

D^R VASILE BIANU • D^R IOAN GLĂVAN

CARTEA SĂNĂTĂȚII



E.D.

EDITURA CARTEA ROMÂNEASCĂ DUCUREȘTI

CARTEA SĂNĂTĂȚII
(DICȚIONARUL SĂNĂTĂȚII)

DR. VASILE BIANU

MEDIC COLONEL IN REZERVĂ,
FOST MEDIC PRIMAR AL SPITALULUI
„I. C. BRĂTIANU” DIN BUZĂU

DR. IOAN GLĂVAN

MEDIC PRIMAR DE SPITAL,
LAUREAT AL ACADEMIEI ROMÂNE,
MEMBRU AL SOC. DE OFTALMOLOGIE DIN PARIS,
MEMBRU CORESP. AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE
DIN ROMÂNIA

CARTEA SĂNĂTĂȚII

(DICȚIONARUL SĂNĂTĂȚII)

STRUCTURA ȘI FUNCȚIUNILE ORGANELOR OMULUI. MEDICINA
UZUALĂ ȘI DE URGENȚĂ, TOT FELUL DE BOALE, ACCIDENTE,
OTRĂVIRI, ASFIXII, EPIDEMII, CONTAGIUNI, MICROBI, NEVROZE,
HIPNOTISM, MEDICAMENTE, PLANTE MEDICINALE, PANSAMENTE,
IGIENA GENERALĂ, ALIMENTE ȘI BĂUTURI, LOCUINȚĂ, ÎMBRĂ-
CĂMINTE, IGIENA PREVENTIVĂ, IGIENA ETĂȚILOR ȘI PROFESIU-
NILOR, IGIENA CURATIVĂ, IGIENA SIMȚURILOR, IGIENA ORA-
ȘELOR ȘI SATELOR, APE MINERALE, HIDROTERAPIE, BĂI, ELEC-
TRICITATE, EXERCİȚIU, GIMNASTICĂ, ETC.

CU 490 FIGURI

PREMIAT DE ACADEMIA ROMÂNĂ CU PREMIUL „NĂSTUREL” 1911

EDIȚIA III-a REVĂZUTĂ ȘI COMPLECTATĂ



EDITURA „CARTEA ROMÂNEASCĂ”, BUCUREȘTI

PRESCURTĂRI

gr. = grame.

ctgr. = centigrame.

mgr. = miligrame.

ctm. = centimetri.

lat. = latinește.

gr. = grecește.

fr. = franțuzește.

fig. = figură.

fam. = familia.

V. = vezi.

ORICE REPRODUCERE, FĂRĂ ARĂTAREA IZVORULUI,
ESTE OPRITĂ

PREFAȚĂ LA EDIȚIA III-a

Cererile neîntrerupte pe care ni le-a făcut publicul dela epuizarea ediției a II-a a „Dicționarului Sănătății” ne-au determinat să scoatem, cu toate greutatețile prin care trece tiparul azi, a III-a ediție.

Modificările aduse sunt multe, fără a schimba structura veche a cărții, pentru că, în cei 12 ani cari s’au scurs dela publicarea ediției a II-a, medicina a fost într’un continuu progres, iar, pe de altă parte, publicul cititor a devenit mult mai pretențios.

Ne-au bucurat în special cererile cititorilor de a desvolta unele capitole — tratate în edițiile precedente mai sumar — și de a introduce chestiuni noi, cari nu figurau până aci. Aceasta denotă o sânguină continuă a cititorilor de a pătrunde tainele medicinei și de a-și agonisi cât mai multe cunoștințe din domeniul igienei, pentru ca să fie cât mai bine înarmați în lupta contra boalelor. Acesta a fost și scopul cu care a fost dat publicității „Dicționarul Sănătății” în prima ediție, de d-l Dr. V. Bianu, care, la vârsta frumoasă de 85 de ani, culege acum roadele grăunțelor sămănate cu 31 de ani mai înainte. Și același scop ne-a condus și pe noi în pregătirea ultimelor 2 ediții: să aducem în casa fiecărui cititor cartea care să-i arate la tot pasul ceace este mai folositor pentru a-i păstra sănătatea și ce măsuri să ia, până la venirea doctorului, când boala îi primejduiește viața.

Greutățile publicării acestei ediții, despre cari am amintit la început, au putut fi învinse numai datorită sacrificiilor aduse de editura „Cartea Românească”, pentru cari îi aducem mulțumirile cele mai călduroase.

Desemnele cari împodobesc cartea au fost executate de d-l Aurel Bordenache, căruia îi mulțumim pentru truda pe care a pus-o ca să fie cât mai de folos cititorilor. De altfel nu ne îndoim că aceștia vor aprecia munca tuturor celor cari au pus toată sânguința ca lucrarea să apară în condiții tehnice cât mai bune.

Dr. Ioan Glăvan.

DOCTORUL DE CASĂ

SAU

CARTEA SĂNĂTĂȚII

A

AA, aa. — Aceste două litere când sunt puse pe o rețetă, sau ordonanță medicală, între numele medicamentelor și cantitatea lor înseamnă că acele medicamente sunt amestecate în părți egale, de exemplu :

Chinină sulfurică } aa 1 gr.
Acid salicilic

Va să zică un gram de chinină amestecat cu un gram de acid salicilic, deci câte un gram din fiecare.

Abatere (Stare de). Caută la *Toro-peală*.

Abator, zalhana. — Este locul de tăiere și de hăbucire, sau îmbucătățire, a vitelor hotărâte pentru măcelărie. Un abator trebuie să aibă : mai multe *ocoale*, sau *țarcuri*, pentru vitele cornute, pentru oi, pentru porci, cari să fie bine pavate și cu șanțuri de scurgere ; — *camere* pentru tăierea vitelor, în număr îndestulător, cari să fie bine aerate, bine pavate și cu pantă pentru ca apa cu care se spală să curgă repede către curtea centrală, unde să intre în canalul principal ; — *apă* în cantitate mare pentru ca să poată spăla tot cuprinsul zalhanalei cu ușurință și în abundență ; — *localuri speciale* pentru pregătirea *măruntaelor*, topirea *săului* și a *grăsimii*, etc. Intr'un abator trebuie să se supravegheze în deaproape *aerarea* (ventilațiunea), *spălarea* amănunțită a camerilor de tăiere și mai cu seamă *scurgerea* repede a apei în canaluri, sau în lipsa acestora în puțuri foarte adânci. Carnea, îndată după tăiere, trebuie cercetată cu de-amăruntul, ca să nu se dea în consumație carnea vitelor atinse de boale molipsitoare, care care are germenii de paraziți : *cisticerc*, *tenie*, *trichină*. Fiecare abator trebuie să aibă o *ghe-tărie*.

Abazie, (din grec. α, priv., și *basis*, mers). — Este o turburare a sistemului nervos, care se produce de obicei la persoanele isterice și se arată printr'o neputință de a umbla în mod normal, deși mușchii nu sunt paralizați. Adeseori *abazia* coincide cu neputința de a sta în picioare sau *anastazia* (vezi acest cuvânt.)

Abces, (lat. *abscessus*, dela *abscedere*, a se depărta), *apostimă*. — O adunătură, sau o colecție de *puroiu*, produsă de o inflamație a țesutului celular, a glandelor și vaselor limfatice, sau a oaselor. Mai totdeauna această îngrămădire de puroiu la un loc se arată sub formă de *umflătură*, mai mult sau mai puțin dureroasă, iar puroiul celei mai adeseori este gros, smântânos, gălbui și fără miros. Abcesul se poate ivi în toate părțile corpului, dar mai adeseori se vede la gât, la sânuri, la subsuoară, la stînghie, în partea dinapoi a armurilor și la pulpe. Orice abces vine, după cum am spus mai sus, în urma unei aprinderi, chiar și umflăturile dela gâtul copiilor scrofuloși. Acestea au mersul lor încet, puroiul se adună puțin câte puțin, pentru că aprinderea care îl fabrică este mai mică, decât la celelalte abcese. Aceste abcese se numesc *reci* (cronice), pentru a se deosebi de abcesele *calde* (acute), care au un mers repede. La abcesele *reci* se mai adaugă așa zisele *abcese migratoare*, sau prin *congestie*, cari se întind departe de locul unde s'au format, iar la abcesele *calde* se pun și abcesele zise *metastatice*, cari se desvoltă într'un loc depărtat de punctul bolnav dela început și cari abcese se datoresc unei infecțiuni de sânge. Când vom vedea într'un punct oarecare al corpului semnele obișnuite

ABCE

ale aprinderii: *umflătură, roșeață, căldură și durere*, trebuie să ne temem de formarea unui abces. Puroiul în abcese *reci* este apos, cu grungiuri, alb-gălbui, sau cenușiu. Un abces este format, copt, gata de a sparge, când durerile, cari la început erau svăgnitoare, s'au mai micșorat, au devenit mai ușor de răbdut; când partea din mijlocul umflăturii s'a mai ridicat, a făcut vârf, s'a mai muiat și pielea s'a subțiat, iar roșeața s'a înlocuit cu o culoare alb-gălbue. Când abcesul este foarte mare, cu mult puroiu, pe lângă semnele de mai sus începe să se turbure și sănătatea generală, mai cu seamă la copii și la persoanele ner-voase, adică bolnavul are fierbințeală, lipsă de poftă de mâncare, sete mare uneori vărsături, durere de cap, lipsă de somn, aiurare, sau spasme la copiii prea mici. *Cauze* sunt mai multe: unele *externe*, altele *interne*. Intre cele externe sunt: căderea, lovitura, înțepătura, intrarea și rămânerea în corp a unui glonț, a unui ac, a unei bucăți de lemn, de fier. Cauzele interne sunt acele cari țin de bolnav; când la un deget dela mână s'a ivit vreun sugiu rău și de lungă durată, sau când la picior s'a aprins și umflat vreo bă-tătură prin frecarea încălțăminteii, se poate prea bine ca într-o bună zi să se arate un abces la subsuoară, sau la stinghie. Abcesele se mai pot ivi în timpul sau în urma unei boale lungi, sau care a slăbit prea mult bolnavul. În aceste cazuri abcesele sunt mai multe și mari; când trece unul se ivește altul, cum se întâmplă la sfârșitul văr-satului, pojarului, scarlatinei, lingoarei, la scrofuloși, la cei slăbiți din pri-cină că n'au hrană îndestulătoare, sau fiind supuși la muncă prea mare tru-pească și sufletească. Cauza adevă-rată sunt **microbii**. Abcesele *reci* cele mai adeseori sunt produse de *micro-bii oficeii*. Mai sunt așa zisele **abcese de fixație**, făcute de medic, pentruca să atragă și să fixeze elementele stricătioase ale unei boale infecțioase, sau ale unei otrăviri în altă parte a corpu-lui, mai puțin primejdioasă. Dacă un abces este bine căutat, trece repede, nu este primejdios, afară numai când este foarte mare și prea adânc așezat, așa că puroiul se poate strecura printre

țesuturi pe întindere mare. Pe cât de repede se vindecă abcesele calde, pe atât de încet merg cele reci, al căror puroiu curge multă vreme și de multe ori pare nesfârșit. Abcesele sunt mai puțin primejdioase prin ele înșile decât prin cauzele cari le-au dat naștere; multe din ele nu le-ar avea omul dacă ar trăi în marginele hotărâte de igienă. *Tratament*: pentru ca un abces deplin format, copt, să se vindece trebuie să se deschidă dela sine, sau să fie des-chis de doctor. La început, se poate ca prin cataplasme de făină de in să dea înapoi, sau dacă nu, să se gră-bească coacerea și prin urmare spar-gerea lui. Pentru aceasta se mai pot face oblojeli calde cu ceai de nalbă, cu fiertură de capete de mac, sau cu făină de in, iar pentru a mai micșora durerile partea bolnavă să se țină în nemișcare, în odihnă și ceva mai ri-dicată. Când însă durerile sunt mari și puroiul adânc și cu aplecare spre a se întinde și strecura mai departe prin țesuturi, atunci doctorul va stră-punge abcesul cu un cuțitaș bine as-cuțit, făcând o tăetură destul de mare pentru ca puroiul să se scurgă cu în-lesnire. După deschidere, abcesul se stoarce încet și pe cât se poate fără durere, spălându-se înăuntru cu acid fenic 2%, sau cu sublimat coroziv 1⁰/₁₀₀, sau cu acid boric 4%, sau în lipsa acestora numai cu apă bine fiartă, sau cu zeamă de pelin, cu ajutorul unui irigator. Apoi vom face o legătură simplă și îngrijită, luând bucățele de tifon moale și curat așa de mari încât să acopere bine partea bolnavă; le vom înmuia în doctoriile mai sus nu-mite, sau în lipsa lor în spirit simplu, în spirit de camfor, sau în apă de Co-lonia înjumătățită cu apă, și le vom pune astfel asupra răni; pe deasupra vom pune un strat mai grosier de vată și vom lega partea cu feși, sau batiste, ori cârpe curate. Aerul din afară înainte de a ajunge la rană se va strecura prin bumbac, se va curăți de orice murdărie și nu va produce nici o stricăciune. Pentru ca tăitura să nu se închidă prea iute se poate pune un fitil de bumbac, sau de tifon, sau un tub de drenaj. Legătura răni se va primeni în fiecare zi odată până la vindecare. Intru cât privește ab-

cesele reci, tratamentul n'are regulă bine hotărâtă, ele se vor deschide mai curând sau mai târziu după împrejurări; în unele cazuri va trebui să se facă răzuirea părților abcesului.

Abces alveolar. v. *Abubă*.

Abdomen, burtă, foale, pân-tece, vin-tre. Este partea trunchiului așezată sub piept (torace); este o cavitate formată în jos de lighean (basin), înapoi de șira spinării din regiunea lombară (șale), în lături și înainte de mușchi. Pân-tecele cuprinde o mulțime de vis-cere (măruntaie). În locul întâi este stomacul (rânza) în mijlocul părții superioare a cavității, unde se vede o infundătură la *lingurea*, (*epigastriu*) (2)




Fig. 1. — Abdomenul văzut din față

asa de simțitoare încât o lovitură mai tare în dreptul ei poate să producă leșin, sau chiar moarte grabnică; aceeașă parte este dureroasă și atunci când stomacul mistue greu. În laturile lingurelei, (fig. 2) se află regiunile numite *ipocondri*; (1,3) cel drept ocupat de ficat, cel stâng de *splină*. Sub epigastriu se găsește regiunea *buricului*, sau a *ombilicului*, în dreptul căreia se află cea mai mare parte a *mațelor*, (*intestine*), și ale cărei laturi, numite *deșerturi* sau *flancuri*, (4,6), cuprind restul mațelor înainte și *rinichi* înapoi. Sub regiunea buricului vine *ipogastrul* (8), în care se

află *beșica* și *organele genitale* la femeie și numai în parte la bărbat. *Boalele pân-tecelui* sunt multe și uneori din cele mai grele. Pielea și mușchii cari formează pârteții lui pot fi supuși la *abcese*, *furuncule*, *contuziuni*, *plăgi*, *brâncă*, *nevralgii*. Aceste boale se întâlnesc de altfel în toate părțile corpului, dar aci trebuie îngrijite și căutate mai repede, căci ele se pot întinde la măruntaie. Alte boale, din cele mai grave, au ca punct de plecare organele interne, cum sunt: *peritonita*, *dropica*, *erniile* și toate boalele de stomac, ficat, *splină*, *mațe*, *rinichi* și *beșică*. Aceste boale au între alte semne *durerile de pân-tece*, *colicele*, *crampele*. Oamenii mari mai au *dureri de ficat* (colici epatice) și *durerile de rinichi* (colici nefritice), localizate în dreptul acelor organe. — La cei ce lu-




Fig. 2. — Abdomen

crează sau umblă cu plumb și preparatele lui, tipografii, turnătorii de litere, zugravii, sau cei ce mănâncă bucate preparate, sau păstrate în vase a căror pârteți cuprind plumb, pot să se otrăvească și să capete dureri, sau *colici de pân-tece* (vezi *Plumb*). Persoanele nervoase adeseori au dureri, sau *nevralgii abdominale*. — Dacă o persoană tânără are dureri așa de mari încât nu poate suferi nici greutatea plapomei și dacă aceste dureri ocupă o mare întindere a pân-tecelui și se însoțesc de fierbințeală și vărsături, trebuie să ne gândim la o *peritonită*, adică la aprinderea cămășii mațelor. — Dacă durerile se simt când apăsăm cu mâna în flancul drept și auzim ghiorăituri, dacă bolnavul are în același timp căldură mare, durere de cap, slă-

ABDO

biciune mare, diaree, probabil că avem de a face cu o *febră tifoidă* (lingoare) la început.—*Cancerul* stomacului, ficatului, al rinichiului, de asemenea produce dureri de pânțece, uneori foarte mari. Când abdomenul este *umflat* peste tot, conține multe gaze și lichide. În cazul dintâiu el ia forma unui balon umflat (*balonarea pânțecelui*) și când îl ciocănim cu degetele răsună ca o tobă, *timpanism* (*timpanos*, = tobă) Se întâmplă uneori că umflătura se face încet și se mărește neconținut, sau se micșorează într'o zi pentru a reveni în ziua următoare la ceea ce a fost; în aceste cazuri în pânțece se găsește apă, avem dropică (*idropizie*).—La copii această umflătură fără încetare este de multe ori un semn de *oftică la pânțece*. Tot la copii se mai poate întâmpla ca abdomenul să se micșoreze în mod *simțitor* și că din umflat ce era să se scufunde, atunci, dacă copilul mai are și durere de cap, trebuie să ne gândim la o *aprindere de creeri, la o meningită tuberculoasă*, în care cămașa creierilor este inflamată.—Când umflătura pânțecelui este mărginită numai la o parte, ea ne arată mai întotdeauna o *tumoare* (modălcă, boț). Pielea abdomenului își *schimbă culoarea* în diferite boale, acoperindu-se cu pete roșii cum se întâmplă în febrele eruptive (vărsate, pojar, scarlatină), în abcese, furnicele, brână. În febra tifoidă se ivesc niște pete trandafirii având forma unui bob de linte, cari pier sub apăsarea degetului, pentru a se ivi din nou îndată ce se ridică degetul. Câte odată se ivesc pete mai închise, albastrii sau negre, la sfârșitul unor boale și cari ne spun că moartea se apropie. *Loviturile* (*contuziunile*) și *rănile* (plăgile) abdomenului, pot să provoace ruptura măruntaelor (leziuni prin *contra-lovitură*); *loviturile directe* cu o peatră, un ciomag, cu piciorul de om, sau de cal, de asemenea pot produce ast-fel de rupturi, fără ca pe perețele pânțecelui să se vadă ceva. În toate aceste cazuri bolnavul simte dureri mari cu sfârșeală sau leșin, cu vărsături și oprirea udului, apoi poate să urmeze *peritonita* cu toate semnele ei.—*Plăgile* sau *rănile* pot fi: *superficiale*, când ating numai pielea și mușchii păretelui, și *adânci*,

când au fost atinse organele interne. În acest caz avem durere mare profundă, paloarea feței, aplecare spre leșin, sughiț, balonarea pânțecelui, vărsături, formarea unei ernii (eșirea măștelor): dacă organele mistuirii sunt găurite, sparte, materiile se scurg în burtă, după care avem apoi semne de *peritonită*. *Tratamentul* contuziunilor și plăgilor: repaos absolut, dietă și opiu pentru calmarea durerilor și operație dacă va fi trebuință.

Abies alba sau **pectinata**. — V. *Brad*.

Ablefaria (gr. *a* = fără și *blefarin* = pleoape).—Este o anomalie *congenitală* caracterizată prin lipsa completă a pleoapelor.

Abluțiune. — V. *Spălare*.

Abort (lat. *abortus* = care se naște înainte de vreme), *avort*, *lăpădătură*, *pierdere*, *pierzanie*.—Se numește astfel expulzarea, sau darea afară a fătului înainte ca el să fie viabil (trainic), adică înainte de a 210-a zi (7 luni) când începe viabilitatea adevărată. *Avortul* este de 2 feluri: *spontan*, când vine dela sine, fără nici o pricină de dinafară, și *accidental* când este produs de vr'o căzătură, lovitură, etc. *Cauzele* sunt *generale* și *locale*. Între cele dintâiu avem emoțiunile morale, hrana neîndestulătoare și munca obositoare, boalele cu fierbințeală, albuminuria, oftica, sifilisul; între cele locale avem: loviturile, căderile, zdruncinul trăsuri, umbletul prea mult, oboselile și excesele de tot felul, mai ales acele cari se produc în ziua care corespunde cu venirea sorocului; un vițiu de conformație al bazenului, care fiind prea strâmt nu lasă să se desvolte fătul; o stare de iritabilitate, sau de rigiditate a mitrei, care nu-i permite să păstreze produsul concepțiunii peste un timp oarecare; aderențe periuterine și alte stări bolnăvicioase. Ca *semne* ale avortului avem dureri de mijloc sau de șale, curgerea câtorva picături de sânge, apoi emoție mare cu expulzarea fătului, mai mult sau mai puțin repede (câte odată numai după câte-va zile). Pe lângă varietațile de avort mai sus amintite mai avem și avortul *provocat* prin operație, de către doctor, cu scop determinat, pentru a scăpa femeia de unele urmări rele ale nașterii la timp, sau

ABOR

ABST

de către moaşe, sau altă persoană, în scop *criminal*. Semnele sunt aproape aceleaşi ca şi în cazurile celelalte. *Avortul provocat medical* se impune numai când viaţa femeii atârână de încetarea sarcinei (în cazurile de vărsături, cari istovesc femeia) de strâmtorarea căilor naturale din care pricină nu poate ieşi copilul, sau când femeia suferă de o boală care s'ar agrava şi mai mult prin sarcină). — *Tratament*. Pentru a *preveni* avortul se vor combate cauzele care îl pot provoca; dacă sifilisul este în joc se va institui un tratament apropiat; femeia va sta în pat mai multe zile în timpul presupus al regulelor; pentru constipaţie i se vor face clistere cu apă glicerinată, sau fiertură de grăunţe de in. Când femeia are pierderi de sânge i se va da: extract fluid de idrastis canadensis, câte 50 picături de 2—3 ori pe zi. *Tratamentul curativ*, când avortul ameninţă să se facă vom recomandă: repaus absolut în pat, hrană uşoară, alimente reci, clisme mari de curăţenie, urmate de clisme mici de laudan (25—30 picături) sau cu cloral (1 gr.). Când este scurgere de sânge prea mare se vor face injecţiuni vaginale cu apă fierbinte de 45°, simplă, sau cu acid boric (40 gr.) sau cu hipermanganat de potasiu (25 gram la litru); femeia va trebui să stea cu capul mai jos şi cu mijlocul mai ridicat şi pe cât se poate în nemiscare; se va tampona vaginul cu tifon iodoformat, sau salolat. Dacă expulzarea fătului şi a anexelor este *incompletă*, sau dacă se iveşte o emoragie mare, doctorul face dilataţia (lărgirea) gâtului mitrei şi goleşte mitra, fie cu degetul, ajutându-se cu cealaltă mână apăsând pe fundul mitrei, sau cu o *lingură ale cărei margini să nu fie tăioase*; după ce am golit mitra vom face o injecţie în interiorul ei, caldă şi puţin antiseptică (acid-fenic 2 la 100, etc. şi tamponament vaginal; vom da în acelaşi timp: ergotină 2 gr., apă destilată 100 gr., sirop de coji de portocale amare 30 gr., să ia la oră 1 lingură; ergotina se mai poate da şi în injecţii sub piele. — *La fară* babele dau la pierzanie fiertură de coajă de cireş amar (prunus avium), coada vacii (salvia silvestris), măhuri

de grădină (chenopodium scoparia), puzderie de meliţoi de cânepă şi rădăcină de pătrunjel (petroselinum sativum).

Abortiv (lat. *abortivus*, dela *ab*, negaţiune, şi *ortus*, naştere). — Medicament care provoacă *avortul*. — *Tratamentul abortiv* are de scop să facă o boală să dispară chiar dela începutul ei. Aşa de exemplu *sifilisul* şi *blenoragia* pot fi oprite în desvoltarea lor printr'un tratament energetic instituit chiar dela început, în primele ore, sau zile.

Absenţă, distracţie, uitare de sine, a se pierde. — Prin cuvântul absenţă se înţelege dispariţia trecătoare a facultăţilor intelectuale, cu păstrarea simţirii şi a mişcării. În absenţă gândirea se întunecă de odată, inteligenţa se suspendă repede, mai mult sau mai puţin în mod complet, dar, din fericire, în mod trecător. Un exemplu: o persoană în mijlocul unei conversaţiuni, a unei fraze, a unui cuvânt chiar, pe care nu-l poate sfârşi, se opreşte de odată, ochii săi devin aţintiti, trăsăturile feţei iau o înfăţişare uimită, se pare că nu mai aude nimic, orice semn de inteligenţă dispăre de pe faţa ei; apoi, după câteva secunde, sau minute, îşi reia şi termină fraza începută, tot aşa pe neaşteptate ca şi cum n'ar fi întrerupt-o; gândirea revine, totul reîntre în ordine, numai că memoria rămâne cam confuză. Absenţa se observă în starea normală în urma unei munci exagerate, a oboselii corpului şi a minţii, în beţia alcoolică, sub influenţa unor medicamente. În aceste împrejurări ea dispăre repede prin odihnă. Absenţa mai poate rezulta dintr'o boală a sistemului nervos, în deosebi în cazurile de epilepsie (boala copiilor) şi de înmuierea creierilor. În aceste boale ea se repetă des şi nu sfârşeşte decât odată cu boala care o produce (vezi *epilepsie*, *înmuierea creierilor*). — Absenţa n'are nici un tratament deosebit al ei şi dacă se repetă trebuie consultat un doctor.

Absint. — V. *pelin*.

Absorpţiune. — Rezultatul terminal al mistuirii (v. *Digestiune*).

Abstinenţă (*abstinentia* dela *abstinere*, a se lipsi de...), *ajun, post, sec*. — Prin acest cuvânt se înţelege a nu mânca nimic, nici una din substanţele

alimentare, sau a mânca numai unele din ele. Abstenența cele mai adeseori este *volutară*, de bună voie, când și-o impune omul singur, de fanfaronadă, sau prin o idee fixă (nebulie, isterie, sinucidere), sau este prescrisă de doctor (abstenență terapeutică), sau de biserică (religioasă). Câte o dată este *involuntară*, de nevoie, cum se întâmplă cu asediații, cei închiși într'o cetate în vreme de războiu, cu naufragiații, cei rătați pe mare, cu lucrătorii surprinși într'o mină, sau într'o carieră prin surpare, sau, în fine, cum se întâmplă cu animalele supuse la o experiență și cari postesc mai mult timp. Abstenența este *completă*, când toate alimentele solide și lichide sunt suprimate; *incompletă* când te lipsești sau numai de alimente solide, sau numai de băuturi, sau numai de unele mâncări, de exemplu de cele grase, sau preparate cu carne. Biserica noastră creștină ortodoxă ne impune de mai multe ori pe an astfel de abstenență, care se cheamă *post*. — *Abstenența completă* dă naștere la accidente foarte grave, mortale chiar, după câțva timp, și în acest caz moartea vine prin *inanitie*. Prin nemăncare greutatea și căldura corpului scade treptat, puterile se micșorează, bătăile inimii se răresc și slăbesc împreună cu respirația, sângele se răcește, pofta de mâncare scade, se ivește o urdinare (diaree), care mărește slăbiciunea generală; în cele din urmă se arată turburări nervoase, nesimțire, halucinații și delir (aiurare). Cel ce nu mănâncă de loc, trăește din propria lui carne, consumându-și mai întâi grăsimea apoi mușchii și când a pierdut 4 din 10 părți din greutatea sa el moare, mai de grabă copilul și adultul decât omul matur. În unele stări nervoase, cum sunt catalepsia, isteria și letargia, omul poate suporta abstenența peste termenul obișnuit; se citează cazuri de *ajunare completă* timp de 12, 25 și chiar 60 zile. O chestie importantă este de a se ști ce hrană trebuie dată celor cari n'au mâncat mai mult timp, cum se întâmplă cu naufragiații, cu cei închiși în mine. În primele momente nu se dă carne, nici vin, nici băuturi spirtoase, ci numai lichide nutritive, cari sunt mai bine suportate de stomac: zeamă de carne

(bulion) fără grăsime și caldută, în cantitate mică, apoi mărindu-se doza din sfert în sfert de oră, și când vedem că acest lichid este tolerat, batem și un gălbenuș de ou în el, apoi numai după câteva ceasuri putem să dăm puțină carne crudă, tocată în supă, sau mai bine praf de carne în apă zaharisită. Mai târziu vom da puțin lapte, iar dacă stomacul nu-l poate suporta, ne vom întoarce iar la zeamă de carne. Trebuie să obișnuim omul pe încetul cu mâncarea și numai după aceea îi vom da carne și vin.

Postul este o abstenență incompletă, prescrisă în măsură mai aspră de religiunea creștină ortodoxă. Dacă posturile ar fi mai puține și mai scurte, n'ar fi mare lucru de zis, căci ar fi numai o variație în hrănirea zilnică, favorabilă sănătății, dar când ne gândim că sunt 4 posturi mari la cari mai adăugând alte 68 zile (mercurile și vinerile) ajungem la 194 zile de post pe an; când ne gândim pe de altă parte la mâncarea mai mult decât săracăcioasă pe care o are în zilele de dulce, la celelalte împrejurări rele de trai și la munca obositoare pe care o desfășură în cursul anului, și mai ales primăvara în postul mare, nu mai trebuie să ne mirăm de ce Românul este slab, sleit de putere și anemic, de ce neamul nostru e decimat ușor de boli. Dacă postul este rău pentru oamenii adulți, maturi, cu mult mai rău este pentru copii și pentru tinerii în cale de dezvoltare (sub vârsta de 15 ani), pentru femeile slăbuțe, cari mai curând sau mai târziu vor fi chemate, sau au fost chemate, să-și facă datoria de mamă, pentru orice om slab, delicat sau bolnav de stomac, pentru toți bolnavii sau pentru cei ce abia au scăpat de vreo boală grea, convalescenții. Prin urmare, *nu trebuie să postească*, cei bolnavi la pat, și toți acei ce suferă de lipsă de sânge (*anemie*), cari sunt slabi și bolnăvioși, apoi copii mai mici de 12 ani. De altfel, nici biserica noastră nu cere post dela toți aceștia, preoții chiar spun aceasta credincioșilor de pe amvon și în vorbirile de toate zilele, că în astfel de împrejurări omul este scutit de păcat, că biserica noastră nu vrea moartea credinciosului, ci binele și sănătatea prin regulile ei bine înțelese și potrivit

aplicate. Cât de păgubitor este postul pentru sănătate se poate vedea la articolul: *Alimente*, unde arătăm cât trebuie să mănânce un om pe zi și unde se face o comparație între mâncarea de dulce și cea de post. Pe lângă abținerea religioasă mai este cea *accidentală*, de nevoie, cum se întâmplă cu naufragiații, sau cei ce sunt victime ale unei catastrofe și cari mai au câte ceva de mâncare, însă de calitate rea și în cantitate neîndestulătoare. În fine, mai este abținerea incompletă prescrisă de doctor unui bolnav și care se cheamă *dietă* (vezi acest cuvânt).

Abubă, *abces alveolar*. — Când cineva are o măsea stricată, adeseori se întâmplă că la răceală să se umfle gingia în locul acela, să fie dureroasă și să coacă; umflătura se poate întinde la obraz. Această umflătură este însoțită de fierbințeală, lipsă de poftă de mâncare și durere svăcnitoare, uneori foarte mare, care nu încetează până când abuba sparge; de aceea este bine ca ea să fie deschisă cât se poate mai iute de doctor. Coacerea abubei se poate grăbi punând des cataplasme de făină de in, cât se poate de calde și făcând des gargară cu ceai cald de mușătel, iar după ce a spart, sau s'a deschis să se urmeze cu gargară de acid boric (4%), apă oxigenată, sau hiperol, pentru a desinfecța gura, până la vindecare. Pentru a nu se întoarce abuba este bine ca să se scoată dintele, sau măseaua stricată, ori să se plumbiească.

Abulie (gr. fără și *buli*, voință). — Micșorarea, sau lipsa totală a voinței la un individ care se află în stare de a gândi și de a executa un act, dar care și-a pierdut puterea de hotărîre, dorințele lui devenind prea slabe, sau că porunca de dat cere o concentrare intelectuală imposibilă. Abulia este una din formele *obsesiunii*.

Acar (*acarus*). — Sub acest nume se înțeleg mai multe specii de animale mici din clasa *Arachnidelor*, cari trăesc ca paraziți. Cei mai importanți sunt: *acarul sau căpușuța râei* numit și *sarcopie scabiei* (v. *Râie*), *acarul coșilor*, sau coșurilor de pe față, numit *demodex folliculorum* (v. *Acnee*), apoi *acarul brânzei mucigăite*, mic, aproape nevăzut cu ochii, fără aripi și cu opt

picioare, care trăește în brânză, pas-tramă, în mucezeala pâinii, a dulceturilor etc.

Acces (*accessus* dela *accedere*, a se apropia, a ajunge, a sosi), *apucat*. — O stare bolnăvicioasă care vine și încetează la intervale mai mult sau mai puțin îndepărtate. Fiecare acces este despărțit de accesul premergător printr'un interval de sănătate aparentă. Cuvântul *acces*, întrebuințat singur, n'are nici un înțeles, de aceea el trebuie să fie urmat întotdeauna de un alt cuvânt, care să-l lămurească, prin urmare vom zice că o persoană a avut un *acces de friguri*, un *acces de delir*, un *acces de epilepsie*. Când este vorba de friguri sau febră, nu trebuie să se confunde *accesul cu paroxismul* cari nu sunt decât agravări ale unei stări bolnăvicioase; boalele acute, fluxiunea de piept, febra tifoidă etc. se însoțesc de o febră care ține tot atâta cât ele, dar care în unele momente prezintă o creștere mai mare, care creștere nu este un *acces*, fiindcă febra n'a încetat nici odată cu totul, ci este o creștere a febrei. Din contră, pe când cortejul obicinuit al febrei reappare numai la anumite ceasuri din timpul zilei și dispare apoi cu totul până în ziua următoare, atunci avem de a face cu un *acces de febră intermitentă*, (întreruptă) cum sunt *frigurile noastre palustre*. Tipul *febrei cu acces* este febra intermitentă, care prezintă trei stadii (fiori, căldură și nădușală) și ale cărei accese revin în fiecare zi, sau la trei zile odată, sau și mai rar (vezi *Paludism*). Boalele cu accese regulate și periodice se tratează de obicei cu preparatele de *chinchina*.

Accident (*accidens* dela *accidere*, a se întâmpla, a veni fără veste, pe neașteptate), *întâmplare nenorocită, ceas rău*. — Când te răstoarnă o trăsură ești victima unui *accident*, iar când te lovește apoplexia ești un *bolnav*. În cazul întâiu corpul a fost atins pe neașteptate de un agent exterior de care putea scăpa; în cazul al doilea sănătatea a fost turburată de o pricină care se găsea în organism de un timp oarecare și a cărei arătare s'a ivit pe neașteptate, repede. Unele accidente sunt speciale *căilor ferate, orașelor, șetelor*, iar altele se pot produce la țară

ca și la orașe, iar copiii și bătrânii sunt cei mai expuși. Bărbații dau victime mai multe decât femeile, din cauză că ei umblă mai mult. Se mai întâmplă multe căderi de pe înălțimi mari, de pe case, de exemplu cei ce acopăr clădirile, zidarii, zugravii, cari adese ori își găsesc moartea în exercițiul meseriei lor. S'au mai observat în orașe cazuri de asfixie prin gaz aerian, sau prin cărbuni aprinși (mangal), coșul sobei fiind închis. Desvoltarea cea mare a întrebuintării mașinelor, a motoarelor de tot felul, a făcut să crească în mod simțitor numărul victimelor în fabrici și ateliere. Aceste accidente produc răni adânci și întinse, smulgeri de mâini și de picioare, cari dacă nu produc moarte, lasă în urma lor tot atâți neputincioși de a-și agonisi hrana zilnică. La țară accidentele de asemenea sunt numeroase: tăieri cu topoare, sape, coase, înjunghieturi cu cuțite, împunsături de tauri, boi și vaci, căderi de pe clăi și căpițe de fân, sau paie, răni grozave și înspăimântătoare în batozele de treerat și în diferite mașini agricole etc. Din toate aceste se poate vedea cât de numeroase și de variate sunt cauzele accidentelor, semnele lor și tratamentul acestor accidente variază după felul lor. În toate cazurile prima grijă trebuie s'o avem de a ridica rănitul, de a-l duce acasă, sau la spital, a-l culca, afară numai când o scurgere de sânge prea mare, sau o pierdere de cunoștințe nu ne silește să-i dăm pe loc primele ajutoare (v. *Răniți. Salvarea*).

Accidentele de muncă. — Orice vătămare a corpului omenesc datorită unei acțiuni imediate și violente a unei forțe venite din afară. Tot ca accident de muncă se consideră anumite afecțiuni patologice, spre ex.: *Cărbunele* contractat de un lucrător în exercițiul meseriei, sau *Sifilisul* inoculat suflătorului de sticlă prin instrumentul de suflat, contaminat. *Hernia* e considerată accident de muncă în caz când e rezultatul unui traumatism (hernie prin sforțare), unei sforțări bruște, anormale și violente, care l-a silit pe bolnav să întrerupă munca imediat din cauza durerilor și a herniei apărute.

În toate țările civilizate accidentele de muncă au făcut obiectul unei legis-

lații speciale. Foarte multe accidente de muncă sunt datorite *beției, uni-formei* de atelier (bluză flotantă etc.), *scărilor* nepractice, lipsa *apărătorilor* ferestraelor circulare, curelelor delamotore, roților, lipsa de *măști* apărătoare, *ochelari* protectori.

Acetanilidă. — V. *Antifebrină*.

Acetic (Acid), Acetate. — Dacă ținem la aer un lichid fermentat, cum este vinul, berea, cidrul, după câțva timp obținem un *acid acetic foarte diluat*, cunoscut sub numele de *oțet*. — În farmacie se prepară un *acid acetic concentrat*, solid, cristalizat, cu miros tare și înțepător, care se întrebuintează în medicină drept *caustic* (arzător) și *stimulent*. Ca *stimulent*, acidul acetic se întrebuintează în cazurile de *sin-copă* (leșin), de *asfixie* (sufocație, înecăciune), de pierdere de cunoștință. Dăm bolnavului să respire pe nas aburii cari ies din cristalele lui, închise într'o sticlută, al cărei conținut, uneori parfumat, se vinde în comerț sub numele de *sare de oțet*, sau *sare de Englițera*. Aceste inhalări nu trebuie prelungite prea mult, căci pot arde căptușeala nasului. — Acidul acetic se combină cu unele corpuri și formează niște săruri numite *acetate*: acetat de amoniac (V. *Amoniac*), acetat de cupru (V. *Cupru*) acetat de plumb (V. *Plumb*).

Acetiltanin. — V. *Tanigen*.

Aceton. — Este un lichid inflamabil, incolor, cu un gust arzător și cu miros de gutuie, sau de cloroform. Acetonul este *anestezic* și *antiastmatic* când se dă în inhalări, punându-l la nasul bolnavului.

Acetonemie (dela cuvântul *aceton* și din gr. *aima*, sânge, ceea ce arată că acetonul a intrat în sânge). Acetonul se formează în organismul nostru prin fermentarea materiilor organice și mai ales a zahărului, cum se întâmplă în *d'abet*, cunoscut sub numele de *boală de zahăr*. În această boală, când s'a ivit *acetonul* în sânge, este un semn rău, deși el prin sine însuși este prea puțin toxic.

Acetonurie (dela cuvântul *aceton* și din grec. *uron*, urină). — Când urina are aceton ea are un miros deosebit și care se simte și din respirarea bolnavului. De altfel acetonul se află

nt'r'o cantitate mică și în urina omului sănătos, cam 5 până la 20 miligrame. Această cantitate crește printr'o hrană prea azotată, dar mai cu seamă în *diabet*, în urma oboșelii, a emoțiunilor, sau a unui regim prea bogat în carne, putând ajunge până la 2 grame și chiar 10 grame în unele *dispepsii*. În aceste cazuri bolnavul are vărsături, constipație, febră, agitațiune și chiar delir și atunci se recomandă o hrană ușoară (ciorbe, pireuri, apă de Slănic, de Căciulata). La *diabet* bolnavul are vărsături însoțite cu urdinare, respiră foarte greu, iar temperatura corpului scade sfârșind prin comă.

Acetopirină (aceto-salicilat de anti-pirină). — Proprietăți: analgesic (contra durerii) și antipiretic (contra căldurii). Se dă contra migrenei și a nevralgiilor; 3 gr. pe zi în buline de câte 50 ctg.

Acefal. — Făt născut fără cap.

Achillea Millefolium. — V. *Coada șoricelului*.

Acholie (dela gr. *a* priv., *choli*, bilă, fiere). — Suprimarea secrețiunii biliare.

Achondroplasia. — Oprirea în dezvoltare a oaselor fătului în lungime. Achondroplasia *adevărată*: calcifierea cartilajului de conjugare, osificarea periostului normală. În *displasie periostală* invers. Cei mai mulți copii născuți astfel mor.

Semnele boalei. Macrocefalie, micro-melie, stern cu șant, fesele evidențiate, omoplatul și basinel strâmte, capul superior al umărului mai mare decât cavitatea glenoidă, mâna pătrată, ușoară subluxație a femurului, tibia curbată înăuntru.

Achondroplasia poate fi fiziologică, ereditară (Pygmeii) sau patologică. **Tratament.** — Tratamentul sifilisului ereditar dă rezultate bune.

Achorion. — V. *Favus*.

Achromatopsie. — V. *Ochii*.

Achromie (dela gr. *a*, fără *chroma*, culoare). — Decolorarea mai mult sau mai puțin mare a pielii prin lipsa de pigment. Ea este de obicei din naștere.

Acid (*acidum*, acru). — În mod general se numesc *acide* corpurile cari au un gust acru, mai mult sau mai puțin tare, cari înroșesc tinctura albastră de turnesol, cari se combină cu *alcalii* formând *săruri*. Acidele ex-

trase din regimul mineral se chiamă *minerale* (acidul azotic, ac. sulfuric, sau vitriolul, etc.); cele din regimul vegetal și animal se chiamă *organice* (acidul acetic, tartric, etc.) Ele au proprietăți diferite după cum sunt *concentrate*, sau *diluate* adică curate, sau înjumătățite cu apă. *Acidele curate*, sau *concentrate*, ard organele omului fiind *caustice*, pentru care în medicină nu se folosesc decât *pe dinafară*, când vrem să distrugem unele tumori, sau crescături mici, dar și atunci numai după sfatul doctorului. Dacă ar lua cineva *pe dinăuntru*, ar bea vr'un acid concentrat, în urma unei greșeli, sau cu hotărîrea de a se omorî, imediat s'ar ivi semnele unei *otrăviri* puternice, cu arsura buzelor, a gurii și a gâtului, neputința de a mai înghiți, o arsură cumplită la stomac, vărsături bilioase (ca fierea) și cu sânge, slăbiciunea pul-sului și aplicare spre leșin. În aceste cazuri trebuie dat bolnavului să bea mult lapte, cât de mult, și apă albu-minoasă, bătută cu albuș de ou, (vezi *Apă*); aceste lichide, cari sunt la îndemâna tuturor, prin albumina ce conțin, învâluie acidul și micșorează atingerea lui cu căptușeala (mucoasa) stomacului și a mățelor. După aceasta i se va da să înghită o mare doză de *magnezie* tăiată cu apă, care este *contra-otrava* acidelor. Dacă omul a scăpat cu vieață, stomacul și mățele lui rămân inflamate (aprinse), iar inflamațiunea va fi îngrijită și tratată după cum trebuie (vezi *Enterită* și *Gastrită*). *Acidele diluate*, sau *subțiate cu apă*, sunt prescrise sau ca *astringente* (stângătoare) sau ca *răcoritoare*. Ca *astringente* (vezi acest cuvânt) se aplică *pe dinafară*, pentru a opri o *curgere de sânge* puțin abundentă, de obicei apă cu oțet, sau pentru a spăla o tăetură care sângerează, sau trăgând pe nas când curge sânge, sau făcând o clismă, când face cineva sânge pe șezut (vezi *Oțet*). Când un bolnav are *amigdale mari* (gâlci în gât), sau *omuşorul umflat*, este bine să facă gargară cu apă în care se pun 15 până la 20 picături acid clorhidric la 200 grame apă. Tot astfel vor face cei ce au *arşiță* în gură, *scorbut*, sau orice umflătură de gingii (vezi *Stomatită*), gangrenă sau răni în gură, în care cazuri e bine să se atingă părțile cu

ACID

niere de trandafir (merică) în care se vor pune câteva picături de acid clorhidric, cunoscut și sub numele de *spirt de sare*. Ca *răcoritoare* acidele se întrebuițează în *băuturi*, făcute cu multă apă, cari au gust acrișor și plăcut, potolesc setea, micșorează căldura corpului și prin urmare sunt bune în multe boale acute; vara toată lumea bea cu mare plăcere câte o *limonadă* făcută cu lămâe, sau acid citric, ori cu alte acide, fără să aibă trebuință de ordonanța doctorului (vezi *Limonade*).

Acid galotanic. — V. *Tanin*.

Acid tanic. — V. *Tanin*.

Aciditate de stomac. — V. *Acrime*.

Acitophosan. — Este un preparat bun cu Tofosan (2 — fenilchinolin — 4 — acid carbonic și acid acetil salicilic). Se recomandă în *sciatică*, nevralgii ale trigemenului, lumbago, dureri de cap, gută, reumatism, icter carteral, litiază biliară, gripă. Se vinde sub formă de praf și tablete. Zilnic se ia de 3 ori câte 1 sau 2 tablete cu apă. După ce s'a înghițit tableta, se mai bea un pahar de apă. Pentru cei cari au greață se recomandă să ia după aceea și un vârf de cuțit de bicarbonat de sodă în puțină apă, — (1/2 pahar).

Acimatare. — V. *Acimizare*.

Acimatație. — V. *Acimizare*.

Acimizare, acimatare, acimatație. — Este acomodarea sau obișnuirea unei persoane cu un alt *climat*, sau cu o țară a cărei latitudine și temperatură se deosebesc de acele ale climatului său, ale țării în care s'a născut și a trăit mai mult timp. La o latitudine chiar ridicată omul se obișnuiește destul de repede, pe câtă vreme în țările calde acimizarea este foarte anevoioasă. Cea mai potrivită vârstă la care omul poate să schimbe climatul este 35 ani, iar cea mai nepotrivită pentru aceasta este copilăria, până la 12 ani. Boalele cele mai obișnuite sunt cele de stomac (lipsă de poftă de mâncare, urdinare), de ficat, de piele, frigurile intermitente, anemia boalele de femei, dizenteria. Ca *reguli igienice*, când te duci în țările călduroase: să nu bei decât apă fiartă, să nu eși pe afară la răsăritul și asfințitul soarelui, să nu te duci acolo decât în lunile Decembrie și Ianuarie, să locuiești într-o poziție înaltă, să închizi ferestrele din

partea din care bat vânturile cari vin din părțile băltoase, să observi o mare curățenie (băi, dușuri); exerciții moderate, dar nu în ceasurile călduroase; să nu faci excese de băuturi alcoolice, nici de mâncare. Aceste zise ne vom ocupa acum cu acimizarea individului care a trăit la țară și vine să șadă la oraș, sau de acela care dela oraș se duce la țară, apoi de acimizarea pe malul mării, sau într'o stațiune cu ape minerale. — *Acimizarea la oraș*. Când cineva, care a trăit mult timp la sate, vine să locuiască în vreun oraș, el va trebui să modifice treptat, încetul cu încetul, acțiunea aerului, a hranei și a apei de băut. Aerul orașelor nu este așa de curat și de bogat în oxigen ca cel dela țară, el este plin de murdării animale și industriale, din care cauză omul suferă mai ales atunci când este silit, pentru a-și agonisi hrana zilnică, să stea închis toată ziua într'un loc îngust, strâmt, într'un birou sau magazin cu tavanul jos, în care atmosfera este stricăta de gazul aerian și de respirația celor ce trăesc acolo. În acest caz cel mai bun lucru este ca el să se plimbe dimineața și seara mai mult timp, decât să stea uitat în vreo cafenea, sau în vreun club ceasuri întregi, unde va căpăta bătaie de inimă, năduf, dureri de cap, pierderea poștei de mâncare, nemistuire și altele. *Hrana* de asemenea trebuie să se schimbe pe încetul, să nu mănânce numai decât întotdeauna ca orașenii, cari au stomacul mai rafinat, apetitul și gustul mai căpricios, din care cauză întrebuițează la masă condimente, piper, ardei și diferite sosuri, precum și multă carne, ceea ce pentru cei ce au trăit la țară ar fi rău, căci le-ar obosi stomacul numai decât și le-ar produce diferite boale. Prin urmare, săteanul când se mută la oraș trebuie mai întâi să-și aleagă mâncările cele mai simple, să bea vin puțin, să se ferească de băuturi spirtoase. *Apa de băut* în oraș este de foarte multe ori rea, mai ales în cele cari nu sunt canalizate și poate da naștere la diferite boale grave: febră tifoidă, diaree, dizenterie, etc de aceea este bine ca să se bea apă fiartă, răcită și bătută (aerisită), sau apă filtrată pentru cei bogați, cari o

mai pot bea amestecată cu diferite ape minerale. Nu trebuie să uităm și *influențele morale*; la oraș vieța intelectuală este cu mult mai dezvoltată decât la sate: teatru, adunările, afacerile private și publice sunt obiectul unei preocupări constante. *Acclimatizarea la țară*. Aerul dela sate este curat, oxigenat și foarte priincios la îndeplinirea tuturor funcțiilor corpului. În schimb însă el păcătuște adeseori prin umezeală și temperatură, fie din pricină că se află în apropiere o pădure întinsă, o apă curgătoare, sau stătătoare, fie din cauză că el suferă dintr'o zi în alta, sau chiar în aceeași zi, variații de mai multe grade de căldură, alte ori fiindcă locuințele dela țară nu sunt un adăpost suficient contra frigului uscat, sau umed. Pentru orașean aceste influențe climaterice sunt mai de temut decât pentru satean, care este obicinuit ca mai mult de jumătate din viața lui s'o petreacă afară din casă, astfel el este expus la guturai, tuse, junghiu, congestii de plămâni, reumatism. Va trebui dară ca să poarte haine mai groase și de lână, să se plimbe cu măsură și să nu stea ceasuri întregi în bătaia vânturilor, să iasă din casă numai în timpul zilei, iar nu dimineața și seara când răceala și umezeala sunt mai de temut. Și aceasta mai ales în locurile băltoase, mlăștinoase, unde domnesc frigurile palustre. Întru cât privește *hrana*, schimbarea traiului trebuie iarăși să se facă pe încetul și treptat. Lăpturile sub toate formele și legumele formează temelia hranei dela țară, carnea foarte rar se găsește, mai ales cea de vacă, dar în schimb se poate întrebuința în măsură mai mare carnea de pasăre. — *Acclimatizarea pe malul mării și în stațiunile de ape minerale*. Când te duci dela oraș, sau dela sate, pe malul mării, sau într'o stațiune cu ape minerale, trebuie să te obișnuiești cu un nou fel de viață, schimbându-ți casa, masa și obiceiurile. Fiind silit să mănânci la birt trebuie să fi cu băgare de seamă ca mâncările să fie bine gătite și nici odată să nu-ți încarci stomacul prea mult. Aerul de mare este întăritor, dar este prea încărcat cu umezeală, mai cu seamă dimineața și seara; umezeala pentru oamenii ner-

voși nu este bună, de aceea este bine ca plimbările pe mal să se facă numai în timpul zilei, când soarele e pe cer. Băile să nu le înceapă omul în ziua când a sosit la mare, nici a doua zi, ci numai după o odihnă de 48 ceasuri, după ce mai întâi s'a obișnuit cu aerul de mare. Același lucru se recomandă pentru orice stațiune de ape minerale; trebuie întotdeauna ca înainte de a începe cura să te odihnești de obo-seala călătoriei.

Acnee, coși, funigiei. — Aceste coșuri se cunosc în medicină sub numele de *acnee* (dela cuvântul gr. *akme*, care înseamnă punct) Acnea este o boală de piele datorită unei inflamațiuni (aprinderi) a glandelor sebacee, alipite la firele de păr și cari secretă o materie grăsoasă, un fel de seu. Acnea este de mai multe feluri: 1. *Acnea vulgară*, sau *polimorfa*, cunoscută în popor și sub numele de *funigiei*, adică vărtele coșuri, cari sunt niște ridicături sau bubulițe roșietice, de mărimea unei gămălii de ac până la aceea a unui bob de mazăre, înconjurată de un mic cerc mai puțin roșietic. Vârful ridicăturii se îngălbenesc, apoi se sparge a 2-a sau a 3-a zi și se scurge o picătură de puroi, care se usucă și apoi pier, lăsând în urmă-i o pată mică, roșie închisă. Acești coși se ivesc de obicei pe față, mai ales pe frunte și tâmpile, pe spate, pe umeri. Ei se ivesc rânduri-rânduri, unii dispar și alții apar și aceasta ani întregi.

Tratament. Intern se recomandă drojdia de bere, care oprește suprașiile, la limfatici untura de pește, la artrici alcalinele, la anemici fierul și arsenicul toate acestea după po-vața și ordonanța doctorului; cumpătare la mâncare. Ca tratament extern, sau local, se recomandă spălăturile de 2 ori pe zi cu apă fiartă foarte caldă, fricțiuni cu spirt camforat, sau apă de Colonia. 2. *Acnea punctată*, care se ivește pe față, mai ales pe aripele nasului, pe frunte, tâmpile și bărbie, uneori și pe spate, sub formă de *puncte negre*, mici ca firele de iarbă de pușcă, din cari puncte, dacă le storci cu unghiile, iese un firicel alburiu ca un viermișor, care se termină printr'un punct, negru și în care se găsește un mic *acar* (vezi

ACNE

acest cuvânt) numit *demodex folliculorum*. Acești coși se ivesc într'una, chiar și la bătrânețe, dar mai mult la tinerețe. *Tratamentul*: trebuie storși între unghii și locul spălat cu apă caldă simplă, sau cu apă de Colonia, sau cu spirt camforat; dacă persoana suferă de anemie i se vor da preparate feruginoase, dacă suferă de constipație va face o cură de apă de Breazu. — 3. *Acneea rozacee*, sau *cuperoza*. Seamănă cu acneea vulgară, dar aci pe lângă bubulițele acelea se mai află o alterațiune a vaselor capilare cari se dilată, se largesc și formează niște pete ridicate, roșietice, neregulate și lucitoare, cari se măresc în timpul digestiunii, a mistuirii și dau o senzație de căldură neplăcută, însoțită uneori de greutate la cap și vijiituri de urechi. Această boală se arată la față și de obicei la nas care este roșu violaceu (vânăt) și cu toate aceste rece la pipăit.

Tratamentul este același ca la acneea vulgară, mai ales din punct de vedere general; *local*: electrocoagularea diatermică sau *scarificațiile* (sgărieturile) liniare în toate sensurile, făcute cu un bisturiu numai de medic. *Acneea cheloidienă* e o acnee la care inflamația foliculară și perifoliculară atinge la o indurație profundă și fi-jbroasă a dermului, asemănătoare unui *cheloid*. *Tratament*: Scarificații, radioterapie, curenți de înaltă frecvență, raze ultraviolete.

Aconit (*Aconitum Napellus*), *omac*, *omag*, *omiac*, *toae*, *toadea*, *mărul lupului*, *coișul*. — Plantă foarte veninoasă din familia Ranunculaceelor. Principiul activ este *aconitina* și *napelina*. Ea lucrează ca liniștitoare (calmantă) a durerilor, în tot soiul de nevralgii, este bună la tușă măgărească (convulsivă), la reumatism, gută, nevralgie sciatică. Preparațiile din rădăcină sunt mult mai tari decât cele din *foi*; tinctura de *foi* se dă 1 până la 5 grame pe zi, pe câtă vreme tinctura din rădăcină numai 5 până la 10 picături pe zi într'o poțiune (băutură). În medicina populară se dă în rachiul de drojdii contra reumatismului. Dacă se spală cineva cu leșie de omag îi crește părul. Pentru că să se îndepărteze orice răutate din casă se afumă cu aconit. — *Aconitina* este un me-

dicament alcaloid primejdios, foarte veninos, se dă un sfert de miligram până la un miligram pe zi de aconitină cristalizată cea amorfă este mai slabă și se poate da de 3 ori mai mult pe zi (3 mgr.). Se dă în aceleași boale ca aconitul numai sub supravegherea doctorului. — *Otrăvirea* cu aconit are următoarele semne: înțepături în gură, strânsură în gât, căldură la furca peptului, la stomac, greață, vărsături, furnicături prin tot corpul, surzenie, turburare în vedere (pupilele sau luminele largite), moleșală foarte mare. *Tratament*: bolnavul trebuie imediat să verse, pentru care i se atinge omușorul, înfundându-i degetul pe gură, sau i se va da apă caldă, sau ipeacuană; alcool în băutură, sau în clisme, aplicațiuni sau oblojeli calde, respirație artificială (vezi *Asfixie*).

Acorină. — V. *Obligeană*.

Acorus calamus. — V. *Obligeană*.

Acrime sau aciditate de stomac. — O simțire neplăcută produsă de ajungerea în gură a unor lichide foarte acre, cari se ridică din stomac; un fel de răgăituri acre, cari provin dintr'o mistuire rea și anevoioasă și cari sunt un semn al unei forme de *dispepsie*. Această dispepsie este caracterizată printr'o prea mare cantitate de suc gastric, în stomac care nu se întrebuintează toată la mistuirea mâncărilor, așa că ceea ce mai rămâne din acest suc foarte acru se întoarce prin răgăituri în gură. Această acrimie este și mai mare atunci când am înghițit băuturi, sau alimente cari sunt acide prin ele înșile, ori au aplecare de a deveni astfel într'un stomac leneș, care le lasă să fermenteze, să dospească, cum se întâmplă cu vinul curat, berea, măcrișul, varza, coacăzele, castraveții, etc. de cari ar fi bine să se lipsească toți cei cu stomacul slab și cari au astfel de răgăeli acre. Pentru ca să combatem acrimile de stomac trebuie să neutralizăm acidul sucului gastric cu ajutorul substanțelor alcaline, și anume cu *bicarbonat de sodă*, luat în începutul mesei, sau după masă la o oră, fie în natură (1—4 grame în puțină apă simplă sau îndulcită cu zahăr; se mai recomandă *apa de var* (10—30 grame), *creta preparată* și *praf de ochi de raci* (carbonat de calce); *magnezia*

calcimată (50 ctgr. până la 2 grame) care se ia înainte de masă, sau între mese, în apă, sau în lapte. În popor se mai întrebuințează untul de lemn, o lingură mare în momentul când apar aceste răgăeli acre (vezi *Răgăeli*).

În comerț se găsesc unele preparate bune, cu ajutorul cărora putem să scăpăm de aciditate, când s'a întâmplat să mâncăm ceva mai mult. Pentru aceasta amintim : *alucolul*, din care se ia o lingură de praf bine amestecat într'un sfert de pahar de apă.

Acriș. — V. *Agriș*.

Acriș roșu. — V. *Drăcilă*.

Acromegalie gr. *acros*, extremitate, și *megalos*, mare. — Această boală, din fericire foarte rară, se arată prin aceea că extremitățile (capul, mâinile și picioarele) iau o creștere foarte mare din cauza îmbolnăvirii glandei numită *hipofiză* (vezi acest cuvânt). Fața este alungită, bărbia mărită prin îngroșarea osului fălcii, nasul este mare, respectabil, cu nările îngroșate; buzele mai ales cea de jos, sunt groase, înconjurate la bărbați cu păr stufos; urechile lungi și îngroșate; pielea feței este cenușie murdară, presărată de glande sebacee ridicate; mâinile și picioarele sunt enorme. Acești bolnavi, deși au poftă de mâncare bună și sete mare, slăbesc; creșterea extremităților se produce cam pe la vârsta de 25—40 ani. Vieța lor este chinuită; au dureri dese de cap, slăbirea vederii, ceea ce-i descurajează și de multe ori îi silește să se omoare. **Tratament:** să se modifice nutrițiunea generală prin arsenic (licoarea lui Fowler, începând prin 5 picături de 3 ori pe zi și mergând până la 2 grame pe zi); preparatele feruginoase în doză mare, idroterapie caldă; întrebuințarea prelungită a searei cornute; organoterapie (sucuri glandulare din tiroid, timus, corp pituitar).

În afară de acest tratament operativ, cu pituitrină (extract din glanda hipofiză) se mai face, cu un bun rezultat uneori, tratamentul cu raze X al hipofizei, sau, dacă se bănuiește o tumoră a ei, se îndepărtează printr'o intervenție chirurgicală.

Acrum. — V. *Mărgăritărel*.

Actinomicoză (gr. *aktinos*, rază și *mykes*, ciupercă). — Este o boală pa-

razitară, produsă de înmulțirea în țăsurile omului a unei ciuperci ce se aseamănă cu un fel de mucegai de culoarea pucioasei. Această ciupercă se găsește în regiunile umede la suprafața vegetalelor (pe spicul cerealelor, pe frunze, pe muguri) și se poate introduce în corpul omului dacă amestecă în gură cu nebăgare de seamă un spic, dacă respiră praful într'o arie de trierat, sau dacă lovește cu piciorul desculț o buturugă acoperită cu aceste ciuperci. Părțile corpului mai des atinse sunt: fața și oasele ei, plămâni, apendicele etc. Pe pielea se ivesc niște ridicături, nodozități, cari să înmoaie, se sparg și se scurge din ele un fel de puroi, cam limpede, plin de grăunțe galbene ale ciupercii, numite *actinomicos*. Același lucru se poate întâmpla și în organele profunde. Durerea este de multe ori foarte mare și provine din apăsarea unei ramure nervoase, care trece prin locul bolnav. Această boală are un mers încet și poate sfârși prin moarte. **Tratament:** Se va da *iodurul de potasiu* 2 până la 5 grame pe zi, mergând până la 8 grame, apoi scăzând iarăși doza. Se vor susține puterile bolnavului cu *tonice* (întăritoare) și *arsenic*; se va combate febra. — Dacă boala este la *piele* și *oase* se poate face *operație*, tăindu-se și scoțându-se partea bolnavă; dacă nu se poate aceasta, atunci se vor face tăieturi întinse asupra umflăturilor, se va deserta puroiul, se va răzui punga cu o linguriță tăioasă și se va arde cu clorur de zinc, sau cu termocauter. Se mai pot trata leziunile actinomicozice prin *injecțiuni interstițiale* cu o soluție iodo-iodurată. — Când boala e în cap pe lângă tratamentul general se poate face *trepanația*, când focarul cerebral este localizat. La *pântece* se poate face *laparotomia* când este o *peritonită purulentă*, dându-se și antiseptice intestinale. La *piept* pe lângă *iodur de potasiu* se va face *inhalatii* antiseptice, mai ales cu vapori de iod sau cu esență de eucalipt. Radioterapia dă uneori bune rezultate.

Actol (lactat de argint). — Praful alb, foarte solubil în apă, omoară microbii, mai ales stafilococii, streptococii și microbii pustulei maligne. Se întrebuin-

ACU

tează în injecții, sub piele, de câte 1 ctgr. odată și numai una pe zi. Se mai dă în gargară și spălături, 1 gr. la 50 apă, în sticlă neagră, punând din această soluție o lingură într'un pahar de apă.

Acu pământului. — V. *Strașnic*.

Acută (dela lat. *acutus*). — Vorbind de boală acest cuvânt înseamnă *grabnic*, adică *boală grabnică*, venită *repede*, boală de curând venită, proaspătă, spre deosebire de boală *cronică*. Orice boală care a trecut de treizeci de zile se zice *cronică*. Pentru mai multe amănunte caută la: *Boale*.

Addison (Boala lui). — V. *Suprarenale* (Glande).

Adenită (dela gr. *adēn*, glandă, ghindură, nodălcă), *bubon*, *udmă*, *uimă*, *scurtă*, *tragăn*. — Este aprinderea sau inflamația ganglionilor limfatici, de sub bărbie, dela gât, dela subsuori și dela stîngii. — Sunt două forme de adenită: *acută* și *cronică* (învechită).

Adenita acută recunoaște drept pricină de multe ori o simplă sgârșitură, sau rănire a pielii în jos de ganglioni, în care vasele limfatice duc otrava, sau infecțiunea făcută prin piele, sau prin căptușeala unei deschideri din apropiere, cum este gura pentru ghindurile gâtului. *Semne*: uimele se arată sub forma unor umflături, una sau mai multe, deasupra cărora pielea se poate mișca cu degetul, umflătura merge crescând și se întinde la părțile vecine și la piele, care se înroșește și este foarte dureroasă la pipăit și chiar fără să fie atinsă. Prin tratament bubonul poate da îndărăt, dar cele mai adeseori face puroi, supurează. Bolnavul are friguri, durere de cap, lipsă de poftă de mîndare. Astfel de buboane se mai văd și la unele boale generale: *vărsat*, *tifos*, *ciumă*, *șancărul simplu* sau *sifilitic*. *Tratament*: odihnă, alifie mercurială (unguent cinereu) simplă, sau cu extract de belladonă (4 gr. la 30 gr.), cataplasme de făină de in des repetate, sau pansament cu sublimat coroziv, sau spirt (vezi *Pansament*). Dacă supurează se sparge dela sine, sau mai bine să se cheme un doctor să deschidă udma cu un bisturiu. După ce s'a spart, sau s'a deschis, se face pansamentul regulat odată sau de 2 ori pe zi până la vindecare. — *Adenita*

cronică are mai multe cauze: *limfatismul*, *scrofulele*, *oftica*, *sifilisul*. Inflamația cronică a urechii însoțită de curgere, sau iritarea urechii prin cercei, boalele de ochi (blefarita, ulciorul), ale pielii, ale capului (eczemă), masele și dinții stricați, inflamația migdalelor din fundul gurii, toate acestea pot da naștere la adenite. *Semnele* și aici sunt ca și la forma *acută*, numai că durerea este mică și la început poate lipsi cu totul. Gâlcile pot fi foarte mari și dacă supurează și se deschid, puroiul curge nemilit și fără sfârșit, lăsând în urma lor semne, sau cicatrice întinse și urâte, mai ales când n'au fost deschise de doctor. *Tratament*: pe dinăuntru se va da untură de pește, tinctură de iod 20—40 picături pe zi în apă, licoarea Fowler (arsenicală) 10—20 picături pe zi în apă, licoarea Fomber (arsenicală) 10—20 picături pe zi în apă. Băi la Lacul-Sărat, Govora, Techirghiol, Pucioasa, Strunga. Iar pe dinafară: alifie iodată, sau injecțiuni cu eter, sau ulei iodoformat. Dacă supurează se va deschide și se va face pansamentul cum s'a spus mai sus.

Adenoidă (Tumoare), dela cuvântul gr. *adēn*, glandă și *eidos* aspect, înfățișare, formă. — Se află de asupra ceriului gurii (vălului palatin) o glandă de aceeași natură ca și amigdalele din fundul gurii, și care se numește *amigdala faringee a lui Luschka*. De obicei foarte mică, ea poate să se mărească la copii ca și celelalte amigdale și să formeze atunci un fel de masă carnoasă, care astupă fundul nasului pe de o parte, iar pe de alta deschizătura trompelor lui Eustație, prin care comunică urechia mijlocie cu fundul gâtului, iar vălul palatin îl împinge în jos și dacă pipăim cu degetul ceriul gurii simțim de asupra lui o masă moale, gelatinoasă, întocmai cum am simți pipăind un pachet de viermi. *Cauze*: ereditatea, limfatismul, rușea (pojarul), *Semne*: o slăbire a auzului, deformarea nasului, greutate în suflarea nasului, neputința de a răsufla decât cu gura deschisă, mai ales noaptea când omul sforăie și se înecă îngrozitor și această greutate la răsuflare face ca pieptul să nu se poată desvolta destul de bine; paloarea feței, anemie. Vocea se schimbă, copilul nu mai

poate pronunța vocale nazale, câte odată își pierde vocea de tot (*afonie*). Copiii atinși de această urâtă boală sunt slabi, supuși la inflamații de gât (*faringite*), la tūsă, la reumatism. De multe ori ei au în același timp și amigdalele din fundul gurii, mărite. *Tratament*: tumorile adenoide trebuie operate cât se poate mai iute, adică distruse de către un doctor specialist, apoi se va da bolnavului un tratament general întăritor: untură de pește, iodur de fier, clorure, chinchină, băi de mare (Constanța, Techirghiol, Mangalia) ape minerale sulfuroase.

Adenom (gr. *adén*, glandă, și terminația *om* care înseamnă tumoare). — Este o tumoare care se aseamănă cu o glandă prin structura ei; se observă mai mult la femeie, la sânuri, și de multe ori se confundă cu *cancerul*, dar de care se deosebește foarte mult. Adenomele sunt tari, nedureroase, fără să fie lipite de piele, se desvoltă încet și supurează rar. Se tratează prin compresiune (apăsare), iar dacă nu reușim așa, scoatem tumoarea prin operație.

Adenom sebaceu. — Mică tumoră albă, sau roșietică, datorită măririi unei glande *sebacee*. La față apar de obicei adenomele sebacee mai ales în timpul celei de a doua copilării. Țin foarte multă vreme.

Adenopatie (gr. *adén*, glandă, și *pathos* boală). — Se numește astfel orice boală a ganglionilor limfatici (vezi *Adenită*), însă mai cu seamă mărirea, sau umflarea ganglionilor cari înconjură bronchiile cele mari, ceea ce face ca cei bolnavi de această boală să simtă o apăsare pe piept, o greutate mare la respirat, mai ales când umblă și se ostenesc; uneori tușesc întocmai ca la tusa măgărească (convulsivă). Se observă la cei ce sufar adeseori de bronchită, la începutul ofitei, în unele boale infecțioase (febra tifoidă, pojarul și altele). *Tratament*: pe din afară ungeri cu tinctură de iod, iar intern; untură de pește, iodur de sodiu, sau de potasiu, sirop de iodur de fier. Contra acceselor spasmodice, a înecăciunii, tinctură de beladona, 5—20 picături; tinctură de aconit, 5—15 picături, se dă cu mare băgare de seamă, bromur de potasiu 2—4 grame pe zi.

Adeno-sarcom. — Proliferarea în ace-

lași timp a epiteliului glandei (v. *Adenom*) și a țesutului conjunctiv, desvoltându-se după tipul embrionar (v. *Sarcom*). Exemplu tumorile sânelui (v. *Sânuri*).

Adiantum capillus veneris. — V. *Strașnic*.

Adinamie (gr. *a* fără, și *dynamis* putere, forță). — Debilitate, lipsă de putere, prostrație completă fizică și morală. Tipul boalelor adinamice este febra tifoidă.

Adipos (țesut). — Acest cuvânt vine dela latinescul *adeps*, care însemnează grăsime. Țesutul adipos este format de niște celule pline de picături foarte mici de grăsime și cari pot fi rezorbite aproape cu totul fără ca celula să dispară; uneori celula numai se turtește. Acest țesut se găsește mai cu seamă sub piele și în jurul organelor; el reprezintă cam a douăzecea parte din corp.

Adipsie (gr. *a* fără, *dipsa*, sete). — Lipsa parțială, sau definitivă, a senzației de sete.

Adolescență (dela *adolescere*, a crește, a se mări), *juneță*, *tinerețe*. — Este timpul vieții care urmează *copilăriei* și începe dela ivirea primelor semne ale *pubertății* (11 până la 14 ani la femeie și 14 până la 16 ani la bărbați), până la epoca în care corpul a încetat de a mai crește, câștigându-și toată perfecțiunea, cam pe la 25 ani. *Juneța* este vârsta desvoltării fizice și intelectuale. *Igiena tinereței* se deosebește la băiat de aceea a fetei, a cărei desvoltare fizică este mai timpurie, mai precoce, mai repede și se face în condițiuni particulare. Din această cauză ne vom ocupa mai întâiu de băiat și apoi de fată. *Adolescentul* are o trebuință mare de activitate, pe care trebuie să o satisfacă păstrând însă o măsură înțeleaptă. Astfel *exercițiul* la aer liber, sub toate formele (plimbări, jocuri, gimnastică, călărie) este indispensabil și atâtă poftă de mâncare, înlesnește mistuirea, ajută desvoltarea mușchilor pieptului și prin urmare mărește activitatea respirației. Inotarea în timpul verii, dansul în vreme de iarnă, idroterapia în toate anotimpurile (afară numai când cura de apă rece este oprită dintr-o pricină oarecare), au același efect bun. Cu toate acestea dacă tânărul a suferit

de reumatism la încheieturi, care ar putea face să ne gândim la vreo boală de inimă, dacă el are bătaie de inimă și năduf, atunci trebuie să-l oprim dela exercițiile violente. În general va face gimnastică după sfaturile medicului. *Hrana* junelui trebuie să fie de bună calitate și în cantitate îndestulătoare. Regimul trebuie să fie variat, dar *carnea* trebuie să ocupe locul de frunte. Mai trebuie supravegheată dezvoltarea *facultăților intelectuale*, la unii să stimulăm, la alții să moderăm activitatea creierilor. Această reglementare are o importanță mare, căci *școala și oste-neala prea mare școlară* pot avea urmări rele pentru sistemul nervos. Când munca întrece puterea creierilor, când tânărul este *obosit cu mintea*, el poate să capete una din *boalele nervoase*: *neurasteniam* (slăbiciune de nervi) și chiar unele forme de *neburie*, cari se nasc sub influența unui exces de încordare a minții. *Boalele adolescenței* sunt: angina sub diferite forme, dela cea mai ușoară, catarală, până la cea diferită; vărsatul, pojarul, scarlatina, anemia (lipsa de sânge); apoi, reumatismul, tusa, junghiul, oftica, scrofullele. Putem însă micșora frecvența acestor boale, afară de predispozițiunea ereditară, prin exercițiu și regim apropiat, o activitate intelectuală bine reglementată, etc. *Igiena tinerei fete*. La etatea de 13—14 ani organismul fetei trece printr'o revoluție, sau mai bine zis printr'o evoluție organică, care o deosebește, din punctul de vedere igienic și medical, de băiat. Pe câtă vreme acesta n'are decât să îndeplinească trebuințele cari rezultă din creștere, iar cea ce-i rămâne din câștig să înnagazineze servindu-i spre dezvoltare, fata, pe lângă cheltuielile necesitate de creșterea sa, mai trebuie să satisfacă și cheltuiala creată prin *pierderea lunară* a unei părți din propria ei substanță. Această evoluție se face de multe ori fără nici o sdruncinare, la multe însă ea se îndeplinește cu greu și aducând oarecare prejudicii sănătății lor. În acest timp sângele sărăcește dacă o igienă bine regulată nu repară pierderile pricinuite, mai întâi fiindcă el se scurge dintr'un organism încă rău pregătit pentru acest *deficit lunar*, apoi fiindcă turburările apetitului și

ale mistuirii fac ca să primească materiale slab reparatoare. Pe de altă parte sistemul nervos, care joacă un rol mare în această îngrămădire de sânge într'un punct determinat al corpului, rămâne fără încetare deștept și excitat și dacă nu este calmat în fiecare lună, prin ușurarea sperată, se transformă în iritațiune cu adevărat bolnăvicioasă. Așa dar punctul principal al igienei tinerei fete este să facem ca sângele ei să fie întreținut în bune condițiuni, să-și urmeze cu ascultare cursul care-i este desemnat, ca sistemul ei nervos să nu câștige niciodată o preponderență de care lesne poate abuza. Prima condiție de succes este o *hrană* bună, substanțială, consistând mai cu seamă din ouă, lapte, pește, carne de vacă. A doua condiție este ca fata să facă un *exercițiu* suficient, pe lângă studiu, desemn, piano, să caute să-și pună în mișcare în fiecare zi trăsura, cel puțin sutul și alte lucrări manuale nu trebuie s'o țină prea mult pe scaun, ea trebuie să se și miște, să facă plimbări pe jos, mai bine decât în trăsura, cel puțin două ore pe zi, să facă exerciții de gimnastică potrivit sexului ei. Afară de acestea puțină hidroterapie este foarte folositoare și în lipsă de dușuri reci poate să facă spălături cu apă rece. *Somnul* trebuie să fie de 7—8 ore și pe cât se poate să se culce mai de vreme pentru ca să se scoale mai de dimineață, somnul de noapte fiind cu mult mai bun decât cel de zi. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie excluse *balurile*, și *teatrul*. Pentru fetele din oraș se recomandă ca cel puțin două luni de vară să le *petreacă la țară*, unde pot să-și facă o bună provizie de aer și delumină. *Costumul* trebuie să fie făcut astfel ca să asigure cea mai mare libertate creșterii și mișcărilor corpului, să nu producă nici un fel de apăsare asupra corpului.

Adonidină. — V. la *Ruscuță primăvărată*.

Adormite. — V. *Dedite*.

Adrenalina. — Este o substanță extrasă din glandele suprarenale și se prepara în laborator. Are proprietatea de a opri sângele (emostatic) și de aceea se întrebuințează la operații. Câteva picături de adrenalina puse pe o plagă operatorie produce în scurt

timp o paliditate și sângele se oprește. Se întrebuințează mult în operațiile ochiului, unde, unită cu cocaina, produce o bună amorteală și se pot face operații importante. Același bun ajutor ni-l dă adrenalina când voim să scoatem un dinte. Când îi curge cuiva sânge din nas, ceace se întâmplă ușor, mai ales vara pe vremea căldurilor, e bine să înfășurăm o bucată de vată la capătul unui băț de chibrit, s'o muiem în adrenalină și s'o introducem în narea din care se scurge sânge, apăsând puțin pe pereții nării și sângele se oprește repede. Adrenalina oprește emoragiile în ulcerile stomacului, în fibromele uterine, în febra tifoidă, în care caz se dă și în apă, s'o bea, și în injecții. Este un medicament otrăvitor și trebuie luat numai după sfatul medicului. Se păstrează în sticle colorate fiindcă lumina o atacă și o face să-și piardă din proprietățile ei.

Adrepatină. — Pomadă, sau supozitoare, al căror medicament activ este adrenalina. Este întrebuințată în cazurile de hemoroizi, sau de fisuri anale, câte 1—3 supozitoare pe zi, sau ungând regiunea anală cu alifia.

Aducere aminte. — v. *Memorie*.

Adultă (Etatea). — Aceasta este epoca vieții în care omul este în posesiunea întregii forțe, a întregii activități fizice și morale; ea începe dela 25 și merge până la 45 de ani. Ea este etatea virilă, perioada existenței în care organismul și-a îndeplinit dezvoltarea sa și n'a intrat încă în calea destrucțiunii lente, care va să înceapă în curând. Ea este etatea pe care igienistii și medicii o iau ca tip ori de câte ori stabilesc regulile hrănirii, a îmbrăcăminteii și a întregului mod de a trăi, precum și descrierea boalelor. Pe câtă vreme noul născut, copilul, junele și bătrânul trebuie să fie considerați *a parte*, adultul nu dă loc la nici o considerațiune specială. Omul adult trebuie să facă o întrebuințare rațională și metodică de alimente, atât în stare de sănătate, cât și în stare de boală. Nu este de ajuns să mănânci, trebuie să știi să mănânci nu numai în sensul gastronomic, ci mai cu seamă în înțelesul igienic, observând oarecare reguli arătate de experiență și cari ne arată modul de a potrivi trebuințelor noastre

alimentele și băuturile. Pentru ca sănătatea să se mențină în cele mai bune condițiuni posibile, trebuie ca regimul alimentar al omului sănătos să se compună din mâncări de bună calitate, ușor de mistuit, în cantitate potrivită, luate la ceasuri hotărâte și la intervale de timp suficiente; mâncările să fie variate și alese astfel ca ele să repare toate pierderile încercate de mașina omenească; să fie așa asociate încât sub un volum mijlociu să conțină toate elementele indispensabile vieții; să fie modificate după obiceiuri, condițiuni sociale, climate și anotimpuri. Mijloacele de a păstra sau de a restabili sănătatea omului adult se găsesc mai pe toate paginile acestui dicționar, prin urmare nu le vom mai înșira aci.

Aer (dela grec. *aer*). — Pământul este înconjurat de toate părțile, pe o grosime de 60 până la 80 kilometri, de o masă gazoasă numită *atmosfera*, formată de un amestec de gaze (*aer*) unul din agenții cei mai puternici ai igienei, fără de care viața nu poate exista. Aerul deși nu se vede are o *greutate proprie*; *un litru de aer* cântărește *un gram* și ceva, lucru mic în aparență, dar în realitate foarte mare când ne gândim la numărul colosal de litri de aer care ne înconjoară și care exercită asupra corpurilor o apăsare oarecare, numită *presiune atmosferică* ce se măsoară cu ajutorul *barometrelor*, unele cu *coloană de mercur*, iar altele de *metal*, cu *cadran*. Barometrele slujesc la prevederea timpului fiindcă există oarecare raport între starea de umezeală și de uscăciune a atmosferei și presiunea. Presiunea exercitată de aer asupra unui corp oarecare este mai mare de *un chilogram* pe centimetrul pătrat. Corpul omului având o suprafață mai mare de 20.000 centimetri pătrați, poartă o apăsare din partea aerului atmosferic mai mare de 20.000 kilograme, dacă apăsarea aerului ar lipsi, lichidele dinăuntru corpului ar eși în afară, ar umfla și ar ridica pielea. Aerul apasă asupra corpului omenească în toate sensurile; această apăsare, în condițiunile obișnuite n'are nici un efect primejdios asupra lui. Aerul are o *temperatură* care variază după locuri, anotimpuri și orele zilei. Temperatura scade cu cât ne urcăm mai sus, cam

AER

cu 1 grad la 200 metri înălțime. Așa dar temperatura aerului variază în diferite locuri după altitudine, după înălțime. Ea mai variază și după natura solului; diferitele feluri de pământ, odată încălzite de razele soarelui, nu se răcesc în același timp, ne având o iradiare egală asupra aerului înconjurător. Văcinătatea maselor mari de apă, pe malul mărilor și oceanelor și alte împrejurări fac temperatura aerului să varieze (v. *Climat*). — Aerul conține întotdeauna *electricitate*. Când cerul e noros, electricitatea este mai abundentă, atât pozitivă cât și negativă; fulgerul și tunetul rezultă din întâlnirea celor doi nori încărcăți cu electricitate de natură contrarie (v. *trăznet*). — *Compoziția chimică*. Aerul este un amestec de mai multe corpuri gazoase, dintre cari cele mai constante sunt *oxigenul*, *azotul*, *acidul carbonic* și *aburii de apă*. Oxigenul și azotul sunt părțile esențiale ale aerului, cari îi dau însușirile fundamentale și cari se află în următoarele raporturi: la 100 părți de aer 21 părți oxigen și 78 azot, iar argon 1%. Aceste cifre nu variază mai de loc, fiind aceleași la orice depărtare și înălțime. Dar s'a constatat că în unele locuri, în apropierea pădurilor mari, pe marginea mărilor, oxigenul fără să fie în cantitate mai mare ia o stare particulară, condensată, care-i dă o acțiune mai energică și din care cauză se numește *ozon*; aerul care conține ozon este mai curat și mai bun pentru sănătate. Oxigenul este partea folositoare a aerului, singura care servește la sănătate. Azotul curat nu se poate respira, dar și oxigenul curat nu este bun, trebuie să fie amândouă amestecate ca să se domolească unul pe altul, cu condiție însă ca azotul să nu treacă peste 4 din 5 părți, căci aerul care va conține mai mult devine asfixiant. Acidul carbonic și aburii de apă se află întotdeauna în aerul atmosferic, însă în proporții foarte variabile. Acidul carbonic se găsește în cantitate mai mare noaptea decât ziua, în oraș decât în sat, în locurile joase mai mult decât pe înălțimi. El este indispensabil pentru existența plantelor și periculos pentru oameni și proporția lui nu poate să treacă peste o cifră oarecare, fără să producă accidente grave (v. *Aer con-*

finat). Aburii de apă de asemenea se află întotdeauna în aer, ceea ce se poate constata cu *igrometrul*. Dar cantitatea lor este foarte variabilă dela o zi la alta, sau dela un loc la altul și atârna de temperatura aerului; ei sunt în cantitate mai mare noaptea decât ziua. Aerul se mai zice *uscat* sau *umed* după cantitatea de aburi pe care o conține. — *Foloasele și primejdiile aerului atmosferic*. Orice ființă, are trebuință de aer, altfel ar muri repede de *asfixie*; dacă omul ar respira un aer necurat și nu în cantitate îndestulătoare ar slăbi și ar pieri cu încetul (v. *Aer conținut*). Din acestea rezultă că viața nu poate exista fără aer, căci fără el nicio funcțiune nu se îndeplinește bine. Exercițiul *respirațiunii* este cel mai indispensabil; copilul, când vine în lume, în primul



Fig. 3. — Pulberi și poleni atmosferici

minut respiră aer și pătrunderea acestuia în plămâni îi produce durere, ceea ce îl face să țipe, să plângă. Intrarea aerului în plămâni (inspirațiunea) pune în atingere oxigenul din el cu

sângele, care îl primește, dând afară (prin expirațiune) acidul carbonic (v. *Respirațiune*). Omul repetă această acțiune, adică respiră, de 16 până la 18 ori pe minut. Din toate acestea rezultă că avem neapărată trebuință de a respira aer curat, făcând în fiecare zi o plimbare sau ședere în aer liber 2—3 ore, întocmai după cum în fiecare zi trebuie să mâncăm și să bem, căci aerul ne dă poftă de mâncare, ne ușurează mistuirea, face să circule și primește sângele. Prin urmare nu putem repeta îndeajuns fiecăruia ca să se plimbe cât se poate mai mult în aer curat. Dar aerul atmosferic în unele împrejurări poate fi *primejdios*. *Presiunea atmosferică* poate să fie mărită sau scăzută, în mod natural sau artificial, în localități diferite (v. *Aer comprimat*, *aer rarefiat*). Uneori ea este mărită în mod natural și în același loc, dela o zi la alta, sau chiar în aceeași zi, atunci zicem că *aerul e greu* și de obi-

ceiu atunci conține și el *electricitate* mai multă și are *temperatură* mai ridicată. În aceste cazuri oamenii nervoși, bolnavi sau convalescenți, au o indispoziție și o enervare deosebită, care nu încetează decât atunci când și starea atmosferei s'a schimbat. Igiena se interesează și de *mișcările* aerului atmosferic. *Vânturile* cari regulează întrucâtva starea de căldură și de frig, de uscăciune și de umezeală a atmosferei și cari servesc de vehicul pentru particulele stricăcioase cu cari este încărcată ea, trebuie luate în seamă când este vorba de așezarea caselor (v. *Locuințe*). Aerul liber de multe ori poate fi și el viciat în compoziția lui, stricat ca și aerul confinat, ceea ce îl face primejdios. El poate să conțină diferite gaze străine, cum e *amoniacul* produs din descompunerea produselor animale; *idrogenul sulfurat*, sau *acidul sulfhidric* care se formează în vecinătatea apelor stătătoare; *idrogenul carbonat* sau *gazul bălților* care există în apa bălților. Dar aceste gaze se amestecă iute cu masa cea mare a aerului, așa în cât n'au vreme să fie așa de periculoase. Aerul mai conține o mulțime de *praf*, care cuprinde rămășițe și bucățele de substanțe minerale și organice, ciupercuțe și microbi diferiți. Cantitatea de praf variază cu condițiile locale; puțin praf la munte (v. *Altitudine*), mult în orașe. *Sporii microbilor* sunt foarte mulți în timpul verii, când e umezeală (cam 14000 la metru cub); *bacteriile* sunt numeroase primăvara. Numărul se împătrește când aerul trece prin orașe, se încezește în centrul acestora. În pulberile uscate numărul *microbilor* poate ajunge la 2 milioane la gram (v. *Pulberi*). Afară de aceste aerul mai conține tot felul de *miasme*, ce sânt diferite emanațiuni (v. *Miasme*). Originea prafului din orașe este noroiul străzilor, murdăriile și apele căsniciilor, fumul fabricilor industriale, etc. De aceea se recomandă ca în orașe străzile să fie largi și în direcția vânturilor, să fie plantațiuni de arbori, cât se poate de multe, trottoare și pavae bune, fără gropi și interstiții mari, cari să se măture și spele regulat cu mașini sistematice; totul să meargă și să se verse în canale. În interiorul caselor e de preferat ca

pereții să fie tencuiți cu ghips și ulei așa ca să se poată șterge și, spăla des cu carpe muiate în soluții antiseptice, mai ales după ce au zăcut bolnavi în casă.

Aer comprimat. — Când presiunea atmosferică este mărită în mod artificial, când se obține deci ca un volum de aer să apese asupra corpurilor cari se află în el, cu o forță mai mare decât ar face-o același volum de aer atmosferic, se zice atunci că *aerul este comprimat*. Dacă luăm ca termen de comparație presiunea atmosferică, a cărei



Fig. 4. — Cameră pentru tratamentul cu aer comprimat

valoare este exprimată numai prin cuvântul de *atmosferă*, se zice că *aerul este comprimat* la 2, 3, 4 *atmosfere*, după cum și acțiunea lui este îndoit întreit sau împătrit mai mare decât această presiune. În industrie aerul comprimat se întrebuințează ca forță motrice pentru a strânge frânele unui tren în mișcare, pentru a face să înainteze arătătoarele unui ceasornic pneumatic. Mulțumită aerului comprimat oamenii pot lucra și acolo unde n'au aer atmosferic, adică să lucreze în apă la facerea stâlpilor unui pod, să lucreze în fundul puțurilor celor mai adânci, să culeagă perle și coral în

fundul mărilor, cu ajutorul scafan-drului. Lucrătorii cari respiră câte 2—5 ceasuri într'un mediu cu aer comprimat simțesc mai puțină osteneală decât în aerul liber și răsufală mai ușor, ceea ce vine de acolo că aerul comprimat ajută respirația folosind toate părțile plămânilor în care aerul poate circula și cari la presiunea obișnuită a aerului atmosferic rămân neîntrebunțate. De aceea se recomandă să faci baie de aer comprimat toți cei ce suferă de boale cronice de piept, tusă, năduf și oftică chiar, în gradul I și II, și mai cu seamă la cei cu *astmă* (vezi acest cuvânt). Aerul comprimat conține în același volum o cantitate mai mare de oxigen, el mărește bogăția sângelui pentru care se recomandă în *anemie*, *cloroză* și în boalele în cari este multă lipsă de sânge; mai e bun și în *rachitism*, precum și în toate constituțiile rele. Pentru administrarea aerului comprimat ne servim de o cameră cu pereți de metal foarte solizi, închisă ermetic printr'o ușă mobilă și luminoasă, prin ferestre cu geamuri de sticlă groase. În această cameră se duce aerul cu ajutorul unei pompe și în măsura în care se îngrămădește aerul presiunea crește. Această presiune ne este arătată de un *manometru* și poate fi regulată cu ușurință prin ajutorul supapelor și a unui robinet. Bolnavul intrat în cameră, în prima jumătate de oră, se mărește presiunea aerului gradat (2—5 atmosfere), apoi în timp de o jumătate oră până la o oră îl menținem la această presiune și, în fine, îl readucem gradat la presiunea normală în timpul ultimei jumătăți de oră. Acțiunea unei astfel de băi este creșterea capacității plămânilor și a nutrițiunii generale. Acest tratament este bun în *astmă*, *emfizem* (năduf), *bronchită cronică* (tusă veche), tusă măgărească, gută, diabet, *anemie*, *albuminurie*. Nu se poate face acest tratament în boalele de inimă. Pentru cură cu aer comprimat noi avem *Câmpu-Lung, Slănicul Moldovei, Strunga*. Pentru a putea face o baie de aer comprimat și rarefiat în același timp, sunt aparate cari printr'un dispozitiv permit bolnavului de a inspira aer comprimat și de a expira în aer rarefiat, ceea ce face ca să se între-

bunțeze toată suprafața pulmonară și prin urmare s'ar obține o supra-activitate a sângelui. Se recomandă acest tratament în: năduf (*emfizem*), tusă învechită, *pleurezie cronică*. Baia cu aer comprimat, sau la presiune ordinară, însă saturat cu diferite medicamente (*gudron*, *terebentină*, *creozot*, *iodoform*, *eucalipt*, etc.) se recomandă în boalele de laringe, la tot felul de răgușeli și la boalele de plămâni (v. *Câmpulung, Slănicul Moldovei*).

Aer confinat, aer închis. Aerul mărginit și stricat, adică mai sărac în oxigen și mai bogat în acid carbonic, care în loc să fie de 2 părți la 10.000 a ajuns la 5 părți pentru 1000 părți de aer se numește *confinat*. Este știut că un om adult, când respiră ia din aer 22 litri de oxigen pe ceas și dă afară 21 litri de acid carbonic, care este foarte stricăcios sănătății, așa că în 4—5 ore aerul dintr'o cameră, dacă nu se face aerisirea, se strică de tot, prin faptul că oxigenul s'a împuținat foarte mult, dar la fel a crescut acidul carbonic; aparatele de iluminat și de încălzit dau toate acid carbonic. Afară de aceasta, toți oamenii cari stau adunați într'un local închis și mic asudă mai mult ca de obicei și dau în aer o cantitate oarecare de aburi de apă, eșiți prin piele și plămâni. Analizând acest aer s'au găsit în el produse volatile, materii organice, cari ies din corp odată cu această apă și cari sunt mai stricăcioase sănătății decât chiar îngrămădirea de acid carbonic. Stricarea aerului confinat poate produce: durere de cap, greață, amețală, sufocațiune (inecăciune de piept), tot atâtea semne începătoare ale asfixiei; ele dispar însă repede îndată ce eșim la aer curat. Alte ori efectele aerului închis sunt mai slabe, dar mai persistente. Astfel șederea într'un atelier prost aerisit în timpul zilei, într'o cameră mică de culcare, în timpul nopții, provoacă *anemie*, pierderea puterii, paloarea feței, lipsă de poftă de mâncare, etc.; sângele fiind sărăcit sănătatea se turbură foarte mult. Cel mai bun lucru pentru a preveni toate acestea este de a da fiecăruia aer în cantitate îndestulătoare, de a primeni aerul destul de des pentru a-l întreține curat (v. *Aerisire*).

Aer marin. — V. *Mare*.

Aer rarefiat. — După cum presiunea atmosferică poate fi în unele cazuri mărită, tot așa ea poate să fie micșorată, în mod natural sau artificial, și atunci zicem că *aerul este rarefiat*. Lucrul acesta se întâmplă când ne ridicăm la înălțimi mari, pe munți sau în aeroplan, balon, atunci barometrul scade cu atât mai mult cu cât ne ridicăm mai sus, ceea ce ne dovedește că aerul devine din ce în ce mai puțin greu și din ce în ce mai rar. Dacă ne urcăm mai sus de 2000 metri sănătatea începe a se resimți din pricina aerului prea rar și efectele lui se vor simți cu atât mai mult cu cât vom merge mai sus și atunci suferim de așa zisa *boala de munte*, sau *boala munților*, adică: amețeală, greutate la cap, stare de somnolență, greutate la respirație, curgere de sânge din nas, bătăi de inimă (palpitații), greață, vărsături, dureri în membre, slăbiciune mare, coloirea albastră a feței. Pe înălțimile mai mici, pe la 1500 până la 1800 metri, aerul mai puțin rarefiat în loc să ne facă rău ne face bine, mai ales dacă ședem acolo mai mult timp, respirația se face cu mai mare ușurință decât în vale, lucru care s'a constatat la Davos, la Briançon, la Saint-Moritz și în alte localități, unde ofica aproape nu există. Din această cauză se recomandă tuturor oamenilor slabi de piept și ofticoșilor la începutul boalei, de a sta în stațiunile alpine, înalte de 1300 până la 1800 metri de asupra nivelului mării, lucru care s'ar putea face și la noi în țară dacă am avea destule case prin munții noștri, cu tot confortul trebuincios, ceea ce din ne-norocire nu există. În timpul verii le-am putea recomanda să petreacă una sau două luni la Sinaia, Bușteni, Predeal, Slănicul Moldovei, Bran, Brașov, Colibița, Stâna de Vale. E necesar să să facă în munții noștri cât mai multe sanatorii.

Aerisire, aerare, aeriseală, ventilațiune. — Aerul pe care îl respirăm trebuie să fie de calitate bună și în cantitate îndestulătoare, de aceea scopul aerisirii este de a ne da aer abundent și curat. Camera în care locuim trebuie să aibă un volum de aer îndestulător pentru plămânii noștri și acest

aer după câțva timp trebuie reînnoit, până ce nu devine stricăcios sănătății. Cât timp omul stă într-o odaie cu ferestrele și ușa închise, fie ziua, fie noaptea, el respiră (v. *Respirațiune*), așa că oxigenul din aer se tot rărește, se împuținează, și acidul carbonic se tot înmulțește, iar aerul din cameră se strică, din ce în ce mai mult și devine nesănătos atunci când cuprinde 1 parte de acid carbonic la 1000 de părți de aer (v. *Aer confinat*). Acest lucru, într-o cameră destul de mare și cu un volum de aer suficient, nu se întâmplă așa curând ca într-o odaie mică și locuită de mai multe persoane. Pentru ca o cameră să fie igienică, sănătoasă, trebuie ca să aibă o capacitate de 14 metri cubi de aer pentru o persoană, sau cel puțin 10 metri cubi. Această cifră trebuie înmulțită cu numărul persoanelor ce vor locui împreună, pentru ca să avem o locuință bună. Când în cameră zace un bolnav, din care cauză ferestrele se deschid mai rar și mai puțin timp, aerul se strică și mai iute prin respirație și în acest caz *cubajul de aer* trebuie să fie mai mare. Dar, fie camera cât de mare, aerul din ea după un timp oarecare, 8 până la 10 ore, începe să se strice și atunci trebuie *reînnoit*, dacă nu voim ca respirația să devină din ce în ce mai anevoioasă, iar dacă am mai întârzia cu *primenirea aerului*, cu ventilațiunea, ar începe să se ivească primele semne ale *asfixiei* (v. acest cuvânt). Aerul *proaspăt* trebuie luat de afară și în cantitate cu atât mai mare și cu atât mai des cu cât camera este mai mică și numărul locuitorilor ei mai mare. Aerul trebuie să fie *curat* și pentru aceasta nu trebuie să se deschidă ferestrele din partea unde sunt latrinele, canalele de scurgere, sau maidanele încărcate cu tot felul de murdării. Dacă avem un aparat de *ventilație*, el va fi așezat astfel încât să ia aer din sus de acoperiș, unde atmosfera nu este așa de încărcată de necurățenii. Aerul *proaspăt* trebuie să aibă o *temperatură potrivită*, să nu fie nici *prea uscat*, nici *prea umed*, de aceea este bine ca locuința să aibă o dublă orientare, ceea ce permite ca să se deschidă ferestrele, sau să se așeze ventilatoarele, spre miază-zi iarna și spre miază-noapte vara (v. *Locuință*).

— Mijloacele pentru a reînoui aerul dintr-o cameră, a-l întreține curat și abundent, constituie ceea ce se numește *ventilațiune*, care este *naturală* și *artificială*. Aerisirea, sau ventilațiunea *naturală*, se face prin grosimea pereților locuinții, prin încheieturile dela deschiderile ei, prin uși și ferestre, prin coșurile dela sobe. *Pereții* lasă să pătrundă aerul neconținut, fiindcă materialele de construcțiune sunt de obicei poroase. Aerisirea, care se produce prin *încheieturile ferestrelor și a ușilor*, este mai mult neplăcută de cât folositoare, pentru care de multe ori suntem forțați să punem cârnați de bumbac pe la ferestre și uși, iar cei săraci le lipesc cu hârtie. Aerul de afară trece prin încheieturile și crăpăturile dela uși și ferestre fiind atras de coșul sobei, așa că el în loc să se împrăstie prin cameră se duce deadreptul către sobă, răcind astfel picioarele și spatele celor ce stau acolo. Cea mai bună ventilație și cu adevărat folositoare este aceea care se face prin *deschiderea ușilor și mai ales a ferestrelor*, repetată mai de multe ori în cursul zilei; acest mijloc de ventilație *naturală* e cel mai bun și mai practic și poate înlocui toate procedeele de ventilație artificială. Pentru a evita curenții de aer față de cari bolnavii sunt cu mult mai simțitori, s'a inventat *ferestrele duble*, ferestrele cu basculă, mulțumită cărora aerul ce vine de afară se duce către tavan, unde se încălzește înainte de a veni în atingere cu bolnavul.

Sobele sunt un bun mijloc de aerisire (v. *Încălzire*). Când arde focul puterea de ventilație a sobei crește în virtutea *tirajului* care se face prin coș; o parte din aerul camerei iese pe coș cu fumul odată și este înlocuit cu altă parte de aer curat și proaspăt, care vine din afară prin uși și ferestre. Aerisirea sau ventilațiunea *artificială*, când este bine instalată, are însușirea de a lucra în tot minutul, ziua și noaptea, introducând neconținut aer curat și alungând în același timp aerul stricat. Sunt două metode: una numită prin *apel*, sau *aspirație*, care trage afară aerul stricat înlocuindu-l cu aer curat; cealaltă prin *împingere* care însuflă aer proaspăt alungând pe cel stricat. Se poate extrage aerul stricat prin aju-

torul căldurii, *ventilație termică*, pentru care trebuie să avem o *sobă de apel* special construită pentru acest scop; se poate reînoui aerul prin mijlocul unor aparate sau mașini, cari sunt puse în mișcare prin electricitate.

Aerob (de la gr. *air* și *vios*, vieată). — Microb care nu poate trăi decât în contact cu aerul.

Aerofagie (gr. *air*, aer și *phagin*, a mânca). — Pătrunderea în stomac a unei doze apreciabile de aer, la oameni nervoși, isterici, neurastenici, fricoși și urmată de răgăituri uneori, cari ușurează pe bolnav. Aerofagia nocturnă poate simula astmul sau anghina de piept. Aerofagia se vede des la tuberculoși și la copiii de sân, cari sug în vânt, sau la o țâță cu sfârc prost, sau își sug degetele, sau vreun obiect. Se recomandă *psihoterapia* (vezi acest cuvânt), ținerea permanentă între dinți a unei țigarete false, să se ia cât mai des prafuri cari absorb gazele și sunt și antiacide, iar la oamenii prea nervoși să se dea valerianat de amoniac.

Aerofobie (*phobos* cuvânt gr., înseamnă teamă). — E senzația supărătoare de care se plâng anumiți indivizi nervoși când aerul le atinge pielea.

Aerostatoterapia (terapia cuvânt gr. = îngrijirea). — Se recomandă tuberculoșilor, la începutul boalei, să se urce în baloane active la înălțimi mai mari, în timpul zilei. Acolo nu-i nici praf, nici microbi în aer.

Aeroterapie (gr. *aer* și *therapē* în, a îngriji). — Prin aceasta se înțelege tratarea boalelor prin aer comprimat, rarefiat, sau saturat cu diferite substanțe medicamentoase (v. *Aer comprimat* și *aer rarefiat*).

Afazia (gr. *a*, fără și *fasis*, grai). — Afazia e totalitatea semnelor cari rezultă din alterarea, stricarea *limbajului interior*: vorba, înțelegerea cuvântului, cetitul și scrisul. Se consideră mari categorii de afazie și anume: *Afazia motrice*, *afazia sensorială* și cea *mixtă*. În prima categorie intră bolnavii cari înțeleg vorba dar nu pot vorbi, în a doua cei ce pot vorbi, dar nu înțeleg. Afazia sensorială e caracterizată prin neputința de a evoca și frazele în legătură cu obiectele și ideile, neputința de a evoca obiectele și ideile în legătură cu cuvintele și frazele. În primul caz

au greutate în expresiune, în al doilea caz au dificultate în *percepție*. Afazicii sensoriali vorbesc, flecăresc mult, dar vorbesc rău. După aceea au turburări în *cetire*, în scriere (*Agrafie*). Afazia *motrice* sau *anartria*. Bolnavul nu poate *articula* cuvintele. Anartria poate fi chiar completă. Cauzele acestor turburări pot fi *sifilisul*, *abcesele*, sau *tumorile* din creier. Tratamentul va fi: *antisifilitic*, reeducarea dar numai în cazurile de anartrie când se poate spera la o vindecare sau ameliorare.

Afecțiune sau *boală*, pentru unii doctori e același lucru, pentru alții *afecțiunea* e o localizare a boalei.

Aferent (vas...) v. *Limfatice*.

Afin, (*vaccinium myrtillus*, fam. Ericaceelor). — Mic arbust care crește prin pășuni pietroase în regiunea alpină și prin locurile stâncoase și umede din pădurile montane și subalpine. Fructele dulci, puțin acrișoare cunoscute sub numele *afine* se mănâncă; din ele se fac conserve și siropuri răcoritoare. Sucul roșu închis al acestor fructe se întrebuințează spre a văpsi stoffe și pentru colorarea vinurilor. În medicină se întrebuințează frunzele și fructele. Principiul activ un acid chinic. Proprietăți: contra diareei; se dă: praf 4 gr. la 2—3 ore; extract 1—2 gr. pe zi în pilule; tinctură, un pahar de lichior pe zi; sirop 2—6 linguri pe zi.

Afinitate morbidă. — Boli ce pot să existe deodată, sau se succed, una pregătind pătrunderea și încolțirea celeilalte mai repede. De pildă: pojarul pregătește oțica.

Afion. — v. *Opiu*.

Afonie (gr. *a*, fără, și *phōni*, voce, glas). — Neputința de a scoate sunete. Afonia provine sau din cauză că coardele vocale nu mai pot vibra: paralizia mușchilor glotei, datorită unei leziuni inflamatoare (unele laringite), sau unor ulceratii (sifilis, cancer, oțică), sau din pricina existenței falselor membrane (crup), sau a unor tumori cari apasă laringele. Se mai observă afonia datorită isteriei, dar atunci ea vine brusc și dispăre, tot așa de repede. Afonia mai poate fi datorită și prin faptul că curentul de aer, care pune în mișcare coardele vocale, nu se mai produce, datorită rănirii, sau strâmtoarei tracheei, paraliziei diafragmu-

lui, etc. Afonia diferă de *răgușeală*, la răgușeală sunetele există, sunt mai slabe (v. *Laringită*, *Voce*).

Afrodiziac. — Medicament care atâță dorințele, poftele veneriene.

Afte (gr. *aptein*, a aprinde, a arde), *gurar*, *plesne*, *pogană*, *pușche*. — Sunt un fel de beșicuțe cari se ivesc în gură, albe sau cenușii, înconjurate de un cerc roșu și cari după 2—3 zile se sparg lăsând în urma lor câte o rană foarte dureroasă la cea mai mică atingere. Aceste beșicuțe se arată de obicei pe limbă, în vârf sau pe laturi, se pot întinde și pe buze, pe gingii, pe căptușeala obrazilor (stomatită aftoasă) și chiar pe amigdale (angină aftoasă). Gura miroasă urît. Se ivesc de obicei la copiii mici, cari au dureri așa de mari încât nu pot suge; se văd și la oameni mari, cari fumează, sau nu-și țin gura curată.

— *Tratament*. Să se facă gargară cu ceai de nalbă, sau de susai, să se atingă rănilor cu câte o picătură de spirt, sau de apă de Colonia sau și mai bine cu piatra iadului, sau cu miere detrandafir (miericică) cu puțină piatră acră în ea, sau cu borax, ori gargară cu clorat de potasă, 8 gr. la 200 apă caldă.

Afuziune (lat. *affusio*, dela *afundere*, a vărsa pe, a turna pe deasupra, a uda).

— Aceasta constă în a turna pe tot corpul, sau numai pe una din părțile sale o cantitate de apă rece, sau caldă. Afuziunea se deosebește de *abluțiune*, care este o spălare parțială, de *irigațiune*, care este o stropire, sau udare locală, de *duș*, în care se aruncă apa cu oarecare putere asupra părților pe care trebuie să le impresioneze. În afuziune bolnavul primește conținutul unui vas plin cu apă, care se revărsă asupra lui. Iată cum se face afuziunea: se pune bolnavul desbrăcat într-o baie, în care poate să fie puțină apă caldă, în picioare sau în poziție șezândă, apoi se toarnă apă deasupra lui, după care bolnavul ese din baie, se șterge bine pe corp, se așează în pat și se învește într-o plapomă de lână, sau se îmbracă repede și apoi iese la aer. *Afuziunile reci* au efecte variabile după durata și modul lor de aplicațiune: *sedative* (liniștitoare) sau *stimulente* (ațățătoare). Ele sunt nesupărătoare chiar și atunci când corpul are temperatură, sau este în transpirație (asu-

dat), însă în acest caz afuziunea rece trebuie să fie de scurtă durată. Ele sunt *stimulente* când apa are 12° și durată 2—3 minute; *sedative* când apa are 14—16° și durată 10—15 minute. Afuziunile reci sunt bune mai cu seamă



Fig. 5. — Afuziune

în boalele febrile, grave, cu adinamie (lipsă de putere) mare, cum sunt: febra tifoidă, scarlatina, febrele intermitente; ele sunt foarte folositoare în mai toate boalele nervoase (nevroze). *Afuziunile calde* se întrebuințează mai rar și sunt mai puțin folositoare. Ele servesc mai mult ca *sedative* (apa de 25—30°).

Agalactie (gr. α fără, *gala*, lapte). Lipsa de lapte din sânul mamei.

Agapia (județul Neamț). — O foarte frumoasă și romantică stațiune climaterică de vară, mănăstire de călugărițe, situată în curbătura Măgura, în fundul unei văi umbrite, altitudine 480 metri. Clima excelentă și constantă aerul foarte curat ozonizat și îmbalsamat cu miros de brad, iar întinsele păduri seculare din jur exercită o influență continuă asupra îmbărsării lui. Vieța liniștită și ieftină; confortul necesar nu lipsește. Imprejurimile sunt foarte pitorești și numeroase: mănăstirile Văratec, Neamțu, Secu Horaiță și stațiunea balneară Bălțătești. — **Indicațiuni:** se recomandă anemicilor, surmenaților, neurastenilor, conva-

lescenților, ofticoșilor (la începutul boalei).

Agar-agar. — v. *Geloză*.

Agasare (gr. *akazein*, a ascuți; fr. *agacement*, dela *agacer*, a strepezi dinții fig. a întărâta, a irita, a provoca). — Sunt două feluri de agasări; una *morală* și alta *fizică*. Cea *morală* constă în o schimbare trecătoare a caracterului, o iritabilitate particulară a nervilor, care face să ne fie penibilă orice senzație fizică și morală pe care în altă stare nu o avem. Această stare fiind trecătoare nu se recomandă ca tratament decât liniște și calmante, puțin bromur de potasiu (2—4 grame), iar pentru a modifica starea generală a acestor persoane nervoase, cari mai întotdeauna sunt și *anemice*, li se dau tonice (fieruginoase) și preparatele de valeriană; hidroterapie.

Agitațiune (*agitatio*, dela lat. *agitare*, a mișca iute, a clătina, sgudui), *neodihna*, *neliniște*. — În această stare inteligența este mărită, exaltată, din care cauză omul are mare poftă de vorbă; ideile se succed fără întrerupere, sar dela un obiect la altul, dar tratează despre lucruri reale, aieva, și se înlanțuesc unele cu altele, ceea ce deosebește *agitațiunea* de *delir* (aiurare). Putem fi agitați nu numai în timpul zilei ci și în cursul nopții, când avem somnul neliniștit, ne deșteptăm adeseori, ne mișcăm în continuu în pat, când pe dreapta, când pe stânga. În boalele grele cu fierbințeală mare agitațiunea este un semn foarte comun și se pronunță mai ales către seară. — În *copilărie* se observă cu mult mai des decât în oricare vârstă și cauza poate fi de multe ori un lucru de nimic dar poate fi și semnul unei boale contagioase. — În *etatea adultă* agitațiunea de asemenea pote fi trecătoare și să dispară odată cu cauza care i-a dat naștere, fără nici un tratament. Ea se arată de preferință noaptea; unele persoane nu pot sta culcate pe spate fără ca să nu aibă somnul agitat; altele sunt agitate din cauza unei mistuiri grele provenită din mâncare prea multă și mâncări prea grele; unii din pricină că au luat băuturi excitante, ceai, cafea, șampanie, licoruri, fără ca să fie obicinuiți cu ele; alții fiindcă au avut în timpul zilei emoțiuni mari, sau au

suferit de căldură mare cum e în timpul verii. — Dacă agitațiunea persistă mai multe zile de rând, cu sau fără întreruperi, dacă ea continuă ziua și noaptea, dacă se mai însoțește și de alte semne, atunci de sigur că ea este începutul unei boale adevărate, de o durată mai mult sau mai puțin lungă: o febră tifoidă, un reumatism, o îngrămădire de sânge la piept, sau oricare boală acută, căci toate încep cu un fel de agitație. Ea mai există și în diferitele forme de alienațiune mintală, în mod continuu sau numai momentan (vezi *Nebunie*). Medicamentele cele mai bune în contra agitațiunii sunt *cloralul* și *opiul*, pe cari numai doctorul le poate prescrie, dar, până să vină el, vom pune bolnavul în pat într'o odaie curată și aerisită, îi vom da dietă și băuturi răcoritoare (limonade, sirop de smeură cu apă), ceai de tei, apă de flori, cari toate pot da liniște bolnavului și în cazurile ușoare pot să-l vindece. — La *bătrâni* agitațiunea este mai rară, dar când există este cu mult mai gravă și ne face să ne gândim la o boală mai serioasă.

Aglosie (gr. α, fără și glossa, limbă) Fără limbă.

Aglutinare. — Microbii cari în mod normal sunt izolați și mobili, sub acțiunea unui ser dela un animal imunitizat prin *vaccinarea* contra acelor microbi, sau a serului unui bolnav, atins de boala pricinuită de acei microbi, se adună în grămezi.

Agnosie (gr. α fără, gnosis, cunoștință). — Turburări în înțelegerea naturii lucrurilor, a semnificărei obiectelor, fără îmbolnăvirea senzoriului și a percepției simple. — După felul turburărilor deosebim *agnosie vizuală*, *surditate psihică*, *agnosie tactilă*, *agnosie generală*.

Agonie (dela grec. agón, luptă), a trage să moară. — Lupta organismului contra morții. Mai întâi *inteligența* se întuneacă; cunoștința se pierde; bolnavul nu mai răspunde decât prin fraze puțin lămurite și fără șir, fiindcă gândirea nu mai există, iar vocea, după ce a devenit mai slabă și schimbată, încetează cu totul din cauza paraliziei laringelui. Omul se află într'o stare de somnolență din care nu-l putem scoate de cât *momentan* prin excita-

țiuni din cele mai puternice. Uneori inteligența se păstrează până în ultimul moment, când bolnavul singur își dă seama că moare, cazuri cari din fericire nu sunt dese. Întru cât privește *mișcările*, ele se slăbesc pe încetul, începând cu membrele inferioare, picioarele fiind deja în nemișcare pe când mâinile se mai mișcă din când în când. După aceasta urmează paralizia gâtului și a esofagului, așa că apa turnată în gură cade în stomac ca într'un vas inert, producând un zgomot special, sau iese afară fără să fie înghițită, tot astfel se întâmplă cu orice i-se dă. Din cauză că *simțirea* este micșorată foarte mult, aproape stinsă, bolnavul nu suferă aproape de loc; durerile din timpul boalei nu le mai are. *Simțurile* și anume: mirosul, gustul și pipăitul nu mai slujesc, vederea și auzul de obicei sunt stinse, cu toate aceste tot e bine ca să nu se vorbească în jurul muribundului, căci poate să mai înțeleagă câteceva. *Fizionomia* ia o înfățișare proprie: fața, capătă o paloare specială, trăsăturile se șterg, tâmpile se înfundă, obrații devin flasci și atârnă, nasul se subțiază și se răcește, buzele sunt mai subțiri și decolorate, pleoapele sunt pe jumătate închise și ascund în parte ochii, cari sunt înfundați în orbite, acoperiți de o pânză ca de păianjen, cu privirea rătăcită. *Căldura* începe să dispară din mâini, din picioare, din nas, din urechi și o *sudoare rece* acoperă pielea, mai ales la cap și la mâni. *Bătăile inimii* și *pulsul* sunt mai încete și mai rare. *Respirația* slăbește, se răcește și pare că s'ar împiedeca, auzindu-se de departe un *horcâit*, produs prin flegma ce rămâne în gât și pe care omul nici n'o poate scuipa, nici n'o poate înghiți, din cauza paraliziei gâtului. Durata agoniei, în termen mijlociu, este de 20 până la 30 ore, rar ajunge până la 48 de ceasuri și în mod excepțional trece de 2 zile.

Agorafobie (gr. agora, piața și fobie, teamă). — O stare deosebită a anumitor indivizi bolnavi de nervi, sau sufletește, când se găsesc într'o piață sau când vor să treacă o stradă pe unde circulă mai multă lume.

Agrafe. — Cele obișnuite se între-

bunțeară la fixarea bandajelor; unele speciale, se întrebuințeară în chirurgie pentru prinderea buzelor plăgilor operatorii.

Agrafie (gr. *a* fără și *grafin* a scrie). — Sunt cazuri când dintr'o lipsă de legătură, coordonare a gândirei, aducere aminte (memoriei), expresiunii scrise a cuvintelor și centrilor creierului, un individ să nu poată scrie nici un cuvânt, deși mișcărilor mâinii sunt bune.

Agriș, acriș, borboană, coacăză, sălbatică, struguri spinoși (*Ribes grossularia*, fam. Saxifragaceelor). — Arbust ale cărui fructe sunt niște boabe ovoide, verzi, galbene, sau roșii, păroase sau fără peri, care crește prin locuri stâncoase și se cultivă prin grădini (Aprilie—Mai). Fructele, numite *agrișe*, se mănâncă; necoapte, sunt acre, astringente și irită stomacul; coapte sunt dulci, răcoritoare și laxative.

Agriș roșu. — v. *Drăcilă*.

Aguridă. — Caută la *Struguri*.

Al. — v. *Usturoiu*.

Aior. — v. *Lapte de cânelui*.

Airol (oxiodogalat de bismut). — Praf cenușiu, fără miros, fără gust, nu se topește în apă, însă se descompune într'un product roșietic în atingere cu lichidele apoase. Se întrebuințeară ca antiseptic, având aceleași proprietăți și dându-se în aceleași doze ca iodoformul, al cărui succedaneu este (vezi *Iodoform*).

Aiurare. — v. *Delir*.

Ajun. — v. *Abțință*.

Ajutoare publice. — v. *Salvarea*.

Alămăioare. — v. *Gutuie*.

Alăptare (*lactatio*). — Copilul, îndată după naștere simte trebuința de a dormi și numai după vr'o trei ceasuri se alăptează pentru întâia oară. Obiceiu de a da noului născut la început apă cu zahăr, sau ceaiuri, este bun; De obiceiu copilul nici nu cere să fie alăptat în prima zi, ci se odihnește, atât el cât și mama și numai de a doua zi trebuie pus la sânul mamei. În timp de mai multe luni, copilul se va hrăni numai cu lapte, care este foarte hrănitor și singurul nutriment care îi prieste. Prin urmare, alăptarea este nutrimentul primei copilării, care nu va fi înlocuită decât numai după mai

multe luni (v. *Întărcatul*). Alăptarea este de trei feluri: *naturală*, când copilul sugă dela sânul mamei sale, sau al unei doici, sau dela un animal domestic femelă; — *artificială*, când copilul sugă laptele din biberon, sau îl bea cu lingurița ori cu ceșcuța; *mixtă*, când copilul este hrănit atât la sân cât și cu biberonul (sticlă sugătoare) — Din *alăptarea naturală* cea mai bună și din fericire cea mai răspândită este cea *maternă*, din partea mamei. Din timpurile vechi alăptarea maternă a copilului mic s'a bucurat de cea mai mare cinste. Așa de pildă în Sparta și la Atena, cetăți vechi, în care s'a pus baza civilizației de azi, femeile care își alăptau singure copiii aveau



Fig. 6. — Cum se ține copilul la alăptare când mama este culcată

întăietate oriunde se duceau și toată lumea le consideră ca pe ceva *dumnezeesc*, de care nu se atingea nimeni, să le facă vreun rău. În India și acum e obiceiu ca mama, după moartea copilului, să-i stropească mormântul cu laptele ei, până îi va seca din țâțe. Acest popor crede că datorită mamei de a-și alăpta singură copilul nu este numai pe lumea aceasta, ci se întinde și după moartea lui, când trebuie să-și verse laptele ei pe mormântul copilului. În poporul nostru găsim de asemenea o mulțime de credințe care spun mamei că, dacă nu-și va alăpta singură copilul, va fi pedepsită de Dumnezeu, iar copilul o va urî când va fi mare. Natura și mintea cer deci ca mama să *nutrească* singură copilul pe care l'a

născut. Cel mai mare folos în alăptarea maternă este potrivirea desăvârșită care este între calitatea laptelui mamei și trebuințele copilului. În momentul nașterii copilul găsește în laptele mamei cantitățile de apă, de zahăr, de materie grasă, etc., cari îi convin; apoi, mulțumită schimbărilor naturale pe cari aceste elemente le încearcă în măsură cu cât se depărtează de acest moment, copilul le va avea în proporțiile cari se potrivesc exact cu trebuințele corpului său. Folosul mamei de a-și nutri copilul



Fig. 7. — Mama își alăptează copilul stând pe scaun

Apoi, în multe cazuri, mamele slăbuțe se îngrășă, pentru că laptele, ca să se formeze mereu în țâțe, cere mamei mai multă hrană și o bună poftă de mâncare. Altele, care au un sân prea mic, după ce alăptează li se mai mărește pieptul, își fac deci un corp mai frumos. Sunt însă unele împrejurări în care mama nu-și poate alăpta copilul: din *partea copilului* este o slăbiciune prea mare generală, sau diformitățile gurii (buză de iepure sau limbă prinsă), cari îl împiedică să sugă sânul. În aceste cazuri trebuie să-l hrănim cu lingurița, sau cu biberonul, cel puțin în primele zile, până când copilul se mai întărește ca să poată prinde sânul. Din



Fig. 8. — Cum ținem copilul când îi dăm lapte cu lingurița

este mare, căci laptele îi umflă sânurile, i le întărește, așa că dacă ele n'ar găsi în sugerea copilului o scurgere ușoară și naturală, s'ar inflama, dând naștere la abces, care e foarte dureros (vezi *Sânuri*). Afară de acestea mai este un alt folos: alăptarea maternă dă mamei puțința de a-și îngriji copilul bine, ceea ce nu se poate cere dela o femeie străină, care n'are dragostea și devotamentul ei.

partea mamei poate să fie calitatea rea a laptelui, sau cantitatea lui prea mică, sau micșorimea sfârcurilor, o slăbiciune generală cu anemie mare (lipsă de sânge), unele boale cari se pot da copilului (oftica, nebunia, epilepsia, etc.), ivirea unei boale molsitoare și febrile, dacă mama rămâne din nou însărcinată. Întru cât privește menstruația (periodul, sorocul), dacă ea se iveau în timpul alăptării, copilul poate continua cu sugerea, mai ales când suportă bine laptele, afară numai de cazul când copilul suferă și începe să aibă vătăruri și urdinare, atunci va înceta alăptarea. Dacă laptele mamei a venit în țâțe din primele ore după ce s'a născut copilul, nu este bine să aș-

teptăm ca sânurile să se umfle de lapte prea mult, ceea ce ar obosi copilul în timpul sugerii, ci e bine să-l punem la sân. La alăptarea copilului în cele dintâi zile dela facere mama va rămânea culcată, întorcându-se într-o parte, iar dela a 6-a, sau a 7-a zi, va da sânul copilului șezând cu spatele răzimate. Puțin timp înaintea facerii și îndată după facere țâțele femeii conțin un lapte subțire și limpede care se numește *colostru*. După ce copilul a supt *colostrul* i se golesc mațele de materia negricioasă care s'a adunat în ele, înaintea nașterii și care se numește *meconiu* și astfel se înlătură trebuința de a se da nou-născutului curățenie în primele zile. Cu încetul *colostrul*, care este un laxativ, dispare, laptele devine mai puțin apos și după 8 până la 10 zile va avea grosimea și compoziția normală. Dacă e slăbuț se va da copilului să sugă din amândouă sânurile la fiecare supt, iar nu alternativ, adică acum dintr'un sân și la altă sugere din celălalt sân; laptele dintr'un singur sân nu-i ajunge ca să-l hrănească. Dacă e voinic și țâța este sănătoasă, i se va da, la un supt, să sugă numai dintr'una, iar la următorul din cealaltă. În chipul acesta laptele este golit tot și țâța va produce și mai mult. Întru cât privește *cantitatea de lapte* pe care trebuie s'o ia noul născut, hrănit la sân, vom spune că este bine ca dela început să se reguleze timpul și durata alăptării. Dela a 2-a sau a 3-a zi după naștere copilul să nu sugă ziua decât la intervale de cel puțin 3 ore și noaptea la câte 3 până la 4 ore. Copiii cari au împlinit e-tatea de 2 luni să sugă noaptea mai rar decât la 4 ore. Fiecare alăptare să dureze 10 până la 12 minute. Dacă copilul a supt la o sugere prea mult lapte, el varsă ce a supt peste măsură, ceea ce nu-i face rău. Dar când se ivesc vărsături adevărate, cu scaune verzi, cu *mătrice* (colici intestinale), cu *diaree* (urdinare), atunci trebuie rărite și scurtate sugerile, să se cheme doctorul, ca nu cumva copilul să nu se îmbolnăvească mai rău. Este bine ca să se reguleze sugerile după cum am arătat mai

sus, atât pentru a păstra puterea și odihna mamei, cât și pentru a asigura mistuirea și somnul copilului. Nu este bine ca să căutăm a domoli țipetele copilului dându-i numai decât țâța, căci acele țipete nu sunt întotdeauna semnul foamei. Copilul bine dezvoltat suge până la 650 grame de lapte în 24 ore în primele 2 luni; la 4—5 luni cam 900 grame pe zi. Cel mai bun mijloc de a ști dacă laptele este bun și îndestulător este de a cântări copilul, dacă nu în fiecare zi cel puțin tot la 8 zile. Din tabloul următor putem vedea cât lapte trebuie să sugă un copil la diferite vârste și cât trebuie să crească în greutate și lungime. Dacă copilul nu crește în această măsură, dacă el este abătut, nepăsător, dacă nu câștigă în greutate și dacă scaunele lui sunt de culoare verde, sau verzuie ca spanacul, atunci e semn că laptele nu e bun și nu e îndestulător și atunci trebuie să recurgem la *alăptare*

Vârsta copilului	Greutatea copilului	Lungimea copilului	Cantitatea de lapte de mamă în 24 ore
10 zile	3 kgr. 250	50 cm.	320 gr.
30 "	3 " 700	54 "	600 "
2 luni	4 " 400	57 "	640 "
3 "	5 " 100	60 "	720 "
4 "	5 " 800	62 "	800 "
5 "	6 " 500	63 "	880 "
6 "	7 " 100	64 "	910 "
7 "	7 " 500	65 "	945 "
8 "	7 " 800	66 "	980 "
9 "	8 " 100	67 "	980 "
10 "	8 " 400	68 "	990 "
11 "	8 " 600	69 "	1020 "
1 An	8 " 800	70 "	1050 "

mixtă, sau la o *doică*, sau la alăptare artificială. Este important de știut *regimul pe care trebuie să-l urmeze femeia care alăptează*. Hrana mamei trebuie să fie mai întâi ușoară de mistuit, în cantitate suficientă, însă nu exagerată, nu prea multă și de calitate bună. Lintea și cartofii măresc bogăția laptelui, precum și celelalte

feculente, dar să nu facem uz de acestea în cantitate prea mare, înlocuind carnea și peștele, cari dau tot atâta lapte ca și vegetalele. Fructele, prăjiturile, legumele, vor fi luate în măsură suficientă. Pentru ca mîstuirea să fie bună trebuie ca hrana să varieze și femeia să nu stea toată



Fig. 9. — Mama legată la nas și la gură, ca să nu dea guturaiul copilului



Fig. 10. — Cum trebuie ținută țafa ca să nu astupe nasul copilului

ziua închisă în casă. Femeia în timpul alăptării se va servi de aceleași mâncări și în aceeași cantitate ca mai înainte, fără să-și schimbe obiceiul. Femeia care alăptează trebuie însă să aibă destulă odihnă fizică și morală. Un somn de cel puțin 7 ore îi este trebuincios.

Emoțiunile vii ale mamei pot să aducă în compoziția laptelui schim-

bări cari pot da copilului fenomene nervoase, convulsiuni (spasme). — *Alăptarea la doică sau mănă.* Dacă este cu neputință ca mama să hrănească copilul, el este încredințat spre alăptare unei doici, sau în casă și sub privigherea mamei, ceea ce este mai bine, sau afară din casă unde privigherea este foarte anevoioasă. Alegerea doicii cere diferite precauțiuni adecă ea să fie sănătoasă, curată, să aibă lapte de ajuns (v. *Doici*). De altfel această alegere trebuie să fie făcută întotdeauna de doctor. În tot cazul o doică bună este de preferit biberonului, oricât de bine întreținut ar fi el. *Alăptarea prin animală femelă.* Prin conformația fizică și docilitatea lor obișnuită, cățeua și capra sunt mai bune doici decât vacile, măgărițele și iepele. Dar acest mod de alăptare




Fig. 11. — Copil sănătos, adăptat de mama sa (la 4½ luni)

prezintă dificultăți numeroase, din care cauză nu s'a putut adopta. — *Alăptarea artificială, sau cu biberonul* (sticlă sugătoare). Când mama nu este sănătoasă și nu se poate găsi nici o doică bună, atunci trebuie să se hrănească copilul cu lapte de vacă, de bună calitate (vezi *Lapte*) dela o vacă sănătoasă. În prima lună a vieții o să adăogăm laptelui de vacă fiert și căldicel o cantitate foarte mică de zahăr ordinar, sau mai bine de zahăr de lapte (lactoză).

Iată acum cantitatea zilnică de lapte de vacă necesară copilului în prima săptămână a vieții sale:

Ziua II-a 70—100 gr. ½ lapte cu 5% zahăr.

Ziua III-a 150—200 gr. ½ lapte cu 5% zahăr.

Ziua IV-a 220—300 gr. ½ lapte cu 5% zahăr.

Ziua V-a 310—400 gr. $\frac{1}{2}$ lapte cu 5% zahăr.

Ziua VI-a 380—500 gr. $\frac{1}{2}$ lapte cu 5% zahăr.

Ziua VII-a 450—600 gr. $\frac{1}{2}$ lapte cu 5% zahăr.

În primele săptămâni dăm laptele tăiat cu apă pe jumătate; între 2—4 luni o parte din 3 să fie apă și de la 5 luni laptele curat. Laptele de vacă se dă copilului cu biberonul, sau sticla sugătoare, care cere o îngrijire cu totul deosebită (vezi *Biberon*). În nici un caz să nu se dea copilului o sugătoare de tulpă cu zahăr și pesmeți pisați, sau cu altă umplătură, cari strică stomacul. Deși laptele de bivoliță este mai greu de mistuit decât cel de vacă, îl putem folosi la nevoie. În timpul verii laptele se strică lesne, se acrește curând și produce vărsături și dureri de stomac; pentru ca să-l ferim mai bine de stricăciune trebuie fiert îndată ce s'a adus în casă și după ce s'a răcit să se pună într'o sticlă curată și astupată bine, iar sticla să se așeze în alt vas cu apă rece, sau gheață. Laptele de vită nutritive cu borhot acru din poverni și din fabrici de zahăr nu este bun. Înaintea ieșirii celor dintâi 2 sau 4 dinți să nu se dea copilului nici un alt aliment, nici o altă hrană decât lapte. Până atunci copilul să fie ferit de mâncări făinoase și de alte mâncări solide. Diferite alimente, cum sunt: laptele conservat elvețian, pulberea lui Liebig, pulberea lui Nestlé și alte preparate, așa zise pentru hrănit copiii, înlocuind laptele natural al femeiei, nu sunt suportate bine de toți copiii, de aceea este mai bine ca cu acei bani să se plătească o doică bună. — **Alăptarea mixtă.** Dacă mama este sănătoasă dar n'are lapte îndeajuns, dacă ea este obligată de a lipsi de acasă pentru a lucra într'o fabrică sau a merge la un serviciu (funcțiune) și mijloacele nu-i permit să țină o doică, atunci ea poate să alăpteze copilul, dându-i-se acestuia și lapte de vacă în lipsa ei, adică să se facă alăptarea la sân și cu biberonul, ceea ce se chiamă alăptare *mixtă*. Nu e bună ca cea *maternă*, dar e mult mai

bună decât cea *artificială*. Nutrirea cu biberonul se va face după cum s'a arătat mai sus. (Celor ce vor să citească mai multe despre alăptare le recomandăm să-și procure cartea „cum să ne creștem copiii” de Dr. Glăvan).

Alaur. — v. *Ciumăfaie*.

Albastru de metilen. — Clorur de tetrametilitionină. Pulbere amorfă, albastră închisă, mată, fără miros, fără gust, solubilă în 60 părți de apă sterilizată. Un sfert de ceas după ce s'a înghițit, urina devine verzuie, apoi albastră-verde după 2 ore, în fine albastră închisă după 4 ceasuri. Albastru de metilen are proprietăți bactericide variabile, și anume: față de ematozoarul paludismului; față de gonococul blenoragiei (injecțiuni uretrale); precum și față de alți microbi, pentru care se dă în dizenterie, conjunctivite infecțioase, ozenă, stomatite ulcerose. Albastrul de metilen se pare că ar calma durerile în ataxia locomotrice, în polinevrite, în nevralgii și uneori și în reumatismul muscular. Bun agent de sugestie în isterie (se dă în pilule). Doză: 5—50 ctgr. în buline, pilule. Pe *din afară* se dă în pulbere, în soluțiuni, colire, injecțiuni intramusculare.

Albastru de Prusia. — v. *Cianur*.

Albeață. — v. *Ochi* și la *Cornee*.

Albină (Înțepături de). — Fiecare albină are un ac la partea dinapoi cu un vârf ascuțit și dințat (15 până la 16 dințișori), care îl face să semene cu o sulită și din care pricină odată intrat în piele el nu mai poate eși. Acul este găușit pe dinăuntru și prin acel canal iese veninul care este produs de 2 beșicuțe așezate în pân-tece și care venin mărește durerea înțepăturii. Cu acest acuzor se apără albinele când sunt atacate, lovite sau supărate în munca lor, și atunci înțepă unde le vine bine, pe față, gât, mâini, sau pe ori ce altă parte descoperită a corpului. Partea înțepată îndată se roșește, se umflă și dă loc la o mâncărime și arsură de multe ori foarte mare. Când înțepăturile sunt multe se pot ivi semne grave, umflături mari și abcese, *gangrenă* la membre prezentând semne foarte

grave, urmate chiar de moarte. — Mai întotdeauna acul introdus sub piele se desface de corpul albinei,, atrăgând cu el și beșicuța cu venin pe care o vedem în înțepătură sub forma unui punct rotund și negru. Nu trebuie să apăsăm pe această pungă ca să nu se mai scurgă venin în rană; e bine s'o ridicăm cu un vârf de ac, trecut întâi prin foc, ceeace se face lesne cu puțină îndemânare și cu ochi buni. După ce s'a scos acul e bine să se spele locul cu apă rece sărată, cu oțet, cu spirt de vin cu apă de Colonia, cu apă de plumb sau cu câteva picături de amoniac lichid, cari micșorează durerea. Se mai poate pune și un amestec alcătuit din: amoniac 15 gr. colodiu 5 gr. și acid salicilic 50 centigrame. Când înțepăturile sunt foarte numeroase va trebui ca bolnavul să facă o baie caldă și să i se dea pe dinăuntru *tonice*. Câte odată albina pătrunde în nas sau în gură și atunci lucrurile sunt mai grave. Se întâmplă uneori că mâncând fructe să înghițim din greșală o albină, sau o *vespie*. Când ne înțepă în gură, sau în fundul gurii, sau pe limbă, după care părțile înțepate se umflă așa de tare încât ne astupă răsufierea, putem muri de *asfixie*. Cel mai bun lucru este să facem gargară cu sare de bucătărie topită în apă, în care vom pune și puțin oțet, iar dacă starea e gravă să chemăm doctorul. Se mai recomandă ca gargară: ceaiul de nalbă, de floare de soc și de capete de mac. *Bondarul și vespiele* sunt tot așa de primejidoase ca și albina. Tratamentul este același, ca și pentru înțepăturile de *fânțari, tăun* și în mușcăturile de *omidă*.

Albinism (dela lat. *albus*). — Lipsa de pigment (materie colorantă), sau de granulații melanice (negre) în celulele poligonale ale stratului adânc al pielii, în celulele zise pigmentare, cari căpțușesc irisul și cavitatea ochiului. Tot pentru același cuvânt se decolorează, sau albește părul (*caniție* congenitală), etc. Din această stare, datorită de obicei unei opriri de dezvoltare, rezultă, la rasa albă, o colorațiune a irisului și a pupilei, din cauză că nici un pigment

nu mai acopere vasele coroidiene și atunci razele luminoase se filtrează prin iris și merg pe retină ca să turbure formațiunea imaginilor; vederea este slabă și ochii clipeșc. Oamenii atinși de albinism se cheamă *albinoși*. Cauza albinismului este necunoscută. Se știe însă că ereditatea joacă un rol important în apariția sa. Albinismul se vede și la animale: șaorece alb, unele specii de iepuri, mierlă albă, corbi albi, etc., cari sunt adevărați albinoși.

Albituri. — v. *Rufărie*.

Albumina (*albumen*, dela *albus*, alb). — Corp cuaternar, care pe lângă carbon, idrogen, azot și oxigen mai conține și mici cantități de sulf, fosfor și materii minerale. Se găsește în *albușul de ou*, în *serul sângelui* și în *limfă*. — *Apa albuminoasă*, patru albușuri de ou bătute într'un litru, sau o oacă, de apă, se întrebuițează în *diaree* (urdinare) și în cazurile de *otrăviri* (vezi aceste cuvinte). — *Linimentul albuminos*: un amestec de părți egale de spirt de vin și albușuri de ou este bnn în sgârieturile pielii în urma loviturilor. Se mai întrebuițează și în *boalele de piele* (v. *Mâncărime*). Albumina în urină (v. *Urină* și *Albuminurie*).

Albumină vegetală. — v. *Gluten*.

Albuminometru. — E un aparat special cu ajutorul căruia ne putem da seama câtă *albumină* se găsește într'o urină.

Albuminurie (dela *albumină* și *urein*, a urina, a se pișa). — Omul sănătos nu are albumină în urină; când se ivește în ud atunci e semn că sănătatea s'a turburat și persoana aceea suferă de *albuminurie*. În acest caz, dacă încălzim urina până dă în clocot și apoi picăm în ea câte-va picături de acid acetic, (oțet tare) ea se turbură, se brânzește. Urina de examinat trebuie să fie proaspătă, să nu fie mai veche de 24 ore, căci ea se strică și nu ne mai arată adevărul. Căutarea albuminii în urină nu este în totdeauna ușoară și de multe ori ne putem înșela, de aceea este bine ca s'o dăm spre analizat la un *laborator* [special, de unde vom obține o analiză completă și amănunțită, care pe lângă

albumină ne va arăta tot ceea ce se află în urină. Prezența albuminii în urină, după un mers lung pe jos, după o masă mai bogată, este *trecătoare* și dispare repede și definitiv, fără să lase urme rele, cum lasă în: *scarlatină, erizipel, pneumonie, febră tifoidă, sarcină*; vezi aceste cuvinte. În unele boale de rinichi, cum este boala lui Bright albumina este *permanentă* în urină (v. *Rinichi*). Tratatamentul albuminuriei constă mai cu seamă în *regim*, care la începutul boalei este *absolut lactat*; bolnavul, va lua numai lapte, dulce și bățut; spre sfârșit va putea lua și alte mâncări: pâne, orez, tapiocă, ciocolată, preparate cu lapte și brânză; apoi mai târziu: legume verzi, feculente, fructe preparate cu lapte, carne albă tocată, puține ouă. Ca băutură: pe lângă lapte, cafea și ceai, slabe, bere și *vin tonic* (v. aceste cuvinte). Nu sunt permise vin, licheruri, țuică ori rachiu. Pe lângă regim se recomandă ca tratament: fricțiuni uscate, masaj, băi de aburi, inhalatii de oxigen și băi de *aer comprimat*. Clima dulce în apropierea pădurilor de brad: Sinaia, Bușteni, Predeal, Agapia, Câmpulung, Bâsca-Penteleu, Dăru, Meleșnic, Rucăr, etc. Ape minerale: Slănicul Moldovei, Căciulata.

Alcalii (dela *al*, articol arab, și *kali*, nume arab al plantei *Salsola soda*). — Prin numele de *alcalii* se înțeleg niște substanțe cari, combinându-se cu *acizii*, formează *săruri*. *Alcalii* sunt de două feluri: *minerali*, cari se scot din regnul mineral, și *organici* sau *alcaloizi*, cari se scot din plante și animale. *Alcalii minerali* sunt: *amoniacul, calcea, magnezia, potasa și soda*. Caracterele lor sunt: gust *acru* și *arzător*, realbăstresc hârtia de turnesol înroșită de acizi, înverzesc siropul de viorele, se topește foarte ușor în apă. Aceste caractere aparțin mai cu seamă la potasă și la sodă, din care cauză aceste se numesc *alcalii tari* sau *adevărați*. Sub nume de *alcali volatili* se înțelege *amoniacul*. *Alcalii curați* sau în *soluțiuni concentrate* sunt *caustici*, ard țesăturile, din care pricină se întrebuințează numai *pe din*

afară (amoniacul la vezicatorile instantanee). *Pe dinăuntru* ei sunt *otrăvuri puternice*, cari se iau din greșeală, sau în scop de sinucidere. În caz de *otrăvire* cele mai bune antidoturi sunt băuturile acidulate, apă cu oțet în abundență. În *soluții slabe* nu sunt otrăvitori, dar pentru uzul intern sunt de preferat *alcalinele*, cari au un gust mai plăcut.

Alcaline (Săruri). — O sare alcalină este împreunarea, sau combinația, unui acid și a unei baze. În medicină se întrebuințează următoarele alcaline: carbonatul, acetatul, citratul, sulfatul de *potasă*, de *sodă*, de *litină*, de *amoniac*. Modul de *acțiune*: carbonatele în doză mică se desdoiesc în stomac sub acțiunea acidului cloridric al sucului gastric; acesta formează cu baza clorure, punând în libertate acidul carbonic. În doză mare absorbțiunea se face în natură, de unde eliminarea tot în natură prin urină, care, în loc de a fi acidă, devine alcalină. *Efectele terapeutice*: alcalinele date în doză mică măresc acțiunea sucului gastric și a sucului pancreatic, înlesnesc schimburile organice și sunt astfel *digestive*. Ele măresc secrețiunea urinii, fac ud mult și sunt astfel *diuretice*; micșorează secrețiunea bilei. Legumele (cartofii, spanacul, napii, morcovii), salatele și fructele crude, conțin o bună cantitate de alcaline, precum și vinul alb (bitartrat de potasă). — Boalele în cari se întrebuințează alcalinele sunt cele de stomac, de ficat, guta, gravela (nisipul), colicele de rinichi. Dar la interior se întrebuințează mai mult bicarbonatul de sodă.

Alcaloizii (dela *alkali* și *eidos*, gr., formă). — Se apropie de *alcalii* prin aceea că ei formează săruri combinându-se cu *acizii*; au un gust *amar* și *nearzător* și se topește cu mare greutate în apă. Cei mai mulți alcaloizi se scot din plante, așa cum este *digitalina, nicotina, chinina, atropina, stricnina*. Unele substanțe pot să conțină mai mulți alcaloizi cu proprietăți diferite, cum este *opiul* care are alcaloizi excitanti (*tebaina, papaverina*) și alcaloizi calmanti, producători de somn (*morfină, codeina*), de

unde diferența de lucrare în unele cazuri a alcaloidului și a substanței din care s'a extras; chiar când acțiunea este identică, aceeași, *doza* în care se dă alcaloidul e cu mult mai mică decât a substanței din care s'a scos (de 100 și chiar 1000 de ori mai mică). Unii alcaloizi se scot din regnul animal. Pe lângă alcaloizii *naturali* sunt și alcaloizii *artificiali*, preparați de chimie. Am spus că alcaloizii au asupra corpului o acțiune variată, unii îl moleșesc (morfină), alții îl irită dând naștere la convulsii, spasme (stricnina), etc. Astfel *îngrijirile* ce sunt de dat în cazuri de *otrăvire* variază. Cu toate acestea trebuie să știm că alcaloizii formează cu *taninul* niște compuși insolubili, cari nu se topeșc și prin urmare inofensivi, nesupărători. Așa dar după ce vom deșerta stomacul de otrava care o conține, prin ajutorul unui medicament vomitiv, care face să verse, vom da bolnavului un ceai de tanin, sau în lipsă vom da preparate cari au tanin, cum este cafeaua, chinina, etc.

Alcool. — v. Spirit.

Alcoolat. — Este rezultatul distilațiunii unui amestec de substanțe vegetale cu alcool curat, sau tăiat cu apă, de exemplu: alcoolat de mentă, de lămâe, etc.

Alcoolatură. — Medicament obținut prin macerația, în alcool a substanțelor vegetale, capabile de a ceda acestui lichid principiile lor active, cum este alcoolatura de aconit. Alcoolaturile hidroalcoolice sunt acele în cari intră o bună parte de apă.

Alcoolice (Băuturi). — Orice lichid care se bea și care conține o cantitate oarecare de alcool este o *băutură alcoolică*, sau *spirtoasă*. Cu toate acestea sunt mulți bețivi de vin, sau de bere, cari se laudă că ei nu beau băuturi alcoolice, fiindcă nu beau rachiu, sau țuică; ei cred în naivitatea lor că vinul și berea nu au alcool și prin urmare nu strică sănătății! Ei nu știu, sau se fac că nu știu, că vinul, berea, vinul de mere (cidru) și de pere, sunt băuturi alcoolice ca și coniacul, romul, țuica, etc. și că între acestea și cele dintâi băuturi nu este altă deosebire decât numai modul de preparare și bogăția

în alcool, care este în cantitate mai mare. După modul de preparare băuturile alcoolice se împart în *fermentate* și *distilate*. Cele *fermentate*: vinul, berea, cidrul și vinul de pere, obținute numai prin fermentarea unui lichid zaharat, nu-și datoresc toate proprietățile lor numai alcoolului, care se găsește relativ în cantitate mică, ci mai mult faptului că alcoolul este amestecat cu materiile zaharate, amare, acide etc. cari intră în compozițiunea lor. Băuturile *distilate* cari se obțin prin distilarea unui lichid zaharat și fermentat, sunt un amestec de alcool și de apă, cu o aromă fără nici o importanță, așa că ele lucrează numai prin alcoolul lor, care este în cantitate cu mult mai mare decât în băuturile fermentate. Pe câtă vreme vinul cel mai tare n'are decât 15—20% alcool, rachiuul are 45—55%, iar romul mai mult decât acesta.




Fig. 12. — Tăria diferitelor băuturi

Rachiuul, romul, alcoolul din sfeclă, din cartofi, din cereale, sunt mult mai stricăcioase, mai otrăvitoare decât vinul, berea, cidrul și vinul de pere. Pe din afară *alcoolul curat și rachiuul concentrat* produc prin evaporare o răcire a pielii, trecătoare, urmată de o arsură vie; pe o rană, în ochi, în gură, produc o adevărată arsură. Rachiuul *ordinar* produce numai un fel de căldură. Pe *dinăuntru* alcoolul *concentrat* este o otravă puternică, ce aprinde stomacul și mâțele, tâmpete, paralizază și în cele din urmă omoară pe nenorocitul care îl bea; această otrăvire din fericire e rară și se tratează prin lapte luat în cantitate mare. Alcoolul *tăiat cu apă*, adică *rachiuul ordinar*, când se bea în cantitate mare și timp mai îndelungat, produce ceea ce se numește *alcoolism* (vezi acest cuvânt), un fel de otrăvire cronică cu alcool. Luat în *doze mici*, el întărește pofta de mâncare, *apetitul* și ușurează *mistuirea* cu condiție însă ca să nu se repete lucrul

acesta zilnic, ci numai din când în când, căci alminterea chiar și *dozele mici* de alcool, luate în toate zilele, în cele din urmă fac să piară pofta de mâncare și îngreuiază mistuirea. Intrucât privește *sistemul nervos*, dozele mici de alcool îl atâță și fac ca omul să fie mai harnic, mai vioi pentru moment, *bătăile inimii* și *pulsul* sunt mai cu putere și mai iuți, putând să producă îngrămădiri de sânge la cap și chiar emoragii în creeri; *respirația* este mai deasă. Acestea sunt efectele alcoolului: *bune* când se iau rar și în cantitate mică, *rele* când se face *abuz*. De aceea *omul sănătos*, oricare ar fi etatea și sexul, *nu trebuie să facă uz de băuturi alcoolice* decât foarte rar și în cantitate mică. Singura băutură îngăduită este vinul curat, așa cum a fost adus dela vie, nu cum este fabricat în pivnițe de cârciumarii lacomi de bani. Vinul conține și substanțe hrănitoare și luat în cantitate moderată — un pahar în timpul mesei — este răcoritor; să nu facem însă *abuz*. Nici berea nu este rea, mai ales vara, dar să n'o bea cei cu tensiunea sângelui ridicată. Copiii nu trebuie să bea nici odată. Intrucât privește *bolnavii* și *convalescenții* alcoolicele se întrebuițează în două feluri: la *exterior* (pe dinafară), alcoolul și rachiul simplu, sau camforat (vezi *Camfor*) se prescrie în fricțiuni (trăsături) și în primenirea rănilor. Fricțiunile sunt foarte folositoare la noii-născuți și la copiii debili, la convalescenți, la bătrânii slabi, la adulți când în urma unei emoțiuni, sdruncinări morale și fizice, sunt amenințați de sincopă (leșin), în toate cazurile unde este trebuință de a stimula pielea. Fricțiile se fac cu mâna, sau cu o cârpă înmuiată în spirt. — La *interior* sau pe dinăuntru, alcoolicele pot fi luate pentru a înlesni *mistuirea*, în cazurile de *debilitate* sau *slăbiciune generală*, în urma unei febre tifoidă, a unei pneumonii și alte boale cari slăbesc forțele bolnavului: răniții și operații cari au pierdut sânge mult.

Alcoolism. — Prin acest cuvânt se înțelege stricarea sănătății prin întrebuițarea obișnuită, fie chiar și în cantitate mică, a băuturilor alcoolice, sau spirtoase, cum sunt: țuica, rachiul, coniacul, romul, absintul și alte aperitive, sau a unei cantități mai mari de

băuturi alcoolice fermentate, cum sunt: vinul, berea, etc. Alcoolismul este foarte lătit și de un timp încoace se pare că a luat proporții mari, ceea ce trebuie să ne facă să ne gândim mai serios la urmările lui cele triste.

Bărbatul este mai expus de cât femeia la otrăvirea cu alcool; sunt unele profesii cari predispun mai mult la această patimă, cum sunt: cârciumarii, fabricanții de țuică și rachiu, podgorenii, bucătarii, etc.

După ce bem o cantitate oarecare de țuică, rom, sau din ori ce băutură mai tare, simțim o căldură în gură și în stomac. Pelița care câptușește gura, mucoasa bucală, produce o secreție mare a salivei. Ajuns în stomac alcoolul produce o iritație a mucoasei stomacale, care se și înroșește din cauză că vasele de sânge, care ajung până la câptușeala stomacului, se dilată din cauza alcoolului și conțin mai mult sânge. Din cauza alcoolului din stomac se produce și aci o cantitate mare de suc gastric, acel lichid care ajută la mistuirea alimentelor. Cantitatea mai mare de suc gastric ne face foame, însă o foame care trece îndată dacă am mâncat o bucată de pâine, sau de carne; nu este deci foamea naturală, pe care n'o putem astâmpăra decât cu cantități mai mari de alimente, cari ne pot hrăni. Iată deci un neajuns pe care ni-l face alcoolul, ne hrănim mai prost, mulțumindu-ne cu puțină mâncare. Obiceiul de a lua aperitive înainte de masă e rău, pentru că alcoolul ne produce foame, pe care ne-o astâmpărăm repede, cu o mică gustare și când vine timpul să mâncăm nu ne mai este foame. Deci ne ruinăm trupul pe de o parte, otrăvindul cu alcool, pe de alta nedându-i cantitatea de alimente care îi trebuie să-l hrănească. Alcoolul produce o grăbire a trecerii alimentelor prin stomac ceea ce este un rău. În mod obișnuit alimentele pe care le mâncăm trebuie să stea un timp mai lung în stomac și de aci trec în mațe. Dacă trec prea repede, cum se întâmplă la bețivi, nu este destul timp să se separe părțile bune de cele rele din alimente și astfel nu ne servesc la nimic. La bețivii vechi se observă adese ori acest lucru.

Alcoolul din stomac trece în intes-

ALCO

tine, dar într-o cantitate foarte mică, partea cea mai mare trecând direct în sânge.

Iată acum ce se întâmplă cu alcoolul care trece în sânge: Este absorbit de vasele care vin până la mucoasa stomacului și intestinelor, iar de aci este purtat de sânge prin toate organele corpului. Din cauza paraliziei pe care o produce alcoolul asupra nervilor, care merg la vasele de sânge, acestea se dilată, mai ales cele dela suprafața pielii și, venind o cantitate mare de sânge în ele, se umflă mult. Fața și nasul se înroșesc cele dintâi, din această cauză și la unii bețivi rămâne așa pentru toată viața. Sângele, venind în cantitate atât de mare, în vasele dela suprafața pielii, dă impresia de căldură, pe care o are orice bețiv. Nu este însă o căldură veritabilă a corpului, ci una de scurtă durată. Cei ce cred deci că alcoolul ne încălzește se înșală, căci după un scurt timp sângele fiind în cantitate așa de mare la suprafața pielii și venind în contact cu aerul, se răcește și cu el se răcește și corpul omului. Așa se explică moartea unor bețivi; din cauza căldurii înșeltoare ei se desbracă de hainele groase și pot îngheța mai ușor, mai ales dacă stau în zăpadă, sau ploae.

Pentru ca să împingă sângele către suprafața corpului inima este supusă unei munci mai grele; muncind într-una să pompeze sângele în vase, ea obosește și cu timpul se îmbolnăvește și devine neputincioasă pentru acest lucru. Pentru acest motiv la începutul beției sângele circulă în organism mult mai repede, iar mai târziu, când obosește inima, circulă încet de tot. Iată deci o urmare a alcoolismului și încă una din cele mai grave: îmbolnăvirea inimii.

Alcoolul ajuns odată în sânge produce și un alt rău mare, distruge globulele roșii, care sunt foarte trebuincioase organismului și astfel poate pricinui bețivului chiar moartea, din cauza acestei boli a sângelui.

Alcoolul este dus de sânge în plămâni, în rinichi, în splină, în ficat, creier și pretutindeni pe unde trece lasă urme rele. Plămânii au de suferit multe la alcoolici: mai întâi micile gropițe din ei, unde se primenește sângele cu

ALCO

substanțe curate, nu mai pot funcționa bine și astfel se încuibă, încetul cu încetul, microbul ofitei. Apoi plămânii trebuie să lucreze mai mult în timpul beției, ca să dea afară o parte din substanțele vătămătoare produse de alcool și care amenință organismul, de aceea ajunge un timp când sunt prea oboșiți. Bețivii au o respirație care miroase a alcool, căci îl dau afară prin plămâni. Unii medici au găsit că un procent și jumătate (1,50%) din alcool este dat afară prin aceste organe. Cu această împrejurare e bine să amintim că alcoolul se absoarbe în organism și prin plămâni, din aer. De aci vede ori cine cât de nenorociți sunt cărciumarii și familiile lor. Având în tot timpul fel de fel de băuturi pe mese, aerul din cărciumă este plin de vapori de alcool, cari intră în plămâni prin respirație. Iată deci că un foarte mare număr de persoane se alcoolizează fără voia și știrea lor.

Rărunchii au și mai mult de lucru. Ei servesc la strecurarea substanțelor otrăvitoare din organism și alcoolul trece și el prin rinichi cam 3%. Cu timpul ajung să nu-și mai poată împlini funcția lor și atunci începe o serie întreagă de necazuri pentru corpul omenească, pentru că otrăvurile ce trebuiau să fie alese de rinichi și date afară rămân în organism.

Ficatul se mărește din cauza alcoolului, devine dureros și deaceia bețivii au dureri mari în partea dreaptă a pântecelui. Bețivii suferă de multe ori și de gălbănare din aceste motive.

Alcoolul produce grăsime multă în jurul inimii, ficatului, rărunchilor și astfel le apasă și le oprește de a mai funcționa cum trebuie.

La începutul beției omul se simte tare, cu o putere musculară chiar mai mare de cât în stare normală. Aceasta se datorește nervilor, care sunt în mușchi și la care ajunge otrava. Ei, care conduc mișcările trupului, ordonă mușchilor să îndeplinească munci grele, dar de o scurtă durată. Puțin după acest timp de voinicie, de care dă dovadă bețivul, ajunge într-o slăbire prea mare, care îl ține vreme lungă.

Alcoolul ajunge foarte repede la creier și deaceia bețivii prezintă chiar dela început semne grave de otrăvire

a creerului. Cantitatea de alcool adusă de sânge la creer este destul de mare. Unii medici au dat alcool la câni și după ce au văzut că s'au îmbătat i-au omorât, le-au scos creerii, i-au spălat cu apă și i-au pus în aparate care să aleagă alcoolul. Au găsit unii, de pildă, la 400 gr. de creer 3 gr. de alcool curat care se aprindea când i-au dat foc. S'a căutat alcoolul în același chip la oameni care au murit beți și s'a găsit și la ei o cantitate destul de mare în creer. Acest alcool distruge încetul cu încetul creerul și omul devine nebun, ori moare. Abuzul de băuturi spirtoase la unii este trecător și turbură sănătatea numai pentru un timp scurt, în acest caz avem *alcoholismul acut*, sau *beția*; la alții starea de beție este obicinuită și atunci avem stricarea diferitelor organe, când se produce o boală durabilă: *alcoholismul cronic*. — *Alcoholismul acut*, sau *beția*. Un om beat se cunoaște de departe, cu fața lui aprinsă și cu ochii strălucitori (îi sticlesc în cap), cu o halenă tare și caracteristică, vorbind de toate și fără șir, cu limba păstoasă; el merge clatinând din cap și împletecindu-și picioarele; unii vesele peste măsură, alții triști sau supărați; unii blânzi și blajini cu toată lumea, alții mânioși, artăgoși și violenti, după cum le este firea.

Dacă însă cantitatea de alcool a fost mare din cale afară, atunci întârâtarea dela început este urmată de o moleșeală foarte mare, un fel de apoplexie cu greutate în respirație, răcirea corpului, somnolență, ochi sticloși, față palidă, și atunci putem să spunem: iată un om *beat-mort*, care poate să moară de-a binelea în câteva minute, sau în câteva ceasuri. În acest caz nenorocitul trebuie tratat ca un bolnav serios, cât se poate de repede să-l facem să verse, gâdilându-i fundul gurii cu o pană de gâscă, sau dându-i un medicament vomitiv și în același timp făcându-l să bea o cantitate mare de apă caldă. Dacă aceasta nu ajunge, dacă slăbiciunea merge crescând și dacă corpul se răcește din ce în ce mai mult, atunci trebuie să-i dăm cafea neagră tare, sau ceai (50 grame la 500 grame apă), sau o băutură (poțiune) cu amoniac (spirt de țipirig) 10 până la 15 picături în apă îndulcită cu zahăr. În

cazurile grave trebuie să prevenim congestiunea, sau îngrămădirea de sânge la cap, stropindu-i fața cu apă rece, punându-i ghiață la cap, lipitori după urechi, muștare la ceafă, pulpe și tălpi și făcându-i fricțiuni, trăsături uscate pe corp. *Alcoholismul cronic*. Otrăvirea înceată, care constituie alcoolismul cronic, se face mai degrabă la acei cari beau zilnic fără a se îmbăta, decât la acei ale căror crize de beție sunt separate de intervale lungi de cumpătare. Din acestea se poate vedea cât de periculos este alcoolismul cronic, care vine pe furiș și atacă rând pe rând toate organele, le arde ca să zicem așa, și nu se arată sub formă de boală de cât atunci când este învechit. Atunci se ivesc următoarele semne: dispepsia adică mistuirea grea, vărsăturile, arsurile la stomac, lipsa de poftă de mâncare, răgușeala bețivilor, palpitațiile sau bătăile de inimă, îngrășarea inimii, înroșirea și mărirea nasului (vezi *Cuperoză*), tremurătura mâinilor și a picioarelor, dureri de cap dese, furnicături, turburări în vedere (halucinațiuni) și vâjiituri de urechi, schimbarea caracterului, a firii, accese de melancolie și de *delirium tremens* (nebuție), în fine demența (tâmpeala), boalele de ficat și de rinichi, pe care le-am explicat cum se produc, sfârșind toate printr'o moarte chinuită. Afară de acestea, dacă bețivul se rănește, se vindecă mai greu decât alții; de capătă o congestie, îngrămădire de sânge la piept, sau o penumonie, nu poate rezista și moare repede. *Tratamentul*: Înainte de toate trebuie ca cel bolnav să se lase de urâtul obicei de a bea, nu însă dintr'odată, ci încetul cu încetul și nu de toate băuturile alcoolice de odată; va începe cu cele mai tari, adică țuca, rachiul, coniacul și numai după câtva timp va împuțina vinul, berea, până se va lăsa de tot, slujindu-se numai de apă, cea mai bună și singura băutură de care organismul nostru are trebuință. După ce bețivul se va lăsa de patima lui vom căuta să combatem semnele boalei; îi vom redeștepta puterile cu întâritoare (tonice); ca băuturi, afară de apă, îi vom da ceaiu, cafea, coca, kola; regim lactat, cât se poate de mult lapte sub toate formele, iar dacă este excitat: băi căl-

duțe prelungite de una sau două ore.

Alcool metilic. Cu câțiva ani mai înainte s'au întâmplat multe morți printre bețivii din țara noastră din cauza spiritului metilic cu care s'au otrăvit. Dacă și spiritul obișnuit (etilic) este otrăvitor, spiritul metilic este și mai de temut. Cel care a băut alcool metilic, fie din greșeală, fie pentru că este mai ieftin, sau, în sfârșit, pentru că negustorul lacom de bani i l-a vândut drept spirit curat, de vin, este apucat de dureri abdominale, uscăciunea gâtului, greață și vărsături, amețeli, delir, pupilele i se măresc și orbirea se arată repede, o slăbire mare intelectuală și musculară, căreia îi urmează moartea. De cele mai multe ori primul semn este slăbirea vederii, sau chiar pierderea ei completă, care se poate arăta la câteva ore după băutură. Dacă bolnavul nu moare, va avea totdeauna de suferit, rămânând mai totdeauna cu o boală de inimă, sau orb.

Alenă, halenă, (lat *halitus*), *duh, duhoare, suflare.* — Se numește astfel aerul care iese din plămâni în timpul expirațiunii, când suflăm. Acest aer se deosebește de cel pe care îl inspirăm (il tragem în piept), de aerul atmosferic, prin compozițiunea și temperatura lui. Alena este mai întotdeauna mai caldă decât aerul din afară, având o temperatură cam între 30 și 35 grade. Din această pricină în timpul iernii aerul ese din gură, sau pe nas, sub formă de aburi; frigul condensează aerul sub formă de vaporii. Când cineva are fierbințeală mare alena este și mai caldă, dar în unele boale ea se poate răci, după cum se întâmplă în holeră și în agonie. Pentru a ne încredința de căldura alenei n'avem decât să apropiem mâna de gura bolnavului. Alena se deosebește de aerul din afară prin faptul că o parte din oxigen este înlocuită cu tot atâta acid carbonic. În stare de sănătate alena n'are nici un miros, cum se vede la copii; dar la mulți oameni ea are dimineța un fel de miros neplăcut de acreală, care vine din putreziciunea fărâmiturilor de mâncare rămase printre dinți și măsele. Pentru a scăpa de acest miros este bine ca omul să-și clătească gura după mâncarea de seara, sau înainte de culcare,

cu apă, și să-și spele cu peria dinții, îndepărtând dintre ei toate resturile de alimente (v. *dinți*). Când cineva face abuz de băuturi spirtoase, de tutun, sau când a mâncat ceapă ori usturoiu, alena capătă un miros deosebit pentru fiecare și acest miros este greu de ascuns prin întrebuițarea izmei, sau a altor medicamente (catechu, etc.). În diferite turburări ale sănătății alena ia un miros tare, sau fad, acru, sau puturos, după cum se întâmplă în boalele de gură: dinți sau măsele stricate, inflamațiunea sau abcesul amigdalelor (gâlci coapte), abcesul gingiilor (abubă), angine etc.; — în boalele de plămâni: gangrenă sau oftică; — în boalele de stomac: dispepsie, gastrită, așa că de multe ori numai după alenă putem bănui cutare sau cutare boală. În toate, aceste cazuri pentru ca alena să nu aibă miros trebuie să tratăm boala de care a suferit omul. Când este vorba de gură vom combate alena rea curățind și plumbuind toți dinții stricați și prin ajutorul gargarelor acidulate, sau a gargarelor cu acid fenic, cu clorat de potasă cu tinctură de benzoe (smîrnă), sau întrebuițând una din soluțiunile următoare: ceaiu de frunze de jale (*salvia officinalis*), 200 grame; glicerină 25 gr.; tinctură de leventică (*lavandula vera*), 10 gr.; clorur de sodiu 30 gr.; — sau: ceaiu slab de frunze de nuc, 100 gr.; clorat de potasă, 2 grame, sau o gargară cu *hiperol*.

Alergare. — v. *Fugă*.

Alergie. — Modul special de a reacționa un organism viu *infestat* deja, față de o *reinoculare* cu *același virus*.

Alexină. — Substanță fabricată de organismul animal datorită unei anumite influențe a microbilor, sau diferitelor vaccinuri și care are puterea să mărească rezistența organismului. — Alexina e considerată și ca o preparație fosfatată specializată.

Algiditate (dela *algidus*, rece înghețat). Răcire corpului însemnată printr-o scădere a temperaturii, care dela normală (37°) poate să se coboare la 30° și chiar mai jos, atunci când temperatura interioară luată în anus (șezut) este din contră cu mult mai mare decât normala, putând ajunge până la 40°. Se observă în unele stări de boală, fie ca semn ordinar cum e în *sclerema*

noilor născuți, fie într-o perioadă oarecare a unei boale grave, cum e holera și febrele pernicioase (*perioada algidă*). Algiditatea, uneori de ghiață, se observă și când se apropie agonia. — *Tratament*: afară de cazul când avem aface cu răceala morții, vom combate algiditatea cu învelitori de lână pe sub cari se freacă bolnavul cu mâna uscată și cu diferite spirturi; se vor da băuturi stimulente (ceaiu, melisă); băi cu muștar.

Alibour (Apa lui . . .). — Este un anti-septic; se întrebuințează în multe boli de piele.

Algomanie (dela cuvântul grec. *algos*, durere). Căutarea unei plăceri, unei voluptăți în durere. E o stare bolnavicioasă a indivizilor bolnavi sufletește.

Alienație mintală (*mentis alienatio*), *nebunie*. — Când cineva își pierde mintea zicem că suferă de *nebunie*, sau de *alienație mintală*, care este o turburare a facultăților intelectuale, venită în lipsă de orice boală anterioară, sau actuală. Dacă un bolnav de febră tifoidă are, în cursul boalei, minute de aiurare, nu putem să zicem că e nebun. Prin *nebunie*, sau *alienație mintală* se înțelege un grup de boale ale creierilor (cerebrale), cari de obicei sunt cronice, caracterizate prin dezordine *inconștiente* ale sensibilității, ale inteligenței și ale voinței, fără febră (căldură) și adeseori fără o turburare aparentă a funcțiunilor nutritive. Așa dar numirea de *alienație mintală* se aplică la orice pierdere de minte (de inteligență), fie temporară, sau definitivă, cum sunt: *demența*, *idiotia*, *imbecilitatea*, *mania* propriu zisă și *melancolia* (vezi aceste cuvinte), cari sunt tot atâtea forme de turburare mintală, în cari rățacirea ideilor se arată în moduri diferite. Însă aceste forme deosebite au un caracter comun, care constituie semnul esențial al *nebuniei*, care este turburarea inteligenței (a minții), a simțului moral și a așa ziselor afecțiuni ale sufletului, pasiuni (patimi), gelozie (pizmă), ură, amor, etc. La unii aceste facultăți sunt exaltate, aprinse, cum este în *manie*; la alții ele sunt deprimare, tâmpite, cum este în *melancolie*; astfel că nu trebuie să așteptăm, pentru a declara pe cutare de nebun, ca vorbele și gesturile lui

să fie dezordonate, lucru care poate să nu se ivească nici odată; este de ajuns numai ca ideile lui să fie incoherente, adică fără legătură între ele și nepotrivite cu realitatea, lucru care se poate vedea chiar și când acea persoană este cu totul liniștită, calmă. De obicei se crede că *nebunia* vine dintr'odată, pe neașteptate, ceea ce se întâmplă foarte rar; de cele mai multe ori însă, dacă am cerceta viața de mai înainte a nebunului, am găsi unele semne precursorii ale *nebuniei*, cum sunt: diferite ciudățenii ale caracterului, perioadă de tristeță, de descurajare, de mutism, fără nici un motiv, sau vom găsi din contră perioade de excitațiune, aprindere, iritațiune, de extravagante, cari alternează câte odată cu depresiunea intelectuală; lucru foarte important de știut, căci prin îngrijiri bune *date la timp* s'ar putea împiedeca ivirea *nebuniei*. Nu este lucru ușor a cunoaște *nebunia*. Trebuie să fim cu mare băgare de seamă în examinarea unui om bolnav, sau pretins de a fi atins de *nebunie*, atât pentru a judeca o faptă comisă, cât și pentru a *sechestra* pe cineva, internându-l într'un ospiciu de alienați. *Cauzele* *nebuniei* sunt multe și variate. Un fapt este constat că *alienația mintală* s'a înmulțit de câteva zecimi de ani, prin împrejurarea că viața a devenit mai intensă, prin iritarea și încordarea mai mare a minții, prin creșterea luptei pentru existență, prin înmulțirea plăcerilor și abuzurilor de tot soiul. *Nebunia* se observă de obicei între 30—45 ani, mai des la oamenii neînșurați și văduvi; ea se transmite prin ereditate (moștenire), când părinții au fost *nebuni*, sau când au suferit vreunul din ei de *epilepsie*, *isterie* sau alte boale nervoase, *sifilis*, *abuzul de băuturi alcoolice* (alcoolism); ea se ivește mai des în pubertate și la femei în vârstă critică (când sunt iertate). Copiii, concepuți în beție, sunt predispuși la *nebunie*, așa că din toate cazurile de *alienație mintală*, dintr'un ospiciu, 1 la 3 sunt din beție. — *Tratamentul* *alienației mintale* are mare importanță, mai ales la începutul ei, când de multe ori se poate vindeca. Deși nu avem un tratament specific pentru a vindeca *nebunia*, totuși putem să pu-

nem bolnavii în condițiuni speciale, luând tot felul de precauțiuni cu privire la starea lor. Astăzi foarte puțin și foarte rar se întrebuințează mijloacele coercitive, cămașa de forță, dușuri, băile reci prelungite, iar opiul, bromurele, clorofomul și alte calmante nu se folosesc decât în cazurile de mare agitație. Ceea ce trebuie unui bolnav în mod general este liniștea sufletească, odihna corpului, lipsa de ori ce întârțare exterioară, o hrană îndestulătoare, câte odată medicamente tonice și idroterapie; bolnavul trebuie observat de aproape zilnic și tratat după semnele boalei, iar dacă a început să fie mai bine, să se amelioreze, trebuie să-i dăm o ocupație prin lucru de mână apropiat stării lui, prin diferite petreceri (distracțiuni) și jocuri; toate acestea se pot face numai în *ospicii speciale*, unde avem toate mijloacele pentru a împușina primejdiiile nebuliei, asigurând în același timp și binele bolnavului. De aceea este bine ca, îndată ce cineva are nenorocirea de a fi atins de această boală crudă, să fie izolat de familie și internat într'un ospiciu, lucru la care nu trebuie să se opună familia, căci numai prin acest mijloc se poate reda bolnavului în mod mai grabnic sănătatea. Intru cât privește tratamentul individual nu vom insista mult, deoarece el privește numai pe doctor, singurul în stare de a trata pe fiecare bolnav după felul boalei lui. *Copiilor predispuși la nebulie* li se recomandă o *educație solidă*, învățătura să înceapă mai târziu decât la alții, să trăiască mai mult la țară, să facă exerciții fizice de tot felul, cumpătare în toate și *lipsă totală de băuturi alcoolice*; să se ocolească emoțiunile, bucuriile și supărările, să se supravegheze vârsta pubertății, sarcina la femei și etatea critică, iar căsătoriile persoanelor predispușe la această boală să fie cu totul oprite.

Alifie. — v. *Unguent*.

Alimente, alimentație (*alimentum, alimentatio, dela alere, a nutri*); *hrană hrănire; nutriment, nutrire*. — Se numește *aliment* orice substanță, solidă sau lichidă, care servește la repararea pierderilor pe cari le încearcă organismul nostru prin funcționarea lui. Substanțele lichide de obicei poartă nu-

mele de *băuturi* (vezi acest cuvânt), iar numele de *aliment* propriu zis s'a rezervat numai pentru substanțele solide. Prin *alimentație* se înțelege adaptarea alimentelor la trebuințele omului în stare de sănătate, sau de boală. — Să arătăm mai întâi *originea și natura alimentelor*. În general o alimentație bună trebuie să cuprindă în ea următoarele substanțe alimentare: proteine (sau albumine), hidrocarbonate, săruri, grăsimi, vitamine și apă (cam 2—3 litri în 24 de ore). O alimentație căreia îi lipsește unul sau mai multe din aceste elemente este necompletă, incompatibilă cu o bună sănătate. Omul își ia hrana din cele trei regnuri, sau împărțții ale naturii, căci corpul lui este compus din elemente pe cari nu le găsește decât în toate trei. Alimentele cele mai principale pentru întreținerea vieții și cele mai multe le ia omul din *regnul animal și vegetal*. Unele din aceste elemente conțin azot, a cărui mare importanță vom vedea-o mai la vale, sunt numite (*alimente azotate, sau albuminoase*, din cauză că conțin și *albumină*) partea temeinică a sângelui și a oului. Aceste alimente se găsesc mai cu seamă în regnul animal: în *carne, sânge, ouă, lapte, brânză*. Alte alimente conțin zahăr în natură, sau niște substanțe cari se transformă în tubul digestiv în zahăr, cum este: *amidonul, făina, fecula*, (alimente zaharate sau *feculente*) și cari se află mai cu seamă în regnul vegetal: în *grâu, porumb, orez, orz, fasole, mazăre, cartofi*; zahărul există în sucul, tulpina și fructele unui număr mare de plante (*sfecla, trestia de zahăr, struguri*, etc.). Mai sunt *alimente grase*, cari conțin grăsimi și uleiuri, date de ambele regnuri (*grăsimi de carne de vacă, de porc, untul, uleiul de măsline*, etc.). Din *regnul mineral*, omul ia *fierul*, care face parte din sângele lui, *sărurile de calce* (fosfat și carbonat) cari întăresc oasele, *sulful și fosforul*, cari se află în nervi și creeri, și mai pe sus de toate *sarea*. Celelalte principii luate din acest regn se dau mai mult ca *medicamente*.

Apă din alimentație o luăm sub diferite forme, fie din alimente (supă, ciorbe, sosuri), fie că o bem la mese, sau între mese. Avem nevoie cam de 2—3 litri de apă pentru 24 de ore. La

masă este de ajuns dacă bem un pahar, | mentație completă de *vitamine*. Sunt
e bine ca restul până la cantitatea ne- | substanțe alimentare fără de care




Fig. 13. — Morcovul este bogat în substanțe hrănitoare. Exemplul de
acțiune vindecătoare a sucurilor din plantă

- | | |
|--|-------------------------------------|
| A. Acțiune binefăcătoare asupra creierului | E. Sucul ajunge în intestin |
| B. Sucurile întăresc mușchii inimii | F. " " " stomac |
| C. Oleurile eterice ridică puterea de rezistență a plămânilor | G. Vitamine ce merg direct în sânge |
| D. În ficat sucul galben se prefăce în vitamină A, antirachită | H. Săruri nutritive și fier |

cesară să se bea între mese. Am spus
mai sus că mai avem nevoie într-o ali-

nu putem trăi; lipsa lor din alimen-
tație dă naștere la multe boale. Le

luăm cu deosebire din fructe și zarzavaturile crude pe cari le mâncăm, din unt, smântână, untura de pește, etc. Alimentele fierte, sau fripte prea mult pierd vitaminele, deși, în stare crudă le conțin mai toate. Pentru acest motiv e bine ca la fiecare masă să nu ne lipsească, dacă se poate, salatele de lăptuci, măcriș, ceapă verde, usturoi, fructe crude. Din acestea se poate vedea cât de variate și de deosebite sunt alimentele, dar dacă le analizăm vedem că ele sunt compuse din aceleași substanțe sau principii, a căror *cantitate* însă diferă dela un aliment la altul. Aceste substanțe sau principii sunt de 2 feluri: *ternare* cari conțin carbon, idrogen și oxigen; *cvaternare* cu 4 elemente: carbon, idrogen, oxigen și azot. De altfel *principiile alimentare*, atât cele *ternare* cât și cele *cvaternare*, se găsesc în ambele regnuri: *vegetal* și *animal*. Principiile *ternare* sunt: substanțele *idrocarbonate* (amidonul, zahărul) și substanțele *grase* (uleiurile de măsline, nuci, rapiță etc. și grăsimile de animale). Principiile *cvaternare* sunt din regnul *animal*: *albumina* (albușul de ou, icre), *musculina* (carne), *fibrina* și *globulina* (sânge), *caseina* (lapte, urdă), *oseina* (oase), *gelatina* (sgăr-ciuri); din regnul *vegetal*: *glutina* (cereale), *legumina* (legume). — Intru cât privește *rolul și puterea nutritivă a alimentelor*, afară de substanțele minerale, cari au rol accesoriu, ele se împart în 2 clase: unele cari formează țesuturile noastre și produc forța, *alimentele azotate* sau *albuminoide* (carnea, ouăle, etc.); altele cari întrețin respirația, fabrică grăsimea, produc căldura animală și nu conțin azot (adică sunt *ternare*), dar ne dau carbon, care se arde în interiorul corpului ca și cărbunele dintr-o mașină cu aburi și cari sunt *alimentele zaharate* și *alimentele grase*. Alimentele din clasa întâi, cari sunt *cvaternare*, se mai numesc după rolul lor fiziologic și alimente *reparatorie*, sau *plastice*: ele sunt date mai cu seamă de regnul *animal*. Alimentele din clasa a doua, cari sunt *ternare*, după rolul fiziologic, se mai numesc și alimente *respiratoare* sau *pulmonare*, ele produc grăsime și căldură și sunt date mai cu seamă de regnul *vegetal*. Prin urmare în alegerea alimentelor ne vom

călăuzi după aceste considerațiuni. Alimentele *azotate* (cvaternare) pot înlocui întru câtva pe cele *ternare*, dar nici odată principiile *ternare* *nu pot înlocui* pe cele *cvaternare*, căci ele *n-au azot de loc*. Câinii, cari au fost hrăniți cu alimente *ternare*, au murit după 35 zile, deși din asemenea alimente li s'a dat cât au voit; au murit fiindcă n'au avut *azotul* necesar reparațiunii țesuturilor organismului lor. Câinii hrăniți cu substanțe *cvaternare* au trăit, căci pe lângă azot au avut și carbon, dar a trebuit să li se dea o cantitate foarte mare (fiind sărace în carbon) pentru ca să ia cantitatea de carbon care le trebuia pentru traiu. Așa dar alimentația noastră zilnică trebuie să se compună din alimente atât *ternare* (regnul vegetal) cât și *cvaternare* (regnul animal), cele dintâi ca să ne dea *carbonul* (elementul lor esențial), care va repara țesăturile uzate prin viațuire și va face posibilă creșterea, prin formarea de țesături noi. *Omul are trebuință de o alimentațiune mixtă și variată*, luată din amândouă regnurile, animal și vegetal, căci el este *omnivor* (mâncător de toate), după cum o probează organizațiunea corpului său întreg și în particular dinții și organele digestive, cari reunesc caracterele proprii *carnivoarelor* și *erbivoarelor*. *Laptele*, un aliment *complex* nu poate servi singur de hrană decât numai până la o limită oarecare; copilul se hrănește cu el numai în primul an al vieții; adultul poate să trăiască numai *câtva timp* cu 3—4 litri de lapte pe zi. Mâncările trebuie să fie *variate* pentru ca să fie bine suportate de tubul digestiv, să ia toate formele pe cari le poate da bucătăria. În stare de *sănătate* alegerea alimentelor atârnă de gust și de obicei și de multe împrejurări, cari regulează în acelaș timp *cantitatea* alimentelor necesare. Hrănirea neîndestulătoare aduce mari primejdii. Hrănirea *excesivă*, prea multă, tot astfel, căci ea dă naștere la *indigestie*, la *dispepsie* (mistuire grea), la *durere de stomac*, la *gută*, la *gravelă*, la *obezitate*; ea îngreunează corpul și mintea, turbură somnul, întinde peste măsură și obosește stomacul, împiedică respirațiunea și bătăile inimii, etc. Prin urmare trebuie să căutăm oarecare re-

gule cari trebuie păzite la mâncare. S'a zis că *apetitul* (pofta de mâncare) este o călăuză bună, dar nu este adevărat, căci de multe ori dacă ne-am lua după el ne-am îmbolnăvi de stomac, mâncând prea mult; alteori, neavând apetit n'am mânca de loc, ceea ce iar nu este bine; trebuie să mâncăm uneori și fără foame. Ceea ce joacă un rol principal

mâncare, iar puținele alimente introduse în stomac se digeră foarte greu. În general o bună poftă de mâncare vine când variem alimentele. Ori cât de bună ar fi o mâncare, dacă o mâncăm mereu, ajunge o vreme când nu ne mai place. Pentru a doza alimentele necesare este o socoteală matematică. Este vorba de a înlocui pierderile zil-



Fig. 14. — Digerarea alimentelor

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| A. Spanac cu pâine veche | D. Friptură de pasere | G. Antricoate de porc |
| B. Ouă foarte moi | E. Friptură de miel | H. Cârnați de mezeluri |
| C. Cafea cu lapte cu chifle | F. Pulpă de porc | I. Sardele |

în digerarea alimentelor este buna dispoziție. Buna dispoziție în timpul mesei, o muzică plăcută, surpriza unei liste de bucate bine aranjată, toate ne dau o poftă bună de mâncare și o bună digestie. De aceea oameni adunați la petrecere mănâncă mult și digeră bine, chiar și cei cu stomacuri slabe, sau bolnave. Din contră, omul trist, sau care primește o veste neplăcută în timpul mesei, nu mai are poftă de

nice printr'o restituție echivalentă, adică să luăm atât cât pierdem. Un adult de greutate mijlocie, cântărind de exemplu 74 kgr. pierde în fiecare zi 20 grame azot și 300 grame carbon, prin urmare el trebuie să ia din alimentele pe cari le mănâncă tot atâta azot și carbon. Ori, această cantitate este reprezentată în azot cam prin 300 gr. carne, redusă prin preparare la 200 gr.; carnea va fi însă împuștinată dacă vom

ALIM

mai lua ouă, pește, lapte, cari cuprind de asemenea azot; în carbon prin 80 până la 100 grame de mâncări grase și 250 până la 300 grame de alimente feculente și zaharate. În estimarea acestei cantități de alimente, strict necesară la conservarea forțelor, și care se numește *porția normală* sau de *întreținere*, trebuie să amintim că *pâinea* și *legumele uscate* (fasole, linte, mazăre) cuprind o materie azotată care face ca ele, fiind luate în cantitate mare, să poată înlocui carnea, peștele, ouăle și laptele până la un punct oarecare. *Porția de întreținere* variază după o mulțime de împrejurări, dintre cari vom pomeni pe cele mai de căpetenie. După *etate*. Dela naștere și până la dezvoltarea completă a omului, alimentele servesc, în afară de producerea de căldură și de muncă, la repararea țesăturilor și la un adaus de țesături nouă, la *creșterea corpului*, prin urmare el are trebuință de o cantitate mai mare de substanțe *plastice* și *reparatorie*. Hrana variază și în celelalte vârste. După *sex*, femeia adultă are trebuință de un regim mai puțin substanțial decât bărbatul, fiindcă ea are și cheltuește mai puțină forță fizică și se poate mulțumi cu o cantitate mai mică de carne și de alte alimente azotate; fiind un temperament mai nervos ea trebuie să se abțină de la alimente excitante și iuți; fata tânără, femeia care alăptează și aceea care atinge etatea critică au trebuință de o hrană specială. După *constituție* și *temperament*. Un temperament, limfatic cere un nutriment reparator, animal, a cărui cantitate nu este mărginită de cât de puterea tubului digestiv, căci nu nutrește ceea ce mănânci ci ceea ce se mistue. Un temperament sanguin trebuie să fie cumpătat în alimente plastice, cari, cum este și carnea, măresc bogăția sângelui. Cel ce este aplicat spre *obezitate* (îngrășare prea mare) va mânca mai puțin, se va feri de mâncări grase, zaharate sau feculente, de cari însă se va servi mult acel ce este slab, sau care slăbește mereu. După *obiceiuri* și *profesiuni*. Muncitorul, pentru a avea putere de muncă și căldură, are trebuință de hrană bună și în raport cu munca de executat; lui îl trebuie pe lângă porția de întreținere, un supli-

ALIM

ment de hrană, care să cuprindă atât substanțe ternare cât și cvaternare, căci el pe lângă puterea care o cheltuește își uzează mai mult organismul, mușchii și are trebuință deci de un supliment de principii *reparatorie*; acest supliment se chiamă *porția de muncă*; ea este de 170 grame de carbon și 8 grame de azot pe zi, ceea ce adăugându-se la porția de *întreținere*: 280 gr. carbon și 20 gr. azot face în total: 450 gr. carbon și 28 gr. azot, pe zi, pentru un muncitor cu o greutate de 60 până la 65 chilograme. Această porție de *muncă* trebuie modificată pentru cei ce lucrează cu creerii, lucrul cerebral se face consumând mai cu seamă substanțe azotate; cel ce lucrează cu mintea și prin urmare face mișcare puțină, va trebui să mănânce alimente foarte reconstituante, sub un volum mic, pentru ca să le poată mistui mai cu înlesnire. După *climate* și *anotimpuri*. Locuitorii țărilor reci au o putere digestivă, poftă de mâncare, o trebuință naturală de a întreține căldura corpului, care îi silește să mănânce o cantitate mai mare de alimente, carne și grăsimi, decât cei de la miază-zi. Vara este bine ca să mănâncăm mai multe alimente vegetale (v. *Cereale, legume*). — Alimentația este de două feluri: *naturală* și *artificială*. În stare normală omul se nutrește prin gură, ceea ce se chiamă hrănire *naturală*. Când însă are un cancer la gură, o fractură a fălcilor, o paralizie a cerului gurii, o strâmtoare a esofagului, etc., care îl împiedică să înghită alimente, atunci trebuie introdusă hrana deadreptul în stomac, pentru ca bolnavul să nu moară de inaniție, de foame; aceasta se chiamă alimentație *artificială*. Ea constă în a introduce prin gură sau chiar prin nas o sondă găurită, numită *esofagiană*, prin care se toarnă în stomac substanțe alimentare, lapte, zeamă de carne, în care se pune carne crudă tocată, ouă, sau pulberi alimentare amestecate tot cu lapte sau supă. În împrejurările acestea alimentația artificială este *voluntară*, făcută cu voia bolnavului. În alte cazuri ea este *forțată*, silită, făcută fără voia suferindului, după cum se face la unii nebuni cu idei fixe, cari refuză orice hrană. Alt mod de alimentație

artificială este când introducem hrana prin *șezut*, sau prin *piele* (v. *Clisme nutritive și băi*). — *Digestibilitatea alimentelor*. Odată alimentele ajunse în stomac, el le modifică, le face proprii sau apte de ași îndeplini rolul lor reparator, ceea ce se chiamă mistuire sau *digestiune*; aceasta însă nu se face întotdeauna așa de repede (vezi *dispepsie*), nici pentru tot felul de alimente, căci unele din ele sunt grele, se mistue greu și încet, așa că stau în stomac mai mult timp și cu atât mai mult cu cât sunt mai greu de mistuit; aceste alimente se chiamă *indigeste*. După gradul de *digestibilitate* alimentele se împart în 3 clase: În prima clasă intră *substanțele indigeste*, cari după ce au stat mai mult timp în stomac n'au suferit nici o schimbare însemnată, cum d. ex. tendoanele, oasele, ciupercile și bureții, migdalele, măslinile, etc. În a doua clasă intră alimentele a căror mistuire nu este completă decât după 4 până la 6 ore: carnea de porc, cârnații, mezelurile, varza, ceapa, pâinea caldă, prăjiturile, etc. În a treia clasă avem alimentele cari se mistue *înte și ușor*, într'o oră și jumătate: carnea de vițel, de miel, de vacă, de pasăre, laptele, ouăle fierte moi, spanacul, fructele coapte, pâinea veche, napii, cartofii. Se înțelege dela sine că această clasificare a *digestibilității* alimentelor nu este absolut exactă. Fiecare stomac are puterea lui proprie de mistuire, la care se mai amestecă și gusturile, obiceiurile, considerațiile de etate, de muncă și altele. Se știe că oul fiert moale este mai digestibil decât oul vârtos, însă nu arare ori se întâmplă să găsim stomacuri așa de capricioase încât să digere cu ușurință, astăzi, o mâncare foarte greu de mistuit mâne. Ținând seamă de cele scrise până aci putem trage următoarea concluzie practică: *fiecare trebuie să învețe din experiență a cunoaște mâncările cari se potrivește, sau nu, cu tubul său digestiv*.

Alior. — v. *Lăptele cănelui*.

Alipină. — Pulbere cristalină, solubilă în apă. Analgezic local, succedaneu al stovainei, însă mai toxic. Se întrebuințează pe *din afară* în soluțiune de 10 la 100, sau în injecțiuni sub piele 1 c.c. dintr'o soluție de 2 la 100 (des-

chideri de flegmoane, panariții, extracții de dinți).

Aliu. — V. *Usturoiu*.

Aloe. — V. *Sabur*.

Alopatie (dela gr. *allos*, alt, altă, și *pathos*, suferință). — Acest nume a fost dat de Hahnemann (vezi *Omeopatie*) la o metodă de tratament care constă în a trata o boală cu leacuri cari produc alte efecte decât efectele produse de însăși boala (contraria contrariis curantur).

Alopecie (dela gr. *alopex*, vulpe, căreia îi cade părul în mod temporar, din cauza unei boale). — Căderea *temporară* (vremelnică) a părului. Alopecia se produce în urma unei boale febrile, cum e febra tifoidă, sau tifosul exantematic, de preferință la femei. Ea este unul din semnele boalelor numite *peladă și tricoșiție*, sau *chelie* (vezi aceste cuvinte) și dispare în urma unui tratament serios. Alopecia se mai vede și în *sifilis* (vezi acest cuvânt), mai ales în perioada accidentelor secundare; în urma unui tratament specific dispare. Intru cât privește tratamentul vom vorbi mai pe larg la cuvântul *păr*.

Alterant (dela *alterare*, a schimba). — Se numesc alterante substanțele cari, ingerate, *modifică nutrițiunea* prin intermediul sângelui, în loc s'o activeze, s'o *reconstitue*, cum sunt: alcalinele, mercurul, iodul, arsenicul, aurul, etc. Medicamentele alterante pot face ca omul să slăbească, sau să se îngrașe, să se topească o bolfă (tumoră), să se vindece o rană (ulcer), etc. Proprietatea alterantă nu se poate defini bine, precis. Efectele medicamentelor alterante sunt vădite, dar modul lor de lucrare nu este bine cunoscut.

Altitudine (dela *altitudo*, înălțime). — *Cura de altitudine* înseamnă șederea la munte. Stațiunile de altitudine se împart în trei grupuri: *stațiuni joase*, intermediare, între munte și plaiu, sub 1200 metri, cum sunt la noi *Sinaia, Bușteni, Predeal*, etc.; *stațiuni de altitudine mijlocie* de 1200—1800 metri deasupra nivelului Mării cum e *Păltiniș*; *stațiuni cu altitudine mare*, 1800 până la 2000 metri. — Ele se mai deosebesc în stațiuni de *vară* și de *iarnă*. Aceste din urmă pot fi cercetate și vara. — Aerul de munte conține mai mult ozon și este foarte curat, căci

ALTI

cuprinde puțin praf vara și de loc iarna. În timpul verii nu bate vântul, aerul este liniștit. Aerul nu conține microbi și este uscat din pricina evaporării apei, sub influența micșorării presiunii atmosferice. Aerul de munte are o influență binefăcătoare asupra sângelui, ale cărui *globule roșii* se înmulțesc, ajungând în câteva zile dela 5 mil. pe mmc. la 6 mil. și jumătate. Reîntoarcerea dela munte aduce o rezorbție înceată a globulelor în *exces*, dar această rezorbție se oprește la normală, adică la o cifră superioară aceleia care exista în sângele bolnavilor. Rezultatul este o activitate mare a nutrițiunii generale. La înălțimi mari, de 1800 până la 2000 metri, avem în primele zece zile (perioada de acclimatizare) o creștere a numărului respirațiilor și a bătăilor inimii, însoțită la oamenii nervoși de palpații, opresiune (apăsare pe piept), insomnie, câte odată de durere de cap și amețeli. Pielea, mai cu seamă la față, se înroșește și produce mâncărime, mai ales când e expusă la soare și la vânt. Apetitul se mărește. După zece zile toate turburările acestea dispar, apetitul însă rămâne mare, puterea crește, corpul se simte mai ușor, suportă ușor oste-neala. Pentru a suprima perioada de acclimatizare este bine ca mai întâi să stăm câteva zile în stațiunile joase, apoi în cele mijlocii și numai după aceea să ne stabilim în stațiunile înalte. Ca *precauțiuni* vom schimba des lingeria, pentru ca să înlesnim funcționarea pielii, vom purta haine de lână vom avea cu noi și haine de iarnă, mai ales că serile și nopțile sunt răcoroase. Cura de altitudine se recomandă pentru *anemie*, *cloroză*, *convalescența* boalelor grele, *neurastenii*, *ipocondrie*, *melancolie* (în aceste trei boale scurtă ședere), *bronchită cronică*, *oftică* la începutul ei. Nu este bună această cură pentru cei cari sufăr de inimă, cari au năduf, la ateromatoși, bătrâni și pentru persoanele cărora le place sgomotul. Stațiunile mai importante dela noi: Nămăești, Păltiniș lângă Sibiu, Brașov, Câmpu-Lung (600 m.), Novaci, în Gorj (680), Tismana (750), Durău Ceahlăului, (800), Bușteni, Poiana Țapului, Sinaia (850), Predeal, la 1050 metri

ALUM

deasupra nivelului Mării Negre, Bran, Brașov, etc.

Altoire. — V. *Inoculațiune*.

Altoiu, altoire. — V. *Vaccin* și *Vaccinațiune*.

Alucinațiune, halucinațiune, halucinații, (lat. *hallucinatio*), *închipuire, nălucire, vedenie.* — Când cineva vede, gustă, sau simte un lucru care nu există, sau când aude sgomote cari nu sunt în realitate, zicem că are alucinațiune. Alucinațiunile sunt produse de diferite turburări ale sistemului nervos, ele pot exista și atunci când a pierit auzul, mirosul și vederea, fără ca omul să fie atins de nebunie, mai ales în momentul trecerii dela veghere la somn și în minutul deșteptării. Alucinațiunile cari provin din partea auzului și cari se văd mai des în melancolie și în mania de persecuție sunt cele mai rele și bolnavii aceștia sunt cei mai periculoși. Sunetele, cari la început n'au nici o valoare, iau cu timpul forma unei voci atribuite unei persoane închipuite (D-zeu, drac, fantomă) unui animal, unui necunoscut, sau cele mai adeseori unei persoane cunoscute. Cuvintele sunt cele mai adeseori niște înjurături, acuzațiuni sau repetarea propriilor gândiri ale bolnavilor, cari își închipuiesc procedeele cele mai ciudate pentru a explica emisiunea sunetelor (electricitate, telefon, tunuri, puști, etc.). Acești bolnavi sunt absorbiți de gândirile lor și pare că privesc la ceva fără să vadă. Alucinațiunile vederii constau uneori în vederea unor persoane sau obiecte înspăimântătoare (nebunii provenite dintr'o otrăvire, sau dintr'o boală nervoasă). Mai rare sunt alucinațiunile mirosului și ale gustului; ele coincid de obicei cu oarecare turburări ale digestiunii și sunt de cele mai multe ori foarte neplăcute.

Alumen, alun (sulfat de alumină și de potasiu), *piatră acră.* — Se prepară din diferite minerale, precum este sistu de alumen, alunita, etc., cu deosebire în Toscana (Italia). Piatra acră din comerț se prezintă parte în mase cristaline, parte în cristale octoedrice, sau cubice, fără cu-

loare, cu un gust dulceag și în urmă astringent; se topește puțin în apă rece, mai mult în apă fierbinte. Se întrebuințează pe *din afară* ca *astringent* (vezi acest cuvânt), pentru a opri o *curgere de sânge* (emoragie) superficială și mică, cum este cea produsă de lipitori, de scoaterea unui dinte, sau unei măsele, la trânji, curgere de sânge din nas; în aceste cazuri este bună *apa emostatică* a lui Pagliari: se fierb 6 ore 2 grame de piatră acră și 1 gram de smirnă (Benzoe) în 20 grame de apă. Se mai face gargară în durerile de gingii, de gură și de gât: 5 grame la 250 grame apă fierbinte, la care se mai poate adăuga și miere de trandafir (mierică) 50 grame. Femeile o folosesc mult în spălături vaginale contra leucoreei (poală albă) 19—50 gr. la un litru de apă. Pe *dinăuntru* se dă în doză de 30—40 ctgr., repetată de mai multe ori în 24 ore în contra vărsăturilor de sânge; se mai dă contra diareei (urdinării): 50 ctgr. la 150 gr. apă și 5 gr. ratania, cu puțin zahăr, la ceas cu lingura. — *Alumen calcinat*; *piatră acră arsă*. Se prepară încălzind piatra acră, pulverizată, în vase de pământ nesmălțuite, până la o temperatură de 240°, adică până se pierde 40% apă, transformându-se într-o masă ușoară și spongioasă. Alumenul calcinat este ușor, alb, poros, spongios, friabil, cu un gust la început puțin stiptic; se topește în 25 părți apă în 24 ore la temperatura ordinară. Se întrebuințează mai cu seamă în chirurgie, pe *râni*, pentru a opri creșterea prea mare a mugurilor cărnoși și la *unghia încarnată*: se pune praful între carne și unghie și apoi se ridică coaja care se formează, odată sau de două ori pe zi, până la vindecare.

Alumină (Sulfat de). — Astringent; se întrebuințează în doză de 1—2 la 100.

Alumol (Naftol sulfat de alumină). — Pulbere albă, solubilă în apă și glicerină. Astringent și antiseptic, în doză de 1—10 la 100, întrebuințat în ginecologie, la spălarea rănilor, în abcese fistuloase și în boalele de piele, pentru uns.

Alun (*Corylus Avellana*, fam. Betulaceelor). — Crește în păduri și

în tufișuri în toată România. Fructele, numite *alune*, au un gust fin și sunt foarte bune de mâncat; în unele părți alunele pisate se beau cu rachieu de drojdii cald, amestecat cu unt de lemn, contra *vătămurii*. Bățul de alun verde se înfierbântă în spuză de foc și se ard cu el *păduceii* de pe tăpile picioarelor. Cu alune arse și muc de lumânare de său se fac la copii sprâncenele ca să le crească mari și negre (din medicina populară).

Alveolă (dela lat. *alveolus*, o gaură mică, despărțitură). — Dinții sunt înfipti în osul maxilar (falca) în niște mici gropițe, numite alveole. Fiecare din ele este căptușită cu o fină piele și este găurită la fund, pentru ca prin acest orificiu să pătrundă nervul, artera și vâna care merg la dinte. Alveolele maxilarelor se cheamă *dentare*, pentru că coprin în interiorul lor dinții. *Alveolă pulmonară* (caută la plămân).

Amara. — Lac sărat în județul Ialomița, între satele Amara și Slobozia. Aceste băi sunt cunoscute de mult. Apa conține: clorur de sodiu, sulfat de sodiu, carbonat de magnezie, carbonat de calce. Nomolul este aproape ca cel dela *Lacul Sărat* și se întrebuințează pentru aceleași boale.

Amare (Picături), *picături de poftă de mâncare*. — Acestea sunt medicamente de origine vegetală, având un gust amar. Cele mai întrebuințate sunt: *pelinul*, *centaura*, *gentiana*, *cuasia*, *chinchina*, *columbo*, *hameiul*, *coaje de portocale*, *de lămâie*, etc. Picăturile amare, deși sunt neplăcute la gust, măresc secrețiunea salivei, a sucurilor stomacului și a mațelor, din care cauză rezultă o mărire a apetitului, o ușurare în mistuire și o regularitate a scaunelor. Ele sunt bune în unele boale de stomac și de intestine, atunci când omul n'are poftă de mâncare, când mistuirea se face cu anevoință, în dispepsie, în convalescența boalelor lungi, primăvara, mai ales la bătrâni, în gută, frigurile palustre, anemie, în boalele de piele. În boalele de stomac, când bolnavul are durere și căldură, nu sunt bune. Ele se vor lua *înainte* de mâncare,

AMAU

cu un sfert sau o jumătate de oră, când voim numai să deșteptăm pofta de mâncare, în *timpul*, sau *după* mâncare, când voim să grăbim mistuirea. — Se obțin bune rezultate dând copiilor 10 până la 15 picături și la oamenii mari 20—30 picături din următorul amestec: tinctură de cascarilă (odogaci), de columbo, de gențiană, de cinamom (scorțișoară), de revent, din fiecare 10 grame și tinctură de nuca vomică (turta lupului) 2 gr. 50 centigrame.

Amauroză (*amurosis*, dela gr. *amauros*, obscur, întunecos.) — Se înțelege prin acest cuvânt micșorarea, sau pierderea totală a vederii, fără alterarea mediilor transparente ale ochiului (corneea, cristalinelul, umoarea sticloasă). Amauroza este cauzată de bolile retinei, nervului optic. Poate fi *congenitală* (din naștere), sau *produsă* de diferite boli în *timpul vieții* (diabetul, albuminuria, anemia profundă, sifilisul, alcoolismul etc.) și poate să dispară uneori atunci când boala care a produs-o s'a vindecat.

Ambliopie (*amblyopia*, dela gr. *amblys*, obtuz, slăbit, și *opsis*, vedere). Slăbirea vederii, care nu este produsă printr'o leziune apreciabilă a membranelor adânci ale ochiului, nici printr'un vițiu de conformație, sau de funcționare. Indivizii slăbiți prin pierderi mari de sânge, sau prin excese, convalescenții, bătrânii, sunt adeseori atinși de ambliopie. Otrăvirile cu plumb, cu beladonă, cu sulfur de carbon, abuzul de băuturi alcoolice și de tutun de asemenea pot produce această boală.

Ambulanță (dela lat. *ambulare*, a umbla, a călători). — Se cheamă trăsura special construită pentru a însoți pe soldați la luptă și în care se adună răniții și se transportă până la spital. Ea are târgi, pe care pot sta răniții culcați, are medicamente și pansamente pentru primul ajutor ce li se dă răniților.

Amenințare de boală. — la *Iminență*.

Amenoree (*amenorrhoea*, dela *a* priv. *men*, lună, și *rhein*, a curge).

— Stare bolnăvicioasă caracterizată prin lipsa totală sau suprimarea trecătoare a periodului (vezi *Menstruație*).

AMET

Amețeală, *vertige* (lat. *vertigo*, dela *vertere*, a întoarce, a învârti). — Amețeala este o stare bolnăvicioasă în care se pare că lucrurile se învârtesc în jurul nostru și în care avem senzația că noi înșine ne învârtim. În *amețeala simplă* vederea rămâne aproape limpede; în *amețeala tenebroasă*, ea este întunecată. În vorba de toate zilele, atât a bolnavilor cât și a unor doctori, prin cuvântul *amețeală* se înțeleg stări cerebrale destul de diferite unele de altele și mai ales starea în care bolnavul, fără să vadă lucrurile învârtindu-se, sau mișcându-se din locul lor, nu se simte sigur în mersul său, face câți-va pași într'o parte și îi este teamă să nu cadă. Amețeala se observă ori de câte ori nu se poate aprecia repede starea raporturilor cari pot să existe între sine însuși și lucrurile exterioare. Patologiceste se observă amețeala în unele mișcări accidentale, cum sunt: mișcările leagănului, scrânciobului, mișcările unei corăbii etc. Amețeala se arată și în anemia cerebrală, în congestiunea cerebrală, mai în toate boalele de creier, mai cu seamă în tumorile cerebrale, în diferite otrăviri, cum ar fi acele prin tutun, alcool, chinină, salicilat de sodă, etc., în paludism, febra tifoidă, influență, sifilis, în boalele de urechi (Menière), în boalele de ochi, în neurastenii, în boalele aparatului circular, boalele de inimă, de aortă (arterioscleroză), în artrism, gută, în boalele de stomac, în boalele căilor urinare, etc.; ea mai poate fi prodromul epilepsiei, sau una din manifestațiunile ei cele mai obișnuite. — *Tratamentul* variază după natura amețelii, după boala care produce amețeala. Astfel la cei ce suferă de *anemie* li se va institui un tratament tonic (hrană substanțială, aer, preparațiuni fierugi-noase, arsenicale, etc.). Se poate întâlni la oamenii nervoși fără să aibă nici un organ bolnav. La cei ce suferă de *arterioscleroză*, *artrism*, *gută*, li se va institui un tratament general igienic și dietetic al acestor boale; se va prescrie regim de lapte, se vor da purgative, iodur de sodiu în doză de 1 gr. pe zi, ani dearândul, alternând întrebuințarea lui cu acea a trinitrinei, luată în doză de 3—4 picături dintr'o

soluțiune de 1 la 100, dimineata și seara. La cei ce sufăr de *boale de rinichi* (nefrită cronică) li se va da regim de lapte, purgative și diuretice. La cei cu *boale de inimă* se vor da medicamentele acelor boale; la *aortici* li se vor face injecțiuni sub piele cu morfină ($\frac{1}{2}$ ctgr, singură sau asociată cu atropină). La cei cu *boale de stomac*, la dispeptici, se va combate constipația cronică, se va opri cu totul tutunul, precum și ocupațiunile obișnuite și bolnavul va sta la țară. În dispepsia nervoasă se va institui tratamentul neurasteniei (abdominale). În momentul când bolnavul are amețală îi vom da o poțiune cu bromur și eter, sau valarianat de amoniac etc. La cei cu *epilepsie* vom da bromurele. La *isterici* și *neurastenici* le vom prescrie tratamentul general al acestor boale. La cei cu *paludism* (friguri palustre) vom combate anemia și cachexia cu chinchină, dată în doză de 6—8 gr. de praf în cafea, sau sub formă de electuar; vom prescrie arsenicul sub formă de licoarea lui Fowler (5—10 picături), arseniat de sodă (5—15 miligrame), sau eacodilat de sodă (5—15 ctgr.), sau se vor face injecțiuni sub piele cu arseniat de fier citro-amoniacal; regim reconstituant; ședere la munte (2—3 luni); idroterapie. La *sifilitici* tratament specific intens, (v. *Sifilis*). La cei cu *boale de ochi și de urechi* se vor trata aceste boale; dacă sunt urechile pline cu ceară se vor desfunda; în boala lui Meniere se recomandă: poziție orizontală în pat, tăcere, liniște.

Amidon. — V. *Amil*.

Amigdale, migdale. — Fructele arborelui *Amygdalus communis* (Rozacee). Sunt 2 varietăți: migdale *dulci* și migdale *amare*. Migdalele *dulci* se mănâncă la masă proaspete sau uscate. Când sunt proaspete se mistue ușor, cele uscate sunt grele, mai ales pentru stomacurile slabe, cari trebuie să se păzească de a le mânca, precum și de prăjiturile făcute cu ele. Ca *medicament* se întrebuințează sub diferite forme: *laptelui de migdale*, care este o băutură calmantă, răcoritoare și care se prepară pisând 50 gr. zahăr cu 50 grame de migdale și diluând această pastă într'un litru de apă; e bun în

aprinderile de gât, de *beșică*, mai ales după vezicători, când e bine să se pună în lapte și 1 gr. de camfor (la un ceas o lingură). *Uleiul de migdale dulci* se prescrie pe *din afară*, în spălături, fricțiuni; se pune în ureche; pe *dinăuntru* ca purgativ (curățenie) 15—30 gr. mai ales la copiii mici. — *Migdalele amare* nu se mănâncă, ele cuprind 2 otrăvuri puternice: *acid prusic* sau *cianidric* și *esență de migdale amare* (vezi *Prusic*). Sâmburii de persică și de zarzăre conțin și ei astfel de otrăvă și prin urmare copiii trebuie opriți de a-i mânca. În comerț se vinde *pastă de migdale amare*, care înmoaie pielea și face să dispară petele de pe față (vezi *Pete*). La *interior* se întrebuințează contra *frigurilor* (febrifug)



Fig. 15. — Amigdalele

A. Amigdalele umflate și roșii
B. Amigdalele umflate și cu puroi

și contra *fanglicei* (teniafug), însă numai după prescripția doctorului.

Amigdale, amigdalite, gâlci. — În fundul gurii și pe laturile înghițitorii se află de fiecare parte câte o ghindură de formă și mărimea *migdalei*. Intre ele atârână omușorul, care prelungește înapoi ceriul gurii. În stare de sănătate aceste ghinduri au o culoare roșietică și mărimea lor variază dela om la om. Amigdalele cuprind niște folicule închise cari ar avea oarecare rol în producerea globulelor albe ale sângelui; ele prezintă pe deasupra adâncituri, în cari se depune *praful* și mai cu seamă *microbii*, din care pricină este bine ca să răsuflăm *numai prin nas*, pentru ca *praful* și *microbii* din aer să se oprească pe *căptușeala* lui. — *Infламаțiunea acută a amigdalelor*. *Amigdalita acută*. *Gâlci*. *Durere de gât*. Această amigdalită se arată

mai cu seamă în copilărie, dar și la adulți. Cauza principală este răcirea, mai ales frigul la picioare, din care pricină se ivește mai mult primăvara și toamna, când sunt dese schimbările repezi ale temperaturii. Semnele gâlcilor sunt: *durere în gât*, cari cresc când bolnavul vrea să înghită, să mănânce, sau să bea; durerea aceasta *răspunde în ureche*, care comunică cu fundul gurii printr'un canal, numit *trompa lui Eustache* și care se aprinde și ea la rândul ei; bolnavul *vorbește pe nas*, are *durere de cap* și *căldură*, uneori foarte mare. Dacă ne uităm în gât vedem că amigdalele sunt roșii și umflate, iar când aprinderea este și mai mare, pe lângă roșeață se văd și niște pete alburii. Examinarea gurii și gâtului trebuie să se facă la lumină și cu multă băgare de seamă, pentru ca să ne putem încredința dacă avem de lucru cu o amigdalită simplă, sau cu vr'o angină de cele rele (v. *Angină*). Semnele amigdalitei simple merg crescând 3—4 zile, apoi scad și sănătatea își ia locul sub influența *tratatamentului*, care este următorul: la început se dă bolnavului o curățenie, chinină, 0,30—0,50 cgr. (la copii câte 0,10 cgr. de fiecare an de vârstă) apoi cataplasme (oblojeli) călduțe în jurul gâtului, muștar la pulpe, bae de muștar la picioare; apoi se fierb flori de tei, de soc, de nalbă, etc., și în aceste fierturi se poate pune puțină piatră acră, sau țipirig, sau acid boric cu care bolnavul va face gargară, cam odată la fiecare ceas. Uneori este nevoie de medicamente energice pentru oprirea boalei. Tinctură de iod se găsește mai în toată casa: se înfășură puțină vată la capul unui băț de lemn, se înmoaie în tinctură și, deschizând bine gura bolnavului, cu ajutorul coadei unei linguri, cu care apăsăm pe limbă, ungem bine amigdalele cu tinctură de iod.

Este și mai bine dacă punem părți egale din tinctură de iod și glicerină într'un pahar și muiem bățul înfășurat în vată în acest amestec, apoi ungem amigdalele. Le mai putem unge cu un medicament pe care-l cumpărăm pregătit gata de la farmacie, *colubiazol*, care este dulce la gust și copiii nu fug de el.

Un medicament de asemenea bun și eficient tot odată este hipermanganatul de potasiu, pe care îl topim în apă (1 gram la 1 litru apă) și cu care bolnavul să-și facă gargară la fiecare sfert de ceas.

O gargară foarte bună este preparată dintr'o pastilă de *hiperol* pe care o disolvăm într'un sfert de pahar de apă și dăm bolnavului să-și gargari-sească bine gura, de mai multe ori pe zi. De asemenea *neolul*, o linguriță la o jumătate de pahar de apă grăbește vindecarea.

Amigdalită supurată, abces al amigdalei. Câte odată, cu tot tratamentul, amigdalita nu trece așa ușor; boala merge înainte și încep fiorii, durerea este foarte mare, încât bolnavul nu poate înghiți nimic, balele curg din gură, amigdala crește mereu și scoate cap într'o parte, atunci este semn că *gâlcile au copt*. Bolnavul se găsește atunci într'o mare neliniște, mai ales din pricină că nu poate respira și este



Fig. 16. — Amigdalotom

amenințat să se înădușe. Pentru a-l ușura doctorul va deschide abcesul, ceea ce oricare bolnav primește bucuros. Dacă nu este doctor la îndemână abcesul nu se sparge singur decât pe la a opta zi, după care bolnavul simte o mare ușurare scuipând puroiul, uneori amestecat cu vinișoare de sânge. Mai primejdios este atunci când gâlcile se sparg noaptea, în timpul somnului și puroiul poate să intre în laringe producând *asfixie*. — *Inflamația cronică, sau ipertrofia amigdalelor*. *Amigdalita cronică* cu *mărirea amigdalelor*. Mulți copii, cari au suferit de gâlcii, vorbesc pe nas din cauză că amigdalele sunt mărite. Aceasta se vede mai ales la copiii scrufuloși, sau limfatici, cari au suferit de mai multe ori de gâlcii și la cari amigdalele rămân cu mult mai mari decât în stare normală, din care pricină vorbesc pe nas și unii nu aud bine. Când amigdalele sunt prea mari respirația se face foarte greu, mai cu seamă în

timpul somnului; aceasta predispune la răcirii mai dese, la tusă și guturaiu, ceea ce aduce cu timpul și o deformare a pieptului. Pentru toate acestea trebuie să recurgem la un *tratament* serios: pentru a înlătura urmările boalei vom da untură de pește, toată iarna și mai mulți ani dearândul, preparatele de chinchină și fier; amigdalele le vom atinge cu tinctură de iod simplă, sau cu glicerină (părți egale), vom da gargară de piatră acră, sau cu tanin. Dacă cu acestea nu trece, trebuie ca doctorul să taie amigdalele, să le scoată, cu un instrument numit *amigdalotom*. Operația nu este grea, nici primejdioasă; afară de unele ca-



Fig. 17. — Examinarea gâtului

zuri de spasme, cari se pot ivi la copiii prea nervoși, singura complicație care se poate arăta este o emoragie care se poate opri cu gargară făcută cu apă oxigenată.

De multe ori este nevoie să luminăm cu ceva fundul gâtului, pentru că nu putem vedea care este adevărata stare a amigdalelor. Pentru acest scop medicul are o oglindă pe care o leagă de frunte și cu ea prinde lumina dela o lampă apropiată de urechea bolnavului și o duce în spre fundul gurei, luminându-l bine. Acest lucru îl poate face oricine, aprinzând chiar o lumânare de ceară lângă capul bolnavului și cu o oglindă prinde lumina dela ea și o duce în gâtul bolnavului, dându-și astfel seama de starea lui.

Amil (*amylum*), *amidon*, *scrobială albă*. — Se extrage din cereale: grâu, orz, ovăz, porumb și orez. El are aceleași proprietăți ca și celelalte *fecule* (vezi acest cuvânt), numai că nu se mănâncă. Se întrebuințează pentru acțiunea sa *emolientă* în boalele de

piele, sub formă de *băi* (500 gr. pentru copii, 2 Kgr. pentru oamenii mari, diluat în 1000 gr. apă curată, apoi turnat în baie încet și agitând); — În cazurile de iritație de piele prin frecarea hainelor, sau alte cauze, în arsurile superficiale, în mâncărime, la bubele dulci (eczema), la brâncă (erizipel), în sfârșit ori de câte ori vom să punem pielea la adăpost de aer, se întrebuințează sub formă de *praf* (pudră), fin și uscat bine, singur sau amestecat în părți egale cu subnitrat de bismut și talc; în cazurile de urdinare (diaree) și în toate iritațiile de intestine sub formă de *clisme* (clistire): 15—30 gr. fiert într'un Kgr. de apă. Se mai prescrie sub formă de *gliceroleu*: 1 gr. la 15 gr. glicerină; sub formă de *cataplasme*, preparate întocmai ca și cele de făină de in (v. *Cataplasme*).

Amil (Nitrit de). — Este un lichid cu miros pătrunzător, otrăvitor, foarte alterabil la aer și lumină; se evaporă ușor.

Este un vaso-dilatator puternic; accelerează bătăile inimei. Datorită proprietăților lui se întrebuințează în angina de piept, în migrenă, epilepsie, histerie, în otrăvirile cu cloroform. Se păstrează în fiole închise și la nevoie vărsăm câteva picături pe o batistă și dăm bolnavului să miroase. E bine să nu dăm mai mult de 4—10 picături dintr'odată, iar doza în 24 de ore să nu întrecă 25 de picături, căci altfel omul se expune să se otrăvească.

Amil (Salicilat de) sau Eter-amil-salicilic. — Este un lichid incolor cu miros de mandarină. Se întrebuințează mai mult pe din afară, în cazurile de reumatism acut sau subacut, fiindcă pătrunde ușor prin piele și este mai bun decât salicilatul de metil, care miroase prea tare.

Amil (Valerianat de). — Lichid uleios cu miros plăcut de fructe. Are puterea de a topi calculele sau petricelele din ficat. Se întrebuințează în proporția următoare: valerianat de amil 50 centigr., mucilagiul de Caragheen 14 gr., ulei de migdale dulci 12 gr., sirop de smeură 30 gr., apă distilată 30 grame; se poate lua toată poțiunea într'un pahar de lapte. Se mai dă și în capsule gelatinoase de câte 10—20 ctgr.

AMIL

Amilen (Iidrat de). — Lichid incolor ; lucrează ca narcotic (care amortește, produce somn) ; se dă la insomnie și epilepsie : 3—8 gr. pe zi în capsule, poțiune sau injecții subcutanate.

Amilen-cloral. — Lichid incolor, siropos, miros camforat. Se dă pentru a produce somn ; e mai bun decât cloralul ; 50 ctgr. până la 1, sau maximum 2 gr. în buline sau emulsie.

Amilen pur sau *pental*. — Lichid fără culoare, volatil, foarte inflamabil, cu miros ca cel de eter, fierbe la 39°. Se dă ca ipnotic (producător de somn) și anestezic (amortitor de durere), foarte folositor în operațiile de scurtă durată (scoaterea dinților). Medicament *periculos*.

Amilenol. — V. *Salicilic (Acid)*, *Salicilate*.

Amiloform. — Făcut din combinația formolului cu amidonul ; praf alb, fără miros, nu e otrăvicios ; se poate întrebuința în locul iodoformului ca antiseptic dezodorant și siccativ.

Amnezie. — Este pierderea memoriei.

Amnios. — Pelița (membrana) cea mai dinăuntru care învelește oul omelesc. Acest înveliș conține lichidul amniotic, produs de copilul, care începe să-și formeze corpul. Acest lichid va înveli corpul copilului tot timpul cât stă în pânțele mamei și se scurge în momentul când se naște copilul ; scurgerea acestui lichid e cunoscută în popor sub numele de *ruperea pungi apelor*.

Amoniac, alcali volatil, amoniac ordinar din comerț, spirit de țipirig. — Soluțiune de gaz amoniac, în apă distilată, în proporție de 20%, care se prezintă sub forma unui lichid incolor, cu miros de urină, sufocant (înăbușitor), cu un gust alcalin și foarte caustic (arzător), producând vezicațiune când este în contact cu pielea. Se numește *alcali volatil* (vezi aceste cuvinte), din cauza vaporilor de amoniac pe cari îi răspândește când sticla este destupată. Sub influența căldurii gazul amoniac se pierde cu totul, prin evaporare, de aceea trebuie păstrat în sticle cu dop șlefuit și la adăpost de căldură. *Amoniacul lichid* are mai multe întrebuințări externe : ca *revulsiv* energetic întocmai ca o vezicătoare, însă lucrând

AMOR

foarte repede, în câteva minute. La o *durere neuralgică* mare, dacă aplicăm pe punctul dureros bumbac mușat în amoniac, după 2—3 minute pielea se beșică și durerea se micșorează sau pier. În *durerile reumatice* și în *paralizii* lucrează ca un *stimulent* puternic, dar în aceste cazuri nu-l întrebuințăm curat, ci amestecat cu un corp gras (untură de porc sau vaselină), părți egale și această alifie înroșește pielea în 10 minute, sau cu ulei de migdale dulci (10 gr. la 90 gr.) și atunci avem mult cunoscutul *liniment volatil*, care este excitant. El mai intră și în compoziția *balsamului Opodeldoch*, foarte bun la reumatism. Când are cineva *leșin*, sau își *pierde cunoștința*, îl deșteptăm numai decât plimbându-i pe la nas o sticlă cu acest amoniac, ferindu-i bine înțeles ochii să nu se irite. S'a mai întrebuințat la arderea *mușcăturilor de animale veninoase, sau turbate*. Aceste arsuri pot fi folositoare și în *mușcăturile de albine*, dar nici odată în cele de vipere sau de câini turbați, când e trebuință de alte mijloace mai puternice. Pe *dinăuntru*, amoniacul se dă în cazurile de *leșin* și de *pierdere de cunoștință*, sau pentru a combate *beția*, sau ca antidot în otrăvirile cu acide : se dau 5—6 picături într'un pahar de apă îndulcită cu zahăr. În medicină se întrebuințează la *interior* sărurile de amoniac : *acetatul* și *carbonatul* de amoniac pentru a produce nădușeală (transpirație) la începutul *febrei eruptive* (scarlatină, pojar) în reumatism ; *cloridratul* de amoniac pentru a înlesni scuiparea în cazurile de tusă (1—2—5 gr.). Se întâmplă și cazuri de *otrăvire*, de obicei accidentale, ceea ce se cunoaște după mirosul de amoniac al respirației, și aspectul gurii care e albă și umflată. Cea mai bună contra-otrăvă este apa cu oțet, dată în cantitate mare, lămâe, portocale, unt de lemn, lapte.

Amoniurie. Se cheamă boala în care găsim o cantitate mare de amoniac în urină.

Amorțeală, amortire, stupoare (lat. *torpor*). — O stare de tâmpeală care se observă în îngrămădirile de sânge la cap (congestiuni cerebrale), sau în unele boale ale sistemului nervos. Dar afară de aceasta mai este un fel de amorțeală

fizică ce este caracterizată printr'un fel de greutate pe care o simțim într'o mână sau un picior, pe cari le mișcăm cu mare anevoință și prin cari simțim niște furnicăături foarte supărătoare, datorite unei poziții rele prelungite, prin cari se apasă nervul principal al membrului. Pentru ca să treacă această amorțire este de ajuns să ne schimbăm poziția.

Amorțire. V. *Anestezie*.

Amputație (lat. *amputare*, a tăia).

— Când i-a căzut unui om un lemn, sau o piatră peste picior, sau peste un braț și, pentru a-i scăpa viața, i se taie membrul rupt, se zice că i s'a făcut o amputație. Se înțelege deci prin acest cuvânt îndepărtarea unui membru întreg, unei porțiuni din el, sau a unei părți proeminente (eșite) în afară) din corp, cum sunt țățele femeii de pildă, prin instrumente tăetoare. Amputația se face oridecâte ori o parte, sau un membru întreg, a devenit inutil, sau îl împiedică pe om de la muncă, în urma unei fracturi de pildă, sau când, în urma unei gangrene, viața omului este în pericol; în asemenea împrejurări se înlătură partea vătămată, sau bolnavă.

Anaerob (gr. *a* sau *an*, fără, *aer*, aer și *bios*, viață). E vorba de microbii cari nu pot să trăiască în aer, pentrucă oxigenul îi omoară.

Anafrodizie (gr. *an*, fără și *Aphrodite*, Venus, Zeița iubirei). — Se cheamă lipsa poftelor sexuale. Se întâlnește mai des la femeie ca la bărbat, uneori completă, alteori parțială. Este datorită firii persoanei suferinde, ocupațiilor intelectuale prea mari, temerei de a nu lua o boală lumească, sau dinpotrivă: excesului de viață sexuală de mai înainte. Alteori e datorit boalelor de nervi, anemiei, diabetului, etc.

Analeptice. — Se numesc astfel alimentele cari ajută la întremarea, la restabilirea puterii, în urma boalelor lungi și grele. Intre alimente avem: zeama de carne concentrată, extractele de carne, carnea crudă tocată bine, laptele, unele fecule cum sunt: tapiocă, arrowroot, salep etc. Dintre medicamente: fierul, fosfatul de calce, clorurul de sodiu.

Analgezie. — Medicament care poartă durerea.

Analgezie (gr. *an*, fără, și *algos*, durere). — Nesimțirea durerii, parțială sau totală, fiind păstrată simțirea atingerii. *Cauzele*: boalele nervoase (epilepsia, isteria, boalele măduvii spinării) boalele pielei; otrăvirile cu clorofom, alcool; răceala și degerăturile. V. și la: *Anestezie*.

Analgezină. — V. *Antipirină*.

Analiză (gr. *ana*, care exprimă împărțire și *lyein*, a rezolva). — Examinarea părților normale, sau anormale, pe care le conține un lichid, de exemplu: *urina* (udul), vărsăturile, *scuipatul*, materiile fecale; sau, a produselor speciale datorite unor boale: membranele false ale *difteriei*, etc.

Anason. — Sunt două feluri: 1. *Anason românesc*, *anis*, *anison*, *bădean* (*Pimpinella anisum*, fam. Umbeliflorilor). Plantă originală din orient, se cultivă și în părțile noastre (Iulie—August); 2. *Anason franțuzesc*, *anason stelat*, *anison stelat*, *badian*, *bădean*. (*Illicium anisatum*, fam. Magnoliaceelor); crește prin locuri umede, în Asia și cu deosebire în China și Japonia, unde se cultivă mult. În sudul Europei se poate cultiva sub cerul liber (*Mai*—Iulie). Se întrebuințează fructele dela amândouă varietățile, fructe cari au un miros aromatic, plăcut, un gust dulce și piperat, lăsând în gură, ca și izma, un fel de răcoreală; ambele au aceleași proprietăți și se pot întrebuința ori care din aceste două feluri. Anasonul ușurează mistuirea la cei cu *dispepsie* (stomachic), alungă gazele din stomac (prin răgăituri) și din intestine (prin vânturi), lucrare care se cheamă *carminativă* mulțumită căreia liniștește colicele, durerile de pânțe (mătricea), mai ales la copii; este bun și pentru a masca gustul purgativelor. Anasonul se întrebuințează: sub formă de băutură de *ceai*, care se prepară aruncând în apă, când clocoțeste, 10 până la 20 gr. la un litru, sub formă de *sirop*, 15—60 gr., în *praf*, 1—4 gr. sub formă de *ulei volatil* (esență) 1—10 picături, ca *tinctură*, 1—15 gr. O poțiune foarte bună contra spasmelor este următoarea: Esență de anason 10 picături, eter sulfuric 20 picături, sirop diacod 50 gr., infuzie de badian 150 gr.; la oră 1 lingură (pentru oameni mari).

Anatomie (gr. *ana*, și *tomé*, secțiune). Este știința care se ocupă cu structura corporilor și a raporturilor dintre organele acelor corpori. Anatomia umană ne învață să cunoaștem cum este format corpul omenesc și cari sunt raporturile dintre diferitele organe, pe care le conține corpul nostru.

Anazarcă (dela gr. *ana*, între, și *sarx*, carne) *idropizie generalizată, dropică*. — Este o infiltrație de lichide în țesutul celular de sub piele. Dacă apăsam cu degetul pe pielea unui asemenea bolnav rămâne câțva timp o gropiță în locul unde apeși, întocmai cum ai apăsa într'un cașcaval, și aceasta pe toată suprafața corpului. Această generalizare deosebește anazarca de *edem* (vezi acest cuvânt). *Cauzele*: frigul (anazarcă *de frigore*); scarlatina, frigurile palustre, boalele de inimă, de rinichi, de ficat; slăbirea generală, cum se întâmplă la sfârșitul ofitei, ori la cancer (rac). *Tratamentul*: regim *lactat absolut*, fricțiuni uscate și spirtoase; clisme, purgative, etc. (v. și *Edem*).

Anchiloză (dela gr. *agkylos*, strâmbat). — Pierdere parțială sau totală a mișcărilor încheieturilor mobile, provenită din cusătura celor două oase între ele, prin țesut osos sau fibros. *Cauzele* sunt mai multe: aprinderea sau inflamația încheieturii, în urma unei fracturi, inflamația tuberculoasă (tumoră albă, oftică la încheietură), reumatismul, guta, imobilizarea prea îndelungată într'un aparat. *Semnele*: înțepenirea sau neputința completă de a îndoi, sau a întinde, o încheietură (articulație), imobilizarea într'o poziție care devine foarte supărătoare, cum este la cot, când e întins și nu-l poți îndoi; de asemenea la picior când genunchiul e îndoit și nu-l poți întinde, așa că umbli șchiop, sau în cărji. *Tratamentul*: când anchiloză este incompletă se recomandă fricțiuni, masaj, mișcări încete, progresive (din ce în ce mai iuți și mai întinse) cu, sau fără aparate. Astăzi sunt stabilimente unde se află instalație completă pentru masaje mecanice, pentru orice fel de anchiloză. Când anchiloză este completă se vindecă foarte greu, sau de loc. Pentru a îndrepta o poziție rea a unui membru de multe ori trebuie să se facă

operație; să se taie tendoane, sau mușchi (tenotomie, sau miotomie), să se facă îndreptarea forțată sub clorofarm a articulației înțepenite, sau să se taie din oase pentru a îndrepta încheietura, sau pentru a forma o articulație falsă. — *Anchiloză falsă*, adică imobilizarea unei încheieturi, printr'o acțiune nervoasă, se observă uneori la persoanele isterice și se vindecă prin efectul cloroformului.

Anderson (Pilulele lui). — V. *Sabur*.

Andrea. — V. *Clavicula*.

Anemie (gr. *an*, fără, și *haima*, sânge), *lipsă de sânge*. — Prin anemie se înțelege *împușinarea*, sau *sărăcirea* sângelui. Anemia poate fi *locală*, adică mărginită la un organ, care nu primește destul sânge, cum este *anemia cerebrală*, în care creerii nu au sânge cât le trebuie (v. *Inmoierarea de creeri*). Cele mai adese ori însă anemia este *generală*, și în acest caz ea poate fi de 2 feluri: întâi cantitatea sângelui conținută în vine și în artere este mai mică decât în stare normală, după cum se întâmplă în urma unei pierderi de sânge (emoragie) produsă de o rănire, sau de o luare de sânge (venesectie) prea mare, ori de o operație chirurgicală, de scurgeri repetate de sânge din nas. În aceste cazuri anemia se mai zice *accidentală* și se manifestă printr'un fel de sfârșeală, paloare repede a pielii, amețeli, văjiituri de urechi, mers clătinat, tendință la leșin. Al 2-lea fel de anemie generală este atunci când sângele se găsește în aceeași cantitate ca și în stare de sănătate, dar el este mai sărac în elementele principale, cari îl constituie, adică în *globule roșii*, al căror număr scade mai mult de jumătate (1 la 2 milioane, în loc de 5 milioane pe milimetru cub de sânge), în *hemoglobină* care poate scădea la 50 grame în loc de 125 gr. pentru 1000 (vezi *Sânge*). Puterea colorantă a sângelui este foarte micșorată, iar globulele albe uneori se înmulțesc. Aceasta este anemia *cronică* sau *lentă*, anemia *adevărată*, despre care se vorbește mai mult și care se întâlnește mai des. Ea vine pe încetul și din mai multe *cauze*: hrană neîndestulătoare, sau rea, mai cu seamă abuzul de băuturi spirtoase, lipsă de mișcare, ședere în oraș, în aer stricat, munca prea mare cu mintea;

apoi sarcina, alăptarea, unele otrăviri (cu plumb, cu mercur, cu iod); unele boale acute, mai ales frigurile palustre și reumatismul, boalele cronice, mai cu seamă boalele de stomac, de mitră, cancerul, oftica, etc. — *Semnele anemiei* sunt: pielea palidă, decolorată, căptușeala pleoapelor pe partea lor dinăuntru, conjunctivele, buzele și gingiile, în loc să fie roșii sunt albe; călduri cu palpații și greutate în piept, dureri de cap și amețeli, uneori cu zăpăceală, câte odată leșinuri prelungite și diferite turburări digestive (lipsă de poftă de mâncare, greutate la mistică). La femei se mai arată turburări în menstruație, uneori în loc de sânge curge un fel de apă spălăcită, alteori pierd sânge prea mult și au dureri. În unele forme de anemie pot să se ivească turburări de partea creierilor. Dacă ascultăm inima auzim un suflu lin în primul timp, suflu care se aude mai bine la baza inimii, la nivelul spațiului al 4-lea intercostal și aproape de stern. Sgomotele normale ale inimii la anemici sunt mai răsunătoare, mai accentuate. Anemia agravează mai toate boalele, întârzie convalescența și predispune la oftică. Toate semnele acestea se văd și la *scleroză*, care se deosebește de anemie și se observă numai la fetele și femeile tinere. *Tratamentul*: se va combate boala care a produs anemia, precum și orice cauză care o poate produce, se recomandă șederea la țară, cura de aer, băi sărate, băi de mare; cura de apă rece (idroterapie), mișcare, exercițiu zilnic, hrană bună, reconstituantă, carne crudă tocată (400 gr. pe zi), ficat crud de vită, tocat și dat sub formă de pastă, substanțele cari conțin fier mult, tot felul de carne, ouă, lapte, linte, spanac. Preparatele de fier, sau de mangan, iar acolo unde fierul nu reușește, arsenicul, date în doze mici. *Hemostilul* este un bun medicament în asemenea cazuri (v. acest cuvânt). Inhalățiuni de oxigen și în cazurile când anemia are un mers acut se poate face o transfuziune de sânge. — *Anemia pernicioasă progresivă*. Sub acest nume se înțelege o boală gravă a sângelui, care nu mai are elementele care îl formează, de cât într-o proporție redusă. Este cauzată de îmbolnăvirea organelor care for-

mează globulele roșii (măduva spinării, splina, ficatul).

Tratament: fier și arsenic în picături. Arsenicul se mai poate administra și prin injecții sub piele; licoarea Fowler 5 gr., apă de laur-ceras 10 gr.; 1 până la 2 cmc. pe zi. Transfuziune de sânge, tratament antisifilitic (vezi *Sifilis*). Contra vărsăturilor: poțiunea lui Rivière, apă cloroformată, mentol, coccaină; inhalățiuni de oxigen. Ședere la țară, sau la munte. Tratamentul cel mai sigur este cel cu raze roentgen. *Regim*: lapte, ouă crude, sau fierte moi, carne friptă, pește, linte, ficat crud; ca băuturi: lapte, kefir, bere slabă.

Anemonină. — V. *Dedifei*.

Anesină sau *Aneson*. — V. *Clorolon*.

Anestezie (gr. *an*, fără, și *esthesis*, sensibilitate), *amorțire*, *nesimțire*. — Pierderea completă, sau parțială, a simțirii, a sensibilității într-o parte a corpului, sau în tot corpul. Anestezia poate fi rezultatul unei stări bolnăvicioase, sau poate fi produsă prin mijloace artificiale, prin medicamente zise *anestezice*. O rănire a unei nerv (lovitură sau tăiere), compresiunea unui nerv, produce anestezia părții pe care o servește acel nerv. Ea se mai vede în degerături, în boalele de piele, în boalele de creeri, de măduva spinării, în isterie, coree, demență, etc. Nesimțirea durerii se numește *analgezie* (vezi acest cuvânt), care se deosebește de anestezie prin aceea că simțirea atingerii, a contactului, sensibilitatea comună s'a păstrat. Anestezia poate fi *locală* sau *generală*. Anestezia *locală* se poate obține prin aplicarea de *ghiață* asupra părții de operat, prin pulverizații de *eter*, de *clorur de etil*, de *clorur de metil*, injecțiuni sub piele cu *novocaină*, *cocaină*, *stovaină*, etc. Anestezia *generală* (pierderea temporară a cunoștinții) se produce prin inhalățiune de *cloroform*, *eter*, protoxid de azot, etc. Această anestezie se face în chirurgie în scopul de a practica, fără durere, o operație gravă, și în obstetrică ori de câte ori este trebuință să se combată marile dureri de facere, sau de a face o operație obstetricală grea, sau când se ivesc accidente nervoase, cari pot aduce moartea femeii (V. *Eclampsie*). În anii din urmă s'a in-

ANES

trodus anestezia și în facerile naturale, mai ales în Anglia, unde se practică pe o scară întinsă, dar atunci trebuie să se facă cu multă băgare de seamă și femeia să nu respire cloroform decât în minutul durerilor celor mai mari și numai cât țin ele, într-o cantitate foarte mică. În anestezia generală sunt 2 perioade: 1. Perioada de *excitație*, în care bolnavul se luptă cu cei din jurul lui, cu mișcări inconștiente, violente la cei alcoolici; 2. Perioada de *somn*, care se anunță prin văjiituri și diferite sgomote în urechi, și în care insensibilitatea (nesimțirea) este completă. Condițiunile necesare pentru anestezia generală sunt: bolnavul să nu sufere de boli de inimă, să fie pus la dietă absolută începând din ajun. Uneori se pot ivi accidente serioase, vărsături, sincopă, leșin, sau chiar moarte, mai ales când cloroformul n'a fost curat și a fost dat în doză prea mare. Din acest punct de vedere inhalatiunile cu eter, sunt de preferat. Cu bun efect se fac injecțiunile *intrarachiene* cu *stovaină* în regiunea lombară, în cazurile de operații cari se practică dela buric în jos. După câteva minute dela injecție, picioarele sunt paralizate și anestezia completă, iar bolnavul asistă conștient la toată operația ce i-se face, putând fi chiar de ajutor chirurgului, când acesta are trebuință de unele mișcări ale bolnavului. Această anestezie (*rachi-stovainizarea*) dă rezultate aproape întotdeauna bune.

Anestezină (eter etilic din acidul amido-benzoic). — Praf alb, fără gust și fără miros, care se întrebuințează ca *anestezic* local. Se dă contra boalelor de stomac, 30 — 50 ctgr. pe zi, în buline.

Aneurism (dela gr. *anevrisma*, dilatațiune, lărgire). — Prin aneurism se înțelege o dilatare, o umflătură într'un anumit loc, a peretelui unei artere. Aneurismul este de 2 feluri: *spontan* și *traumatic*. În cazul dintâu umflătura, sau punga, este formată prin lărgirea pereților unei artere într'un punct oarecare, pereți cari și-au pierdut puterea de rezistență, sub influența unei boale numite *aterom*, sau *arterio-scleroză* (vezi aceste cuvinte). Această lărgire se poate face numai într'o parte a arterei și atunci avem *aneurismul saciform*

ANEV

(în formă de sac), sau lărgirea se face de jur împrejur: *aneurism fusiform* (în formă de fus). În cazul al doilea, când aneurismul e *traumatic*, el vine dintr'o rănire a vasului și pereții pungii sunt formați atunci din țesăturile vecine. Aneurismele *arterio-venoase* se formează atunci când sunt rănite artera și vâna în același loc și punga ce se produce comunică cu amândouă vasele. Sunt mai multe *cauze* cari produc această cumplită boală: abuzul de băuturi alcoolice, boalele sifilitice, viața leneșă și hrana prea multă și prea bună în comparație cu munca, efortările violente, și *ateromul* (vezi acest cu-




Fig. 18. — Aneurisme

vânt). Etatea cea mai expusă este între 30—40 ani. Aneurismul se arată mai mult la *aorta* (vezi acest cuvânt) din piept, la gât, la subsuoară, în stinghe și la îndoitura genunchiului. Se poate ivi și la arterele creierilor. Intre *semnele* boalei avem următoarele: umflătura sau tumora, care se află întotdeauna pe traiectul unei artere, prezintă bătaie ca de puls, mișcări de întindere sau de umflare generală și un freamăt, sau fâșiitură specială. Când punem mâna pe aneurism el scade, dacă apăsăm mai jos de el, aneurismul crește. Tumora, pe măsura în care crește, apasă tot mai tare părțile din jur, provocând durere, apoi aneurismul aortei dă naștere la palpitații (bătăi de inimă), la respirație grea, la înecăciune, la nevralgii intercostale, la sughiț, la un fel de răgușeală și o

greutate la înghițit. Dar nu trebuie să uităm că de multe ori chiar doctorul nu poate cunoaște dintr'odată anevrismul din piept, mai ales când este la început. — *Tratament.* Anevrismul, lăsat în voia lui, sfârșește prin a se rupe, a plesni și atunci moartea vine la minut, *subit*. Această ruptură, acest sfârșit, se poate, prin tratament, dacă nu ocoli pentru totdeauna, cel puțin amâna și viața se poate prelungi pentru un timp oarecare. Pentru aceasta bolnavul va trebui să se ferească de emoțiunile vii, de muncă oositoare, de efortări, de exerciții violente, de mișcări și plimbări forțate, de influența supărătoare a balurilor și seratelor, a adunărilor numeroase și sgomotoase, cari supără respirația și împiedică circulația regulată a sângelui; să se ferească de băuturi alcoolice și excitante, de vin, cafea, ceaiu; să nu fumeze; regim cât se poate de sobru și repaus. Ca medicamente se recomandă: iodurul de potasiu, de rubidiu, de sodiu, la început câte 50 ctgr. pe zi, mergând crescând până la 2, 4, 6 grame; după 20 zile de cură se va face o întrerupere de 10 zile; se mai dau bromurele, opiaceele, digitala, secara cornută, pentru a combate eretismul și sfârșeala de inimă; pentru întărirea inimii: cafeină, strichnină, ergotină, iar când anevrismul e de natură *sifilitică* se va institui un tratament specific energetic: injecții cu mercur, neosalvarsan și bismut. Anevrismele cari se găsesc la membre se pot vindeca prin operație chirurgicală.

Anexită. — Înțelegem prin acest cuvânt inflamația trompelor și ovarelor. Este o boală serioasă, care produce dureri în pânțele și care, dacă nu se îngrijește la vreme, produce sterilitatea femeii bolnave (nu mai face copii).

Este produsă de blenoragie, cele mai adeseori, de tuberculoză sau de mulți alți microbi, cari pătrund prin uterul femeii și ajung până la ovare.

Angelică, angelină, angelică, buciniș, (*Angelica archangelica*, fam. Umbeliferelor). — Plantă care crește pe lângă torențele, pâraiele și râurile din pădurile de munte și subalpine (Iulie—August). Se întrebuințează semințele, frunzele și mai cu seamă rădăcina, care este groasă ca degetul,

în formă de fus, sbârcită; neagră-ca-fenie pe din afară, albicioasă pe dinăuntru, la gust plăcută, cam dulce și aromatică la început, apoi iute și amară, conține un suc gălbui. Popoarele din nordul Europei mănâncă vlăstarele tinere de angelică. În medicină se întrebuințează pentru proprietățile sale stimulente, tonice, stomachice, etc. Pentru aceste calități se dă la convalescenți și la cei cari au limba în totdeauna albă și încărcată, care le dă gust de mâncare și le ușurează mistuirea, producând răgăituri și vânturi la cei ce fac gaze multe în stomac și mațe. Se dă angelica în praf sau în fiertură, în formă de ceaiu (20 gr. la 1000 gr.), sau sub formă de tinctură, 2—10 gr. într'o poțiune oarecare. Anghelica mai intră și în compoziția apei de melisă, etc. — La țară, din cauza gustului și a mirosului suav, se pune în rachiul pentru a-i da gust: acest rachiul se bea și în contra vătămurii și ca tonic al stomacului.

Anghină. — V. *Angină*.

Anghinare. (*Cynara Scolymus*, fam. Compozitelor). — Plantă erbacee spinosă, originară din regiunile mediteraneene, cultivată ca plantă culinară din cauza solzilor cărnosi și a receptacolului floral care constituie o minunată legumă (v. *Legume*). Anghinarea are și o acțiune diuretică, adică face multă urină.

Angină (dela lat. *angere*, a strângula, a sugruma, a gătui), *anghină, durere de gât, gâlcii*. — Prin cuvântul *angină* se înțelege orice aprindere, sau inflamație de gât, fie ea ușoară sau gravă. Prin urmare angina este de mai multe feluri după cum vom vedea în rândurile ce urmează. — 1. *Angină catarală acută, angină simplă, durere de gât*. Este forma cea mai ușoară și mai puțin periculoasă. Incepe cu fiori, căldură, oboseală generală, durere de cap, lipsă de poftă de mâncare. Aceste semne la unii sunt neînsemnate, pe câtă vreme la alții, mai ales la copii, sunt în măsură foarte mare, căldură (delir). După o zi începe durerea de gât cu uscăciunea și usturime în fundul gurii și la înghițitoare, greutate mare la înghițit. Căptușeala din fundul gurii este roșie, uscată, lucitoare, presărată de mici ridicături și umflată.

Uneori după 3—4 zile se văd niște mucozități, sau un strat-pultaceu pe amigdale, curățat cu înlesnire cu un pământ și nu seamănă de loc cu cel dela angina difterică. Cele mai adeseori angina se însoțește și de unele semne ale aparatului digestiv: limba este alburie sau gălbuie și încărcată, greață și constipație. Căldura scade în 4—5 zile, ghindurile dela gât sunt puțin prinse și în 6—7 zile boala trece. *Cauzele* sunt: frigul, răceala. Recidivele sunt frecvente. *Tratament.* La început se va da o curățenie (unt de ricină, sau sare amară, iar la copii calomel 15—35 centigrame, după etate); contra căldurii se va da chinină, antipirină, fenacetină. Pe din afară se vor pune cataplasme calde, sau cârpe muiate în apă fierbinte și acoperite de gutapercă; gargară cu diferite ceaiuri, de nalbă, de mușătel, cu acid boric, (4 gr. la 100 de apă) la fiecare jumătate de ceas, sau mai bine spălături abundente în fundul gurii cu apă boricată, fenicată, salicilată. Atingeri în gât de trei ori pe zi mai ales amigdalele, cu: acid fenic, cămfor, câte 1 gr., glicerină 30 gr., cu: acid salicilic 50 ctgr. glicerină 60 gr. etc. sau mai bine cu un amestec de: tinctură de iod 10 gr. și glicerină tot 10 gr. sau *columbia-zol*; apoi băi calde la picioare, cu muștar, sau muștar la pulpe. Regim: lapte, ouă moi; ca băuturi diferite ceaiuri călduțe, plăcute la gust și limonade acidulate (cu lămâie). — *Amigdalită acută, gâlcii.* — Semnele sunt ca și la angina catarală, cu deosebire că aci amigdalele sunt foarte umflate, ceea ce aduce mare greutate la respirație și la înghițire; uneori durere de urechi, când inflamația s'a întins și la *trompa* lui Eustache. Când gâlcile fac puroi bolnavul are căldură și mai mare, fiori de frig, gâtul umflat și pe din afară; abcesul se poate forma înăuntrul amigdalei, sau în jurul ei *Tratamentul* este ca și la angina simplă, la care se mai adaugă ungeri pe din afară cu unguent cinereu, 30 gr., extract de beladonă 4 gr., și pe deasupra un Prinsnitz (cârpă muiată în apă și stoarsă, iar pe deasupra gutapercă), sau cataplasme calde cu făină de in. Pe amigdale este bine, pentru a domoli durerile, să se facă atingeri cu:

glicerină 20 gr., borat de sodă 2 gr., cocaină 50 ctgr.; gargară de ceai de nalbă, călduț, alternând cu gargară de: acid boric 130 gr., apă 1 litru, esență de mentă 5 picături. După 2—3 zile abcesul se sparge, sau mai bine se va chema doctorul, care va deschide abcesul și bolnavul se va ușura imediat. Durata acestei angine este cam de 8 zile. — 3. *Angină catarală cronică, angină granuloasă.* Această formă are următoarele semne: uscăciune și un fel de gădilătură în gât și în nas, mai cu seamă dimineața la deșteptare, ceea ce silește bolnavul să scuipe des și cu oarecare greutate mucozitățile vâscoase ce se găsesc în fundul gurii. Uneori se observă și o mică surzenie din cauza astupării *trompii* lui Eustache. Păreții gâtului și cerul gurii sunt roșii, lucitori, presărați cu granulațiuni (mici ridicături) roșietice, de mărirea unui bob de cânepă. Asemenea leziuni se găsesc uneori și în laringe și în nas (v. *Laringită cronică* și *Coriză cronică*). Acest fel de angină ține mult timp și este întreținută de tutun, de băuturi alcoolice, și de contactul aerului la cântăreți și la cei ce vorbesc mult. *Tratament.* Să nu fumezi, să nu bei alcoolice; gargară cu ceai de frunze de nuc, gargară sau pulverizații cu ape minerale *alcaline* (la gutoși), *sulfuroase* (la reumatici), *arsenicale* (la limfatici); amigdalele să se atingă cu: tinctură de iod și glicerină câte 10 grame. La interior să se dea: Licoarea Fowler, 6 până la 10, 12 picături pe zi, sau sirop de iodur de fier, 2 linguri pe zi. — 4. *Amigdalita cronică; gâlcii învechite,* rezultă din repetarea de mai multe ori a amigdalitei acute la limfatici și scrofuloși, care produce o umflare sau mărirea amigdalelor, permanentă. Uneori amigdalele sunt așa de mari încât se ating cu omușorul și atunci respirația este foarte grea, mai ales în timpul somnului. La unii copii această amigdalită este însoțită de mărirea ghindurilor dela gât (adenite cervicale cronice). La cei limfatici și scrofuloși se observă adeseori și coriză (inflamația nasului) și blefarită (aprinderea genelor, cu urdori la ochi). *Tratament.* Dacă amigdalele sunt tot timpul mari și ne fac neplăceri, cel mai

bun lucru este să fie scoase (tăiate cu amigdalotomul). 5. *Angina gangrenoasă* se observă mai mult la copii decât la adulți, în scarlatină, pojar, vărsat, febra tifoidă, dizenterie, difterie. În fundul gurii și pe migdale se văd plăci gangrenoase cenușii, negricioase, cu miros urât, unele mici ca lintea, altele mari ca un ban de 10. Dacă gangrena este mărginită, placa se deslipește, cade lăsând în locu-i o ulcerație care se poate vindeca; dacă gangrena este întinsă, plăcile se împreună între ele și copleșesc omușorul, cerul gurii. Gâtul, pe din afară, se umflă, gura miroase foarte urât și curg bale multe; bolnavul vorbește pe nas, înghite greu, este abătut, moleșit, fără putere, pulsul slab; uneori are neliniște și aiurare; moarte în câteva zile. *Tratament*: se ard suprafețele gangrenate cu acid cloridric, sau fierul roșu: gargară și spălături abundente cu acid fenic, 1 la 200; cu acid salicilic, 2 la 1000; sau cu permanganat de potasă 1 la 2000, cu sublimat corosiv 1 la 15000; atingeri în gât cu acid lactic, sublimat corosiv, acid fenic câte 1 gr. la 30 gr. glicerină, sau cu tinctură de iod și glicerină câte 10 grame. Se vor întreține forțele bolnavului cu tonice și alcool, extract de nucă vomică 10 ctgr., extract de chinină, extract de kola câte 4 gr., poțiunea Tood 130 gr., sirop de chinchină 25 gr.; se iau 4 linguri pe zi. — 6. *Angină difterică* (v. *Difterie*). — 7. *Angină sifilitică* (v. *Sifilis*). — 8. *Angina tuberculoasă* are ca semne: arsură și durere în gât, iar în fundul gurii se văd mici granulații împrăștiat, sau confluențe, alb-gălbui, cari se ulcerează, lăsând în urma lor răni mai mult sau mai puțin întinse. Bolnavul are dureri mari și nu poate înghiți decât cu mare greutate, ceea ce-l face să aibă spaimă de mâncare. Această angină poate dura săptămâni și luni, grăbind moartea bolnavului. Pentru *tratamentul general* vezi la *Ofitică*, iar ca *tratament local* se recomandă atingeri cu tinctură de iod, naftol camforat, acid lactic 50 la 100, sau cu acid fenic 50 ctgr., glicerină 20 grame. Pentru a înlesni înghițirea se va atinge înainte de mâncare fundul gurii cu glicerină fenicată (50

ctgr. la 100), cu o soluție apoasă de cocaină de 5 sau 10 la 100, sau cu o soluție uleioasă de mentol de 1 la 20. — 9. *Angină scarlatinoasă* (v. *Scarlatină*).

Angină de piept (*angor pectoris*). — Această boală primejdioasă, foarte dureroasă, vine din timp în timp, sub formă de *accese*. De odată, fără nici o pricină vădită sau cu prilejul unei emoțiuni, a unei oboseli, după mâncare prea multă, bolnavul simte în partea stângă a pieptului, sub țâtă, o *durere înjunghietoare*, care se întinde în diferite părți, spre gât, la ceafă, în tot pieptul, la stomac, dar cele mai adese ori durerea se întinde la brațul stâng, la mână, la degetul inelar și cel mic (sfera nervului cubital), și pielea mâinii devine palidă și fără sânge. Când accesul este puternic, durerea este însoțită de o simțire strașnică de strângere de piept, de răsuflare grea și de neliniște; bolnavul cu fața palidă, pământoasă, acoperită de sudori reci, se simte strâns ca de niște clește puternice, sau strivit de o greutate foarte mare și amenințat de înăbușire (sufocație) și leșin, nenorocitul, fără să poată vorbi sau mișca, dar păstrându-și cunoștința, simte că viața i se stânge, că moare. Accesul acesta durează câteva clipe, câteva minute, apoi dispare lăsând în urma lui o amorțire în mâna stângă, o trebuință mare de a urina, răgăeli gazoase, vărsături și o mare moleșală. Accesul nu este însă în totdeauna așa, după tipul clasic. Durerea care pleacă dela inimă poate să cuprindă nu numai brațul stâng, ci amândouă brațele și mâinile, poate să se ridice în sus până la încheietura fălcii, poate să se scoboare spre lingurea și să ocolească trunchiul ca un fel de încingătoare, sau să se prelungească în jos spre stinghe până la testicul. S'a mai văzut durere care să aibă un mers întors, adică să plece dela mână, să se ridice repede spre piept, în forma unei *aure* ca la epilepsie. Dacă ascultăm pieptul în timpul accesului, deși bolnavul pare a fi amenințat de înăbușire, nu auzim nimic anormal; bătăile inimii sunt ca în stare de sănătate, uneori mai încete, însă sunt neregulate sau grăbite, dacă angina de piept este însoțită de

leziuni cardiace sau aortice. Pe unii bolnavi nu durerea îi chinuște, ea este însoțită sau chiar înlocuită prin accese de *opresiune*, de apăsare în piept, cu sau fără bătăi de inimă; alteori *dispnea* torturează bolnavul și durerea cade pe al doilea plan. În multe cazuri angina de piept nu vine așa de iute și în măsură așa de mare, după cum am arătat mai sus. Bolnavul are în mod aproape continuu, timp de mai multe săptămâni și chiar luni, cu foarte mici întreruperi, o durere în brațul stâng, o apăsare în piept și o durere suportabilă în regiunea inimii. La mulți bolnavi accesul este atât de violent, dela prima dată, în cât omul moare în câteva clipe, fără ca ai casei să fi avut timpul să-i dea ajutor. Adeseori în timpul acceselor se mai observă și alte semne: pierderea poftei de mâncare, salivație, constipație, umflarea pântecelui. — *Cauzele* acestei cumplite boale sunt mai multe. În cazurile cele mai grave cauza este scleroza arterelor inimii (coronare), cari se astupă și nu mai lasă să circule sângele și inima nu mai este hrănită, atunci moartea vine repede; apoi scleroza aortei, de multe ori de natură sifilitică; nevralgiile și nevritele plexului cardiac, tumorile mediastinului, din apropierea acestui plex și cari pot provoca aceste nevralgii sau nevrite, abuzul de tutun, de ceai, de cafea; guta, reumatismul, sifilisul. — *Mersul* boalei este variat. Accesele cele dintâi sunt de obicei ușoare și trecătoare și numai cu timpul devin mai mari și mai lungi. Cu toate acestea boala poate fi mortală chiar în primul acces, cum am mai spus. Unii bolnavi au numai un singur acces, ceea ce se întâmplă foarte rar; de obicei accesele, din rare ce erau la început, se îndesesc și revin în cele din urmă în fiecare săptămână, sau chiar în fiecare zi. Accesele sunt uneori periodice, revin la zi și oră fixă. Unii bolnavi și când n-au accese nu sunt cu totul bine; în totdeauna au o greutate la respirație, o apăsare în piept, o amorțeală în mâna stângă. Când boala nu este produsă de leziunile arterelor coronare, sau ale aortei, ea se poate vindeca. — *Tratament.* Înainte de toate bolnavul trebuie să ocolească orice pricină care

ar putea provoca accesul, adică să nu se supere, să nu se obosească, să nu mănânce prea mult, să nu fumeze, să nu bea cafea, băuturi alcoolice, să nu facă beții și nopți albe: să se hrănească mai mult cu lapte (2—4 litri pe zi), să nu mănânce carne de vânat, raci, pește de mare, mâncări iuți, ardeiate; prea puțin vin la masă, cu o apă minerală. Să se combată diateza artritică prin alcaline și litină, guta prin iodur de potasiu sau de rubidiu; se va prescrie iodurul de sodiu luni și ani, cu întreruperi de 10 zile în fiecare lună (50 ctgr. până la 2 gr. pe zi), sau tinctură de iod 5—10 picături de 2 ori pe zi; sifilisul cu preparațiuni sau injecții mercuriale și iodur de potasiu. În *timpul accesului*: injecțiuni sub piele, cu morfină, de câte 1 ctgr. una, sau mai multe, după trebuință; pungă de gheață în regiunea inimii; la acestea se mai adaugă inhalațiuni cu cloroform, sau eter, ori să se dea câteva picături de eter în puțină apă, îndulcită cu zahăr; punând la nas sticla cu eter să miroase, sau, în lipsă de eter, se poate întrebuința amoniac lichid, din care se poate da și pe dinăuntru 5—6 picături, în apă cu zahăr. Se mai dă în contra accesului cu un efect și mai bun, nitrit de amil 5—10 picături turnate pe o batistă, care se pune la nas, sau soluție alcoolică de *trinitrină* ($\frac{1}{100}$) 30 picături, apă distilată 300 gr., 3—6 linguri de compot pe zi, sau: nitrit de sodiu 14 gr., apă distilată 350 gr., 2 lingurițe pe zi. Contra durerii se mai poate da și cloral hidrat. În intervalele acceselor este bine să se aplice pe partea dureroasă; vezicători, puncte de foc și când durerile sunt perzistente pungă cu gheață, în permanență.

Operațiile cari s'au făcut contra acestei boli n'au dat rezultate bune totdeauna. Tratamentul sifilisului trebuie instituit cât mai de grabă, dacă se dovedește că suferă de această boală.

Angina lui Ludwig. — Este o formă mai gravă de angină. Cere o intervenție chirurgicală urgentă. Este un flegmon al gâtului, tare ca lemnul.

Angiocolită. — Inflamația canalelor prin care se scurge bila.

Angiologia. — Partea din anatomia

umană care se ocupă cu studiul inimii și al vaselor de sânge.

Angiom sau *angionom* (dela grec. *aggeion*, vas, și particula *om*, care însemnează tumoră, umflătură, bolfă). — Este o tumoră formată de lărgirea vaselor mici sanguine, a capilarelor, de exemplu: tumorile zise *erectile*, *nervi materni*. (v. *Nervi*).

Anilarsinat de sodiu. — V. *Atoxil*.

Anilină (*anilinum*), sin. *fenilamină*. — Product industrial. Se scoate din păcura care rezultă din distilația, cărbunilor de pământ. Este un lichid incolor, mobil, foarte refringent, de un miros aromatic particular și de un gust acru și arzător. La lumină se înegrește. *Proprietăți*: toxică; lucrează asupra sistemului nervos central, contra *coreei* și a *eclampsiei* (vezi aceste cuvinte). *Doză*: 5 până la 15 ctgr. de 3 ori pe zi, în timp de 3—4 săptămâni, în apă, cu puțin acid sulfuric. — *Ortrăvirea cu anilină* se cunoaște după următoarele semne: amețeli, sudori abondente, răcire generală, fața, buzele și degetele se învinețesc, o simțire de apăsare în piept foarte mare, respirația are miros de anilină. *Tratamentul*: să se pună bolnavul aproape de o fereastră deschisă la aer rece; stimulente, respirație artificială, luare de sânge (venisectie).

Anilipirină. — Compusă dintr'o parte antifibrină și două părți antipirină; lucrează ca: antitermic, analgesic și nervin, fără să aibă inconvenientele antifebrinei. Se dă în migrenă (durere de cap), în diferite nevralgii, în reumatism muscular și articular (dureri de mușchi și de încheieturi), febră, etc.; 1—2 gr. pe zi, în doze de câte 50 ctgr., în buline; se poate da și într'o poțiune, sau în sirop, socotit câte 50 ctgr. pe lingură.

Aniodol. — Antiseptic puternic și un dezodorizant de primul ordin. O soluție de 1 la 4000 sterilizează foarte bine plăgile. Bun dezinfectant pentru gură și nări, într'o soluție de 1 la 1500, sau 1 la 3000. Pentru mâni și instrumente este de ajuns o soluție de 1 la 2000. În blenoragie lucrează minunat în injecții de 1 la 3000, mai ales la femei. Se mai întrebuințează pentru mâni și sub formă de săpun în soluție de 1 la 100.

Anis, anison. — V. *Anason*.

Ankilostoma. — Este un vierme rotund, lung de 11—18 mm. Larvele acestui vierme pătrund prin piele și ajung în tubul digestiv și în plămâni. Produce boala numită *ankilostomiază*, numită odinioară anemia minierilor, boală care se întâlnește și în Europa. *Semnele* boalei: dureri în stomac, respirație puturoasă, febra ridicată, slăbirea forțelor, epistaxis, amețeli, anemie foarte mare.

Anofel (v. la Malarie).

Anorexie grec. *an*, fără, și *orexis*, apetit). Lipsă de poftă de mâncare, sinonim cu *inapetență* și adeseori cu desgustul de mâncare. Este un semn care se vede în toate boalele de stomac, fie la început, fie în cursul lor. Sunt boale de stomac grave, cum este cancerul, în care anorexia poate să lipsească, sunt altele foarte ușoare (dispepsie) în care ea este foarte pronunțată, așa că nu trebuie să i se dea o importanță prea mare de diagnostic. Anorexia este mare, mai cu seamă în boalele nervoase (isterie, ipocondrie), în boalele de mitră, în sarcină la început, în boalele de rinichi (uremie). La copii și bătrâni anorexia are mare însemnătate. Se combate prin măsuri igienice, printr'o hrană potrivită, prin întrebuințarea unor ape minerale, alcaline sau gazoase. Intrebuințarea preparatelor amare: de gențiană, de absint, de nuca vomică, de chinchină; vinurile amare (de chinchină, de gențiană) și diferite elixiruri, așa numite eupeptice (cari ușurează mistuirea). O formulă de picături de poftă de mâncare este: tinctură de absint, tinctură amară, câte 20 gr., tinctură de nucă vomică, 10 gr.; să se ia câte 25—30 picături, înainte de mâncare, în puțin vin sau apă. Pentru completarea celor zise asupra anorexiei caută și la: *Alcoolism*, *Apetit*, *Dispepsie*, *Febră*, *Isterie*.

Anorhidie. — Lipsa congenită (din naștere) a unui testicul.

Antebraț. — Este partea membrului superior cuprinsă între cot și pumn. El are două oase: *radiul* în afară și *cubitul* înăuntru, și 20 de mușchi, o mulțime de artere, de vine și de nervi; forma lui generală este aceea a unui trunchiu de con răsturnat. — Pe an-

ANTE

tebraț se ivesc adeseori *abcese* și alte inflamații, cari nu prezintă nimic deo-



Fig. 19. — Membrul superior

1=umărul; 2=brațul;
3=antebrațul; (a=cubitul, b=radiul)



Fig. 20. — Vedere posterioară a mușchilor antebrațului pronat

sebit. *Loviturile* și *tăieturile* de asemenea se observă des; *curgerile de sânge* în răniri sunt de multe ori mari și nu pot fi oprite decât de doctor, dar până să vină le vom acoperi rana cu cârpe curate, înmuiate în apă rece și vom strânge bine antebrațul, în sus de tăietură, cu mâinile, sau cu o legătură oarecare. *Fracturile*, sau frânturile de oase, sunt de asemenea dese; se fac de obicei pumnului, în urma unei căderi pe mână; în aceste cazuri vom ține mem-




Fig. 21. — Poziția oaselor antebrațului în rotație

ANTI

brul în nemișcare, fără să-l strângem (vezi *Aparate* și *Fractură*). Un obicei rău au unele mame, sau servitoare, când iau copilul de o mână și-l ridică pentru a-l pune pe un scaun, a-l da jos pe scări, etc., căci, pe lângă durerile mari, de multe ori îi pot produce o sucitură sau scrântitură la cot, sau la pumn. În loc să ia copilul numai de o mână, mai bine ar face să-l apuce cu amândouă mâinile de subțiori, ca să-l pună pe scaun, sau să-l dea jos de pe scări.

Antihelmintice. — Medicamente cari se dau în contra viermilor intestinali, numite și *vermifuge* (vezi *Viermi intestinali*).

Anti (grec. *anti*, contra). — Pus înaintea unui adjectiv, format din numele unei boale însemnează medicamentele destinate pentru a combate acea boală. Se zice astfel: anti-acid, anti-alcalin, anti-isteric, antisifilitic, etc.

Antiacid. — Medicament care combate acrimile de stomac alcalinele și în special bicarbonatul de sodă, oxidul și carbonatul de mangan.

Antiafrodiziac (gr. *anti*, contra, și *aphrodisia*, plăcerea amorului). — Regim, sau medicament, care calmează excitația organelor genitale: exercițiul și munca regulată, viață cumpătată, pat tare, băi calde prelungite, beladonă, bromur de potasiu, sau sodiu, camforul, dionina, cloralul, lauroceras, preparatele de opiu, ceaiul de teiu, etc.

Anticataral. — Medicament bun în contra catarului.

Antidot (gr. *anti*, contra, și *dotos*, dat). — O substanță este antidotul altei substanțe când nimicește efectele acesteia, fie *chimicește*, prin formarea unui compus nevătămător (acid și alcaline), fie *mecanicește*, subțind corpul stricăcios (apă), sau învâlcind și înconjurând otrava (sirop, materii cleioase, gelatinoase, uleioase), fie *fiziologicește*, înlesnind alungarea otrăvii, prin mărirea secrețiunilor, urină, sudoare, salivă, fiere, prin cari otrava este aruncată afară (diuretice, sudoarice, etc.). Pentru mai buna lămurire caută la: *Otrăvire* și *Ser*.

Antiemoragie. — Medicament care se dă contra emoragiei, a curgerii de sânge.

Antifebrile. — Medicamente cari se dau în contra frigurilor, în contra febrei (v. *Antipirină, Chinchină, Chinină, Arsenic, Cafea, Febră*).

Antifebrină, sau acetanilidă. — Se prezintă sub formă de lamele cristaline strălucitoare, fără miros și cu gust arzător. Combate febra și calmează nervii; se dă și contra formelor grave de variolă (vărsat). *Doza*: 50 ctgr. până la 2 gr., însă nici odată mai mult de 50 ctgr. pentru o doză, *supraveghind acțiunea*. Se dă în buline de 25 până la 50 ctgr.

Antiflogistic (dela gr. *anti*, contra, și *phlox*, flacăra). — Medicamente cari se dau în contra aprinderii (inflamației), cum sunt: cataplasme și diferite oblojeli calde sau reci, băi, ghiață, băuturi răcoritoare, purgative, lăsări de sânge, locale sau generale. Alcoolul, care scade temperatura corpului, ar putea fi considerat ca antiflogistic.

Antiflogistină. — Este o bună catapasmă, decongestionantă, antiseptică, alcătuită din: salicilat de aluminiu, fin pulverizat și uscat, glicerină pură, acid boric, acid salicilic, iod și oleuri de mentă, eucalipt. Se recomandă în bolile de plămâni (pneumonie, pleurezie, bronșite, în peritonite, amigdalite, inflamația sânilor, a mitrei, etc.

Antigonococic (Vaccin...). — Este o emulsie în ser fiziologic, de diferite rase de gonococi (microbii blenoragiei), omorâți prin căldură. Se întrebuintează, sub formă de injecții, în toate complicațiile blenoragiei, la femei și bărbat. În urma injecțiilor se observă, uneori, dureri, roșeață și ușoara umflătură a membrului unde s'a făcut injecția, febră, dureri de șale.

Antigutos. — Medicament cari se întrebuintează în contra *gutei*.

Antilăptos. — Medicament care se dă pentru a opri, sau a împuțina laptele.

Antileucoreic. — Medicament care se dă contra leucoreei, a poalei albe.

Antimalarie. — Medicament care se dă în contra frigurilor palustre, a paludismului.

Antimeningococic (ser polivalent...)

— Se prepară prin introducerea în sângele cailor a microbilor numiți meningococi, apoi se ia serul sângelui acestor cai și după ce suferă, în laborator, câteva

preparații, se poate injecta la oameni. Se întrebuintează contra meningitelor și de multe ori putem salva dela moarte pe acești bolnavi.

Antimoniu, sau stibiu. — Metal alb, cu reflex alb argintiu, lucitor, dur, friabil, se pulverizează ușor, are mai multe preparațiuni, cari se întrebuintează în medicină: 1. *Oxid alb de antimoniu*, medicament contra-stimulent și expectorant, care înlesnește scuiparea, în doza de 1 până la 4 gr. într'o poțiune: infuzie de isop 90 gr., oxid alb de antimoniu 4 gr., sirop de tolu, sirop de morfină câte 20 gr.; la fiecare, oră câte o lingură. — 2. *Protocolur de antimoniu*; caustic energetic, care, împreună, cu clorur de zinc și cu făina, formează vestita pastă Canquoin. — 3. *Sulfur de antimoniu*: medicament expectorant, întrebuintat în doză de 5 ctgr. până la 1 gr. în pilule. — 4. *Tartarstibiat*, sau *emetic* (tartrat de antimoniu și de potasă). Proprietăți: produce vărsături (vomitiv), purgativ, contra-stimulent, după cantitatea în care se dă, astfel: în doză de 5 până la 10 ctgr., în 3 pachete, luat fiecare într'o jumătate pahar de apă, din sfert în sfert de oră, produce *vărsături*. Se întrebuintează mai mult la oamenii mari, singur, sau asociat cu 1 gr. de *ipecă*; dacă varsă după 2 prafuri nu se mai dă al treilea și dacă le-a luat pe toate și nu varsă în deajuns să mai bea puțină apă caldă. În aceeași doză, însă diluat într'un litru de zeamă de verdețuri și băut încet, cu ceșcuța, dimineata pe nemâncate, este *purgativ*. Dacă mai adăogăm la acest purgativ 20 gr. de sulfat de sodă și dacă se bea din acest amestec câte un pahar, din sfert în sfert de oră, este un *emeto-catartic*, adică produce în același timp și vărsături și curățenie. O doză de 20 până la 75 ctgr., într'o poțiune de 200 gr., luată cu lingura din ceas în ceas, constituie un *sedativ* (care domolește) prin mărirea secrețiunilor încetinirea circulației și a respirației. În fine, amestecat cu untură de porc (axonge) formează *pomada Autenrieth*, care lucrează ca o vezicătoare pe locul unde se aplică: bună în bronșite, pneumonie, congestie cerebrală, crup, reumatism. — 5. *Kermes mineral* (oxid-sulfur de antimoniu); *expectorant* în

ANTI

doză la 10—20 ctig. *vomitiv și contrastimulent* în doză mare, 1—2 gr. bun în bronchite, emfizem (năduf). — *Otrăvirea, prin preparatele de antimoniu*, are următoarele semne: gust metalic, vărsături continue, o strângere în gât, durere la stomac, diaree, crampe, moleșeală. *Contra-otrăvă*: dacă nu sunt vărsături să se dea *ipeca*, ceaiu și cafea tare, albuș de ou, lapte, bolnavul să se acopere bine, să stea în căldură.

Antinevrită. — Antitermic și analgezic. Doză; 50 ctgr. până la 1,50 gr. în buline.

Antinevralgie. — Medicament care se dă în contra durerilor de nervi, a *nevralgiilor*.

Antiparazitar. — Medicament care se întrebuințează în contra paraziților.

Antipiretic (gr. *anti*, contra, și *pyretos* febră). — Medicamente cari se dau în contra frigurilor, în contra febrei, fierbințelii (*Antipirină, Anti-febrină, Chinchină*).

Antipirină (gr. *anti*, contra, și *pyretos* febră), *analgezică*. — Praf cristalin, fără miros, gust cam amar; scade *căldura* și combate *durerea* (migrena, nevralgiile), este bună și în *curgerile de sânge*, mai ales la cele din nas. Doză; 50 ctgr. până la 1, 2, 3 gr. pe zi, în unele cazuri se poate merge până la 4, 5 gr.; se dă în buline, sau topită în apă. Pe din afară se întrebuințează pentru a opri emoragia, în cristale, sau topită, 20 la 100. — La unele persoane face *blândă* (urticarie). Cei ce sufăr de inimă să ia antipirină în măsură mică și rar. Femeile să n'o ia în timpul regulilor (menstruației). Copiii să nu li se dea mai mult ca 0.10—0.20 centigrame pe an de vârstă.

Antiputride. — V. *Antiseptice*.

Antireumatismal. — Medicament care se dă în contra reumatismului.

Antiscorbutice. — Sunt mai multe plante, cari au putere de a vindeca scorbutul din care pricină li s'a dat numele de *antiscorbutice*. Intre acestea sunt *năsturelul, lingureaia, trifoiștea, hreanul, muștarul negru*. Dar în, afară de acestea, este știut că toate fructele și vegetalele verzi au aceiași acțiune în contra scorbutului, unele chiar le sunt superioare cum sunt: portocalele

ANTI

și lămâile. Sunt 2 preparate vrednice de arătat, cari se întrebuințează cu folos: 1. *Berea antiscorbutică*, se prepară astfel: se pun în 200 gr. bere, proaspătă 3 gr. lingurea, 6 gr. hrean, și 3 gr. muguri de brad. 2. *Siropul antiscorbutic*; frunze proaspete de lingurea 50 gr., rădăcină de hrean 40 gr., portocale amare 10 gr., scorțișoară 2 gr., vin alb 200 gr., zahăr 250 gr.; să se bea 2 linguri pe zi, copii mai mici 2—3 lingurițe pe zi.

Antiseptice. — Medicamente cari previn, sau împiedecă infecțiunea putridă, sau purulentă, omorând microbii dinăuntru și dinafara corpului. Cele mai de căpetenie sunt: sublimatul coroziv, acidul fenic, alcoolul, acidul boric, permanganatul de potasă, iodoformul, salolul, timolul, creozotul, naftolul, gaiaculul, bismutul, etc., cari sunt în acelaș timp și *otrăvuri*, din care pricină trebuie întrebuințate cu mare băgare de seamă (v. *Dezinfectante și Dezinfecțiune, Plăgi*).

Antisepsie (gr. *anti*, contra, și *sepsis*, putrefacție). — Prin aceasta se înțelege întrebuințarea substanțelor medicamentoase în contra putreziciunii, adică acele cari o împiedecă să se facă, nimicind microbii cari o produc.

Antiseptol (iodosulfat de chinchină). — Product de forma unui praf de culoarea ciocolatei, puțin solubil în apă, solubil în alcool și eter; cuprinde jumătate din greutatea sa iod și se întrebuințează în locul iodoformului, având aceleași proprietăți antiseptice și dându-se în aceleași doze.

Antiseptolul Chauvin. Medicament uleios, este un bun dezinfectant al nasului și faringelui și un bun medicament în inflamațiile acestor organe, în sinuzite, vegetații adenoidice, etc., fiind preparat din mentol, camfor, eucaliptol, chloreton, oleu cinamonic și oleu de parafină. Se picură, de 2—3 ori pe zi, câte 5—6 picături în fiecare nară, în cazul boalelor de mai sus, sau ca preventiv în timpul epidemiilor de gripă, de paralizie infantilă, etc.

Antispasmodice. — Se numesc astfel medicamentele cari combat nu numai starea spasmodică propriu zisă, sau convulsivă (spasmele), ci și diferitele turburări nervoase. Intre acestea sunt

amoniacul cu toate preparatele lui, eterul, melisa, valeriana, camforul, asa fetidă, opiu, bromurele, clorofomul, cloralul, lămâioara, portocalul, teiul, etc.

Antistreptococie (serul . . .) — Se întrebuințează, sub forma de injecții, pentru a combate erizipelul, frigurile de după naștere (febra puerperală), scarlatina, etc. Serul este cu atât mai folositor cu cât se întrebuințează mai la începutul boalei. Ca și celelalte seruri și vaccinuri se prepară și la noi în țară, la „Institutul de seruri și vaccinuri Prof. Dr. Cantacuzino”, din București.

Antitermice (gr. *anti*, contra, și *thermos*, căldură). — Medicamente cari se dau contra temperaturii ridicate, contra căldurii. (V. la *Febră*).

Antivomitiv. — Medicament care oprește vărsăturile.

Antrax. — V. *Pustula malignă*.

Antrenare. — Prin acest cuvânt se înțelege totalitatea mijloacelor cari se întrebuințează pentru a pune pe om în stăpânirea întregii sale energii fizice, ca să poată suporta oboselile unui exercițiu oarecare. Igiena recomandă în timpul antrenamentului, o alimentație reconstituantă, sub un volum mic, întrebuințarea moderată a băuturilor alcoolice, scaune regulate zilnice, întrebuințând la nevoie, exercițiu regulat, hidroterapie, sudorifice, cari împuținează cantitatea de grăsime din corpul omului, din care cauză aceste mijloace sunt foarte bune și pentru a combate *obezitatea*. Exercițiul trebuie să se facă regulat și în mod *progresiv*, ca intensitate de acțiune și ca durată. Micșorarea presiunii în artere, produsă prin afluxul de sânge în mușchii, cari sunt în acțiune, este compensată printr-o înmulțire a bătăilor inimii, cari însă nu trebuie să treacă mai mult de patru, sau cinci, peste cifra obișnuită. Respirațiile trebuie să fie mai ample, mai adânci, însă nu mai numeroase și trebuie făcute prin nas, ținând gura închisă.

Anus, șezut. — Orificiul inferior al intestinului.

Aortă (grec. *aorté*, vas). — Este trunchiul comun al tuturor arterelor, începând dela inimă și terminându-se în jos, prin bifurcație, în iliacele pri-

mitive (v. *Circulațiune, inimă*). *Anevrismul aortei* este o boală gravă, care poate aduce moartea în orice clipă. Cauzele acestei boale le-am arătat la articolul *anevrism*. *Semnele* sunt: durere (nevralgii intercostale, dureri la



Fig. 22. — Anevrism al aortei

braț, la mână, durere în piept cu apăsare continuă sau prin accese, cu răsuflare sgomotoasă, uneori tusă chintoasă, ca în tusa măgărească, turburări în voce care e răgușită,

sau afonă (fără glas), greutate la înghițit încontinuu, sau numai din când în când. Bătăi cari dau senzația ca și cum ar fi două inimi în piept, etc.. Cât despre *tratament* caută la *anevrism*.

Apă (lat. *aqua*), *protoxid de oxigen*.

— Corpul omului cuprinde multă apă; din zece părți, șapte sunt formate de ea. Noi pierdem zilnic o cantitate mare de apă prin respirație (330 gr.), prin piele (600 gr.), prin urină (1700 gr.) prin escremente (130 gr.), și prin bale și alte secrețiuni și escrețiuni, așa că pierderea totală ar fi cam până la 3 litri pe zi. Această apă pierdută trebuie pusă la loc, restituită corpului, căci fără ea omul nu poate trăi. *Selea* ne arată că avem trebuință de apă, numai de apă, nu și de alte băuturi. Nu toată apa pierdută trebuie s'o luăm prin băuturi, căci o bună parte ne este dată de alimentele solide, cari conțin și ele o mare câtime de apă: carnea, pâinea, brânza, fructele, etc., toate sunt formate dintr-o cantitate mai mare sau mai mică de apă. Astfel fiind omul n'are trebuință de a bea atâta apă cât pierde, fiindu-i de ajuns un litru până la un litru și jumătate pe zi, restul luându-l din mâncare. Apa este un lichid transparent, fără culoare, fără miros și fără gust; ea este răspândită în natură cu atâta belșug, încât acoperă patru cincimi din suprafața pământului. Apa se mai găsește înăuntrul pământului, ca pânze subterane ori în aerul atmosferic, ca aburi, ceață și nori. Se compune, chimicește, din 2 volume de *idrogen* și

APĂ

un volum de *oxigen*, sau, după greutate, din 4 părți din primul gaz și 16 din al doilea. Formula ei chimică este H_2O . Apa care se află la suprafața pământului nu este așa de curată, ea cuprinde materii saline, minerale, organice și gazoase în soluțiune și alte corpuri în suspensiune. La temperatura de 0° apa se solidifică, se schimbă în *ghiață* cu volum mai mare și o densitate mai mică decât apa lichidă, ceea ce explică pentru ce vasele, în cari se face această schimbare, crapă și pentru ce ghiața înnoată la suprafața apei. La temperatura de 100° apa începe a fierbe și se transformă în aburi; dar ea se evaporă și la temperatura mai mică, ceea ce se chiamă *evaporațiune*, care, producându-se la suprafața apelor terestre, regulează starea de umezeală a aerului (vezi *Aer atmosferic*). — *Apa de băut*, trebuie să fie limpede, fără culoare, fără miros, cu gust plăcut, să fie aerată, temperată iarna, rece vara (temperatura ei să nu treacă nici odată peste 12°); să conțină anumite săruri, însă substanțele fixe, adică substanțele solide, cari rămân după evaporare la 109° , să nu treacă peste o jumătate de gram la litru; să conțină cât se poate mai puține materii organice; să nu aibă amoniac, azotite și fosfați; să facă spumă cu săpunul și să fiarbă bine legumele; să nu cuprindă nici un microb *patogen* (producător de boală) și cât se poate mai puțini microbi nevinovați. Apă potabilă nu este apa curată chimicește (H_2O), ea trebuie să mai cuprindă pe lângă *idrogen* și *oxigen* și alte corpuri, trebuie să mai conțină gaze, cum este aerul și bioxidul de carbon, cari o fac plăcută la gust și ușoară la mistuit, și *săruri*; clorur de sodiu (sare de bucătărie), bicarbonat de calce, sulfat de calce și de magnezie. Apa este *rea* de băut când are gust rău și conține lucruri stricătoare sănătății, ea mai este rea și atunci când nu cuprinde destule gaze și săruri. Când gazele lipsesc cu totul, apa se mistue greu și n'are gust bun, cum este apa destilată și apa fiartă, ne aerată, când se găsesc în câtime prea mare apa nu mai este potabilă, ea este o apă *minerală*, care se întrebuințează numai în anumite cazuri. Când apa

APĂ

n'are *săruri* nu este gustoasă și corpul suferă din lipsa sărurilor, iar dacă sărurile se găsesc în câtime prea mare, mai mult de o jumătate de gram la litru, apa este *aspră*, nu mai fierbe bine legumele și nu mai face clăbuci cu săpunul, având și un gust rău. Apa este *sălcie* când are prea mult sulfat de calce; ea cade greu la stomac și se mistue cu anevoință când cuprinde prea mult carbonat de calce. Ea este purgativă când conține mult sulfat de magnezie (sare amară), iar când are prea mult clorur de sodiu (sare obișnuită) are un gust sărat și în loc să potolească setea o mărește. Apa este nesănătoasă când conține substanțe *anorganice*, materii argiloase, silicioase, calcaroase, cari fac ca apa să fie turbure, sau diferite corpuri pe cari apa le-a luat din cursul ei de pe pământ, sau din pământ, ori că ele au fost aruncate în apă de canale, de fabrici, de spălătorii, tăbăcării, *arsenic*, *amoniac*, *nitrite* și *fosfați*, provenite din materii organice și escremente). Toate acestea fac ca apa să fie rea de băut. Intre materiile *organice* pot fi diferite materii moarte, sau vii, în suspensiune, sau în soluțiune, cadavre de diferite animale: (insecte, pești, soareci, câini, moluști), etc., bucățele de lână, bumbac, in, pene, peri, bucățele de lemn, de paie, boabe de scrobeală, resturi alimentare, escremente, etc., cari putrezind produc pe lângă amoniac diferite *toxine* (cresol, scatol, fenol, indol, etc.), cari pot da naștere la colici și la diaree (urdinare). Se pot găsi în apă și animale inferioare, ca viermi, infuzorii, etc., cari sunt cu mult mai periculoase, căci din apă putem lua sub formă de ouă, sau sub formă de embrioni, diferiți paraziți ai corpului nostru, cum sunt *limbriciii*, *oxiurii*, *tricocefalul* și *distoma hepatică*. Din apă poate lua porcul, sau vaca, oul de *tenie* (panglică), pe care ni-l trece sub formă de cisticerc; tot din apă ia știuca ouăle de *botriocefal* (tot un fel de panglică). Din apă putem lua și ouă, sau larve, de *anghilule* (stercorale și intestinale), cari, înmulțindu-se, produc urdinare. Apoi mai putem lua *amiba* numită *coli*, care dă naștere la dizenterie (urdinare cu sânge). Dintre *vegetale* putem găsi în apă

unele indiferente, altele însă foarte primejdioase pentru sănătate: O apă ca să fie bună de băut nu trebuie să aibă nici un microb patogen, iar microbi nevinovați cât se poate mai puțini (să nu treacă peste 300 pe c. c.). Un singur microb patogen, într'un pahar cu apă, este mai primejdios de cât sute de mii de microbi saprofiți. Foarte multe boale mari și periculoase se pot lua prin apă: frigurile tifoide (lingoarea), cholera, dizenteria (amiba coli), diareia (colibacilul), apoi în apă, se mai găsesc și microbi supurației (cari fac puroi). Să vedem acum câte feluri de apă avem: a) Apele meteorice sunt ploaia și zăpada; apa de ploae conține microbi pe cari îi întâlnește în aer în căderea ei; aceea care cade mai pe urmă este foarte curată, având prea puțini microbi sau de loc; apa de ploaie care s'a scurs prin burlane este rea din pricina microbilor luați din praful de pe acoperiș. Zăpada este tot ca și apa de ploaie, aceea însă care a stat mai mult timp pe lângă casă se infectează grozav, din cauza necurătenilor ce se aruncă pe ea. b) Apele superficiale. Apele din râuri și fluvii ar fi bune de băut dacă n'ar trece prin sate și prin orașe, unde se aruncă multe necurătenii în ele. Conțin o mare câtime de substanțe organice moarte și vii. Cele moarte putrezind produc amoniac, idrogen sulfurat, idrogen carbonat și diferite toxine, din care pricină produc colici și urdinare. Substanțe organice vii: microbi patogeni și microbi nevinovați. În râurile ce trec prin orașe se varsă apa de ploae, care duce cu sine toate necurătenile ce întâlnește pe străzi, prin canale, lăturile, urina, escrementele, apele cari au servit la diferite industrii (tăbăcării, spălătorii, etc.), ceea ce face ca apa râurilor, cari trec prin orașe, să fie foarte periculoasă. Noroc că apele de râuri și de fluvii după ce au eșit din orașe se curată în mersul lor; după un drum de 20—50 Km. ele își recapătă curățenia de mai înainte și aceasta prin depunerea la fund a microbilor și mai ales prin acțiunea omoritoare de microbi a soarelui. Apa bălților și heleștaielor nu este bună, căci nu se primește de cât foarte puțin și este încăr-

cată de prea multe substanțe organice. Apa lacurilor mari, a lacurilor de munte, care se primește mereu prin izvoare numeroase și prin râuri, este foarte curată. Apa de mare, din pricina cantității prea mari de sare, nu este bună de băut; de cât după ce se distilează, dar și apa distilată nu este sănătoasă, tocmai din cauză că n'are săruri de loc, și n'are gaze. Apa de mare, la o depărtare oarecare de țărm, n'are microbi mai de loc, în apropiere de țărm însă numărul microbilor crește mult prin murdăria ce se aruncă în ea, sau prin apa ce se scurge din canale. c) Apele subterane. Apa din izvor este foarte curată, n'are microbi, când vine dela o adâncime de cel puțin 5 metri, când pământul care o acopere n'are crăpături, când suprafața acestui pământ nu este infectată prin gunoale, prin escremente, etc. Când apa unui izvor se turbură, după ploi, aceasta dovedește că pământul deasupra este crăpat și că apa de ploaie pătrunde până la izvor. Pentru ca apa de izvor să fie totdeauna curată trebuie captată, chiar dela punctul din care țâșnește și în jurul aceluia punct trebuie stabilită o zonă de apărare, care să nu fie locuită. Apa de izvor, ori cât de curată ar fi, dacă n'o bem proaspătă, dacă este stătută, se strică din cauză că microbii cari cad în ea se înmulțesc foarte repede. Fiindcă nu găsim apă de izvor în tot locul, în cele mai multe cazuri trebuie să ne luăm apa de băut din puțuri (fântâni), săpând, sau găurind pământul, până ce dăm de apă. Unele puțuri sunt superficiale, altele profunde și altele arteziene. În teorie apa de puț este întocmai ca apa de izvor, dar în realitate nu este așa și sunt o mulțime de puțuri a căror apă este rea, din pricina microbilor. Ei ajung în apă din cauză că puțul nu este bine construit, că nu este închis la gură, așa că microbii din aer cad în apă, că este în apropiere de pământ infectat de latrine, depozite de bălgar, etc. Puțurile superficiale, cari ne dau apă din întâiul strat de apă, sunt cele mai rele, căci sunt mai mult supuse la infiltrații. Puțurile profunde (adânci) și puțurile arteziene au apă mai curată din cauză că infiltrațiile se fac

mai cu greu, straturile de apă fiind mai adânci. *Ghiata* are microbi, căci aceștia rezistă la înghețare și la temperatura foarte scăzută, așa că apa rea dă o ghiată rea. Microbul febrei tifoide trăiește în ghiată mai multe luni. Nu se va pune ghiata în băuturi. *Ce apă trebuie să bem.* Singurile ape pe cari le putem bea, fără nici o preparare, sunt apele de izvor, apele de puț și apele unor lacuri de munte. Apele de izvor să fie bine captate și ferite de murdărie, iar puțurile să nu fie prea superficiale și să fie bine construite și împrejmuite. Puțurile cele mai bune sunt cele care se compun dintr'un tub de fontă, care merge până la stratul de apă care se află la o adâncime de mai mulți metri. Acest puț va trebui să fie departe de latrini, cel puțin de 20 metri. Intru cât privește puțurile de piatră, ele trebuie zidite cu var hidrolic, pentru ca pârșii să fie impermeabili, iar marginile trebuie să fie ridicate deasupra pământului de un metru. Pământul din jurul puțului să fie uscat și curat, gura lui să fie acoperită și apa să se scoată cu pompa. Dacă apa vreunui puț s'a infectat putem purifica puțul prin var și anume: stingem 10 Kgr. de var în 50 litri de apă, apoi aruncăm acest lapte de var în puț, iar după trei zile sleim puțul. Afară de apele de izvor, apele de puțuri igienice și de apele unor lacuri de munte, toate celelalte ape înainte de a le bea trebuiesc *purificate* (curățate), pentru ca să nu conțină microbi patogeni. Purificarea apelor are de scop de a înlătura microbii și pentru aceasta avem trei mijloace: *fierberea, tratamentul chimic și filtrarea.* — *Fierberea* este cel mai sigur mijloc de *sterilizare*; prin fierbere omorim diferitele vietăți din apă, înlăturăm materiile albuminoide fixe și precipităm excesul de săruri calcaroase. Pentru ca să ajungem la acest rezultat trebuie ca apa să *fiarbă în clocote o jumătate de ceas*, să rămână în vasul de fierbere până la consumare și să fie consumată în aceeași zi în care a fost fiartă. Apa fiartă însă are și defecte: ea este fără gust, grea la stomac și nu astâmpără bine setea. Pentru a înlătura aceste neajunsuri trebuie să batem apa ca s'o aerăm și

s'o bem rece. — Pentru *tratamentul chimic* se recomandă mai multe substanțe chimice, cari purifică apa. Cele mai bune sunt: *baterea apei cu piatră acră* (alun); pentru aceasta se aruncă piatră acră, pisată, în apă (cam 3 grame la 10 litri) și apoi se bate apa cu un băț, după care apa fie cât de turbure, se limpezește. Ca să nu se turbure apa din nou, când o scoatem, este bine să avem un vas anume făcut pentru aceasta, care să aibă un cep așezat la o înălțime oarecare de fund (10—15 cim.), pe unde să dăm drumul apei, fără ca cea dela fund să se miște și să se turbure, așa că microbii rămân pe fundul vasului. Bateria apei cu alun nu este sigură, căci sunt unii microbi (ai febrei tifoide, ai colerei) cari nu dispar. Mai bun mijloc de cât acesta este *ozonizarea*. Aerul ozonizat (4—6 miligrame ozon la un litru de aer) are o mare putere oxidantă și după vreo 10 minute apa devine sterilă, iar cantitatea de materii organice scade foarte mult. *Filtrarea* apei se face prin aparate speciale, numite *filtre* cari au de scop sterilizarea apei care trece prin ele, în care scop se întrebuințează: cărbune, nisip, porțelan, pietre poroase, etc., cari sunt dispuse în diferite moduri, alcătuind o mulțime de filtre care se găsesc în comerț. Nu e destul ca un filtru să ne dea o apă limpede, ci ca acea apă să nu aibă nici un microb. Prin urmare un filtru bun trebuie să oprească, să rețină toți microbii, iar nu cum se întâmplă cu unele filtre învechite și rău întreținute, cari ne dau o apă și mai bogată în microbi decât apa pusă în filtru pentru purificare. Filtrele trebuie să fie bune și examinate în diferite rânduri pentru a vedea dacă apa ce o dau este bine sterilizată. Chiar dacă apa a fost filtrată, în timp de epidemie, este bine ca la ieșirea din filtru s'o fierbem, pentru mai multă siguranță. In ceace privește *cantitatea* să se bea apă în câtime potrivită, dacă voim ca să avem o bună mistuire; bând prera multă vom suferi de *dispepsie*. Apa *rece*, 4—10°, atâtă pofta de mâncare și ușurează mistuirea; răcirea apei, mai ales în oraș, nu este un lux, ci o trebuință. Apa *prea rece*, de 4°, este vătămătoare, între mese mai cu

seamă când corpul este nădușit și omul stă pe loc. Ea poate da naștere la dureri de stomac etc. Apa caldută este rea în timpul mâncării, ea îngreunează mistuirea; dacă se recomandă băuturile calde la unii cari au mistuirea grea, aceasta se face numai la sfârșitul mesei și sub forma de băuturi preparate cu plante (ceaiu etc.) cari nimicesc efectul apei calde. — În medicină apa se întrebuințează în băi, în dușuri, în spălături într'un cuvânt în idroterapie. Aprovizionarea orașelor cu apă este o chestiune de cea mai mare importanță. Cele mai bune ape pentru aprovizionarea orașelor sunt cele de izvor și apele subterane, sau apele unor locuri de munte. Dar fiind că nu toate orașele pot să-și procure astfel de ape, multe sunt silite să se aprovizioneze cu ape de râuri și fluvii. În acest caz apa trebuie să fie supusă la o purificare serioasă înainte de a fi distribuită locuitorilor. Filtrarea se aplică și la cantități mari de apă, iar filtrele se fac cu nisip. Aceste filtre constau în niște bazinuri mari, de 2000—3000 metri patrați de suprafață, în cari se află de jos în sus: straturi de pietre mari, petriș mare, petriș mic, nisip fin și deasupra apă. Chiar când aceste filtre sunt construite în condițiuni bune, ele nu dau o apă cu totul sterilă, în cele mai bune cazuri ea tot are 30—100 microbi pe centimetru cub, microbi între cari se pot afla și cei producători de boale. Mai bună ar fi sterilizarea apei cu aer ozonizat, deși este mai greu de realizat.

Apă aluminoasă. — V. *Alumen*.

Apă camforată. — V. *Camfor*.

Apă de colonia. — Foarte mult întrebuințată pentru toaletă, iar pentru însușirile ei antiseptice se întrebuințează uneori la legarea rănilor. Ea se compune din: esență de scorțișoară, 1 gr., esență de leventică, de flori de portocale, de rosmarin, din fiecare câte 2 gr., esență de lămâie, de chitră, de bergamotă, din fiecare câte 4 gr.; alcool de melisă și de rosmarin, din fiecare câte 50 gr.; alcool de 90°, 180 gr.; se amestecă și se lasă opt zile, apoi se distilează.

Apă de dinți, apă de gură. — V. *Dentifrice*.

Apă de flori de portocală. — V. *Portocal*.

Apă de gudron. — V. *Gudron*.

Apă de lăptuci. — V. *Lăptuci*.

Apă de laur-ceras. — V. *Laurceras*.

Apă de melisă. — V. *Melisă*.

Apă de mentă. — V. *Mentă*.

Apă de orez. — V. *Orez*.

Apă de orz. — V. *Orz*.

Apă de plumb. — V. *Plumb*.

Apă de Sedlitz. — În Boemia este o apă naturală, cu acest nume, dar nu se exportă. În farmacie prin apă de Sedlitz se înțelege o soluție de 30 gr. de sulfat de magnezie (sare amară), 4 gr. de bicarbonat de sodă, 4 gr. de acid tartric la 600 gr. apă. Este un purgativ bun; are singurul cusur de a fi în cantitate prea mare și greu de înghițit.

Apă de Seltz. — V. *Apă gazoasă*.

Apă de trandafir. — V. *Trandafir*.

Apă de var. — V. *Calce*.

Apă feruginoasă. — Bătură întăritoare care se face cufundând în apă de mai multe ori o bucată de fier înroșit în foc, sau lăsând să stea în apă niște cue ruginite, iar când se bea apa trebuie mai întâi bătută, apoi se pune în vas altă apă în locul celei băute. Este un bun medicament pentru cei săraci.

Apă gazoasă. — Se fabrică în industrie încărcând apa cu acid carbonic sub o presiune de 7 atmosfere. În casă se prepară foarte repede cu ajutorul unui aparat numit *gazogen*. Acest aparat se compune din două vase puse unul deasupra celuilalt. Vasul de jos comunică cu cel deasupra numai printr'un tub (o țevă) care merge până la partea de sus a vasului. În vasul de jos se pun 21 gr. de bicarbonat de sodă și 18 gr. de acid tartric, sau 30 gr. de bisulfat de potasă și 30 gr. de bicarbonat de sodă. Îndată se dezvoltă o mare cantitate de acid carbonic, care merge prin țevă în vasul de sus și se amestecă cu apa care se găsește în acel vas. Apa gazoasă întetește pofta de mâncare și ușurează mistuirea, dar nu trebuie s'o întrebuințăm decât numai atunci când lipsa de poftă de mâncare nu se însoțește de dureri de stomac. Oamenii bolnavi nu trebuie să bea apă gazoasă. Pentru convalescenți și oameni nervoși este

APĂ

bună; cei sănătoși să nu bea decât foarte rar, când apetitul lăncezește, și să nu-și facă obiceiul de a bea în fiecare zi.

Apă la cap. — V. *Idrocefal*.

Apă la inimă. — V. *Idropericard*.

Apă la plămâni. — V. *Idrotorax*.

Apă lui Goulard. — V. *Plumb*.

Apă lui Rabel. — V. *Sulfuric*.

Apă oxigenată. — V. *Oxygen*.

Apă sedativă. — Se prepară din amoniac lichid 60 gr., alcool camforat 10 gr., clorur de sodiu (sare) 60 gr., apă 1000 gr. Această apă se întrebuințează mai mult pe din afară în contra loviturilor, a durerilor nevralgice și reumatice, în spălături la înțepăturile de insecte (țânțari, etc.), la mușcături de reptile. Se întrebuințează în durerile de cap, în migrenă, aplicând-o pe cap sub formă de comprese înmuiate, dar în aceste cazuri este bine să se îndoiască cu apă ca să nu irite pielea. Pe dinăuntru se dă în doză de câteva picături într'un pahar de apă ca stimulent.

Apă sulfuroasă. — V. *Ape minerale*.

Apă tare. — V. *Nitric* (Acid).

Aparate (*apparatus*, dela *ad*, la, *para*, a pregăti, a prepara). — Când

se rupe un os, în două sau mai multe bucăți, acestea trebuiesc puse la locul lor și pentru ca ele să stea pe loc și nemișcate, până când osul se fierbe și se întărește, trebuie să aplicăm un *aparat*, o legătură potrivită. Pentru a face un aparat trebuie să avem mai multe lucruri, și anume: niște lopățele sau *atele*, cari de obicei sunt de lemn, cum e o șindrila (draniță), dar mai bune sunt cele făcute din stejar, cari se pot îndoi fără să se rupă ușor. Aceste atele trebuie să aibă o grosime de 3—5 milimetri, de diferite lățimi și lungimi, după trebuință, dar în tot cazul ele trebuie să fie mai puțin



Fig.—23. Braț legat în ate și sprijinit în eșarfă

APAR

late decât membrul pe care se aplică și puțin mai lungi decât el. Marginile și capetele trebuie să fie netezite pentru ca să nu rănească pielea. De altfel nu se aplică mai nici odată până ce nu s'au îmbrăcat cu un străt subțire de vată, iar pe deasupra o cârpă. Mai avem trebuință de niște *perinițe*, făcute din pânză și din vată, a căror mărime variază după necesitate și cari au de scop să adăpostească membrul bolnav și să mai domolească apăsarea făcută de atele, cari vor ține membrul în poziție bună; apoi totul va fi ținut pe loc și strâns potrivit, cu ajutorul unor *feși*, sau *șireturi*.

— Aparatele pot fi *amovibile* și *inamovibile*. Cele dintâiu sunt făcute din lucrurile mai sus descrise, cari se pot face și desface cu ușurință și ori de câte ori este trebuință. Ele sunt simple și ușor de făcut, însă sunt mai supuse la mișcări sau dislocări. Aparatele *inamovibile* sunt acele cari țin în nemișcare, imobilizează, părțile într'o învelitoare permanentă, făcută dintr'o substanță care întărește, se solidifică, și cu care se ung feșile pe deasupra cum sunt:

ghipsul, *dextrina*, *scrobeala*, *gelatina*, *gutaperca*, *silicalul de potasă*. De altfel toate aparatele acestea trebuiesc aplicate de către doctor și prin urmare nu mai este trebuință să stăruim asupra lor. Dar până să vină doctorul și până să ne procurăm cele trebuincioase pentru facerea unui bun aparat, nu trebuie să lăsăm bolnavul în suferință, fără să-i aplicăm, în mod *provizoriu* o legătură, care să-i țină mâna sau piciorul într'o poziție bună și în nemișcare, ceea ce-i micșorează mult durerile. Ne vom servi pentru aceasta de ce aveam la îndemână, vom lua 2 sau 3 perini sau perinuțe, pe cari vom pune, dacă avem, o mușama sau orice stofă impermea-




Fig. 24.—Bandaj Pentru fractura gambei, improvizat din bastoane

bilă (pânză cerată sau gutapercă), apoi vom pune membrul bolnav pe aceste perini, într'un plan puțin înclinat, așa că mâna să fie mai sus de cât brațul și piciorul mai ridicat decât coapsa. Pentru ca membrul să nu se miște vom trece pe sub perine niște șervete, sau batiste, pe cari le vom înoda pe deasupra, așa că membrul va sta pe perină ca într'un *igheab* (gutieră). Avem astfel un aparat destul de bun până la sosirea doctorului, care va examina cazul cu deamănuntul și va aplica un alt aparat mai bun.

Apatie. — V. *Toroșeală*.

Ape minerale. — Aceste ape naturale se întrebuințează ca tratament preventiv și curativ, din cauza constituției lor și a însușirilor speciale. Ele se mineralizează prin sărurile cu cari se încarcă în drumul lor pe sub pământ, iar temperatura lor rezultă din adâncimea din care ele pleacă (un grad la 33 metri). Apele minerale se numesc *reci* când temperatura lor nu trece de 20°, iar *calde* sau *termale* când ele au o căldură mai mare de 20°. Cele mai multe se întrebuințează ca *băutură*, fie pe loc, fie la o depărtare oarecare de locul lor de origine și sub formă de *băi*, *dușuri*, *pulverizațiuni* și *inhalațiuni*. Orice apă minerală trebuie privită ca adevărat medicament, cu indicațiile sale bine hotărâte, foarte bună când este bine și la timp întrebuințată, periculoasă când este întrebuințată fără socoteală și fără rost. O *apă de masă*, cât de nevinovată ar fi în aparență, dacă este luată numai de plăcere sau numai din spirit de imitație, fără nici o trebuință vădită, poate cu timpul să facă rău. O cură făcută într'o stațiune oarecare este folositoare nu numai prin puterea apelor, ci și prin faptul că pacientul este departe de ocupațiunile sale zilnice, ducând o viață liniștită, odihnă și schimbând în același timp aerul. Cura se va face *întocmai după prescripția doctorului*. Băile de asemenea se vor face după ordonanța medicală; ele să nu fie mai calde, nici de durată mai lungă, căci orice abatere dela prescripție poate să fie vătămătoare. — După compoziție apele minerale se împart în: *Ape salină*, cari conțin principii clorurate, în special clorur de

sodiu, din care cauză lucrează ca reconstituante, bune pentru scrofuloși. Apele salină se împart în: ape *cloruro-sodice simple* (Jitia, Ocnele-Mari, Oglinzi, Ocna Sibiului, Sărata-Bacău, Slănic-Prahova, Tazlău, Telega-Doftana); — ape *cloruro-sodice polimetallice* (Băltătești); — ape *cloruro-sodice iodurate superioare* (Meledic, Nastaschi, Sărata-Monteroru); — ape *cloruro-sodice bogate în iod* (Govora, Vulcan, Olănești.); — mai sunt *apele lacurilor și bălților sărate* (Balta Albă, Lacul Sărat, Amara, Techirghiol). Despre acțiunea acestor ape să se caute la numele fiecărei stațiuni. — *Ape alcaline*, cari conțin bicarbonat de sodă simplu sau asociat cu bicarbonat de calciu, sau cu clorur de sodiu (alcaline clorurate), sau cu sulfat de sodă (alcaline sulfatate), stimulează secrețiunea sucului gastric, emulsionează grăsimile în intestin, măresc activitatea respiratoare prin acțiunea lor asupra globulelor de sânge. La noi în țară avem astfel de ape la: Sângeorjul, Căciulata, Cozia, Borsec, Tușnad, Slănic-Moldova, Bodoc, Malnaș, Buziaș, Vatra-Dornei. Apele acestea lucrează în boalele de stomac, de ficat (nisip și pietricele), contra obezității, gutei, diabetului, gravelei urice (nisip la rinichi) și catarului beșicii urinare. Nu sunt bune în boalele de inimă, cancer, în oftică. — *Ape sulfuroase*, cari conțin ca principiu dominant sulfur de sodiu, sau sulfur de calciu. Aceste din urmă se mai chiamă și idrosulfurate, fiindcă conțin între altele idrogen sulfurat liber. Modul de întrebuințare este: băutură, gargarisme, băi, jumătate de băi, băi de piscină, băi de aburi, dușuri, inhalații, pulverizații, etc. Se recomandă în reumatism muscular și articular, scrofula, boale de piele (eczemă, acnee, herpes), boale cronice de nas, de gât, bronhii și plămâni, de urechi, de mîtră, de beșică, de stomac și intestine. Nu sunt bune pentru persoanele prea nervoase, supuse la congestiuni și la emoragii, în boalele de inimă, în cancer, oftică. — *Ape fieruginoase*, cari conțin fier sub formă de bicarbonat, unele reci gazoase, altele reci negazoase și altele calde. La noi avem astfel de ape la: Slănic-Moldova, Strunga. Modul de între-

APE

buintare: băutură, băi, dușuri. Se recomandă în anemie, debilitate, convalescență, neurastenie, dispepsie. — *Ape arsenicale*, cari conțin arsenic sub formă de arseniat de sodă sau arseniat de fier. Modul de întrebuințare: băutură, gargarisme, inhalțiuni, pulverizațiuni, băi, dușuri. Se recomandă în catarul căilor respiratoare, astmă, scrofule, oftică la început, limfatism, boale de piele, friguri palustre. Nu sunt bune în boalele de inimă, cu congestiuni și emoragii, la cei nervoși, la gută. — *Ape termale* simple, a căror mineralizare este foarte slabă și a căror acțiune se datorește gradului lor de căldură. La noi avem astfel de ape la: Herculane, Băile Episcopale și Felix de lângă Oradea, Mangalia, Star-Chiojd. Modul de întrebuințare: băi simple, de aburi, de etuve sau de piscină, dușuri. Se recomandă în reumatism cronic, boale de femeii, anemie, limfatism, boale de piele. Terminând vom spune cetitorului să nu se mărginească la cetirea acestui articol, pentru a-și alege apa minerală, sau stațiunea balneară de care are trebuință. Se va adresa doctorului său de încredere, care, cunoscându-i bine constituțiunea și boala de care suferă, îi va prescrie ceea ce are de făcut. Ceeace am dori să rețină fiecare cetitor e că în țara noastră avem ape minerale cel puțin tot așa de bune ca în oricare altă țară din Apus, deci bolnavii n'au de ce să-și mai cheltuiască banii peste hotare. Despre ape minerale vom mai vorbi, când vom descrie fiecare stațiune în parte.

Ape stătătoare. — V. Mlaștină.

Appendice (*appendix*, dela *ad*, la, și *pendere*, a atârna). — Acest appendice, așa de vestitpr în răutatea lui, este o prelungire foarte îngustă a unei părți a intestinului gros, a *cecului* (unde se unește intestinul subțire cu cel gros), din care cauză i se zice *apendice ileo-cecal*. Calibrul lui este aproape ca al unei pene de scris; forma lui este cilindrică, semănând cu un vierme, din care pricină se mai numește și *apendice viermicular*; lungimea sa variază dela 4 până la 12 ctm.; direcțiunea e de obicei flexuasă; cavitatea, lui foarte strâmtă, comunică cu cecul prin-

APEN

tr'un orificiu cam de $\frac{1}{2}$ ctm., care adeseori este astupat, în parte, printr'o îndoitură.

Appendicită. — Constă în inflamația apendicelui ileo-cecal. Frecvența ei poate fi datorită în parte și epidemiilor de *influență*, cari sunt așa de dese la noi. — **Cauzele.** sunt mai multe: astuparea apendicelui cu o pietricică (*calcul*), care se formează înăuntrul lui, din materii fecale și săruri minerale (carbonate și fosfate de calciu). Astuparea mai poate fi produsă prin inflamația păreților, datorită întinderii inflamației intestinului (*enterită*), mai cu seamă a celei pseudo-membranoase. Appendicita mai poate proveni dintr'o sugrumare (*strangulație*) a apendicelui, angajându-se în vreo rupătură a peritoneului ea mai




Fig. 25—Apendice



Fig. 26. — Apendicele

poate fi produsă prin prezența unui vierme (limbri, *oxiuri*, *tricocefal*). Intre cauzele *pre-dispunătoare* avem în primul loc *artrismul*; pietricelele (*calcul*) apendicelui sunt a cele cari se ivesc mai de timpuriu, de aceea și apendicita se observă des la copii și se produce la diferiți membri ai aceleiași familii, mai ales la acele în cari se observă colicele de ficat, sau de rinichi. Apoi *sarcina* (graviditatea) pre-dispune la calculi de ficat, cari cad în intestin și de aci ajung la apendice. *Constipația* obișnuită, înghițirea sâmburilor de mere, pere, struguri, a bucăteleurilor de smalt, cari se iau de pe vas și se amestecă cu mâncarea, perisorii dela peria de dinți, pot fi punctul de plecare al unei apendicite. Diferite boale infecțioase generale, mai cu seamă *influența*, *febra tifoidă*, oftica

pojarul, probabil prin rămășițele de microbi pe cari aceste boale le lasă în pereții intestinului, pot fi de asemenea cauza ei. — *Semnele* acestei boale sunt: Ivirea unei *dureri* în partea de jos din dreapta pântecelui (fosa iliacă) la o distanță egală între buric și creasta șoldului, pe linia care le unește, du-




Fig. 27. — Deschiderea normală a apendicelui

- 1 = intestinul subțire
2 = trecerea în intestinul gros
3 = legătura cu apendicele

rere de multe ori foarte mare. În dreptul durerii mușchiul de sub piele este mai tare, mai întins și pielea sensibilă, la cea mai mică atingere este dureroasă. Pântecelul în acea parte este mai tare, prezintă un fel de *împăstare* care se simte bine la pipăire. Bolnavul are febră de 38—39°, greață și



Fig. 28 — Apendice strangulat

vărsături; la cea mai mică mișcare durerea crește. Această stare durează mai multe zile, după care, dacă boala merge spre bine, urmează vindecarea. Dacă însă boala merge spre rău, începe să se facă puroiu, o complicație foarte gravă, mortală. *Tratament.* Repaus în pat, în nemișcare, dietă aspră: lapte și băuturi reci, luate în cantități mici (câte o lingură la fiecare sfert de oră). Se va aplica puna cu ghiată pe partea bolnavă în permanență. *Nu se vor da purgative.* Dacă în 24 ore maximum boala nu se îndreptează spre bine, ci dimpotrivă se agravează, febra crește și ră-

mâne tot mare (39°), dacă pântecelul se umflă, atunci de sigur că s'a făcut *puroiu*, și în acest caz trebuie cât se poate de iute să i-se dea drumul, să se deschidă cavitatea cu puroi, să se deșerte și spele cu o soluție antiseptică, să se dreneze, aplicând un pansament bogat pe de asupra, care se va schimba zilnic, până la vindecare; toate acestea le face medicul. Dacă apendicita nu face puroi și se vindecă, pentru ca boala să nu mai revie, după cum are obiceiul, se recomandă ca după 5—6 luni să se facă *operația* scoțându-se apendicele. E bine să se facă operație imediat, chiar în momentul accesului. — În timpul convalescenței, când nu s'a făcut puroiu, se va grăbi rezorbția resturilor inflamatorii cu ajutorul oblojelilor calde, cu clistire emoliente și laxative ușoare. S'au descris cazuri de apendicite familiare datorite oxiurilor, pe cari îi aveau toți membrii familiei, în cât e bine să fim atenți și la această posibilitate și într'o asemenea împrejurare să se trateze toți ai casei contra viermilor.

Aperitive (*aperitivus*, dela *aperire*, a deschide). — Toate aperitivele spirituoase nimicesc sucurile stomacului (gastric și pancreatic) cari înlesnesc mistuirea și dau naștere la durere de cap și la urdinare, deci să nu bea nimeni aperitive alcoolice, fiind vătămătoare sănătății. Pofta de mâncare poate fi deschisă prin alte mijloace igienice, sau medicamentoase, cari sunt vrednice de a fi numite *aperitive*. Dacă apetitul scade ne vom sili să-l redeștepte prin diferite *exerciții fizice*; se va *scula de dimineață*, și va *umbla* mai mult în timpul zilei și atunci desigur că vom mânca cu poftă bună. Dacă apetitul nici cu aceasta nu se deșteaptă va căuta să *schimbe aerul*, dela oraș se va duce, pentru un timp oarecare, la țară sau pe malul mării. Acestea sunt mijloace mai bune pentru a deschide pofta de mâncare, decât băuturile alcoolice cari strică sănătatea. Întru cât privește *aperitivele medicamentoase*, ele sunt foarte numeroase și aparțin clasei substanțelor *amare*: *chinchina*, *gențiana*, *cojile de portocale amare*, *reventul*, *pelinul*, *hameiul*, etc. (vezi aceste cuvinte și *Amare*). Toate

acestea deschid apetitul și înlesnesc mistuirea. Cele mai multe se întrebuințează în diferite băuturi sau în vin, cari trebuiesc luate reci, cu lingura sau păhăruțul, cu o jumătate de ceas înainte de mâncare, dar nu e bine să se abuzeze nici de acestea, ci să se ia numai din când în când, la adevărată trebuință. Berea mărește apetitul, dar și ea trebuie luată rar și în măsură mică, fiindcă predispoze la îngrășare și are alcool (v. Bere).

Apetit, poftă de mâncare. — Când suntem sănătoși și a trecut câțva timp fără să mâncăm, începem a simți ceva deosebit, care pleacă dela stomac și care ne îndeamnă să-i dăm mâncarea trebuincioasă, pentru a repara puterile pierdute. Dacă simțirea aceasta stă numai în dorința de a mânca, dorință care vine dela sine, nedureroasă, și care poate fi atârțată prin vedere, miros, sau numai prin aducere aminte de oarecari bucate, atunci vom zice că avem poftă de mâncare sau *apetit*. Dacă nu îndestulăm această simțire ea se schimbă într-o adevărată *trebuință* de a mânca, însoțită de o suferință mai mult sau mai puțin mare și pentru care toate mijloacele de a o îndestula sunt bune, atunci avem *foame*. Cum putem să păstrăm acest apetit, această fericită *poftă de mâncare*? Mai întâiu este neapărat trebuincios să păzim o regulă la mâncare: să mâncăm în totdeauna la acelaș ceas; dela o masă până la cealaltă să treacă un timp îndestulător; să nu mâncăm mai mult la o masă decât la cealaltă, nici mai mult astăzi decât ieri. Pentru ca apetitul să se păstreze, trebuie ca și bucatele să se mai schimbe, să fie variate, căci tot una și aceeași mâncare te obosește și desguștă. Este bine să ne luăm după gust în alegerea mâncărilor, pe cât ne este cu putință, căci o mâncare dorită se mistue mai bine. La bolnavi, în timpul boalei, sau după boală, nu este bine să le dăm mâncări ce nu le plac și de cari au scârbă, ci să ne luăm după gustul lor, dacă mâncările dorite de ei nu sunt oprite de doctor. Altă regulă pentru a nu ne strica pofta de mâncare este să nu ne sculăm de la masă cu totul sătui, sau prea sătui, ceea ce ne-ar aduce turburare în mistuire; să mân-

căm numai cât ne trebuie. Pofta de mâncare să fie îndestulată în marginea unei bune mistuiri, după cum ne povățuiește și bunul simț și practica zilnică, pentru că fiecare din noi știe cât îi poate stomacul. Să facem exercițiu, sau plimbări în aer curat regulat în fie-care zi, între mese. Se mai poate mări sau desțepta pofta de mâncare luând înainte de mâncare, cu un ceas, un pahar de apă de băut, sau picături amare (v. Amare, *Aperitive*). Sunt unele persoane cari, deși slabe din firea lor, mănâncă prea mult, peste măsură. Aceste persoane trebuie să caute cu orice preț să-și înfrâneze pofta prea mare, dacă voesc să aibă stomac sănătos. Tot astfel trebuie să facem ori de câte ori avem un apetit prea mare în urma unei oboșeli, a unei munci, a unei vânătăi sau a unei urcări pe munte. Oamenii cari au fost bolnavi de o boală lungă și grea, în timpul căreia nu puteau mânca, sau nu li se da de mâncare trebuie să se stăpânească, sau să fie stăpâniți și să nu li se dea de mâncare prea mult odată. Uneori creșterea apetitului este cu adevărat bolnăvicioasă și în acest caz nu mai poate fi vorba de apetit, ci de adevărată foame, nesfârșită și nesăturată, care se numește *bulimie*, care nu este o boală de sine stătătoare, ci un semn al altor boale, cum sunt: diabetul (boală de zahăr), nebunia, isteria, viermii intestinali; pentru a scăpa de bulimie trebuie să ne vindecăm de boala care o produce. Micșorarea și pierderea apetitului. Adeseori se întâmplă că apetitul se micșorează, sau chiar se pierde și constituie ceea ce se chiamă *inapetență*, care, ajungând în grad mai mare, se însoțește chiar de un *desgust* de mâncare, care rezultă uneori dintr'o osteneală, din excese, sau dintr'o simplă influență a anotimpului. De multe ori la începutul primăverii, când se ivesc cele dintâiu călduri, funcțiunile digestive lăncezesc, stomacul devine leneș, ceea ce strică gustul și micșorează, sau nimicește apetitul. Când lipsa de poftă de mâncare se însoțește de fierbințeală, sau de alte semne venite de odată, ea arată că are să se ivească o boală grea (o aprindere de plămâni, de stomac ori de mățe, o lingoare, etc.). In aceste îm-

prejurări am face foarte rău dacă am încerca să redeşteptăm apetitul, care va dormita în tot timpul cât va ține fierbințeala. Lipsa de apetit poate să persiste în cursul convalescenței, după o boală lungă și grea. — *Perversiunea apetitului*. Cei ce suferă de dispepsie (mistuire grea), femeile tinere și clorotice, isterice, sau însărcinate, nebunii, au câte odată apetitul și gustul corupte și atunci avem: 1. *Malacia* sau dorința de a mânca alimente neobișnuite (sare, piper, muștar, castraveți, etc.). 2. *Pica* sau dorința de a mânca lucruri cari nu se mănâncă (pământ, cărbune, tencuială de pe zid, cerneală, cleiu, insecte, etc.). 3. *Omo-fagia* sau dorința de a mânca alimente crude; carne crudă, etc. Pentru a combate această perversiune a gustului trebuie să ferim bolnavul de lucrurile după cari aleargă și să combatem boala, care produce această stare de multe ori așa de desgustătoare.

Apetit (Lipsă de). — V. *Anorexie*.

Apiol. — Lichid uleios extras din fructele de *pătrunjel*. Dacă se dă în doză de 1 sau 2 grame combate frigurile (*febrifug*), dacă se dă în doză de 24—30 ctgr., în capsule gelatinoase, lucrează ca *emenagog*, adică înlesnește venirea regulilor (a menstruației), la femeile la care întârzie.

Apium petroselinum. — V. *Pătrunjel*.

Aplecate, *ciumurluială*. — Se zice de cineva că i s'a *aplecat*, atunci când a mâncat prea mult, sau a mâncat ceea ce nu-i place și îi vine rău, cu greață (v. *Indigestie* și *Otrăvire*). — La *țară* se freacă tot corpul cu oțet, cu usturoiu pisat, pe mâini și la încheieturi. Ca să se răcorească îi se dă bolnavului ceaiu de izmă, iar la buric i se pune ceapă pisată, sau izmă cu oțet, pe frunte îl trage cu oțet de trandafiri, îi sucește buricul cu două degete, îl trage pe la mâini, pe la frunte cu oțet ori numai cu apă sau cu scui-pat și îi descântă de *aplecate*.

Apomorfina. — Rezultă din încălzirea la 150°, în tuburi închise, a morfinei cu 10 sau 20 de ori greutatea ei de acid cloridric. Ea lucrează ca vomitiv (producând vărsături), ca expectorant și ca contra-stimulent. E un medicament *periculos*. Se dă în injecții

subcutanate (1—1½ ctgr.) și înbăutură, sau în clistere (10—30 miligrame).

Apoplexie (gr. *apoplissein*, a isbi de stupeoare), *săgetătură*. — Această boală se deosebește de *epilepsie* (boala copiilor), fiindcă în minutul căderii bolnavul nu dă nici un țipet și n'are spasme (convulsii). Se deosebește de *sincopă* (leșin), fiindcă inima îi bate tot cu așa putere ca și în stare de sănătate. Se deosebește de ruptura unui *anevrism* din piept, căci el nu varsă sânge pe gură. Omul lovit de săgetătură cade jos fără să mai miște; toți mușchii îi sunt paralizați, când îi ridici o mână și o lași cade ca moartă, tot așa picioarele. Dacă paralizia a atins mâtele și beșica, bolnavul se pune pe el și cu treaba mare și cu treaba mică; dacă îl înțepi nu simte, dacă îi apropii o lumânare de ochi nu face nici o mișcare; fața îi este roșie, tot așa și ochii; respirația e sgomotoasă, sforăitoare; uneori are vărsături. Această stare poate dura un timp foarte variabil, dela câteva minute până la mai multe ceasuri. Unii bolnavi nu-și mai vin în fire, ci mor, atunci apoplexia se numește *fulgerătoare*: alții mor după 2 sau 3 zile, de asemenea fără să-și mai revie. În alte cazuri cunoștința revine după câteva minute, tot așa și simțirea, dar bolnavul rămâne cu o jumătate a corpului damblagită, paralizată (*emiplegie*). Această paralizie poate să dispară și ea, după câțva timp, sau să rămână definitivă, până la sfârșitul vieții. Această stare provine dintr'o boală foarte gravă de creeri, cele mai adeseori o *emoragie*, adică o revărsare de sânge la creeri, prin ruperea unei artere. *Emoragie cerebrală*, sau *apoplexie cerebrală* înseamnă același lucru, adică o revărsare de sânge în creeri, sau la suprafața lor. — *Cauzele* sunt boalele de creeri: congestiunea (îngrămădirea de sânge), înmuiera creerilor, sifilisul, alcoolismul, arterio-scleroza. — *Tratament*. După ce s'a ridicat bolnavul de jos și a fost așezat în pat, trebuie desbrăcat, deschiat la haine, descins de orice legătură pentru ca respirația să nu-i fie supărată. Odaia este bine să fie cât se poate de mare, ferestrele deschise ca să vie mult aer

curat, proaspăt; se curăță corpul de orice murdărie. Apoi ne vom sili să tragem sângele dela cap în jos spre picioare, punând capul sus, pe mai multe perini, gheață la cap și lucruri calde, sau muștare, la pulpe și picioare; se va aplica un clistir purgativ, preparat din ceaiu de siminichie (15 gr. la 500 apă), în care se pun și 25 grame de sulfat de sodă, sau de sare amară; dacă bolnavul poate înghiți i se va da un purgativ mai tare. Tot la început se vor aplica lipitori după urechi (10—15) sau, dacă bolnavul este sângeros, să i se lase sânge din vâna dela braț. *Regim*: lapte și zeamă de carne. Pentru *emiplegie* (damba în jumătatea corpului,) se recomandă electricitatea, masajul și injecțiile cu strichnină. Pentru a evita un al doilea atac de apoplexie se recomandă să se facă un tratament general al arterio-sclerozei, să se evite variațiile bruște ale tensiunii arteriale, să se oprească munca cu creerii, să se ocolească emoțiile vii, trecerile repezi dela o temperatură caldă la una prea rece. Să nu se facă o căldură prea mare în camere, vara să se evite acțiunea prea mare a razelor solare asupra capului, să se oprească excesele de orice natură și să nu se mănânce mult la masă, mai ales seara înainte de culcare, să se oprească băuturile alcoolice, să se evite excitațiunile, stomacul să fie în totdeauna liber. Să nu se frecventeze adunările numeroase în localuri rău aerate (cafenele, teatre, baluri, etc.), făcând în fiecare zi exerciții sau plimbări îndestulătoare și potrivite după starea fiecăruia. — În *poșor* babele tratează săgetătura cu buruieni strânse în ziua Crucii, pe cari le fireb și cu zeama lor spală bolnavul pe locui săgetat, mână și picior.

Aprindere. — V. *Inflamație*.

Apucat (de epilepsie, etc.). — V. *Acces*.

Aramă. — V. *Cupru*.

Arăriel, arățiel, limba câinelui, pleșcaii roșie. (*Cynoglossum officinale*, fam. Boraginaceelor). — Plantă erbacee cu miros greu, cu rădăcină cărnoasă în forma fusului; florile roșietice închise, mai rar albe; crește prin locuri necultivate, pustii și pie-

troase, pe coline uscate, pe lângă drumuri și cu deosebire pe un pământ calcaros. Rădăcina de arăriel trecea altă dată ca având acțiune *narcotică*, în realitate însă *pilulele cu cinoglos*, sau arăriel, cari se găsesc în farmacie, își dătoresc lucrarea lor calmantă și somniferă *extractului de opiu* pe care îl conțin (2 ctgr. de pilulă) și pulverii de sămânță de iosciam (măsălarită)..

Arățel. — V. *Limba mielului*.

Archis. — V. *Ienupăr*.

Ardeiu, paprică, piper roșu, piparcă (*Capsicum annuum*, din fam. Solanaceelor). — Plantă erbacee originară din America tropicală (Brazilia și Mexico), introdusă în Europa prin veacul XVI, unde se cultivă foarte mult ca plantă culinară. În bucătărie se întrebuințează fructele ca condiment și pentru salată. În medicină se întrebuințează ca stimulent și rubefiant (înroșește pielea). Pe *dinăuntru* se dă ca stimulent sub formă de: praf, 50 ctgr. până la 2 gr.; extract apos, 30—60 ctgr.; tinctură, 10—30 picături. Pe *dinafară* se întrebuințează pentru căderea părului în fricțiuni (10 gr. de tinctură la 100 gr. alcool). S'a recomandat și contra *trânșilor* (emoroizilor) sub formă de *extract*, 40 ctgr. pe zi în hapuri. Dacă se pune pe piele o înroșește și ridică beșici ca o vezicătoare, de aceea la *fară* se întrebuințează la junghiu și la orice durere, singur sau amestecat cu rachiu. Vin fiert cu ardeiu și cu zahăr se bea cald ca să provoace înădușeală (transpirație). Pentru friguri se bea un pahar de vin roșu, în care se pune o lingură de ardeiu roșu pisat, sau se mănâncă ardei roși, copti (spuziți) în cenușă.

Arderea cadavrelor. — V. *Cremațiune și Incinerațiune*.

Arenal, metilarsinat de sodă. — Succedaneu al cacodilatului de sodă, care nu poate fi dat în băutură și în injecții sub piele. Arenalul este mai puțin toxic și poate fi dat sub orice formă. Se dă 4—5 zile de arândul apoi se lasă tot atâtea zile repaus. Dă bune rezultate și în frigurile *palustre*, întovărășind chinina; se mai recomandă în oftică, bronchitele cronice, gripă, leucemie, anemie pernicioasă, vârsăturile sarcinei, etc. Doză: 25—50 mgr.

pe zi, până la 10 și chiar 15 ctgr., în paludism.

Aretel. — Caută la *Limba mielului*.

Argent (azotat sau nitrat de), *piatra iadului*. — La o temperatură de 190° nitratul de argint se transformă într-o masă topită ce curge ca uleiul și care se toarnă în forme puțin încălzite, de unde, după răcire, se obțin bețișoare albe sau cenușii, cari se tocesc în părți egale de apă rece și caldă. *Proprietăți*: antispasmodic, antiflogistic, caustic. *Doză*; pe dinăuntru 1 până la 10 ctgr.; în clistere 5—10 ctgr. (copii), 15—20 ctgr. (adulți). Pe din afară: colir (picături de ochi) 1—2 gr. la 100. Când o rană este urită și merge încet spre vindecare o ardem cu un bețișor de piatra-iadului. *Otrăvirea cu nitrat de argint* are ca semne: vărsături alburii, cari se înegresc la aer. Pentru a o combate vom da bolnavului să bea apă sărată multă, apoi vomitive, apă albinoasă (cu albuș de ou). — În *popor* se întrebuințează ca *prezervativ* în contra tuturor boalelor, dar numai pe din afară; copiilor li-se face cu piatra iadului câte un semn pe frunte, pe pânțele, în jurul umflăturilor, ca să nu se întindă mai departe; tot așa la brâncă.

Argent (Albuminat de). — V. *Protargol*.

Argent viu. — V. *Mercur*.

Argirol. — Este o combinație de argint foarte utilă. Are culoarea neagră și conține 30% argint. Se întrebuințează mult în tratamentul bolilor de ochi (ulcere corneene, conjunctivite infecțioase etc.) în soluție de 15—20% și în injecții intrauretrale, în bleonoragie.

Argiroză. — Se cheamă colorația pielei, sau a conjunctivelor, datorită întrebuințării îndelungate a sărurilor de argint. Dacă, de pildă, i se instilează unui bolnav vreme îndelungată nitrat de argint, în ochi, conjunctivele se colorează în negru, sau cenușiu și colorația aceasta persistă multă vreme.

Argonină (Caseinat de argint). — Are proprietăți antiseptice și omoară microbii ca și nitratul de argint, fără însă ca să fie caustică.

Arigan. — V. *Sovârv*.

Arior. — V. *Lăptele câinelui*.

Aripane. — V. *Ridiche*.

Aristochinină. — V. *Chinină* (Carbonatul de chinină).

Aristol, timol biiodat. — Un praf antiseptic ca și iodoformul: se întrebuințează la legarea rănilor, simplu sau amestecat cu alte medicamente: aristol 6 gr., subnitrat de bismut 8 gr., acetanilidă 30 gr., pentru pansament uscat la orice răni cari merg încet. Pentru boale de piele, în special în *psoriază* se dă pentru uns: aristol 5 gr. colodiu 50 gr.

Aritmie. — În mod normal inima bate după o anumită regulă. Orice turburare în ritmul ei, deci orice abatere dela regula normală, se cheamă aritmie.

Arm. — V. *Coapsă*.

Armata. — V. *Soldat*.

Arme de foc. — Rănilor, sau plăgile prin armă de foc, se deosebesc de celelalte răni prin faptul că ele au adeseori un corp străin în adâncimea lor, glonte sau sburătură, sau, dacă glonțul a eșit, rămâne în rană o bucată de haină, de cămașă, sau alte murdării aduse de glonț. Plăgile prin armă de foc produc repede o stare de sfârșeală generală, cu slăbiciune și după câțva timp (ore sau zile) dau naștere la febră, agitație și chiar aiurare. În cazurile de rănire prin armă de foc se va încerca să se scoată glonțul, sau sburătura din rană, lucru de multe ori foarte greu și uneori chiar cu neputință, în care caz se va mulțumi să spele și să desinfecteze rana bine, apoi să aplice un pansament, până la vindecare.

Armurar. — V. *Pustula Malignă*.

Arnea. — Este un bun aliment, foarte bogat în vitamine, conținând partea germinativă din semințe și spanac crud, săruri minerale, etc. Se recomandă în tuberculoză, pelagră, anemii pronunțate, în oboseală fizică și intelectuală, în convalescență. Se administrează sub forma de: pulbere sau bomboane, la copiii sub 5 ani 3—4 bomboane zilnic, sau 1—2 lingurițe de cafea, de pulbere; la adulți dozele se pot da duble.

Se poate lua sau în pulbere curate, sau în apă, lapte, cafea.

Arnica, carul pădurilor, carul zănelor, podbal de munte (*Arnica mon-*

lana, fam. Sinanterelor). — Plantă erbacee indigenă, care crește prin fânețele și pășunile umede. Rădăcina, frunzele și mai cu seamă florile se întrebuințează în medicină ca stimulente energice ale sistemului nervos, vomitive (cari fac vărsături), febrifuge, tonice și pe din afară pentru legarea rănilor. *Modul de întrebuințare*; pe *dinăuntru* sub formă de *ceai* 2—5 gr. la 1000, de *praf* 25—50 ctgr.; pe *dinafară*: *tinctură* 1—2 gr. sau *zeamă* de arnică 5 gr. la 1000.

Aron. — V. *Rodu pământului*.

Arpăcaș. — V. *Orz*.

Arsenic (dela grec. *arsenicon*, care vine dela *arsin*, bărbat). — Arsenicul se întâlnește în natură în stare născândă, dar mai adese ori în stare de sulfură, sau de arseniură metalică (cobalt sau nichel). Se află în mici cantități și în unele ape minerale. În medicină nu se întrebuințează arsenicul în natură, ci numai unele preparațiuni sau combinațiuni ale lui, toate otrăvuri foarte puternice și care sunt în același timp și medicamente foarte folosite, întrebuințate bine și în cantități potrivite. — Intre preparațiunile mai întrebuințate avem: *Acidul arsenios*, care este cel mai activ și se prezintă sub forma unui praf alb, numit și *șoricioaică*, din cauză că se întrebuințează la omorârea șoarecilor, punându-se de obicei în mămăligă, sau amestecat cu făină. În medicină se dă ca: antinevralgic, antiherpetic, febrifug, în boalele căilor respiratoare, ca escarotic (pus pe piele o arde formând o coajă, escară). *Doză*: 2 până la 10 mgr.: se întrebuințează sub formă de *granule* de 1 mgr. fiecare; *Licoarea lui Boudin* (1/100); care conține 10 miligrame de acid la 10 gr., *pilule*, zise *asiatice*, de câte 5 mgr. una. Pe dinafară sub formă de praf, sau în *paste*. Când se ia acid arsenios nu trebuie să se ia băuturi astringente, sau apă de var. — *Arsenitul de potasă* se dă în boale cronice de piele, la friguri palustre, boalele nervoase (isterie, coree, migrenă), scrofule, oftică, astmă, emfizem, bronchită, sau tusă veche. Se întrebuințează sub formă de: *Licoarea lui Fowler*, 2 până la 15 picături. — *Arsenicatul de sodă* se dă în aceleași boale ca și arsenitul

de potasă, sub formă de: *Licoarea lui Pearson*, 4—20 picături; *granule* de câte 1 mgr. (2—10 pe zi); în *vin de china*, 5—10 mgr. pe zi. — *Otrăvirea cu preparate arsenicale*. Cele mai multe cazuri de otrăvire se fac cu *șoricioaică*, din greșală, sau cu scop criminal. Culoarele de anilină de pe jucării, bomboane, conțin și ele o cantitate bunăsoară de acid arsenios; *săpunul naturalistilor* conține 30 la 100 de acid; *pastele epilatoare* conțin sulfur de arsenic (orpiment) și uneori chiar și acid arsenios. Otrăvirile cronice se observă la lucrătorii cari prepară acidul arsenios, verdele lui Scheele (arsenit de cupru), sau cari lucrează la hârtia colorată, la flori, frunze și iarbă artificială, la sticlărie, sau la cei ce locuiesc o cameră a cărei pereți sunt îmbrăcați cu hârtie verde catifelată, etc. *Semnele*; Otrăvirea *acută* se arată cam la un sfert de oră, sau o oră după ce s'a înghițit otrava, cu o simțire de căldură și de strângere în gât, sete mare, durere arzătoare la stomac, vărsături alimentare, bilioase verzi, negre sau albastre, diaree mare, cu dureri de pânțe, respirația anxioasă, pielea rece, pulsul foarte mic. Otrăvirea *cronică*: lipsă de apetit, gura uscată, sete vie, greutate la stomac, vărsături, constipație, scaun cu sânge, slăbire și slăbiciune generală, ochii roșii și buhăiți, pielea uscată și scâmoșată, diferite erupțiuni, paralizii. *Tratament*. În forma *acută*: vomitive (ipeca), să se bea multă apă de sărată; fier dializat, 30 gr., repetat de mai multe ori sau magnezie în abundență, stimulente, fricțiuni, bolnavul bine acoperit ca să fie în căldură, albuș de ou, cataplasme pe pânțe. În forma *cronică* să se depărteze cauza; reconstituante.

Arsilină. — Albumină fosforată și arsenicală cuprinzând la 100 părți: 2—6 de fosfor și 0.17 de arsenic. Se dă în boalele de piele, anemie, leucemie, paludism, etc. *Doză*: 3—4 gr. pe zi.

Arsinal. — V. *Arenal*.

Arșiță. — V. *Erpes*.

Arsuri, combustiuni. — Aburii cuprind părțile de apă foarte fierbinți, cari, venind în atingere cu pielea, se condensează și o ard; trași în piept, prin respirație, ard căptușeala bron-

chiilor și plămânilor. Gazele ard prin flacăra lor, în cazurile de explozii și arsurile nu sunt adânci, dar sunt primejdioase prin întinderea lor. Lichidele, când nu sunt fierbinți până la 100° , produc numai un eritem pe piele, fără nici o gravitate, cu cât însă temperatura lor este mai mare, cu atât și arsurile pot fi mai primejdioase. Lichidele arzătoare caustice (vitriolul acidul fenic concentrat, acidul azotic, esența de oțet, etc.), dacă sunt înghițite din greșală, sau cu voie, în cazurile de sinucidere, ard tot ce întâlnesc în drumul lor și produc moartea. Solidele și mai ales metalele, aurul, argintul, arama, fierul, etc., când sunt încălzite până la roșu produc arsuri adânci, însă mărginite numai la locul cu care au venit în atingere. Când aceste metale sunt topite, atunci arsurile sunt grozave; un nenorocit care și-a scăpat piciorul într'un cazan cu fier topit, când și la 'scos avea în locul lui un ciont carbonizat. — Pe lângă natura corpului arzător (gazos, lichid sau solid), care joacă un rol mare în cece privește întinderea și adâncimea arsurilor, trebuie să ținem seama și de *durata*, cât acel corp a fost în atingere cu corpul nostru. Astfel se explică arsurile cele întinse la cari sunt supuși epilepticii, cari cad peste foc fiind în nesimțire; tot așa se întâmplă și cu bețivii. Cu cât un corp arzător stă în atingere cu țesăturile noastre mai mult timp, cu atât și arsura va fi mai întinsă și mai adâncă. — *Semnele*. Pentru a înlesni descrierea arsurilor, le vom împărți în *trei* grade: *întâi* avem o roșeață vie, însoțită de o durere mai mult sau mai puțin arzătoare, a cărei durată variază. Această durere se poate asemăna cu durerea produsă de muștar. În acest grad arsurile se vindecă fără să facă puroi (fără supurație). În *gradul al doilea* avem o roșeață mai mare, o durere mai vie și care ține mai mult timp; apoi se ivesc pe pielea arsă niște beșici întocmai ca la vezicători, pline cu un fel de apă gălbuie. Aceste arsuri se vindecă făcând puroiu (cu supurație). În *gradul al treilea* avem distrucția pielei și a cărnurilor de desupt, în diferite adâncimi. Aci nu este roșeață de cât numai pe marginile părților arse; durerea este

mai mică, uneori nu este de loc, iar vindecarea nu se face decât după ce au căzut părțile arse. Pe lângă semnele acestea arsurile dau loc la turburări ale sănătății, cari sunt în raport cu gradul de arsură, întinderea și adâncimea ei. Este o mare deosebire între arsura de gradul întâiu, care de obicei nu produce decât o febră ușoară și trecătoare și între arsurile de celelalte grade, cari aruncă bolnavul într'o neliniște mare, până la aiurare uneori, sau bolnavul cade într'o toropeală până la nesimțire. — *Tratament*. Dacă hainele sunt în flăcări se va înăbuși focul, învălind persoana care arde cu un cearșaf înmuiat în apă, cu o plapomă, sau la nevoie cu un șol, un covor sau ori ce ne cade în mână. Partea arsă va fi desvelită cu mare băgare de seamă, ca să nu rupem pielea, dacă e nevoie se vor tăia hainele cu foarfecele. Dacă arsura cuprinde o mare parte din corp, este bine să punem bolnavul într'o baie caldută, în care va sta mult timp și vom răci puțin câte puțin baia. Prin aceasta se poate preveni febra și reacțiunea. Dacă bolnavul este rece, în leșin, îl vom încălzi cu ajutorul băuturilor calde și excitante, ceaiu rusc, sau ceaiu de teiu. Arsura va fi acoperită cu cârpe îmuiate în apă de var, amestecată cu unt de lemn, *liniment oleocalcar*, pe care le udăm din când în când, cu aceeași doctorie. După ce am pus cârpe astfel îmuiate pe rană putem să mai punem pe deasupra un strat de vată și apoi să legăm totul cu o fașă. Acest pansament trebuie schimbat de 2—3 ori pe zi; el micșorează durerea, căldura va fi mai mică și vindecarea la arsura de gradul întâiu se va face în câteva zile. Același lucru se va face la picioare, la față și în celelalte părți; acolo unde nu se poate face baia se va face numai pansament. Când arsura este întinsă prea mult, pe o mare parte a corpului, în loc de apă rece se va întrebuința apă caldută, cu care se va face și baie la nevoie. La arsurile de gradul întâiu se mai poate întrebuința și *apa de plumb*, cârpe muiate și stoarse, des primenite. Se mai recomandă spălături cu acid boric, în care se moaie cârpe și se vor storce, aplicându-le pe arsură

și schimbându-le des și aceasta timp de 12—15 ore, după care vom pune cârpe muiate tot în acid boric, însă cald de 40°, pe cari le vom stoarce bine, le vom aplica pe arsură și pe deasupra vom pune gutapercă. Când nu e puroiu schimbăm acest pansament odată pe zi, în caz contrar de 2 ori pe zi. În gradul al doilea, când sunt *beșici*, le vom sparge cu forfecuțe trecute prin foc, le vom deșerta de apa ce conțin (fără însă să ridicăm pielea, căci ar produce bolnavului dureri și usturimi mari) după care vom face un pansament cu acid boric, ca mai sus. În loc de acid boric se poate întrebuința sublimat corosiv (1 la 3000), în care vom muia cârpele. Mai putem pune și diferite alifii întinse pe tifon, între acestea cea mai bună este: acid boric, antipirină câte 5 grame, iodoform sau xeroform 1 gr., vaselină 50 gr.; sau: salol 4 gr., cocaină 25 ctgr., vaselină 30 gr. După ce am aplicat alifia punem pe deasupra un strat de vată, apoi gutapercă și legăm; pansamentul se poate face în fiecare zi, sau la 2—3 zile odată. Vom da bolnavului tonice și calmante și regim de lapte. În cazurile grave precum și la arsurile de gradul al treilea doctorul singur va hotărî ce este de făcut. În arsurile de gradul al III-lea un bun medicament este *ambrina*. O găsim în comerț sub formă de plăci, ca ceara, o punem într'un vas, pe care îl vârîm în altul mai mare, care conține apă fiartă. Ambrina se topește îndată și din ea, astfel topită, luăm cu un bețișor învelit cu vată la cap și ungem toată rana. Pe deasupra punem un strat de vată și pansamentul astfel întocmit îl lăsăm până a doua zi, când îl ridicăm și repetăm această operație. Vindecările se obțin mult mai repede ca cu celelalte medicamente.

Artera (gr. *arteria*). — Canal prin care curge, sau mai bine zis circulă, sângele roșu. În limba poporului artera se confundă cu *vâna* înțelegându-se orice canal prin care curge sânge, fie roșu, fie negru; mai mult, Românul mai înțelege sub cuvântul de vână și tendoanele mușchilor.

Arterio-scleroză (gr. *sklerosis*, întărire, împietrire). — Când omul se

hrănește prea bine și mai mult decât trebuie, în raport cu munca lui, arterele de obicei se întăresc, se împietresc, își pierd elasticitatea și, prin îngroșarea păreților, se strâmtează, așa că sângele nu mai poate circula bine (v. *Aterom*), din care pricină se ivesc o mulțime de suferințe.

Articulație (Înțepenire de). — V. *Anchiloză*.

Articulațiuni (lat. *articulus*, încheietură), *încheieturi*. — Oasele cari compun scheletul omului sunt unite între ele prin articulații, sau încheieturi, cari permit unui membru, mână, sau picior, să facă diferite



Fig 28. — Diferite feluri de articulații

mișcări: înainte, înapoi, în lături, în sus, în jos, de învârtire sau sucire. Intinderea acestor mișcări este mărginită prin niște coarde numite *ligamente*, cari sunt elastice și leagă oasele între ele. Impreunarea aceasta dintre două sau mai multe oase între ele, cu ligamentele și cămașa (capsula) care le acopere, se chiamă *încheietură*, sau *articulație*. Cele mai de căpetenie încheieturi sunt: *umărul*, *cotul*, *șoldul*, *genunchiul*, *pumnul* (v. aceste cuvinte). Așa dar o articulație se compune din capetele, sau extremitățile, a două oase și din mai multe *ligamente*, sau coarde cari le unesc; ea mai are afară de acestea niște sgâr-

ciuri sau *cartilaje*, un fel de discuri sau talgere flexibile, cari îndulcesc întâlnirea și loviturile celor două oase când se apropie unul de altul; apoi, un fel de apă sau lichid vâcos, ca albușul de ou, ațos, care se cheamă *sinovie*, care udă mereu capetele oaselor pentru ca ele să alunece mai cu înlesnire, întocmai după cum face și uleiul la mașini. Când încheietura este sănătoasă *sinovia* este în cantitate mică, uneori însă crește și articulația se umflă, atunci avem ceea ce se zice *idartroză*. În alte cazuri *sinovia* este mai puțină decât trebuie și mișcările încheieturii din această pricină se fac mai cu greutate și sunt dureroase,



Fig. 29. — Artrită a genunchiului (pungă seroasă cauzată de inflamație)

uneori se aud niște scârțaituri la mișcare, atunci avem *artrita uscată*, sau *seacă*. Pentru orice inflamații sau aprinderi de încheieturi să se caute la articolul *artrită*. Loviturile, căderile făcute de-a dreptul asupra unei articulații, mișcările exagerate involuntare, cari depășesc prea mult cele două capete osoase, sau cari rup ligamentele (când calci strâmb) și orice violență accidentală, pot produce diferite turburări articulare, mai mult sau mai puțin grave: *contuziuni*, *entorze* (sucituri), *luxațiuni* (scrintiri), *plăgi* (vezi aceste cuvinte). *Ingrîșirile* ce sunt de dat bolnavului variază după natura accidentului. Aci vom spune numai

că este o regulă de mare importanță care se poate aplica în toate cazurile, oricare ar fi articulația bolnavă, fie vorba de o inflamație, de lovitură, sau entorză (sucitură); *să se pună încheietura în odihnă*, în repaus absolut. Dacă durerea este la umăr, cot sau pumn, să se pună mâna într'un colțar sau tulpă, fixat pe după gât și să nu se facă nici o mișcare; dacă e vorba de șold, genunchi, sau glesne să se țină piciorul drept în pat și să nu se umble. Dacă încheietura este umflată, dureroasă, pielea roșie, să se pună cataplasme de in caldă, cari se vor schimba tot la 2 ore, sau să se pună cârpe muiate în apă de plumb, simplă, sau cu laudan și toate acestea până vine doctorul, care după ce va examina cazul va prescrie tratamentul cel mai bun.

Artrită gr. *arthron*, încheietură, și terminația *itis*, care înseamnă aprindere). — Este inflamația unei articulații și are mai multe forme. **Artrită acută**: 1. *Simplă*, produsă prin lovitură, cădere, fractură și atunci se zice *traumatică*, sau este produsă printr-o infecțiune cum se întâmplă în scarlatină, febră tifoidă, blenoragie și atunci se numește *infecțioasă*. **Semnele** sunt: o durere mare la încheietura aprinsă, umflătură, roșiața pielii, febră (căldură). **Tratament**: odihnă în pat. membrul pus într-o direcție bună, bandaj (legătură cu humbac) compresiv 2. *Blenoragică* (vezi *Bleboragie*). — 3. *Guloasă* (vezi *Gută*). — **Artrită cronică**: 1. *Uscată* (deformantă) provenită dintr-o fractură, o scrintire, o sucire a încheieturii, reumatism, dintr-o artrită acută. Se observă de obicei la șold, genunchi, cot, umăr, picior. — **Semne**: un fel de supărare la încheietură când se schimbă vremea, o durere spontană, care nu se mărește prin



Fig. 30. — Formarea unei pungi infecțioase (cu puroi) a = punga

mișcările articulației; umflătură cu deformare: greutate în mișcări, la umblat, înțepenire cu scârțitură; boala merge încet, are durată lungă și ca complicație uneori se face apă în încheietură. *Tratament*: idroterapie rece medicațiune alcalină, iodurată și arsenicală: exercițiu, plimbări pe cât se poate, diferite mișcări combinate, masajiu, gimnastică suedeză, să se întrefie forțele bolnavului prin tonice, fieruginoase, untură de pește. — 2. *Tuberculoasă* (vezi *Tumori albe*). — 3. *Umedă* sau cu apă (vezi *Idartroză*).

Artrism. — Este o stare generală sau *diateză* care poate da naștere la diferite boale, la aceeași persoană, sau la indivizii unei familii: reumatism, gută, migrenă, diabet, obezitate, astmă emfizem, gastrită cronică, aterom, pietricele la ficat, rinichi și vezică.

Cauze: moștenirea dela părinți sau neamuri; bunul traiu și muncă puțină cum se întâmplă la oamenii bogați, viață sedentară, la cei ce lucrează mai



Fig. 31. — Reumatism deformat al articulațiilor degetelor

mult, cu mintea și nu fac mișcare mai de loc, de aceea se observă artrismul mai mult în orașe decât în sate. *Semne*: încă din copilărie se arată unele manifestări: eczemă, furnicile, agitație în timpul nopții, constipație, și emoroizi, curgeri de sânge din nas, sensibilitate la frig, dureri de cap, moleșală sau nervozitate prea mare, dureri trecătoare prin oase și încheieturi, dureri de ochi cu roșeață, guturaiu des, sau tuse nervoasă, căderea părului din vreme, turburări de stomac (răgăituri, greutate, arsură, nemistuire). *Tratament*. Pentru că să se preîntâmpine toate acestea trebuie o hrană mai mult vegetariană, carne puțină, oprire dela băuturi alcoolice, dela cafea, ceaiu, dela legumi acide (macris, patlagele roșii); să aibă scaun regulat; idroterapie, exercițiu sub toate formele (plimbări, gimnastică, bicicletă), fricțiuni uscate. *Tratamentul curativ* să se caute

la diferitele boale înșirate mai sus și cari constituie artrismul.

Asa fetidă, aerel. — Este extrasă din rădăcina plantei *Ferula asa fetida* din fam. umbeliferelor, originară din Persia și Afganistan. La noi *aerelul*, sau *asa fetidă*, vine în bucăți roșietice, sau cafenii, unsuroase la pipăit, spărgăcioase la răceală, moi, mlădioase la căldură, răspândind un miros de usturoiu, pătrunzător, greu și neplăcut, la gust amară, iute și puțin aromatică. Ea se dă ca antispasmodic puternic, ca emenagog (ca să înlesnească venirea regulelor) și ca viermifug. Se dă sub formă de *pilule*: asa fetidă și camfor câte 10 ctgr., săpun cât trebuie pentru o pilulă, să se ia 1—6 pe zi. — Sub formă de *praf* se dă: 50 ctgr., până la 2 gr., de *alcoolat* și *eterolat* 1—4 gr. pe zi, în *clistire*: asa fetidă 2—4 gr., un gălbenuș de ou, ceaiu de nalbă 250 gr.

Asaprol. — Praf alb, uneori puțin roșietic, fără miros, gust amar. Proprietăți: antiseptic, antitermic, anti-reumatismal, analgesic; lucrează ca și salicilatul de sodă, însă este mai ușor de tolerat pentru cei cu stomacul slab, sau cu albuminurie. Se dă în contra reumatismului articular acut și sub acut, reumatismului muscular, la gută, influență, viermi intestinali: 1—3 gr. la copii, 2—4—6 gr. la adulți, în poțiuni, buline, sau prafuri de câte 50 ctgr. Nu se poate da cu antipirină și sulfat de chinină.

Ascaride lombricoide. — V. *Viermi intestinali*.

Ascită (gr. *askitis*, dela *askos*, burduf), *boală de apă, dropică, idropică, idropizie abdominală*. — O revărsare de apă în pânțece, în care apa sau lichidul poate ajunge la o cantitate de multe ori foarte mare, 10—15—20 și chiar 30 litri. Ascita poate să fie o boală de sine stătătoare (*idiopatică*), sau să fie produsă de o altă boală, sau de o turburare generală a sănătății, care să favorizeze îngrămădirea de apă, sau de serozitate, în cele mai multe țesături (v. *Anazarcă*). Ascita poate fi produsă de o răceală, de frig (*à frigore*), prin luarea unor băuturi cu ghiată, sau alte cauze cari nu se cunosc, mai poate fi produsă de o boală de ficat, de splină (*friguri palustre*),

de inimă (insuficiență mitrală etc.) de rinichi (nefrită)), sau de peritonita tuberculoasă, sau canceroasă. Tratatamentul variază după cazuri: în ascita idiopatică se va da numai lapte și



Fig. 32.—Aspiratorul lui Potain

diuretice (medicamente) cari fac ud mult; în ascita produsă de altă boală se va trata boala care a produs-o. Când apa este peste măsură de multă și bolnavul este amenințat să moară, atunci i se va da cep, adică se va face paracenteza abdomenului (pân-tecelui) și se va

scoate încet și cu băgare de seamă aproape tot lichidul. Injecțiunile iodate pot fi folositoare, cu condiție ca să nu se injecteze decât o soluție puțin concentrată și variabilă, după natura lichidului extras.

Aseptic (gr. *a*, nu, și *sépsis*, infecțiune). — Orice substanță care nu are germeni de boală, sau microbi, se zice *aseptică*. Microbii sunt nimiciți prin fierbere (apă fiartă) sau prin ajutorul unei etuve, care îi distruge pe toți.

Aseptol (acid ortofensulfuric). —

Lichid negricios cu proprietăți anti-septice întrebuintându-le ca și fenolul (acidul fenic): intern 10 ctgr. până la 1 gr. pe zi, într'o porțiune, sau sirop; extern 2 până la 4, la 100.

Asfixie (gr. *a*, nu, și *sphixis*, pulsație). — Prin acest cuvânt se înțelege greutatea sau neputința de a respira, adică de a absorbi oxigen și a da afară acidul carbonic, așa că nu se mai poate primesti sângele din țesături. Asfixia, dacă nu se iau măsuri grabnice în contra ei, sfârșește în totdeauna prin moarte. — Asfixia este de 2 feluri: simplă și toxică. *Asfixia simplă* provine din mai multe cauze: când aerul nu este în cantitate îndestulătoare; *aerul rarefiat* (la înălțimi mari, pe munți înalți, sau în balon); *aerul confinat*, închis, cum este în camerele neaerate în de ajuns, pentru numărul celor ce le locuiesc; aerul în-

cărcat cu acid carbonic, cum este în pivnițele în care fierbe sau fermentează vinul sau fructele, etc. (vezi *Aer*, *Aerisire*, *Aer rarefiat* și *Aer confinat*). — Asfixia mai poate fi produsă printr'un obstacol sau o piedică în respirație, cum se întâmplă la cei *spânzurați*, *înecați*, *sufocați*, (năbușiți), *sugrumați* (gâtuiți), la cei ce au astupate căile respiratoare printr'un corp străin înghițit, sau produs printr'o boală: cancerul, oftica, sau difteria (crup). Intre cauze se mai numără și unele leziuni nervoase: acțiunea curentilor electrice, suprimarea excitației respiratoare a nervilor pielei, printr'o arsură generalizată, leziunile nervilor frenici și ale bulbului cerebral, cum este în: *epilepsie*, *turbare*, *tetanos*, în otrăvirile cu *strichnină*, și *curară*. — Asfixia se mai poate întâmpla în boalele de *plămâni* (bojoci), când veziculele lor nu mai pot primi aer, fiind umplute de exudate (pneumonie), sau sunt apăsate de ceva din afară, (cum este în *pleurezie cu apă*), în boalele de *inimă*, când nu mai poate fi împins sângele în plămâni, în embolia pulmonară, boalele infecțioase, etc. *Asfixia toxică* este otrăvirea sângelui cu gazeuri vătămătoare, cum sunt *acidul carbonic* și *oxidul de cărbune*, cari iau locul oxigenului din aer. Aceste gaze se formează când s'a pus capacul la sobă înainte de a se stânge focul cu totul, când se pune mangal într'o strachină în mijlocul odăiei, cum fac cei ce vreau să se omoare, când o sobă de fier trage rău, sau sunt aruncate în bombele din avion, în timp de războiu. Se mai poate ivi când se țin în camera de dormit *flori*, cari toată noaptea dau acid carbonic. Această asfixie mai poate fi produsă prin gaze sulfuroase (de pucioasă), gazul aerian de iluminat (cu care se întâmplă multe morți), gazul ce iese din hasnalele privăților (latrinelor). — *Semnele asfixiei* sunt: la început o greutate la cap, o aplecare neînvinșă la somn, o moleșală generală, văjiituri de urechi, zăpăceală cu amețeli, încercare de a vărsa, fața devine roșie purpurie, mâinile și picioarele încep a se răci. Dacă lucrul se oprește aci omul poate fi scăpat de moarte, își revine; dacă însă asfixia continuă atunci el merge spre

o moarte sigură : amortirea se mărește, inteligența și cunoștința scad și se pierd ; picioarele devin nesimțitoare, apoi mâinile și pe urmă trunchiul ; membrele sunt succesiv atinse de convulsii (spasme) foarte tari, apoi de paralizie completă. Lipsa de aer produce o neliniște de nespus. Respirația devine mai înceată, mai slabă până se sfârșește cu totul, iar inima mai continuă încă puțin să bată, dar din ce în ce mai slab, până încetează definitiv, când moartea a sosit. — *Tratat* : sunt două reguli de păstrat dacă vrem să reducem la viață pe un asfixiat : *să lucrăm iute*, să nu așteptăm până ce vine doctorul, care de multe ori este așa de greu de găsit și *să lucrăm mult timp*, cu răbdare, chiar și *mai multe ceasuri* dacă este trebuință, căci s'au văzut multe succese. Mai întâi de toate scoatem bolnavul la aer curat, apoi facem *tracțiunea ritmică* a limbii : deschidem repede gura, ținând fălcile depărtate cu ajutorul unui dop de plută, a unei bucăți de lemn, cu o coadă de lingură, apoi prindem limba cu o pensă, cu un clește, cu un cârlig, sau cu degetele învelite cu o cârpă subțire, ca să nu alunece, și să o *tragem cu putere afară* de 16 până la 20 de ori pe minut, apoi o lăsăm să reîntre în gură până unde merge ea și numai atunci o tragem din nou, urmând tot astfel. Pentru ca să nu mai numărăm de câte ori tragem limba afară pe minut, putem să regulăm această tragere după respirația noastră, adică la fiecare respirație s'o tragem odată afară. Când limba începe a se împotrivi la tragere este semn bun, semn că respirația celui asfixiat începe să se restabilească, ceea ce se arată și printr'o ridicare a pieptului, apoi o scoborîre însoțită uneori de un sughiț. Afară de tracțiunea limbii, sau odată cu aceasta, se mai face respirația artificială prin *mișcări de asemenea ritmice* ale pieptului, pentru care avem nevoie de un ajutor ca să le facă, și anume : el va aplica cu putere mâinile pe piept, apăsându-l tare, apoi le întinde cât poate de tare în direcția capului, continuând astfel până ce omul începe să respire (vezi *Inecați*). Ajutorul mai poate face și astfel : să

se așeze înapoia capului bolnavului, să prindă brațele și să le apese cu putere asupra pieptului în timp de trei secunde (clipe), să facă *expirațiunea* (adecă darea afară a aerului din piept), apoi să le depărteze și să le ridice pe lângă cap, ținându-le astfel iarăși 3 secunde, să facă *inspirațiunea* (adecă intrarea aerului în piept), după care iar le lasă în jos repetând același lucru până la sfârșit. Dacă aceste mișcări se fac în același timp cu *tragerile limbii*, trebuie să facem astfel ca ridicarea mâinilor să se facă în timp ce limba e afară și lăsarea lor în jos când limba este înăuntru și aceasta de 16—20 ori pe minut. Bine înțeles că toate aceste mișcări de brațe *nu pot înlocui tragera limbii*, care este cel mai energic mijloc de a învia pe un asfixiat, ci pot s'o ajute. Se mai recomandă și *inhalatiunile de oxigen*, când putem să le facem. După ce am readus omul la viață îl vom culca într'un pat cald, cu capul ridicat pe perini, îi vom da un ceai cald, cu lingura, *supraveghind respirația*, căci se poate întâmpla să înceteze din nou, mai ales când asfixia a ținut mult și atunci iarăși începem ca mai sus. Despre tratamentul asfixiei la *inecați*, *spânzurați* și la *noi-născuți* vezi la aceste cuvinte.

Așias. — V. Mac.

Asistolie gr. *a*, nu, și *systoli*, contracțiune). — Slăbirea contracțiunilor inimii, care vine sau în mod brusc, repede, sau în perioada cea din urmă a boalelor de inimă. Criza de asistolie poate fi datorită unei degenerări a fibrelor musculare ale inimii, unei leziuni valvulare foarte întinsă, turburărilor circulației periferice. Mai poate fi datorită unei slăbiri a contracțiunilor cardiace, determinată sau printr'o leziune nervoasă, sau printr'o compresiune a inimii (exudat pericardiac). Ea se caracterizează prin neliniște mare, dispnee (răsuflare grea), slăbiciune, neregularitate și inegalitate în mișcările inimii și ale pulsului dilatarea vinelor, cianoza (învinețirea buzelor), răcirea mâinilor și picioarelor, idropizii multiple, în deosebi edem pulmonar, congestiuni viscerale, albuminurie, etc. Asistolia poate aduce repede moartea, sau să treacă momentan, pentru a reveni sub in-

fluența cauzelor cari i-au dat naștere.




Fig. 33.
Asmățui

formă de băutură, 10 gr. fierte într'un litru de apă. În supa de legume unele gospodine pun și asmățui.

Asociație microbiană. — V. *Microbi.*

Asol. — Antiseptic puternic, având ca bază aldehida formică. Se disolvă foarte ușor în apă rece, sau caldă. Are miros plăcut. Asolul în soluție de 1 la sută omoară în 7 minute microbul ofticeii, în 10 minute microbul febrei tifoidă, al răpciugei, stafilococul piogen auriu, în cinci minute microbul ciumei. Se întrebuințează cu mult succes în *chirurgie*, în *ginecologie* și la *faceri*. — **Doză:** o linguriță la un litru de apă pentru spălarea rănilor, 2 lingurițe la un litru de apă pentru spălaturi vaginale și uterine, o lingură la un litru pentru dezinfectarea camerilor, scuiătorilor, etc. Câteva picături de asol, într'un pahar de apă, formează o bună apă de spălat în gură.

Asple. — V. *Leventică*.

Aspirină. — Se prepară din acidul acetic combinat cu cel salicilic. Se găsește sub forma de pulbere, sau de pastile. Se întrebuințează într'o mulțime de boli: reumatism, dureri ale mușchilor, șalelor, influență (guturai), pleurezie cu lichid, ascită, dureri oculare de natură reumatismală, etc. Se poate lua în apă, sau orice lichid. Luată odată cu un ceai fierbinte produce o puternică transpirație. Doza mijlocie, zilnică, pentru adult, este de 2—3 gr., luate în doze egale, de 4—5 ori pe zi. Copiilor li se dă o cantitate mult mai redusă (1—1.20 gr. pe zi), luată în doze de 0.25—0.30

ctgr. de fiecare dată, iar copiilor mici de tot câte 0.10—0.20 ctgr. pe an de vârste.

Asternut. — V. *Pat.*

Astigmatism (gr. *a* nu, și *stigma*, punct). — Un defect al ochiului, care nu vede deslușit obiectele în toate părțile lor. E datorit faptului că organul nu are aceeași putere refringentă în diferite planuri ce trec prin axa lui. Astfel ochiul atins de astigmatism pe când privește o suprafață formată de linii verticale și de linii orizontale, nu vede lămurit decât pe unele, sau pe celelalte. Pentru a remedia acest defect se întrebuințează ochelari cu sticle cilindrice.

Astmă (grec. *asthma*, respirație anevoioasă, grea). — Este o boală nervoasă care se arată prin accese de opresiune, ce se repetă la intervale neregulate, adeseori foarte depărtate unele de altele și în intervalul cărora bolnavul pare a se bucura de o sănătate bună. Cel dintâiu acces de astmă se ivește de obicei cam pe la miezul nopții, arătându-se printr'o greutate



Fig. 34.—Compresiunea
nervului pneumogastric

mare în piept, o simțire de apăsare foarte obositoare; fața este la începută palidă, apoi vânată, acoperită de sudori reci, cu respirația gâfâindă, sgomotoasă și întrerăiată. Această stare durează 1 până la 3 ore, uneori și mai mult, până ce în sfârșit se ivește o tusă cu ajutorul căreia scuipi un fel de scuipat vâscos, cleios, sămănând cu fideaua fiartă. De obicei accesele se produc în serii, mai mult sau mai puțin apropiate, cari durează câteva zile sau câteva săptămâni și a căror totalitate constituie ceea ce se chiamă un *atac de astmă*. Dacă se întâmplă ca bolnavul să aibă în același timp și o *bronchită*, atunci respirația este și mai grea și mai supărătoare. *Emfizemul* este produs de astmă, de multe

ori, tot așa și unele boale de inimă. — *Cauzele* astmei sunt: ereditatea, mai cu seamă la cei ce sufăr de reumatism, de gută, de trănji, de blândă, de eczemă. Accesele de astmă, sunt provocate (la cei predispuși) de umezeală, de răceală, de unele mâncări grele (raci de mare, stridii, scoici), de gaze și pulberi (praf), de diferite mirosuri (de vioarele, de grăsimi când arde, de ipeca, de clor), etc. Astma se observă mai des la bărbați. În ultimul timp se crede că ar fi datorită unei excitații prea mari a pneumogastricului. — *Tratament.* În momentul accesului vom ține bolnavul șezând în pat, sau pe un scaun (fotoliu) cu capul în sus, cu șealele răzimate pe perini. I se va da cât se poate mai mult aer, deschizând ferestrele, dacă nu cumva e prea frig afară, în caz contrar numai ușa care dă într'un antreu; îi vom da să fumeze țigarete de *datura* (ciumăfaie), de *hiosciam*, de *câneapă de India*; vom afuma în jurul bolnavului, aprinzând *hârtie nitrată*, sau frunze de *datură*, *hiosciam*, *beladonă*, singure sau asociate. Să se dea bolnavului cafea neagră, tare, din sfert în sfert de oră. Se mai recomandă pentru oprirea accesului, să se facă *compresiunea nervului pneumogastric* la nivelul gâtului, care se poate face de însuși bolnavul, sau să se pună ghiață la gât. Se mai pot face inhalațiuni de *eter*, de *iodur de etil*, de *cloroform*; sau să se pună aproape de pat o farfuriuță cu 4—5 gr. de *piridină*, pentru o cameră cam de 25 m. c. Să se dea poțiunea: eter sulfuric 1 gr. extract de *beladonă* 5 ctgr. apă de laur-ceras 10 gr., apă distilată și sirop de coji de portocale câte 60 gr., la fiecare ceas câte o lingură. Dacă accesul e mare de tot și durează prea mult se pot face injecțiuni sub piele de *morfină*, de câte 1 ctgr. de 3—4 ori pe zi. Pentru a opri revenirea acceselor trebuie evitate cauzele amintite mai sus. Apoi trebuie examinat nasul și fundul gâtului, pentru că se poate ca astma să-și aibă originea acolo. Unele forme sunt mult ajutate de tratamentul cu raze X. Ca *tratament general preventiv* se va da *iodurul de potasiu* în doză mijlocie de 1—2 gr. pe zi și preparatele *arsenicale*. În *popor* se tratează astma cu *vâsc*, care

este un parazit ce se face pe ramurile merilor, perilor, răchitelor și a bradului alb. Vâscul de păr și de brad se bea fiert în apă. Se mai întrebuințează și ceaiul de flori și frunze de *degetariță* (digitală).

Astragal. — V. *Picior*.

Astringente (lat. *astringens* dela *astringere*, a strânge). — Se cheamă medicamentele cari fac ca țesăturile și orificiile cu cari vin în atingere să se strângă. Ne putem convinge despre acest efect dacă punem pe limbă un mic cristal de piatră acră, sau o picătură de suc de lămâie. Ele se întrebuințează pe dinafară pentru a opri o curgere de sânge (emoragie), sau pentru a combate o inflamație superficială, iar pe dinăuntru pentru a opri urdinarea, sau orice altă scurgere anormală. Se întrebuințează sub formă de prafuri, gargară, injecții (spălături), clistire, băuturi, hapuri, etc. în doze variabile după vârsta și constituția fiecăruia, după cum se arată la fiecare din ele. Cele mai principale sunt: *acidele* (sulfuric, azotic, cloridric), *sărurile de plumb*, de *zinc*, de *fier*, de *cupru* (piatră vânăță), de *mercur*, etc.; apoi *alumen* (piatră acră), *tanin*, *acid galic* și toate substanțele bogate în tanin: *ratania*, *răculeț*, *gogoși de ristic*, *căpșuni*, *coaje de stejar*, *rodie*, *chinchină*, *gutui*, etc.

Ață la limbă. — V. *Limbar*.

Atac. — Caracterul *atacului* este *repezițiunea* în năpădirea boalei și *repetarea* lui periodică, întocmai ca la *acces*. Despre *atacul de apoplexie*, *epilepsie*, de *gută*, *reumatism* vezi aceste cuvinte. *Atacul de nervi*, care se observă de preferință la fetele și femeile tinere, în urma unei emoțiuni morale vii, unei supărări, unei spaime, unei *boale de inimă*, sau a unei indigestii, alteori fără nici o cauză aparentă. Acest atac de nervi, care se observă mai ales la o persoană nervoasă și anemică, vine repede și constă într-o indispoziție generală, care nu se poate descrie și care încetul cu încetul se fixează într'un punct oarecare, mai ales la lingurică, în dreptul stomacului, sub formă de strânsură apăsătoare, care merge crescând. După aceea i-se înmoaie picioarele și bolnava cade jos făcând mișcări dezordonate și

sucituri de corp ciudate, uneori rostogolindu-se pe pământ în toate felurile. Cele mai adese ori bolnava n'are cunoștință, nici nu mai simte, cu toate aceste ea vorbește ca în vis, mai mult aiurează în mod sgomotos și cu halucinații, fără să simtă dacă o gâdili, o arzi, sau o înțepi. Acest *atac de nervi* poate ține câteva minute, până la câteva ceasuri și se termină de obicei prin sughit și lacrimi. *Tratament*: În timpul atacului bolnava să nu se lovească, să nu-și facă rău, prin urmare vom pune-o în pat, sau îi vom așterne jos o saltea, sau perini, ținând-o cât se poate în loc fără violență însă; îi vom desface legăturile de peste mijloc, corsetul, pentru ca respirația să se facă bine, sau mai bine s'o desbrăcăm de tot, o vom stropi cu apă rece pe față și pe piept, îi vom pune la nas eter, sau oțet, până ce-i trece atacul, sau, dacă durează prea mult, se va chema doctorul, care o va deștepta și îi va prescrie o cură potrivită cu starea ei.

Atac. — V. *Tuberculoză*.

Atac de nervi. — V. *Isterie*.

Atavism. — Tendința ființelor vii de a prezenta o asemănare cu caracterele mintale, sau fizice, ale unui străbunic îndepărtat.

Ataxie. — (gr. *a*, fără, și *taxis*, ordine). — Prin acest cuvânt se înțelege o neregulă în îndeplinirea unor fenomene fiziologice (ataxie în mișcările umbletului), sau în mersul unor boale. Boalele cu formă ataxică sunt caracterizate prin unele semne neobișnuite, de pildă: nestabilitatea fenomenelor și, adese ori, lipsa de proporție între leziunile organice și dezordinele funcționale (febrele pernicioase, scarlatina anormală, icterul grav, etc.) — *Ataxia locomotrice*. Este o boală a măduvei spinării, care are două perioade: de suferință și de paralizie. În prima perioadă de suferință, avem următoarele semne: dureri care vin de obicei sub formă de crize, dureri fulgerătoare, sau pătrunzătoare prin picioare, cu intervale de odihnă mai mult sau mai puțin lungi: câte odată dureri de mijloc, încingătoare, dureri în degetele mici și inelare dela mâni, la față, la ceafă, crampe de stomac cu vărsături, dureri în beșică, la ri-

nichi, în mațe, în dreptul inimii. În perioada a doua, de paralizie, avem: lărgirea pupilelor, căderea pleoapei de sus, vederea dublă, strabism, slăbirea gradată a vederii, vâjiituri de urechi, tușă nervoasă cu un fel de năduf; Bolnavul își aruncă picioarele înainte și în afară și isbește pământul cu călcăele. Pe când ataxia atinge mâinile (ceace se întâmplă rar și târziu), bolnavul devine stângaci, simțul pipăirii și al durerii este micșorat. La urmă de tot mușchii se atrofiază și cade repede într-o slăbiciune generală. Ataxia este o boală care merge încet și crescând, 15—20 ani. Câte odată se poate vindeca, mai ales când se ia din vreme. *Cauzele*: în multe cazuri este sifilisul (și atunci, dacă se îngrijește repede, se poate vindeca) excesele alcoolice, oboselile prea mari, excesele veneriene, tuberculoza. De multe ori nu i-se poate cunoaște cauza. — *Tratament*. La început se recomandă evitarea tuturor exceselor și a oricărei oboseli. La cei sifilitici se va institui un tratament specific intens. După o cură mercurială se vor da pilule tonice cu: lactat de fier 5 gr., extract de chinină 5 gr., extract de nucă vomică 50 ctgr., extract de gențiana cât trebuie pentru 100 pilule, din cari se iau 3—6 pe zi. Se mai dă nitrat de argint, 3—5 ctgr. pe zi în pilule de câte 1 ctgr. și săcară cornută câte 60—90 ctgr., pentru fiecare din cele 3 zile dintâiu ale fiecărei săptămâni, timp de 5—6 săptămâni; fosfor de zinc 15—40 miligrame pe zi în pilule. Contra durerilor fulgerătoare: antipirină, exalgină acetanilidă, morfină, cloral, sulfonal, băi calde prelungite, pulverizații de eter, de clorur de metil, electrizații cu curenți continui. Pentru dureri de stomac, în caz de ipercloridrie: bicarbonat de sodă în doză mare; în momentul accesului: morfină, vezicătoare la lingurică, pulverizații de eter, sau de clorur de metil. Pentru vărsături: protoxalat de cerium, 5—15 ctgr. de 3—4 ori pe zi. Educația progresivă a mușchilor prin exerciții metodice de gimnastică pentru regularea mersului.

Ataxie locomotrice. — V. *Ataxie* și *Măduva spinării*.

Atelă. — Se cheamă o scândurică de care ne servim să legăm o mână,

sau un picior frânt. De obicei se fac din scânduri de brad, subțire și netede și se pun, una sau două, de-a lungul membrului rupt, apoi se leagă cu un prosop, o curea, sau orice avem la îndemână și astfel transportăm rănitul la medic, sau la spital.



Fig. 35. — Cum se leagă brațul rupt, de atelă

Aterom. — O boală a arterelor, caracterizată prin degenerarea grăsoasă a tunicii lor interne, care se rupe, sau din contră, se infiltrează cu săruri calcare și formează plăci tari, cari reunindu-se dau arterei o rigiditate sau tărie osoasă (arteră în formă de țevă de pipă). Din această stare pot rezulta trei lucruri: lărgirea mărginită a arterei, numită *aneurism*, apoi ruptura ei, ceea ce ne dă *emoragie* și închegarea sângelui provocată prin neregularitatea peretelui, *tromboză*, cu mortificarea țesutului udat de acea arteră, *gangrenă*. *Semnele*: dacă pipăim artera bolnavă o simțim tare, neregulată, cu șerpuituri, mai ales la tâmplă sau la mână (radială), pulsul neregulat, brusc sau slab. *Complicațiuni* se pot ivi din partea rinichilor, a inimii, a creierilor (emoragie sau înmoliere). *Cauzele*: alcoolism, artrism (mai ales diabet), sifilis, bătrânețe. *Tratament preventiv*: cumpătare mare în toate, exercițiu regulat zilnic.

Atitudine (lat. *Atitudo, situs corporis*, poziția corpului). — Dacă stăm un timp oarecare nemișcați, în același loc, sau când suntem prea ațintiți la un lucru oarecare, corpul nostru ia, în mod instinctiv, poziția care-i pare mai puțin obositoare, sau care-i convine mai bine pentru acel lucru; dacă această poziție este prea prelungită și dacă mai cu seamă aceasta se repetă zilnic, atunci poziția luată de corpul nostru năzuiește să rămână aceeași și în timpul de odihnă. Fiindcă această atitudine este de obicei vi-



Fig. 36. — Atitudine bună la scris

țioasă, adecă ridică un umăr mai mult decât pe celalt, sau ține spatele prea aplecat, rezultă că trunchiul nostru nu se mai poate ține drept și rămâne strâmb pentru toată viața. Acestfel de sucitură, sau de strâmbare de corp, nu numai că strică frumusețea staturii, dar în același timp poate să împiedice și unele funcțiuni, cum sunt:



Fig. 37. — Atitudine bună la scris

respirația, mistuirea, etc. Prin urmare trebuie să fim cu mare băgare de seamă mai ales la copii, în vârsta dezvoltării fizice și să preîntâmpinăm din vreme urmările atitudinilor vițioase pe cari



Fig. 38. — Atitudine rea la scris

le iau în timpul scrisului, a cetitului, a cusutului, în școli și cari atitudini dau naștere la deviațiuni și deformații de corp, de statură.

Atlas. — Se chiamă cea dintâi vertebră din șira spinării. Pe ea se sprijină craniul.

Atonie. — Se cheamă scăderea mare a puterii de contracție a țesăturilor, (atonie uterină, gastrică, etc.).

Atoxil, anilarsinat de sodă. — Pulbere albă, fără miros, gust cam sărat, solubilă în apă. Se recomandă în boalele de piele, în anemie, în oftică, în boalele somnului în pelagră, etc. Atoxilul se dă în buline de câte 10 ctgr., simplu, sau cu puțină lactoză, 1—3 pe zi sau într-o soluție: atoxil, 1 gr., apă distilată, 150 gr. (1—3 linguri pe zi în puțină apă), sau în injecțiuni sub piele: atoxil, 1.50, apă distilată, 10 c. c. (o injecție reprezintă 15 cgr. de atoxil); se pot injecta 2 c. c. odată, adecă 30 ctgr., sub pielea pân-

tecelui sau în fesă, repetându-se la fiecare 2, 3 sau 4 zile.

Atrepsie (grec. *a*, fără și *threp-sis*, nutriment). — Boala copiilor de țată, a sugacilor. Nou-născuții slăbesc încetul cu încetul, până ce rămâne numai pielea și osul. Un copil cu atrepsie este încrețit ca un bătrân. Slăbirea vine din hrana rea, din care pricină copiii urdină mult, beau apă și ar mânca mereu. *Cauzele*: părinți nesănătoși, lapte rău, hrană rea și prea de timpurie. *Tratament*: să se dea țată sau lapte la intervale regulate, să se caute o doică sănătoasă, să se țină curat biberonul, să se dea lapte până la 10—12 luni. Ca medicamente se recomandă contra diareei acidul lactic, apă de var, bismut, clistire cu amidon cu tanin, benzonaftol, dermatol, tannigen etc. Copilul să se țină învelit în haine calde, să i-se facă băi calde și cu muștar, fricțiuni stimulente cu spirt, sau oțet de trandafir. — La țară, când se îmbolnăvește un copil de boală câinească, *babele* iau pelin verde, îl toacă mărunț, îl freacă în mâini, îl amestecă cu găinați de găină, îl prăjește cu seu de lumânare și leagă copilul la pânțece. Tot pentru aceasta fac copilului scâldători cu *părul ciutei*. (*Rhamnus cathartica*), de 3 ori pe zi: dimineața în fundul casei, la amiază în mijlocul casei și seara la ușă. Iși poate oricine închipui ce greșală fac cei ce mai cred în aceste obiceiuri.

Atrofie (gr. *a*, nu, și *trophî*, nutriment). — Slăbirea organismului, a unui organ, sau a unui țăsut, din cauza unui vițiu, a unei hrăniri rele și neîndestulătoare, a unei boale. Slăbirea este atrofia țesutului grăos. În vechime prin cuvântul *consumțiune* se înțelegea atrofia mușchilor și sub numele de *ftizie* (ceea ce astăzi înseamnă oftică la plămâni, sau formă ulceroasă) se descria atrofia generală fie ea produsă sau nu de o leziune locală. Atrofia este *simplă*, când este numai o micșorare de număr, sau de volum, a elementelor cari constituie organele și țăsăturile; ea este *degenerativă* când, pe lângă degenerarea grăsoasă, este și o rezorbție, o topire a elementelor degenerate. În atrofia simplă, care se observă mai ales la bătrânețe, este o dispariție progresivă

a elementelor grăsoase, a țăsutului adipos. Atrofia este *fiziologică*, cum este la bătrânețe, când unele organe încețază de a funcționa și anume: mamelele, uterul, testiculele; ea este *patologică*, în urma febrei grave, a febrei hectice, a boalelor cronice grave (diaree, diabet), a boalelor nervoase, a inanității, a unei inflamații, a oboselilor, etc. Gravitatea atrofiei atârână de întinderea ei și a cauzei care i-a dat naștere. Tratamentul variază după forma atrofiei. *Atrofia musculară progresivă* este datorită unei boale a măduvei spinării (*mielita coarnelor anterioare* și constă, la început, într'o slăbiciune a mușchilor, apoi topirea lor, încetul cu încetul, așa că omul se topește de pe picioare, până ce rămâne numai piele și oase. Această atrofie se întinde la toți mușchii, chiar și la acei ai buzelor, limbii și înghițtoarei, așa că omul nu mai poate mânca; ea sfârșește prin moarte. *Tratamentul* constă în electricitate: *curenți induși*, cari întrețin contractilitatea mușchilor și *curenți continui*, cari înlesnesc nutrițiunea mușchilor. La interior se dă fosfor, fosfor de zinc, nucleă vomică, strichnină, fier, arsenic, ergotină, singure sau asociate, de exemplu; fosfor de zinc 8 ctgr., arseniat de sodă 8 ctgr., oxalat de fier 4 gr., ergotină 20 gr., extract de nucleă vomică 80 ctgr.; să se facă 80 pilule și să se ia 3 pe zi. Se mai recomandă masaje și hidroterapie metodică.

Atrofie musculară progresivă. — V. *Atrofie și Măduva spinării*.

Atrofie musculară. — V. *Mușchi*.

Atropină. — V. *Mătrăgună*.

Aur (lat. *aurum*). — Acest metal prețios nu se întrebuințează în medicină decât foarte rar, în natură și atunci sub formă de plăci, de inele, etc. (vezi *Metaloterapie*). Mai mult se întrebuințează sub formă de *săruri*, cum sunt: *Bromurul de aur*, care se da în epilepsie, sifilis, cancer de stomac, în doză de 3 miligrame până la 1 ctgr, în soluție, *Clorurul de aur* lucrează ca antiseptic și caustic sclerizant. *Clorurul de aur și de amoniu* se dă în dismenoree în doză de 5 miligrame până la 1 ctgr., în grănule. *Clorurul de aur și de sodiu* se dă în contra sifilisului, în doză de

AUTO

5 miligrame până la 1 cgr., în pilule. Aurul se întrebuințează și în tuberculoză, de multe ori cu rezultate bune.

Autohemoterapie. — Este medota de a trata (lecuî) unele boli injectând în mușchi sânge dela același bolnav. Procedul este ușor: Intr'o seringă, sterilizată, se scoate din vâna bolnavului cantitatea de sânge pe care o dorim, apoi i-se injectează, imediat ce am scos acul din vână, în mușchi tot sângele din seringă. Dă bune rezultate în astm, prurit, exeme, etc.

Autoinfecție. — Se poate să avem odată un furuncul și în același timp să ne rănim; dacă punem mâna, sau un obiect, pe furunculul cu puroi, apoi o ducem pe rană, aceasta se infectează, face și ea puroi și uneori devine foarte gravă. Modul acesta, de a ne infecta cu microbi dela noi înșine, se cheamă autoinfecție.

Autointoxicație. — V. *Microbi.*

Automatism ambulator. — Epilepticii, nevropații, alienații, au adeseori o impulsie de a călători, de a fugi, căreia nu-i pot rezista. Epilepticii nu-și amintesc de nici o faptă săvârșită în cursul acestei stări.

Automobilism. — Călătoria cu un automobil bun este o adevărată plăcere, cu condițiunea de a merge cu o iuțeală numai de 30 până la 40 kilometri pe ceas și de a nu face mai mult de 200 kilometri pe zi. Automobilul nu trebuie să fie acoperit, ceea ce permite să aspiți aer curat, deci un mijloc foarte bun de a-ți recăștiga puterile, tăria, pofta de mâncare și somnul; ea este minunată pentru sănătate la cei surmenați, cari au trebuință de a se odihni; la anemici de asemenea. Alergând cu iuțeală câmpii întregi într'o frumoasă zi de primăvară, sau de vară, respirând un aer curat, toată ziua, seara mănânci cu poftă mare și noaptea dormi adânc ca după un exercițiu obositor. S'a studiat influența dislocărilor repezi de aer asupra nutrițiunii generale, examinând sângele, numărând globulele roșii și dozând hemoglobina și s'a ajuns la următoarele rezultate: la persoanele sănătoase cifra globulelor roșii a crescut simțitor. Hemoglobina dela 98 la 100 s'a ridicat la 101 și 102 la

AUTO

100. La doi oameni anemici s'au constatat foarte importante puncte de comparațiune: globulele roșii nu treceau de 4,300,000 la unul și de 4,500,000 la celalt; de a 3-a zi chiar nutrițiunea se îmbunătățește ca la oamenii sănătoși: globulele se ridică la 4,700,000 și 4,900,000; la sosire (a 10-a zi) la 5.675,000 și 6,800,000, adică un câștig de un milion de globule roșii în timp așa de scurt! Acest bun rezultat nu-l pot da cele mai bune preparate fieruginoase, nici cele mai vestite tonice (întăritoare). Emoglobina de asemenea s'a urcat dela 87 la 100 la 99 și 100 la 100. Aceste efecte se datoresc hematozei (primenirea sângelui în plămâni) făcută prin ajutorul unui aer mai bogat în oxigen, cum este aerul de pe câmp și printr'o aeratiune mai completă a plămânilor, cari respiră mai adânc în timpul călătoriei cu automobilul. Așa dar acest mod de călătorie se potrivește foarte bine la anemici, la neurastenici, cu condițiunea însă ca odihna să fie deplină, întrerupând cursa la timp. Automobilismul se poate recomanda ca mijloc de tratament celor ce sufăr de *emfizem* (năduf), pe o temperatură mijlocie, de *astm*, de *anemie*, de *surmenaj*. Cititorul însă nu trebuie să uite că o călătorie cu automobilul este foarte vătămătoare sănătății, când ea se face cu o iuțeală mare, stârnind nori de praf și expunând la accidente de cea mai mare gravitate. Este periculos pentru cei bolnavi de inimă și cu deosebire pentru cei ce sufăr de angină de piept.

Autoplastie (gr. *autós*, sine-însuși, și *plassein*, a forma). — Este o operație prin care se repară un organ, a cărui formă a fost stricată, prin părți sănătoase, luate de pe aceeași persoană, din vecinătatea organului stricat, sau din depărtare. Autoplastia se deosebește de *eteroplastie*, care combate diformitatea prin țesături sănătoase, împrumutate dela altă persoană, sau dela vreun animal. Se deosebește de *proteză*, care înlocuiește părțile pierdute prin lucruri artificiale.

Autopsie (gr. *autos*, sine-însuși, și *opsis*, vedere). — Prin aceasta se înțelege examinarea tuturor părților unui cadavru (om, sau animal, mort)

pentru a găsi, sau determina cauza morții. Autopsia poate fi făcută numai în scop medical, adică să se constate mai precis boala de care a murit omul, sau animalul, sau în scop de a lămuri justiția, asupra cauzelor cari au produs moartea. Deschiderea cadavrului poate fi mărginită numai la o parte a corpului.

Autoseroterapie. — Este o metodă mai nouă de vindecare a bolilor prin serul scos din sângele aceluiaș bolnav pe care îl lecuim.

Autoscopie. — Fenomenul prin care un individ se vede pe el însuși, sau în afară de el, sau în sinea lui.

Autotransplantare (osoasă). — Se cheamă înlocuirea unei lipse din schelet printr'un os luat din scheletul aceluiaș om, sau animal.

Auz. — V. Ureche.

Avariție (lat. *avaritia*), *sgârcenie*. — Iubirea de bani peste măsură de mare trebuie socotită ca o stare bolnăvicioasă, ca o *manie*, întocmai ca *dipsomania* (mania de a bea), *piromaniam* (mania de a da foc), *grandomania* (mania de mărire), *teomania* (mania religioasă), mania de a *fura* lucruri de prin prăvălii, mania de a *risipi* banii și averea, etc. cari sunt tot atâtea boale mintale. Un avar trebuie tratat ca oricare bolnav, care se poate vindeca printr'un tratament medical. Avarul se hrănește cât se poate de rău, mai rău de cât un om sărac, care își cerșește hrana; el poartă haine vechi, rupte și murdare; locuiește într'o casă neigienică, murdară, neaerată face ca toți ai săi să ducă lipsurile cele mai mari, să rabde foame și frig, întocmai ca și el și aceasta de frică să nu cheltuiască bani. Un astfel de om este cu adevărat *bolnav* și pe lângă toate lipsurile care le îndură el este stăpânit ziua și noaptea de neliniște și de groază, ca să nu-l fure cineva, ceea ce îl oprește de a dormi; devine pizmareț, plin de ură, fuge de lume, n'are prieteni, trăind într'o singurătate desăvârșită, muncit de idei fixe chinuitoare, de visuri rele; el este veșnic tăcut și ocolește pe toți cei ce-l caută. Avarul moare, în cele din urmă dement, dacă nu se ivește vre-o boală intercurentă, care să-i scurteze viața chinuită și tristă, sau dacă nu cade,

cum se întâmplă adese ori, victimă unui asasinat. — Avariția este câte odată ereditară; ea atinge mai mult pe celibatari și deopotrivă pe bărbați și pe femei. Nu trebuie să confundăm avariția cu economia și crușarea, cari sunt însușiri bune și caracterizează pe oamenii înțelepți și prevăzători. — **Tratament.** Această boală trebuie tratată dela început, dacă voim să obținem vr'un succes. Doctorul se va sili din capul locului să câștige încrederea bolnavului, pentru ca să-i poată sugera ideia că el trebuie să ducă o viață cât se poate de igienică și scutită de boale.

Aviație. — Turburările care se arată la cei ce se urcă pe munți înalți, sau în balon, se observă și la aviatori. Cum aviația face progrese mari e bine ca alegerea piloților și observatorilor aviatori să se facă cu multă băgare de seamă. Să nu se primiască cei cu boli de inimă, de ochi și urechi, nervoși, sifilitici, alcoolicii și anemicii.

Avitainoza. — Starea, sau boala datorită lipsei complete, sau parțiale, în alimentația noastră, a vitaminelor.

Avort. — V. *Abort*.

Avrămeasă. — V. *Veninarită*.

Axilară (Regiunea). — V. *Subsuoară*.

Axonge. — Grăsimă de porc preparată în mod special și care servește în farmacie la prepararea alifilor și a pomezilor. Fiindcă ea rânzește ușor a început să fie înlocuită cu *vaselină* și *glicerină*, cari nu rânzează nici odată.

Azimă (Pâine), dela grec. *a*, fără, și *zymi*, drojdii, plămădeală, aluat. — Pâine care n'a dospit, n'a fermentat.

Azmură. — V. *Smeură*.

Azot (Protoxid de). — Un gaz care se întrebuințează pentru a amorți o regiune, în care se face o operație de scurtă durată: la scoaterea dinților, pentru a amorți gingia și nervul. Protoxidul de azot, numit și *gaz de voie bună* (ilariant) din cauză că el produce o simțire plăcută, care face pe om să rădă, trebuie să fie curat și să se dea în doze foarte mici.

Azotat de argint. — V. *Argint*.

Azotate, azotic (Acid). — V. *Nitrate* și *Nitric*.

Azotemie. — Totalitatea semnelor,

simptomelor, datorite opririi în sânge a compuşilor azotați, ca *ureea*. Dacă în sânge se găsește mai mult de 0 gr. 20—0 gr. 50 de uree la litru, atunci avem azotemie. Dacă se găsește peste 1 gr. de uree în sânge avem de a face cu azotemie de *alarmă*.

Totdeauna trebuie să cerem ajutorul medicului în acest caz. E bine ca măcar odată pe an, mai ales după vârsta de 40 de ani, să ne cercetăm sângele din acest punct de vedere.

Azoturie. — Eliminarea prin urină a unei cantități anormale de substanțe

azotate ca : acid uric, uree. Depinde și de alimentație. În *bolile ficatului*, în accesele de *malarie*, în boli cu febră. *Hiperazoturia* (120—130 gr. uree în 24 ore eliminată prin urină) se întâlnește în diabetul *pancreatic*, *diabet azoturic*, *icter cataral*, *ciroză hipertrofică alcoolică*.

Azuga. — Localitate de petrecut vara, pe valea Prahovei, între Bușteni și Predeal, situată într-o poziție încântătoare, înconjurată de munți uriași și de păduri frumoase de brazi. Clima este ca și la *Bușteni*. Imprejurimi frumoase.

B

Babadag. — Stațiune balneară în județul Tulcea. Orașelul Babadag se află la o depărtare de 3 ore cu trăsura dela Tulcea. Băile se află la 2 kilometri de oraș, unde mergi cu trăsura pe un drum foarte frumos, printre vii și pomi. Poziție încântătoare. Apele conțin sare, iod, pucioasă și fier. Se recomandă în reumatism, scrofuloză, anemie, etc. Excursiuni se fac pe muntele Columbaba, la Chioșcula, etc. Apă de băut foarte bună.

Babinski (Semnul lui). — Poartă acest nume după numele descoperitorului, medicul Babinski. Se întâlnește la om când fasciculul piramidal din bulb (vezi : sistemul nervos central) nu-i complet dezvoltat, sau este alterat (bolnav). Iată cum se caută : tragem ușor cu vârful unui ac peste marginea internă a tălpii. Dacă omul este normal și sănătos degetul cel mare dela picior încearcă să se îndoaiească (se flectează) ; dacă omul are o boală care i-a vătămat bulbul, cum spuneam mai sus, degetul cel mare al piciorului se dă pe spate, după ce am tras cu acul ; în primul caz se zice că Babinski este negativ, în al 2-lea este pozitiv.

Babeurre este un aliment acrișor, albicios, preparat din lapte, după ce s'a extras untul. Se prepară astfel : se ia lapte crud, de bună calitate și se pune într'un vas la prins. După 24 de ore (în timp de iarnă după 36 de ore), se scoate crema care s'a așezat la suprafață și se bate laptele prins. ca să i-se scoată tot untul rămas. Li-

chidul rămas este babeurrul, care se întrebuintează fiert și îndulcit (după Prof. Manicature).

Se dă copiilor cari au avut o intoxicație alimentară, sau diaree de mai lungă durată. Nu este un aliment hrănitor, de aceea nu se va da copiilor timp îndelungat, ci numai cât va fi nevoie ca să ajute întremarea tubului digestiv al copilului care a fost bolnav.

Fierberea se va face încet, la foc mic și mestecându-se mereu.

Babon. — V. *Adenită*.

Bacil (lat. *bacillum*, bețișor). — Varietate de *microbi*.

Bacilemie se cheamă infecția generalizată, datorită pătrunderii bacililor în sângele unui individ.

Bacterie (grec. *bacterion*, băț mic). — Varietate de *microbi*.

Bacteriurie se cheamă boala datorită pătrunderii unui mare număr de bacterii în urină.

Bădean. — V. *Anason*.

Băi (lat. *balneum*, baie), *scalde*. — Prin cuvântul baie se înțelege șederea mai mult sau mai puțin prelungită a corpului, sau numai a unei părți din corp, într'un mediu, care de cele mai adeseori este *lichid*, de obicei apă, de multe ori *gazos*, băi de aburi sau de aer, și câte odată *solid*, băi de nămol de nisip. Băile sunt de două feluri ; *simple*, când se întrebuintează numai apă, dulce sau sărată ; *medicinale*, în toate celelalte împrejurări. Dacă se cufundă corpul întreg baia se numește *completă*, întregă ; dacă se cufundă numai o parte din corp se

chiamă baie *parțială*, cum este baia de șezut, baia de picioare, de mâini.

— *Băile simple*, de apă dulce, calde, sau reci. (Despre băile de apă sărată *naturală* vom vorbi la *Mare*). *Băile întregi* pot fi *călduțe* (temperate) sau *calde*, cu o temperatură a apei de 29 până la 34 de grade centigrade, iar cele *calde* de 35—40°. *Baia caldă* mărește asudarea pielii și produce o excitație generală, urmată îndată de o



Fig. 39. — Baia de mâni

slăbiciune, moleșeală. Această baie este periculoasă pentru oamenii sângeroși și nu trebuie făcută decât după sfatul doctorului. Cea mai igienică este baia *temperată*, sau *călduță*, care se potrivește oricărui om sănătos și în multe cazuri de boală. Fiindcă temperatura ei (29—34°) se apropie de aceea a corpului, când intrăm în ea nu simțim o neplăcere, ci o prea mică supărare în respirație și o ușoară strângere a corpului, cari dispar după câteva clipe. Fața este puțin colorată și jilavă, n'avem durere de cap, apoi începem să ne simțim bine. Această baie înlesnește slujba pielii curățind-o de murdăria și de grăsime, de solzii sau straturile de epiderm, ce sunt gata să cadă, de praful care o îmbăcsește, etc., nu slăbește și ca *baie de curățenie* e bine să se facă cel puțin odată pe săptămână. O baie trebuie să țină o *jumătate de ceas*, până la un ceas, dacă trece peste acest timp produce slăbiciune; nu trebuie să facem baie cu stomacul încărcat, deci nici odată după mâncare, ci numai după ce au

trecut 3 până la 5 ceasuri. După baie putem mânca îndată. Timpul cel mai bun de baie este dimineața, până la dejun și spre seară înainte de masă. *Băile reci* sunt acelea cari au o temperatură dela 28 grade în jos până la 20°, iar cele de 10—19°, le-am putea numi *foarte reci* (acestea sunt periculoase, căci, ori cât de scurte ar fi, pot produce *congestiuni pulmonare* (îngrămădiri de sânge la plămâni), răceli și alte neplăceri. Este mai bine să ne scaldăm în *apa curgătoare, de râu*, decât în *apa stătătoare*, căci apa este neconținută prămenită. Când intrăm în apă simțim mai întotdeauna un fior general, care ne sbârlește pielea, un fel de strângere de stomac, supărare în respirație, dar toate acestea pier repede, mai ales dacă ne aruncăm repede în apă și cu tot corpul deodată, fără să stăm locului, ci mișcându-ne mereu în toate părțile. *Durata* unei băi reci este de 5 până la 20 minute, nici odată mai mult. După baie ne vom îmbrăca repede și vom face o plimbare cu pași



Fig. 40. — Baie de picioare

iuți pentru ca să se producă o reacție în corpul nostru. Astfel făcute, băile reci sunt tonice, întăritoare, folosite vara când sunt călduri mari; ele micșorează asudarea și măresc pofta de mâncare. Nu sunt bune la cei slabi și iritabili, cari tremură în apă, la cei

nervoși, la cei sângeroși, cari sunt amenințați de apoplexie cerebrală, la cei cu boale de inimă și cu anevrism. De asemenea băile reci nu sunt bune la copii până la vârsta de 7—8 ani, nici la bătrâni. *Băile reci, făcute în puțină, în boalele cu fierbințeală mare, cum este febra tifoidă, au o temperatură care variază dela 30 până la 18°; la adulți se fac de 20° și durează 15 minute, repetându-se din 3 în 3 ore, până când temperatura corpului (luată în șezut) scade sub 39°.* La copii prima baie va fi de 28°, celelalte de 24°, ținând fiecare cinci minute, iar dacă începe fiorul și mai puțin. După ce va ieși din baie bolnavul se va înveli în haine de lână, iar la picioare i se va pune o sticlă cu apă caldă. Băile reci, în boalele cu fierbințeală mare, scad temperatura și calmează sistemul nervos, regulează circulația și respirația, înmulțesc udul (urina), prin care se elimină toxinele din corp. Se recomandă băile reci în febra tifoidă, în broncho-pneumonie la copii, reumatism cerebral, febrele eruptive (scarlatină, pojar), meningită, delirium tremens. Nu e bine să se dea în pneumonie dublă, în boalele de inimă, diabet, boala lui Bright (de rinichi), când ea întovărășește o boală febrilă. *Băile parțiale sunt de mâini, de picioare și de șezut.* Cele mai mult întrebuințate sunt băile de picioare și de șezut, *Băile de picioare, cu apă curată și caldă, trebuie să se facă adeseori pentru curățenie, mai ales de către cei ce fac băi întregi; dacă nu în toate zilele, ele trebuie să se facă cel puțin de 3 ori pe săptămână, și întotdeauna seara, la culcare, după 2—3 ceasuri dela mâncare.* Băile de picioare, *calde, trag sângele în jos, pentru aceea se întrebuințează în durerile de cap, guturai, văjiituri de urechi, în durerile de gât, etc.* Apa trebuie să fie caldă, cât o putem suferi, în tot timpul cât ține baia, care de obicei durează 10—15 minute. Efectul este mai mare dacă punem în baie sare sau făină de muștar. *Băile de șezut se fac în putini speciale în formă de scaun, cu spate și mâner, în care trunchiul se înfundă în apă până la buric, iar picioarele rămân afară.* Aceste băi se fac pentru curățenie și când sunt toate ordonate

de doctor pentru a liniști mâncărimile și inflamațiunile de șezut, pentru trănji, pentru a restabili curgerea periodului, în inflamațiile de beșică etc. Ele pot fi de apă curată sau medicinale, adică punând în apă doctorii. — *Băile medicinale.* Intre acestea avem în primul loc: *Băile cu aer cald; ele au de scop să întetească slujba pielei, să asude mai mult cu ajutorul aerului cald și uscat; sunt bune pentru cei grași și pentru cei ce sufăr de reumatism.* Pentru a face o baie de aer cald este de ajuns să punem bolnavul desbrăcat pe un scaun, iar sub scaun să aprindem o lampă de spirt, cu mai multe flăcări, apoi să învelim bolnavul cu una sau două cearșafuri, ori cu o plapomă de lână, cari vor cuprinde scaunul și bolnavul până la gât, în jurul căruia le fixăm, astfel



Fig. 41. — Baie de șezut

că tot corpul, afară de cap, va sta într'un aer încălzit repede și destul de tare. Un alt procedeu este de a pune bolnavul într'o *etuvă uscată*, sau într'un fel de *ladă* de lemn, care cuprinde corpul întreg până la gât; aerul din acea ladă va fi încălzit tare cu o lampă de spirt sau de gaz. În timpul cât stă în baie bolnavul va bea din când în când apă rece; se va deschide și o fereastră pe când s'a stabilit asudarea, pentru ca bolnavul să respire cu ușurință. E bine să se termine baia cu o cufundare într'o piscină de 12°, sau sub un duș. *Temperatura* băii de aer cald variază după efectul pe care vrem să-l obținem. Cu o *temperatură* de 38—42° avem un efect *excitant sudorific*, pentru aceasta este bine să supraveghiem căldura din etuvă ca să nu treacă de 42°, și îndată ce ajunge la acest grad vom strânge o flacăară dela lampă. La această temperatură pielea se înroșește și se umflă, circu-

lația pielei e mai grăbită și nădușeala începe, pulsul rămâne liniștit și bolnavul se simte bine. Dacă, din contră, el se simte cam rău, îl doare capul, trebuie să-i punem pe frunte cărpe înmuiate în apă rece. Durata băii este de o jumătate până la o oră. Cu o temperatură de 45—55° avem efect revulsiv: sudoarea neputând cumpăni temperatura băii, căldura corpului crește cu 1° până la 3° și odată cu ea circulația devine mai repede, respirația de asemenea, fața se înroșește, urechile vâjje, ameteți și chiar pierdere de cunoștință prin congestie cerebrală (îngrămădire de sânge la creeri); de aceea, îndată ce vedem că bolnavul începe să sufere, trebuie să mai stingem din flăcările lămpii, iar bolnavul nu va sta mai mult de 15—20 minute. După baie bolnavul se va cufunda în piscina cu apă rece, sau va trece pe sub duș. Se înțelege dela sine că aceste băi nu se vor face decât după porunca doctorului și cu mare supraveghiere. Sunt bune pentru a slăbi, când cineva suferă de îngrășare prea mare (*obezitate*); sunt bune pentru reumatismul cronic, pentru diferite nevralgii, etc. Nu sunt bune pentru oameni sângeroși și iritabili. *Baie alcalină*, se face cu carbonat de sodă, punând 250 gr. pentru o baie obișnuită; se recomandă în boalele cronice de piele, reumatism cronic, durerea de șale. *Baia aromatică* este o baie simplă în care se toarnă o fiertură de jale, lămâioară, pelin, rosmarin, cimbrisor, izmă și leventică și produce o excitație generală foarte prielnică. *Baie de nămol*. Unele ape minerale lasă să se depună aproape de izvoarele lor un fel de nămol care conține aceleași materii ca și ele și care are aceleași proprietăți. Băile de nămol se fac sau calde, sau reci, sulfuroase sau fieruginoase ca și apele cari îl depun. Sunt bune pentru copiii scrofuloși, debili, pentru reumatism, pentru boalele de mîtră. Nămolul se întrebuințează sau în băi întregi sau în jumătăți de băi, sau în aplicațiuni de nămol curat pe anumite părți bolnave ale corpului. La noi cea mai vestită stațiune balneară în această privință este *Tekirghiolul*. *Baie de nisip* se face pe malul

mării, acoperind o parte a corpului cu un strat de nisip, gros de câțiva centimetri, și stând astfel la soare 15—20 minute, adăpostind capul cu o umbrelă și supraveghind efectele. Corpul începe să asude și nisipul se lipește de piele; când căldura devine prea mare și începe să ne doară capul, trebuie să încetăm cu baia. Se recomandă la reumatism și în scrofulă. *Baie sărată*. Se pun în apa de baie 2—4—6 Kgr. sare ordinară. Dacă vrem să avem o baie de mare artificială, vom pune în apă: 8 kgr. de sare neagră, 3 kgr. de sulfat de sodă, 3 kgr. de clorur de magneziu și 700 gr. de clorur de calciu. Băile sărate sunt întăritoare (tonice) și stimulente. Se recomandă la anemici, scrofuloși, limfatici. 16. *Baie de tărâte*. Fierbem 2 kgr. de tărâte în 5 litri de apă, strecurăm și legăm tărățele într'un sac pe care îl punem în baie, turnând și apa în care a fiert. Această baie este calmantă, liniștește mâncărimea și inflamațiile de piele. *Băi sulfuroase*, de pucioasă: Se tolesc 125 grame de piatră pucioasă, într'o jumătate oca de apă, pe care o vărsăm în baie. Dacă mai punem și 250 gr. de gelatină, avem o baie sulfuro-gelatinoasă. Pentru ca o baie să se apropie de cele sulfuroase naturale pe lângă floare de pucioasă mai punem: câte 60 grame de sulfur de sodiu, carbonat de sodă și sare ordinară, topite în 300 gr. apă. Aceste băi sunt foarte bune în scrofulă, reumatism și mai ales în boalele învechite de piele. Durata băii trebuie să fie de 20—30 minute și să nu fie prea caldă. *Baie de aburi*. După cum în baia de aer cald căldură uscată lucrează asupra pielei, în baia de aburi căldura încărcată cu umezeală: la temperatură egală, baia de aburi este mai bine suportată decât cealaltă. Se face într'o cameră specială, închisă ermetic, unde introducem cât se poate de mulți aburi de apă. Când bolnavul nu se poate ridica putem să-i facem baie de aburi în pat: plapoma fiind ridicată cu un cerc de fier sau de lemn, se învâlește bolnavul până la gât într'un sac de pânză lustruită, sau smălțuită, în care intră aburul dat de o lampă de spirt; sau se pune sub pla-

pomă o bucată de var nestins în care se toarnă apă, puțin câte puțin; căldura desvoltată de var, în atingere cu apa, face aburi, dar trebuie mare băgare de seamă, ca acea căldură să nu fie prea mare, să ardă bolnavul, sau să aprindă pânzăria patului. De aceea este de preferat baia de aburi făcută într'un stabiliment. Omului sănătos baia de aburi îi mărește vigoarea corpului, îl face mai mlădios, mai sprinten, mai vioiu, ceea ce face ca aceste băi să fie cele mai igienice și ar trebui să fie mai mult întrebuințate; baia de aburi se sfârșește prin dușuri reci, în formă de ploaie, peste tot corpul, sau omul trece pe rând prin trei camere, a căror căldură este din ce în ce mai mare (60—80°); apoi trece în camera în care îi se face masaj, se bate cu ramuri mlădioase de mesteacăn, se săpunește cu săpun aromatic și se fricționează cu o mânășă de păr; după aceasta trece în altă cameră unde i-se face duș de apă caldută și de acolo în cea din urmă cameră se culcă, învelindu-se bine în plapomă de lână, ca să asude mult. Băile de aburi sunt foarte bune în reumatismele învechite, nevralgii, mai ales în nevralgia sciatică.

Baie cadă, putină, scăldătoare. — Aparat sau vas care servește pentru a face băi. Cele mai adeseori se întrebuințează băile de faianță de zinc, de aramă sau de lemn, având forma ovală. Băile de piatră, de ciment, de porțelan, de marmură, etc., se găsesc mai ales în stabilimentele balneare. Trebuie ca putina să fie astfel construită, încât tot corpul să poată fi cufundat în apă. Pentru copii se fac putini mici de lemn, sau de zinc, potrivite cu mărimea lor. Căzile de lemn servesc pentru băile acide, băile mercuriale, băile cu pucioasă, etc. acestea se pot face în putini smălțuite, dar nu trebuie să uităm că nu e bine să punem în băi de metal soluțiuni mercuriale (sublimat corosiv) sau o soluție acidă.

Bal (lat. *ballare*, a dansa, a juca). — Jocul, sau danțul, are unele foloase, dar imprudențele cele mari la cari dă loc și cari, cu oarecare băgare de seamă, s'ar putea ocoli, ne dau prilejul să vorbim de el. Se face de obicei într'un

salon închis de toate părțile, rău aerat și de multe ori prea mic în raport cu lumea ce adăpostește, așa că aerul se strică repede. Mai mult, femeile în toalete de bal sunt strânse în corsete, așa că organele lor nu-și mai pot face slujba; respirația, digestia și toate celelalte funcțiuni se îndeplinesc rău, din care cauză în curând se sufocă se, înăbușe și atunci recurg la înghețată, ori limonadă cu ghiață, ca să se răcorească, dar fiind asudate îndată răcesc, dacă nu răcesc în bal, se îmbolnăvesc în drum spre casă. Nu trebuie ca fetele să se lipsească de bal, dar sunt unele reguli cari ar trebui păstrate, spre binele tuturor. Intre acestea sunt: balul să înceapă mai de vreme ca de obicei și să se termine mai curând, salonul să fie destul de mare și bine aerat, fără să aibă curenți de aer. Numărul invitaților să nu fie prea mare, ci în raport cu mărimea salonului, sau a saloanelor, ca să nu fie lumea prea înghesuită. Dansatoarele și cavalerii lor să nu bea lichide prea reci, cu ghiață, când sunt înădușiți, iar când pleacă din bal să se odihnească mai întâiu, cel puțin o jumătate de oră, ca să nu fie asudați când ies la frig. Boalele cari se pot căpăta prin călcarea acestor reguli sunt: amigdalita, guturaiul, tusa sau bronșita, junghiul sau pleurezia și pneumonia și în cele din urmă oftica, sau unele boale grele de inimă.

Balanită (dela grec. *balanos*, gland. ghindă). — Inflamațiunea sau aprinderea pielii de pe capul membrului bărbătesc (a penisului), care adeseori coincide cu a sulacului (prepuțului) și atunci avem: *balanopostita*. Cauzele sunt mai multe: o iritație locală, murdăria (necurătenia), sculamentul sau șancăru, urina cu zahăr a diabeticilor, excesele. Ca semne avem: roșeața și umflarea părții inflamante și un fel de materie urâtă și cu miros rău, care se scurge dintre cap și prepuț. Vindecarea se face de obicei într'o săptămână; la alcoolici și diabetici se poate complica de gangrenă. Balanita se însoțește de multe ori de *fimoză*, sau de *parafimoză* (vezi aceste cuvinte). **Tratament:** Băi locale cu apă de plumb, cu apă cu sulfat de zinc, cu acid boric, cu cari se spală cu c tu-

lumbiță pe sub sulac. Se mai fac și arsuri ușoare cu piatra iadului.

Balcic. Este primul orașel mergând pe coasta românească a Mării Negre spre granița cu Bulgaria. Prin așezarea lui într'un golf al Mării Negre, Balcicul este scutit de curenți și de vânturi, având în spate un deal care-l apără, așa în cât este una din stațiunile climatice mult căutate în timpul verii, oferindu-ți priveliști minunate și când îl vezi de pe Mare și când privești Marea, de pe uscat. În jurul lui, pe distanțe mari, este climat cald. Excursionistii, precum și cei ce se duc să rămână mai multă vreme la Balcic, găsesc un climat maritim și un aer și soare plăcut, cum este pe tot malul Mării Negre, adică pe așa numita coastă de argint. Regiunea este recomandabilă pentru toți limfaticii, anemicii și pentru cei slăbiți, fiind un loc de recreație dintre cele mai frumoase. Se poate merge la Balcic cu trenul prin Bazargic și cu vaporul dela Constanța.

Bale. — V. *Salivă*.

Balneoterapie (dela lat. *balneum*, baie, și grec. *therapein*, tratament). — Cură prin băi.

Balonarea sau umflarea pântecelui. — V. *Abdomen*, *Gaze intestinale*.

Balotare. — Termin de obstetrică prin care se desemnează rezultatul primit prin mișcările împărțite capului copilului, care, împins în mod brusc cu degetul introdus în vagin, cade din nou asupra lui producând o lovitură, care este unul din semnele cele mai sigure ale sarcinii. Se poate provoca această balotare dela a VI-a lună.

Balsam. — Sunt două feluri de balsamuri: *naturale* și *artificiale*. Cele dintâi sunt niște rezine (rășini), cari conțin acid benzoic sau cinamic și cari se scurg în mod natural din unii copaci, cum este de exemplu: balsamul de Peru, de Tolu, Smirna, Stirax, Lichidambar, și unele rezine lichide ca balsamul copaiv. Balsamurile artificiale sunt preparate în farmacie cu substanțe rezinoase, sau aromatice și cari prin proprietățile lor se apropie de cele naturale; toate calmează durerile. Cele mai întrebuințate sunt: *Balsam acetic camforat*: săpun și cam-

for 1 gr. la 50 gr. eter; fricțiuni pentru reumatism, *balsam antinevralgic*, *balsam dentar*, *balsamul comandorului* (se plămădește în spirt angelică, pojară, săbur, smirnă, miră, tămâie, balsam de Tolu). Se întrebuințează la oprirea curgerilor de sânge și grăbește vindecarea rănilor, *balsam Fioraventi*, (se obține distilând mai multe substanțe rezinoase sau aromatice: terbentină, miră, scorțioară, micsandre, gherghină, etc. după ce mai întâi s'au plămădit în spirt. Este un stimulent energic, care se întrebuințează la reumatismul cronic, la dureri de mușchi, la paralizii) făcându-se fricțiuni). *Balsamul Opodeldoch*, se face din: spirt, grăsime de vacă, amoniac, camfor, esență de lămâioară și rosmarin. Foarte bun în fricțiuni contra durerilor reumatice, loviturilor, scintirilor și paralizilor. — *Balsamul tranquil*, este un fel de fiertură, făcută din mai multe plante aromatice și narcotice, în untdelemn; bun liniștitor contra durerilor nevralgice, reumatice și altele. — *Balsamul de viață al lui Hoffmann* e o tinctură alcoolică de săpun, camfor și esență de rosmarin. Se întrebuințează ca și cele de mai sus, în fricțiuni.

Balsam copaiv. — V. *Copaiv*.

Balta albă. — Stațiune balneară în județul Râmnicul-Sărat, situată în com. Grădiștea de jos, foarte reputată pe vremuri, apa și nămolul său. La 1876 lacul a fost inundat și de atunci lumea și-a pierdut credința în puterea apelor lui, așa că astăzi aceste băi vestite nu mai funcționează.

Bălțătești. — Stațiune balneară în județul Neamț, la o depărtare de 10 Km. de Târgul-Neamț. Localitate vârită într'o vale prea frumoasă și adăpostită de vânturi la poalele unor șiruri de munți, acoperiți de păduri întinse de brazi. Drumurile de la gările Piatra-Neamț și Pașcani, până la această stațiune, sunt minunate, bine bătătorite cu piatră de munte; călătoria frumoasă și pitorească. Bălțăteștii se află la o înălțime de 475 m. deasupra nivelului Mării-Negre. Temperatura medie în timpul verii 18°; clima constantă și dulce; aerul curat și uscat; o vegetație vie împropătează atmosfera, care, fiind astfel

BĂLT

ozonizată dă stațiunii însușirile unei localități climaterice. Isovoarele sunt în număr de patru; ele sunt clorodice și natrio-sulfatice, conținând și magneziu, clorure, bromure și iodure. Elementul predominant este clorul de sodiu, iar marea proporție de sulfat dă apelor proprietatea terapeutică de care se bucură. Aceste ape prin cloruri, bromuri și ioduri se apropie de apele dela Kreuznach și Hamburg, iar prin sulfatii de sodă și clorul de sodiu de cele dela Ischil. Reichenhall și Ausée. *Sarea purgativă de Băltățești*, așa de mult întrebuințată, se extrage prin evaporare din izvorul No. 1; e cristalizată și foarte bogată în sulfat de sodă și în cloruri, bromuri și ioduri de magneziu. Din isovoarele No. 1, 2 și 3 se prepară, tot prin evaporare, sarea de băi. Apele din izvoarele No. 1, 2 și 3 se întrebuințează pentru băi calde sau reci, idroterapie, inhalazioni, pulverizazioni și injezioni. Apa dela No. 4 se bea. Se recomandă în *scrofuloză*, *limfatism*, *rachitism*, boalele sistemului nervos (paralizii, paraplegii, emiplegii); în *debilitatea generală*; în boalele de *piele* (eczemă, prurigo, psoriază); în boalele de *mitră* și de *ovare*; în *tuberculoza de oase*.

Băltătură. — V. *Unguraș*.

Bălură. — V. *Brândușa de toamnă*.

Banana. — Fructul plantei *Musa sinensis*. E parfumată, plăcută la mână care, bogată în vitamine, bună pentru copii și adulți. Conține 15% zahăr și 3% amidon. Nu se recomandă diabeticilor.

Bandaj erniar. — V. *Ernie*.

Bandaj ortopedic. — V. *Columna vertebrală* și *Ortopedie*.

Bandaje, legături. — Prin bandaj înțelegem o legătură aplicată asupra unei părți a corpului, care servește pentru a strânge acea parte, ca să se desumfle, sau să nu se mai umfle, pentru a opri o curgere de sânge (*emoragie*), pentru a fixa piesele unui *pansement*, ca să nu se miște, pentru a ține în loc o surpătură, *ernie*, ca să nu mai ese afară. Un bandaj se compune din carpe numite *compres* și din *feși*. Când facem un bandaj trebuie să avem în vedere următoarele reguli: bandajul să fie de o potrivă de strâns

BAND

în toată întinderea lui, pentru ca să nu se slăbească, să nu joace. Să nu-l strângem prea tare pentru ca să nu se oprească circulația sângelui și să se producă *gangrenă*. Când strângem prea tare partea aceea se învinețește și extremitatea membrului se răcește; în




Fig. 42. — Bandaj de gambă

tot cazul vom strânge cu atât mai slab partea cu cât stratul de bumbac ce se află între piele și bandaj este mai subțire. Bandajul să se aplice pe membru de jos în sus, pentru ca sângele să se împingă spre centru. — Aplicarea bandajului să se facă încet și blând ca să nu sdruncinăm partea du-



Fig. 43. — Bandaj de piept

reroasă. Fașa să se desfacă puțin câte puțin, în măsura în care înaintează bandajul; la începutul bandajului, pentru ca să menținem extremitatea în mod solid, vom face mai multe înconjururi cu fașa, cari să se acopere pe deplin, apoi celelalte înconjururi să se acopere numai pe a treia parte. — Să nu se facă încrețituri atunci când se întoarce fașa. Capătul feșii să se

fixeze cu un *ac de siguranță*, sau să se coase, sau să se rupă în două şuvițe, cari să se înoade între ele, de parte de locul dureros. Când se desfăce bandajul fașa trebuie răsucită (îndoită în sul) în sens contrar (vezi *Feși*).



Fig. 44. — Aparat de extensiune

Pentru *bandajele cu feși* se întrebuințează: feși făcute din tifon sau din pânză, un strat de vată, simplă sau fenicată, strat mai mult sau mai puțin gros, care se pune pe partea bolnavă pentru ca să apărăm plaga cât mai bine de microbii din afară și pentru adomoli apăsarea feșii. Diferitele feluri de bandaje se pot vedea în figurile alăturate la acest articol. Bandajele *cu feși* se fac și la cap, mai ales asupra ochilor, dar la cap cele mai adeseori se întrebuințează *triangulele* sau *colțarele*.

Aceste bandaje sunt cele mai practice. Ele pot fi făcute cu un *tulpănaș* în *trei colțuri*, sau dintr'o bucată de pânză în *patru colțuri*, care se poate îndoi în mai multe, ca o *băsmăluță*



Fig. 45. — Bandaj pentru maxilarul inferior



Fig. 46. — Bandaj pentru cap

de gât, a cărei lățime va fi potrivită cu locul pe care trebuie să-l acopere. Când n'avem *ac de siguranță* vom face un nod, iar dacă vroim ca nodul să nu apese prea tare asupra pielii vom pune sub el o *perinuță* de vată. La aplicarea acestui bandaj vom așeza în totdeauna mijlocul legăturii asupra rănii și vom înoda cele 2 capete de

partea cealaltă, sau, dacă lungimea pânzei este destul de mare, le vom încrucișa și le vom înoda în apropiere de rană. În unele cazuri, cum este la față, la picioare, această încrucișare trebuie făcută pentru ca pansamentul să fie mai tare, mai sigur. Pentru *bandajele în patru colțuri* ne putem servi de un șervet, sau ștergar de pânză,



Fig. 47. — Bandaj pentru nas



Fig. 48. — Bandaj monocular

cu care se face de obicei așa numitul *bandaj de corp*, care se aplică în jurul pieptului atunci când s'a rupt o coastă sau mai multe. În acest caz este bine ca ștergarul să fie mai lung, ca să înconjure pieptul cel puțin odată și jumătate, după care îl coasem bine, potrivit de strâns, și pentru ca să nu



Fig. 49. — Bandaj în formă de T

cadă jos, îl vom fixa cu niște bretele aplicate peste umeri. *Bandajul în formă de praștic*, care se aplică de obicei la cap, se face dintr'o bucată de pânză mai mult lungă decât lată, despăcată la capete în 2 sau 2 şuvițe, cari merg până aproape de mijlocul ei. Partea de mijloc a pânzei, care este

întreagă, se aplică pe vârful capului, şuvițele de dinapoi pe frunte și cele de dinainte la ceafă. — Pentru *bandajul de ochi*, în formă de praștie, să se vadă figurile alăturate. *Bandajul în T* se formează dintr'o fașă transversală și din alta verticală; el se întrebuintează la pansamentele ce se fac între coapse. Partea transversală, sau orizontală, slujește de încingătoare, iar partea verticală, care este cusută cu un capăt de încingătoare, merge cu celalt capăt printre coapse și se leagă de cealaltă parte a corpului tot de încingătoare. Mai sunt și altfel de bandaje: *crucea de Malta*, *eșarfa*, etc. (vezi aceste cuvinte). *Bandajul inamovibil* se aplică de obicei la fracturi și se face cu ghips.

Brandrăburce. — V. *Carțofi*.

Barabule. — V. *Carțofi*.

Barbă. — Românul din firea lui nu poartă barbă, dar cei ce-o poartă să nu uite că ea trebuie ținută curată, spălată cu apă și cu săpun și periată în fiecare zi, și, din când în când, potrivită cu foarfecile. Cei ce se rad sunt expuși la boale lipicioase, pe cari le capătă dela bărbier, dintre cari unele destul de grele: *tinea (chelia)*, *pedală*, *sifilis*, etc. Din această pricină este bine ca fiecare să se radă singur, cu briciul său propriu, iar dacă nu se poate rade el, să-și ducă la bărbier briciul său, cu care îl va rade, căci nu este bine să fie ras cu briciul comun, cu care se rade alții, dela cari se poate îmbolnăvi. Azi mai toți se pot rade singuri, de când s'a inventat *mașina de ras*, cu care nu te poți tăia și pe care ar fi bine s'o întrebuinteze toți. De asemenea este bine ca și periile, foarfecile, pieptenul, să fie *personale*, dacă vrem să fim sănătoși. Când ne radem la bărbier, cu briciul lui, trebuie să cerem ca să-l dezinfec-teze în fața noastră, spălându-l bine cu alcool. Briciul trebuie să taie cât se poate de bine, pentru ca să nu ne sgârie pielea, iar săpunul să fie de calitate bună.

Barba caprei. — V. *Crețușcă și Ciuperci*.

Barba împăratului. — V. *Micșunea*.

Barba lui Aron. — V. *Rodu pământului*.

Bărzăun (*Înțepături de*). — V. *Albine*.

Basamac. — V. *Rachiu*.

Băsea-Penteleiu. — Stațiune climaterică de munte, în munții Buzăului (70 km. dela orașul Buzău). Se găsește situată la o înălțime de 400 metri, în comuna cu același nume. Această localitate pitorească este înconjurată de păduri. Se găsesc și izvoare cu apă minerală, alcalină-fieruginoasă, sulfuroasă: No. 1 și 2 pentru băut, No. 3 pentru băi. Astăzi stațiunea aceasta este puțin cercetată.

Basedow (Boala lui), sau gușă exoftalmică. — V. *Tiroidă*.

Basin (lat. *pelvis*), *lighian*, *șold*). — *Basinul*, *lighianul*, sau *șoldul*, este un




Fig. 50. — O secțiune într'un basin de femeie

- 1 = uter
- 2 = Gâtul uterului
- 3 = vaginul
- 4 = himenul
- 5 = buzele mici
- 6 = buzele mari
- 7 = beșica urinului
- 8 = clitorisul
- 9 = rectul
- 10 = anus
- 11 = pubisul
- 12 = ovar

canal osos, care slujește de temelie trunchiului și este susținut de mem-




Fig. 51. — Basin normal

brele de jos, de picioare. Este format înapoi de osul crucii (sacrum) și os-

BASİ

cioarele noadei sau a cozii (coxul), pe laturi și înainte de oasele șoldului (coxale sau iliace), cari se împreună înainte, pe linia mijlocie, prin *simfiza pubiană*. Lighianul este împărțit în



Fig. 52. — Basin de rachitic

două : *marele și micul lighian*, printr'o linie ridicată, *strâmtoarea de sus*, formată de baza sacrului, de unghiul sacro-vertebral sau promontor, de marginea osului iliac și a pubisului. *Marele*



Fig. 53. — Basin deformat

lighian cuprinde o parte din mațe și organele genito-urinare. Este foarte important de a cunoaște întinderile *strâmtoarei de sus*, pentrucă după mări-



Fig. 54. — Basin oblic

mea, sau strâmtoarea ei va ști medicul dacă femeia gravidă poate să nască ușor, sau greu. Diametrul antero-posterior trebuie să fie de 11 ctm.

BĂTĂ

cel transversal de 13 ctm. și jumătate, cel oblic de 12 ctm. Sunt instrumente cu cari se pot măsura aceste diametre, chiar pe femeia vie. Conformația *micului lighian*, care se află sub *strâmtoarea de sus*, când nu este bună, poate să împiedice eșirea copilului. Prin *radiografie* se poate cunoaște în mod desăvârșit forma lighianului în toate cazurile de rachitism,



Fig. 55. — Basin strâmtorat

coxalgie, pentru ca să se poată lua din timp măsurile trebuincioase, pentru viitoarea naștere. Desvoltarea lighianului se face până la 20 ani, de aceea nu este bine ca fetele să se mărite mai înainte de aceasta vârstă. La fetele rachitice basinal se desvoltă neregulat, prezentând diformități mari, cari le fac să nască greu și aduc diformația întregului corp. Asemenea basini se pot vedea în figurile alăturate.

Basna (nemțește *Bassen*). — Stațiune de ape minerale în Transilvania, aproape de orașul Mediaș. Aceste ape sunt clorurate sodice. Acid carbonic liber. Termale. Ele au proprietăți reconstituante, pentru care se recomandă în boalele scrofuloase, în boalele de piele, în reumatism și în boalele de mitră.

Bătaie de cahlă. — V. *Asfixie*.

Bătaie de inimă. — V. *Palpitațiuni*.

Bătaie de soare. — V. *Insolațiune*.

Bătaie la cap. — V. *Insolațiune*.

Bătături, ochi de găină. — Se ivesc de obicei la degetele mici dela picioare, mai rar și la celelalte degete, la talpa piciorului, la călcâiu și între degete, uneori chiar și în vârful degetelor. Constau dintr'o mică umflătură formată prin îngroșarea pielii, sau mai bine zis a solzilor ei (a epidermului), care, îngroșându-se, se înfundă în piele ca un cui și produce prin apăsare o

durere foarte mare. Pricina adevărată a bătăturilor sunt încălțămintele prea strâmte, prea scurte; cele făcute din piele prea groasă, sau cari au talpa prea subțire. *Tratament.* Cel mai bun lucru este să-și facă omul o bae caldă, apoi să radă strat cu strat bătătura, spălată cu alcool cu un cuțitaș trecut prin flăcără, ca să nu fie infectat, până ce dă de pielea care e simțitoare și atunci trebuie să se oprească, pentru ca să nu dea sângele. Se mai recomandă să se pună pe bătătură, mai multe zile de rândul: acidul salicilic, acid lactic, câte 2 gr., colodiu elastic, 8 grame: — sau: acid salicilic, 1 gr., alcool de 90°, 1 gr., eter 2 gr., extract de cânepă de India 50 ctgr., colodiu elastic, 5 gr. Se vor pune cu un pumătuf, sau pensulă. După 5—6 zile bătătura se ridică cu ușurință, întreagă. Pentru a nu se mai ivi bătăturile trebuie, înainte de toate, să ne facem încălțăminte potrivite cu piciorul, nici prea strâmte, nici prea largi, nici scurte, din piele subțire și cu talpă mai groasă.

Bătrânețe (lat. *senectus*). — Este o scădere firească a puterilor, ce se sfârșesc în slăbiciune, în neputință. Ea constă într'o slăbire, din ce în ce mai mare, a diferitelor funcțiuni ale organismului, într'o slăbire mai mult sau mai puțin grăbită a forței vitale (a puterii de a trăi). Omul nu mai ajunge astăzi bătrânețele de altă dată, ci îmbătrânește înainte de vreme, din cauza modului de trai și obozelei peste măsură a vieții pe care o ducem. De altfel, ori cum am trăi, ori ce am face, de bătrânețe nu putem scăpa. Toate lucrurile create sunt supuse unei legi de schimbare și de evoluție. *Omul se naște cu sămânța morții în el.* La om activitatea organismului servește la început nu numai pentru a acoperi cheltuiala zilnică, ci și pentru a construi materiale nouă; mai târziu ea se mărginește numai în a satisface cerințele zilnice ale corpului, și, mai târziu încă, ea abia este în stare să poarte toată greutatea vieții, a existenței. În viața omului sunt trei epoci mari: una de *creștere*, una de *echilibru* (stare de loc) și una de *decadență* (de scădere). Această din urmă epocă constituie bătrânețea, pe care nu o putem ocoli. Un învățat grec, Pita-

gora, împărțise viața omului în patru părți egale: el numea *copil* pe omul dela 1 până la 20 ani, *june* dela 20 până la 40 ani, *om* dela 40 până la 60 ani, *bătrân* dela 60 până la 80 ani, dela această vârstă în sus el nu mai număra pe om printre ființele vii. — Bătrânul are următoarele semne: pielea și-a pierdut moliciunea și frăgezimea ei, este uscată, sbârcită, aspră. Sbârciturile, cari s'au ivit mai de vreme la frunte și la tâmpile, se întind la obraz și gât. Părul capului se rărește, iar cel care rămâne este slab; mulți devin pleșuvi, statura și greutatea corpului sunt mai mici decât în etatea adultă. Dinții și măselele se răresc, iar cei cari rămân sunt tociți și uneori se clatină. Tubul digestiv este sbârcit ca și pielea, pereții lui sunt subțiați și nu se mai strâng cu aceeași putere ca mai înainte. Pieptul se strânge (se adună), se micșorează, plămânii se strâng asupra lor însuși, se largesc în măsură mai mică și respirația se face mai slab. Canalele cari slujesc la circulația sângelui sunt stricate: inima și arterele sunt încrustate cu materii calcaroase, sau grăsoase, ceea ce le face să fie puțin elastice și împiedecă întru câțva cursul sângelui. Simțurile sunt slăbite: vederea este micșorată și la marginea corneei se vede un cerc gălbui (cercul bătrâneței), auzul este slăbit. Glasul este răgușit și pițigăiat. Căldura corpului este scăzută, somnul scurt și inteligența mai puțin vie. Corpul se încovoie înainte din ce în ce mai mult. — Nu toți bătrânii însă sunt astfel. Unii își păstrează statura dreaptă, marțială chiar. Pielea rămâne netedă și moale, dinții își păstrează tăria, vederea și auzul sunt bune, memoria rămâne credincioasă. Cele mai multe boale nasc din slăbirea diferitelor organe. Lipsa dinților și a măselelor, precum și slăbirea și lenevirea organelor mistuirii, fac ca digestiunea să se îndeplinească cu greutate și nu pe deplin, producând adeseori urdinare. Micșorarea pieptului și slăbirea plămânilor aduc diferite boale de piept: năduf (emfizem), tusă și aprindere de plămâni (pneumonie), care, de obicei, este moartea bătrânului. Stricarea arterelor face ca sângele să circule rău în diferitele organe și astfel

rezultă înmoierea creierilor, îngrămădiri de sânge la cap, curgeri de sânge din nas, urinare cu sânge și altele. În toate aceste boale se observă *slăbiciunea*; în boalele cari, la etatea tânără, au căldură mare, la bătrâni căldura este mică. Pierderea puterii se face repede și în măsură mare, lucru de care trebuie să ținem seamă și s'o prevenim prin medicamente întăritoare (tonice) și printr'o dietă potrivită. — *Igiena bătrânilor* se apropie foarte mult de a copiilor. Din pricina lipsei dinților bătrânii nu pot măcina bine bucatele și prin urmare mistuirea la ei se face rău, deși, pentru întreținerea puterilor, au trebuință de o hrană bună și substanțială. Astfel fiind mâncarea bătrânilor trebuie să se compună din bucate ușor de amestecat, cum este carnea tocată, carnea fragedă, legumele fierte și făcăluite (mazăre, linte, fasole *bătută*), fructele coapte, ouăle și laptele. Este bine ca bătrânii să mănânce mai puțin la o masă, mai cu seamă la masa de seară și să mănânce mai des, fie și de patru ori pe zi, întocmai ca și copiii. La masă să bea câte puțin vin, dacă se poate vechiu și negru, amestecat cam pe jumătate cu apă ordinară, sau cu apă minerală. Băuturile cele tari, licorurile, sunt oprite; cafea slabă și numai odată pe zi. Mesele să fie la ore fixe regulate, prânzurile să nu fie prea bogate, șederea la masă să fie mai lungă, pentru ca mestecarea bucatelor să se facă încet și bine. Sculându-se dela masă, sau puțin timp după aceea, bătrânii vor face puțină mișcare. Este foarte rău ca ei să stea în amorțire, după ce au mâncat, căci aceasta îi expune la îngrămădiri de sânge în diferite organe și la nemistuire (indigestiune). Prin aceasta nu voim să spunem că bătrânii să facă exerciții violente; în toate zilele vor face mici plimbări în aer curat. În general bătrânii dorm puțin; ei pot să stea 8 ceasuri în pat fără nici un inconvenient, dar un somn de 5—6 ore le ajunge. Dacă sunt agitați, neliniștiți, li se poate da o băutură calmantă, apă de flori de portocale, ceai de teiu, etc.

Băuturi. — Omul sănătos trebuie să bea pentru a-și potoli *setea*, care-i spune că, corpul său are trebuință de

apă. Mâncările tari se mistuie mai ușor când sunt muiate într'o cantitate de lichid. Organele și umorile corpului nostru cuprind o cantitate mare de apă, care mereu se pierde prin sudoare, salivă, urină, etc. și care trebuie zilnic înlocuită. Toate băuturile merg în stomac, care le mistue și după aceea ele trec în sânge și în celelalte umori ale corpului; astfel fiind, dacă luăm băuturi în cantitate prea mare, mai mult decât ne trebuie, ele obosesc stomacul, îl umflă prea tare și-l împiedică de a mistui mâncările solide (tari). Prin urmare trebuie să ne oprim de a bea prea mult între mese, afară numai de cazul când am muncit prea din greu, am umblat prea mult, ne-am obosit peste măsură și din această pricină avem o sete arzătoare, atunci putem s'o potolim bând apă, bere, sau alte băuturi răcoritoare. Să nu bem în timpul mesei mai mult decât trebuie pentru mistuire: 1 până la 2 pahare un om mare, un pahar copiii. *Băuturile trebuie să aibă o căldură potrivită.* Sunt iarăși mulți dintre noi cari în timpul verii luăm băuturile cât se poate de reci, din gheață, sau chiar cu gheață, ceea ce poate să ne producă o greutate în mistuire sau unele boli de gât. Apa adusă dela fântână în momentul de a fi băută, sau ținută câteva minute înainte de masă într'un lichid mai rece, precum și vinul adus tot atunci din pivniță, sunt destul de reci, tot așa și între mese băuturile să fie potrivit de reci. În boalele cu fierbințeală mare, cum este febra tifoidă și febrele eruptive (scarlatina, pojarul, etc.), sau în aprinderile cu căldură (reumatismul poliarticular acut), trebuie să bem lichide în măsură mică și nu mult odată. Băutura să fie rece, ca temperatura camerii, iar nu răcită în gheață. Putem da astfel de băuturi și în aprinderile de plămâni (bronchită, pleurezie, pneumonie). În boalele de rinichi însă băuturile trebuie date în cantitate mai mare, pentru ca să se facă ud mult și să se spele astfel rinichii și beșica. Dacă stomacul este leneș și mistuirea anevoioasă este bine ca la sfârșitul mâncării să luăm o băutură caldă, cafea turcească, ceaiu, etc. cari întăresc stomacul. Când însă boala de sto-

BĂUT

BENZ

mac se însoțește de dureri și de vărsături, simple sau cu sânge, atunci vom lua băuturi reci, răcite la gheață chiar, cum este șampania frapată, adevărată răcită la gheață. În convalescență bolnavii se vor lua după obiceiurile lor din timpul sănătății. Cea mai simplă și mai naturală dintre toate băuturile este *apa*, apoi *laptele*, dulce sau bătut o băutură iarăși naturală, care constituie și hrana cea mai bună în caz de boală. *Băuturile acidulate*, limonadele și apele minerale, naturale, sau artificiale, sunt băuturi foarte întrebuițate și folosite.

Băuturi alcoolice sau spirtoase. — V. *Alcoolice*.

Bazna. — La 12 klm. de gara Meadiaș de pe linia ferată Brașov—Cluj, într'un ținut deluros cu păduri de fag și stejar și cu vii multe, la o altitudine de 291 m. se găsește această stațiune balneo-climaterică cu bun renume. Clima de câmp, aer ozonizat și parfumat; sezonul ține dela 15 Mai — 20 Septembrie. Această stațiune are băi reci de bazin, băi calde de bazin și cadă; are un izvor cu apă de băut *Merkel* și alte 5 izvoare cu iodură, clorură și bromură de sodiu în mari cantități. Din apa de Bazna se face sarea ioduro-bromuro-clorurată, care se desface și în comerț și cu care putem prepara cataplasme sau băi în casă. Băile din Bazna se recomandă (de luat *intern* apa izvoarelor): în bolile cronice ale tubului digestiv, apartului respirator și genito-urinar, în anemie, osteomielită cronică, tabes, scrofuloză. De întrebuițat *extern* în reumatism, boli de femei, boli de piele, urticaria cronică, sifilis, boli de nervi.

Becaș. — V. *Sitar*.

Bechice (gr. *vix*, *vichós*, tusă). — Medicamente cari domolesc tusea; în deosebi frunzele, florile și rădăcinile, cari înmoaie pieptul (curmale, isop, lemn dulce, mac roșu, mixandre sălbatică, nalbă mare, parpian, silnic, stafide, sulfină, tămâioară, etc.

Beladonă. — V. *Mătrăgună*.

Belitură. — V. *Excoriațiune*.

Beltea. — V. *Pelte*.

Benzacetină. — Praf cristalin, fără culoare, solubil în apă. Lucrează ca *antincvralgic*, înlocuind cu succes nar-

coticele în cazurile de insomnie și de excitație nervoasă. Se dă 50 ctgr. până la 1 gr. în buline. Se poate asocia cu cafeina.

Benzină. — Lucrează ca *parazitocid* și se întrebuițează pe dinafară în spălături. — *Otrăvirea* cu benzină are următoarele semne: văjiituri de urechi, tremurături convulsive, contracțiuni de mușchi, greutate la respirație, lărgirea pupilelor, încheștarea fălcilor, răcirea mâinilor și picioarelor, paraplegie și în fine moarte. *Tratament*: Să se dea medicamente pentru vărsat: ipeca, emetic, apomorfina; să se spele stomacul. Apoi stimulente: alcool, amoniac (2 gr. în apă), eter (2 gr. în apă); inhalații cu amoniac, dușuri calde alternativ cu dușuri reci, injecțiuni sub piele cu sulfat de atropină, un miligram, sau 40 picături de tinctură de beladonă, în apă, pe gură, respirație artificială până ce bolnavul și-a revenit, curenți electrici întrerupți, pe piept, sau în dreptul inimii.

Benzoate. — Cele mai întrebuițate sunt: *benzoatul de sodă*, care este foarte bun contra diatezei urice, în gută, tusa măgărească, bronșite, pneumonie, în doze de 50 ctgr. până la 2 gr., dat în buline, soluțiune, pilule, sirop; *benzoatul de amoniac*, lucrează și se dă în aceleași doze ca precedentul; *benzoatul de calce*, la gută, gravelă, diateză, urică: 20 ctgr. până la 2 gr.

Benzoic. — V. *Smirnă*.

Benzoic (Acid). — Praf cristalin, extras din smirnă (benzoic). Se întrebuițează ca stimulent, diuretic, diaforetic. *Doză*: 20 ctgr. până la 2 gr.

Benzonaftol. — Combinația naftolului B cu acidul benzoic. Este un bun dezinfectant, sau antiseptic intestinal; se descompune în corp în acid benzoic și hipuric, cari asigură antiseptia căilor urinare și în naftol, care desinfectează mâțele. *Doza*: 2—4 gr. până la 6 gr. pe zi la adulți (în buline, sau într-o băutură apoasă); 1—2 gr. la copii, cari îl iau cu mare înlesnire, fiind fără nici un gust, punând praful în apă îndulcită cu zahăr, sau în zeamă de dulceață.

Benzosalină. — Eter metilic al acidului benzoilsalicilic, întrunind acțiunile acidului salicilic și acidului benzoic. Se dă cu succes în contra nevral-

giilor, reumatismului, influenței, etc. Doză: 3—4 gr. pe zi în doze de câte 50 ctgr. până la 1 gr.

Berbec. — V. *Oaie*.

Berberină (Cloridrat de). — Este un medicament foarte bun în contra umflăturii de splină, în frigurile palustre: cloridrat de berberină 1 gr., bisulfat de chinină 50 ctgr, divizat în 4 părți egale în buline; să se ia la fiecare ceas câte un bulin.

Bere. — Băutură igienică, se fabrică din orz, hameiu, un ferment (drojdii) și apă. Orzul, udat cu apă, se așterne în localuri încălzite, unde începe a încolți, apoi se usucă, luând numele de *malt*. Acest malt se macină gros, se moaie în apă și apoi, după diferite metode, se înfundă în apă fierbinte, ori se fierbe cu apă, ori se fac amândouă operațiunile; fiind încă fierbinte i se adaugă hameiu, după care se strecoară și se supune la fermentație, adăugându-i-se drojdii. Astfel se obține berea, care conține alcool în cantitate de 1% până la 8%, cea mai tare. Berea mai conține azot, cam 1.650 gr. la 100 litri, ceea ce corespunde cu 10.94 gr. gluten, din care cauză s'a zis că berea este nutritivă; apoi materii zaharate, grase, aromatice, amare, gumoase, colorante și săruri. O bere de bună calitate trebuie să fie limpede și transparentă, de culoare palidă, ca chihlibaru, sau neagră; ea fierbe când se toarnă în pahare din cauza acidului carbonic. Berea este răcoritoare, astâmpără setea fără să producă sudori, cum face apa; este tonică, întăritoare, mărește pofta de mâncare și este nutritoare, prin azotul pe care îl are, din care cauză ea îngrașă. Cei grași nu trebuie s'o bea tocmai din această pricină, nici cei supuși la boale de stomac, la dureri și arsuri. Cei cari au tensiune mare a sângelui să bea puțină bere și rar. Berea mărește cantitatea urinei, din care cauză este bună la cei ce fac nisip. Pentru a se îmbăta cineva trebuie să bea bere mai multă decât vin, sau alte băuturi alcoolice, dar beția de bere este foarte rea, de aceea nimeni să nu facă abuz. Berea mai este bună la convalescenți, în urma boalelor lungi și grave. — Mai este bere medicamentoasă, care se prepară plămădind în bere diferite substanțe:

chinchina, muguri de brad, plante antiscorbutice, etc., care însă nu se întrebuințează mult, mai bune fiind preparatele din aceste substanțe făcute în vin, sau în apă.

Bere (Drojdia de). — Dă bune rezultate în furunculoză, dându-se în natură, 3 lingurițe pe zi, din drojdia proaspătă în pastă, și 120 gr. din drojdia lichidă, conservată în mod aseptice; din drojdia uscată se dă 4—10 gr., iar din cea granulată, 2—6 linguri. Se mai recomandă în constipație, în diabet, etc.

Beregată. — V. *Laringe*.

Beriberi sau **Kakke**. — Este o boală de origine alimentară, care se întâlnește în Asia, India, Indo-China și Japonia, unde se află în stare de endemie. În timpul războiului mondial s'a observat și la trupele coloniale, venite în Europa. Această boală se arată sub 3 forme: umedă sau *idropică*, uscată sau *paralitică* și *mixtă*. Înainte de a-și lua forma definitivă, boala începe prin turburări în membrele inferioare, turburări senzitive, slăbiciune în mers, apoi înăbușeală și apăsare în piept, cu simțire de strângere, după care începe una din formele: *paralitică* sau *idropică*. În prima formă avem: o amorțire în partea care se va paraliza mai târziu, cu furnicăături, arsură și uneori dureri fulgerătoare, după care vine paralizia motrice, adică slăbirea forței musculare, cu ataxia mișcărilor mersului, când atinge membrele inferioare, cari de obicei sunt mai expuse, paralizie senzitivă, cu dureri la apăsarea trunchilor nervoși și a maselor musculare, atrofia mușchilor, uscăciunea pielii, etc. Când sunt atinse membrele superioare avem aceleași semne, dar, aci fiind atinși mai des mușchii extensori și interosoșii mâinii, avem ceace se chiamă *ghiara beriberică*. În forma a doua avem: umflarea picioarelor (edem perimaleolar). Această umflare se întinde la coapse, la trunchiu și față, așa că cu încetul câștigă tot corpul. Apoi bolnavii au respirația grea (dispnee), bătăile inimii slabe și iuți, stomacul nu mai primește nimic, vărsături. În forma mixtă boala se dezvoltă sub amândouă formele la același bolnav. — *Cauzele*: hrana rea, conservele

și mai cu seamă orezul decorticat și întrebuințarea *alimentelor fără vitamine*. Cauze predispunătoare sunt : oboșeala, răceala, traiul sărăcăcios, aglomerațiile (școale, închisori, cazarmе, corăbii, război, etc.). — *Tratament*. Pentru a preveni boala se recomandă : o bună igienă generală, acolo unde trăiesc mai mulți la un loc, hrană bună ; substanțele hrănitoare să fie de bună calitate și proaspete. În cazuri de epidemie să se suprimе orezul din hrană, să se izoleze bolnavii. *Tratament individual* : bolnavul să fie pus în cele mai bune condiții de igienă alimentară și climaterică ; hrană fără orez decorticat și alimente bogate în vitamine, șederea la aer curat. Pentru turburările nervoase periferice : electricitate, masaj, strichnină, arsenic. Pentru dureri : aconit sau beladonă. În forma idropică : diuretice (digitală, scilă), purgative.

Beșică (lat. *vesica*, grec. *kystis*). — Beșica este organul în care se adună urina (udul), care vine picătură cu picătură și neîntrerupt din *rinichi*, prin canalele numite *uretere*, iar după ce se umple de urină ea o dă afară, la intervale mai mult sau mai puțin depărtate, prin canalul udului, numit *uretră*. Dimensiunile și forma beșicii sunt foarte variabile. Este așezată în bazinul cel mic, unde este ținută de niște ligamente foarte slabe. Beșica goală nu este mai mare de 3 cm. și este cu totul ascunsă în dosul osului pubian (pubis) ; când este plină poate să se întindă până aproape de buric. Peretele ei dinapoi răspunde, la bărbat, la mușchii șezutului (rect), iar la femeie la vagin și la o parte a mitrei. Beșica este căptușită pe dinăuntru cu o mucoasă, care când este strânsă, formează niște încrețituri cari pier când beșica se umple cu ud și se întinde. Adeseori se mai văd tot pe dinăuntru niște ridicături, produse de mușchii, cari se află sub mucoasă și între cari se pot adăposti pietri (calculi). În afară de mucoasă se află straturi de mușchi, unele longitudinale și altele transversale ; mușchii aceștia sunt formați de fibre netede, asupra cărora voința n'are putere. Beșica are vase numeroase, mai ales o rețea bogată de vase. — *Boalele beșicii*. Aprinderea, sau inflamațiunea beșicii, care

se numește *cistită*, se vede foarte des și este de 2 feluri : *acută* și *cronică*. *Cistita acută* poate fi produsă de o lovitură, sau de o plagă în partea de jos a pântecelui, sau de o inflamație a celorlalte organe, prin care trece urina, de o răceală bruscă. Mai poate fi produsă de abuzul băuturilor alcoolice, de excesele veneriene, de oprirea regulilor, de blenoragie, de sondare cu instrumente necurate, etc. *Semnele* acestei boale sunt : durere în partea de jos a pântecelui, care se întinde spre stinghii, perineu și anus (șezut), cu trebuințe dese și mari de a urina (de a face udul), iar când iese udul bolnavul simte că-i trece un fier roșu prin canalul udului (uretră). Urina lasă un depozit de mucozități și de puroii amestecat cu sânge, care poate fi dat afară și sub formă de chiazguri. De multe ori bolnavul are trebuințe dese de a merge la scaun. Afară de acestea bolnavul este agitat și poate să aibă greață, vărsături, sughit ; febra variază, uneori este mică, alteori poate fi așa de mare încât bolnavul să aiureze. *Cistita cronică* se mai numește și *catar de beșică* : ea este cele mai adeseori urmarea cistitei *acute*, care a fost neglijată, ne căutată bine. *Semnele* ei sunt : o durere mai mică decât în cistita acută, care de multe ori constă numai într-o greutate pe care o simte bolnavul în partea de jos a pântecelui, dar care se poate însoți de trebuințe dese de a face udul. Această durere este mărită de frig, de umezeală, de excesele veneriene, sau de abuzul de băuturi alcoolice. Urina este turbure, lăptoasă, miroase urât și se deșeartă cu greutate ; este alcalină, conține puroii, flocoane mucoase și uneori sânge și urați. Turburările generale variază cu durata boalei și cauzele ei (stricturi uretrale, calculi, prostatită și hipertrofia prostatei). *Tratamentul în cistita acută*, la început : repaus în pat, regim de lapte mai multe zile în rând, în lapte se pot pune 2 gr. de bicarbonat de sodă, la litru ; se vor evita mâncările iuți, cafeaua, licorurile, vinul curat ; se va da ceaiu, foarte slab, tăiat cu lapte, băuturi răcoritoare. Se vor prescrie alcalinele (bicarbonate de sodă, 3—8 gr. pe zi, salol (4 gr. pe

zi), acid benzoic, benzoat de sodă, sau de litiu. În caz de febră se va da chinină, antipirină, fenacetină, singure, sau asociate cu salol. Pentru dureri se vor face oblojeli calde, în partea de jos a pântecului și la perineu, clisme cu laudan (20 picături la 50 gr. apă caldută), sau cu cloral (2—3 gr. la o clismă compusă dintr'un pahar de lapte și de un gălbenuș de ou, pentru a o emulsiona), sau supozitoare cu morfină (de câte 2—ctgr. unul), sau cu extract de opiu, de câte 5 ctgr. (2 pe zi), la trebuință se va face o injecțiune sub piele, cu morfină, sau se vor face instilațiuni cu nitrat de argint (30 picături dintr'o soluție de 1 la 50, după câteva zile dintr'o soluție de 1 la 40 și 1 la 20). Pentru retențiunea urinei se vor face sondaje de 2—4 ori pe zi. În *cistita cronică* același regim, aceleași reguli ca și în *cistita acută*. În contra transformării alcaline a urinei se recomandă: acid benzoic (1—6 gr.) cu cantitate egală de glicerină, într'o poțiune, cataplasme cu muștar în partea de jos a pântecului, desertarea regulată a beșicii (de 2—4 ori pe zi), la nevoie cu sonda, injecțiuni calde, în beșică, făcute încet și în doze mici, cu soluțiune de nitrat de argint (1 la 500), acid boric 2 la 100, tanin 1 la 100 (aceasta când urina are sânge), instilațiuni cu nitrat de argint (1—4 la 100). — *Paralizia beșicii*, uneori atinge pereții ei și în acest caz avem mai întâiu retențiunea urinei, apoi incontinența prin regurgitare, (prea plinul beșicii se scurge în mod involuntar prin picături; alteori este paralizat numai mușchiul dela gâtul beșicii (sfincterul), care închide beșica, și în acest caz omul nu-și poate ține de loc udul (are incontinența urinei), care curge involuntar și încontinuu. Paralizia beșicii se poate arăta la orice etate, în cursul unei boale grave (febră tifoidă, o febră eruptivă), în urma unei emoragii cerebrale, a unei răniri, sau a unei boale de șira spinării, la nebuni, la paralizie generală progresivă, etc. *Calculi, sau pietri* în beșică se arată de obicei la bătrâni, mai rar la femei. Intre cauzele avem: o hrană prea îmbelșugată, *gravela* (v. acest cuvânt), sau nisipul, o piedecă la facerea udului (stricturi sau

strâmțorarea uretrei ipertrofia prostatei), urina alcalină sau prea acidă, chiaguri de sânge veniți din rinichi, din uretere, din beșică și cari servesc de sâmburi în jurul cărora se depun și se încrustează sărurile. De obicei se formează la copii numai o piatră, în beșică, iar la adulți se pot forma până la 3—4 și mai multe (într'un caz s'au găsit 300). Cu cât sunt mai multe pietre cu atât ele sunt mai mici;



Fig. 56. — Piatră în beșica udului

- 1 = piatră
- 2 = beșica udului
- 3 = ureterul
- 4 = vaginul
- 5 = osul pubisului
- 6 = clitorisul
- 7 = canalul urinar

când sunt puține, sau când este numai una, mărimea lor poate să fie de 3—4 cm. de diametru, în caz excepțional s'a scos un calcul de 1500 gr., de formă ovală, turtită, netedă sau, cu ridicături și adâncituri mai mult sau mai puțin mari. Unele au culoarea roșietică, cum sunt cele formate din acid uric, altele sunt cenușii (urate de amoniac), altele brune (oxalat de calce) și altele albe (fosfat și carbonat de calce și de amoniac). Pietrile de acid uric și de oxalat de calce vin din rinichi, celelalte se formează în beșică. *Semnele* sunt: o greutate în partea de jos a pântecului, urina este roșie și câte odată iese cu greutate, alteori se oprește repede de a mai curge și se pornește din nou după multe sforțări și schimbări de poziție; dureri va-

BEȘI

riate mai ales la sfârșitul urinării, când piatra apasă pe gâtul beșicii. Prin radiografie se poate vedea foarte bine piatra, a cărei prezență se poate constata prin sondare cu o sondă metalică. *Tratamentul* constă în operațiunea numită *talie ipogastrică*, prin ajutorul căreia se deschide beșica și se scoate piatra.

Beșica cea rea. — V. *Pustulă malignă*.

Beșici, beșicute. — V. *Fliclene*.

Beșicuțe. — V. *Vericule*.

Beteag. — V. *Infirmitate*.

Beteșug. — V. *Boală*.

Beție. — V. *Alcoolism*.

Betol (Salicilat de naftol B). —

Praf alb, cristalin, fără miros și fără gust. Lucrează ca dezinfectant intestinal, se dă în reumatismul articular, în inflamațiile beșicii: 1—2 gr. pe zi, în buline, în prafuri, sau într'o poziune.

Biberon (dela lat. *bibere*, a bea). — Când suntem siliți să recurgem la *alăptarea artificială*, este mai bine să dăm laptele cu biberonul, decât cu linguriță, cu paharul, sau cu ceașca, pentru că el se potrivește mai bine cu gura copilului, care chiar dela naștere simte trebuința de a suga. Nu vom vorbi despre toate formele cari s'au dat biberonului, vom spune numai că cel mai bun este cel mai simplu și care se compune dintr'o *sticlă* de 100—150 grame și dintr'un *sfârc* de cauciuc, care se aplică pe gâtul sticlei în minutul când dăm copilului să sugă. Acest biberon, simplu, este ușor de curățit și efin, așa că putem avea 2 sau și mai multe la îndemână. Biberonele cu tuburi lungi de cauciuc nu se mai întrebuințează astăzi, fiind periculoase, căci nu se pot curăți bine. Biberonul este cel mai bun mijloc să alăptăm copiii artificial, cum am mai spus, cu o singură condiție: să fie întreținut cât se poate de curat. Iată cum putem păstra această curățenie. Luăm 7—8 sticle de câte 150 de gr. fiecare, le umplem cu lapte proaspăt, le așezăm într'un coșuleț de metal cu mai multe despărțituri (câte una pentru fiecare sticlă și le închidem cu dopuri de vată sterilizată). Punem coșulețul într'o căldare mai mare, cu apă (să avem grijă ca apa din căldare să

BICA

nu ajungă până la gura sticlelor, ca să nu pătrundă înăuntru), o punem să fiarbă 3 sferturi de oră în clocot, apoi o dăm la o parte, de pe foc. Într'o oală, alătura, avem atâtea cauciucuri de biberone câte sticle am pus la fiert. Acestea au forma unor sfârcuri de țâță și copilul le poate ține în gură și suga ca și din țâță. Le păstrăm în oală



Fig. 57. — Biberon

în care am fiert până în momentul sugerii când luăm pe fiecare (după ce ne-am spălat bine mâinile cu apă și săpun și cu puțin alcool, sau apă de colonia) îl prindem la gâtul sticlei, după ce am aruncat dopul de vată și astfel avem din fiecare sticlă un biberon. Dăm copilului de fiecare dată un biberon, iar dacă a mai rămas lapte în sticlă îl aruncăm, sau îl fierbem a 2-a oară. Astfel avem pentru fiecare supt câte o sticlă cu lapte bine pregătit. Când voim să încercăm laptele din biberon dacă e fierbinte, să nu bem din el, ci să turnăm puțin pe dosul mâinii sau să apropiem biberonul de frunte, ori de obraz și ne vom convinge repede.

Bicarbonat de sodă. — Este un medicament mult întrebuințat și la îndemâna tuturor, nefiind periculos. El este baza tuturor apelor minerale naturale, cum sunt: Vichy, Vals, Carlsbad, Slănicul Moldovei, etc. și tipul *alcalinelor*; se întrebuințează și singur în boalele de stomac cu arsură, în străpezirea dinților prin fructe necoapte, în boalele de ficat, în gută, boalele de piele, boale de beșică. Dacă se întrebuințează mai mult timp nu trebuie să dăm mai mult de 4 gr. pe zi, când se întrebuințează numai câteva zile putem da până la 8 gr. pe zi (arsuri de stomac, reumatism acut). Bicarbonatul de sodă se ia cu apă de băut, sau în ceai de mușetel ori de teiu. Unii îl înghit sub formă de praf și beau apă după el, dar acest procedeu nu este bun, căci face clăbuci în gură și se poate îneca cel ce-l ia. Este mai bine dacă se pune într'un pahar cu puțină apă, se mestecă și se bea. El intră în compoziția *apei gazoase*.

Bicsad. — Stațiune climaterică și balneară din jud. Satumare. Apele conțin mult acid carbonic liber, bicarbonat de sodiu și pucioasă. Sunt bune pentru bolnavii de diabet, de tuberculoză (la început), pentru boli de femei, boli ale căilor urinare, scrofuloză.

Bilă. — V. *Fiere*.

Bilharzia este un vierme, parazit al sângelui uman, care se întâlnește mult în Egipt. Pătrunde în corpul omului, prin rect, uretră, mai rar prin piele și foarte rar prin apa de băut. *Bilharzioză* se cheamă boala produsă de acest vierme. *Semnele*; anemie pronunțată, datorită pierderii mari de sânge, hematurii, colici intestinale, diaree cu sânge.

Binoclu (dela *bini*, doi, și *oculos*, ochiu). — Bandaj destinat să acopere amândoi ochii, ținând pe loc pansamentul. — Tot sub acest nume se cunoaște un aparat construit astfel că apropie, sau îndepărtează obiectele pe care le privim prin el, mărindu-le, sau micșorându-le. Se întrebuințează la teatru și cinematograf, iar militarii îl întrebuințează ori de câte ori au nevoie să vadă dealuri, văi, sau anumite puncte îndepărtate, pe câmpul unde fac instrucție.

Biolactyl. — Un preparat care conține fermenți lactici, cu ajutorul cărora microbii putrefacției și microbii producători de boale din intestin sunt făcuți inofensivi. Este întrebuințat în cazurile de enterite muco-membranoase, diaree infecțioasă, disenterie și alte turburări intestinale de origine infecțioasă. Se dă sub formă de comprimate, câte 6—8 pe zi pentru adulți, 2—4 pe zi pentru copii mai marișori și un comprimat pe zi pentru copiii mici, zdrobit; comprimatele se iau înaintea meselor principale, înghițindu-se fără să fie amestecate, cu apă. Sub formă de lichid biolactylul este și mai ușor de luat, mai ales pentru copii, cărora li se dă, până la 4 luni, 2 lingurițe pe zi, dela 4—8 luni câte 2 lingurițe, înaintea supturilor, cu apă sterilizată, îndulcită (adulții iau jumătate de flacon deodată).

Biopsie se chiamă ridicarea unei porțiuni dintr'un țesut viu, din corpul omenesc, sau animal, pentru examenul

microscopic, în vederea stabilirii boalei de care suferă acel țesut. Biopsiile ne aduc mare folos, mai ales când e vorba de un cancer, sau alte tumori ale organismului, de care, cu cât le aflăm mai din vreme și le tratăm, cu atât scăpăm mai repede.

Bismosalvanul. — Este un amestec de bismut, iod și chinină, în stare uleioasă. Medicamentul este mult întrebuințat contra sifilisului, fie sub această formă, fie în combinație cu lecitina, sub numele de *neobismosalvan*, care este o formă perfecționată a bismosalvanului. Ambele medicamente, în afară de sifilis, se mai întrebuințează în angina lui Vincent și în febră tifoidă.

Bismut. — O substanță mult întrebuințată în medicină, sub diferite forme. *Subnitratul de bismut* se prezintă sub forma unui praf alb, fără gust și miros, care nu se topește în apă. Este mult întrebuințat ca antidiareic, în doze de 50 ctgr. până la 8 gr. pe zi, în praf, sau într'o poțiune. Nu trebuie să-l întrebuințăm prea mult timp pentru că poate să dea intoxicații. *Salicilatul de bismut* este mai mult întrebuințat ca sarea precedentă, pentru că nu este otrăvitor, chiar dacă-l luăm în doze mai mari. Se întrebuințează ca antidiareic, în doze de 1—3 gr. zilnic, adeseori asociat cu benzonafтолul. Bismutul este și un medicament puternic contra sifilisului. Această proprietate a lui a fost descoperită de *Sazerc* și savantul român *Levaditi*, și azi nu se mai poate înțelege un tratament rațional al sifilisului, decât cu neosalvarsan, mercur și bismut, mai ales că de multe ori suntem siliți să recurgem numai la acest din urmă medicament, pentru că sunt bolnavi cari nu suportă pe celelalte. Dintre preparatele de bismut, puse azi în comerț, cele mai bune și mai întrebuințate sunt; *bismosalvanul*, *neobismosalvanul*, *iodobismutatul de chinină*, *bismiochinul* etc. Acest din urmă preparat este românesc și este tot așa de bun ca cele streine, având și avantajul că, fiind preparat în țară, este mai efin.

Bismutol. — Fosfat de bismut solubil. Se dă ca antiseptic stomacal și intestinal, în gastro-enterita copiilor.

Doză: 2—4 gr. la adult și 1—2 gr. la copii, în poțiune, sau buline. Pe dinafară lucrează ca siccativ.

Bismutoză. — Se obține precipitând o soluțiune apoasă de albumină de ou printr'o soluțiune de azotat de bismut, în apă saturată cu clorur de sodiu. Se dă în contra diareelor diferitelor enterite, în boalele de stomac (iper-aciditate). Doză: 2—4—6 gr. pe zi, în pilule, bulin, etc. Pe dinafară în contra arsurilor, eczemei, etc.

Bisturiu. — Este cuțitul cu care operează medicul. Mărimea și forma variază după nevoe, așa de pildă un bisturiu cu care tăiem un picior, sau deschidem pânțele unui om este mai mare și mai puternic decât altul cu care facem operații la ochi. Trebuie să fie foarte bine ascuțit și sterilizat, înainte de operație, pentru ca să nu producă infecția plăgii pe care am făcut-o.

Bitter. — Pentru a prepara un bitter bun avem trebuință de: ențură (gențiana), chinchină, coji de portocale, ienupere, coriandru, scorțișoară, mic-sandre, izmă bună, anason, angelică, jale, zahăr și spirt, cari îi dau acea amărăciune cunoscută. Acest bitter nu este rău, când se bea rar și puțin și întotdeauna amestecat cu apă. Astfel luat este mai puțin primejdios ca absintul și alte băuturi alcoolice.

Blană. — Hainele făcute din blană și hainele înblănite sunt foarte bune în timpul iernii, mai ales pe vreme de ger, căci ele țin cald, adică păstrează căldura corpului prin aerul cuprins între peri. Este cel mai bun mijloc de a izola corpul de frigul din afară. Blănitele sunt luate dela diferite animale: oaie, urs, lup, pisică, etc., pentru a nu pomeni pe cele mai scumpe, cari se întrebuințează nu atât pentru a ne apăra de frig, cât pentru a ne mulțumi un gust bolnăvicios, luxul, luând ochii celor mai puțini favorizați de soartă. Pielele animalelor sunt supuse mai întâi la tăbăcit, mulțumită căruia ele nu putrezesc. Hainele înblănite sunt bune pentru persoanele bătrâne, pentru cele cu pieptul slab, însă și pentru acestea cu condițiune ca ele să nu le poarte decât numai afară, iar îndată ce au intrat în casă să le dezbrace, căci altfel tre-

cerea dela căldură la frig le-ar fi primejdioasă. Cei tineri și sănătoși să nu se învețe cu blănuri, dacă vreau să fie sănătoși. Intru cât privește mănuișile și încălțămintele căptușite cu blană, ele sunt bune când gerul este mare și suntem siliți să stăm mai mult timp pe afară.

Blândă. — V. *Urticare*.

Blefarită (gr. *blepharon*, pleopă, și *terminația ită*, care însemnează inflamație, aprindere). — O serie de inflamații ale marginilor libere ale pleoapelor. Cauzele sunt multe, *generale* și *locale*. Cele *generale* se întâlnesc la copii și adulți anemici, scrofuloși, convalescenți de rușeolă, ofticoși, diabetici, hrăniți prost, la cei ce stau în praf, fum, sau la căldură mare, la cei cari nu poartă ochelari ca să-și corecteze defectele vederii (ipermetropie, astigmatism ipermetropic). Cauzele *locale*: Păduchi acarus, ciuperci (trichofiton, sporotricum, etc.), sifilisul, lepra. *Tratament*. În principiu toate blefaritele se tratează astfel: În *general*: Untură de pește, iod, băi de sare, aer curat lipsit de praf și vânt, lumina tare și căldura mare se vor evita. *Local*. Spălături cu ceai de tei, sau camomilă, soluție de borat de sodiu 1%, sau carbonat de sodiu 1%. După aceea se aplică (făcând ușor masaj) pe marginile pleoapelor: oxid galben de mercur, proaspăt precipitat, gr. 0.20, Vaseline pură albă, Lanolină aa. 5 gr. O alifie foarte bună, care se găsește în tub închis, asemănător celor de pastă de dinți, este oxidul galben de mercur preparat de laboratorul Blache, din Franța. Se cere la farmacie, sau drogherii: un tub Blache de oxid de mercur 1%, sau 2%. Când voim să-l întrebuințăm desfacem șurubul dela cap, întindem pe un mic bețișor de sticlă, bine rotunjit la cap și spălat cu alcool, o cantitate mică de alifie, cu care masăm ușor marginea pleoapelor. Dacă avem grijă să închidem tubul bine după întrebuințare, îl putem păstra multe luni, fără să se strice conținutul. În blefaritele ulcerose se îndepărtează crustele, se epilează cili (se smulg), apoi se face masaj ușor cu Nitrat de argint sol 1%, a locurilor de unde s'au smuls perii (cili). Epilația se face dimineața și, îndată după

ea, se pune o compresă cu apă rece pe pleoape, care se ține 2—3 ore și numai după aceea se ung marginile pleoapelor cu alifia de mai sus.

Blefaroptosă (gr. *vlèpharon*, pleopă, și *plosis*, cădere). — Scoborârea permanentă a pleoapei superioare, în urma paraliziei nervului ridicător, sau când pielea este umflată (vezi *Ochiu*).

Blefarospasm (grec. *vlèpharon*, pleoa, pă, și *spasmos*, spasm). — Strângerea mușchilor orbiculari ai pleoapelor, care are ca rezultat închiderea pleoapelor și care poate ține dela câteva minute până la câteva ceasuri. Este datorit mai în totdeauna unei excitații a nervului trigemen. Se observă în conjunctivite, în inflamațiile de ochi, cu deosebire în ulcerile corneei, în nevralgiile suborbitare, cariile dentare, etc. Se tratează combătând cauza care i-a dat nașterea (reumatism, inflamațiunile ochilor, cariile dentare, etc.). Se poate întrebuița și electricitatea și mai cu seamă curenții galvanici, cari reușesc uneori mai bine decât aplicațiunile narcotice, sau injecțiile subcutanate de morfină.

Blefarostat. — Se chiamă un mic aparat, cu ajutorul căruia putem să ținem pleoapele îndepărtate. Este trebuincios când facem operații la ochi și avem nevoie să-i ținem deschiși mai mult timp.

Blenoragie, triper, sculament. — Este o boală veneriană, contagioasă, luată prin raport sexual. Este datorită unui microb numit *gonococ*, care se află pe canalul udului (uretră) la bărbat, iar la femei în vagin și uneori și în uretră. *Semnele* acestei boale sunt: la bărbat, după o zi până la cinci zile dela contact, se simte un fel de mâncărime pe uretră, la vârful membrului, apoi se ivește o scurgere limpede și lipicioasă, ca albușul de ou, la început, care în curând devine mai groasă, galbenă și în urmă verzue. În clipa când trece udul prin canal se produce o arsură mare pe toată întinderea uretrei, care se întărește ca o coardă și provoacă dureri foarte mari. După un timp oarecare, de obicei șase săptămâni, scurgerea începe să fie iarăși galbenă și mai subțire, apoi încetează cu totul; durerile încetează și mai iute. La femei scurgerea este aceeași

durerile însă nu sunt așa mari, aprinderea fiind mărginită, cele mai adeseori, la vagin. Când boala se întinde și la canalul udului durerile sunt tot așa de mari, când trece udul, ca și la bărbat. Boala se poate întoarce în urma ostenelelor, a umblatului mult, prin exces de băuturi alcoolice. *Tratament*: sunt oprite oboselile de orice natură, umblatul mult, călăritul, bicicleta, excitațiunile sexuale; să se poarte *suspensor*. Se recomandă spălăturile repetate ale organelor genitale



Fig. 58.—Gonococi (văzuți la microscop)

și ale mâinilor pentru ca boala să nu fie dusă la ochi. Regimul va fi următorul: sunt oprite toate lucrurile excitante, mâncările piperate și ardeiate, vânatul, stridiile, peștele de mare, brânzeturile, sparghelul, apoi, vinul, licorurile, berea. Se vor da băuturi răcoritoare (ceai de orz, de semințe de in, de cozi de cereșe) ca 1 litru pe zi, ape alcaline, sau: bicarbonat de sodă 2—5 gr., zahăr 40 gr., esență de lămâe 2 picături la 1 litru de apă, din care se va bea din când în când, în timpul zilei. Ca tratament abortiv se recomandă în primele 24—48 ore *injecțiunile* în uretră cu nitrat de argint (1—3 gr. la 100 gr. apă distilată); injecția se va lăsa 2—5 minute în uretră. Aceste injecții se fac 3—5 zile, de 2 ori pe zi. Mai bune sunt *spălăturile* abundente ale uretrei cu ipermanganat de potasă (1—2 la 1000 până la 4 la 1000), făcute cu un irigator ținut sus, având un tub de 2 metri, cu o canulă de sticlă cu vârful conic. În primele 4 zile 2 spălături pe zi, în alte 4 zile câte una. În același timp cu tratamentul local se fac injecții în mușchi, sau sub piele, cu vaccin anti-gonococic, care dă temperatură ridicată 1—2 zile după injecție, urmată de frisoane. Este probabil că această temperatură ridicată distruge gonococii, în același timp cu medicamentele introduse în uretră. Intre multele seruri și vaccinuri antigonococice, preparate în țară și în străinătate, cel

preparat la noi de Institutul „Prof. Dr. Cantacuzino” este recunoscut ca foarte bun. Dacă boala nu trece în 8 zile se vor mai face spălături încă 5—6 zile. Cine nu poate face aceste spălături se va mulțumi cu injecții uretrale, făcute cu o tulumbiță de sticlă, sau de cauciuc, de 4—8 ori pe zi, totdeauna după ce a urinat, cu: ipermanganat de potasă (1 la 2000 sau 1 la 1000), cu argentină (1 la 3000), cu protargol (1 la 250), după ce mai întâiu si-a spălat uretra cu apă boricată. Injecțiile și spălăturile nu trebuie făcute în cazurile de orhită, prostatită, sau când sunt focare inflamatorii în uretră. Atunci ne vom mărgini a da pe dinăuntru: santal, gonosan, salol, bicarbonat de sodă, băi generale, purgative ușoare, clistere cu laudan, sau cloral. Să se ăge de seamă ca să nu se pună mâna infectată la ochi, pentru ca să nu se capete *oftalmia purulentă*. Când boala a devenit cronică se chiamă *blenorée*, sau în limba franceză: *goutte militaire*. Scurgerea, care este de altfel incoloră, nu mai are sfârșit: din când în când câte o picătură, mai cu seamă dimineața. *Tratament*: aceleași prescripții igienice; regim tonic, idroterapie, preparații fierugi-noase, injecții și spălături uretrale, ca mai sus, dar mai bine să se facă *instilații*, cu nitrat de argint. *Complicațiile* sunt multe. La bărbat: *orchita* și epididimita, stricturile *uretrei*, cistita colului *beșicii*, *reumatismul* *blenoragic*, *spermatoarea*. La femee, *ovariita*, *peritonita* și *salpingita*. — Vindecarea deplină a blenoragiei n'o poate spune decât medicul, după ce examinează secreția uretrală la microscop. Toate câte le-am spus mai sus să servească cititorilor pentru lămurirea lor asupra boalei, tratamentul ei să-l încredințeze însă medicului. Este o boală care prezintă atâtea pericole și care lasă urme pentru toată viața, în cât sfătuim pe orice bolnav să se ducă la spital, sau la un medic acasă pentru a fi îngrijit, să nu se trateze singur.

Boală (*morb*, grec. *nósos*), *beteșug*, *morb*. — Ori ce stricăciune, sau turburare a sănătății, se numește *boală* și omul cu sănătatea stricăta este *bolnav*. O boală se arată prin oarecari turburări la unul sau mai multe or-

gane, cari turburări se numesc *simptome*. În medicină nu este de ajuns numai observația, trebuie să înălțăm simptomele observate, a trage deducțiuni logice, ceea ce constituie *diagnosticul*, sau *diagnoza* pe care se sprijină părerea formată asupra naturii unei boale. — Mergând cu judecata ceva mai departe doctorul poate să se pronunțe asupra schimbărilor cari se vor ivi în cursul unei boale, asupra duratei sale, asupra sfârșitului, ceea ce constituie *prognosticul*, sau *prognoza*. Boalele se împart în *interne* și *externe*, în *medicale* și *chirurgicale*, după cum boalele se tratează prin medicamente, sau prin operație. — *Cauzele* boalelor, ori de ce natură ar fi ele, au o acțiune subordonată, adeseori, condițiunilor individuale de etate, de sex, de temperament, de predispoziție. Cauza unei stări bolnăvicioasă stă adeseori într'o stare bolnăvicioasă precedentă; boalele se pot produce unele pe altele. — Ori care boală începe, apoi *evoluiază*, (crește), se oprește și scade, de aci starea de *invaziune*, de *creștere*, de *stare* și de *descreștere*. Această împărțire nu se potrivește decât pentru unele boale *acute* și *continue*; însă mersul repede, sau încet, egal sau inegal, al celorlalte boale, este o împrejurare a evoluției lor, care este bine să se însemneze. Mersul unei boale este *regulat* când fazele dezvoltării sale se succed, în ordinea și cu durată, sau intensitatea, sau cortegiul simptomatic obișnuit; *neregulat*, când o fază lipsește, sau nu vine la timpul său, sau că este prea scurtă, etc. — Nu toate boalele au aceeași *durată*: unele își termină evoluția în câteva zile, boalele *acute*; altele din contră, își parcurg perioadele lor într'un timp mai îndelungat, boalele *cronice*. De altfel este foarte greu de a fixa câte zile trebuie să dureze o boală, pentru a fi *acută*, sau *cronică*, în privința acestora nu avem nici o regulă precisă. Trecerea dela starea acută la cea cronică este un fel de *terminație* a boalelor acute, cari se mai pot termina prin *vindecare*, sau prin *moarte*. Dintre acestea vindecarea se vede mai des și ea constă în întoarcerea repede, sau gradată, a organelor și lichidelor corpului la starea lor normală, mani-

festată prin încetarea diferitelor turburări, pe cari le-am numit *simptome*; dar mai înainte ca toate funcțiunile organismului să-și fi reluat regularitatea naturală este o perioadă intermediară, în care sănătatea, încă subredă, mai are trebuință de îngrijire, perioada de întremare, numită *convalescență*. Sunt unele boale pentru care știința medicală n'a găsit încă leacul și aceste boale se numesc *incurabile*. Numărul acestor boale merge din fericire scăzând și ele sunt rare. *Tratament*. Este un obicei rău că bolnavii, la cari boala începe în mod blajin, pe încetul, nu se îngrijesc delă început și așteaptă ca boala să facă progrese, să înainteze, să se agraveze, așa că doctorul, când vine, se găsește în fața unui caz foarte greu și de multe ori ajutorul său nu mai are nici un succes; dacă ar fi fost chemat delă început ar fi combătut simptomele cele dintâiu, oprind boala de a înainta și punând-o din primele zile pe cale de vindecare. Prin urmare cel mai bun sfat ce putem da cetitorilor noștri este ca ori de câte ori se vor simți indispuși, înainte chiar de a cădea la pat, să consulte doctorul. Tratamentul este de 2 feluri la oricare boală: unul prin *medicamente*, pe cari le ordonă doctorul și cari variază după boală și altul *igienic*, care este tot așa de important și se aplică la toate boalele. Pentru un bolnav regulile igienice trebuie aplicate și mai aspru decât pentru omul sănătos. Prin urmare vom da bolnavului *camera cea mai mare*, cea mai aerată și mai bine expusă, ferită de miasme, departe de latrine și de bucătărie. Vom opri orice vizită. Căci vizitele obosesc bolnavul; vom opri strict ca în camera bolnavului să intre alte persoane decât acelea cari îl servesc, chiar și membrii familiei nu pot să stea mai mulți deodată, ci numai pe rând, unul câte unul. De asmeenea nu este bine să ținem bolnavul în *căldură prea mare*, ceea ce l'ar slăbi și mai mult. Bolnavul, ca și camera, trebuie ținută într-o stare de *curățenie mare*; el se va primumi foarte des și ori de câte ori trebuința va cere; scaunele și urina se vor scoate îndată afară. Când este vorba de o boală *contagioasă* izolarea bolnavului se va face cu mare stric-

teță și se va opri intrarea în cameră a persoanelor tinere, cari n'au suferit de aceeași boală. Îngrijirile prea multe și nefolositoare obosesc bolnavul și nu trebuie să facem nimic mai mult decât ceea ce ne-a poruncit doctorul. Când bolnavul intră în *convalescență*, trebuie să fim cu mare băgare de seamă, pentru ca să nu-l întoarcă boala. Când bolnavul nu are apetit și trebuie să-l hrănim, vom căuta să-i deșteptăm pofta dându-i mâncări în doze mici, ușor de mistuit. Igiena ne mai dă mijloace pentru a preveni unele boale, adică a lupta în contra cauzelor lor, ceea ce se chiamă a face tratament *preventiv*.

Boală câinească. — V. *Atrepsie*.

Boala copiilor. — V. *Epilepsie*.

Boală de grăsime. — *Obezitate*.

Boală de mare, rău de mare. — Cei mai mulți când călătoresc pe mare, până se obișnuiesc, sau în totdeauna, sufăr de un fel de boală, numită *rău de mare*, (fiindcă omul se simte rău, fără să se știe ce are). Acest rău, sau boală, se poate arăta sub mai multe forme, fără ca să fie vr'una periculoasă. Boala de mare chinuște mai cu seamă pe cei ce călătoresc pentru întâia oară cu vaporul. Omul pleacă sdravăn, sănătos și vesel, cum trebuie să fie oricine când face o călătorie de plăcere, și nu se mai satură privind în dreapta și în stânga frumusețile ce i se arată, mai ales când marea este liniștită și timpul frumos; dar, pe măsura în care se depărtează de mal, vântul începe să se simtă, clătinarea și legănarea vaporului devin mai mari, călătorii încep să-și piardă voia bună, să se îngălbenească și să-i treacă sudori reci; ei sunt cuprinși de o indispoziție generală, foarte neplăcută, însoțită de o greutate mare la cap, care le apasă mai cu seamă fruntea, apoi încep să aibă sfârșeală, amețeală, văjiituri de urechi, părăndu-li-se că totul se învârtăște în jurul lor; pulsul este mic și încet, corpul rece, slăbiciune și aplecare spre leșin, căscături des repetate, gura se umple de bale și omul scuipă des; răgăituri, greață și în cele din urmă vărsături, cari sunt cu atât mai rele cu cât stomacul este mai gol, producând dureri foarte mari. Aceste vărsături sunt grăbite prin vederea altor persoane cari

BOAL

BOAL

varsă, printr'un miros care vine dela bucătărie, dela mașini, sau din pereții vaporului. După ce a vărsat omul se simte ușurat, răsuflă mai liniștit, pulsul este mai bun, fața se înroșește și nu mai este acoperită de sudori, corpul se încălzește iar după puțin timp răul începe din nou, repetându-se aceleași suferințe, uneori în mai mică măsură, dar întotdeauna lăsând pe om sdrobot de oboseală. Aceasta este *forma cea mai grea* a boalei de mare, sunt însă și altele mai ușoare. *Cauzele*: Sunt oameni foarte predispuși la această boală, așa că ori de câte ori vor călători pe mare vor avea-o; sunt unii chiar dintre marinari, cari deși își fac vieța pe vapor, sufăr de acest rău ori de câte ori se imbarcă, după ce au petrecut câțva timp pe uscat. Sunt alți oameni, puțini la număr (între cari este și unul din scriitorii acestor rânduri) cari n'au simțit nici odată răul de mare, ori de câte ori au călătorit pe mare. Femeile sunt mai supuse acestei boale de cât bărbații. Cauza de căpetenie este echilibrul nestabil al corpului omenesc, supus la mișcările de clătinare și de legănare ale vaporului. Se mai citează între cauze și căldura, lipsa de aer, mirosurile de tot felul, mirosul tutunului etc. — *Tratament*. Înainte de a se imbarca omul trebuie să mănânce și să bea bine, pentru ca să aibă vărsături mai ușoare și mai puțin dureroase. Dacă este vorba de o călătorie scurtă, de un ceas sau două, și dacă marea este rea și timpul urât, cel mai bun lucru este să stai într'un colț al vaporului, la adăpost de vânt, pe un fotoliu, dacă se poate suspenda, și să înghiți două-trei linguri de *sirop de cloral*, lăsând să te cuprindă somnul. Pentru a preîntâmpina, sau a combate vărsăturile se mai recomandă să înghiți, din când în când, bucățele de gheață, sau ceaiu slab cu gheață, apă cloroformată, sau: cloridrat de coccaină, 20 ctgr., tinctură de iod, 30 picături, apă 150 gr., din care să bei 2 până la 4 linguri pe zi. Pentru durerea de cap sunt bune: bromurele, antipirina, piramidonul, fenacetina, sau cloralul. Ca mâncare: pesmeți, lapte, lapte cu tapioca, fripturi, pâine, fructe, șampanie răcită la gheață.

Boală de nervi. — V. *Isterie*, *Neurastenie* și *Nevroze*.

Boală de zahăr. — V. *Diabet*.

Boala lui Addison. — V. *Suprarenale* (Glande).

Boala lui Basedov. — V. *Tiroidă*.

Boala lui Bright. — V. *Rinichi*.

Boala lui Friederich. — V. *Măduva spinării*.

Boala lui Meniere. — V. *Ureche*.

Boala lui Morvan. — V. *Măduva spinării*.

Boala lui Parkinson. — V. *Paralizie agitantă*.

Boală lumească. — V. *Blenoragie*, *Șancăr* și *Sifilis*.

Boală mare. — V. *Tifoidă* (Febra).

Boala munților sau a **înălțimilor**, *răul de munte*. — Dacă te urci pe un munte, mai sus de 3000 de metri, începe să îți se facă rău, să fii bolnav, și din ce urci mai sus de aceea îți va fi și mai rău. Când te urci cu balonul, numai la o înălțime de 7000 de metri, începe să-ți fie rău. Această boală începe prin a te simți rău peste tot, a avea o indispoziție generală, a ți-se tăia picioarele, a ți-se îndoi genunchii și a simți o greutate mare; apoi, încep și vărsăturile alimentare, cari, în cazurile grave, devin mucoase și bilioase, câte odată chiar vărsături de sânge, colici și urdinare, sudori reci și durere cumplită de cap (parcă te strânge la cap cu un cerc de fier), văjiituri de urechi, întunecarea vederii, apăsare în piept, bătăe de inimă, toropeală și aplecare mare spre somn, pierdere totală a voinții, uneori leșin. Aceste semne dispar dacă te culci și încep iarăși dacă te urci mai sus. Cel ce este cuprins de această boală se înțelege dela sine că nu-și mai poate continua drumul. — *Cauzele* acestei boale sunt: *frigul*, *oboseala* (umblarea multă, nedormire, mâncarea rea), *micșorarea presiunii atmosferice*, care produce o împuținare a oxigenului din sânge, din care pricină provine *asfixia*, sub influența creșterii acidului carbonic, datorită muncii musculare, apoi mai este și *predispoziția individuală* și *neaclimatizarea*. — *Tratamentul*. La început: bolnavul se va hrăni bine cu ouă, carne, pâine, i se va da cafea sau ceaiu, să nu i-se dea de loc alcool și licoruri, care măresc arderea organică și prin

urmare producțiunea acidului carbonic în sânge. Să se întrerupă, dacă se poate, ascensiunea și să se scoboare, în vale, sau numai la 250—300 metri înălțime. Pentru starea de somnolență și pentru leșin se vor încerca toate mijloacele de a redeștepta și a însufleți bolnavul (stimulente pe cale stomacală, fricțiuni pe piele, inspirațiuni profunde forțate, trageri ritmate ale limbii, inhalazioni de oțet tare, de amoniac, de nitrit de amil), apoi să se acopere și să se încălzească bolnavul; să se scoboare cât se poate mai iute la o înălțime de 2500 și chiar la 2000 metri.

Boală rea. — V. *Tifoidă* (Febră).

Boale de femei. — V. *Leucoree*, *Menstruație*, *Ovar*, *Uter*.

Boale de piele sau dartre. — V. *Acnee*, *Eczemă*, *Erpes*, *Impetigo*, *Lichen*, *Lupus*, *Pitiriază*, *Psoriază*.

Boale endemice. — V. *Endemie*.

Boale veneriene. — V. *Blenoragie*, *Șancăr* și *Sifilis*.

Bob, bobă, favă. (*Faba vulgaris*, fam. leguminoaselor). — Plantă erbacee cu teciile groase, puțin umflate, cu semințele lunguete, cari conțin mare cantitate de amil și de legumină. Face parte din *legumele feculente* foarte hrănitoare.

Boboci. — Stațiune balneară în județul Buzău, comuna Tohani, la o depărtare de 12 km. de Mizil. Localitatea este așezată pe Valea Scheei, în vecinătatea râulețului Boboci, numit și *Păturosul*, din cauza hidrogenului sulfurat ce conține. Apele sunt: cloruro-sodice sulfuroase-iodurate. Stațiunea este proprietatea comunei Mizil. Bună pentru durerile reumatice și în special pentru reumatismul articular.

Bodoc. — La 11 kilometri de orașul Sf. Gheorghe, jud. Trei-Scaune. Altitudine 530 m. Climat subalpin. Apa din izvorul principal „Matilda”, care conține mult bicarbonat de sodiu și calciu, se pune în vânzare pretutindeni în sticle închise. Apa „Matilda” se recomandă ca apă de consumat la masă, simplă, sau cu puțină vin, sau pentru cură contra bolilor aparatului respirator, contra lipsei de poftă de mâncare, aciditate mare în stomac, hemoroizi, boli ale vezicii biliare.

Bojoc. — V. *Plămân*.

Boldo (*Peumus Boldus*, fam. monimiaceelor). — Plantă ale cărei frunze lucrează ca stimulent, tonic, mai ales în boalele de ficat. Principiu activ: *boldina*. Se dă: uleiul esențial (în perle) 20—50 ctgr.; tinctură, 1—2 gr.; vin, sau sirop 20—30 gr. Foarte cunoscut este preparatul *Boldo-Verne*, în inflamațiile de ficat.

Bolesniță. — V. *Epidemie*.

Bolfă. — V. *Tumoare*.

Bolfe. — V. *Difterie* (*angina difterică*).

Bolnav. — V. *Boală*.

Bondar (*Înșepături de*). — V. *Albine*.

Boranță. — V. *Limba mielului*.

Borax, borat de sodă. — Este o sare cu un gust mai întâiu dulceag, apoi alcalin amar. Se întrebuințează în boalele de gură, *plesne* (afte), *acrum* (mughet), în *anghină*: 4 gr. în 30 gr. de *mierică* (mel rozat, sau miere de trandafir), sau mai bine glicerină, cu care se atinge gura, cu un pumătuf, de mai multe ori pe zi, sau se face gargară cu 10 gr. la 100. În contra crăpăturilor dela sfârcurile țâțelor și a mâncărilor de asemenea este bun sub formula: borax 10 gr. glicerină 30 gr. Se mai întrebuințează și în preparatele de dinți (dentifrice).

Borboroseli, borborigme. — Un fel de gâlgaire, sau sgomote care se aud uneori în stomac, sau intestine și sunt produse prin dislocările gazelor, în mijlocul lichidelor care se găsesc acolo. Aceste borboroseli se aud la oamenii cari sufăr de mistuire grea (dispepsie), la cei atinși de aprinderea mățelor, de febră tifoidă, de dizenterie, etc. Se întâmplă însă aceste borboroseli și la oameni sănătoși, lucru foarte supărat, mai ales când te afli în lume și se pot preveni numai prin hotărîrea de a nu bea lichide decât foarte puțin în timpul mâncării și de loc între mese și de a împiedeca îngrămădirea de gaze în tubul digestiv prin mijloace apropiate, carbune vegetal etc.

Borea. — Comună la poalele muntelui Budalac, pe valea Borcei, județul Suceava, într-o poziție din cele mai pitorești. Ape alcaline sodice și cloriodurate. Conține 4—9% bicarbonat de sodă și 4—3% acid carbonic. Ape de băut similare cu cele de Borsec și Spa; nu sunt exploatate.

BORD

Bordeiu. — *V. Locuintă.*

Boric (Acid). — Medicament anti-septic, antifermentescibil, sedativ, care se întrebuințează mai mult pe *dinafară*, în soluție de 4 gr., la 100 gr. apă fierbinte (maximul de solubilitate). Este bun la spălarea rănilor, în boalele de mitră, în boalele de gură, de ochi, ca gargară, în clistire.

Bornival. — Eter izovaleric de borneol. Lichid cu miros slab de valeriană. Se dă în contra turburărilor nervoase și nevrozelor cardiace. Doză: 25 până la 50 ctgr. pe zi, în buline.

Boro-Fenic. — Acid fenic boricat. Pulbere albă, puțin solubilă în apă. Antiseptic. Bun în pansamente, simplu sau asociat cu borat de sodă, în spălături, în soluție de 1 la 100.

Borsec. — Cea mai cunoscută stațiune din Ardeal și una din cele mai frumoase și mai pitorești stațiuni balneo-climaterice din această provincie. Așezată la o altitudine de 820 de metri între masivii Călimanului și Ceahlăului, cu un climat subalpin, cu aer parfumat, ozonizat, cu 28 de izvoare cu apă, saturată de acid carbonic, foarte plăcută la gust, e una din cele mai frecventate băi. Apa dela Borsec (Borviz de Borsec) e bună și pentru cură externă și pentru cea internă. Apa conține bicarbonat de calciu, bicarbonat de fier și de litiu. Stațiunea aceasta cu ape carbo-gazoase este indicată în afecțiunile catarale ale tubului digestiv (apa luată *după masă*), pentru turburări ușoare ale inimii, în convalescență, în boli cronice, nervoase.

Boș. — *V. Testicul.*

Boșorogeață. — *V. Ernie și Mitră.*

Bostan. *cucurbeată, dovleac, dovlete, lubă (Cucurbita Pepo, fam. cucurbitaceelor).* — Plantă erbacee acătătoare, ale cărei fructe sunt cele mai mari la noi în țară și se cultivă în toată România. Fructele sunt alimentare pentru om și animale. Din semințe se prepară un ulei alimentar, care se întrebuințează și în industrie. Pulpa, sau carnea bostanului este foarte apoasă, puțin hrănitore și laxativă, iar semințele sunt *viermifuge*. Cu 15 până la 30 gr. din aceste semințe, curățite de pelicioara lor, și tot atâta zahăr, se face un fel de pastă, care este luată

BOZ

cu plăcere de bolnavi, mai ales de copii; de altfel se poate aromatiza cu puțină zeamă de lămâe, sau de portocale.

Babele la țară fac oblojești la gât, când cineva are gâlci, cu mațe de dovleac prăjite cu untură de porc, amestecate cu găinați de gâscă. Uimele se întorc, dacă se pune pe ele *tatargă*, rasă pe răzătoare și prăjită cu untură de porc, ori cu unt de lemn. Cârcei fierți cu spini de *holeră* se beau contra *holerei*. Laptele de semințe, amestecat cu rachiu, se dă în contra *panglicei*.

Boswellia serata. — *V. Tămie.*

Botine. — *V. Incălțăminte.*

Botriocefal (gr. *bothrion*, gropiță, și *kephali*, cap.) — Un fel de *panglică* care se găsește mai mult în Elveția pe lângă lacul de Geneva ca și pe lângă Delta Dunării. S'a numit astfel din cauză că la cap are două gropițe, în loc de ventuze. Ouăle de botriocefal se găsesc în apă și în corpul unor pești cum e știuca, de unde trec în om.

Bourel. — *V. Melc.*

Boz, bozie, boj, (*Sambucus Ebulus*, fam. Caprifoliaceelor). — Plantă er-



Fig. 59. — Bostan




Fig. 60.
Botriocefal



Fig. 61. — Boz

bacee, cu miros neplăcut, care crește în toată țara, prin locuri necultivate, tufișuri, pe lângă garduri și drumuri,

pe câmp și prin păduri. Această plantă lucrează ca purgativ drastic, dar în medicină nu se întrebuințează. — La țară însă bozul se întrebuințează foarte mult și ca medicament și la descânțece. Ceaiul de frunze se dă în contra sculamentului. Fiertura (decoctul) de rădăcină și de fructe în contra dropiceii.

Brad, *brad alb*, *silha* (*Abies alba*, sau *pectinata*, fam. coniferelor). — Arbore frumos, întotdeauna verde, crește prin pădurile din regiunea subalpină în toată România. Mugurii de brad au solzii acoperiți de o materie rășinoasă, care le dă un miros și un gust aromatic. Se întrebuințează în medicină, pentru a împuțina flegma și a înlesni scuiparea, în cazurile de tuse cronică și de catar de plămâni (behic, expectorant, anticataral), precum și pentru a face ud mult și limpede (diuretic). *Ceaiul* de muguri de brad se face prin infuzie, din 10—20 gr. la un litru de apă clocotită; se mai prepară și un *sirop*, cu care se îndulcesc poțiunile cari se dau în cazurile de guturaiu cu tuse. *Berea* fabricată cu muguri de bard este bună în contra scorbutului. — La țară se bea primăvara decoctul (fiertura) de muguri tineri în contra scrofulelor. Pentru spieritură se bea dinminea câte o lingură de rachiou de drojdi, în care s'a plămădit rășină. La copturi se pune un fel de plasture făcut din rășină, sau de vită, ceară, casă de paiangen și făină de grâu, amestecate împreună și pisate. Cioturile din scândurile de brad arse și pisate se beau cu apă, când cineva are junghiu.

Brădișor. — *V. Pedicuță*.

Brâncă. — *V. Erizipel*.

Brancardă. — Este o targă de transportat răniți, sau bolnavi. Poate fi tipică, gata fabricată, sau improvizată, de urgență. Cea mai simplă brancardă este formată din două prăjini de lemn, groase la capete atâta cât să le putem prinde în mână și lungi cam de 2½ metri și în jurul cărora se coase o bucată de pânză groasă, lată de 70—80 cm. și lungă de 2 metri, astfel ca să formeze un adevărat pat. La unul din capete se poate așeza o perină mică. Bolnavul, sau rănitul, este așezat culcat pe această brancardă și purtat de 2 oameni, unul care

merge înainte, apucând cu amândouă mâinile capetele lemnelor și altul făcând același lucru cu capetele dinapoi.

Brancardier. — Cei ce sunt instruiți în căutarea și transportarea răniților. Ei dau și primele ajutoare bolnavilor și răniților. Trebuie să li-se dea o instrucție specială sanitară, mai ales celor destinați a fi brancardieri în războiu.

Brândușe, *bălură*, *brândușa morților*, *ceața ciorii*, *ruscea de poiană* (*Colchicum autumnale*, fam. liliaceelor). — Plantă mică erbacee, care crește prin fânețele și pășunile umede. Această plantă este foarte veninoasă, prin toate părțile ei, din pricina unui alcaloid numit *colchicină* pe care îi conține. Se întrebuințează ca purgativ drastic, diuretic, antigutos, anti-reumatismal. Se dă pe *dinăuntru*, sub formă de: alcoolatură de bulb, 2—5 gr.; alcoolatură de flori 2—5 gr.; extract de semințe, 1—10 ctgr.; praf (pulbere), 5—30 ctgr. sirop, 10—30 gr.; tinctură de semințe, 1—5 gr.; vin de bulb, 10—20 gr.; vin de semințe 5—10 gr. Apa medicinală de cholchic se prepară plămădind în timp de 5 sau 6 zile, 50 gr. de bulb cu 100 gr. de spirt, din care se iau 20—40 picături, într'un pahar de apă îndulcită cu zahăr, în 2 rânduri, în timp de 2—3 zile. La țară se întrebuințează această plantă numai la vopsit. — *Colchicina* se dă contra gutei și contra reumatismului, 4 până la 6 mg., în granule de 1 mg. — *Otrăvirea* are următoarele semne: durere arzătoare în stomac, vărsături cu vine de sânge, sete mare, prostrație extremă, pupilele dilatate, sudori abundente dureri de cap, la membre și încheieturi. *Tratament*: decoctul, sau fiertura de stejar, sau de chinchină; ceaiu tare, eter, rachiou, apoi băuturi emoliente.

Brânză. — Brânzeturile sunt preparațiuni foarte bogate în substanțe hrănitoare, cazeină, grăsime sau unt. Brânza se face din laptele de vacă, de capră și mai mult din cel de oi prin închiegarea lui cu chiag, sau *maia*. Brânzeturile sunt de două feluri: *crude* (urda, brânza de vaci, de capre, de oi) și cele preparate prin *fierbere* (toate cașcavalurile). Ori ce brânză, în timpul

BRAȘ

păstrării, este supusă la schimbări produse de microbii descriși în fermentația laptelui, cari digeră cazeina, desdoiesc grăsimea și dau săpunuri solubile, în unire cu potasiul și cu sodiul și prin produsele de fermentație, ca valerianatul de amoniac, cari întăresc gustul și înlesnesc mistuirea, ca niște bune condimente. Mai bune și mai ușoare la mâncat sunt brânzeturile proaspete, nefermentate, ca brânza de vaci preparată de curând și diferitele *creme* (cum ar fi crema de Buzău, etc.), cari, mâncate cu puțin zahăr și în câtime mică, ușurează mult mistuirea. Brânza de burduf, brânza de puțină, de Brăila, etc. sunt ceva mai grele și nu se potrivesc pentru ori care stomac. Brânzeturile *străine*, diferitele cașcavaluri, deși sunt nutritive, sunt grele la mistuit și de multe ori sunt falsificate.

Brașov. — Frumoasa și plăcuta stațiune climaterică, la poalele munților Carpați, în mijlocul unor încântătoare păduri de brazi și fagi. Înălțimea Brașovului e de 585 m. Aerul e minunat și dătător de sănătate. Brașovul e peste tot cunoscut. Orașul, destul de frumos, atrage un mare număr de vizitatori, atât vara cât și iarna. Are avantajul asupra altor stațiuni climaterice că poți să locuiești în oraș, având tot confortul și să vizitezi toată ziua împrejurimile, la o foarte mică distanță și foarte frumoase. Cine se îndepărtează puțin de Brașov ajunge la Bran, Timișul-de-Sus, Predeal, Stațiuni climaterice foarte frumoase.

Braț (lat. *brachium*). — Se chiamă astfel acea parte a membrului superior care se întinde dela *umăr* până la *cot* și căreia îi urmează *antebrațul*. Brațul se compune dintr'un singur os, numit *humerus*, care este înbrăcat de mai mulți mușchi, cari îl pun în mișcare și între cari cel mai de frunte este mușchiul *biceps*, aflat pe partea dinaintea. De altfel toți mușchii brațului sunt puternici și mișcă brațul în toate direcțiile. Se întâmplă câte odată ca brațul să nu poată face nici o mișcare, atunci zicem că e *paralizat*, ceea ce poate să provie dintr'o congestie sau emoragie cerebrală. Uneori osul fiind rupt, sau scrintit, brațul iarăși nu se poate mișca.; alte ori neputința bra-

BRAT

țului poate să provină și dintr'o cădere pe umăr, o lovitură strașnică, din care cauză s'a paralizat nervul *circumflex*, sau la cei ce umblă în cărji, apăsând prea tare subsuora. Aceste *paralizii* se pot vindeca numai cu *electricitate*, aplicată, se înțelege, de doctor. Afară de os și de mușchi, brațul mai are o *arteră* foarte mare, care-i aduce sângele trebuincios pentru hrănire și care *arteră* poate fi atinsă de *aneurism*, mai multe *vine*, dintre cari două se văd foarte bine, în apropierea cotului și din care, la trebuință, se *lasă sânge*; apoi mai mulți *nervi*, tot atâtea fire ca cele de telegraf, cari aduc mușchilor poruncile dela creier ca să miște brațul; pe deasupra tuturor a-



Fig. 62. — Mușchii brațului contractați

cestora se află o *piele* subțire, căptușită pe dedesupt cu un strat de grăsime. — Brațul este supus la multe lovituri (*contuziuni*) și răniri (*plăgi*) de tot felul, a căror gravitate atârnă de grosimea țesăturilor atinse; cele cari interesează numai pielea nu sunt primejdioase și se vindecă de grabă; cele adânci sunt cu mult mai periculoase, mai ales când ating vinele și nervii cei mari. Pe braț se pot ivi tot felul de *inflamații*, *abces*, *brăncă* etc., cari nu sunt mai grave aci decât în alte părți ale corpului și care se tratează în același fel. Când însă, din nenorocire, omul și-a pierdut brațul, în urma unui accident, sau a unei boale grave, pentru vindecarea căreia doctorul a fost slit să facă *amputația*, adecă să taie brațul, atunci el se poate înlocui cu un braț *artificial*, care, mul-

țumită perfecționărilor aduse de către fabricanți, poate face aproape toate mișcărilor brațului natural.

Breazu. — Apa de Breazu, cunoscută și sub numele de Alexandru cel Bun, se scoate din izvoarele dela Breazu, de lângă Iași. Ea conține sulfat de sodă, de magnezie, de potasă, carbonat de sodă, de fier, acid carbonic. Apa de Breazu este purgativă, n'are miros, are gust amar, însă cu mult mai puțin decât apa de Buda, nu e așa de concentrată ca aceasta, din care cauză acțiunea ei purgativă nu face dureri. Luată în doză de un pahar (300 grame), lucrează după $\frac{1}{2}$ oră. Se recomandă cu succes contra constipației cronice, contra *trânșilor*, boalelor de ficat și *splină*, boalelor de stomac și de *rinichi* (în unele cazuri). Ea nu produce greață, nici vărsături, nu provoacă colici; se bea ușor și de ori și cine, nu obosește stomacul. Doză: 300—600 gr. odată (1—2 pahare), luate de preferință dimineața. După întrebuintare nu produce constipație ca celelalte ape minerale purgative.

Bretele. — V. *Pantaloni*.

Brezoiu. — Localitate de vilegiatură pe valea Lotrului, aproape de locul unde acesta se varsă în Olt; foarte mult vizitată în timpul verii. Satul este mare și locuitorii cu dare de mână, are hotel, restaurant și multe locuințe confortabile. Clima statornică, dulce; adevărată stațiune climaterică, înconjurată de păduri întinse de brazi și stejari, cu împrejurimi pitorești.

Bright (Boala lui). — V. *Rinichi*.

Brionină. — V. *Împărăteasă*.

Broască. — V. *Modălcă* și *Pumn*.

Broască (*Buța vulgaris*. Batracian). — Dacă ne uităm la pielea broaștei, dela cap și de pe spate, vedem că este acoperită de o mulțime de glande, din care iese un fel de apă gălbuie, vâscoasă și acră, care ar fi *veninul* ei. Când broasca este atacată, sau întăritată, se umflă, corpul ei devine tare și elastic și această umflătură face să curgă venin mai mult. Acest venin, dacă îl inoculăm la paseri, la șopârlă și alte animale mici, toate acestea pier; pentru om el nu este primejdios. Trebuie să ne păzim după ce am umblat cu o broască să nu punem degetele la ochi, la nas, la gură, căci ne

ustură rău câteva ceasuri și chiar zile. Pentru a potoli această usturime vom întrebuinta mereu apă rece. La *țară* babele se servesc de broaște în căutarea boalelor și anume: broasca prăjită de vie o pun la gât, pentru gâlci. Spintecată de vie se pune cu partea sângerândă la rana din înțepătură, dalac sau sugiu. Trei broaște răioase, puse în rachi, după ce pier, rachiul se bea pentru friguri, iar broaștele se aruncă zicând: din vânt au venit frigurile în vânt să se ducă. Dacă broasca se udă (urinează) pe corp se fac negi sau râe, care se vindecă, dacă se înfășoară locul bolnav cu ouă de broască, o zi și o nopate. Cu grăsime de broască se unge la dureri de încheieturi. Copiii mici poartă broasca cusută într'o petică, la gât, ca amulet în contra sperieturii. Pentru vindecarea *plesniței* (v. acest cuvânt) se taie o broască peste pântecul bolnavului și cu aceea se leagă acel bolnav pe sub barbă.

Brom. — Solubil în apă, în alcool; foarte solubil în eter. Proprietăți: dezinfectant, fondant, rezolutiv, revulsiv. Doză: 5—10 ctgr.

Bromalină. — Brometilformină. Se recomandă ca sedativ nervos, în doză de 2—6 gr. în soluție, sau sirop, iar la copii 1—2 grame.

Bromeină. — Este un bromidrat acid de *codeină* (preparat de Montagu), sub formă de frumoase ace măta-soase; foarte solubilă în apă și în alcool; conține 35 la 100 de brom. Este calmantă, ipnotică și se dă în insomnii, visuri rele, spaimă nocturne, ale copiilor, apoi în tusa măgărească, în dureri nervoase de stomac și de mafe, în cancerul stomacului. Se dă sub formă de *pilule*, de câte un ctgr., 4—8 pe zi; *sirop*, 1—3 linguri pe zi; *injecțiuni sub piele*, 2 ctgr.

Bromipină sau **Bromopină.** — Combinațiunea bromului cu ulei de susan, sau sesam, conținând 10—33 la 100 de brom. Se dă în aceleași cazuri ca și bromurele alcaline. Doză: bromipină (10 la 100), 15—50 gr. pe zi, cu lingura, sau în clizme și în injecțiuni, sub piele; bromipină (33 la 100), 5—30 gr. pe zi în capsule, sau în lapte, sau în clizme.

Bromism. — Astfel se chiamă otrăvirea produsă cu preparatele de brom.

BROM

(bromure), când se iau în cantitate prea mare și prea mult timp. Semnele sunt; uscăciune de gât, lăcrimare, pe piele ies niște beșicuțe roșietice (acnee), o stare de beție, somnolență. *Tra-tament*: să se micșoreze doza, sau să se întrerupă întrebuințarea, după cazuri.

Bromoform. — Un medicament lichid calmant și anestezic foarte activ, din care pricină trebuie dat cu multă băgare de seamă, fiind *periculos*. Se dau 10 până la 15 picături pe zi, într-o porțiune la copii, sau 10 până la 15 ctgr. la adulți.

Bromol. — Se mai numește și *tribromofenol*. Este un praf galben, ca lămâia, gust astringent. Se formează saturând acidul fenic cu brom. Anti-septic puternic. Pe *dinăuntru* se dă la febra tifoidă abces al plămânului și în colera infantilă, 5 până la 15 mgr. Pe *dinafară* se întrebuințează în difterie și pansamentul rănilor, în alifie: bromol 4 gr., vaselină 30 gr.

Bromon, bromone (Robin). — Combinațiune a bromului cu *peptonatul de carne de vacă*. Ușor de asimilat și nu produce nici o stricăciune în organism. Bromonul este un *calmant* și se recomandă în boalele nervoase, oboseală de creeri, neurastenie, iritabilitate nervoasă a femeilor și a fetelor tinere și în turburările nevropatice ale copiilor, în epilepsie, insomnia bătrânilor, etc. Bromonul se poate lua în apă, vin, lapte, sau bere. La adulți se pot da 40 până la 80 picături, ori de câte ori vroit să producă un efect însemnat; ca *sedativ* se dă 20 picături de 3—4 ori pe zi; ca *ipnotic*, 60 de picături dintr'odată, seara la culcare, în ceaiu cald de teiu; ca *antispașmodic* 20 picături de mai multe ori pe zi, până la 100—150 picături. La copii și la bătrâni se va începe cu 10—20 picături pe zi, putând merge până la 40 picături.

Bromure. — Se numesc astfel medicamentele compuse din *brom* și un alt corp. Cel mai întrebuințat și mai cunoscut este *bromurul de potasiu*, care este o sare cristalizată, cu gust sărat și amar, pentru care se dă de obicei într-o porțiune cu un sirop de coji, sau de flori de portocale. Pentru proprietatea lui calmantă se dă în toate bo-

BRON

lele nervoase: în *epilepsie* dă rezultate bune, când este administrat timp mai îndelungat și în doză crescândă, cât poate suporta bolnavul și numai după ordonanța doctorului, în *isterie*, în *coree* și în alte boale cu iritație nervoasă. Se dă dela un gram până la 10 gr. pe zi. — *Bromurul de sodiu* și *bromurul de amoniu* au aceeași lucrare ca și cel de potasiu și se dau în aceleași doze. De multe ori se pare că lucrează mai bine când se dau aceste trei bromure împreună: brom. de pot., de sod., de amon., câte 5 gr., apă distilată 250 gr., sirop de flori de portocale 50 gr.; să se ia câte 3—4 linguri pe zi. — *Bromurul de camfor*, încetinează bătăile inimii și micșorează căldura. E sedativ, antispașmodic, ipnotic: 50 ctgr. până la 1 gr. 50 ctgr. în pilule sau dragee. — *Bromurul de fier* este un bun preparat fieruginos: 10—30 ctgr pe zi, în pilule; se recomandă mult în boalele nervoase (neurastenie), cu anemie drageele lui Hecquet (4—6 pe zi). — *Bromurul de stronțiu* foarte bun în cazurile de albuminurie: 2—6 gr. pe zi. — *Otrăvirea cu bromure*, vezi la *Bromism*.

Bronchie (*bronchia*, gât, gâtlej) — Bronchiile sunt două țevi membranoase, prin cari aerul din afară




Fig. 63. — Figură schematică a tracheei, plămânilor și bronhiilor

pătrunde până la *plămâni*. Ele rezultă din bifurcația *tracheei* (beregata), care este un tub gros ce urmează la-

ringelui. Fiecare bronchie se duce în jos și spre afară, intrând în plămânul din acea parte; ea se împarte acolo și se subîmparte până la nesfârșit, dând ramuri și rămurile din




Fig. 64. — Bronchii

ce în ce mai mici și mai numeroase. Cele din urmă rămurile sfârșesc în niște pungulițe (celule), cari formează țesutul propriu al plămânului. Bron-



Fig. 65. — Lobul pulmonar (mult mărit, cu artară. vine și vase capilare)

chiile cu ramurile, rămurilele și beșicuțele dela capetele acestora, s'ar putea asemăna cu o ciorchină de struguri. Natura a lăsat ca bronchiile să se împartă în atât de multe rămurile cu

scopul ca astuparea accidentală a unora dintre ele să nu împiedece *respirația*, fără de care omul nu poate trăi. Pentru ca circulația, sau pătrunderea aerului să se facă cu destulă înlesnire, în toate aceste ramuri și rămurile, natura le-a făcut dintr'un fel de inele sgârcioase (cartilaginoase), care le țin în totdeauna deschise. Când omul este sănătos aerul pătrunde cu ușurință peste tot, până în fundul plămânilor. Când însă omul este bolnav, sau răcit la piept și are tuse, ramurile bronhiilor se astupă, pe o întindere mai mult sau mai puțin mare, cu un fel de materie (flegmă) groasă, așa că aerul nu mai poate pătrunde liber prin ele și respirația se face cu anevoință; bolnavul scuipe cu greutate această flegmă, mai ales când nu este bine coaptă, după cum se întâmplă în *catar* (vezi acest cuvânt). Același lucru se mai întâmplă și la sfârșitul multor boale, cari omoară omul prin *asfixie* și în momentul *agoniei*. Strămtarea bronhiilor mai poate fi de natură nervoasă, când pereții lor se strâng după cum se vede în *astmă* și *tusa măgărească*. De multe ori căptușeala bronhiilor se inflamează, se aprinde și se îngroașe așa că le strâmtează; această inflamație se chiamă *bronchită*.

Bronchiectazie. — Boală pe care o întâlnim adeseori la bătrâni și mai rar la tineri. Constă în dilatația bronhiilor, din loc în loc, sau în întregimea lor. Este datorită bronșitelor cronice, tusei convulsive, bronho-pneumoniei, sau sifilisului pulmonar. Se produce astfel: într'un anumit loc al bronchiei se slăbește peretele cartilaginos și muscular, dând loc la dilatări în urma unei tuse mai tari. *Semne*: bolnavul scuipe foarte mult, mai ales dimineața când se scoală, o secreție purulentă, care se adună în pungile pe care le fac bronchiile, prin dilatare. Alena, foarte urât mirositoare, ne spune de departe că e vorba de o bronchiectazie. Bolnavul poate să aibă călduri este obosit și de multe ori acestei boale îi urmează oftica.

Bronchită. — Este produsă de aprinderea sau inflamația *bronhiilor*. *Bronchita acută* este aprinderea de curând a bronhiilor. În *guturainul* cu tuse de asemenea este o aprindere de bronchii

BRON

însă inflamația nu este așa de mare ca într-o bronchită adevărată; în guturaiul cu tuse aprinderea atinge numai cele dintâiu ramuri ale bronchiilor, pe cele mai mari și în acest caz se înțelege dela sine că boala nu este așa de gravă, respirația nu este de tot împiedecată, căci aerul, deși mai greu, pătrunde până în fundul plămânilor, pe câtă vreme în bronchită pot fi atinse și ramurile cele mai mici ale bronchiilor, cari se pot astupa de flegmă și atunci aerul nu poate pătrunde mai de loc, iar respirația se face cu mare greutate. Tusea, care este unul din semnele boalei este mai ușoară și mai scurtă în cazul întâiu, pe câtă vreme în cazul din urmă ea este mai tare, mai grea, mai supărătoare și vine mai des. Bolnavul de bronchită acută are în primele zile puțină căldură, o indispoziție generală, un fel de arsură cu usturime în piept, care este mai mare când începe tusa. Aceasta vine din timp în timp, uneori mai des, alteori mai rar, câte odată cu putere așa de mare în cât sdruncină pieptul și-l face dureros. Flegma, la început, nu este, sau este puțină și sub forma unui lichid transparent, albicios, subțire ca balele; pe piept se simte un fel de apăsare (opresiune), care uneori este foarte mare. După câteva zile, 3—5, respirația se mai ușurează și năduful nu este așa de mare, căldura pieră, tusa este mai rară și scuipatul, sau flegma, este galbenă-verzue și iese cu înlesnire. În 8—10 zile bronchita acută a trecut. Când în timpul bronchitei s'a ivit un *junghiu*, în vreo parte a pieptului, atunci nu e semn bun; junghiul acesta prevestește ivirea unei alte boale mult mai gravă, o *pleurezie*, sau o *pneumonie*. În cazurile cele mai ușoare junghiul poate fi numai o *nevralgie intercostală*. În tot cazul, îndată ce vedem că bolnavul se plânge de junghiu, trebuie să-l punem în pat, să-l îngrijim bine și să chiamăm doctorul. Fiecare poate fi atins de bronchită, a cărei cauză de căpetenie este *răceala*, mai ales frigul umed, cu ceață, care de multe ori dă naștere și la durere de gât. Bronchita se mai poate căpăta când respirăm aburi, sau gaze iritante, iuți. Tusa face parte din semnele multor boale. De obicei bronchita

BRON

nu este o boală grea, dar este bine să căutăm să ne scăpăm cât se poate de iute de ea, căci și ea, ca și ori și care altă boală, când este lăsată în voia ei, poate să aibă urmări rele. Pentru o *bronchită ușoară* nu este nevoie să-și întrerupă omul ocupațiile, luând bine înțeles oarecari precauțiuni, adică să se păzească de o nouă răceală, de curenți, să fie potrivit îmbrăcat, să nu iese dimineața și seara din casă, să nu fumeze, să-și pună de 2 ori pe zi muștar pe piept, să bea ceaiuri zise pectorale, cari înmoaie tusa, cum este ceaiul de teiu, de silnic, de nălbă, de năvalnic, de capete de mac alb (fără semințe) singure sau mai multe la un loc, amestecate în părți egale. Din ele să se facă ceaiu (câte 10 gr. la un litru apă), îndulcit cu zahăr, sau cu un sirop de tolu. Când însă bronchita este *mai întinsă*, mai grea, atunci bolnavul trebuie să stea în casă, sau chiar în pat, la căldură; să se ungă pe piept cu tinctură de iod și să pună ventuze. La ceaiurile numite mai sus poate să se mai adauge sirop diacod, sau puțină apă de laur-ceras, pentru ca să se mai liniștească tusa; ceaiurile se mai pot lua tăiate cu lapte cald și îndulcit cu zahăr, sau mai bine să se bea câte o lingură la fiecare 2 ceasuri din: tinctură de aconit 30 picături, apă de laur-ceras 10 gr., sirop de co-deină, sirop de tolu câte 20 gr., apă distilată 100 gr. În contra fierbințelii (a căldurii) se va da chinină, singură sau cu antipirină, antifebrină sau fenacetină. Când flegma iese greu se va da: infuzie de poligală din 5 gr., apă 150 gr., licoare amoniacală anizată 2 gr., sirop de ipeca, sirop diacod câte 20 gr.; la fiecare 2 ore câte o lingură. — *Bronchita cronică* urmează de obicei unei bronchite acute, care n'a fost bine și la timp tratată. Semnele ei sunt cam aceleași ca și în bronchita acută. Această bronchită, durând mai multe săptămâni, sau chiar luni, turbură în cele din urmă sănătatea generală, bolnavul are un fel de gâfâială continuă, orice efortare îl ostenește numai decăt; fața și mai ales buzele i se învinețesc, n'are poftă de mâncare, n'are putere și slăbește. Pentru aceasta orice bronchită cronică trebuie tratată cu atenție, căci

altmîntrelea poate sfârși prin *năduș* (emfizem). Bolnavul se va unge pe piept, cu tinctură de iod, la nevoie se vor pune vezicători; pe *dinăuntru*: apă de gudron, sau pastile de gudron, siropuri de tolu, de muguri de brad, diacod, de specii pectorale (numărate mai sus la bronchita acută), capsule cu ulei de terbențină, pastile de kermes, medicamente cari se iau de obicei în bronchitele cronice. Când însă tusa nu se micșorează, atunci este semn că bronchita ține de o stare generală rea. — *Bronchita capilară* (v. *Bronco-pneumonie* și *Influență*).

Bronco-pneumonie. — Când aprinderea într-o bronhită se întinde la ramurile cele mai mici ale bronhiilor, avem ceea ce se numește *bronchită capilară*, iar când inflamația merge mai departe și cuprinde beșicuțele plămânilor (veziculele pulmonare) avem *bronco-pneumonie*, boală foarte grea și primejdioasă. Această boală este uneori o întindere a unei bronchite acute, dar de obicei este produsă printr-o *tovărășie de microbi* ai boalelor molipsitoare, cum sunt: influența, tusa măgărească, pojarul, brânca, difteria, febra tifoidă, oftica. Bronco-pneumonia atinge mai mult copiii și bătrânii. *Semnele* ei sunt: căldură mare (40°), chinte de tuse dureroase, apăsare pe piept mare și neîntreruptă, respirația foarte deasă, mergând până la sufocație, fața palidă, buzele vinete, mâinile și picioarele reci. Mersul boalei este continuu, din când în când cu oarecare ușurări, până la asfixie. Micșorarea apăsării din piept poate să se facă uneori foarte repede, mai ales la copii. — *Tratament.* Ceilalți copii să se depărteze de cel bolnav. Bolnavului să i se dea lapte în doze mici. Copiii mici să se ia des în brațe, însă bine înveliți, să nu se lase culcați mult timp, să li se schimbe des poziția; când sunt mai mari să stea în pat, în poziție șezândă, sprijiniți de perini. Picioarele să le fie bine învelite, în flanele sau vată. Pe piept să se pună cataplasme calde, de muștar, sau puțin înmuiate în oțet, sau cărpe reci pe piept, stoarse bine, băi căldute, ventuze uscate pe piept, inhalatțiuni de oxigen. La început este bine să se dea un vomitiv: ipeca 30 ctgr. până la 1

gr., sirop de ipeca 30 gr. In contra *căldurii*: antipirină sau chinină, băi calde de $32-35^{\circ}$ de mai multe ori pe zi, de câte 10—15 minute; în timpul băii cărpe reci la cap, printre băi cărpe reci pe piept, de jur împrejur, schimbate din sfert în sfert de oră, sau la jumătate de oră, sau la o oră. Dacă tot nu scade căldura se vor face băi reci de $28-25^{\circ}$, de câte 5—15 minute, din 2 în 2 ore. După bae se va șterge bine bolnavul, se va pune în pat fără să se acopere prea gros și va bea câte o cafea, sau un ciaiul cald. In loc de băi se pot întrebuința cearșafurile reci. Când pieptul este plin de flegmă pe care bolnavul nu o poate scuipa, se va da: ceaiul de poligala 200 gr. cu benzoat de sodă (1 gr.), kermes mineral (10 ctgr.), sirop tolutan (20 gr.); la ceas cu lingura. Când se ivește vreun *junghiu* se va aplica pe loc o vezicătoare. In convalescență se vor da tonice; preparate de fier, de arsenic, de chinină, untură de pește; ședere la țară.

Broncoscopie (gr. *bronchos*, bronchie și *scopein* a privi). — De multe ori suntem nevoiți să căutăm un corp străin, pe care l'a înghițit bolnavul, chiar în bronchie. Atunci introducem un aparat, cu o lampă, care luminează interiorul bronchiei și ne arată locul unde este rănită, sau unde este astupată de corpul strein.

Broncotomie (grec. *bronchos*, bronchie și *tomein*, a tăia). — Operația care constă în deschiderea unei bronchii, pentru a scoate un corpstrein, care s'a fixat în ea.

Brown-Séguard (Metoda lui). Tratamentul anumitor boli prin extracte de organe (V. *Opoterapie*). Brown-Séguard e primul care a inventat acest fel de tratament.

Brustur, *lapuc*, *lipan* (*Lappa major* sau *Arctium lappa*, fam. compozitelor). — Plantă erbacee, care crește pe marginea drumurilor, pe câmpuri, prin dărămături, pe lângă garduri. In medicină se întrebuințează rădăcinele, semințele și frunzele. Principiul activ o materie oleaginoasă, rezină, inulina. Proprietăți: depurativă, diuretică, sudorifică. Pe *dinăuntru* se dă sub formă de *praf*, 5—10 gr.; extract, 1—5 gr. In *poșor* se dă fiertura (decoctul) de

rădăcini, în contra cel-peritului (sifilis), ca depurativ (curăţitor de sânge) şi la boalele de piele. Rădăcina plămădită cu rachiuri de drojdii se bea pentru vătămături. Cu frunzele de brustur unse cu unt se oblojesc copiii după ce se scot din scăldătoare. Sămânţa pisată bine şi pusă în rachiuri de drojdii, sau în apă neînceptă, se bea în contra boşorogelii (erniei). Pentru *trântitură* se presară cu sare rădăcină de brustur amar şi se pune pe tălpi; după câteva zile se vindecă.

Bubă neagra. — V. *Pustulă malignă*.

Bubă rea. — V. *Pustulă malignă*.

Buba trântililor. — V. *Pelagră*.

Bubat. — V. *Variolă*.

Bube dulei. — V. *Eczemă*.

Bubolu. — V. *Furnicel*.

Bubon, buboane. — V. *Adenită*.

Bucătărie. — O bucătărie trebuie să fie curată, bine luminată, bine aerată şi destul de mare; numai în aceste împrejurări ea poate fi ținută în stare de curăţenie şi numai într-o astfel de bucătărie se pot găti bine şi curat mâncările. Pentru ca fumul dela cup-tor şi aburii să nu fie supărători, trebuie ca fiecare bucătărie să aibă o fereastră care să se deschidă în afară, în aer liber şi curat, să aibă un cuptor cu un coş care să funcţioneze bine şi să aibă un tiraj energetic şi sigur. Podeaua să fie de mozaic, sau ciment, sau de asfalt, pentru ca să se poată spăla într'una; de asemenea şi zidurile ar fi bine, cel puţin până la o înălţime oarecare, să fie căptuşite cu faianţă lustruită, care se spală cu uşurinţă. Vasele de lemn servesc numai la păstrarea mâncărilor uscate; vasele de sticlă, de faianţă, de porţelan, servesc pentru a mânca din ele; vasele de metal, însă nu trebuie să cuprindă *plumb* care este foarte periculos; vasele de aramă sunt bune numai dacă sunt smălţuite şi smălţul să fie des reînnoit, căci altfel mâncările preparate în ele sunt otrăvitoare. Vasele de fontă şi de fier bătut sunt bune, dar ele ruginesc de grabă şi dau mâncărilor un gust neplăcut, de aceea este bine ca şi acestea să fie smălţuite, iar smălţul să nu aibă plumb. Despre prepararea mâncărilor caută la: *Bulion, Ciorbe, Fripturi, Papă, Rasol, Supe, Zeamă de carne*, etc.

Budachi. — Staţiune climaterică şi balneară din Basarabia, jud. Cetatea Albă, pe malul lacului Budachi. Apa lacului conţine multă sare şi pucioasă. La 3 klm. distanţă, plajă frumoasă la mare. — Staţiunea aceasta se recomandă bolnavilor cu boli de plămâni, de piele, pentru bolile femeieşti, pentru scrofuloză, pentru anemici, limfatici, reumatici şi sifilitici.

Buduhală. — V. *Tusă convulsivă*.

Bugaz. — Staţiune balneară maritimă, în sudul Basarabiei, pe linia ferată Cetatea-Albă—Odesa, cu gară în localitate. La 5 klm. depărtare este comuna Şaba, bogată în vii. Climă dulce, ferită de ploi şi vânturi, aerul este bogat în ozon şi din acest motiv înviorător. Se pot face băi de mare, cură de soare şi de struguri. Sezonul durează uneori până toamna târziu. — Este indicat pentru tuberculoza osoasă, la anemici, scrofuloşi. — Copiii au mult folos, chiar sănătoşi fiind; după o cură de soare şi aer la Bugaz, pleacă mult învioraţi.

Bughea. — Comună în judeţul Muscel, la 3 kilometri de Câmpulung. Sunt 4 izvoare cu ape sulfuroase-ioduroase-fieruginoase alcaline. Localitate mai mult de vileagiatură şi de excursii pentru vizitatorii Câmpulungului, căci apele nu se mai exploatează.

Buhăiala, Buhav. — Când cineva se umflă la faţă şi la ochi (la pleoape), fără ca pielea să fie tare, roşie şi dureroasă, zicem că este *buhav*, sau *buhăit* la faţă, sau în termin medical că are *edem*. Uneori buhăiala aceasta se vede numai dimineţa, când se scoală omul şi după câteva ceasuri pier. Alteori însă ea se vede în tot timpul, în permanenţă. Când este trecătoare, adică se ieseşte numai odată, sau numai de câteva ori şi la intervale mari, nu este de temut, când însă buhăiala se vede în fiecare dimineţă şi se prelungeşte şi peste zi, aproape fără întrerupere, atunci ea este un semn rău, un semn de boală gravă: *anemie*, boală de *rinichi*, de *inimă*.

Buiguială. — V. *Delir*.

Bulmie. — V. *Apetit*.

Buline, capsule. — Bulinele sunt un fel de cutiute mici, făcute din pâine azimă (ostie), în cari se pun medicamentele cu gust amar şi neplăcut. Bu-

linul se înghețe cu apă, adică se pune într-o lingură cu apă, se înmoaie pe o parte și pe cealaltă, sau se pune așa uscat în gură, pe limbă și se bea în același timp apă. Mai sunt capsulele așa zise *gelatinoase*, a căror formă este olivară, sau ovoidă, în cari se pun medicamentele lichide, cari sunt greu de luat din cauza gustului lor.

Bulion, *zeamă de carne*. — Sub acest nume se înțelege orice lichid, care se obține fierbând în apă carne cu, sau fără, vegetale. Bulionul se face cu carne de vită, de găină, sau pui, de broască și broască țestoasă. Se mai face bulion și numai cu legume verzi. Dar în general, când zicem numai simplu *bulion*, înțelegem pe acel făcut din *carne de vacă*, cel mai întrebuițat și despre care ne vom ocupa în primul loc. — Când voim să avem un bulion bun, aromatic și succulent, cu gust plăcut, punem carnea la foc, în apă rece, care se încălzește până începe să fiarbă. Cea mai bună zeamă de carne se face în oală de pământ, care se încălzește mai încet și întreține o căldură egală. De obicei se pun cam 500 gr. de carne de vacă la o oală de apă rece, în care chiar dela început se pune puțină sare. Apa se încălzește încet și spuma care se ridică pe deasupra ei, se curăță cu o lingură. Această spumă se face din închiegarea albuminei din carne. La bulion se pot pune, pe lângă carne, și oase. Când nu se mai face spumă de loc se pun *legumele*, alese după gust și după anotimp, căci ele fac zeama de carne mai gustoasă. Pentru bolnavi nu vom pune în bulion decât pătrunjel, morcovi, țelină și ceapă. Dacă se pune ceapă *prăjită* se dă bulionului o culoare mai frumoasă, ceea ce se poate face și cu caramel (zahăr ars). Dacă ținem oala pe foc, la o temperatură potrivită, timp de 3 până la 4 ceasuri, avem un bulion bun și n'avem decât să-l mai curățim de grăsimea care se află la suprafață, care îl face indigest, adică greu de mistuit. Când punem carnea la foc, în *apă fierbinte* și n'o lăsăm să fiarbă mult, atunci avem un bulion mai sărac, dar în schimb un *rasol* mai hrănitor (v. *Rasol*). — Zeama de carne se strică ușor, se înăcrește, dacă o ținem prea mult, mai ales în timpul

verii, de aceea nu e bine să facem mai multă decât ne trebuie pentru o zi. Bulionul scoate din carne numai sărurile și grăsimea, iar principiile adevărat hrănitoare rămân în rasol, sau se pierd prin fierbere mai ales când aceasta a ținut prea mult. Bulionul simplu, sau cu pâine prăjită, ori cu tapioca, fidea, griș, orez, etc., luat la începutul mâncării, deșteaptă apetitul și face ca gura să se umple de salivă și stomacul de sucuri, cari înlesnesc mistuirea. De aceea este foarte bine să se păstreze bunul obicei de a lua la început puțin bulion, nu numai pentru oamenii sănătoși, dar mai ales pentru bolnavi și convalescenți. — Bulionul de *vițel* se face punând 125 gr. de carne la o oală de apă, la un foc potrivit și lăsăm să fiarbă 2 ceasuri; este mai subțire decât bulionul de vacă, răcoritor și laxativ. — Bulionul de *miel*, care la noi se cunoaște sub numele plăcut de *ciorbă de miel*, se curăță cam greu de grăsime și este hrănitor pentru că se mănâncă cu carne cu tot. — Bulionul, sau ciorba, de *găină*, sau de *pui*, constituie o bună hrană pentru bolnavi și convalescenți. — Bulionul de *broaște*, de *broaște țestoase*, de *melci*, cari la noi nu se mănâncă, se prepară astfel: se curăță animalul de măte, i se taie capul, iar la broasca țestoasă se ferestrește testul, la melc se îndepărtează căsuța, apoi se pun în apă rece și se fierb două ceasuri, la o căldură potrivită (nu prea mare). — Bulionul de *legume* sau *verdețuri*, este laxativ, adică ușurează eșirea afară. Se recomandă să se ia mai cu seamă după ce s'a luat un purgativ, pentru a-i completa efectul.

Bumbac. — V. *Vată* și *Veștiminte*.

Bunghișor, *ochiul boului*, *steluțe* (*Eriogon acris*, fam. compozitelor). — Plantă erbacee cu frunzele liniar-lanceolate, uneori acoperite cu peri aspri și cu florile roșietice, sau violete. Crește pe câmpuri, dealuri pustii și în munți, pe locurile sterpe. Se întrebuițează frunzele și vârfurile înflorite; oprește urdinarea (anti-



Fig. 66. Bunghișor

BURE

BUZE

diareic) și curgerea de sânge (antiemo-ragic). Se dă sub formă de ceaiu din 1—2 gr. la 100 de apă.

Burete. — V. *Spongie*.

Burete de iască. — V. *Babiță*.

Bureți. — V. *Ciuperici*.

Buric. — V. *Ombilic*.

Burtă. — V. *Abdomen*.

Buruiană Căinească. — V. *Trepăddtoare*.

Buruiană de-a-bubă. — V. *Păpălău*.

Burulană de ceas rău. — V. *Vetrice*.

Buruiană de dalac. — V. *Lăsnicior*.

Buruiană de făcut copii. — V. *Nemțșori*.

Buruiană de negel, buruiană măgărească. — V. *Laptele câinelui*.

Buruiană de spulburături. — V. *Dumbăt*.

Bușteni. — Stațiune climaterică de munte, reputată pentru clima ei minunată. Buștenii se găsesc pe valea încântătoare a Prahovei, la poalele munților legendari Caraimanul, Omul și Gepii. Stațiune de cale ferată la o depărtare de 8 kilometri de Sinaia. Regiunea Buștenilor este din cele mai pitorești, ascunsă într-o poiană deasupra căreia se ridică întinsele păduri de brazi ale Carpaților. Înălțimea acestei stațiuni este de 800 m. deasupra nivelului Mării-Negre. Clima e dulce și statornică mult mai plăcută ca la Sinaia, localitatea fiind scutită de vânturi și de curenți. Această stațiune este bună pentru anemici, surmenați, convalescenți, neurastenici, ofticoși în gradul întâiu (la începutul boalei). Imprejurimile sunt minunate și se pot face excursiuni plăcute.

Buză de iepure. — Este un vițiu de conformație a buzei de sus sau de jos, care este crăpată, sau despicată. De obicei se vede la buza de sus, care este despicată la stânga liniei mijlocii, când se zice *simplă* sau unilaterală. Alteori despicătura buzei este însoțită și de aceea a cerului gurii (gură de lup). Foarte rar se întâmplă ca buza să fie despicată în amândouă părțile liniei mijlocii și atunci avem buză de iepure *dublă*. Se poate ca



Fig. 67.—Buză de iepure

uneori să fie despicată buza de jos și atunci despicătura este întotdeauna la mijloc. Buza de iepure este din naștere și se observă mai ales la copiii eșii din părinții alcoolici (bețivi). S'a văzut uneori producându-se în urma unei răniri, atunci când rana n'a fost cusută. Pentru a scăpa de aceasta infirmitate nu este decât un mijloc, *operația*, pe care numai chirurgical o poate face.

Buzăret. — V. *Pelagră*.

Buze (lat. *labrium labrum*, grec. *cheilos*). Buzele mărginesc deschizătura de dinainte a cavității bucale, deschizătură care se numește *gură*. Ele se împreună la extremitățile lor formând *comisurile*, colțurile sau unghiurile gurii. Buzele au o margine liberă și alta aderentă; aceasta se continuă cu baza nasului pentru buza de sus (*superioară*), pe câtă vreme ea este separată de menton prin șanțul mento-labial pentru buza de jos (*inferioară*). Grosimea buzelor variază după rasele omenești (groase și răsfărânte înafară la negrii) și după constituțiunea fiecăruia. Astfel la cei predispuși la scrofule buza de jos este mai groasă și mai supusă la crăpături. Buzele sunt compuse din mușchi, ceea ce le permite să se miște cu ușurință, înainte și înapoi; ele sunt căptușite înafară de piele, care la bărbați este acoperită de păr, iar pe dinăuntru de mucoasă, adică de o piele umedă, care se continuă cu gingiile și care este roșietică la cei sănătoși și palidă (alburie) la cei ce sufăr de lipsă de sânge (anemie). Buzele servesc la vorbire și masticățiune; ele opresc saliva, așa de folositoare la mistuire de a nu curge din gură și mulțumită lor mâncările sunt ținute în gură până ce sunt măcinate și înmuiate bine în salivă, iar lichidele sunt supte și înghițite. Dacă n'ar fi buzele n'am putea pronunța consonantele *b, f, m, p, v*. — Când buzele sunt *paralizate*, după cum se întâmplă în urma congestiunii, sau emoragiei cerebrale, precum și în înmuiera creierilor, atunci saliva, lichidele și mâncările curg necontenit din gură și omul se hrănește și mistue foarte greu, așa că de multe ori trebuie să recurgem la alimentațiunea artificială. Buzele, pe lângă

carne, au multe vase, artere și vâne, din care pricină ori ce rănire sângerează. În *întepături* sângerează mai puțin și vindecarea se face repede; în *tăieturi* sângele de multe ori curge în cantitate foarte mare, așa că, pentru a opri sângele trebuie să strângem buza între degete și să facem o legătură strânsă, sau mai bine, când rana este întinsă, să se coase prin câteva puncte cu ață de mătasă, legată potrivit de strâns. Multe persoane sufăr de *crăpături* și de *beșicuțe* (erpes), pentru cari cel mai bun lucru este să se ungă cu vaselină sau glicerină și să nu se spele buzele cu apă rece. Uneori se pot ivi *furmicele* și chiar *antrax*, cari sunt foarte dureroase și prin necăutare pot da naștere la complicații grave, din partea ochilor și a creierilor; pentru a preîntâmpina toate acestea trebuie chemat din vreme un doctor. O boală cumplită se ivește la buze, mai ales la buza de jos și la oamenii mai în vârstă, ea se numește *cancer* sau *rac*. Această boală se arată mai ales la fumători, la cari buza se irită mereu de tutun și pentru a scăpa de ea trebuie să se facă operație de timpuriu, adică să se taie adânc tot racul

până în părțile sănătoase și apoi să se refacă buza cu ajutorul părților moi din jur, operațiune care se numește *cheiloplastie*.

Buziaș. — Băi mult căutate, în județul Timiș, la o depărtare, cu trenul, de 1½ ore de Timișoara și 1 oră de Lugoj, așezate pe liniile Timișoara-Buziaș și Lugoj-Vârșeț. Clima constantă, temperatura de peste zi ne fiind prea diferită de a nopții. Izvoarele unde se fac băi sunt chiar în frumosul parc de brazi și tei. Are izvoare bogate în acid carbonic, fier, clorur de sodiu. Se pot face băi calde și reci, băi de nomol fieruginos, se găsesc ape minerale de băut, radioactive, cum e cea din izvorul sf. Anton, bogată în clorur de sodiu și acid carbonic și izvorul Phoenix, bogată în acid carbonic și plăcută la gust. Apele dela Buziaș sunt indicate în bolile de inimă, de rinichi, boli de stomac, reumatism, boli de femei. Sezonul ține dela Maiu până la sfârșitul lui Octombrie uneori. Multă lume vine la Buziaș să se recreeze, chiar dacă n'are nevoie de băi, pentru că este o regiune frumoasă, traiul efitin, case destul de confortabile, lumină electrică, restaurante bune.

C

Cacadâr, cacașder. — V. *Trandafiri*.

Cacao. — Se numește astfel fructul unui arbore numit *Theobroma cacao*, din familia butneriaceelor, originar din Peru, Mexic și Antile, cultivat astăzi în toate țările calde. Acest fruct are mărimea și forma unui sămbure de olivă, are un gust amar, miros slab și la pipăire este unsuros. Sub formă de praf se întrebuițează ca aliment, sub formă de ceaiu, sau și mai bine amestecat cu lapte dulce și îndulcit cu zahăr, sau cu miere de stup. Din fruct se scoate *butirul* sau untul de cacao, care se întrebuițează așa de mult la facerea supozitoarelor. Din cacao se prepară mult gustată *ciocolată*. Alcaloidul care se extrage din cacao se numește *Teobromină*.

Cacao (Unt de). — V. *Unt*.

Cachexie (dela grec. *kakos*, rău, și *hexis*, dispoziție, citește cașexie). — Prin acest nume se înțelege o turbu-

rare adâncă a sănătății, care se arată printr'o slăbire din ce în ce mai mare, o micșorare înceată și neconținută a puterii, buhăiala feței, umflătura mâinilor și a picioarelor, gâlbejala obrazilor, sărăcirea sângelui și lăncetizarea tuturor funcțiunilor. Când această stare de cachexie se vede la sfârșitul unei boale lungi, atunci când începe convalescența, ea se vindecă. Dacă se ivește la sfârșitul unei boale, cum sunt: cancerul, oftica, atunci nu numai că nu se vindecă, dar prevestește un sfârșit apropiat al bolnavului. Cauzele cachexiei fiind variabile și tratamentul ei va fi variabil și se va adresa la cauză. În cachexia venită în urma unor boale lungi, la începutul convalescenței, se va prescrie bolnavului șederea în aer curat, la soare. O hrană bună și întăritoare, vinuri vechi, chinchina, amare, etc. Când este rezultatul unor boale ca scrobutul,

CĂCI

frigurile palustre, neurastenia, alcoolismul, boalele sifilitice, tratamentul va fi cel arătat la acele boale. **Cachexie pachidermică.** — V. *Mixedem*.

Căciulă, cușmă. — În timpul iernii cea mai bună îmbrăcăminte pentru cap este căciula, care la orașe este făcută din tot felul de blăni, unele mai scumpe de cât altele și a cărei formă variază după gustul fiecăruia și după capriciul, de multe ori ciudat, al modei. Forma căciulii nu este tocmai potrivită cu scopul ei căci ea nu apără bine fața, urechile și ceafa, iar când o tragem peste urechi ne acopere și ochii. Purtarea căciulei în timpul verii este de multe ori periculoasă, pentru că sângele se urcă la cap producând amețeală, durere de cap, insolație. Pentru toate aceste neajunsuri este bine ca să poarte, în timpurile călduroase, *pălărie* și în timpul verii *pălărie* de paie, mai ales când este ocupat la muncă, sub arșița soarelui.

Căciulata. — V. *Călimănești*.

Cacodilie. — (Acid). — Medicament care cuprinde *arsenic* (vezi acest cuvânt), asociat cu alcool, din care cauză se mai zice și *arsenic organic*. — *Cacodilatul de sodă* se întrebuintează în stările de anemie și cachexie, în doză de 2—5 ctgr. pe zi, sub formă de granule, de injecțiuni sub piele și în clizme, în timp de 8 zile, alternând cu 8 zile de odihnă. În boalele de piele se dă în doze mai mari. — *Cacodilat de fier* (v. *Fier*).

Căderea părului. — V. *Alopecie, Chelie și Păr*.

Cadin (Ulei). — Se extrage din ienupăr, al cărui lemn se arde într'un cuptor fără curent de aer. Acest ulei are un gust acru, aproape arzător, un miros de rășină, cam urât. Se întrebuintează cu succes în multe boale de piele (exemă, psoriază, peladă). Se aplică curat, sau amestecat cu glicerină, unt de migdale dulci, sau untură de porc, în proporție de 1—15 gr. la 30 gr. Pe *dinăuntru* se dă dela câteva picături până la 1 sau 2 gr.

Caecum, sau Cecul (lat. *coecus* orb). — Este prima parte a intestinului gros, așezat în fosa iliacă dreaptă. Jos se prelungește prin *apendice*, sus cu colonul ascendent, fără o limită precisă de demarcație. Intestinul sub-

CAFE

țire (ileonul) se îmbucă în unghiul drept cu caecum, în așa fel că formează o valvulă numită ileocecală. Intre bobile cele mai de seamă ale acestei porțiuni din intestin găsim: *volvulus*, sau sucirea cecului (încurcătură de mată), în care caz trebuie să operăm imediat




Fig. 68. — Caecum

pe bolnav, *tuberculoza*, *tiflita* (care duce de multe ori la perforație) și *cancerul*. Această din urmă boală se găsește în 24% din cazuri și, dacă n'a fost operat la timp, duce la moarte într'un timp mai scurt decât dacă ar fi localizat la alt organ.

Cafea. — Este o băutură foarte răspândită pe suprafața pământului și mai ales la noi. Sub numele de *cafea* se înțeleg semințele unui arbust frumos, numit *Coffea arabica*, din familia rubiaceelor, care crește în Abisinia, Mozambic și în Angola. Astăzi se cultivă foarte mult în țările călduroase și mai cu seamă în Brazilia. În comerț se cunosc mai multe feluri de cafea: *Martinica*, *Moca*, *Rio*, etc. Fructul sau boabele de cafea se prădesc, se macină mărunț și apoi se prepară mult gustată băutură. Într'un ibric, în care apa fierbe în clocote, se pune cantitatea trebuincioasă de cafea și zahăr, se amestecă de 2—3 ori, se culege caimacul, pe urmă se toarnă în ceașcă și cafeaua este gata... Ea conține un alcaloid numit *cafeină* și un ulei închis, cunoscut sub numele de *cafeon*, care dă cafelei aroma sa plăcută. În comerț de multe ori



Fig. 69. — Cafea

se vinde cafea stricată, se strică (la umezeală, când este adusă pe vapoare, dacă nu se iau oarecari măsuri); se falsifică de multe ori. De aceea este bine să cumpărăm întotdeauna cafeaua verde, crudă, care nu se poate falsifica, s'o prăjim acasă și s'o măcinăm pe măsura în care o întrebuințăm. Cafeaua prăjită și măcinată se falsifică cu făină de grâu și de mazăre, cu feculă de cartofi, praf de ghindă, cu drojdii de cafea, cari au servit odată, dar mai cu seamă cu *cicoare*, care se vinde în cantități enorme pe fiecare an, anume pentru acest scop, mai ales în Germania, unde se întrebuințează la cafeaua cu lapte. Pentru ca să ne convingem dacă cea care am cumpărat-o este adevărată, n'avem decât să aruncăm într'un pahar cu apă puțină cafea și dacă înoată pe deasupra, mai mult timp, dacă se înmoaie de apă pe încetul și dacă în căderea spre fund vâpșește apa în gălbui, atunci este bună, dacă, dimpotrivă, ea cade repede la fund și vâpșește apa în negru, atunci e falsificată. Cafeaua, pe lângă gustul său plăcut, are multe însușiri. Ea face ca simțurile noastre să fie mai pătrunzătoare, imaginația mai vie, mintea mai luminată, memoria mai puternică, ideile mai bogate și o simțire generală de bine. Afară de intelect cafeaua înțețește energia fizică, mărește puterile, constituind astfel o adevărată hrană, fără ca ea, prin această excitație, să aducă vre-o molesire primejdioasă, cum se întâmplă cu alcoolul. Cafeaua se poate întrebuința cu folos de toți acei cari trebuie să muncească cu mintea și cu corpul, mai mult ca de obicei, de cei supuși la durere de cap (migrenă). Cafeaua împiedecă somnul, din care pricină este foarte bună în otrăvirile cu *opiu* și preparatele lui, în otrăvirile cu plantele veninoase din familia solanelor (Tutun, Mătrăgună, Mă-sălarită, etc.). Cafeaua neagră se mai întrebuințează pentru a masca gustul unor medicamente amare, sau grețose, precum sunt: chinina, sulfatul de magnezie, uleiul de ricin, etc. După mâncare, înlesnește mistuirea și se recomandă la cei ce suferă de greutate la stomac, după ce au mâncat. Excită, sau înțețește toate funcțiunile,

prin urmare face rău la cei ce sunt nervoși, la cei ce suferă de gastralgie, adică durere trecătoare de stomac, însoțită de arsuri, la toți copiii, fără deosebire și la multe femei tinere, cu sistemul nervos prea iritabil. Luată în cantitate mare și des slăbește nervii, aducând tot felul de turburări unele mai supărătoare decât altele; odată învățat cu ea, n'o mai poți lăsa decât cu mare greutate și având dureri de cap, indigestii și un fel de slăbiciune intelectuală. De aceea cel mai înțelept lucru este să nu te obișnuiești cu cafea, s'o bei rar și cel mult odată pe zi, de preferință numai o cafea după dejun. În medicină se administrează sub formă de infuzie, decoctiune și sirop. — Cafeaua cu lapte este o hrană bună și nutritivă, cu condiția ca atât laptele cât și cafeaua să fie de bună calitate și să nu se bea în cantitate prea mare odată, ceea ce ar obosi și ar întinde stomacul. Este bine să se ia cafeaua cu lapte în totdeauna cu ceva, fie cu pâine prăjită, sau cu un corn, ori covrig, și să nu ieșim nici odată dimineața din casă cu stomacul gol, fiind mai expus la boale pe nemân-cate.

Cafeină. — Alcoloidul cafelei, al cărei principiu activ este. Lucrează ca diuretică, antinevralgică și antiastmatică (bună la tusa măgărească); mai este și tonică excitantă. Se întrebuințează singură, sau sub formă de sare: bromidrat, citrat, valerianat de cafeină, 25 ctgr. până la 2 gr. pe zi în buline, în poțiuni, în pilule, sau în injecții sub piele (asociată atunci în părți egale cu benzoat de sodă).

Cafeism (la fel și teism). — O serie de accidente datorite abuzului de cafea (și ceai) și cari se traduc astfel: In forma *acută*: excitație cerebrală, palpitații, urinare frecventă, insomnie, tremurături, greață. In forma *cronică*: Scăderea poftei de mâncare, turburări stomacale, digestie anevoioasă, somn întrerupt de vise urâte, exaltarea sensibilității, furnicături, excitație cerebrală însoțită de lene, neurastenii, tremurături mai ales ale mâinilor și limbei, crampe la picioare, dureri de cap, slăbire sexuală, anemie pronunțată. *Tratament*: Provocăm vărsături, dăm alcool, șampanie, facem fricțiuni

pe tot corpul, masaj, injecție de 1 cgr. de morfină.

Cal. — În străinătate se mănâncă și carnea de cal, mai ales de către oamenii săraci, de oarece este cu mult mai efțină decât cea de vacă. La noi, până acum, lumea n'a început s'o mănânce, deși această carne este sănătoasă, nutritivă și ușor de mistuit. Supa, rasolul și friptura, sunt gustate tot așa ca și preparațiile făcute din carnea de vacă, cu condiția însă ca animalul să nu fie istovit de bătrânețe și de boală, nici de muncă, după cum se întâmplă de obicei, căci, din nenorocire, nimeni nu trimite calul la abator decât atunci când nu se mai poate ține pe picioare. În acest caz, carnea de cal este tare, nu așa de gustoasă și mai greu de mistuit. Din această pricină ea este mai efțină decât carnea de vacă și în orașele mari, din apusul Europei, constituie pentru populația săracă o hrană destul de bună, mai bună de cât hrana compusă numai din pâine, supe și legume.

Calăican. — V. *Cupru*.

Călărie. — V. *Echietațiune*.

Călătorie. — Pentru un om sănătos nimic nu poate fi mai instructiv, mai plăcut și mai igienic, decât o călătorie, făcută în condiții bune, adică să aibă omul tot ce-i trebuie și să nu se obosească prea mult. Călătoria este bună și ca tratament în unele boale, mai ales în cele cronice. Nu înțelegem aci călătoria pe care o face un bolnav mergând la una din stațiunile balneare, unde are să petreacă puțin timp. Vrem să vorbim de acele călătorii pe cari le fac unii bolnavi, mergând dintr'o țară într'alta și cari călătorii lucrează prin schimbarea neconținută a aerului, prin exercițiul fizic pe care îl face omul, precum și prin distracțiile pe cari i-le procură. Acestea sunt călătoriile propriu zise, cari au o influență favorabilă asupra unor boale nervoase, caracterizate prin turburări ale inteligenței, cu formă tristă și liniștită, cum sunt melancolia și ipocondria, precum și asupra anemiei și clorozei, asupra boalelor cronice de ficat, de stomac, și intestine. În oftică și celelalte boale cronice de plămâni, la cari aerul uscat face rău, se recomandă călătoriile pe mare, cari

sunt foarte bune și la mulți fac să înceteze scuiparea de sânge, să se împuțineze tusa și flegma, să se întrezeze în mod neașteptat. Dar nu trebuie să se piardă din vedere că toate aceste călătorii trebuiesc făcute după arătarile doctorului, care singur este în stare să aleagă locul, climatul, anotimpul, precum și durata călătoriei.

Călcăiu. — Se numește astfel partea dinapoi a piciorului, formată de osul *calcaneum* și de care se prinde *tendonul* lui *Achile*. (v. *Picior*).

Calce (Calciu). — Este un alcali care, combinat cu diferite acide (carbonic, fosforic, sulfuric), se găsește în abundență în coaja pământului, în apele cari străbat unele terenuri, în oasele omului și ale animalelor superioare, în scoicile animalelor inferioare, etc. Când calcea este lipsită de apă se numește *calce comună*, sau *oxid de calciu impur*, sau *var nestâns*, care arde și se întrebuințează numai pe dinafară, și nici atunci nu se aplică singură, căci manipularea ei este așa de primejdioasă încât numai doctorul trebuie să umble cu ea. Din această pricină nu trebuie să ne încredem în preparatele epilatoare (cari fac să cadă părul) făcute cu var nestâns (vezi *Epilație*). Dacă se toarnă pe var nestâns apă, picătură cu picătură, amestecul acesta se încălzește până la 300°, se crapă, se înalbește și se prefăce în praf, care este *varul stâns* (idrat de calce, calce idratată) și care nu se întrebuințează în medicină. *Apa de var* însă are multe întrebuințări și ea se prepară astfel: se pune într'un vas mare o parte de calce și 40 de părți de apă, se lasă să se depună, se decantează, adică se scurge apa lăsând numai stratul de pe fundul vasului, peste care se toarnă apoi apă destilată, de o sută de ori atâtea grame câte cântărește acel strat. Se agită (se bate) din timp în timp, apoi se lasă liniștit și apa care se scurge acum este adevărata *apă de var*, care se întrebuințează în medicină. Această apă de var se dă pe *dinăuntru* 1 până la 3 linguri pe zi, în lapte, sau într'o beurtură gumeasă, la copiii cari sufăr de urdinare, sau de vărsături, la adulți cari mistue greu (dispepsie), cari au acreli la stomac și la toți acei al căror

stomac și mațe dau afară mâncările nemestuite. Pe *dinafară* apa de var se întrebuițează în spălături, la eczemă și pentru a lega rănille. Ea face parte din *linimentul oleo-calcăr* (apă de var și unt de lemn), care este foarte bun de pus la arsuri, sub formă de cârpe înmuiate. — Cele mai de căpătenie săruri, formate din combinația calcei cu acizii, sunt: *Carbonatul de calce*, cretă, tibișir, marmură albă), care este foarte răspândit în natură și care se întrebuițează în medicină, în acriile stomacului și în otrăvirile cu acide, în doze de 2,8 și 15 gr. după vârsta bolnavului. — *Clorurul sau ipocloritul de calce*, este o sare gălbuie, cu miros iute de clor, care se întrebuițează im-prăștiindu-se în abundență prin latrină (privăți) și urinarele de prin orașe, ca dezinfectant. Se mai spală cu el, topit în apă (5—10 gr. la 100 apă), obiectele cu cari s'au servit bolnavii. — *Fosfatul de calce*, care se află în oase, în dinți, în unghii, în păr, în sângele omului și animalelor, se dă ca întăritor, reconstituant, în *rachitism*, în *înmuierea oaselor*, precum și în *oftică*, 1—5 gr. pe zi, într'o lingură de apă, sau de lapte. Tot astfel lucrează și se dau: *lactofosfatul de calce*, *glicerofosfatul de calce*, în buline sau în sirop: 10—50 ctgr. până la 1 gr. din glicerofosfat (care este cel mai întrebuițat), 50 ctgr. până la 5 gr., din celelalte. — *Sulfatul de calce* (ghips) prezintă un interes igienic, întru cât el poate să se găsească în apa de băut, care se zice atunci *selenitoasă* sau văroasă și are un gust neplăcut, fad, cade greu la stomac, fierbe rău legumele și nu topește bine săpunul (vezi *Apă*). În medicină nu se întrebuițează decât numai la facerea bandajelor, în cazurile de rupturi (fracturi, frânturi) de oase.

Calcigenolul. — Este un preparat de calciu care se dă în toate cazurile în cari este nevoie de întărirea scheletului, femeilor gravide, celor cari alăptează, rachiticilor, celor cari au hemoptizii, în debilitate și în orice stare a organismului în care este nevoie să dăm bolnavului calciu. Forma de calcigenol numită *iradiată*, este necesară ori de câte ori este nevoie să-i dăm bolnavului, pe lângă calciu, și vitamine.

Este un medicament bun la gust, în special pentru copii și se dă: câte o linguriță de 3 ori pe zi sugacilor, câte o lingură de desert, înaintea celor 3 mese principale copiilor mai mărișori și câte 3 linguri de supă pe zi adulților.

Calce mare. — V. *Rostopască*.

Calculi. — Prin acest nume se înțeleg niște concrețiuni pietroase, sau *pietricele*, de mărime, de formă, de culoare și de tărie variabilă, cari se formează, în mod accidental, într'un loc oarecare al corpului nostru, mai cu seamă în canalele și rezervoriile prin cari trece fierrea și urina, adică ficatul, rinichii și beșica. Astfel avem calculi *biliari* și calculi *urinari*. Afară de aceștia mai sunt acei cari se formează în canalul și glandele salivare (în gură), calculi *salivari*, în vecinătatea încheieturilor, *calculi uratici la gutoși*, în *intestine*, în *prostată*. — Calculii *biliari*, sau ai *ficatului*, se văd mai adese ori la femei decât la bărbați. Uneori ei nu produc nicio durere, sau prea puțină supărare. Aceste pietricele se pot simți câte odată când pipăim pânțele, sub coastele din dreapta spre buric, în dreptul beșicii fierei. Când aceste pietricele pleacă din beșică, duse de fiere, spre mațe prin canalele prin care trece fierrea, ele produc dureri cumplite, cunoscute sub numele de *colici de ficat*, sau *epatice* (v. *Epatic*). — Calculii *urinari* se văd mai întotdeauna la bărbați. Se pot ivi la orice vârstă, dar mai des la copii și la bătrâni. Adeseori se formează mai mult la cei ce duc o viață sedentară, de odihnă și se hrănesc prea bine și mai mult de cât trebuie. Calculii de *rinichi* produc, când trec din rinichi spre beșică, dureri groaznice, numite *colici de rinichi*, sau *nefritice*. Când stau numai în rinichi, de multe ori, nu produc dureri, ci numai o greutate și o supărare în regiunea rinichiului. — Calculii *beșicii* pot să se formeze din pietricele formate în rinichi și aduse în beșică de către urină, sau se pot forma dela început în beșică. Dacă se unesc mai mulți calculi între ei și formează ceea ce se numește *piatră*. Calculii, sau pietricelele, se compun mai cu seamă din corpi acizi, prin urmare toți cei ce sunt amenințați de

această boală trebuie să combată aciditatea sângelui lor, luând *alcaline* în fiecare zi și timp îndelungat; vor lua *bicarbonat de sodă*, în natură și mai ales vor lua *Apă de Căciulata*, care este superioară tuturor apelor minerale străine. Este mai bine ca aceste ape să fie luate la izvor și numai la nevoie să se ia acasă în sticle. Afară de aceasta trebuie urmat un regim deosebit: sunt oprite mâncările grase, zaharate, iuți (piperate și ardeiate),



Fig. 70. — Calcul biliar

sau acide (măcriș, coacăze, etc.) și băuturile alcoolice. Vin puțin, cu apă și bere se poate bea. Se recomandă mult exercițiu, mișcare, plimbare, afară de călărit, care este primejdios pentru cei ce poartă în ei pietricele. Calculii mari, sau pietrele, trebuiesc scoase prin *operație*, căci ele nu se pot sfărâma prin medicamente.

Căldură (lat. *calor*, gr. *thermi*). — Căldura este un agent fizic, care dă organelor noastre (prin nervii senzitivi), simțirea de frig, sau de cald, după puterea ei. Lucrează asupra corpurilor materiale, în general, prin turburări mai mult sau mai puțin adânci în însușirile lor: schimbări de volum, schimbări de stare (trecere din stare solidă în stare lichidă, din stare lichidă în stare gazoasă, etc.). Căldura se duce dela un corp la altul, sau prin atingere, contact (*fenomene de conductibilitate*), sau la depărtare, distanță (*radiare*). Ea se iradiază ca și lumina. Căldura *naturală*, a aerului care ne înconjură, vine dela soare, care varsă pe fiecare an asupra pământului o cantitate așa de mare, în cât

s'ar putea topi un strat de gheață, care ar avea o grosime de 30 metri și ar înveli pământul întreg. Afară de aceasta globul terestru are o căldură interioară (*căldura centrală*), care este cu atât mai mare, cu cât ne scoborâm mai mult spre sânu pământului; ea crește cam cu 1° la 30 de metri. Omul are și el căldură proprie *căldura animală*, care variază după vârstă, sex, constituție, între $36^{\circ}5$ și $37^{\circ}5$, în stare de sănătate și care, în stare de boală, se urcă mai sus, crește (vezi *Temperatură*). Rar se întâmplă ca corpul omului să aibă aceeași căldură ca și aerul atmosferic; el se luptă neconținut cu mediul în care trăește și, mulțumită căldurii pe care o produce, el își poate păstra în tot timpul o temperatură constantă, cu toate încercările ce fac lucrurile din afară, de a-i lua sau a-i da căldură. Animalele cu sânge *rece*, cari n'au căldură proprie, își schimbă temperatura corpului după aceea în care trăesc. Căldura proprie a omului, căldura animală, nu este întotdeauna îndestulătoare pentru a lupta cu *frigul*, de aceea omul caută să profite de împrăștierea, sau iradierea căldurii de către sobe, cuptoare, sau alte aparate de încălzire, iar afară se îmbracă iarna cu haine groase de lână, de blănuri, cari, fiind rău conducătoare de căldură, împiedecă corpul de a-și pierde din căldura animală și de a se răci în atingere cu aerul atmosferic. Asupra lucrurilor neînsuflețite căldura are o mare putere, le mărește volumul, le *dilată*. Tot așa lucrează și asupra corpului nostru care n'ar putea să treacă repede, în mod brusc, fără primejdie, dela o căldură mijlocie la alta mare, care i-ar produce modificări mai mult sau mai puțin serioase. În adevăr, căldura lărgeste (dilată) toate părțile organismului nostru, în deosebi inima și arterele și vinele în cari circulă sângele. De aci rezultă o stare zisă *pletorică*, ce se arată printr'o greutate în respirație, bătăe mai mare de inimă (palpitații), durere mare de cap, cu amețeli și care poate sfârși printr'o congestie cerebrală (îngrămădire de sânge la creier). Când lucrurile nu merg așa departe omul, se poate alege cu un fel de stare de moleșală generală,

fără apetit, cu mistuirea grea și pierderea puterilor, ceea ce îl împiedică dela lucrările fizice și intelectuale. Lucrul acesta se observă în timpul verii, în luna lui cuptor mai ales, și atunci trebuie să ne păzim de a bea lucruri prea reci și în cantitate mare, ceea ce ar face să nădușim prea mult și ne-ar slăbi. Trebuie să ne susținem puterile cu mâncări întăritoare, sub volum mic (ouă, lapte, brânză, carne) să nu ne lăcomim la fructe crude, acide, să ne plimbăm dimineața și seara, să facem câte o baie rece, sau dușuri reci, să ne culcăm în odă bine aerată. Căldura mare poate produce accidente subite, grave și chiar mortale cunoscute în popor sub numele de *soare sec*, sau *insolație* (vezi acest cuvânt). Boalele, cari de obicei se cred a fi produse de căldură, se datoresc mai mult la abaterile dela regim. De altfel boalele în timpul căldurilor mari au o gravitate mai mare, cum este diareia la copii, frigurile, boalele de ficat, etc. O recomandatie bună pentru cei ce pot este ca în timpul verii să meargă la țară, sau la munte, iar cei săraci, sau cari nu pot părăsi orașul, trebuie să nu se dea pradă căldurii, urmând sfaturile de mai sus. Căldura prea mare a camerilor, în timpul iernii, nu este bună și trebuie să facem ca în casă să avem o temperatură potrivită, normală (v. *Temperatură*). — În medicina căldura are mai multe întrebunătăți: 1^o. Ca liniștitoare, sau domolitoare de dureri, *calmantă*, cu ajutorul sticlelor, sau termofoarelor pline cu apă caldă, cărămizi calde, flanele și șervete calde, în contra durerilor de stomac, de mațe, la period, etc. 2^o. Ca *digestivă* se recomandă băuturi, sau ciaiuri calde, la *dispepsie* (mistuire grea). 3^o. Contra curgerii de sânge, *contra emoragiei*, se recomandă clizmele de apă caldă de 45—50^o, în scui-pările de sânge, în curgerea de sânge din nas, iar pentru curgerile de sânge din mîtră injecțiunile vaginale cu apă fierbinte. 4^o. Ca *rezolutivă*, *anticongestivă*, în aprinderile de beșică, de mîtră, de prostată, sub formă de clizme calde. 5^o. Ca *aseptică*, apă fiartă, la pansamente.

Căldură. — V. *Febră*.

Călimănești-Căciulata. — Stațiune

balneară, situată în județul Râmnicul-Vâlcei, pe malul drept al Oltului, la poalele muntelui Pisolea și la o depărtare de 18 Km. de orașul Râmnicul-Vâlcei. Localitate pitorească, la 280 metri deasupra nivelului Mării-Negre, înconjurată de munți stâncoși și păduroși, de păduri întinse, până pe vârfurile munților, de împrejurimi frumoase și de locuri istorice. În fața Călimăneștilor, Oltul se desface în două brațe, formând un *ostrov* cu o pădure deasă și în mijlocul căruia stă ascuns un schit ridicat de Neagoe Basarab. Satul Călimănești, la începutul căruia se găsește stațiunea balneară, e un sat frumos. Clima este dulce și constantă. Apele acestei stațiuni sunt *cloruro-sodice-sulfuroase* și se întrebuintează în băi, dar reputația acestei stațiuni se datorește mai cu seamă isvorului miraculos dela *Căciulata*, ce se găsește în vecinătatea Călimăneștilor, la o depărtare de 15 minute. Aici se deschide un platou frumos, înconjurat de coline și păduri, printre cari se scurge repede la vale pârâiașul Căciulata, pentru a se vărsa în Olt. În vecinătatea acestui loc se găsește isvorul cu minunata *Apă de Căciulata*. Isvorul este captat și deasupra lui se ridică un frumos pavilion de cură. În mijlocul stațiunii se află un hotel mare, stil modern, cu tot confortul, cu stabiliment de băi calde și reci, un parc deschis, așternut dinaintea hotelului, care dă acestei stațiuni balneare și climaterice o înfățișare admirabilă. *Apele dela Călimănești* se întrebuintează în băi, în boalele reumatice, în boalele de femei, de piele, scrofuloză, artrism. *Apa din spatele stabilimentului* și din vecinătatea lui se bea; 1—2 pahare provoacă ușoară purgație; ea este laxativă și derivativă. *Apa de Căciulata* este foarte bună în boalele de beșică, de rinichi, de ficat de piele, artrism, reumatism, dar mai cu seamă în boalele de rinichi și de beșică, la cei ce sufer de *pietricile și nisip*, care se elimină cu mare ușurință.

Calmante. — Medicamentele cari domolesc, sau fac să înceteze durerea, precum și acelea cari micșorează aprinderea (inflamația), sau cari liniștesc nervii, se chiamă *calmante*

CALM

CALO

sau *sedative*. Intre cele cari domolesc durerea avem în locul întâiu *capetele de mac*, din cari se scoate *afionul* (opiu). Le fierbem în apă și această fiertură se poate bea, se poate pune în clizme, în fumuri (fumigații), sau se pot face cu ea diferite cataplasme. — Tot așa este și cu *rădăcina de nalbă mare*, care adeseori se întovărășește cu macul și se întrebuintează sub aceleași forme (v. *Mac* și *Nalbă-mare*. — Cataplasmele de *făină de in* micșorează durerea, prin înmoiera și relaxarea țesuturilor pe cari se aplică (vezi *Cataplasme*). — *Uleiul de mușetel* și *uleiul camforat* sunt bune pentru a face fricțiuni pe părțile dureroase. — *Afionul* este cel mai bun pentru a liniști o durere, dar trebuie să fim cu mare băgare de seamă când îl întrebuintăm, fiind primejdios. El se întrebuintează mult sub formă de *laudan*, picături ușor de luat în puțină apă, 5—10 picături odată, sau se pot pune aceste picături într'o clizmă, ori se pot turna pe o cataplasma, dar în nici un caz nu se va da la copiii mici, pentru cari este foarte primejdios (v. *Laudan*). *Apa curată*, pusă neconținut pe un loc dureros, este bună de multe ori, nu se va pune însă apă rece la cei ce suferă de reumatism, sau cari tușesc. — Când voim să liniștim nervii (o excitație generală) vom da *apă de flori de portocale*, în care mai putem pune și puțină apă îndulcită cu zahăr, sau vom da *ceai de tei*, ori *foi de portocale*, sau *eter ori camfor*, cari sunt foarte bune calmante de nervi.

Calmette (*Serul lui*). — Este un ser preparat de Institutul Pasteur, din Lille, din serul de cal imunizat, contra veninului diversilor șerpi. (*Vaccinul lui*). Vaccinul antituberculos descoperit de Calmette împreună cu un alt învățat Guérin se dă copiilor dela naștere până a 10-a zi, în 3 doze, la interval de câte 2 zile între fiecare doză. Copii astfel vaccinați sunt mai puțin expuși să contracteze tuberculoză în timpul vieții. Mulți dintre ei au fost lăsați în aceeași casă cu părinții tuberculoși, după ce au fost vaccinați și nu s'au îmbolnăvit.

Calomel (*Protoclorur de mercur*). — Este un praf alb, fără miros și fără gust, care nu se topește în apă. Este

un *purgativ* și *viermifug* foarte bun. Face ca bila din ficat să curgă în câtime mai mare în mațe, din care pricină se dă cu mult folos la cei ce suferă de ficat, mai ales de gălbănare (icter). Se întâmplă însă, de multe ori să întârzie să-și facă efectul purgativ, sau să nu lucreze de loc, atunci trebuie să-l ajutăm cu o doză de unt de ricină, sau punând o clizmă. Pentru a fi mai siguri de efect se poate da calomelul în tovărășie cu alte curățenii mai tari: sabur, jalapa, scamonea. Ca *viermifug* se dă la copii, când au limbrici și oxiuri, pe cari îi omoară. Asupra panglicii n'are nici o putere. Se dă sau calomelul singur, două sau trei zile în rând, sau întovărășit cu santonină, sau cu semen-contra. Calomelul se dă în doză de 20, 30, 40 și 60 ctgr., după vârstă, pentru o singură dată. Trebuie să fim atenți că dozele normale pentru adulți pot fi mortale pentru copii, căora le trebuiesc doze cu mult mai mici. Fiindcă nu se poate topi în apă se dă în buline, în miere, într'un sirop de dulceată. În farmacie se mai prepară pișcoturi cu calomel, pentru limbrici, pe cari copiii le mănâncă cu înlesnire. Sarea de *bucătărie schimbă calomelul în sublimat coroziv* (*saricică*) și care este foarte otrăvitor, deci ori de câteori dăm calomelul, să oprim să se dea bolnavului vreo mâncare cu sare, bulion, supă, etc., i se va da toată ziua numai *lapte dulce* și câte puțin ceaiu slab, cald, cu zahăr, *fără lămâe*. De asemenea în ziua când se dă calomelul se va opri laptele de migdale și apa de laurceras, cari îl schimbă într'o otravă tot așa de tare ca și sublimatul. Pe lângă proprietățile de purgativ și viermifug calomelul se mai dă și contra sifilisului. În doze de 20 ctgr. până la 1 gr. pe zi, lucrează la adulți, ca purgativ și viermifug; unu până la 5 ctgr. ca alternant și antisifilitic. Pe dinafară se dă în alifii ($\frac{1}{10}$).

Calorifer. — V. *Încălzit*.

Calozitate (lat. *callus*, bățătură). — Îngroșarea pielei, mai bine zis a epidermului, provenită din cauza loviturilor și frecărilor repetate (cum se întâmplă la palme), sau a încălzimintelor rău făcute (v. *Bătăături* și *Negi*).

Caltavete. — V. *Jaretiere*.

Calus (latinește *callus, callum*). — Când o fractură de os este bine îngrijită, cele două capete ale osului rupt se lipesc între ele, printr'o cicatrice, sau țesut nou, care se numește *calus*.

Calviție (lat. *calvus*, chel, pleșuv). — Căderea definitivă a părului.

Cămașă. — Cămașa apără pielea de atingerea aspră a celorlalte haine de deasupra ei. La țărani, mai ales în timpul verii, când nu mai poartă altă haină, cămașa este un apărător în contra arșiței soarelui, în contra vântului și a ploilor, în contra frigului primăvara și toamna. Ea regulează întru câțva și funcțiunile pielei, este chiar un curățitor al ei și prin urmare este măsura traiului igienic, sau neigienic, al celui ce o poartă. Ori din ce ar fi făcută o cămașă, trebuie să fie croită așa încât să nu facă multe încrețituri, când este aplicată pe corp, pentru ca să nu irite pielea. Să fie destul de largă pentru ca să nu strângă nici o parte a corpului și mai ales gâtul trebuie să fie liber în mișcările lui, deci gulerul nu trebuie să fie prea strâmt nici prea tare, pentru ca să nu supere circulația sângelui. Mânecele trebuie să fie destul de largi pentru ca mișcările mâinii să fie cât se poate de libere. Cămășile de lână, de flanelă, sunt folositoare în unele împrejurări, la vânătoare, la vâslit, etc., când omul asudă mult, absorbând sudoarea, pe măsură în care ea se formează. Fiecare om trebuie să aibă cămașă de noapte și cămașă de ziua. La orașe sunt unii cari poartă cămașa de noapte pe sub cea de zi, obiceiul iarăși foarte rău. Cămașa de noapte se infiltrează de sudoare și de alte necurățenii și, fiind astfel îmbăscită, ea împiedică funcțiunea regulată a pielei, din care pricină omul nu se simte bine, pe câtă vreme, dacă ai o cămașă curată, ai o plăcere mai mare și pare că ești mai vioiu. Este bine ca și cămașa de zi să se schimbe cât se poate mai des (igiena cere cel puțin de două ori pe săptămână).

Cămașă de forță. — Se întrebuințează la nebuni, pentru a-i ține liniștiți. Ea este făcută din pânză groasă și tare, încheiată bine la piept, cu șiruri tari, având mânecele mai lungi

decât mâinile și înfundate cu inele, prin cari trec sfori tari, cu cari se leagă de pat, apoi la gât și în jos cu fâșii puternice tot pentru același scop.

Camfor. — Este o esență volatilă solidă, care se scoate din lemnul arborelui *Cinnamomum Camphora* numit și *Laurus Camphora* sau *Camphora officinarum*, din familia Lauraceelor. Camforul purificat este solid, alb, lucitor și puțin translucid, fragil și la pipăire unsuros. Are un miros pătrunzător, gust aromatic, iute și cam amar; pus pe limbă dă o simțire de căldură, urmată de răceală. La aer se volatilizează câte puțin, în flacără arde, fără să lase urme. Trebuie păstrat în sticle bine închise. — Camforul este calmant, antispasmodic, antiseptic, viermifug, diaforetic, rezolutiv, antiafrodiziac. Se mai recomandă contra sudorilor de noapte,



Fig. 71.—Camfor

contra frigurilor, otitei. Se dă sub formă de *praf*: 5 ctgr. până la 2 gr., în hapuri, sau într'o poziune. Mai mult se întrebuințează pe *dinafară*: se prepară o *apă camforată*; (2 gr. la 1000) un *spirit de camfor* (100 gr. la 900), un *eter de camfor* (1 la 9), *ulei de camfor* (50 la 400), *oțet de camfor* (25 la 1000). Toate acestea sunt foarte bune pedeparte ca refrigerante și calmante, în fricțiuni, în durerile reumatice și nevralgice, în aplicațiuni pe locurile unde se află o îngrămădire de sânge, sau umflături de tot felul, iar pe de altă parte ca desinfectante, aplicându-se pe răni, cârpe, sau comprese înmuiate în ele. *Alifia*, sau *pomada de camfor*, se face punând 9 părți untură de porc (axonge), cu un gr. de ceară albă topită, 3 părți de camfor; ea se întrebuințează cu bun succes la lehuzele cari nu pot, sau nu vreau să alăpteze, pentru ca să dea țâța îndărăt, să oprească laptele. Pentru *tusă* mulți recomandă să tragi camfor dintr'o țevă, sau pană de găscă, sau din așa zisele *țigarete de camfor*. Omoară *moliile* din hainele de lână și din blăni, pentru care se întrebuințează foarte

mult. — *Bromurul de camfor* este un preparat foarte bun ca antispasmodic și antiafrodiziac. Se dă 50 ctgr. până la 1 gr., în pilule. — *Otrăvirea cu camfor* are următoarele semne: alena miroase a camfor, amețeli, turburări în vedere, sgomote în urechi, slăbiciune mare, aiurare, convulsii, răcirea corpului, câte odată poftă de a urina. Ca *tratament* se recomandă la început să se provoace vărsături prin gădilarea omușorului, sau dând ipeca, apoi inhalări cu eter (se pune eter la nas); să se încălzească corpul cu cărămizi calde, sau cu sticle pline cu apă fierbinte, fricțiuni.

Cămin. — V. la *Incălzit*.

Camomilă. — V. la *Mușetel*.

Câmpina. — Stațiune climaterică pe valea Prahovei, la o depărtare de o oră de Ploiești, cu stațiune de cale ferată. Se află la o înălțime de 430 m. deasupra nivelului Mării-Negre, pe un platou întins. Clima e dulce și constantă, aerul este încărcat cu emanațiuni de vaporii de păcură ce se ridică în atmosferă din numeroasele sonde din valea Prahovei. *Cura de aer* dela Câmpina este indicată convalescenților, anemicilor, tuberculoșilor, istoviților (surmenaților). În parcul dela marginea orașului sunt izvoarele minerale *sulfuroase atermale*, întrebuințate pentru băi. Izvoarele ne fiind captate, debitul lor este mic și insuficient pentru alimentarea completă a stabilimentului. În partea nordică a orașului, pe locul numit Măcelăria, se găsește un alt izvor de apă minerală „*Isvorul tămăduirii*” care, după credința poporului, vindecă boalele de ochi. *Apele sulfuroase* conțin săruri de calciu, sodiu, magneziu și potasiu, acid carbonic și sulfuric și mult hidrogen sulfurat. Aceste ape se recomandă în boalele reumatice și artritice, în scrofuloză, în boalele de piele (eczemă, răie, prurigo, etc.), în limfatism, în boalele de mîtră și de beșică.

Camptodactilie (grec. *kamptos*=curb, *dactylon*=deget). — Este o inflexiune permanentă a degetului mic și inelar. Este indolentă și fără roșeață, mai frecventă la femei și se produce în a II-a copilărie. Pentru unii este un semn de neuroartrism pentru alții

de tuberculoză. Nu trebuie confundată cu rețracția aponevrozei palmare sau boala lui *Dupuytren*.

Câmpulung. — O stațiune climaterică și de vilegiatură foarte mult vizitată. Acest oraș, din jud. Muscel, este situat pe platoul ce se ridică deasupra râului Târgu. Stațiune de cale ferată. Regiune romantică și pitorească, cu foarte interesante împrejurimi pentru excursiuni, cum este *Rucărul* (v. acest cuvânt). Orașul e mare și este capitala județului Muscel. Are clădiri și vile frumoase cu un bulevard admirabil, în care furnică o mulțime de oaspeți veniți de prin toate părțile țării, clima dulce și constantă, temperatura mijlocie în timpul verii 17°; lipsit de vânturi reci și de curenți. Clima aceasta convine ofticoșilor, scrofuloșilor, neurasteniciilor și istoviților, copiilor anemici și debili. La Câmpulung se găsesc renumitele băi de munte *Radu Negru*, în mijlocul unui parc umbrat de arbori bătrâni și înfrumusețat de numeroase alee împodobite cu flori. El cuprinde patru secțiuni: 1. *Idroterapie rece și caldă* cu 2 săli mari, cu aplicațiunea apei sub toate formele idroterapeutice. Este recomandată în boalele nervoase, anemie, scrofuloză, rachitism, obezitate, emoroi. 2. *Aer comprimat și inhalatii*, unde se fac inhalări cu diferite esențe medicamentoase (pin, gaiacol, eucaliptol, pulverizațiuni, cu săruri și ape minerale). Se recomandă în boalele de plămâni, în tusă, astmă, laringite și faringite cronice, în boale de nas și urechi. 3. *Electricitate* cu instalațiuni de curenți faradici și galvanici, băi electrice cu apă, masaj electric. Se recomandă în paralizii, atrofii musculare, nevralgii, cefalgii, nevrazenie, isterie, atoniile gastro-intestinale. 4. *Igienică*, cu băi de apă caldă, de aburi, de aer cald uscat, basini de apă rece și caldă, băi de puțină cu săruri minerale, un mare basin deschis cu apă, cu cadere de apă, servind pentru înotare.

Canale, egouri (fr. *égouts*). — Astăzi mai toate orașele au canale, sau egouri, prin cari se scurg, la oarecare depărtare de locuințe, toate necurățiile, împreună cu apele de ploi. Sunt 2 sisteme de canale: unele prin cari

se scurg numai materiile fecale (excrementele), urina și apele casnice și altele prin cari se scurg, împreună cu acestea și apele de ploaie și de stradă. Cele dintâiu sunt canale speciale, mici, nedeschise în strade și cari duc materiile în râuri sau la mare. Ele însă au neajunsul că se pot astupa, sau se pot sparge și în acest caz gazele ies afară și infectează atmosfera. Cele de al doilea sunt canale largi cari comunică din distanță în distanță, cu atmosfera prin niște guri, cari fac ca ele să poată fi curățite și reparate. În ele merge un curent mare de apă. Rețeaua canalelor, dela plecare și până




Fig. 72. — Canale

(G=grătar; R=recipient de noroi; S=tub recurbat în sifon; C=canal; Gd. C=gură de curățire

la terminare, se compune din: conductele casei, canalele de stradă și colectoarele. Canalele trebuie să aibă o pantă suficientă pentru ca apa să curgă repede ca să poată duce toate necurătenii. Canalele trebuie să fie construite în mod solid, să fie rezistente, să nu fie poroase și pe dinăuntru să fie cât se poate de netede. Astfel fiind ele nu se vor strica ușor, nu vor lăsa ca lichidele să se filtreze prin pereții lor și părțile solide ale necurătenilor nu se vor putea fixa de ridicăturile de pe fața lor internă. Tuburile de metal sunt bune pentru canalizarea care pleacă dela case și dela latrine. Forma canalelor de stradă este ovală, cu marea extremitate în sus. Celelalte sunt rotunde. Dimensiunile lor variază după cantitatea de apă ce trebuie să conțină; canalele cele mari au o înăl-

țime de 80 cm. până la 1 m. 80 cm. și lățimea de 50—80 cm.; cele mai mici au un diametru de 12—30 cm. Panta unei canalizări trebuie să fie de 1 metru la o lungime de 1 Km., pentru canalele mari și de 1 la 50 metri și chiar de 1 la 35 m. pentru cele mici. Cu această condiție și cu un volum mare de apă se va asigura o scurgere cu o viteză de 60 m. pe secundă. Când volumul de apă nu este îndestulător și viteza nu este destul de repede, materiile solide se vor depune. Canalele sunt prevăzute cu guri comunicante, cari înlesnesc vărsarea apelor de ploi și de pe strade, iar ventilația stabilită permite omului să le curețe. Gurele de scurgere trebuie să fie așezate în partea laterală a rigolelor din stradă, comunicând cu canalul principal printr'un canal oblic, cele de ventilație trebuie să fie așezate pe canalul principal, să fie acoperite cu capace găurite, grele și rezistente, ca să poată suporta greutatea mari, iar cele de curățenie trebuie să fie așezate pe trotuar și în comunicație cu gurile de vărsare. Forma lor este aceea a unui recipient, care își are fundul mai jos de cât conducta de scurgere, pentru a lăsa ca materiile solide să se depună, de unde se vor curăți din când în când. Orificiul să fie destul de larg pentru a permite intrarea omului și să fie acoperit cu capac de metal. Orașul Paris are o rețea de canale din cele mai mari și mai bine instalată. Sistemul său de canale primește toate apele casnice, noroiul din curți și de pe străzi, o mare cantitate de rămășițe de vegetale și de animale, cea mai mare parte de urină și de materii fecale, tot atâtea materii cari, putrezindu-se, dau naștere la emanațiuni, cari miroase urit și sunt nesănătoase. Canalele sunt așa de bine construite și funcționează în condițiuni așa de bune, în cât lucrătorii și chiar cei ce voesc să le vadă umblă prin ele fără să sufere ceva și mirosurile nu se răspândesc în afară, pentru că toate canalele Parisului întrunesc cele trei condițiuni principale, pe cari trebuie să le aibă orice canal cu astfel de destinație: pantă îndestulătoare, pentru scurgerea lichidelor, apă abundentă, pentru a împinge ma-

CANA

teriile și ventilație suficientă, pentru a expulza gazele. Capitala noastră, Bucureștii, are un sistem de canale bine construit și convenabil instalat, dar, din nenorocire nu toate canalele acestea primesc excrementele omenești, ci numai apele meteorice cu toate murdăriile de prin curți și străde. Salubritatea publică nu se va putea îmbunătăți pe deplin decât atunci când toate excrementele omenești vor fi transportate afară din oraș, prin mijlocirea canalelor, căci numai în acest mod locuitorii vor scăpa de actualele hasnale, cari sunt foarte defectuoase și sunt vătămătoare pentru sănătate și cari se mai găsesc la periferia orașului.

Canal toracic. — Este canalul în care se adună limfa din organism.

Cancer (lat. însemnează *crab*, sau *rac*), *epiteliom*, *carcinom*, *rac*, *schirus*. — Este o tumoră care se poate ivi în organele dinăuntru, sau în cele dinafară ale corpului nostru, distrugând țesăturile în

care se desvoltă, întinzându-se încetul cu încetul la părțile vecine și putându-se reproduce, după ce a fost scoasă prin operație. Li s'a dat numele de *cancer* sau *rac*, fiindcă aceste tumori se întind, din locul unde se ivesc, la părțile vecine sub formă de șuvițe, cari s'ar putea asemăna cu picioarele unui rac. Mulți numesc cancerul *schiros*, care însă este numai o varietate de cancer, a cărei însușire de căpetenie este că tumora e fibroasă, tare la pipăit. — *Cauzele* adevărate ale cancerului nu se cunosc bine. Din experiență și cercetări se poate susține azi că această grozavă boală nu se moștenește și nu se ia de la om la om. — Se crede că iritațiile repetate, cum sunt cele produse de pipă pentru buza de jos, ar fi o cauză predispunătoare. Organele cele mai des atinse sunt: sânurile, stomacul, mâtele, limba, ficatul, mitra, etc. — *Semnele* sunt: se ivește o tumoră, cât un bob de porumb, care crește



Fig. 73. — Cancer al obrazului

CANC

neconținut și se întinde, ca și cum ar trăi pe socoteala organelor vecine, fără să mai dea înapoi vreodată. Dela o vreme această tumoră, se ulcerează se deschide și din rană se scurge o materie murdară care miroase; rana se mărește din ce în ce, ca și tumora. La început cancerul nu este dureros, din



Fig. 74. — Cancer al feței

care cauză mulți nu bagă de seamă că sunt bolnavi decât mai târziu, când încep să aibă svâcnituri, cam dure-roase și cari, după câțva timp, încep să fie adevărate dureri mari, aproape neîntrerupte. Aceste semne le au toate cancerile; lor li se mai întovărășesc și altele, după organul bolnav și aceste semne atârnă de turburările pe cari cancerul le aduce în slujba organului, așa de pildă cancerul limbii împiedecă bolnavul de a vorbi și de a înghiți, cancerul stomacului împiedecă mîstuirea și provoacă

vărsături caracteristice (v. Stomac) și așa mai departe. *Gravitatea* cancerului atârnă de locul unde s'a ivit. Când el se ivește pe dinafară, la buză, la sânuri, etc. atunci poate fi operat, bine și în întregime, mai ales când bolnavul aleargă din vreme la doctor, până ce cancerul nu a crescut prea mult și nu a otrăvit sângele. Nu tot astfel este cu cancerul de ficat, unde operația



Fig. 75. — Cancer al nasului

CANC

n'are nici o putere și moartea vine mai repede. — *Tratamentul.* Toate leacurile, câte s'au dat și se dau în contra acestei boale, de doctori ca și de babe,



Fig. 76. — Cancer al ochiului

n'au nici o putere de a vindeca. Azi se cunosc două feluri de a tămădui cancerul: *Operația*, care nu poate fi de folos decât atunci când se face cât mai de vreme și pe dea'ntregul, lucru



Fig. 77. — Cancer al ochiului

care nu se poate îndeplini decât la cancerile ivite în părțile dinafară ale corpului. Chiar și în aceste cazuri, de multe ori, cancerul se poate arăta din nou. În organele interne: stomac, ficat, mățe, mîtră, rinichi etc., operația nu

CÂNE

dă rezultate bune de cât foarte rare ori. 2. *Tratamentul cu raze.* Fie cu razele lui *Roentgen*, radioterapie, fie cu ale lui *Curie*, radiumterapie, este bun într'un număr mare de cazuri. Leacul cancerului, prin urmare, trebuie des-



Fig. 78. — Cancer al pleoapei

coperit de aci înainte. Un sfat bun putem da tuturor celor cari vor simți pe corpul lor vreun nod vreo umflătură, să se arate la doctor și, în caz de trebuință, să se supună la operație fără întârziere.

Cancer la intestine (la mățe). — V. *Intestin.*

Cancer la stomac. — V. *Stomac.*

Cânească (Boală). — V. *Atrepsie.*

Câneapă (*Cannabis sativa*, fam. Urticaceelor). — Semințele conțin un fel de ulei pentru care se întrebuințează la facerea *laptelui*, sau a *emulsiei de cânepă* (*emulsio cannabis*). La țară se dă fiertura sau decoctul de cânepă în contra limbricilor. Cu decoctul de cânepă verde se spală pe cap ca să crească părul. Iulfa de semințe de cânepă fiartă cu lapte se bea pentru a opri vărsăturile sau când cineva este otrăvit.

Câneapă de India (*Cannabis indica*, fam. Urticaceelor). — Se întrebuințează vârfurile înflorite. Principiul activ este: *canabina*. Lucrează ca antispasmodică, anestezică locală. Medicament primejdios. Se dă sub formă de extract, 5—50 ctgr. în pilule; tinctură, 2—10 gr. într'o poțiune și țigărete de *cannabis indica*, pentru cei ce sufăr de astmă.

CANI

Caniculă. — Se numește astfel steaua Sirius din constelația Cănelui, care este cea mai strălucitoare dintre toate stelele fixe, și prin extensiune numele de *caniculă*, sau *zile caniculare*, se aplică la acea epocă a anului în care această stea răsare și apune odată cu soarele: dela 9 Iulie până la 10 August, când avem căldurile cele mai mari. În această perioadă caniculară igiena ne sfătuiește să nu ne schimbăm modul de viață din tot timpul verii, ci numai să ne ferim de băuturile prea reci, de înghețate și de băuturile alcoolice, cari ne pot face rău.

Caniție (lat. *canities*). — Încăruntirea sau albirea părului; vine de obicei dela etatea de 30 ani înainte, sau poate și mai de timpuriu. S'a observat uneori venind foarte repede, aproape subit. Caniția mai poate fi congenitală (din naștere) și se recunoaște prin lipsa, sau raritatea pigmentului tegumentar, cum se întâmplă la *albinism*. Despre încăruntirea obișnuită caută la păr.

Cânt, cântăreți. — În urma cântului plămânii se întăresc, așa că respirația se face cu mai multă regularitate. Nu trebuie să cânte cei cu ernie, nici cei sângeroși, cari sunt aplicați spre congestiuni, nici cei cu boale de inimă, la cari cântarea le-ar face rău, sau le-ar mări boala. Cântul mai contribuie la educația auzului și în totdeauna este o îndeletnicire minunată, care mărește puterea de respirație a plămânilor. Cântăreții de meserie, cari sunt supuși la o iritație neconținută a organelor vocale, au reguli igienice deosebite, la cari trebuie să se supună pentru a-și păstra glasul și a fi sănătoși. Prin cântare multă, uneori prea multă, ei sunt supuși la inflamație de gât și de gâtlee, sau laringe (v. *Angină și Laringită cronică*). Cântul mai poate fi împiedecat prin mărirea amigdalelor și prin turburări nervoase, cari constau într'un adevărat spasm al laringelui. Cântăreții trebuie să se păzească de mâncări iuți, piperate sau ardeiate, de tutun, de băuturi spirtoase, să nu treacă repede dela căldură la frig, să se păzească de ceață și de umezeală, cari le strică glasul, să nu mai cânte îndată ce văd că sunt nădușiți, sau cu guturaiu, iar gâtul

CANT

și pieptul să nu fie strânse de guler, cravată și vestă.

Cantalup, cantaloș (*Cucumis cantalupo*, fam. cucurbitaceelor). — Varietate de *pepene galben* foarte parfumat și cu coastele foarte pronunțate și sgrâbuncioase (verucoase). Numele de cantalup provine dela cuvântul italian *Cantalupo*, o vilă a Papilor, în apro-



Fig. 79. Cantalup

piere de Roma, unde s'a obținut mai întâiu această minunată varietate de pepeni. Cantalupul este foarte plăcut la mâncare, dar este cam greu de mistuit, de aceea nu trebuie să se mănânce prea mult odată. Nu este bun pentru cei slabi de stomac, pentru cei ce sufer de diaree și de diabet.

Cântar, balanță, cumpene. — De mai mult timp se practică bunul obicei de a se cântări copiii mici, sugaci, din lună în lună, și chiar mai des, pentru ca să se vadă dacă laptele este bun și dacă ei se hrănesc bine, să se vadă cât câștigă în greutate corpul lor. Această cântărire este bună și pentru adulți. Cântărirea este de folos când vrei să constatăm efectele tratamentului în obezitate, în oftică și în alte boale. Pentru noii-născuți se întrebuințează de obicei cumpenele (balanța). Pentru adulți toate mijloacele de cântărire sunt bune. Pe lângă cântarele obișnuite se mai găsesc pe la gări și prin alte localuri publice cântare automate, foarte practice. Când vom să facem o cântărire trebuie făcută întotdeauna cu același cântar, cu aceleași haine și la aceeași oră din timpul zilei, pentru ca să nu facem nici o greșală și să putem bine aprecia cât a câștigat sau a pierdut corpul din greutatea lui dela cântărirea de mai înainte.

Cantaride, gândaci de frasin, gândaci de turbă (*Lytha vesicatoriu*, *Cantharis vesicatoria*). — Insecte foarte comune

la noi, cari se ivesc în Iunie pe frasinii și au un miros ca de șoareci. Principiul activ căruia dătoresc proprietatea lor vezicantă este *cantaridina*, care se întrebuințează în farmacie la prepararea vezicatorilor (vezi *Vezicatori*). Cantaridele luate pe dinăuntru sunt toxice; ele lucrează mai întâiu asupra beșicii udului și a organelor genitale, din care cauză se întrebuințează ca *afrodiziac*. În cele mai multe cazuri produc moartea. Se dau sub formă de: praf, 2—5 ctgr.; tinctură, 1—10 picături; extract, 5—10 mgr. Pe dinafară, pe lângă vezicatori se mai dau în alifie (unguent), pomadă, ulei, hârtie (Rigolot). — *Cantaridina*, alcaloidul care se extrage din cantaride, este foarte periculos și nu se întrebuințează pe dinăuntru. — *Otrăvirea cu cantaride* are următoarele semne: arsură la stomac (la lingurea), durere de cap, vărsături și diaree (urdinare), fața roșie, ochii strălucitori, udul se




Fig. 80. — Cantaride

face cu greutate, cu durere, în cantitate mică, des și cu sânge; apoi delir (aiurare) și convulsii cu o mare excitație genezică. *Tratament*: să facem bolnavul să verse, gădilându-i o mușorul, sau dându-i ipeca; apoi se bea apă albuminoasă (apă cu albuș de ou), zeamă de orz, calmante. — *La țară* se întrebuințează în contra *turbării*, la vite și la oameni: se afumă cu ei, sau se beau pisați cu apă, sau vin alb. Cu gândăcei fierți în borș se spală *rânile*. Pentru *sculament* se beau gândăcei plămădiți în rachiu și oțet, cu sânge de nouă frați, rădăcină de pir, rădăcină de boz și ochi de rac. Pentru *sfrenție* se rup capetele la 9 gândaci, iar trupurile lor se pun într-o litră de rachiu cu untdelemn, după 3 zile se bea de 3 ori pe zi, fără ca să mănânce acrituri în timpul acela. Pentru *beșica cea rea* se pisează gândăceii și se amestecă cu mămăligă, sau cu făină de grâu cu apă, făcându-se o cocă ce se leagă la mână, ori la picior,

ca să tragă beșica cea rea dela cap, sau dela față. Cu acești gândaci se mai face de dușmănie între bărbat și femeie, dacă se pun sub pragul peste care trece bărbatul și femeia și așa se naște zizania și cearta între ei, până se despart. — În Bucovina se numesc *căței de frasin*, sau *cățelul frasinilor*; se mai întrebuințează pentru a vindeca oamenii și vitele mușcate de câine turbat.

Cap (lat. *caput*, grec. *kephale*). — Partea superioară a corpului omenesc se numește *cap*, care este format din două părți: una în sus și înapoi numită *craniu*, iar altă parte înainte numită *față*. Despre aceste părți ne vom ocupa în articolele: *craniu* și *față* (vezi aceste cuvinte), iar de diferitele părți cari le compun în articolele: *buze*, *creier*, *frunte*, *limbă*, *nas*, *obraji*, *ochi* (v. aceste cuvinte). Capul se articulează cu șira spinării în așa fel încât el se poate mișca înainte, înapoi, în lături și se poate suci spre dreapta și spre stânga. Această însușire de a se putea mișca înlesnește mișcarea în diferite direcții a privirii ochilor, pe care o putem arunca aproape în toate părțile din jurul nostru, afară numai de partea de dinapoi. Mișcărilor acestea le execută capul cu ajutorul mușchilor cari se prind pe de o parte de el și pe de altă parte de trunchi și a căror putere de contracțiune este egală, ceea ce face capul să stea drept pe șira spinării, în stare de imobilitate completă. Dacă unul din acești mușchi, dintr-o cauză oarecare, ia o preponderanță asupra celorlalți, atunci capul ia o pozițiune fixă, invariabilă, de care nu se poate depărta decât cu dureri foarte mari, cum se întâmplă în *torticolis*. Conformația generală a capului variază foarte mult dela om la om, chiar în stare de sănătate. Ea mai variază și după rasă, astfel capul Mongolilor, Japonilor, Turcilor, Tătarilor, se deosebește de capul Europeanilor. Dar aceste diferențe interesează mai mult *antropologia*, pe câtă vreme medicina nu se ocupă decât de formațiunile generale, cari sunt în raport cu turburările facultăților intelectuale și în deosebi cu nebunia (vezi *Distormațiuni*). Un cap prea mic corespunde cu o stare numită *microcefalie* și se

vede mai ales la *idiofi*. Un cap prea mare, *macrocefalia*, se observă în rachitism. Capul mare se mai vede și în cazurile când se adună apă prea multă la creier, *idrocefalie*, care este o boală din naștere și se termină cele mai adeseori prin moarte. *Rănirile* capului, plăgile, arsurile, etc., sunt grave, din pricină că se află în apropierea creierului, iar la față din cauza vecinătății unor organe importante ca ochii, nasul, etc. Ele și aci se tratează ca în toate părțile corpului, cu aceleași mijloace pe cari cetitorul le găsește arătate la Arsuri, Plăgi, Răniri. Intre boalele capului mai avem: *erizipelul*, sau brânca, ce începe la față și mai întotdeauna se întinde și la cap, *eczema* și celelalte boale de piele, cari se pot observa și la cap, având același tratament, *tremurăturile* cari se văd adeseori la bătrâni; în fine, *paralizile*, mai ales *paralizia feței*.

Căpială. — V. *Ipocondrie*.

Capilare. — Vase mici sanguine, între artere și vâne; vase mici limfatice (vezi *Cord* și *Circulație*).

Caprifoale. — V. *Crețușcă*.

Căprioară. — Carnea de căprioară nu se potrivește pentru toate stomacurile. Cea de căprioară bătrână este tare și nu poate fi mâncată decât fiind mai stătută, sau sub formă de marinată. Dar chiar și astfel trebuie s'o mâncăm cu băgare de seamă și nu multă de odată. Cei supuși la boale de piele (eczema, etc.) nu trebuie să mănânce carne de vânat și mai ales de căprioară.

Capsule. — V. *Buline*.

Căpsuni, fragi de câmp (*Fragaria colina*, fam. rozaceelor). — Mică plantă erbacee, care crește prin poenile pădurilor și pe colinele aride. Căpsunele sunt bune și gustoase la mâncare. — La țară decoctul (fiertura de) frunze, de cărcii și rădăcini se bea de femeile cari au dureri în pânțece la period. Cu decoctul de foi de căpsuni, micșunele și coada șoricelului, se spală de pârleală (pelagră).



Fig. 81.—Căpsune

Carantină. — Sub acest nume se înțelege șederea, mai mult sau mai puțin prelungită într'un lazaret, adică într'o clădire separată de restul țării, a persoanelor cari vin dintr'o țară, sau o localitate, în care bântuie o epidemie, sau cari au călătorit pe un vapor în care s'a ivit un caz de boală molipsitoare.

Carbolic (Acid). — V. *Fenic (Acid)*.

Carbon (dela *carbo*, cărbune). — Substanță elementară, care poate fi unită cu alte principii, cum este în substanțele vegetale și animale, cărbunele ordinar, etc. Carbonul este unul din corpurile simple cele mai răspândite și cele mai importante. Se întâlnește sub o mulțime de forme în regnul animal și în regnul mineral. Cărbunele de lemn este un carbon mai mult sau mai puțin necurat, precum este și cărbunele din cele mai multe substanțe. Diamantul incolor este adevăratul carbon, cristalizat, fără nici un amestec. Toate combustibilele pe cari le întrebuițăm, cum sunt: cărbunele de lemn, cărbunele de pământ, turba, antracitul etc. (vezi *Încălzit*), ne dau căldură mulțumită *carbonului* pe care îl au și care se degajă în unele condiții determinate. Materialele mai sus numite ard din cauza *carbonului* lor, care se combină cu *oxigenul* din aer. Din această combinație se nasc două corpuri: *oxidul de carbon* (vezi mai jos) și *acidul carbonic* (vezi *Carbonic*), cari sunt foarte primejdioase pentru cei ce le respiră.

Carbon (Oxidul de). — Un gaz fără miros, format prin combinația în părți egale a carbonului cu oxigenul, câtă vreme acidul carbonic conține 2 părți oxigen și o parte carbon. Oxidul de carbon se formează ori de câte ori cărbunele arde în mod incomplet într'o sobă, într'un cuptor, sau într'un calorifer. Este o otrăvă puternică. Ajungând prin plămâni în sânge copleșește globulele lui, pe cari le face incapabile de a mai absorbi oxigen și omul moare prin *asfixie*. *Otrăvirea* cu oxid de carbon produce un fel de indispoziție generală, dureri de cap perzistente, cu greutate și văjiituri de urechi; fața și degetele se învinețesc, bătăi de inimă, comă și moarte. *Tratament*: deschiderea ferestrelor, aer mult tracțiunile

limbii (v. *Asfixie*), inhalațiunii de oxigen și de amoniac, cafea, dușuri reci la cap și piept, fricțiuni și călduri la mâini și picioare; la trebuință luare de sânge din vine (venesecție).

Carbonate. — Prin numele de carbonat se înțelege o sare formată prin combinarea acidului carbonic cu un alcali, sau cu unul din corpurile numite *base*, cari au proprietatea de a da săruri combinându-se cu acizii. — Dintre carbonate, cele mai de preț pentru medicină și igienă sunt: *carbonatul de amoniac*, *carbonatul de calciu* (cretă, *ti-bișir*, *marmură*, *piatră de var*), *carbonatul de fier*, *carbonatul de magnezie*, *carbonatul de plumb* (numit și *ceruză*), *carbonatul de sodă*, care se întrebuințează la prepararea băilor alcaline (v. *Băi alcaline*) și care nu trebuie să se confunde cu *bicarbonatul de sodă* (v. *Bicarbonat de sodă*).

Carbonic (Acid). — Este un gaz fără culoare, cu miros cam înțepător, gust acrișor. Se formează din combinația carbonului cu oxigenul, ca și oxidul de carbon, având însă de 2 ori mai mult oxigen. Acidul carbonic se formează în natură, mai ales în *aerul atmosferic*, apoi în unele peșteri a căror pereți prezintă crăpături, prin cari el scapă în continuu. Acidul carbonic fiind mai greu decât aerul cade în partea de jos. Acest gaz așa de primejdios pentru om și animale este foarte trebuincios pentru vegetale, cari n'ar putea exista fără el, căci toate plantele absorb acid carbonic și dau afară oxigen, în cantitate egală, când sunt expuse la lumina soarelui. La întuneric și la umbră se întâmplă dimpotrivă, iau oxigen și dau afară acid carbonic, din care pricină aerul unei camere, în care au stat flori în timpul nopții, se strică repede și devine periculos pentru vieța celor ce dorm acolo. Omul precum și toate animalele, respirând în tot timpul fără întrerupere, ziua și noaptea, dau afară acid carbonic, astfel că dacă nu se primește destul de des aerul care merge la plămâni, acest gaz stricăcios se înmulțește mereu. Aparatele de iluminat și de încălzit produc și ele acid carbonic, așa că aerul se strică și mai mult (v. *Aer confinat*). Deși acidul carbonic nu este așa de otrăvitor, ca

oxidul de carbon, el însă, prin îngrămădire, poate fi tot așa de periculos, pentru că el nu mai întreține respirația și ia încetul cu încetul locul oxigenului, care este singurul gaz folositor al aerului. *Otrăvirea*, sau *asfixia* cu acid carbonic, se tratează ca și cea cu oxidul de carbon (v. *Carbon*, *oxid de*). — Acidul carbonic poate fi întrebuințat cu folos, când îl amestecăm cu apă, (ceea ce se poate face cu mare ușurință cu ajutorul unei pompe) și atunci avem cunoscuta *apă gazoasă*, care se întrebuințează foarte mult la masă, când se bea cu vin. Apele gazoase naturale conțin de asemenea acid carbonic. Aceste ape gazoase, artificiale și naturale, când se iau la masă, ușurează mistuirea la cei cu stomacul leneș.

Carbuncul contagios. — V. *Pustula malignă*.

Cărbune. — V. *Pustula malignă*.

Cărbunele animal se recomandă în bolile intestinelor, (colite, enterocolite acute), dispepsia putridă și fermentativă, holeră, dizenterie, febră tifoidă, intoxicații, otrăviri cu stricnină, fenol, morfină. Se ia în cantități mari, de 3 ori câte o linguriță (și chiar câte o lingură, după caz), cu multă apă.

Cărbunele cel rău. — V. *Pustula malignă*.

Cărbune vegetal. — Este cărbunele care se întrebuințează în medicină. El se face arzând în vase închise ramuri de plop, tinere de 2—3 ani, se spală apoi în 3—4 ape, se usucă și se pulverizează (*Cărbunele lui Belloc*). Se mai poate prepara și din lemn de teiu. Este un praf negru foarte fin și foarte ușor, fără nici un gust. Acest cărbune lucrează ca absorbant, antiputrid și dezinfectant. Se dă pe *dinăuntru*, sub formă de praf, în linguriță, sau în buline, sau sub formă de granule, pentru a împușina gazele intestinale, în dilatațiile de stomac și în răgăiturile acre. Pe *dinafară* se pune pe rănilor cari fac puroi mult și au miros urât. Se întrebuințează în boalele de gură, de gingii, simplu sau asociat, cărbune 2 părți, clorat de potasă 1 parte, coaje de chinchina 1 parte, toate fin pulverizate și amestecate.

Cărcei. — V. *Crampe*.

Carcinom, (sinonim cu cancer). — V. *Cancer*.

CARD

Cardia. — Deschizătura de sus a stomacului. Corespunde exact locului unde se termină esofagul și începe stomacul și este locul unde esofagul se strâmtează mai mult.

Cardialgie. — Dureri de stomac localizate în regiunea *cardiei*, care corespunde vârfului sternului.

Cardol, tribromosalol. — Praf cristalizat, care nu se topește în apă, recomandat ca narcotic și emostatic (opritor de sânge). Se dă 50 ctgr. până la 2 gr. în pachete, sau în buline. E bine să se înceapă cu 2 gr. și apoi să se scadă la 1 gr. pe zi.

Carență (Boli prin). — Boli datorite lipsei parțiale, sau totale, din alimentația noastră, sau a animalelor, a unor elemente esențiale, a *Vitaminelor*. Bolile prin carență, cele mai obișnuite, sunt: *Béribéri*, *Scorbut*, *Pelagra*.

Carfologie (grec. *karp*hos, fulgi și *legein*, a culege). — Mișcări dezordonate pe cari le fac unii bolnavi cu mâinile ca și cum ar voi să culeagă niște fulgi din aer, sau alte lucruri, cari nu sunt decât numai în închipuirea lor (halucinațiuni). Aceste mișcări se văd în boalele grave, cum este febra tifoidă și sunt un semn rău, ca și delirul și trăsăturile mușchilor.

Carie. — Prin acest cuvânt se înțelege o boală specială a țesutului osos, un fel de inflamație a osului, o *osteită*, care nu este o inflamație francă, adevărată, nici o mortificare a țesutului osos, cum este într-o *ne-croză*, ci este o *osteită* provenită dintr-o leziune primitivă a celulelor osului. Caria atinge mai cu seamă dinții și măselele, sternul, coastele, vertebrele, oasele lungi. Caria poate fi adâncă (profundă), sau superficială, simplă, fungoasă, atonică necrotică, etc. Ea poate să se ivească în urma unei loviturii, sau fără motiv. *Semnele* sunt: o durere vie, mai ales noaptea, umflătura osului, apoi ivirea puroiului (abces rece), care miroase urât, este gros, grăunțos și uneori cu mici bucățele de os (*colți de lup*). După ce s'a deschis abcesul rămâne o fistulă, prin care se scurge în continuu puroiul ce vine dela os. Prin fistulă ajungem cu stiletul la osul bolnav, care este colțuros. *Tratamentul* este gene-

CĂRJI

ral și local. Prin cel general vom modifica starea generală a bolnavului, iar prin cel local vom deșerta puroiul, vom spăla rana în fiecare zi, vom curăți osul stricat și la nevoie vom scoate tot osul cariat.

Cârji. — O cârjă este un băț mai mare, mai puternic, pe care se sprijinește acel care nu poate umbla pe picioarele lui, fie din cauză de slăbiciune, fie din pricina înțepeniturilor dela încheieturi, a unui reumatism, sau altor boale, fie că un picior a rămas mai scurt decât celalt, sau că a fost tăiat de mașină, sau de doctor. Este mai bine să se servească de două cârji de odată decât numai de una,



Fig. 82. — Cârji

căci atunci mersul este mai sigur. Cârja la partea de sus are o bucată de lemn în cruce, puțin cam scobită, pe marginea de sus, în formă de corn. Această bucată de lemn trebuie să fie îmbrăcată cu iută, sau bumbac și până sau piele pe deasupra, pentru ca să nu lovească prea tare subțioara, care cu timpul devine dureroasă; din această cauză mai trebuie întrerupt mersul cu cârja, din când în când, iar pe pielea subțioarei să se presare praf de scrobeală, după ce mai întâiu s'a spălat bine cu apă. Partea de jos a cârjii este bine să aibă un fel de călcăiu din pânză groasă, sau de piele pentru ca să nu alunecă și să nu se lovească prea tare de pietre sau de podele; cârjile mai luxoase au jos cauciuc, care micșorează apăsarea asupra subțioarei și împiedecă alunecarea. Cârjiile trebuie făcute de lemn tare, rezistent, fără însă ca să fie prea grele.

Lungimea lor trebuie potrivită după statura celui care le poartă, căci dacă sunt prea mici omul trebuie să se aplece prea mult, pentru ca să se sprijine după cum trebuie.

Cărligat, cărligați. — V. *Răculeț*.

Carminativ (dela *carminare*, a curăți, a împrăstia). — Medicament care provoacă darea afară a gazelor din stomac și din intestine, cari gaze provoacă dureri, mai ales la copiii mici (colici intestinale). Cei supuși la astfel de gaze trebuie să se ferească de feculente (fasole uscată mai ales), de mâncări crude, de prăjituri și de lucruri grase, cari ajută formarea de gaze (*flatulență*). Pentru a combate gazele este bine să se întrebuințeze condimente aromatice, ceaiu de anason, de molură (fenicul), de jale, de coriandru, melisă, scorțișoară, praf de revent, elixir de garus, piper, ardeiu, etc.

Cărnățarie. — Când vorbim de cărnățarie numai decât ne gândim la carnea de porc, sub toate formele ei, proaspătă, sărată sau afumată. Dacă porcul este sănătos și bine hrănit, după ce s'a îngreșat, poate fi tăiat și dat spre mâncare sub diferite forme: costițe, cărnați, cartaboși, răcături, șuncă, etc. Toate aceste preparate, pentru ca să fie mistuite, trebuie să fie mâncate în cantitate mică și mai rar, să nu se mănânce numai carne de porc toată ziua, nici mai multe zile la rând. Oamenii bolnăvicioși și slabi de stomac să nu mănânce carne de porc, afară numai de unele cazuri bine determinate, în cari se recomandă *șunca*, mai ușor de mistuit și mai hrănitore, mai ales pentru unii ofticoși. Trebuie să ne păzim de preparatele vechi, mucigăite, sau făcute din carne stricată, sau provenită dela un animal bolnav. Acestea pot da naștere la accidente grave cari seamănă cu cele de otrăvire, colici, urdinare, vărsături, etc. Carnea de porc crudă, sau nefriptă bine, poate da omului *tenia*, sau *pan-glica* și *trichina* din care pricină trebuie să fim cu mare băgare de seamă și să nu mâncăm decât carne bine friptă, bine preparată.

Carne (lat. *carnis*, grec. *kreas*). — Mușchii diferitelor animale, cunoscuți sub numele general de *carne*, servesc pentru hrana omului. Carnea de mân-

care ne-o dau animalele mamifere, paserile, peștii și moluștele. Carnea este unul din cele mai bune alimente, căci conține principii *cuaternare* (musculină, albumină), principii *ternare* (grăsimi), *săruri* și *apă*. Elementele albuminoide din carne se asimilează mai lesne decât cele din vegetale, dintre cari unele trec prin tubul digestiv al omului nemodificate, prin urmare fără nici un folos. Elementele albuminoide ale cărnii se modifică cu ușurință prin căldură, prin apă, prin sare, prin microorganisme și prin sucurile tubului digestiv și mulțumită acestor modificări ele constituie alimentele cele mai asimilabile și mai hrănitore. Carnea cea mai întrebuințată este cea de vacă, de porc, de oaie, de *pasări domestice*, de *vânat*, de *pește*, etc. Valoarea nutritivă a acestor cărnuri variază după compoziția lor. Astfel carnea de vacă conține substanțe albuminoide 17—20%, substanțe coloide 2—3, grăsime 1.5—2.8; iar carnea de vițel are 16,4 și 2—4; carnea de porc 19, 4, 5.7; carnea de pasări 20, 1.4, 1.9; carnea de pește 13, 4.4, 4—6%. Din acestea se vede că cea de pește conține mai puține substanțe albuminoide și prin urmare ea este mai puțin hrănitore. De carnea peștilor se apropie carnea unor batraciene (broaște), a unor crustacei (racii) și a unor moluște (stridiile, midiile, melcii). Valoarea hrănitore a cărnii atâră și de organul din care provine: burta, plămâni, picioarele, (sgârciurile sunt cele mai puțin nutritive). Carnea, după starea de sănătate sau de boală a animalelor, se împarte în carne *sănătoasă*, *bolnavă* și *otrăvitoare*. Pentru a fi siguri de calitatea cărnii trebuie să se examineze vitele când se duc la tăiere, la abator, și să se oprească dela tăiere cele cu înfățișare bolnăvicioasă. Boul, capra, vaca, oaia, porcul, când sunt în stare de sănătate, trebuie să aibă privirea blândă, ochii limpezi, urechile și coar-nele la rumegătoare să fie calde, nările umede, părul lucios și lins, pielea fără nici o bubă, respirația liniștită, să mănânce cu poftă, să rumege în odihnă, limba să nu atâră afară din gură, ceea ce este un semn în totdeauna rău. Calitatea cărnii variază și după felul animalelor. Astfel carnea de *bou*,

CĂRN

cea mai bună, este a animalului între 4 și 8 ani, care a fost mai întâiu îngrășat. Ea trebuie să aibă o culoare roșie trandafirie peste tot, să nu aibă vânătăi, urme de bătaie, urme de inflamațiune, nici vr'un ganglion mărit, după cum se vede în oftică. O carne bună lasă la tăiere să se scurgă zeamă roșie și la pipăit trebuie să fie moale, prin apăsare cu degetul carnea să se poată străbate. Grăsimea de pe coaste și de pe spinare trebuie să fie tare și albă, sau gălbuie, măduva oaselor de asemenea să fie tare, gălbuie, sau roșie. Carnea vitelor îngrășate în poverni este moale, cu înfățișare murdară, și cu miros neplăcut, iar grăsimea lor este moale și băloasă. Carnea de vacă tânără și stearpă este bună, iar a vacilor cari au dat lapte este flască și fără grăsime. Carnea de vițel de lapte este alburie și cu grăsime moale care se topește între degete; mai bună este a vițelului înțărcat. Carnea de berbec este închisă, moale și cu grăsime albă. Carnea de porc are o culoare roșie, grăsimea este albă și tare; gustul ei depinde de hrana animalului, astfel carnea porcilor hrăniți cu porumb și cu ghindă este cea mai plăcută, iar a celor hrăniți cu borhot, stând închiși în oboare murdare, este neplăcută la gust deși este grasă. Calitatea cărnii mai atarnă și de traiul animalelor, după cum ele au fost ținute în libertate sau închise în oboare, sau grajduri; carnea vitelor hrănite în aer la pășunat este cea mai gustoasă și mai bună. Etatea animalelor are deosebită importanță, carnea vitelor tinere este fragedă și nutritivă, iar a celor bătrâne este tare, fibroasă, se mistuie greu și hrănește puțin. Carnea vitelor de jug și a vacilor de lapte este mai puțin hrănitore. Carnea diferă și după părțile din care s'a luat, astfel carnea de la gât, umăr și pulpă este cea mai gustoasă și mai fragedă, digerându-se mai ușor și fiind cea mai nutritivă. După culoare carnea se împarte în: *albă*, *roșie* și *neagră* (roșie închisă). Carnea albă este aceea a animalelor tinere și a păsărilor; ea este hrănitore, are gust plăcut și se mistuie ușor. Carnea roșie este a rumegătoarelor tinere; ea este mai hrănitore, dar se mistue mai greu. Carnea neagră

CARN

este dela animalele și pasărilor sălbatice; ea este puțin hrănitore și se mistuie cu greutate. Digestibilitatea cărnii ține de bogăția grăsimii și de starea ei fibroasă, care o face să fie mai mult sau mai puțin tare și să se mistue într'un timp mai mult sau mai puțin lung. — *Carnea bolnavă și otrăvitoare*, care nu trebuie mâncată cu nici un preț, este de mai multe feluri: 1. *Carnea intrată în putreziciune*, care se cunoaște după mirosul neplăcut și după vedere. Carnea stătută prea mult pentru ca să se frăgezească, așa numita carne *fezandată* nu este bună, de oarece ea conține *ptomaine* foarte otrăvitoare, de aceea trebuie să ne ferim de mezeli și păstrămuri stricate, de pești imputiți și de vânături prea stătute. 2. *Carnea dela animalele prea bătrâne, ori prea slăbite*, prin muncă prea mare, hrană neîndestulătoare, sau prin lactațiune prelungită, și-a pierdut o mare parte din principiile nutritive. 3. *Carnea animalelor prea ostenite*, cum este aceea a vitelor aduse la abator din depărtare prea mare, sau a vânaturilor mult gonite de câini, înainte de a fi împușcate, în care s'a dezvoltat o mare cantitate de *leucomaine*, substanțe tot așa de otrăvitoare ca și *ptomainele* de asemenea nu-i bună. 4. *Carnea animalelor bolnave de diferite boale parazitare* (animale sau vegetale), cum sunt: *tenia* (panglica) și *trichina* sau diferite bacterii și *actinomicetul*, cari se pot transmite la om, este periculoasă. Carnea animalelor bolnave de boale microbiene nu este bună de mâncat, căci ne poate îmbolnăvi; între aceste boale se numără: *dalacul*, *oftica*, *septicemia*, etc. — *Preparațiunile cărnii de mâncare*. Carnea *crudă* nu servește la mâncare decât numai la unele popoare sălbatice. Pe la noi ea nu se întrebuințează decât numai ca tratament, în unele boale de stomac, în oftică, etc. Pentru mâncare carnea se prepară în mai multe moduri, cu ajutorul căldurii. Dacă fierbem carnea mai mult timp avem *zeama de carne*, sau *bulionul* și *rasolul* (v. aceste cuvinte). Zeama de carne nu este hrănitore, de oarece principiile nutritive rămân în rasol, iar în bulion nu trec din carne decât numai sărurile și gelatina, ea însă are un rol

important întrucât atâtă secrețiunea sucului gastric, grăbind mistuirea. Cel care mănâncă la începutul mesei puțină supă mistuie mai ușor. Rasolul este foarte hrănitor, dar se mistue mai greu decât *friptura* care este cel mai bun mod de preparare al cărnii. Prin frigere, fie la grătar, sau la frigare, se desvoltă în carne un fel de aromă plăcută care întetește apetitul. *Ex-tracte de carne*, așa de răspândite în comerț, nu sunt hrănitoare, de oarece nu conțin substanțe azotate asimilabile. Luate în cantitate mai mare pot fi chiar periculoase, conținând prea multe săruri de potasiu. — *Regimul animal*, în care omul nu se hrănește decât numai cu carne, nu este bun, este chiar periculos. Acest regim produce constipație, grăbește bătăile inimii și mișcările respiratoare, micșorează cantitatea urinii, a cărei culoare devine mai închisă, iar, dacă omul nu face mișcare, exercițiu suficient, el capătă *pletoră*, adică supra-abundență de sânge, cu tendință la congestiuni și la apoplexie, gută, gravelă, boale de piele. Prin urmare omul nu se va hrăni numai cu carne, ci va urma un *regim mixt*.

Carne (Zeamă de). — V. *Bulion*.

Carne fiartă. — V. *Rasol*.

Carne tocată. — V. *Tocătură*.

Carotida (artera mare a gâtului). — Avem câte o arteră de fiecare latură a gâtului. În stânga pleacă din *aortă* și în dreapta din trunchiul *brachiocefalic*. Fiecare din aceste două artere se împarte, la gât, în alte două ramuri: una *carotida externă*, care se ramifică, la rândul ei, la gât și cap și altă *carotidă internă*, care merge la creier. Carotida fiind una din cele mai importante artere ale corpului, prezintă o deosebită importanță: rănită poate aduce moartea în cel mai scurt timp. Ramificațiile ei se întind la toate părțile capului. În cazurile de emoragii mari, fie ale carotidei, fie ale uneia din ramurile ei, putem să le oprim apăsând-o, cu putere, pe latură gâtului, mai jos de ureche și mai înainte.

Carp (lat. *carpus*, grec. *karpos*, pumn). — Se numește astfel scheletul pumnului, compus din opt oase mici (arșice) așezate între antebraț și

mână. Aceste oase sunt așezate pe 2 rânduri: unul deasupra (antibrachial) care cuprinde mergând dinafară înăuntru: *scafoïdul*, *semi-lunarul*, *piramidul* și *piziformul*; celalt inferior, care cuprinde: *trapezul*, *trapezoidul*, *marele os* și *osul cu cârlig*. Aceste două rânduri se articulează între ele printr'o mulțime de ligamente (v. *Pumn* și *Mână*).

Cârpă. — V. *Compresă*.

Cartilaj (lat. *cartilago*), *sgârciu*. — Țăsut elastic, care constituie la început scheletul fetului, iar mai târziu se transformă în os, se osifică, afară de unele părți cari rămân pentru toată viața sub formă de sgârciu, cum este sgârciul nasului, al urechilor, epiglota, laringele, tracheia, sgârciurile dela încheieturi, dela coaste, etc.

Cârțiță. — V. *Răpciungă*.

Cartofi, *băraboii*, *cartoașe*, *crumpiri*, *picioci*, *țermer* (*Solanum tuberosum*, fam. Solanaceelor). — Plantă erbacee, originară din America de Sud (Chili),

care se cultivă foarte mult pentru tuberculele sale bune de mâncat. Din punct de vedere igienic cartofii sunt un aliment sărac, puțin hrănitor, din cauză că ei cuprind substanțe albuminoide în cantitate mică, abia 1.8%, dar în schimb au mai multe hidro-



Fig. 83.—Cartofi

carbonate (20.5%). Din pricina compoziției lor cartofii nu pot servi singuri de hrană, decât numai luați în cantitate prea mare, ceea ce ar obosi stomacul. — Pentru aceasta ei trebuie pregătiți, sau mâncați cu carne, cu lapte, etc. cari au mai multe albuminoide. Substanțele albuminoide sunt îngrămadite în părțile de sub coaje, pe câtă vreme miezul este format numai din făină, de aceea, când se gătesc cartofii, trebuie jupuiți de cămașă, iar nu curățiți cu cuțitul, căci atunci se ia cu coaja tocmai partea mai hrănitoare a lor și tot din această cauză, când se prăjesc cartofii, nu trebuie să fie arși la suprafață. Cartofii se potrivească mai cu toate stomacurile și cu

toate constituțiile; ei nu produc gaze ca fasolea, linte și mazărea, cari însă sunt cu mult mai hrănitoare decât cartofii. Un mare avantaj au cartofii că se pot găti în foarte multe forme; ceea ce îi face să fie așa de plăcuți la gust, chiar și când sunt numai fripți, ei sunt buni și ușor de mistuit, cu condițiune însă ca să fie gătiți cu unt bun, sau cu grăsime de calitate bună. Pireaua de cartofi este iarăși foarte gustoasă și sănătoasă. Mulți aleargă după cartofi noi, fără să știe că aceștia se mistuie mai greu decât cei vechi. În medicină se întrebuințează cartofii numai pe dinafară, aplicându-se pe arsuri cartofi rași, cari calmează durerile. Din cartofi fierți se fac *cataplasme*.

Cărunțeală. — V. *Canție și Păr.*

Casa copilului. — V. *Placentă.*

Căsătorie (lat. *matrimonium, conubium*), *însurătoare, măritiş, cununie*. — După lege bărbatul se poate însura la vârsta de 18 ani, iar femeia se poate mărita la 15 ani, pe câtă vreme igiena cere ca soțul să fie cel puțin de 22 ani. Pentru bărbat însurătoarea la etate de 18 ani este foarte primejdioasă, căci mortalitatea este de 5 ori mai mare decât la cei ce se însoară după 22 de ani. La femeile măritate la 15 ani mortalitatea este mai mare aproape de 2 ori decât la cele de 20 de ani. Femeia măritată prea de timpuriu, prea tânără, mai ales dacă rămâne des însărcinată, este supusă la boale cronice de mitră și de ovare, cari o țin mult timp în pat și o predispun la cloroză, la anemie și chiar la oftică. Un copil născut dintr-o mamă mai mică de 18 ani se naște slab și bolnăvicios, ceea ce mărește grijile și oboselile mamei. — Vieața regulată, pe care o duce omul în căznicie, îl apără de multe neajunsuri, de multe boale, pe câtă vreme vieața celibatară îl predispune în grad mai mare la moarte, la nebunie, la sinucidere, la crime; mortalitatea oamenilor căsătoriți fiind de 100 aceea a oamenilor celibatari este de 160 și a văduvilor de 280 (socotite toate aceste cifre pentru etatea de 30—35 ani). Deasemenea sinuciderile fiind de 100 pentru cei căsătoriți, ajung la 111 și 250 pentru celibatari și văduvi; tot astfel atentatele la vieață și la proprietate, precum și nebunia, se

văd de două ori mai des la cei neînsurați. — Căsătoriile între rudenii nu sunt periculoase pentru copii, când părinții sunt sănătoși și au constituție bună; ele sunt însă rele când amândoi soții sunt slabi, nervoși, sau sunt atinși de una din formele artritismului (astmă, gută, obezitate, reumatism). Dar în aceste cazuri când copiii ies bolnăvicioși, sau predispuși la boală, nu se poate învinovăți consangvinitatea, ci starea rea a sănătății părinților, care are aceleași efecte rele asupra urmașilor și în cazurile când părinții nu sunt nici într'un grad de înrudire între ei.

Căscara sacrada. — Coaja unei plante *Rhamnus purshiana* din fam. *rhannaceelor*. Lucrează ca *laxativ* (curățenie). Se dă în praf: (50 până la 75 ctgr.), în pilule, sau în pilule (hapuri).

Căscare, căscat (*oscitatio*, franț. *baille ment*). — Act care constă într'o inspirație mare, adâncă și înceată cu depărtarea falcilor, urmată de o expirație de asemenea prelungită și adeseori sgomotoasă. Căscatul este de natură nervoasă și are de scop de a introduce în plămâni o cantitate mai mare de aer decât se face într'o respirație ordinară și aceasta pentru a primi sângele, care tinde a se îngreuna și a circula mai încet. Cauzele căscatului cele mai obișnuite sunt: pofta de a dormi, plictiseala, ascultarea, sau citirea unor scrieri prea puțin interesante, sau a unor discursuri politice, ori academice, sau a unor conferințe rău lucrate și monotone predate, apoi mai este foamea. Uneori căscatul este și un semn de boală, sau de indispoziție; acei cari au mistuirea grea încep a căska după masă câte 1—2 ore, având în același timp o greutate la stomac. Alții încep a căska ori de câte ori sunt cuprinși de vreo slăbiciune, sau amenințați de leșin (sin-copă). În aceste cazuri trebuie tratată boala adevărată. Se mai întâmplă la unii, când căscă prea tare, de li se *scrintește* (luxează) falca de jos, de aceea este bine să fim cu băgare de seamă când căscăm, să nu depărtăm prea mult falcile.

Căscarila. — V. *Odogaci*.

Castan, căstăniu, (*Castanea vesca*

sau *costanea sativa*, fam. fagaceelor). — Arbore originar din sudul Europei și din Asia, care crește și prin



Fig. — 84. Castan

părțile noastre, mai ales în munții județului Gorj (Tismana) și în Mehe'dinți (Cerneț). Se cultivă mult pentru fructele lui, care sunt bune de mâncat (*castane*) și pentru lemnul său prețios. *Castanele* fierte sau prăjite, sunt un aliment sănătos

și hrănitor conținând multă *feculă*, ele nu sunt bune pentru cei ce suferă de diabet, de obezitate, de dispepsie.

Castan sălbatic, *castan porcesc*, *castan de cai* (*Aesculus hippocastanum*, fam. Acerineelor). —

Arbore originar din nordul Greciei, cultivat mult în Europa ca plantă ornamentală. (Mai Iunie). Fructele sale, numite *castane de India*, precum și ramurile tinere și scoarța, se întrebuințează în contra frigurilor (febrifug). — *La țară* cine vrea să nu sufere de *brâncă* poartă la gât o castană învelită într'o cărpă.



Fig. 85. — Castan sălbatic

Castoreu. — Produs odorant solid al unui animal numit *Castor fiber*, din clasa Mamiferelor, care trăiește în țările de nord ale Americii și Asiei. Castoreul conține acid benzoic, o materie grasă cristalizabilă (*castorina*), asociată cu alte materii grase și rezinoase, un ulei volatil, carbonat de amoniac, etc. Este bun în contra spasmeilor și pentru a ușura venirea regulelor (emenagog). — Se dă sub formă de: praf, 5 ctgr. până la 1 gr. și 50 ctgr. tinctură alcoolică, 2—5 gr., tinctură eterată, 2—5 gr., idrolat, 20—60 gr. Pe *dinafară* sub formă de ulei, în ungeri.

Castrăție, scopire. — Scoaterea, prin operație, a unuiu, sau ambelor testicule, la bărbat sau ovarelor la femeie.

Această operație nu se face de cât atunci când, fără ea, bărbatul sau femeia ar fi expusi la suferințe prea mari, sau la moarte.

Castravete, (*Cucumis sativus*, fam. cucurbitaceelor). — Plantă originară din Asia. Fructul de castravete are o carne apoasă, puțin hrănitoare, cam greu de mistuit și fadă, așa că pentru mâncare trebuie să i-se pună condimente, sare, piper și oțet. În schimb însă, castravetele este răcoritor, din care pricină se întrebuințează așa de mult la mâncare, mai ales în poporul nostru, unde se consumă în cantitate foarte mare, sub formă de murături. Nu trebuie să se facă abuz, căci obosește stomacul și ne putem îmbolnăvi, iar în schimb nu ne ajută aproape la nimic, căci nu este hrănitor. Cu sucul de castravete, dacă i-se adaogă untură de porc, grăsime de vacă, balsam tolutan și apă de trandafiri, se prepară un fel de pomadă, sau alifie, cu care se unge pielea iritată, crăpată, pârlită, jupuită. Această alifie se răncezește ușor și nu se poate întrebuința decât fiind proaspătă. — La țară se spală pe obraz cu zeamă de castraveți, pentru părleală, ca să se facă pielea albă. Cărceii fierți cu vin alb, vechiu, se beau pentru durere de pânțece. Castraveții murați (acri), prăjiți cu unt de lemn, se pun la udmă ca să dea înapoi. Zeama de castraveți murați se bea ca curățenie, câte un pâhar pe stomacul gol. Ca să liniștească durerea de cap în timpul frigurilor se taie un castravete în două și se pune câte o jumătate la tâmplă.

Catalepsie (gr. *katalipsis*, *dela katalamvanein*, a surprinde, a apuca). — Prin acest cuvânt se înțelege o stare nervoasă bolnăvicioasă, care se observă la nebuni. Catalepsia vine prin atacuri, a căror frecvență și durată variază foarte mult. De obicei atacul de catalepsie izbucnește repede, în mod subit; corpul întreg rămâne în poziția în care se găsește în acel minut și această poziție o păstrează în tot timpul atacului, oricât de mult ar ținea el. Dacă cineva din jurul bolnavului îi schimbă această poziție, ceea ce o poate face cu înlesnire, bolnavul păstrează noua poziție până la sfârșit: se poate da capului, trunchiului, membrilor po-

zițiile cele mai variate, cele mai ciudate, poziții cu totul contrarii celor obișnuite și în cari bolnavul stă, ca și înțepenit, fără ca el însuși să-și poată lua altă poziție. În timpul atacului inteligența și sensibilitatea par a fi suprimate: bolnavul stă nepăsător față de tot ce se petrece în jurul lui, însă nu cade jos, inima nu-i încetează de a bate, plămânii lui răsuflă regulat, toate acestea deosebesc catalepsia de apoplexie, de sincopă (leșin) și de asfixie. Deci, ceea ce caracterizează catalepsia este starea de înțepenire instantanee a mușchilor, cari, pentru moment, nu mai sunt stăpâniți de voința bolnavului. Catalepsia nu este gravă prin sine însăși, pecăt este de gravă prin boala care a produs-o, isteria, sau nebunia. Atacurile de catalepsie par a fi produse mai cu seamă de emoțiunile morale. Aceste atacuri pot fi produse și după voință, la unele persoane nervoase și predispușe la ele, după cum poate fi produs somnul sau somnambulismul artificial. Catalepticii pot să nu mănânce timp îndelungat; s'ar părea că viața este în parte suspendată la ei. Astfel câteva linguri de zeamă de carne, luate în fiecare zi, sunt îndestulătoare traiului lor, chiar când această stare se prelungește peste marginile obișnuite.

Cataplasme (gr. *kataplassein*, a acoperi, a aplica pe deasupra). — Sunt niște doctorii cari se întrebuințează pe dinafară, punându-se pe pielea părții bolnave. Se prepară din diferite făinuri, prafuri, foi și pulpe vegetale cu apă, sau cu lapte. Cele mai adeseori cataplasmele se întrebuințează pentru umezeala lor, fiind adevărate băi locale, cari se aplică pe răni, pe inflamațiuni, pentru ca să liniștească, sau să domolească durerile, arsurile și mâncărimile. Se prepară de obicei din făină de in, de orez, sau chiar de porumb, din scrobeală, din feculă de cartofi, din miez de pâne, lucruri cari au toate însușirea de a înghiți apa și a o păstra mult timp. Cataplasmele lucrează după temperatura lor: fiind reci, ele opresc inflamația și împiedică formarea puroiului; fiind foarte calde, înlesnesc coacerea și prin urmare formarea puroiului, din care pricină se mai numesc și *maturative* (cari gră-

besc coacerea), fiind calde sau călduțe, ele sunt *emoliente* și domolesc durerile (*calmante*). — Unele se prepară la rece

cele de *făină de muștar*, de *cartofi*, de *usturoiu*, de *morcovi*, cele mai multe însă se prepară la *cald*. Cele de *făină de in*, se întrebuințează mai mult decât toate și se prepară astfel: se amestecă 2 părți de făină de in (cam 120 grame pentru o catapasmă obișnuită) cu 3 părți apă rece și apoi se fierbe, amestecând într'una cu o lingură ca la mămliguța pripită; să nu fie nici prea subțire, nici prea vârtăoasă, ci potrivită. Cataplasma astfel preparată se întinde între două cârpe debumbac, sau de



Fig. 86. — Cum se prepară și se aplică o catapasmă caldă de ierburi

între două cârpe debumbac, sau de



Fig. 87. — Cum se prepară și se aplică o catapasmă cu muștar și in

pânză de in, ori de tifon îndoit în mai multe și să fie întinsă mai groasă

pentru ca să nu se răcească iute; apoi, fiind gata, se aplică pe partea bolnavă, de care se leagă cu o batistă, cu un tulpă, sau cu o fașe, după cum este și locul pe care se aplică. Cataplasmele de *scrobeală* (amidon), de *feculă de cartofi*, de *făină de orez*, de *miez de pâine*, se prepară ca și cele de făină de in. Se vor schimba îndată ce încep a se răci, la 2—3 ore. Pentru ca ele să se răcească mai încet, prin urmare să țină mai mult, este bine să le acoperim cu o gutapercă îndoită, sau cu o pânză cerată. *Cataplasme revulzive* sunt acele cari trag sângele dintr-o parte a corpului în altă parte, dela cap la picioare, din adâncime la suprafață. Acestea se fac de obicei cu *făină de muștar* și se numesc și *sinapisme*.

Catar (gr. *katârroos*, scurgere), *gutturăiu*, *troahnă*. — Constă într-o creștere trecătoare a cantității lichidului care se găsește de obicei la suprafața membranelor numite *mucoase*, cari căpтуșesc pe dinăuntru organelor noastre. *Nasul* are o mucoasă care în totdeauna dă un fel de umezeală, fără de care nu am putea avea miros; *bronchiile* au o mucoasă al cărei lichid o ține în stare de umezeală trebuincioasă; tot așa urechea, stomacul, beșica, etc. au câte o căpтуșeală de aceeași natură, care în totdeauna dă un lichid trebuincios, pentru împlinirea slujbii lor. Când cantitatea acestui lichid se mărește mult, apare catarul. De obicei când zicem numai simplu catar, înțelegem pe acela al bronhiilor, catar *bronchic* sau *pulmonar*, care, de cele mai multe ori, este însoțit și de catarul nasului adecă de *gutturăiu*, și atunci avem *gutturăiu* cu *tusă*. — *Catarul bronchic* se desvoltă cele mai adeseori în urma unei, sau mai multor *bronchite*, acute sau cronice. După o *tusă* mare, în timpul căreia fața se învinețește și respirația se face așa de greu încât se pare că este o adevărată sufocație, bolnavul începe să scuie o mare cantitate de lichid incolor, filant, transparent, spumos, care seamănă cu albușul de ou subțiat cu apă. Catarul prin sine însuși nu este grav, dar este supărat și obositor și poate să devie primejdios când este întreținut de o bronchită cronică. De aceea trebuie ca bol-

navul să scape cât se poate mai iute atât de catar cât și de bronchită. Se recomandă gudronul sub toate formele: (apă de gudron, elixir, sirop, în inhalatii), sirop de codeină, sirop diacod simplu, sau cu sirop de tolu, din când în când vomitive (ipeca), muștare la pulpe, sau băi la picioare cu muștar, ventuze uscate pe piept.

Catar de nas. — V. *Coriză*.

Cataractă, perdea. — În stare normală lumina pătrunde în ochi printr-o ferestruică numită *pupila* și străbate succesiv, mai multe straturi transparente, între cari este o lentilă numită *cristalin*, până ce ajunge în fundul ochiului, pe *retină*, pe care ea desemnează chipul obiectelor pe cari le vedem. În boala numită *cataractă*, sau *perdea*, *cristalinul* nu mai este transparent, ci devine *opac* prin formarea pe loc a unor părțicele solide, sau a unei substanțe molatice, sau a unor picături uleioase, dispuse sub formă de stea, de triunghi, etc. De aci rezultă că lumina fiind împiedecată în drumul ei spre fundul ochiului, vederea obiectelor exterioare este micșorată sau nimicită, după cum *cristalinul* a devenit *opac* numai într-o parte, sau peste tot. *Perdeaua* nu se face repede, dintr-o dată, ci de obicei pe încetul. Vederea începe mai întâiu să slăbească, adică bolnavul vede lucrurile ca printr-o ceață, ca printr-o sită. Vederea este mai bună la întineric, spre înserate, la umbră, pe timp noros, decât când soarele luminează cu putere, ceea ce face ca bolnavul să meargă atunci cu capul plecat în jos. Când *cristalinul* este cu totul *opac*, bolnavul nu mai vede de loc, nu mai poate deosebi nici un lucru, are numai zarea luminii, adecă simte când este ziua sau noaptea. *Tratament*: numai operația, adică *extrația* cataractei, pe care o face numai doctorul specialist, singurul în stare de a ști când și cum trebuie făcută această operație. Tot ce putem recomanda acestor bolnavi este ca să nu umble prin babe, să nu-și pună nimic în ochi, decât numai ceea ce le dă doctorul, până când *perdeaua* este *coaptă* și se poate scoate.

Cataracta se arată de obicei către bătrânețe (după 40 de ani la femei și 50 de ani la bărbați); fiind urmarea

fiească a îmbătrânirii cristalinului. Sunt cazuri însă când o întâlnim în copilărie (unii copii se nasc cu ea) și la tineri. Spre deosebire de această cataractă naturală, mai întâlnim alta patologică, adică produsă de unele boale și încă o formă, cea traumatică. Aceasta se ivește ori de câteori pătrunde un corp tare în cristalin și-l înțeapă.

Cristalinul normal ajută să vedem clar, când îl vom scoate, fiindcă s'a îmbolnăvit de cataractă, va trebui să-l înlocuim cu o lentilă de forma și puterea lui, cu un ochelar. De aceea operații de cataractă poartă totdeauna ochelari, pentru că numai astfel vor vedea clar.

Catechiu. — Este un suc care se scoate din *Areca Catechu* (fam. Palmirelor) și *Acacia Catechu* (fam. leguminoaselor), cunoscut în băcănii sub numele de *Kiat-hindi*. Acest suc astrigent și tonic se aduce în bucăți solide, cubice, de culoare roșie închisă pe dinafară și cafenie pe dinăuntru, fără odoare, gust astrigent, dulce la început, apoi amar. Conține un *venin* special: *catechină*. Se dă sub formă: de praf, 55 ctgr. până la 8 gr., de *înctură* ($\frac{1}{2}$), 30 gr., de *sirop*, 20—150 gr., de *pastile*, de câte 10 ctgr. una, de *tizane* din 10 la 1000. Pe *dinafară* 2—4 gr. la 100 în injecțiuni. Se recomandă în diareie (urdinare), în boalele de gură și de gât, cu tendință spre emoragie, umflarea și înmoierea gingiilor, scorbut.

Căfel de Frasin. — V. *Cantaride*.

Catran. — V. *Gudron*.

Cauciuc, gumă elastică. — Este sucul îngroșat, care se scoate prin tăieturi făcute în trunchiul unor arbori sau arbuști din America. Acest suc este alb și lăptos când curge din copac și este adus în Europa sub formă de butelii mici, de culoare închisă sau roșietică. După ce se prepară el devine alb, rezistent, foarte elastic, fără miros, fără gust, nu se strică la aer, nu se topește în apă, dar se înmoaie în apă fierbinte. La frig se întărește, iar la căldură se moaie. După ce a fost *vulcanizat*, adică supus la acțiunea sulfurului (a pucioasei) își păstrează elasticitatea la orice temperatură. Cauciucul fiind elastic și flexibil este foarte

bun pentru fabricarea multor instrumente de medicină și de chirurgie și anume: sfârcuri, biberoane, danturi ciorapi pentru varice, perini umplute cu aer, saltele umplute cu apă, punți pentru ghiață, diferite încingători ortopedice, etc. Cauciucul, fiind impermeabil, adică nepătruns de apă, sau de oricare alt lichid, se întrebuințează și la prepararea stofelor cari se pun în patul copiilor, al bolnavilor și răniților, pentru a apăra saltelele și perinele de a se uda, sau murdări (mușamale). Tot din cauciuc se mai fac și mantale de ploaie, cari sunt bune, cu condiție ca să nu le purtăm prea mult, ci numai când avem neapărată trebuință de ele, căci împiedică în același timp și evaporatia lichidelor, a sudoarii care iese din corp, ceea ce nu este bine pentru sănătate. Tot din cauciuc se mai fac diferite canule, sonde, bugiuri, lighenase și tuburi de drenaj, de irigație, etc.

Causalgie (gr. *kâsis* = arsură, *algos* = durere). — O nevralgie caracterizată prin dureri, sub formă de arsuri, localizate la palme și tălpi. Se crede că-i vorba de o inflamație a plexului simpatic (nevrită) ce însoțește vasele nervilor. Tratamentul cel mai sigur este operația sau injecția cu 2 cmc. de alcool de 60°, în trunchiul nervului bolnav, dureros.

Caustice și corozive. — Substanțe cari au însușirea de a arde, sau a nimici țesăturile pe cari se aplică. Acțiunea lor arzătoare este mică, moderată, din cauza că sunt puțin caustice, cum este *alunul calcinat*, sau fiindcă se întrebuințează în cantitate mică și numai printr'o simplă atingere repede, cum sunt: *nitratul de argint* (piatra iadului) și *acidul azotic* (apa tare) și *acidul cromic*. Causticele propriu zise sunt: fierul roșu, acidele tari, clorul de *antimoniu*, pasta arsenicală, *potasa caustică*, *calciu* (varul nestins), *amoniacul* concentrat cari produc escare. — *Otrăvirea cu caustice acide și cu alcali* are următoarele semne: dureri foarte mari pe tot locul pe unde au trecut causticele, dela gură până la stomac, dar mai cu seamă la lîngurea. Urmele arsurii se văd pe buze, în gură, sub forma unei cojițe mai mult sau mai puțin groasă de substanță mortificată,

care poate fi negricioasă (acid sulfuric sau vitriol), gălbuie (acidul azotic sau apă tare), albă (acidul cloridric), cenușie (potasă, amoniac). — *Tratamentul*. În otrăvirea cu *acide* vom da doze mari de apă cu săpun și de untdelemn, bicarbonat de potasă, de sodă, carbonat de amoniac, sau chiar leșie comună, cu sodă mult diluată cu apă, magnezie sau apă de var, lapte, ceai. În otrăvirea cu *alcali*, cu amoniac, se va da oțet cu apă, zeamă de lămâe, sau de portocale, acid acetic, sau oricare alt acid diluat cu apă multă.

Cautere și cauterizație. — Sunt a-nume instrumente, numite *cautere*, cu cari se ard, adică se cauterizează în mod superficial, țesăturile. Intre acestea avem *galvanocauterul*: un fir de platină care se înroșește cu ajutorul unei pile electrice cu bicromat de potasă. Se întrebuințează mai cu seamă în tumorile limbii și ale colului mitrei, ale ploapelor și globului ocular. Tăind cu acest instrument se împiedecă emoragiile și se previn durerile cari urmează după operație. Cel mai întrebuințat este *cauterul lui Paquelin* sau *termocauterul*, care este bazat pe însușirea pe care o are platina de a condensa, pe când este încălzită până la roșu, vaporii și gazele și de a rămânea incandescentă tot timpul cât vin în atingere cu ea vaporii de benzină, împinși cu ajutorul unui suflător. Mulțumită acestui instrument se pot face în câteva clipe o mulțime de *puncte de foc*, cari sunt cu atât mai puțin dureroase, cu cât platina este mai mult încălzită, până la alb. Când n'avem la îndemână nici galvanocauter nici termocauter și este neapărată trebuință să ardem, pentru a opri o emoragie, o mușcătură de animale turbate, sau veninoase, ne putem servi de orice metal, de orice fier încălzit. până la roșu.

Caverna. — V. *Tuberculoză*.

Cazeină. — V. *Lapte*.

Cazeină vegetală. — V. *Legumină*.

Ceacăr. — V. *Strabism*.

Ceafă, greabănu gâtului. — Partea dinapoi și de sus a gâtului.

Ceaiu. — Se numește astfel produsul vegetal, preparat din frunzele arbustului *Thea chinensis*, din fam. *teaceelor*. Frunzele preparate se întrebuin-

tează pentru a face, prin infuziune, o băutură foarte mult întrebuințată și cunoscută sub numele de *ceaiu*. În comerț se cunosc două feluri de ceaiu: *ceaiul verde* și *ceaiul negru*, cari diferă între ele după modul de preparațiune, iar numeroasele varietăți ale acestor două feluri depind de etatea frunzelor și a arbuștilor, precum și de diferitele feluri de preparațiune. *Ceaiul* are un gust și un miros plăcut, care se datorește unui ulei esențial, gălbui. Conține un alcaloid numit *teină*, mai conține *tanin* și un principiu azotos, analog cu *caseina* din lapte etc. Proprietățile ceaiului se apropie mult de ale cafelei, însă el este mai excitant și mai puțin hrănitor. El stimulează funcțiunile digestive, circulația sângelui, secrețiunile, căldura animală și facultățile intelectuale, dacă se ia în doză moderată. În doze mari și repetate ceaiul produce insomnie, neliniște, tremurături, bătăi de inimă. Toate popoarele cari locuiesc în țările nordice și friguroase, consumă foarte mult ceaiu, pe cari îl beau și la masă și printre mese, la orașe. În medicină ceaiul se întrebuințează în cazurile de mistuire grea, provenită din încărcare de stomac, în acest caz se bea o ceașcă de ceaiu simplă, sau cu o linguriță de rom; în cazurile de răceală de asemenea este bun. Ceaiul se prepară turnând o jumătate litru de apă fierbinte peste 2—4 gr. de frunze și lăsând până se colorează bine apa.

Ceaiu. — V. *Infuziune*.

Ceapă (*Allium cepa*, fam. liliaceelor). — Plantă erbacee bulboasă cu miros particular, care se cultivă din vechime pentru trebuințele bucătăriei. Ceapa conține o esență sulfurată, iute, căreia i se datorește mirosul său înțepător și însușirea de a irita ochii până la lacrimi. Prin fierbere și prăjire ceapa își pierde o parte din



Fig. 88—Ceapă iuteală, așa că se poate întrebuința ca condiment într'o mulțime de sosuri și de mâncări (stufat, etc.), sau sub formă de piureuri. — La țară ceapa se întrebuințează foarte mult ca *doctorie*, atât pe

dinăuntru, cât și pe dinafară. Pe *dinafară* ceapa se întrebuințează în *bu-boae* și anume se ia o ceapă, se coace în spuză, se scoate miezul și se pune în scobitură o bucată de lumânare de seu, se leapădă coaja și așa caldă cum este se pune câte o foaie pe bu-boiu. Se mai întrebuințează la *gâlci*, *surpături* (ernie), *dureri de pânțe*, *nă-jit*, *guturaiu*, *râni*, *înțepături de albine*, *de viespi*, în *choleră* chiar, sub diferite forme și preparățiuni.

Ceapă blândă. — V. *Praz*.

Ceapa ciorii. — V. *Brândușă de toamnă*.

Ceapă de mare (*Scilla maritima*, fam. liliaceelor). — Plantă erbacee bulboasă, originară din regiunea mediteraneană. În medicină se întrebuințează numai bulbul, al cărui principiu activ se numește *scilitină*. Este un puternic diuretic, excitant, expectorant. Adeseori se asociază cu digitala. Se dă sub formă de extract: alcoolic, 2—20 ctgr. oximel scilitic, 15—30 gr., praf, 10—30 ctgr., tinctură, 1—5 gr., vin 10—60 gr., vin compus, 15—60 gr., oțet, 10—30 gr., iar pe *dinafară* sub formă de liniment.

Ceață, negură, păclă. — Este foarte nesănătoasă, răcind iute corpul și când respirăm cu gura deschisă ea merge deadreptul în laringe și în bronhii, producând durere de gât, răgușeală. Pentru a ne apăra de toate acestea cel mai bun lucru este să nu ieșim din casă când este păclă. Dacă suntem siliți să ieșim, să nu vorbim pe drum, să nu deschidem gura. Ținând o batistă la gură, vom merge repede, fără să ne oprim pe drum, vom căuta să fim bine îmbrăcați și hainele bine încheiate. Făcând toate acestea vom scăpa ușor de ori ce neplăceri produse de ceață.

Cecitate. — V. *Orbire*.

Cefalalgie (dela grec. *kephali*, cap, și *algos*, durere) și **Cefalee**. — Durerea acută de cap se chiamă *cefalalgie*.

Cefalorahidian (*Lichid*). — E un lichid clar ce se găsește în cavitățile ventriculare ale creierului și în spațiul dintre piamater și arahnoida măduvei spinării. Conține la litru 985 gr. apă; 7 gr. clorură de sodiu, albumină 0.30 gr., carbonați alcalini urme și zahăr 0.50 gr. Servește de regulator circu-

lației cerebrale și mădule, compensând afluxul mai puțin mare al sângelui. Când se întâmplă ca stânca osului temporal să fie foarte adânc fracturată, lichidul cefalorahidian se scurge prin urechi. Ca să extragem lichid cefalorahidian, pentru examen chimic, sau microscopic, facem *puncție lombară*. În meningitele tuberculoase și cele sifilitice este clar, turbure în anumite stări meningiale infecțioase, *purulent* în meningite acute pneumococice, meningococice, streptococice, *hemoragic* în cazuri de emoragii cerebrale, de traumatisme craniene. În stare normală, mai în totdeauna prin puncția lombară, se scurge picătură cu picătură; în diferite boli se modifică acest fel de a se scurge. De ex. în meningite, sau în tumori cerebrale se scurge repede și se zice că are *tensiune mare* (*îpertensiune*). Tensiunea o constatăm cu un aparat special numit *manometrul lui Claude*. În lichidul cefalorahidian se pot injecta seruri antimicrobiene și medicamente: salvarsan (în *sifilis*), stovaină, novocaină (în *rahianestezie*), ser antimeningococic (în meningită) etc.

Celer. — V. *Țelină*.

Celperit. — V. *Sifilis*.

Centenari (lat. *centum*, sută). — Cei cari au împlinit o sută de ani se pot numi cu mândrie *centenari*. În cărțile sfinte se povestește de mult pomenitul Mathusalem, care ar fi trăit nici mai mult nici mai puțin decât 969 ani, apoi mai sunt și alți patriarhi, cari ar fi trăit aproape tot cam atâta. Nouă însă nu ne vine a crede că anii pe vremurile acele ar fi fost tot așa de lungi ca anii noștri, dar s'o lăsăm încurcată căci nu e bine să ne atingem de cele sfinte. În timpurile mai apropiate de noi se pomenesc următorii centenari, vrednici de a fi trecuți la nemurire: Henric Jenkins, un englez care a murit la 1670 în etate de 169 ani, și care, pe când atingea sută, înnota apa în susul ei; Surrington din Norvegia care a murit în 1797, în vârstă de 160 ani și al cărui fiu mai mare avea 104 ani, pe când fiul cel mai mic n'avea decât 9; Gurger Douglas mort în Germania în 1796 la 120 ani, care a avut 8 copii, din căsătoria a treia, pe care a făcut-o la etatea de

85 ani. Doctorul francez Dufournel a avut cinstea să fie dus înaintea împăratului Napoleon în 1810, pe când avea 112 ani; a murit când avea împliniți 120 de ani. Politiman, un chirurg, care s'a născut la 1685 și a murit la 1825 în Lorena, în etate de 140 ani, operând, se zice, în ajunul morții o femeie atinsă de rac. În 1881 s'au numărat în Europa 3108 de centenari (1244 bărbați și 1864 femei) la o populație de 242 milioane de locuitori. Cei mai puțini centenari erau în Belgia, Danemarca și Elveția. În New-York tot pe vremea aceea trăiau 29 de centenari. În Paris a murit, în anii din urmă, învățatul chimist Chevreul care trecuse de 102 ani, ceea ce dovedește că munca cu mintea nu scurtează viața și că mai iute moare leneșul. Dacă cercetăm traiul bătrânilor trecuți de sută la toți găsim o viață liniștită, fără multe emoțiuni, cât se poate de cum-pătată și foarte regulată. Acest lucru trebuie să ni-l însemnăm și să ducem aceeași viață, dacă voim să atingem suta (v. *Longevitate*).

Cerat. — Medicament compus din ceră albă și ulei de migdale dulci, la care se mai pune și puțină apă de trandafiri, pentru miros, uneori și puțin carmin la pomada ce se pune la buze. Ceratul se întrebuințează numai pe dinafară, producând o simțire de răcoreală plăcută și când voim să fie mai calmant, putem să-i mai adăugăm laudan, extract de opiu, sau de beladonă. Ceratul se pune pe tot felul de răni, sau răniri, la arsuri, la sgărieturi și crepături de piele, etc. Se răncezește repede și atunci, în loc să calmeze, irită rănilor, din care pricină nu se mai întrebuințează astăzi, înlocuindu-se cu glicerină, sau vaselină, cari sunt mai bune.

Cerc, bandaj erniar. — V. *Ernie*.

Cercei. — Când se pătrund urechile la o fetiță, de multe ori se întâmplă că înțepătura se vindecă numai în partea de sus, iar în partea de jos, unde apasă cerceul, se inflamează și face puroi. În acest caz lucrul cel mai bun de făcut ar fi să se scoată cerceul. Adeseori rana nu se vindecă pe deplin nici odată, ci vecininc face puroi, și atunci, tot purtând cerceul, gaura se tot mărește în jos, se lungeste

din ce în ce, până ce se despică în două sfârcul urechii și atunci, tot din spirit de cochetărie, se face o altă gaură alături. S'au văzut astfel urechi pătrunse de trei ori. La mulți copii, mai ales scrofuloși, s'au văzut diferite boale de piele provenite din pătrunderea urechilor. Între altele este eczema, care, începând dela rană, se poate întinde pe tot corpul. Cel mai bun lucru de făcut ar fi să nu se mai poarte cercei.

Cereale. — Cereale sunt toate plantele cari se cultivă, pentru ca grăunțele lor să slujească la hrana omului. Grăunțele acestea trebuie mai întâiu să fie măcinate, ceea ce face să se deosebească coaja, sau *țărâțele*, de miez, care singurul este bun pentru hrană și care constituie *făina*, din care se face *pâinea*, *mămăliga* și diferitele *paste* alimentare. Partea de căpetenie a grăunțelor cerealelor este o substanță numită *gluten*, care cuprinde *azot*, ceea ce face ca ele să se apropie întru câtva de alimentele luate din regnul animal și cu cât aceste grăunțe conțin mai mult azot, cu atât sunt mai hrănitore. Din acest punct de vedere *grâul* se află în frunte, iar la coadă *orzul*. Celelalte părți cari afară de gluten, se mai găsesc în grăunțele cerealelor sunt: amidon substanțe groase, gumoase și zaharate. — *Cerealele întrebuințate:* *Grâul* este cel mai bogat în gluten și din care se face pâinea și pastele alimentare. *Secara* este mai săracă în gluten și cu ea se hrănesc mai mult locuitorii săraci. *Orzul*, care la noi se dă numai la animale, servește la alimentația popoarelor din nordul Europei. El mai slujește și la fabricarea berii. Pâinea care se face din orz este grea. Orzul curățit de coaje și spălat se numește arpăcaș, care se pune în supă. Orzul curățit de coji și zdrobit mare constituie un fel de uruială, din care se prepară o gargară și o băutură răcoritoare (30 gr. la un litru de apă fierbinte). *Ovăzul* la noi se dă la animale. În Franța din făina de ovăz se face o fiertură pentru copiii mici, care este ușoară și hrănitore. *Porumbul* conține substanțe grase în cantitate mare și este temeiul hranei țaranului român. (*mămăligă*). Se mai întrebuințează la îngrășarea animalelor. *Orzul*

care servește la alimentație se întrebuințează și în medicină.

Cerebrală (Materie). — Se întrebuințează substanța cenușie a creierului mic dela vițel. Productul, curățit de grăsimi și uscat se dă în contra neurasteniei. Se întrebuințează în injecțiuni, sub piele, un extract lichid, sterilizat, al substanței cenușii (*Cerebrină* sau *Cerebrenină*). În Franța se întrebuințează același extract preparat cu substanța cenușie dela berbec. Doza pulverii: 2—4 gr. pe zi.

Cerebrospinal. — V. *Meningită*.

Cerebru. — V. *Creier*.

Cerul gurii, palat (lat. *palatum*). — Partea de sus a cavității bucale se numește *cerul* sau *palatul* gurii. El se compune dintr'o parte *anterioară*, care este tare, osoasă, formând un fel de *bolță* și dintr'o altă parte *cărnoasă*, membranoasă, numită *vălul* palatului, sau *vălul palatin*, care este mobilă (se mișcă). Marginea de sus a *vălului* este prinsă de marginea de dinapoi a bolții, marginea de jos are la mijlocul ei un fel de prelungire numită *omușor* (*împărătuș* sau *luetă*), iar marginile laterale se continuă fiecare cu partea cea mai depărtată a limbii, prin două îndoituri numite *stâlpi* sau *pilieri*, cari mărginesc o gropiță triunghiulară, în care se află așezată *amigdala*. Rolul bolții palatului este de a oferi limbii un sprijin rezistent pentru *masticarea* alimentelor, cari, după ce au fost tăiate și îmbucătățite de dinți și măsele, sunt sdrobite asupra acestui plan osos. Afară de aceasta, bolta palatului ajută vorbirea, modificând și întârind sunetele cari vin din *laringe*. Vălul palatului și omușorul, mulțumită înșuririi lor de a se mișca, servesc de capac între fundul gâtului și partea de dinapoi a nasului, capac care, în momentul când mâncăm și bem, se ridică și închide orificiul ca să nu se ducă mâncarea și băutura pe nas. Cei ce au fost bolnavi de sifilis, care le-a ros și găurit vârul platului, înghit foarte greu și de obicei mâncarea le dă pe nas; de asemenea ei *vorbesc pe nas*. *Rănilile* ușoare ale vârului palatin se vindecă ușor, repede, mai ales cele cari rezultă dintr'o înțepătură sau tăietură, făcută cu un os ascuțit, ac, cuiu, etc. Rănilile produse prin *armă*

de foc, sunt cu mult mai grave. *Inflamațiunile* cerului gurii se vor trata ca toate celelalte inflamațiuni.

Ceruză. — V. *Plumb*.

Cesariană (*Operația*). — Operația care se face tăind peretele pântecelui și fața anterioară a mitrei (uterului) spre a se scoate copilul, în cazuri când basinel este strâmtorat din diferite cauze și copilul nu se poate naște pe calea naturală. Când o femeie însărcinată moare, iar copilul trăește în uterul ei, este o datorie a medicului să facă operația cesariană, și să salveze copilul.

Cesvârtă. — V. *Coapsă*.

Chalazion citește *Șalazion* (dela gr. *chalaza*, grindină), *granulom*. — Mică umflătură (tumoră), de mărimea unui bob de grindină, care se ivește la pleoape (vezi *Ochiu*, *boale de...*).

Cheag. — Se numește a masă roșie gelatinoasă, în care se transformă sângele închegându-se. În termen medical se zice *coagul*. Cheagul oprește curgerea de sânge astupând vasele, la început în mod vremelnic, apoi în mod definitiv, printr'un fel de transformare fibroasă.

Chefir sau **Kefir**. — Băutură alimentară preparată cu lapte de vacă, fermentată sub influența contactului cu grăunțe de chefir, o ciupercă specială numită *dispora caucasia*. Chefirul este cu atât mai bogat în alcool cu cât s'a lăsat să dureze mai mult timp fermentațiunea. După 24 de ore se obține chefir *slab*, după 48 chefir mijlociu și după 3 zile chefir *tare*. Doză: 1—2 păhare până la 3 sticle pe zi. Se recomandă în boalele de stomac și în cazurile de slăbire.

Cheia. — Mănăstire de călugări în munții Prahovei; localitate de vilegiatură, la 3 ore de Vălenii de munte. Clima plăcută; împrejurimile păduroase și muntoase, pitorești.

Cheiloplastie (gr. *cheilos*, buză, și *plassein*, a forma). — Refacerea buzei în cazurile de pierdere de substanță. Sunt multe proceduri: cu unu sau mai multe lambouri laterale (cu baza superioară sau inferioară) cari se reunesc prin mai multe puncte de sutură, sau cu lambouri rectangulare cu bază inferioară.

Chelbe. — V. *Tinea*.

Chelen sau **Kelen**, *clorur de etil, eter-cloridric*. — Anestezic local, care se întrebuițează în pulverizațiuni ca și clorurul de metil; el produce un frig mai puțin intens, căci nu fierbe decât la 12°5; se poate conserva în tuburi de sticlă, vaporii lui sunt *inflamabili*. Se întrebuițează de către doctori și ca anestezic general, înlocuind protoxidul de azot și cloroformul în diferite operații.

Chelie. — V. *Păr și Tinea*.

Chelie căprească. — V. *Tinea (Favus)*.

Chelie fără bube. — V. *Peladă*.

Chenopodiu (*chenopodium ambrosioides*, fam. chenopodiaceelor). — Plantă erbacee care crește în Mexic și introdusă în Europa pentru cultură. Se întrebuițează iarba, adică foi, ramuri și flori culese uscate și conservate în cutii închise. Are miros pătrunzător, gust de camfor, aromatic și amarui. Lucrează ca antispasmodic. Se dă în ceaiu, 8—10 la 1000, în coree la copii.

Cheratiță (gr. *keras*, corneie). — Inflamația sau aprinderea corneei, care poate avea urmări grave pentru vedere prin formarea de *albeață*, de aceea trebuie instituit un tratament energic, chiar dela început. *Cauzele* cheratitei sunt: reumatismul, limfatismul, tuberculoza și sifilisul (cheratiță interstițială), variola. *Cauze locale*: ră-nirile. (V. *Ochiu*, boalele de).

Cheratocon. — V. *Ochiu*.

Chermes mineral. — V. *Antimoniu*.

Chestrui. — V. *Efelide*.

Chibrituri (Otrăvire cu). — V. *fosfor*.

Chil și Chim. — Chimul este amestecul care rezultă din mistuirea substanțelor hrănitore de stomac, de unde se duce în intestine și acolo o parte din el, numai partea hrănitore, se absoarbe sub numele de *chil* de către limfaticile intestinului, cari conțin de obicei limfă. Partea nehrănitore trece mai departe prin naștele groase de unde iese din corp sub numele de *materii fecale*.

Chimen, *chimin*, *chimion*, *săcărea* (*Carum Carvi*, fam. umbeliferilor). — Plantă erbacee care crește prin fânețele și pășunile de munte, umede și pietroase. Fructele aromatice, întrebuițate în medicină ca stomachice, carminative și diuretice. La *țară* se dă ciaiul,

sau fiertura de chimen, la copii când au *mătrice* (colici intestinale).

Chimen dulce. — V. *Molură*.

Chimion. — V. *Chimen*.

Chimion de apă, *chimion de baltă*. — V. *Mărăraș*.

Chină, *quinquină*. — Coaja sau scoarța diferitelor specii ale arborelui *cinchona* din fam. rubiaceelor. Arboarele *cinchona* crește spontan și în cultură în țările tropicale ale Americii meridionale, la altitudini de 1200—7300 metri. Speciile amintite sunt cele mai principale, cari dau în comerț cele trei feluri de *chină*, dar mai sunt și alte specii și varietăți, dela cari provin unele feluri de *chină*, ce vine din comerțul american. China are mai multe principii active: acidul chinic,



Fig.—89. Chimen Fig. 90.—Chinchină

chinina, *cinconina*. — *China galbenă*, a cărei coaje galbenă portocalie dă un praf gălbui, foarte amar, puțin astringent, foarte bogat în *chinină*, care este cel mai bun în contra frigurilor și ca tonic. *China cenușie* sau *fuscă*, se prezintă sub formă de coji subțiri, cenușii pe dinafară și gălbui pe dinăuntru, dă un praf gălbui cenușiu, mai mult sau mai puțin deschis, care este astringent și tonic. *China roșie*, a cărei praf este roșu, ține loc între cele două și este astringentă și febrifugă. Pentru combaterea frigurilor, se întrebuițează numai *chinina*, care lucrează mai iute și mai energic, iar coaja de *chină* se dă numai ca astringent și tonic. Pe *dinăuntru* se dă *china* sub următoarele forme: extract alcoolic de *china cenușie*, galbenă și roșie, 1—4 gr., extract apos, sau moale, de *china cenușie*, 1—6 gr., extract apos uscat de *china cenușie*, 1—4 gr., extract idro-alcoolic

de china galbenă și roșie, 2—4 gr., macerațiune, 10 la 1000, praf, 4—12 gr., sirop, 10—100 gr., tinctură, 5—20 gr., vin 30—100 gr.; Pe *dinafară* se întrebuințează praful de china, care se pune curat, sau amestecat cu praf de amidon, pe plăgile și rănilor cari se vindecă încet. — *Cinconidină*. Izomerul cinconinei se dă ca antipiretic: 5—30 ctgr. (antipiretic) și 30—40 ctgr. de 3—4 ori pe zi (febrifug). — *Cinconina* lucrează ca și chinina, însă este mai slabă, dându-se în doze de 3 ori mai mari ca ea. *Cinconina sulfurică* se dă 5—15 ctgr., de 3—4 ori pe zi, ca tonic, 1—2 gr. pe zi ca antiperiodic.

Chinină, quinină. — Chinina este cel mai important principiu activ al *chinei*, care se extrage din coaja acestui arbore. Se găsește în cantitate mai mare în coaja chinei galbene, din care se și extrage. Chinina nu se întrebuințează în medicină curată, ci în combinație cu diferiți acizi: sulfuric, cloridric, etc., formând sulfat de chinină, cloridrat de chinină, bromidrat de chinină, etc. Este medicamentul specific aproape al tuturor accidentelor datorite *paludismului*, *curativ și preventiv*. Se mai dă ca antitermic și tonic în influență, ca sedativ nervin în tusa măgărească, analgezic în reumatismul articular acut, în nevralgii, în migrenă. Nu se dă în timpul menstruației, nici a sarcinei, de cât în doze mici și la mare trebuință. Chinina se dă mai cu seamă sub formă de sulfat, cloridrat și bromidrat, 10 ctgr. până la 2 gr. în buline, pilule, clizme, supozitoare (când doza se dublează) injecțiuni sub piele (în caz de urgență), rar în poțiune din cauza amarăciunii. La *copii* se dă: 2—6 ctgr. înainte de 1 an, 8—15 centigrame dela 1 până la 2 ani, 0,10 ctgr. de fiecare an de vârste după doi ani. Proprietățile sărurilor de chinină fiind aceleași ca și ale chininei, care este *febrifugă, antepieriodică și antitermică*, vom aminti numai indicațiunile speciale și dozele: *Arseniatul de chinină*, întrebuințat în unele forme de nebunie cu slăbire nervoasă, sau stupoare: 5—10 mgr. Nu se întrebuințează decât ca preparațiune arsenicală. *Bromidratul bazic de chinină*, conține 76,60 la 100 chinină: în *injecțiuni sub piele* (ipodermice), 20—50

ctgr. pentru odată. — *Bromidratul neutru de chinină*, conține 60 la 100 chinină. — *Carbonatul de chinină*, sau *aristochinină*, se dă la copii în tusa măgărească, 5—60 ctgr. (dela 1 la 6 ani), 50 ctgr. până la 1 gr., la adulți. — *Cloridratul bazic de chinină* conține 83,62 la 100 chinină; *injecțiuni ipodermice*, 20 ctgr. odată asociat cu antipirină. — *Cloridratul neutru de chinină* conține 74,50 la 100 chinină; foarte întrebuințat, mai cu seamă în injecțiuni sub piele. — *Euchinină*, nu este așa de amară, de aceea se dă mai mult la copii; fiind mai slabă de cât sulfatul de chinină se dă în doze de 2 ori mai mari de cât ea. — *Lactatul de chinină* conține 72,6 la 100 chinină. Se dă mai mult în injecțiuni sub piele. — *Glicerofosfatul de chinină* e tonic: 25 ctgr. până la 1 gr. în buline, 80 ctgr. în injecțiuni sub piele. — *Sulfatul bazic de chinină* conține 72,81 la 100 chinină; antipieriodic, tonic: 50 ctgr. până la 2 gr. — *Sulfatul neutru de chinină* conține 59,12 la 100 chinină: 1—2 grame. — *Tanatul de chinină* conține numai 20,21 la 100 chinină: se dă în contra sudorilor de noapte la ofticoși, 1—2 gr. — *Valerianatul de chinină* conține 76 la 100 chinină: febrifug, antispasmodic: 30 ctgr. până la un gram.

Chlor. — Când un om și-a pierdut vederea la un ochiu și vede numai cu celălalt se zice că este *chior*, că a *chiorât*. Să nu se confunde omul chior cu cel *ciacăr*, care se uită cruciș, nici cu cel ce nu vede tocmai bine cu un ochiu. Chiorul nu vede de loc cu un ochiu și această infirmitate nu mai are leac, așa că el se slujește numai de ochiul sănătos. Dacă cumva chiorul vrea să-și ascundă acest cusur poate să-și pună un ochiu de sticlă întocmai ca cel sănătos.

Chipăruș. — V. *Ardeiu*.

Chirș sau Kirsch. — Este o băutură alcoolică preparată prin fermentațiunea și distilația cireșelor sălbatice și a sămburilor lor. Conține și urme de *acid prusic*, care este în cantitate mai mică, și dă băuturii o aromă plăcută și o lucrare calmantă asupra sistemului nervos. Chirșul băut în cantitate mai mică și numai din când în când, înleznește mistuirea. Luat curat,

sau sub formă de *grog*, chirșul mărește puterea și previne sfârșeala. Abuzul de chirș este foarte primejdios și aceasta trebuie s'o știe cel ce are obiceiul să-l bea.

Chirurg. — Se chiamă medicul care s'a specializat în operații.

Chirurgie. — Se chiamă partea din medicină care se ocupă cu boalele cari cer operații, ca să poată fi vindecate.

Chisăliță, compot. — Chisălița este un fel de dulceață, cu deosebire că nu se fierbe așa de mult timp și fructele își păstrează forma și consistența lor, iar zahăr se pune mai puțin decât la dulceață, de oarece nu se păstrează timp îndelungat, ci de obicei se mănâncă îndată după preparare. Chisălița nu se potrivește pentru orice stomac; cea preparată cu coacăze, cireșe și mere este cam acidă, iar cea cu smeură și gutui este prea grea de mistuit; numai chisălița făcută cu pere, prune, zarzăre, caise, este mai bună și mai ușoară la mistuire. Pentru cei supuși la îngrășare chisălița, având mai puțin zahăr, este cu mult mai bună decât dulceața.

Chist sau Kist (gr. *kystis*, beșică, pungă). — Este o umflătură, sau *tumoră*, în forma unei pungi, sau a unui sac închis de toate părțile și care cuprinde un lichid mai mult sau mai puțin gros. Chistul se poate dezvolta în toate părțile corpului, în toate organele chiar și în cele mai adânci. Când se ivește în părțile dinafară este ușor de recunoscut, atât prin forma și prin volumul lui, cât și prin conținut, despre care ușor ne putem da seamă prin pipăirea cu mână. Un chist ivit în afară nu este primejdios, creșterea lui ne supărând nici un organ important. Când însă un chist se dezvoltă în părțile adânci ale corpului, într'un organ profund, el este mai greu de recunoscut și de multeori nu poate fi bănuț decât numai prin turburările ce le produce în funcționarea aceluia organ și gravitatea lui atârână de importanța organului atins. Un chist odată recunoscut trebuie operat, căci el niciodată nu se vindecă dela sine; operația trebuie făcută cât se poate mai iute, pentru ca să scurtăm suferințele bolnavului și să-l scutim de complicațiuni, care i-ar pune în primejdie viața.

Chist al Ovarului. — V. *Ovar*.

Chist Sebaceu. — V. *Modălcă*.

Chitae. — V. *Porumb*.

Chitie. — V. *Tichie*.

Choerophyllum Cerefolium. — V. *Asmăui*.

Ciacăr. — V. *Strabism*.

Cianhidric (Acid) sau *prusic*. — Se întrebuintează rare ori ca sedativ, calmant, în doză de 10 până la 15 picături, dintr'o soluție de 1 la 100. Acest acid este principiul activ al *apei distilate de laur-ceras*. — *Otrăvirea*. Acidul prusic produce, mai totdeauna, moarte instantanee. *Semne*: moarte foarte repede, după convulsii și colici mari, respirație grea, întreruptă prin suspine adânci. *Tratament*: să se dea 50 gr. de sulfat de fier (vitriol verde) în apă.

Cianoză. (gr. *kianos*, albastru). — Coloarea albastră, vânătă, câte odată neagră, sau lividă a pielii, care provine dintr'o piedecă în circulație sau dintr'un amestec al sângelui arterial cu cel venos, în urma unei rele conformațiuni a inimii, trecătoare sau permanentă.

Cianur. — V. *Cianhidric*.

Cicatrice. — Orice rană, după ce se vindecă, lasă în locul ei un semn, care nu se șterge nici odată și care se numește *cicatrice*. Forma cicatricii variază după forma și întinderea răni. Rănilor făcute prin tăiere (plăgile tăiate), cari se cos și se vindecă fără să facă puroiu, lasă o cicatrice liniară, care abia se vede; rănilor cu puroiu și uimele, cari se sparg singure, lasă cicatrice mari și urâte, cele produse de arsuri lasă cicatrici foarte întinse și urâte.

Ciclistm. — Exercițiul cu bicicleta este foarte bun pentru copii, femeile și bărbații sănătoși. Se recomandă în tratamentul anemiei, artrismului, obezității, constipației, neurasteniei, dar în toate aceste cazuri exercițiul trebuie făcut în mod rațional. Cei bolnavi de inimă, cei ce suferă de hemoroizi, de ernie, nu trebuie să facă acest exercițiu.

Cicoare, cicorie (*Cichorium Intybus*, fam. compozitelor). — Plantă erbacee, care crește prin câmpii, ogoare, fânețe, drumuri, locuri virane. Frunzele se mănâncă salată, iar din rădăcina uscată, prăjită și măcinată, se face *surogatul*

de cafea. În medicină se întrebuințează frunzele proaspete și uscate și rădăcina. Lucrează ca: tonic, amar, depurativ, stomachic. Se dă sub formă de ceaiu, 10 gr. la 1000, extract, 1—5 gr., iar siropul de cicoare simplu, sau împreună cu sirop de revent, se dă la copiii mici ca purgativ, 2—5 lingurițe. — *Cicoarea de grădină, cicoare* (*Cichorium Endivia*).



Fig. 91. — Cicoare

Plantă originară din Turchestan și Asia mică, se cultivă mult în Europa, mai ales în Franța, chiar și la noi, pentru uzul culinar, fiind una din cele mai bune salate din cauza amărăciunii, care o face să fie aperitivă și tonică.

Cicută. — V. *Cicută*.

Cidru, vin de mere. — La noi se întrebuințează foarte puțin acest vin, pe câtă vreme în străinătate și mai ales în Franța se bea mult. Cidrul se prepară de obicei dintr'un amestec de mere dulci, mere amare și mere acre, cari, după ce au fost zdrobite și expuse la aer timp de 24 de ore, se pun la teasc și ceea ce se scurge se lasă să fermenteze, timp de o lună, după care cidrul este gata. Se pune în butoaie foarte curate și afumate cu pucioasă, sau se trage în sticle. Cidul se păstrează cu mare anevoință și nu se poate transporta, din care pricină el trebuie băut pe loc și să nu fie ținut mult timp, căci se strică. Vinul de mere conține cam 3—4 la sută alcool și, când este curat și proaspăt, este o băutură bună și igienică, dar nu trebuie luat în cantitate mare, căci obosește stomacul și mațele, dând naștere la diaree și colici.

Cifoză. — V. *Cocoșă și Columba vertebrală*.

Cigă mică. — V. *Ciuperca* (Bureții galbini).

Cimbrisor, cimbru de câmp, sârpun, schinduf, timian (*Thymus serpyllum*, fam. labiatelor). — Plantă odorantă și aromatică, ce crește prin fânețe și pășuni uscate, pe coline și câmpuri, prin poieni, livezi, pe marginea pădurilor. În medicină se întrebuințează ca excitant, sub formă de infuzie (ceaiu) din 10 la 1000. — *La țară* cimbrisorul este foarte cunoscut, atât ca leac, cât și pentru mirosul lui care seamănă întru câțva cu cel de lămâie. Ceaiul de cimbrisor se dă în contra *colicilor*, decoctul de rădăcină și cu sare arsă se dă copiilor pentru *mătrice*. La *celperit* se fac oblojeli cu decoct de cimbrisor amestecat cu frunze de măr dulce și șovârf, sau gutui. Cu cimbrul de câmp se fac băi celor ce sufăr de scorbut. Planta întreagă uscată și pisată se trage pe nas ca tabacul, pentru a opri sângerile să curgă.



Fig. 92. — Cimbrisor

Cimbru, cimbru adevărat, cimbru de grădină. — V. *Lămâioară*.

Cimbru de câmp, cimbrușor. — V. *Cimbrisor*.

Cinabar. — V. *Mercur* (*Bisulfur de mercur*).

Cinchona. — V. *Chinină*.

Cincondină. — V. *Chinină*.

Cinoglos. (Pilule opiacee de). — V. *Opiu*.

Cințaură. — V. *Fierea pământului*.

Ciocolată. — O mâncare foarte plăcută mai ales copiilor. Ciocolata se prepară din *cacao* și *zahăr*, la cari se mai pune, pentru a-i da aromă, scorțișoară, sau vanilie. *Cacao* este produsul vegetal, preparat din semințele unui arbore mic, numit *Theobroma Cacao* din fam. butneriaceelor, originar din America. Semințele de cacao au mărimea și forma unui sâmbure de măsline, turtite, netede, și tari. Sâmburele este amar, cu miros slab și la pipăire este unsuros. Din semințe se prepară untul de cacao, care se întrebuințează în medicină la facerea *săpunașelor* (su-

pozitoarelor), cu diferite medicamente, mai ales pentru copii mici. Ciocolata preparată cu vanilie are un gust cu mult mai plăcut decât cea cu scorțișoară și este mai ușor de mistuit. Ciocolata este hrăitoare, din care pricină se socotește ca *aliment*. Materiile grase, sau untul de cacao, servesc la întreținerea căldurii animale și la respirație, dar nu contribuie la reparația mușchilor, nu dau putere, însă hrănesc bine, întocmai ca toate alimentele grase. La fabricarea ciocolatei se mai adaugă uneori sagu, salep, arrow-root și chiar gluten, când ciocolata devine un aliment complet. Nici un aliment nu este falsificat așa de mult ca ciocolata, punându-se în loc de unt de cacao alte grăsimi (unt de lemn, sau de migdale dulci grăsimi de vacă, sau de oaie). Se mai prepară ciocolată cu diferite medicamente și anume: ciocolată *fieruginoasă* care este tonică, întăritoare; ciocolată cu *magnezie*, care este purgativă; ciocolată cu *santonină*, care se dă pentru limbrici la copii etc.

Ciocolați. — V. *Ciuperce* (Ciuciuleni).

Ciolac. — V. *Ciung*.

Ciont, bont. — Se numește astfel partea care rămâne dintr'un membru amputat (tăiat). Intr'un ciont bun cicatricea este tare, puțin aderentă de extremitatea osoasă, care este căptușită de o perniță de țesut celulo-grăsos. În acest caz aplicațiunea unui aparat de proteză este ușoară. Câte odată însă se întâmplă că cicatricea este subțire și lipită de os, din care pricină se rupe și se rănește (se ulcerază) sub influența unei frecături, sau trăsături, iar retracțiunea mușchilor face căpătâiul osului să iese afară (ciont conic). Nervii se termină prin niște umflături numite *nevrome*, cari sub influența unor apăsări repetate, sau chiar și fără cauză cunoscută, dau naștere la dureri nevralgice mari. Câte odată se pot ivi fistule și leziuni osoase grave chiar și după mai mulți ani de vindecare aparentă, (*osteită, osteomielită*).

Ciorapi, colțuni, ștrimfi. — În vechime (și chiar și acum în unele părți) omul își încălța picioarele fără să le pună mai întâiu în ciorapi, sau să și le învâluie în *obiele*, dar aceasta nu este sănătos, căci cu mult mai bine este apărut piciorul de frig când se pune

ceva între el și între piele. Ciorapii prind bine în tot timpul, iarna-vara, căci absorb o parte din nădușeala picioarelor. Tre-



Fig. 93. — Ciorapi pentru varice

împiedecă circulația sângelui din vine, (cari se largesc și dau naștere la




Fig. 94. — Cum se ia măsura pentru ciorapii de varice

varice. De aceea este mai bine să se fixeze ciorapii cu ace de siguranță de ismene, iar la femei cu un fel de bretelețe, cari leagă ciorapii de corset, sau de o cingătoare de mijloc. — *Ciorapi elastici* sau ciorapi pentru varice sunt făcuți dintr'o țesătură elastică și pot fi lungi, până sub genunchi, sau până la coapse. De obicei degetele și călcâiul nu se cuprind în ciorap. Ciorapii trebuie să fie foarte mlădioși, așa că după opt zile de purtare nici să nu mai simți că-i porți, trebuie desbrăcați la culcare și încălțați dimineața. Trebuie să fie comandați după măsură, ca să se potrivească bine, după cum se arată în figura alăturată.

Ciorbă, supă. — Deosebirea între

CIOS

supă și *ciorbă* este că prima se face cu *zeamă de carne* în care se pune pâine prăjită, sau tapioca, griș, orez, fidea, stelișoare și gustul ei este dulce, pe câtă vreme *ciorba* se face cu borș, sau cu apă simplă, înăcrîtă cu sare de lămâie, sau oțet, așa că gustul ei este acru. Se înțelege că și în *ciorbă* se pun legumi ca și în *supă*, pentru ca să fie mai gustoasă, de exemplu: *ciorba de pui*, *ciorba de miel*, etc. Atât *supa* cât și *ciorba*, luate la începutul mîncării, deșteaptă apetitul și fac gura să se umple de *salivă* și stomacul de *sucuri*, cari înlesnesc mistuirea. Prin urmare este bine să se păstreze bunul obicei de a începe mîncarea cu *supă*, sau cu *ciorbă*, însă nu în cantitate mare, mai ales cei predispuși la *obezitate* și cei ce sufer de *dispepsie* trebuie să ia foarte puțină.

Ciosvîrtă. — V. *Coapsă*.

Circulațiune. — V. *Cord*.

Circumeiziune. — Operație care constă în *tăierea împrejur* și ridicarea unei părți a prepuțului (sulacului). Are marele folos de a face ca mucoasa glandului, să fie mai rezistentă și prin urmare de a pune pe om mai la adăpost de îmbolnăvire, de a contracta sifilisul, sau alte boale venerice.

Cireașa lupului. — V. *Mătrăgună*.

Cireșe. — În medicină se întrebuințează ca diuretice (fac ud mult și limpede), sub formă de sirop, sau sub formă de fiertură de cozi de cireșe (10 la 100). La *fară zeama de cireșe* fierte se bea de femeile cari au prea multă menstruație. Se bea contra *răsurilor*, iar *ciaiul de cleiu de cireșe* se bea pentru tusă. Cireșele să nu se mănânce cu *sâmburi*, căci mulți au murit din pricina aceasta de *încurcătură de mațe*, sau de aprindere de mațe.

Cirș. — V. *Dextrină*.

Ciroză (gr. *cirrhos*, galbin-roșietic). — V. *Ficat*.

Cisticere. — V. *Viermii intestinali* (*Tenia*).

Cistită. — V. *Beșică*.

Citrat de magnezie. — Caută la *Magnezie*.

Citric. (Acid). — Este temperant (răcoritor). Se dă 2—7 gr. în limonadă, în poțiune, în sirop (10 p. 1000); limonada vinoasă se face din limonadă

CIUM

citrică simplă, la care se mai adaugă vin roșiu, 250 gr. la un litru.

Ciumă, pestă, pestă bubonică, (lat. *pestis*). — Este o boală contagioasă și se produce prin intrarea în corpul omului a unui *microb* special, descoperit de învățatul francez *Yersin* în anul 1894. Acest *microb* se transmite prin contact direct, prin atingere cu un bolnav, sau prin contact indirect, adică prin măruri și alte lucruri din țările bătute de ciumă, adusă cu vapoarele și prin șoareci și muște. Se transmite prin puroiul buboanelor, prin sângele, scuipatul, urina și scaunele bolnavilor, prin obiectele cari au fost în atingere cu bolnavii, prin cadavre, etc. — *Semnele ciumii* sunt: *febră*, sau *căldură* vie, o *stare de abatere* foarte mare, *emoragii*, sau curgeri de sânge prin nas, gură, șezut, etc., umflături (tumori) numite

buboane, cari se arată în stîngii, la subțiri, sau la gât, rotunde și mari ca nucile, cari fac puroi și se sparg. În apropierea acestor *buboane*, pe teritoriul limfatic al lor, se mai ivesc niște




Fig. 95.—Microbii ciumei

beșicuțe (*fliclene*) de diferite mărimi, pline cu o apă turbure și înconjurată de un cearcăn (aureolă) roșu înflăcărat, sub aceste beșicuțe se observă un punct negru, format de gangrena țesuturilor, care gangrenă poate coplesi regiunea întreagă. Din pricina coloarei negre li s'a dat numele de *carbuncule* acestor părți gangrenate. Urina este rară și albuminoasă. Bolnavul are greață, vărsături, sete vie, limba încărcată și murdară, buzele uscate și funingi-noase, pulsul mic și neregulat, respirațiunea grea. Câteodată în cazurile foarte grave, apar pete punctiforme, sau de mărimea unui bob de linte, pe tot corpul, mai mult sau mai puțin confluențe (*ciumă neagră*), cari se numesc *peteșii*, însoțit de obicei de curgeri de sânge din nas, gură, șezut, etc. În aceste cazuri bolnavul intră în comă și moare repede. În cazurile mai ușoare *buboanele* se deschid, supurează, dar puroiul dispare

repede; uneori buboanele nu supurează și se rezorb dela sine. Convalescența se stabilește, adeseori, după diferite peripeții, flegmoane, artrite supurate, gangrena extremităților, etc. — Durata ciumii este, în termen mijlociu, de 8—10 zile; de obicei bolnavul moare după 3 până la 5 zile. — *Tratament.* Se va întrebuința chiar dela început *serul antipestos* al lui Roux și Yersin, care a dat bune rezultate.

Injectiile se fac sub piele, sau intravenoase, în cazurile grave. *Tratamentul simptomatic* se va îndrepta mai cu seamă în contra lipsei de putere: băi reci, ghiată la cap, strichnină și injecțiuni cu eter. Buboanele supurate și deschise se vor pansa, regulat. Casele unde au fost bolnavi se vor dezinfecța (vezi *Dezinjecțiune*), bolnavii se vor izola în spitale speciale, se vor nimici șoarecii și șobolanii. Se vor face injecții cu ser antipestos, preventiv, la toți oamenii cari se găsesc în regiunea unde s'a ivit un caz și numai așa se poate opri epidemia.

Ciuma fetei. — V. *Ciumăfaie*.

Ciumăfaie, alaur, bolândariță, ciuma fetei, cornuță, laur, mărul porcului, turbare (*Datura Stramonium*, fam. solanaceelor). — Plantă erbacee cu miros greșos, foarte veninoasă, care crește prin dărâmături, locuri pustii, garduri, drumuri, paragine. În medicină se întrebuințează rădăcina, frunzele și semințele, a căror lucrare este: *antispașmodică, narcotică*. Se dă sub formă de: alcoolatură, 5—30 picături, extract alcoolic, 1—10 ctgr., extract apos 2—20 ctgr., praf, 5 ctgr. până la 1 gram, sirop, 10—30 gr., tinctură, 1—30 picături. Pe *dinafară* se întrebuințează sub formă de plastore, ulei. — La *țară* se întrebuințează frunzele și semințele, pentru *friguri*. *Otrăvirea* cu ciumăfaie are ca semne: uscăciune de gât și de piele, pupilele lărgite, aiurare, visuri rele, vedere îndoită, erupții pe piele, paralizia picioarelor, comă. *Tratament:* spălarea stomacului, sau medicamente pentru a vărsa (ipeca), stimulente ca alcool, eter, amoniac, acetat de amoniac, cafea tare și caldă, muștare pe pulpe, sticle cu apă caldă la picioare, injecții sub piele cu pilocarpină, sau 7 gr. de tinctură de jaborandi, pe gură sau șezut.

Respirație artificială prelungită, dacă e trebuință. Dacă s'a oprit udul se va face un sondaj.

Ciumărea, iarba ciumii, scrântitoare (*Galega officinalis*, fam. leguminoase-



Fig. 96. — Ciumărea

me până la 2 gr., sirop, 2—4 linguri pe zi, infuzie din 20 la 1000.

Ciumurlulală. — V. *Aplecate* și *Indigestiune*.

Ciung, ciunt. — Se numește acel care n'are o mână, o parte, sau totalitatea brațului.

Ciuperci, bureți, mânătărci. — Deși conțin multă apă, sunt hrănitoare fiindcă conțin o mare cantitate de azot. Mâncarea preparată cu ele are un gust plăcut și în mai multe părți constituie un bun mijloc de hrană pentru popor, care cunoaște așa de bine nu numai ciupercile, ci și mânătărcile și bureții, cari cresc în abundență la țară și sunt la îndemâna tuturor. Dacă se mistue uneori cam cu anevoință, aceasta provine din modul lor de preparare, cu multă untură de porc, sau unt de vacă, uneori și cu unt de lemn, adaugându-se piper de multe ori prea mult. În tot cazul nu trebuie să mâncăm prea mult la o mâncare, să nu abuzăm, iar cei slabi de stomac și convalescenții să nu mănânce de loc. Primejdia mare însă este că sunt ciuperci și bureți *veninoși* și încă în grad mare, așa că pot produce moartea. Din nenorocire n'avem nici un mijloc sigur prin care putem să ne lămurim în privința aceasta. Știința nu ne dă nici un semn sigur, nici o probă temeinică; proba cu banul de argint, sau cu ceapa, cari trebuie să se înegrească dacă vin în atingere cu ciuperca veninoasă, n'au nici un preț. Cel mai bun mijloc de a nu ne otrăvi cu ciuperci, sau bureți, este să-i cunoaștem. Noi ne vom mulțumi să arătăm aci bureții,

CIUP

ciupercile și mânătărcile cari se pot mânca, iar la urmă vom arăta pe cei ce sunt veninoși. — Se pot mânca fără nici o teamă: *Buretele bălos* (*Agaricus eburneus*, fam. agaricaceelor), cu pălăria viscoasă, netedă, cu marginea răsucită, carnea albă cu miros plăcut, care crește pe pământ în pădurile de fag și de brad, toamna. — *Buretele creț* (*Hydnum coralloides*, fam. hydnameelor), care seamănă cu o conopidă, cu carnea fragedă, cu un gust plăcut. Crește toamna pe trunchiul arborilor bătrâni din păduri. — *Buretele de nuc* numit și *păstrăv*, *păstrăv de nuc* (*Bolletus squamosus*, fam. boliporaceelor) cu pălăria cărnoasă galbenă roșietică, prevăzută cu solzi închiși, având forma unui evantaiu. Carnea este albă, cu miros pătrunzător și cu un gust plăcut.



Fig. 97. — Buretele galben (comestibil)

Crește pe trunchiul nucilor, fagilor și ulmilor din păduri. — *Buretele de spin* (*Agaricus alutaceus*, fam. agaricaceelor), cu pălăria cenușie, bătând în purpuriu mai cu seamă spre margini, verze sau gălbue la centru, cărnoasă, solidă, lamelele albe, devenind gălbui, piciorul alb neted și lucitor, carnea albă, violacee sub peliculă, cu un gust dulce și fără nici un miros. Crește prin păduri pe pământ. vara. — *Buretele șerpesc* numit și *pălăria șerpelui* (*Agaricus procerus*, fam. agaricaceelor) cu pălăria oval-convexă, mamelonată, acoperită de solzi îmbrăcați bruni, pe deasupra cu o peliță care se rupe lăsând să se vadă carnea albă. Are piciorul fistulos înalt, umflat la bază, carnea albă moale, cu miros și gust plăcut. — *Buretele oilor* (*Polyporus confluens*, fam. poliporaceelor); ciupercă compusă din mai multe pălării, de culoare brună-gălbue, cu picioa-

CIUP

rele albe scurte reunite într'o tulpină cărnoasă, carnea alburie, puțin amară, miros plăcut, crește în mari grupe pe sub brazi și pini, prin mușchi, mai cu seamă toamna. — *Bureții călugărești* (*Polyporus frondosus*, fam. poliporaceelor), ciupercă cu pălării numeroase, brune-cenușii, reunite prin piciorușe într'un singur trunchiu, cu carnea albă, cu miros și gust plăcut. Crește toamna pe rădăcinile și trunchiul stejarilor bătrâni. O singură bucată cântărește, uneori, până la 15 kgr. — *Bureții de conopidă* numiți și: *barba caprei*, *burete creț*, *crețișoară*, *curălice*, *laba măței*, *meloșel*, *opintici*, *toamnăcel* (*Clavaria coralloides*, fam. clavariaceelor), ciupercă de culoare albă, trecând în cenușiu, tulpina groasă, neregulat ramificată. Crește vara și toamna prin pădurile umbroase și umede, mai cu seamă în păduri de brad. — *Bureții de meastecăn*, numiți și *pânișoare* (*Cortinarius cinnamomeus*, fam. agaricaceelor), ciupercă cu pălăria cărnoasă, de culoarea scorțișoarei (galbin-brună), uneori variind în formă și culoare, cu piciorul gros, mai târziu gol înăuntru, gălbui, pe lamele de colorii variate (roșii, galbine, brune), lucitoare, late și îndesuite, carnea gălbue cu miros aromatic; cresc mai mulți la un loc prin păduri, pe pământ, toamna. — *Bureții de prund* sau *bureții de rouă* (*Collybia esculenta*, fam. agaricaceelor), mică ciupercă cu pălărie galben-brună, puțin cărnoasă, cu lamele alburii distanțate, carnea albă, cu gust cam amar este parfumată, din care cauză se întrebuințează la supe ca condiment. Cresc mai mulți la un loc prin păduri, de primăvara până toamna. — *Bureții de stejar*, numiți și: *păstrăvi roșii de stejar* (*Fistulina hepatica*, fam. poliporaceelor), ciupercă roșie ca sângele, sau roșie-închisă, cu pălăria întreagă, sesilă, sau purtată de un picior lateral și scurt. La coacere iese din ea un lichid roșu, ca sângele. Crește pe trun-



Fig. 98. — Sbârciog gras (comestibil)

chiuri de arbori, mai cu seamă de stejar, vara și toamna. Din această ciupercă se scoate un fel de clei, numit: clei de stejar. — *Bureții galbeni* sau: *burete galben, cigă mică, galbinele, gălbiori, unghia caprei, urechiușe, urechiuși* (*Cantharellus cibarius*, fam. agaricaceelor), ciupercă galbenă cu pălăria cărnoasă, cu lamele groase, distanțate. Crește în mici grupe prin păduri umbroase de fag, de brad




Fig. 99. — Burete de stejar (*Fistulina hepatica*)

și de mesteacăn. Are carnea albă, spre margini gălbuie, miros plăcut, gust cam pipărat. E foarte bună la mâncat, vara și toamna. — *Bureții vineți*, sau *burete vântat* (*Cortinarius violaceus*, fam. agaricaceelor), ciupercă de culoare violet-închisă, cu pălăria cărnoasă, cu lamele groase, distanțate, piciorul bulbos și păros, violet cenușiu pe dinăuntru, carnea moale, fără miros. Crește izolat printre frunzele uscate din pădure, vara și toamna. — *Iuțișorii*, sau *iufarii* cunoscuți și sub numele de: *burete acru, burete galbin, bu-*



Fig. 100. — Iuțișor (comestibil)



Fig. 101. — Ciupercă de gunoi

rete iute lăptos, burete pipărat, bureți iuți, bureți usturoși (*Lactarius piperatus* sau *agaricus piperatus*, fam. agaricaceelor), ciupercă comestibilă, cu pălăria albă, puțin gălbuie la bătrânețe, dură și

compactă, netedă sau rugoasă și glabră cu marginile undulate și recurbate în jos, lamele albe sau gălbui, foarte dese, piciorul alb cărnos și foarte scurt, carnea albă, fragedă, piperată, fără miros și cu mult lapte alb și acru. Crește prin păduri, vara și toamna. — *Ciuciuleți* cunoscuți și sub numele de: *bureți de iarbă, bureți de pajiste, burețiori, ciocârți, ciuciulași, cocârle, cocârți*



Fig. 102. — Ciuciuleți-cocârle (comestibil)

(*Marasmius alliatus* sau *scorodanius*, fam. agaricaceelor), ciupercă comestibilă, cu pălăria subțire, convexă sau plană, galbin roșcată, lucitoare, apoi alburie și brăzdată pe margini. — Această ciupercă are un gust și miros de usturiu, ea crește în grupe prin pășuni uscate, pe coaste, pe marginea drumurilor și a pădurilor, vara și toamna. Se întrebuințează în bucătărie, mai cu seamă ca condiment. — *Râscovi*,



Fig. 103. — Râscov (comestibil)

sau *bureți dulci, opintici, pânea pădurii, pita lui Dumnezeu, râscov de brad, râscov de fag*, (*Lactarius* sau *agaricus deliciosus*, fam. agaricaceelor), burete comestibil cu pălăria cărnoasă, la început convexă, apoi plană, sau chiar deprimată la mijloc ca o pâlnie, cu marginile răsfrante, vâscoasă, de culoare portocalie, roșu-cărămizie, sau gălbuie, carnea fragedă, galbin-roșietică, cu miros plăcut, cu lapte mult și plăcut. Se prepară mâncări bune

CIUP

CIUP

cu el, se mănâncă și crud, se poate păstra pe iarnă sărat. Crește prin pădurile de fag și de brad, vara-toamna.

Barba caprei sau :

burete creț, creasta

cocoșului, meloșel,

togmăgel, (Clavaria

flava, fam. clava-

variaceelor), ciu-

percă mare come-

stibilă, fragilă cu

tulpina cărnoasă,

groasă, albă de

culoare galbenă

roșcată, în vârf

tulpina se ramifică

în ramuri cilin-

drice, netede. Ese

pe pământ în pă-

duri umbroase, Septembrie-Octombrie.

— *Sbârciogi groși sau pupi (Gyromitra*

sau Helvella esculenta, fam. helvela-

ceelor), ciupercă comestibilă, cu pă-

lăria brun-roșcată, sau brun-negricioasă

globuloasă, um-

flată, cărnoasă,

cu aspect de

ceară Tulpina

(piciorul) groasă

ne regulată, în-

velită într'o pă-

lărie ca într'o

căciulă. Are

miros și gust

plăcut, crește

în grupe primă-

vara prin pădu-

rile de brad,

fiindcă conține acid helvelic, care este

otrăvicios și se dizolvă în apă fier-

binte, se recomandă ca ciuperca să

se opărească în-

ainte de a se găti

pentru mâncare.

— *Buretele boilor, măn-*

ătărci, pita vacii,

titarci, vacuțe (Bo-

letus bovinus, fam.

poliporaceelor),

ciupercă comesti-

bilă cu pălăria

lată, îndoită pu-

țin, deasupra găl-

bue, dedesubt gal-

ben închisă, piciorul scurt, carnea albă,

devine albastruie, în contact cu aerul.

Crește prin luminișul pădurilor de



Fig. 104. — Barba caprii-meloșel (comestibil)



Fig. 105. — Sbârciogi grași-negru și alb (comestibil)



Fig. 106. — Mănătărci (comestibile)

brad, toamna. Uscată, sau murată, se păstrează pentru iarnă. — *Ciuciuleni, ciocolați (Agaricus cinnamomeus),* burete cu pălărie subțire, castanie. Crește vara prin iarbă, e bun și plăcut ca mâncare. *Bureții groși, bureții popești, hiribele, ghebele, (Boletus pachypus),* seamănă cu mănătărcile, dar au pălăria mai plină și cotorul mai gros; pălăria are o culoare ruginie deschisă, iar cotorul este ceva mai închis, roșietic, având pe dinafară zâmțituri. Cresc prin pădurile de fagi și sunt gustoși la mâncare. Dacă îmbătrânesc gustul lor devine amar, înepător și nu se mai pot mânca. — *Ciuperca obișnuită (Agaricus arvensis sau Psalliota arvensis, fam. agaricaceelor)* cu pălăria cărnoasă, albă, adesea pătată cu galben, lamele albe, apoi alb-roșietice și la urmă brun-închise, piciorul alb, gol, sau spongios, carnea albă, gustul și mirosul plăcut. Crește prin pășuni, și livezi, vara toamna. — Altă varietate *Agaricus pratensis* cu pălăria alburicenușie, lamele cenușii, apoi brune, carnea albă, compactă, cu miros și gust plăcut. Crește prin livezi și păduri, vara și toamna. — A treia varietate

Agaricus

silvaticus, cu pă-

lăria cărnoasă,

brun roșcată,

carnea albă, în

atingere cu ae-

rul devine găl-

bui-roșietică,

cu miros și gust

plăcut; crește

toamna prin

păduri. — Ciu-

perca de gunoiu,

sau nană (Aga-

ricus campe-

stris, fam. aga-

ricaceelor), cu

pălăria cărnoasă alb-ro-

șietică, sau alb-brunie, mătăsoș-pă-

roasă, lamele roșietice, dese, deven-

nind apoi negricioase, piciorul căr-

nos, cilindric, alb, glabru, carnea

moale, compactă, albă devenind roșie-

tică, sau brună în atingerea cu aerul.

Are gust și miros foarte plăcut, pentru

care se mănâncă mult. Crește vara și

toamna pe câmpuri, livezi și păduri,

adeseori cultivată pentru trebuințe cu-

linare. — Mănătărcile, sau: hribi, mi-



Fig. 107. — Sbârciog conic și cu picior (comestibil)

lăcă pietroasă, nitarcă roșie, pitarcă (*Boletus edulis*, fam. poliporaceelor), cu pălăria cărnoasă, foarte bombată, brun gălbui, uneori galbenă murdară, glabră și umedă la suprafață. Are piciorul gras, țepăn, galben roșcat deschis, sau brun, adese ori umflat la bază, carnea albă, puțin roșietică sub piele, miros și gust plăcut. Crește prin păduri umbroase și prin



Fig. 108.—Nico-reții (comestibil)

poieni, vara și toamna.—La țară dintre toți acești bureți, cari se mănâncă, se întrebuințează ca leac numai buretele de nuc și anume: fiert în lapte dulce se înfășoară la pânțele trei zile de-a rândul, pentru rast (splină mare), sau se fierbe 3 zile în rând se ia dela foc și se înfășoară pânțele bolnavului. Se ține 3 zile și se ridică tot la același ceas. Bolnavul trebuie să aibă răbdare mare, căci mirosul grâu nu-l slăbește, ținându-se legat 3 zile și 3 nopți.—Nu se



Fig. 109.—Bureți pe-ștriți amanita muscaria (veninoși)

pot mânca fiind veninoși. Buretele de stejar (*Boletus purpureus* sau sanguineus, fam. poliporaceelor), ciupercă cu pălăria emisferică, bombată (convexă) purpurie, puțin catifelată (velutină), opacă, cu piciorul gros, spre bază puțin tuberculos, galben și cu vine, sau puncte roșii, porii foarte mici, sporii verzui-brunii. Are carnea albastră și crește prin păduri.—Buretele roșu sau hrib țigănesc (*Boletus satanas*, fam. poliporaceelor), ciupercă veninoasă, cu pălăria bombată, glabră, puțin viscoasă, roșcată, apoi alburie. Are carnea albă, devenind roșie sau violacee, în atingere cu aerul, are gust dulce și miros neplăcut, piciorul gros, oval pânticos, în partea de sus cu o rețea de vinișoare roșii ca sângele. Crește toam-

na prin păduri.—Buretele cerbilor, (*Scleroderma vulgare*, sau *Sct. aurantium* sau *Lycoperdon cervinum*, fam. sclerodermataceelor), ciupercă sferică, de culoare galbenă ca lămâia, sau galben-brună, peridiul solid, gros și coriaceu, acoperit de tubercule verucoase, de un galben mai închis, uneori numai areolat, sau chiar neted. La coacere are mai multe deschizături,



Fig. 110.—Bureți de stejar-boletus purpureus (veninos)

prin cari ies sporii de culoare brună. Carnea este albă la început, devine albastră, uneori marmorată și în fine brună, cu un miros tare și neplăcut. Crește pe pământ la marginea pădurilor și pe drumurile din pădure, vara și toamna.—Bureți peștriți sau burete șerpesc, pălăria șerpelui (*Amanita muscaria*, fam. agaricaceelor), ciupercă foarte veninoasă, cu pălăria de culoare roșie frumoasă, vâscoasă, mai totdeauna acoperită de pete albe, convex plană. Are lamele albe, piciorul alb, crește pe pământ, vara și toamna.—Otrăvirea cu aceste ciuperci se datorește unui principiu numit muscarina, pe care îl conțin. Semnele otrăvirii se ivesc după o oră, până la cinci ore,



Fig. 111.—Hrib țigănesc (veninos)

dela mâncare, prin colici, sau dureri cu vărsături și urdinare, după care apar fenomene nervoase și de slăbiciune generală, amețeli, tremurături, ajiurare, spasme. Din nenorocire

aceste semne se ivesc de obicei cam târziu, atunci când otrava a pătruns deja în sânge. Dacă nu s'a dat ajutorul la timp semnele otrăvirii merg înainte: respirația devine grea, horcăitoare, pulsul neregulat, apoi din ce în ce mai mic și mai rar, vederea se tulbură fața palidă, sudori reci peste tot, temperatura scade cu 3 sau 4 grade.

Moartea se arată prin comă (sfârșeală generală). Dacă bolnavul se vindecă rămâne încă mult timp suferind de (gastro-enterită). Semnele otrăvirii variază, ca formă și intensitate, după felul ciupercii, după modul de preparare, după câtimea mâncată, după vârsta celor ce mănâncă. Copiii mor câteodată înainte ca la părinții lor să fi început semnele otrăvirii. *Tratament.* Dacă semnele otrăvirii încep, după ce s'au mâncat ciupercile veninoase, trebuie să facem ca bolnavul să verse, gâdilându-i omușorul cu degetul său cu o pană, sau să-i dăm să bea multă apă caldută, sau să-i dăm *emetice* (10—15 ctgr.), sau *ipeca* într-o jumătate pahar de apă. Dacă a trecut mai mult timp dela mâncare, mai mult de 2 ceasuri, vom da bolnavului ulei de ricină (30 gr.), iar pentru slăbiciunea generală îi vom da eter (o linguriță de dulceată într'un pahar de apă îndulcită cu zahăr, repetată din jumătate în jumătate de ceas), rachiu, cafea. Pe dinafară vom pune pe lângă corp sticle pline cu apă fierbinte, mai ales la picioare și mâini, cataplasme calde pe pânze. În fine se va întrebuința *atropina*, care este cel mai bun antidot al muscarinei, ceea ce numai doctorul va putea-a face.

Claviculă, undrea. — Este osul care unește *osul pieptului* (sternul) cu *spata* (omoplatul sau scapula) și contribuie la formarea *umărului*. Sunt două clavicule, una în stânga și cealaltă în dreapta. Undrea este acoperită numai de piele din care pricină este foarte supusă la rupturi (fracturi). Ea poate fi ruptă sau printr'o lovitură aplicată deadreptul cu un băț, sau poate fi ruptă printr'o cădere asupra umărului, fiind prinsă între două puteri contrare, spata și osul pieptului. De obicei se rupe la mijlocul ei și atunci capetele osului se incalceă, din care cauză rezultă o umflătură, sau o ridicătură în acel loc și care ne arată că osul a fost rupt. Această fractură a claviculei nu prezintă de cât foarte rar complicații grave și de obicei se vindecă în 30 de zile, dar capetele rupte ale osului trebuie descălecate și ținute în linie dreaptă, iar brațul trebuie ținut în nemișcare în tot timpul acela. Pentru aceasta s'au făcut o mulțime de

aparate, dar toate au fost date uitării și cea mai bună legătură este cea mai simplă, care se compune dintr'o perinuță pusă în subțioară și cu câteva feși mai tari și elastice se fixează brațul în poziție potrivită, bolnavul putând umbla, fără să aibă trebuință de a sta culcat. În spitale chirurgii coase capetele rupte ale osului, între ele, cu fir de argint; în modul acesta clavicula se vindecă mai iute și mai bine fără a se scurta.

Cleiu vegetal. — V. *Gluten*.

Cleptomanie sau **Kleptomanie** (gr. *kleptein*, a fura). — Este un fel de nebunie în care omul este împins spre furtisag. Cleptomanul fură numai ca să adune; el știe că face o faptă rea, dar nu se poate stăpâni și fură fără nici un interes, căci el nu întrebuințează obiectele furate, pe cari de multe ori le uită unde le-a pus. Sarcina este uneori o cauză a cleptomaniei.

Climat (gr. *klima*, regiune). — Prin climat se înțelege spațiul cuprins între două linii paralele cu ecuatorul, sau întinderile de pământ în cari temperatura și celelalte condițiuni ale atmosferei (uscăciunea, umezeala, presiunea atmosferică, etc.) sunt aceleași. S'ar mai putea zice că climatul este totalitatea variațiunilor atmosferice cari ating organele noastre în mod simțitor: temperatura, umiditatea, presiunea aerului, vânturile, starea electrică și ozonică, seninătatea cerului. — *Climat calde*, a căror temperatură mijlocie variază dela 20 până la 28 grade (minimum 12°, maximum 48°) cuprind regiunile *intertropicale*. Acolo nopțile sunt primejdioase fiindcă sub un cer fără nori, pământul pierde prin iradiare către spațiurile cerești • mare parte din căldura din timpul zilei, ceea ce produce deosebiri de temperatură foarte mari. *Climat temperate*, a căror căldură mijlocie este de 10 până la 15 grade (mijlocia iernii +3°, a verii 19°, a primăverii 10°, a toamnei 11°). Țara noastră face parte din climatul temperat; cu toate acestea iernile noastre sunt uneori foarte lungi și friguroase, iar verile uneori sunt foarte călduroase, am putea zice tropicale, cu temperatura de +39°. *Climatele reci* au o temperatură mijlocie, care variază dela un punct ceva mai

jos de 0° până la $+10^{\circ}$, sau și mai mult. Frigul cel mai mare pe pământ nu este la pol, unde mijlocia este de -16° , ci în nordul strâmtoării Behring, unde e de -23° . Limita locuințelor omenești este dela 70° până la 78° de latitudine, unde mijlocia este numai de -7° până la -8° ; acolo frigul poate merge până la -57° , iar în vara cea mai călduroasă termometrul se ridică până $+15$ sau $+20^{\circ}$, diferență de 77° . Din acestea se poate vedea cât de variată poate fi temperatura unei țări, din aceste două feluri de climat. Ceeace face ca temperatura să varieze dela o țară la alta este: latitudinea, altitudinea, vecinătatea apelor și a pădurilor conformația și compoziția pământului, vânturile predominatoare, etc. Studiul climatelor are pentru igienă un interes de căpetenie, fiindcă este de ajuns să se despădurescă o regiune, să se usuce, sau să se aducă un curs de apă pe acolo, pentru ca să se schimbe temperatura și să se facă schimbări paralele în sănătatea locuitorilor. Diferitele elemente ale climatului, căldura sau frigul, uscăciunea sau umezeala aerului, înălțimea, influențează mult asupra izbucnirii boalelor, ele regulează, până la un punct oarecare, mersul, împrăștierea și gravitatea boalelor. La noi în țară n'avem coleră decât numai când ne vine din Asia, n'avem friguri galbene ca America, dar în schimb avem frigurile palustre în măsură mare, febra tifoidă, care se vede mai des vara și toamna decât iarna și primăvara, ceeace arată că frigul nu-i prieste acestei boale. Acest mod de tratament este foarte practic, dar din nenorocire nu-l putem aplica în totdeauna și nu-l putem aplica decât numai la bolnavii bogați și la cei ce se pot transporta fără pericol, cari n'au, sau au prea mică febră, ceeacă nu se vede decât numai în boalele cronice. Celor ce suferă de reumatism le fac bine țările calde, celor scrofuloși aerul de mare, care este întăritor, celor ofticoși un climat nu atât cald cât egal și constant, precum și o pozițiune mai înaltă deasupra nivelului mării. Trecherile repezi dintr'un climat rece într'unul cald pot să provoace boale ale tubului digestiv, iar trecherile repezi dintr'un climat cald în unul rece boale de piept.

Fecunditatea crește prin șederea în regiunile temperate, sau septentrionale, ea scade prin trecerea în țările calde. Longevitatea este mărită în regiunile de Nord.

Clipe. — V. *Ochiu*.

Clipire. — Când cineva închide și deschide repede și una după alta pleoapele, zicem că *clipește*. Când această clipire este involuntară atunci trebuie să ne gândim la o iritație, sau inflamație de ochi și să ne arătăm la un doctor oculist, adică specialist în boale de ochi, care singur ne va putea da o povață bună și un tratament potrivit.

Clistire, clizme. — Prin cuvântul *clis-tir*, sau *clismă* se înțelege introducerea unor lichide în mațul cel gros. Clismele se fac sau cu o pară de cauciuc, care se întrebuintează mai cu seamă la copii, sau cu o *irigator*. Canula, sau țeava care se adaptează la irigator, trebuie să fie destul de lungă; în unele cazuri se introduce un tub de cauciuc, sau o sondă destul de adânc în mațe, pentru ca lichidul să fie dus cât se poate mai sus. Lichidul introdus cu un irigator mare, ținut cât se poate de sus, merge până la capătul de sus al mațului gros, adică până la valvula ileocecală, care-l separă de mațul subțire. — Cea mai bună *poziție* pentru bolnav este de a se culca pe partea dreaptă, cu coapsele puțin îndoite și cu șezutul ridicat pe o perină. El va respira liniștit fără efortare și fără să tușească, pentru ca să nu întărească (să nu se strângă) mușchii pântecelui. Canula, sau țeava, unsă cu vaselină, unt, sau ori ce alt corp gras, se va introduce în șezut până la o adâncime de 6—7 centimetri; astfel lichidul va pătrunde cu înleznire în maț, în caz contrar el va ieși prin șezut în măsura în care intră. — *Cantitatea* lichidului variază: un litru (clistir mare) de o jumătate de litru (clistir întreg), de un sfert de litru (jumătate de clistir), și de 125 grame de lichid (un sfert de clistir, sau un clistir mic). — *Durata* este scurtă când se face numai cu apă simplă și numai cu scopul de a curăți intestinul este *prelungită* (un sfert de ceas, o jumătate de ceas sau mai mult) când clistirul se face cu substanțe medicamentoase, cari trebuie să se absoarbă. — *Temperatura* variază și

clistirul poate fi *rece, cald, cald sau foarte cald* (45—55°), după trebuință. Din punctul de vedere al *compozițiunii* clistirele se împart în: simple, medicamentoză și nutritive. Clistirile simple se compun numai din apă curată (rece, dezmoțită, caldă), în cantitate de cel puțin o jumătate de litru, (igienice și se recomandă pentru a preveni sau a combate *constipația*). Nu trebuie să se facă abuz cu aceste clisme, întrebându-se numai la nevoie, căci prin obișnuință ele își pierd efectul. Clismele medicamentoză sunt de multe feluri: *laxative* se fac cu *glicerină*, 1 sau 2 linguri la 250 gr de apă, sau cu *untdelemn*, cu *uleu de migdale dulci*, aceeași doză, sau cu *miere*, 60—100 gr. la 400 gr. apă), *purgative*, se fac cu *ciai de siminichie* (senă), din 10—15 gr. de foi în 500 grame de apă fierbinte, în care se tolesc apoi 15—20 gr. de sare amară). Se mai prepară cu sare, din 30 de gr. sare de bucătărie în 3—500 grame apă. Pentru diaree se prepară clisme cu *scrobeală*, sau *amidon*, *astringente* (preparate din piatră acră sau *alun* 4—8 gr., la 250 gr. apă, din *nitrat de argint* cristalizat, 10—20 centigrame sau din extract de ratania, 1—4 gr. la 250 gr. apă. Mai sunt clistire *viermifuge*, adică cele ce se pun pentru viermii intestinali (limbrici, oxiuri, sau viermișori de șezut), cari se prepară cu 5 gr. de sabur în 500 gr. apă de tărâțe, sau cu 5—30 ctgr. de *santonină* în 200 gr. apă caldă, sau 2—10 gr. *semen-contra* în 100 gr. apă fierbinte; se vor pune numai la copiii cari nu pot lua cu nici un preț medicamentele pe gură. Clismele nutritive se fac în cazurile când bolnavul nu se poate hrăni prin gură, cum se întâmplă în unele boale de gură, de gât, de esofag, sau de stomac, sau în cazurile de slăbiciune foarte mare, produsă de anemie, cloroanemie, de vărsături cari nu se pot opri, de emoragii (curgeri de sânge) abundente, de febră tifoidă, etc. În cazul întâi clistirile se prepară cu gălbenușe de ouă, bătute în zeamă de carne, iar în cazul al doilea se fac clistire așa zise *tonice*, cu vin roșu 100—150 gr., repetate dimineața și seara. În amândouă împrejurările este bine ca înainte de a pune clistirul nu-

tritiv, care trebuie păstrat, să se curețe mațul de materiile fecale cu ajutorul unui clistir mare, de apă curată, pe care bolnavul îl va da îndată afară. De altfel nu trebuie să ne bizuim prea mult pe lucrarea acestor clisme nutritive, de oarece puterea de absorbțiune a mațului gros este foarte mică și nu trebuie să recurgem la ele decât atunci când nu mai este cu putință nici un alt mijloc de hrănire artificială.

Clisme. — V. *Clistire*.

Clocitoare. — Când se întâmplă ca un copil să se nască înainte de vreme, sau să fie prea slab, atunci cel mai bun lucru este de a-l ține câțva timp într-o clocitoare, unde este o temperatură constantă de 32°. Se compune dintr-o cutie cu fund dublu. Despărțirea de jos pri-



Fig. 112. — Clocitoare

mește apă caldă într'un recipient special, sau în niște vase de sticlă, cari se schimbă tot la două ceasuri. Despărțirea de sus, în care se așează copilul, este închisă pe deasupra printr'un perete mobil, cu o fereastră prin care putem observa copilul. Acest perete are două deschizături: una care comunică cu exteriorul, pe unde ese afară aerul respirat, a doua în perețele despărțitor, prin care aerul cald vine din partea de jos în sus. Un termometru ne arată în tot minutul gradul de căldură al atmosferei în care trăiește copilul.

Clonții babei. — V. *Săcară cornută*.

Clop. — V. *Pălărie*.

Clopoțele. — V. *Mărgăritărel*.

Clor. — Gaz galben verzui, cu miros înăbușitor, care provoacă tuse, stră-

nutare și o mare apăsare pe piept, uneori cu scui pare de sânge. Poate produce asfixie și pentru acest motiv este unul din gazele de război mult întrebuințate sub formă de obuze, sau de valuri. Este recunoscut ușor după miros și culoare. Are putere de a decolora și de a dezinfecă. Ca dezinfectant se întrebuințează sub formă de *clor lichid*, sau *apă clorată*, care se prepară amestecând doi litri de clor cu un litru de apă. — *Otrăvirea* cu clor produce iritația gâtului, tuse, greutate la respirație și la înghițit, fiind un gaz sufocant și asfixiant. Ca tratament se recomandă să se respire aer curat și amoniac. — În vorba de toate zilele sub numele de *clor* se înțelege *clorul de calciu*, care dă un miros tare de clor și este bun dezinfectant. (se pune în latrine).

Cloral (Idrat de). — Medicament calmant, somnifer, anestezic și antiseptic. Ca somnifer se dă în doză de 1—2 gr. la adult într'un pahar de apă, de ceai slab, sau de limonadă gazoasă, în minutul culcării. Se dă adeseori siropul, care conține 1 gr. de cloral la 20 gr. El nu constipă ca preparatele de opiu. Pentru lucrarea sa calmantă se dă în *convulsii*, 50 ctgr. până la 1 gr. într'un clistir de 150 gr. apă, cu un gălbenuș de ou. Contra *măncărimilor* de piele se dă în spălături de 5—10 gr. la 250 gr. apă. Contra *durerilor*, a *tusei măgărești*, a *palpitațiilor*, asociat, în doză de 1—2 gr., cu bromurele sau opiaceele, contra *răului de mare* 1 gr. într'o limonadă gazoasă. Ca antiseptic 10—20 gr. la 1000. — *Otrăvirea* cu cloral are următoarele semne: somn adânc, umflătura feței, puls slab, respirația rară, mâinile și picioarele reci, temperatura scăzută. *Tratament*: se deșteaptă bolnavul, i se provoacă vărsături prin gădilarea omușorului, sau dând ipeca. Căramizi calde, sau sticle cu apă fierbinte la picioare și în jurul corpului, fricțiuni uscate, muștare, cafea neagră, tare, pe gură, sau prin clistere, respirație artificială mai multe ceasuri.

Cloralamidă sau **Cloralfomidă**. — Cristale incolore. Lucrează ca și cloralul. Se dă în poțiune sau în praf: 2—3 gr odată.

Cloraloză. — Praf cristalin alb. Lu-

crează ca ipnotic (producător de somn). Se dă în doză de 20—75 ctgr. în buline. La deșteptare nu produce durere de cap, nici turburări digestive.

Clorat de potasă. — Un fel de sare albă, strălucitoare, cu un gust răcoros și înepător, care se întrebuințează în aprinderile de gură și de gât, în iritațiile gingiilor, în mughet, în amigdalitele acute, etc. în pastile, cari se topec în gură 6, 8, 10 pe zi, fără însă a le înghiți, dar mai bine sub formă de gargară, 4 gr. la 100 apă.

Cloreton. — Aceton cloroform. Ipnotic: se dă în boalele mintale. Anestezic local. Doză: 50 ctgr. până la 1 gr. în buline, sau în sirop. Soluțiunea de cloreton se întrebuințează ca anestezic local, sub numele de *Aneson* sau *Anesină* (2 la 100). Lucrează mai repede decât cocaina.

Cloridric (Acid). — Se întrebuințează ca excitant al digestiunii, în doză de 2 gr. la un litru de apă.

Cloro-anemie. — Caută la *Cloroză*.

Cloroform. — Se întrebuințează în toate operațiile, pentru a adormi bolnavii, ca să nu mai simtă nici o durere. Intrebuințarea cloroformului trebuie să se facă cu mare băgare de seamă. Pe *dinăuntru* se dă ca antispasmodic, anestezic și calmant, în doză de 1—4 gr. în băutură sau clistir. Nu trebuie să se dea la cei cu boală de inimă. Pe *dinafară* se dă în fricțiuni, în diferite linimente, sau unsoiri, pentru a combate durerile nevralgice, sau reumatice. Nu trebuie să uităm sticla destupată, căci aburii de cloroform se amestecă cu aerul din camera în care dormim și ne poate *otrăvi*, producându-ne vărsături, încetinirea respirației și a circulației sângelui, putând merge până la *asfixie* și *sincopă* (leșin). În aceste cazuri, ca tratament, se recomandă să se facă tracțiuni ritmate ale limbii și respirație artificială și să se pună capul mai jos decât corpul. În *otrăvirile* prin *înghițire* avem ca semne: mirosul special al halenei, durere de gât, răcirea mâinilor și picioarelor, slăbirea pulsului.

Clorometil. — V. *Metil*.

Cloroză, *gălbeneală*. — Sub acest nume se înțelege o boală specială a fetelor tinere, la etarea pubertății, caracterizată printr'un fel de paloare a

țesăturilor. Pielea are o înfățișare albă, bătând în galben, uneori chiar puțin verzuie, care seamănă cu ceara și din pricina aceasta boala și-a luat numele de *cloroză* (*chloros* galben-verzui). Buzele și gingiile sunt albe, decolorate, tot așa și căptușeala ploapelor (conjunctiva). Carnea este moale. Pofta de mâncare este micșorată, sau lipsește cu totul. Uneori bolnavei îi place să mănânce lucruri crude, necoapte, sau lucruri cari nu se mănâncă. Mistuirea se face cu mare greutate, pulsul e mic și repede, respirația cam grea, cea mai mică efortare produce bătae de inimă și înecăciune în piept. Bolnava simte o moleșeală peste tot, este tristă, apatică, sau nepăsătoare, nu este în stare să muncească, nici trupește, nici sufletește, are dureri de cap, migrene, amețeli și se pierde uneori. Regulele (menstruația) îi vin cu dureri, sunt puțin abondente și uneori nu le are de loc; alteleori pierde sânge prea mult, ceea ce o slăbește și mai mult. Semnele acestea de obicei se văd și la *anemie*, care nu se deosebește de *cloroză* decât prin faptul că anemia atinge amândouă sexele, pe câtă vreme *cloroză* este o boală a fetelor tinere, când ajung la pubertate și care se mai observă uneori și la femeile tinere. —

Tratament. Temeiul acestui tratament este fierul, (apa fieruginoasă, *cacodilatul de fier*, sau *feroconstants*, un preparat foarte bun. Se mai recomandă inhalatiunile de oxigen, preparatele amare (chinchina, quinas, gențiana), revent, în doză mică, pentru a combate constipația, fricțiuni uscate și aromatice peste tot corpul, un regim alimentar întăritor (carne roșie friptă puțin, carne crudă, măduvă de oase, ficat de vită fiert puțin și tocat în zeama lui, sau nefiert deloc, pește, ouă, lapte și preparatele lui, bere), plimbări și exercițiu în aer liber, idroterapie, băi sărate calde, ședere la țară, la munte, pe malul mării.

Clorur de etil. — V. *Chelen*.

Clorur de sodiu. — V. *Sare*.

Conicus benedictus. — V. *Schinel*.

Coacăz negru. — V. *Struguri negri*.

Coacăză, pălinele, pomușoară, rozincin, strugurei, strugurei roșii (*Ribes rubrum*, fam. saxifragaceelor). — Arbust care se cultivă prin grădini pentru

fructele sale comestibile, cari sunt roșii sau albe și din cari se face dulceață, compot, sau se mănâncă cu zahăr, cu vin, sau simple. Aceste fructe au o

acreală plăcută, mai ales când sunt preparate cu zahăr. Pulpă lor dă un suc (zeamă) care se poate păstra în sticle și care, amestecat cu apă zaharată, este o limonadă plăcută și sănătoasă. Siro-pul de coacăze se face cu 1 kgr. de suc, limpezit și filtrat și cu 1 kgr. și jumătate de zahăr. Aceste preparate sunt răcoritoare și bune pentru bolnavi și convalescenți, ca și pentru cei sănătoși.

Coacăză sălbatică. — V. *Agriș*.

Coacerea alimentelor. — Alimentele se mănâncă preparate la foc; prin aceasta mâncările au un gust mai bun și o aromă mai plăcută decât în stare naturală și se mistuie mai ușor, prin faptul că nu sunt așa tari și îndesate și se desfac mai cu înlesnire, așa că stomacul muncește mai puțin pentru ca să le digere.

Coadă boului. — V. *Lumânare*.

Coadă lupului. — V. *Lumânărică*.

Coadă mielului. — V. *Lumânare*.

Coadă șoricelului, *sorocina* (*Achillea millefolium*, fam. compozitelor). —



Fig. 114. — Coadă șoricelului

Plantă erbacee care crește prin livezi și pe marginea pădurilor. În medicină se întrebuințează vârfurile înflorite, sub formă de ceaiu din 20 la 1000. — La țară se culeg vârfurile înflorite, se usucă și se păstrează în loc uscat. La nevoie se iau cam

20 gr., se fierb într-o jumătate litru apă, se strecoară se îndulcește cu zahăr și se bea caldă, câte o ceașcă de 3 ori pe zi, pentru a vindeca tusa ușoară, provenită din răceală, atât la oameni



Fig. 113. — Coacăz

mari, cât și la copii, precum și pentru curățirea sângelui. Pe *dinafară* coada șoricelului se întrebuințează la *râni*, peste cari se presară praf făcut din această plantă.

Coadă vacei. — V. *Lumânărică*.

Coagul. — V. *Cheag*.

Coaltar. — Gudron extras din cărbune de pământ, negru, cu miros tare. Se întrebuințează ca dezinfectant, în spălături, injecțiuni, praf.

Coapsă, arm, cesvârtă, ciosvârtă. — Partea corpului care se întinde dela șold și stinghie până la genunchiu. Coapsa este formată de un singur os, *femur*, care se unește în sus cu trunchiul, pentru a forma șoldul, iar în jos

cu gamba spre a forma genunchiul. Osul este îmbrăcat de *II mușchi* foarte puternici, cari mișcă coapsa în timpul mer-



Fig. 115. —
Scheletul
membrului
inferior



Fig. 116. — Sistemul traectorial în vasele membrului inferior

sului în sus, în jos, înăuntru și în afară. Ea are o *arteră* foarte mare, numită *femurală* cu ramurile ei, cari duc sângele în toate părțile coapsei, de unde se întoarce prin *vine* numeroase. Mai are *nervi* cari însuflețesc mușchii și *pielea*, care este fină, căptușită de un strat de grăsime. Coapsa poate fi atinsă de inflamațiile, de

toate *rănirile* posibile, de *abcese*, *brăncă*, etc. La ea se mai pot vedea *anevrisme* și diferite *tumori*. Osul poate fi *rupt* în diferite locuri și *scrintit*. Nervii pot produce diferite dureri (*nevralgii*), în deosebi nevralgia *sciatică*. Dar toate aceste boale nu prezintă nimic particular și li se vor da aceleași îngrijiri și aci ca și în celelalte părți ale corpului.

Coarda ielelor. — V. *Silnic*.

Coaste. — Coastele sunt oase curbate în formă de arcuri, cari formează în cea mai mare parte pereții pieptului, în care se află inima și plămânii. Pentru aceasta coastele se unesc înainte cu șira spinării. Sunt în număr de 12 de fiecare parte, adică 24 cu totul; se numără de sus în jos și anume coasta




Fig. 117. — Scheletul toracelui
(ca să se vadă coastele)

1, 2, 3, etc. Inima bate între coasta a patra și a cincea din stânga. La oamenii slabi coastele se văd pe sub piele și se pot număra. Se pot frânge printr'o lovitură aplicată deodreptul asupra lor, sau printr'un alt accident. *Fracturile* de coaste se complică uneori de rănirea, sau inflamația plămânului, de pleurezie, etc., complicații cari se pot ameliora și vindeca printr'o îngrijire deosebită. Fractura coastei se cunoaște prin aceea că bolnavul simte în locul ei o durere foarte mare, care crește prin cea mai mică mișcare, prin pipăire, prin mișcările respirației. În cazurile de fractură se recomandă cea mai mare odihnă și aplicarea repede a unui *bandaj de corp* destul de strâns, care împiedecă dizlocarea capetelor osului rupt și micșorează durerea. De multe ori, fără să te lovești, simți în

COBA

dreptul coastelor o durere vie, care se mărește prin apăsarea cu degetul pe locul dureros. (nevralgia *intercostală*), datorită nervilor cari merg printre coaste.

Cobai (sau porc de India). — Este un animal mic, cam cât pui de iepure, întrebuințat mult în laborator, de către medici, pentru experiențe. În corpul lui se prind foarte ușor microbii officei, ai dalacului, ai difteriei, de aceea servește mult când se fac cercetări cu acești microbi.

Coca. — Foile arborelui *Erythroxylum coca* din America, întrebuințate ca: stomachic, calmant și nutritiv. Principiul activ: *cocaina*. Se dă: praf de foi 4—6 gr. în electuar, în pastile, în buline, extract: 2—4 gr. în poțiune, tinctură alcoolică: 5—15 gr., elixir și vin: 15—30 gr., infuzie (ceaiu): 5—10 la 10000.

Cocaină (Cloridrat de). — Este un alcaloid extras din *coca*. Se întrebuințează ca *analgezic*, în durere de stomac, tusă măgărească, oftică, răul de mare. Ca *anestezic* se întrebuințează altă dată mult sub forma de injecții sub piele; din cauză că este otravă puternică a fost înlocuit în cazurile când voim să facem operații mici la ochi, la dinți, pe piele, la amigdale cu alte medicamente mai puțin otrăvitoare (cum este novocaina de exemplu). În operațiile la ochi se întrebuințează (3—5%) mai cu seamă sub formă de picături, iar în cazurile când dorim se suprimăm unele dureri oculare sub formă de alifie (1/20). — *Otrăvirea* cu cocaină are următoarele semne: căldură în obraz, turburarea vederii, lărgirea pupilelor, apăsare în piept, puls mic, excitație, la unii moleșeală. *Tratament*: vom face ca bolnavul să verse gâdilându-i omușorul, sau dându-i ipeca, apoi fiertură de coaje de stejar, de frunze de nuc, sau tanin, pentru a forma un tanat insolubil. Se mai dă cafea, ceaiu, șampanie, muștare la pulpe, injecții de cafeină, de eter, sau inhalatii cu nitrit de amil; respirație artificială (vezi *Asfixie*).

Cocainomanie. — Este intoxicația cronică prin cocaină. După câtva timp de întrebuințare această otravă devine o necesitate, fără de care organismul nu se simte bine. Cocaina de obicei

COCO

se trage pe nas (ca tabacul) și mai rar se ia sub formă de injecții. Cocainomania se răspândește mai repede ca celelalte *toxicomanii*, căci printr'un simplu gest discret praful ucigător, fără miros denunțator și care nu pătează, e dus la nas, aproape fără să fie văzut. Beția cocainică, la fel cu cea de *opiu* produce o stare de bucurie, dar pe când opiul e calmantul ce dă liniște deplină, cocaina este excitant violent. Beția de cocaină constă la început, într'o senzație de frig la față, pielea devine palidă, vărsături, palpații și insomnie. — La cei obișnuiți, aproape imediat, se produce o stare de bine, specială, care durează două, sau trei ore și care se va traduce în afară printr'o mulțumire de sine, vioiciune a trupului și a spiritului, un sentiment adânc de putere și de inteligență superioară. Cocainomanul își găsește memoria excelentă, judecata sigură, se înflăcărează, devine vorbăreț, gesticulează, face jocuri de cuvinte, proaste deseori. După cele trei ore de încântare urmează apoi tristețea, deseperarea, spaima. Dar dela o vreme, tot mărinind dozele, memoria și voința slăbesc. digestia e greoaie, constipația alternează cu diareia. *Tratamentul*: Oprirea cocainei și internarea bolnavului într'un spital ori sanatoriu. Să se ia severe măsuri contra traficantilor și localurilor clandestine unde se practică toxicomaniile.

Coccyx, *osul noadei*. — Este așezat sub osul *sacrum* (osul crucii) la partea de jos a șirii spinării.

Cochinadă, *cochinar*. — V. *Scarlatină*.

Coci. — Caută la *Microbi*.

Cocoașă, *gheb* (lat. *gibbus*). — *Cifoză*, sau *scolioză*, cocoașa se află mai întotdeauna în spate, mai rar în dreptul coastelor, sau la piept. Rar se întâmplă ca această cocoașă să fie din naștere. Uneori această ghibozitate din naștere nu zdruncină sănătatea și copilul poate trăi. Alteori însă ea este semnul unei stări bolnăvicioase (*rachitism*), care nu se vindecă decât printr'o căutare îndelungată și cât se poate de îngrijită. Oprește creșterea corpului, pieptul rămâne mai strâmtat și rău conformat, ceea ce împiedecă plămânii de a respira bine, din care pri-

cină acei copii sunt slabi de piept și trebuie păziți bine de răceală. Când ghebul este prea mare este bine să-l înconjurăm cu perinute de vată și să-l acoperim cu o căptușeală mai groasă, ca să nu fie supus la lovitură. De multe ori copilul se naște sănătos, crește bine până la o vârstă oarecare, când, printr-o întâmplare nenorocită, a căzut pe șira spinării și și-a rupt-o. În locul rupturii șira s'a încovoiat și, dacă cumva copilul nu moare, ea se vindecă încovoiată. Alteori fără să cadă și să-și rupă șira spinării, i-se umflă și-l doare șira spinării, care începe a se încovoia din ce în ce mai mult (*boala lui Pott*). Se mai poate întâmpla ca șira spinării să se strâmbe din pricina unei atitudini vicioase, în școală. În acest caz cocoșa poate să se întindă la mai multe inele și să fie astfel mai mare. Boala lui Pott se poate vindeca numai prin operație și foarte bune îngrijiri. Celelalte cazuri se vindecă prin măsuri igienice și un tratament special.

Cocoloș. — V. *Porumb*.

Codeină. — V. *Opiu*.

Codoform. — Este un preparat compus din codeină, bromoform, belladonă, aconit, terpină și benzoat de sodiu, menit să oprească tusa, să liniștească pe bolnav, mai ales în tusa fumătorilor, tusa uscată, nervoasă. Se prezintă sub forma de pastile, din cari se dau bolnavilor adulți câte 5 pe zi, iar copiilor peste 5 ani câte 2—3 pe zi. Sub formă de sirop este și mai ușor de luat, având un gust plăcut, dându-se câte 2—4 linguri adulților în 24 de ore și câte 2—3 lingurițe copiilor mai mari.

Coji de lapte. — V. *Impetigo*.

Cojoana. — Stațiune balneară aproape de Cluj. Apele conțin foarte multă sare și pucioasă. Se recomandă în reumatism, gută, scrofuloză, tuberculoza osoasă.

Cola africană (*Cola acuminata*, fam. malvaceelor). — Se întrebuințează semintele. Principiul activ : *cafeina*, *teobromina*, *kolanina*. Se dă în diareele cronice, în doză : tinctură alcoolică : 2—16 gr., extract fluid : 1—5 gr., pulbere : 6—10 gr., în infuziune, vin : 30—60 gr.

Colăceii babei. — V. *Nalbă*.

Colagog (dela grec. *cholé*, fiere, bilă și *agein*, a alunga). — Medicament care face să iese fierea prin mațe, odată cu materiile fecale.

Colaps (lat. *collabori*, a cădea). — Însemnează o scădere repede de putere, fără leșin propriu zis cum se întâmplă în unele boale grave : febra tifoidă, pneumonie, etc. În stările de colaps se recomandă muștare la pulpe și picioare, ventuze uscate pe spate și piept, fricțiuni tari spirtoase, lovituri cu mâna pe corp, apoi se va acoperi bine bolnavul, punându-i la picioare sticle cu apă fierbinte, sau cărămizi calde. I se vor da pe dinăuntru excitante difuzabile : alcool, acetat, sau carbonat de amoniac, eter, mosc, sau se vor face injecțiuni sub piele cu eter, cafeină, uleiul camforat. Când colapsul vine în urma unei emoragii, pe lângă tratamentul de mai sus, se vor face injecțiuni sub piele, sau în vine, cu ser artificial.

Colargol. — Argint coloidal. Antiseptic destul de puternic, nu este toxic. Se dă în boalele infectioase, în soluțiune glicerinată, în pilule, injecțiuni subcutanate, sau intravenoase. Doză : 5—15 ctgr. pe zi. Se întrebuințează mult în bolile de ochi, punându-se câteva picături zilnic dintr-o soluție de 0.20 ctgr. la 10 gr. apă.

Colehicină. — V. *Brândușă de toamnă*.

Cold-Crem. — Pomadă formată din ceară, ulei de migdale dulci, tinctură de benzoe (smirnă), apă și esență de trandafiri. Este o alifie moale, cu miros plăcut, dar care se răncește iute. Când este proaspătă înmoaie pielea și se poate întrebuința atunci când aceasta este iritată, sgârbiată, crăpată și produce mâncărime. Nu trebuie să facem abuz ungând pielea în fiecare zi, fiindcă ea astupă porii și împiedecă funcțiunea lor regulată.

Colecistită (grec. *chole*, fiere, bilă și *kistis*, beșică). — Inflamația sau aprinderea beșicii fierei (veziculei biliare).

Coledoc (gr. *chole*, fiere, bilă și *dochos*, care conduce). — Canal care duce fierea din ficat până în mațul subțire, în duoden.

Colemie (grec. *chole*, fiere, bilă și *haima*, sânge). — Trecerea, sau văr-

sarea fierii în sânge; este tot una cu *gălbănirea* sau *icterul*.

Coleră sau **Holeră**. — Leagănul colerei este India unde se cunoaștea de pe vremurile cele mai îndepărtate și unde bătue aproape în fiecare an, cum ar fi la noi frigurile. Dar acolo nu este așa de gravă ca pe la noi, poporul fiind obișnuit cu ea. Prima epidemie de coleră s'a ivit în Europa, în 1830. Se întinde foarte ușor și agentul de cepătenie al propagării ei este omul, pe uscat și pe mare, în toate părțile pe unde a pătruns comerțul și civilizația, mulțumită mijloacelor de comunicație. Colera se propagă prin materiile fecale ale bolnavilor, cari murdăresc apa de băut, rufăria, hainele și așternutul, cari, spălându-se, apa duce microbii în pământ iar de aci se duc în apele din puțuri, sau din râuri și apoi prin această apă de băut se întinde repede în toate părțile. Microbul colerei a fost descoperit în 1883 de către învățatul doctor Koch. Acest microb se află în scaunele bolnavilor de coleră, de unde trece în apele de băut. Bacilul colerei este strâmb ca un arc, ca o virgulă, de unde și numele de *bacil-virgulă*, produce un fel de materie otrăvitoare, toxina, care mortifică pielea ce căptușește mațele și care, dacă se resoarbe otrăvește sângele și paralizază nervii organelor circulatoare. — *Semnele boalei*. Colera prezintă forme foarte diferite: unele nu prezintă nici o gravitate, altele sunt cumplite și omoară bolnavul în câteva ceasuri. *Perioada I* numită și *prodromică* este caracterizată prin urdinare. Incubarea boalei are o durată variabilă, dela câteva ceasuri până la câteva zile. Omul este apucat de dureri în pânțe (colici), urmate de scaune, la început de materii fecale apoi biliase (ca fierrea) și seroase, însoțite adeseori de ghiorăituri. La început bolnavul are fierbințeală mică, sau de loc, uneori cu aplecare spre răcirea corpului și câte odată este cuprins de sudori abundente. *Perioada II*. Uneori boala începe deadreptul prin această perioadă. Scaunele sunt foarte dese, nu mai au miros fecaloid, sunt seroase și constituite dintr'un lichid apos, fără culoare, în care înnoată niște flocoane albi ce s'au asemuit cu grăunțele de

orez (*scaune riziforme*). Aceste scaune conțin microbii colerei. În același timp se ivesc vărsături de materii apoase, dese, însoțite de dureri de stomac. Bolnavul are o sete arzătoare, nepotolită. Udul care dela început s'a împuținat, acum nu mai e de loc. Limba este albuie, umedă. Pânțele este turtit și la pipăire pare a fi împăstat. Bolnavul slăbește văzând cu ochii, mâinile și picioarele se răcesc, pulsul repede și mic, crampe strașnice, trăsăturile feței se șterg, circulația sângelui începe a se încetini și bolnavul cade într'o stare algidă (rece ca gheața). Această perioadă poate dura o jumătate de ceas, un ceas, o zi, sau 2 zile. Copiii prea mici, și bătrânii pot să moară în această perioadă. *Perioada III*, numită și *algidă*. Scaunele se răresc, uneori încetează. Bolnavul se schimbă la față: nasul se subțiază, ochii se înfundă în cap. Are ameteți, vâjiituri de urechi și durere de cap.




Fig. 118. — Vibriionul holerei

a = mult mărit: b = văzut normal

Glasul se subțiază, se taie, se stânge, neliniște mare cuprinde bolnavul care e chinuit de sforțări continue de a vărsa și de dureri sau crampe, mai ales la pulpe, foarte mari. Apoi bolnavul se răcește și mai mult, se acopere de o sudoare rece și vâscoasă, devine nepăsător, în stare de amortire, cu ochii peste cap și cu lumina lor turbure, până ce moare. *Perioada IV*, sau de *reacțiune*. Dacă omul nu moare în perioada de mai înainte semnele boalei încep a se îmbunătăți, toate funcțiunile se restabilesc, așa că în 12—15 zile bolnavul intră în *convalescență*, care este lungă și se complică adeseori de boale de stomac, de urdinare, de paralizii și de turburări ale inteligenței. Omul vindecat de coleră nu este scutit de a mai fi vreo-

dată bolnav de aceeași molimă. *Tra-tament. Mijloace preventive.* Unele au de scop de a îngrădi boala, în țara ei de origină, sau în primele locuri pe cari le-a năvălit, prin ajutorul *carantinelor* și a *cordoanelor sanitare*, cari o închid într'un cerc tare, nepătruns. Pentru aceasta sunt anume regulamente așa zise internaționale. Prin urmare prima condiție pentru a împiedeca împrăș-tierea colerii este de a asigura cură-țenia și aerăția orașelor și a satelor, apoi a locuințelor. În timp de epide-mie de coleră nu este bine să stăm închși în casă. Trebuie să eșim în fie-care zi, să deschidem ferestrele, pentru ca aerul și soarele să omoare microbii, curățenia cea mai mare să domnească în casă, filtrele de apă să fie în stare bună și să nu aibă nici un fel de miros, latrinele să fie deșertate și dezinfectate în fiecare zi cu sulfat de cupru. Când se găsește deja un bolnav în casă, a-cesse măsuri, trebuie luate cu mai mare asprime: bolnavul trebuie izolat de ceilalți locuitori, precum și persoanele cari îl îngrijesc. Lingerie, vasele, și toate lucrurile cu cari se servește bol-navul, trebuie cu amănuntul dezinfec-tate. Mijlocul cel mai bun de a ne feri de contagiu este: înainte de a ne a-șeza la masă să ne spălăm cu apă și săpun fața și mâinile și să ne gargari-sim. Apoi să trecem prin flacăară, la o lampă de spirt, cuțitul, furculița și lingura, ca și bucata de pâine. În lo-cul feței de masă e mai bine să punem o mușama, pe care s'o ștergem cu sublimat corosiv ($1/1000$). În timp de epidemie trebuie supravegھیată hrana. Nu e nevoie ca omul să-și schimbe modul lui de traiu, mai ales când tră-ește bine. Trebuie să ne păzim de fruc-tele și legumele crude. Să ne ferim de mâncările cari se mistue greu, să ur-măm un regim sănătos și înfloritor, fără să alergăm după tot felul de bău-turi așa zise anticolerice. Cel obișnuit cu câte puțin coniac, sau rom, poate să urmeze înainte fără însă a trece măsura. În fine, trebuie să ne punem în stare de a rezista dușmanului, când ne atacă și să nu ne irităm stomacul și mâțele prim năncări și băuturi, cari pot provoca urdinare. Colera n'are nici o doctorie specială și tratamentul ei variază după perioada în care se gă-

sește boala. În *perioada I* trebuie să îngrijim bolnavul cât se poate de iute, dela început chiar și astfel de multe ori reușim să îndepărtăm atacul ade-vărat de coleră. Vom da pentru aceasta *laudan* (tinctură de opiu), fie într'un ceai oarecare, fie în clistir, *subnitratul de bismut*, ori *salicilatul de bismut*, 8 până la 10 gr., în 24 ore, în pachete de câte un gram. Vom da în același timp și ceaiurile aromatice, de nalbă de mușetel, de soc, de izmă, de flori de teiu și altele. În *perioada II* vom continua cu *laudanul*, vom da și sali-cilatul de bismut. Dacă bolnavul varsă îi vom da băuturi de ghiață, apă ga-zoasă rece, apă albuminoasă (vezi acest cuvânt), ceai de mentă, etc. În *pe-riooda III* zisă *algidă* (de răceală) tre-bue să provocăm, cu ori ce preț, căld-ura, să readucem circulația și pri-menirea sângelui în plămâni. În urma prea multor scaune sângele omului se împrăștiează și se îngroașe, așa că el circulă cu anevoință, nu se mai pri-menește în plămâni, unde ia oxigen, ci se încarcă cu acid carbonic și inima își pierde toate puterea. Trebuie dar să împiedecăm moartea care vine prin oprirea circulației sângelui și din în-cetarea răsufării. Întrebuințăm când *căldura*, când *frigul*. Căldura se în-trebuințează sub formă de cărămizi calde la picioare, fricțiuni uscate, cu peria, sau cu mânuși aspre de păr, fricțiuni umede cu flanelă înmuiată în rachiu, sau oțet camforat, sub formă de băi calde, sau de băuturi calde. Frigul se întrebuințează sub formă de idroterapie, de apă rece, sau cu ghiață pe dinăuntru și pe dinafară. Unii mai întrebuințează și urticațiunea (bătaia cu urzici), care se poate înlocui cu fricțiuni făcute cu spirt, sau cu esență de terbențină, etc. Dăm băuturi sti-mulente, sub formă de ceaiu rusesc, de romăniță (mușetel), de izmă, melisă, cafea și altele. Se mai dă oțetul de țipirig (acetul de amoniac), 8—10 gr. eterul 1—2 gr., etc. Bolnavul va bea într'una cantități mari de apă, pentru ca să se înlocuiască apa pier-dută prin scaunele multe. Alții in-troduc apă prin clistire. Se poate in-jecta în sângele vânos al bolnavului apă sărată pentru a subția sângele care s'a prea îngroșat. Cel mai bun

lichid de injectat, *serul artificial*, este : apă distilată, 1000 gr., clorur de sodiu (sare) 7 gr., sulfat de sodă (sare amară) 10 gr. Acest lichid trebuie să fie cald de 38 până la 44 grade centigrade. Trebuie să injectăm 2 până la 2½ litriuri odată și într'un sfert de ceas. Se recomandă foarte mult acidul lactic, ca profilactic, în doză de 4—6 gr. pe zi, iar în perioada III (algidă) 15—20 gr. și anume : apă 800 gr., acid lactic 15—20 gr. Să se bea din când în când câte o jumătate pahar. În *perioada IV*, când reacțiunea este francă și normală, nu mai avem de combătut decât câteva simptome gastro-intestinale, prin mijloacele arătate la începutul tratamentului. În caz când reacțiunea este gravă, neregulată și complicată vom redrepta acțiunea nervoasă prin alcool, cafeină, injecții de eter, hidroterapie, etc. Cetitorul nu se va încumeta să trateze el colera. Cel mai bun mijloc de a preveni boala, în timp de epidemie, este să se facă injecții cu vaccin anticoleric, tuturor celor din aceeași localitate. Acest vaccin a dat rezultate foarte bune totdeauna și este singurul mijloc de a opri marile epidemii de cholera.

Coleră infantilă, colera copiilor. — V. *Intestin (Enterita coleriformă)*.

Colerină, colera noastră, colibaciloză. — Se ivește în timpul verii, când facem abuz de mâncare luând băuturi acide și foarte reci, fructe verzi, ne-coapte. Se arată uneori printr'o indispoziție repede, prin scaune numeroase, lichide ca și apa, însă puțin dureroase, sete și fierbințeală moderate. Alte ori ea se arată cu furie mai mare : pe lângă urdinare, bolnavul mai are vărsături dese și verzui ca fierea, o durere mare și arzătoare la stomac și mațe, răcirea corpului, câteva crampe (dureri) în membre, mai ales la pulpe și sfârșeală. Colerina este o formă de *diaree* dar poate fi și un simptom dela începutul colerii, sau chiar o formă mai ușoară a acestei boale, când ea bătute în mod epidemic. Colerina își are microbul ei, care se numește *colibacil* și care trăiește de obicei în intestine, în mod nevinovat, dar printr'o cauză oarecare, răceală sau abuz de mâncare, sau de băuturi

reci, el începe a se înmulți și a produce *toxine* în cantitate mare, cari dau naștere la această diaree, numită colerină. **Tratament.** Odihnă la pat, dietă la mâncare, sau mai bine bolnavul nu va mânca nimic în 24, sau chiar 48 de ceasuri, ci va bea apă curată sau fiartă (dietă idrică), o apă minerală oarecare, ceaiu slab cu puțin coniac, sau rom, limonadă cu acid lactic, în cantități mici. În cazurile grave se vor face injecții sub piele cu ser artificial (apă sărată), clistire mari cu apă caldă, cataplasme calde, pe pânțele și sticle cu apă caldă, în jurul corpului. După 2—3 zile, bolnavul va fi pus pe regim lactat : la început lapte tăiat cu apă curată, sau cu apă de



Fig. 119. — Colibacili

A = normali ; B = mult măriți

var, apoi lapte curat, iar mai târziu supă, ouă, până se va ajunge la regimul ordinar. Ca medicamente se recomandă preparatele de opiu, mai ales laudan câte 5—10 picături în apă, de 3—4 ori pe zi, bismut, dermatol, cretă preparată, apă de var, tanin, ratanie, nitrat de argint, etc., spălături intestinale simple sau medicamentoase, se mai recomandă pe dinăuntru apă albuminoasă (bătută cu albuș de ou) și clistire cu rădăcină de nalbă, cu capete de mac, cu scrobeală.

Colesterină. — Substanță biliară care se găsește mai ales în calculii (pietricelele) ficatului.

Colibă. — V. *Locuință*.

Colibacili. — V. *Microbi*.

Colibaciloza. — V. *Colerină*.

Colibița. — Stațiune climaterică în jud. Bistrița-Năsăud ; bună pentru cântarea bolilor de plămâni și slăbiciune generală fizică. E așezată la 800 m. înălțime în mijlocul unor păduri. Are și un sanatoriu.

Colică epatică sau hepatică. — V. *Epatică*.

Colici, dureri de pânțec, mătrice, vătămătură. — Prin *colici* se înțeleg mai mult durerile de intestine *colici intestinale*, cari la copiii mici se cunosc sub numele de *mătrice*, sau *matrinchină*. Aceste dureri se deosebesc de celelalte dureri cari sunt de natură nevralgică, reumatismală, etc., sau de acele cari sunt localizate în piele, sau în mușchi. Se mai deosebesc și de așa zisele *colici epatice* sau de *ficat*, *colici nefretice* sau de *rinichi*, cari își au punctul lor de plecare din aceste două organe, de *colicile saturnine* sau de *plumb*. *Colicile intestinale* se arată printr-o durere, mai mult sau mai puțin tare, ce se mărește la cea mai mică mișcare și se însoțește de un fel de neliniște, de paloarea feței cu ochi tăiați, de o sfârșeală și o durere care ni se pare că ne sfâșie, ne rupe, sau ne arde și care este mai puternică în jurul buricului. În același timp bolnavul simte trebuința de a eși afară și în cele din urmă el scoate ceva materii lichide, alte ori se duce degeaba. Această trebuință de a merge afară nu se află decât la colicile intestinale, ceea ce ne pune pe cale de a le deosebi de celelalte dureri ale pântecului. *Mătricea* este cea dintâi durere, mai de seamă, pe care o simte copilul după ce s'a născut, din care pricină țipă, se svârcolește, își sgârcește picioarele, lapădă țâța din gură. Această stare ține până ce îl scoate afară și atunci face niște materii lichide și verzui, cu flocoane albicioase. Odată cu aceste materii ies și gaze (vânturi), după care copilul se liniștește. Mai mult sufăr de aceste colici copiii slabi, piperniciți, rău desvoltați, cu toate că ele se pot vedea uneori și la copiii robuști, cu înfățișare sănătoasă. Cauzele mătricii sunt mai multe: în primul rând este hrana rea, când copilul se hrănește cu biberonul și atunci sau laptele de vacă nu este bun, sau că biberonul nu se ține în stare curată. Dacă este hrănit de mamă, poate avea dureri pentru că mama nu se nutrește cum trebuie, sau că mănâncă lucruri a căror proprietăți iuți trec în lapte: fasole, varză, ceapă, salate cu oțet și altele, ori că mama este prea oste-

nită, supărată, emoționată, nedormită și atunci laptele nu este tocmai bun. Pentru oameni mari colicile intestinale de asemenea își iau naștere dintr'o abatere dela regim: sau că mănâncă prea mult odată, sau că hrana n'a fost bună și nu s'a putut mistui bine, fructele și legumele acide, crude, băuturile reci, mai cu seamă cele luate când corpul este înădușit, *Tratament*. Mai întâiu de toate trebuie căutată cauza boalei și împrejurările în cari se arată pentru ca, acestea fiind depărtate, să se risipească boala și să se poată ocoli pe viitor, ca să nu mai revie. În cazurile obișnuite de mătrice mamele dau copiilor, pentru a le calma durerile, diferite ceaiuri: de izmă, mușețel, anason, angelică, chimion, cimbru de câmp, etc., iar pe pânțec le pun cârpe calde, cataplasme calde de făină de în, simple sau stropite cu câteva picături de laudan, sau îi ung pe pânțec cu ulei camforat, de camomilă (mușețel), sau acopere pânțelele cu vată, sau flanelă caldă. Se va da copilului să sugă regulat și de mai puțin ori. În lapte se poate pune o apă alcalină, sau *apă de var* (5—10 gr., la un bibeorn), sau *dextrină* (1 linguriță de cafea). Copilului nu i-se va da nimic altceva de mâncare decât numai lapte fiert, sau sterilizat, unt de ricină, sau i-se va pune câte o clismă, după cari se ușurează. Ne vom feri a da copilului picături de opiu, de flori de maci, cari sunt foarte periculoase. La oamenii mari se va da curățenie (unt de ricină, 30 gr., sau sulfat de sodă, ori de magnezie, 20 gr.), iar pe pânțele se vor pune cataplasme cu laudan, cârpe calde, muștare, și diferite unsori calmante ca mai sus. Bolnavul se va feri de răceală și umezeală, va mânca mâncări ușoare, se va păzi de substanțe feculente, acide și excitante. O poziune foarte bună pentru adulți este: apă de mentă, apă de melisă, câte 30 gr., apă cloroformată, 100 gr., laudan, 30 picături, apă de laur-cireș, 10 gr., sirop de flori de portocal, 30 gr.: să se bea la fiecare ceas câte o lungură.

Colici nefretice. — V. *Rinichi*.

Colir. — Medicament care se pune în ochi sub formă de picături. Colirele se prepară cu apă la care se adaugă diferite substanțe medicamen-

toase, cum ar fi : piatra iadului (nitrat de argint), atropină, sulfat de cupru, sulfat de zinc, etc. Se pun în ochi cu un instigator, sau cu o sticlă cu dop de sticlă, cu care se numără picăturile. Nu este bine să se întrebuințeze când este vorba de ochi, decât numai medicamente prescrise de doctor, căci dacă ne-am lua după babe, sau după îndemnul altor oameni, cari ne spun că și ei ar fi suferit de aceeași boală, am putea să ne stricăm ochii și să ne pierdem vederea pentru totdeauna.

Colită (gr. *kiolon*, intestinul, sau mațul gros și terminațiunea *itis*, care însemnează inflamație). — Se numește astfel inflamația colonului, adică a mațului gros; ea este de mai multe feluri : catarală, sau superficială, mucoasă, câteodată ulceroasă, sau ulceromembranoasă. În colită *simplă*, sau *catarală*, bolnavul are diaree (urdinare). Când colita este mai gravă pe lângă diaree bolnavul are dureri scemături și uneori scaune cu sânge. Leziunile colitei simple se văd în colera nostră, în colera epidemică, în febra tifoidă și în alte boale în cari bolnavul are diaree. Colita *mucoasă*, care se mai numește și *foliculoasă*, sau colita *ulceroasă simplă*, se arată mai cu seamă la copiii neîngrijiți, rău hrăniți și atinși de diaree cronică (învechită); ea se mai vede la ofticoși. Colita *ulceromembranoasă* se deosebește prin formarea și desertarea de false membrane (pielite). *Tratamentul* colitei este același ca și al *enteritei*. În colita care seamănă cu dizenteria, vom recomanda bolnavului repausul în pat, apoi i se va da o doză de calomel, 40 până la 60 ctgr. Pe pânțe se vor aplica în permanență cârpe muiate în apă caldă, acoperite de taftă gomată, sau de mușama, ori de gutapercă. Bolnavul se va hrăni cu apă de var, cu ouă, carne crudă rasă. În fiecare dimineață se va da bolnavului o mică doză de sulfat de sodă (4—5 gr.), în apă de Vichy, sau sare de Carlsbad, o linguriță, în timp de 15—20 zile. Când sunt răni pe mațe se vor face clizme astringente, de exemplu cu : acid tanic, 4 gr., gumă arabică, 60 gr., apă fiartă 1000 gr. laudan, 25 picături.

Coloeint. — Fructul plantei *Cucumis colocynthis*, din fam. cucurbita-

celor, originară din Africa, se cultivă în Europa, în Spania și Archipelag. Lucrează ca purgativ drastic foarte violent, din care pricină se întrebuințează foarte rar. Se dă pe *dinăuntru* sub formă de : extract, 10—30 ctgr., praf, 20—50 ctgr. Pe *dinafară* se dă tinctură, 1—5 gr. la 45 gr. unt de ricină, ca liniment, sau unsoare (o linguriță de cafea se pune pe pânțe și se fac trăsături cu ea, dimineața și seara, ca purgativ). *Otrăvirea* cu coloeint are ca semne : vărsături continue, moleșală, răcirea mânilor și picioarelor. La început până nu s'au ivit vărsăturile, trebuie să le provocăm prin gâdilirea omușorului, sau dând ipeca, apoi se va da laudan 20 picături, într'o lingură de apă, sau în clismă, stimulente, fricțiuni, sticle calde, băuturi îndulcitoare, cataplasme, lapte.

Colodiu. — Este o soluție de fulmicon (praf de bumbac) în eter, la care se adaugă o cantitate mică de alcool. În medicină se întrebuințează pe *dinafară*, când voim să acoperim o rană, o sgârietură, ca să nu vie în atingere cu aerul. Pentru aceasta ungem acel loc cu un pumătuf înmuiat în colodiu, iar acel strat de colodiu, după ce s'a evaporat eterul, se transformă într'un fel de pelicioară foarte fină, impermeabilă, foarte aderentă, care rezistă la apă și la alcool și nu poate fi ridicată decât numai cu ajutorul eterului. O rană astfel acoperită este la adăpost de aer și de praf. Dacă la 15 gr. de colodiu punem 1 gr. de unt de ricină, avem *colodiu elastic* sau *ricinat*, care se usucă mai încet, însă este mai solid și se lipește mai tare.

Collo-iode (Dubois). — un preparat bun al iodului, format din iod coloidal 3 ctgr. pe 1 c.m.c. sub formă de iod hidrați amino sodici. Se administrează în cazurile de sciatică, reumatism articular, sau diformant, gută, arterioscleroză, sub formă de soluție, câte 10—60 pentru adulți și 8—20 pentru copii. Nu produce fenomene de iodism, cu alte preparate de iod, fiind deci cu mult mai ușor de suportat.

Colori sau culori veninoase, vâpseli otrăvicioase. — Vâpseliile se întrebuințază într'o sumedenie de lucruri pentru a le da o înfățișare mai plăcută. Astfel se vâpsesc bomboanele, vinurile

și licorurile, îmbrăcămintea (ciorapii, cămășile colorate, unele stofe), perdelele, tapetele de hârtie. Diferitele jucării pentru copii, cari sunt vâpsite cu culori otrăvicioase, devin periculoase pentru toți cei ce umblă cu ele. Cele mai primejdioase sunt *colorile minerale*, mai ales *verdele*, care cuprinde *arsenic*, apoi *albul*, care poate să fie făcut cu *plumb roșu viu*, făcut cu *chinavar*, care cuprinde *mercur* (argint viu), *albastrul*, care se face cu *cupru*. Sunt unele vâpseli de *origine organică* tot așa de veninoase: *anilina*, *fuxina* cu derivatele lor, cari dau frumoase culori de violet și roșu. Aceste culori aplicate pe piele, cu vestmintele, pot produce erupțiuni foarte supărătoare, dureroase și de lungă durată, iar luate pe dinăuntru pot da semne de otrăvire: dureri de stomac, la mațe (colici), sudori reci, răcirea mânilor și picioarelor. Se înțelege că în toate aceste cazuri de otrăvire se va chema cât se poate mai grabnic un doctor. Trebuie să fim cu mare băgare de seamă ori de câte ori umblăm, sau întrebuințăm, lucruri vâpsite și să nu pierdem din vedere că *ori ce vâpșea, care nu ține la cea mai mică frecare, se prăfuieste și cade de pe obiect*, este în totdeauna o vâpșea otrăvicioasă. Să băgăm de seamă ca copii să nu ducă la gură tot ceea ce cade în mână. Vâpselile otrăvicioase sunt oprite de lege și fabricanții, împreună cu negustorii, sunt răspunzători de întrebuințarea lor.

Colostru, sau **corastră**. — Cel din tâiu lapte al femeii, după ce a născut. El este puțin purgativ și prin urmare foarte bun pentru copii, pe care îl ajută să dea afară *meconiu*l.

Colți de lup. — Bucățele mici de os cari se deslipesc dintr'un os mort și ies afară printr'o fistulă, împreună cu puroiul.

Colțuni. — V. *Ciorapi*.

Collubiazol. — Preparat cu rubiazol, este un bun dezinfectant în angine, rino-faringite, gingivite, amigdalite simple, etc., întrebuințându-se sub formă de badijonări, gargară, sau instilații.

Columbo. — Rădăcina unui arbust numit *Cocculus palmatus*, din fam. menispermaceelor, care conține un prin-

cipiu activ: *colombina*, sau *berberina*. Lucrează ca tonic stomachic puternic. Se dă pe *dinăuntru* sub formă de: extract, 20 ctgr. până la 1 gr. praf 50 ctgr. până la 4 gr., tinctură: 5—15 gr.; vin: 50—100 gr.: ceai, din 10 la 1000.

Columna sau coloana vertebrelă, șira spinării. — Columna, sau coloana vertebrală este formată dintr'un șireag



Fig. 120—Columna vertebrală

de oscioare suprapuse, numite *vertebre*, în număr de 24 și anume: 7 la gât, 12 la spate, 5 în dreptul rinichilor apoi, *sacru* (osul crucii) și *coccix* noada cari se compun tot din vertebre cusute între ele. Fiecare vertebră prezintă înaintea o umflătură numită *corpul vertebrei* ale căruia fețe de sus și de jos, cari sunt puțin găunoșite, răspund la celelalte vertebre, înapoi și pe laturi o jumătate de inel, *arcul vertebral*, care înconjură *canalul vertebral* în care se află *măduva spinării*. Acest arc, în dreptul unirii lui cu corpul, prezintă de fiecare parte câte o scobitură, una în sus și cealaltă în jos cari, împreună cu acele ale vertebrelor de sus și de jos, formează *găurile de conjugățiune* (unire),



Fig. 121.—Sternul coastele și șira spinării, văzute de sus

prin care ies nervii măduvii. Arcul dă naștere, între altele, la niște ridicături, sau apendice, dintre cari patru verticale, *apofizele articulare*, două transversale, *apofizele transverse* una orizontală, *apofiza spinoasă*.

Această din urmă, cu toate similarele ei, formează *spina dorsală* sau *șira spinării*. Articulația, sau încheierea vertebrelor între el, se face printr'un disc, așezat în găunoșirea corpului vertebrelor și prin unirea apofizelor articulare cu vecinele. Vertebrele sunt

unite între ele prin ligamente puternice. Șira spinării poate face mișcări de flexiune (îndoire), de extensiune (întindere), de înclinare laterală, de torsione (sucire) și de rotațiune (învârtire) prin ajutorul unor mușchi puternici, cari se prind de ea. Fiecare mișcare a columnei vertebrale pune în mișcare mai multe articulațiuni (încheieturi), fiecare îndoire într-o parte oarecare o strâmbează în formă de arc, iar când ea se întoarce asupra ei însăși are forma unei spirale — *Fracturile și luxațiunile columnii vertebrale*. Ori ce fractură, sau frântură, precum și orice luxație (scrintire) a vertebrelor, prezintă o mare gravitate din pricina măduvii spinării, care se află în canalul format de ele, așa că o bucată de os rupt, sau o dislocare a unei vertebre poate apăsa, lovi, sau rupe măduva și prin urmare să dea naștere la o paralizie a mișcării și a sensibilității picioarelor (dambă de picioare), sau o turburare în slujba beșicii și a matelor. Când

sunt atinse vertebrele dela gât omul poate muri repede. În toate aceste cazuri nenorocite trebuie ridicat bolnavul, cu cea mai mare băgare de seamă și întins pe un pat într-o poziție dreaptă, orizontală, cu capul pe acelaș plan cu picioarele, până ce va sosi doctorul, care va imobiliza vertebrele cu ajutorul unui aparat special, până când ele se vor vindeca, combătând în acelaș timp inflamația (aprinderea) măduvii, paralizia beșicii, etc.—*Caria vertebrelor*. Vertebrele se pot caria, sau putrezi ca orice os, după cum se vede la *rachitism* (vezi acest cuvânt), la copiii limfatici și scrofuloși și această boală este întotdeauna foarte gravă. *Caria* începe




Fig. 122.—Vertebrele văzute din profil. Sus a 3-a vertebră văzută perpendicular

printr-o durere într'un punct oarecare a columnei vertebrale, durere care se mărește prin apăsarea cu degetul și prin mișcările trunchiului, cu fierbinaș, slăbire, lipsă de poftă de mâncare, urdinare și alte semne, cari spun că o parte a sistemului osos este aprinsă (inflamată) și supurează (face puroiu). Apoi vertebra, sau vertebrele atinse, se înmoaie, nu mai pot purta greutatea corpului și se turtesc, iar columna vertebrală se încovoie formând un *gheb*, sau *cocoașă*. Dacă turtirea se face repede, măduva este apăsată ca și în cazurile de fractură și de luxație și atunci avem paralizia, sau dambă de picioare, dacă ea se



Fig. 123. — Diformități ale coloanei vertebrale
(a = cifoza; b = lordoza)

face încet, ca de obicei, măduva se obișnuiește, încetul cu încetul, cu apăsarea, care se face și ea în mod progresiv, și nu este atinsă în mod grav. Mai în totdeauna se produc abcese, cari, plecând din punctul cariat, vin de se deschid în afară, în apropierea aceluși punct, sau în depărtare, în stinghe și coapsă. Boala se poate sfârși în două feluri: sau durerea locală trece, vindecarea este deplină, însă însoțită de cocoașă, sau moartea vine prin sleire de putere. De altfel sfârșitul boalei atârână mult și de tratament, de aceea îndată ce un copil se plânge că-l doare spatele, îndată ce vedem că, punând mâna, îl doare într'un loc fix și că durerea aceasta este mărită prin mișcare, iar copilul este trist, nu doarme bine, îi este frică să se miște, etc. atunci, fără întârziere, trebuie chemat doctorul, care ne va povățui ce să facem. În această

boală se recomandă aerul curat, soarele, șederea la țară, sau pe malul mării, lipsă de oboseală, hrană bună, untură de pește iarna etc. — *Deviațiunile* sau *strămbăturile coloanei vertebrale*. Adeseori șira spinării prezintă deviațiuni, sau strămbări, într-o parte oarecare, din pricina unei, sau unor, vertebre cari se apleacă într-o direcție anormală, formând astfel diformități, sau ridicături neplăcute. În aceste cazuri statura omului nu mai este dreaptă, ci se încovoiește ori înainte, ori înapoi, ori în lături; în primul caz avem *cifoza* (cocoșat), în al doilea *lordoza* (plecat înapoi) și în al treilea *scolioza* (sucit, strămbat într-o parte). *Cauzele* sunt multe: nemișcarea prea îndelungată, într-o poziție sau atitu-



Fig. 124. — Coloana vertebrală în diferitele mișcări ale corpului omenesc

dine, în care omul, fără voia lui, înlocuiește lucrarea mușchilor prin lucrarea ligamentelor. Lucrarea neîndestulătoare a mușchilor vertebrali produce inegalitate de apăsare a suprafețelor articulare, unele asupra altora și ca urmare inegalitate de întindere a ligamentelor cari unesc vertebrele: unele se strâng, se retractă prea mult, în partea în care nu trebuie, iar altele se alungesc acolo unde sunt deja prea lungi, înlesnind astfel reproducerea unor atitudini, sau ținute rele, cum se întâmplă prin șederea prea îndelungată în școală, prin modul de a scrie aplecat, prin șederea mai mult pe

un șold sau pe o parte decât pe cealaltă. Între cauzele cari predispun la aceste slujiri sunt *creșterea* prea repede, mai cu seamă la etatea de 12—15 ani, apoi lipsa de exercițiu, condițiuni rele igienice, o hrană neîndestulătoare, poziția rea a școlarilor când cresc, sau scriu, la mese prea înalte, sau prea joase, ținând corpul prea aplecat înainte, sau prea dat înapoi. Oamenii dela țară, cari stau aplecați la munca câmpului sunt expuși la deviații ale coloanei vertebrale; cei ce poartă greutăți mari pe spate, sau umeri (cifoza), ori duc greutăți mari numai într-o mână (scolioza). Diferitele boale, cari micșorează rezistența osoasă (oftica, osteita, rachitizmul) sau acțiunea mușchilor (paralizia îndoitorilor spinării), infirmitățile permanente (schioparea), bătrânețea, toate pot aduce o strămbare a coloanei. *Tratamentul comun*, adecă pentru toate diformitățile, are de scop de a împiedeca boala de a se ivi și pentru aceasta se recomandă: jocul în aer, alergările, variind adeseori atitudinea; în caz de miopie (vedere scurtă), să se acomodeze masa, sau pupitrul de scris, așa că copilul să nu stea aplecat, iar scaunul să aibă răzămătoare pentru spate. Se mai recomandă băile de mare, idroterapie, untură de pește, preparațiile cu iod. *Tratamentul curativ*, la începutul boalei, constă în a ține corpul drept și a face o gimnastică rațională, medicală, iar dacă boala este ceva mai înaintată se recomandă imobilizarea corpului timp mai îndelungat, pe un pat special, tare, cu saltea de păr, fără perine, în poziție orizontală. După îndreptarea diformității bolnavul va trebui să poarte un *corset* anume făcut pentru acest scop, un corset *ortopedic*. Un lucru nu trebuie pierdut din vedere, ori care ar fi varietatea boalei: tratamentul trebuie făcut cât se poate mai la începutul boalei, dacă vom să obținem vindecarea. Nu trebuie așteptat până când oasele se strică de tot și diformitatea este prea înaintată. În *cifoza* (cocoșa), după ce boala s'a stabilit, se recomandă *gimnastica suedeză* sub formă de întindere (extenziune) continuă a trunchiului înapoi, *gimnastică franceză*, cu ajutorul scă-

rilor ortopedice pe cari bolnavul se ridică și se scoboară de-a-îndoasele cu spatele spre scară), etc. *Lordoza* (cu spatele încovoiat înapoi) și *scolioza* (un umăr mai ridicat decât celalt) în care columna vertebrală este strâmbată într-o parte, au același tratament comun. (v. *Mecanoterapie*).

Colutoriu. — Medicament care înlocuște gargara și se aplică pe gingii, pe limbă, în gât, cu ajutorul unui pumnățuf. Colutoriu se face de obicei cu *mierică* (mel rozat), în care se pune borax, clorat de potasă, sau piatră acră, etc.

Coma (dela gr. *koma*, somn adânc). — Un fel de ațipire, mocnire, amortire adâncă, ce cuprinde pe un bolnav în cursul unei boale. Coma este un semn al unor boale de creeri (emoragie, înmoliere, abces, tumoră, etc.). Se mai vede în spasme (convulsii), în isterie, epilepsie, otrăviri (cu alcool, cloroform, opiu), în unele forme ale boalelor infecțioase (scarlatină, pojar, vărsat, febră tifoidă, coleră), în uremie, în diabet. Când coma se ivese repede, în mod subit, se numește *apoplexie*, când ea se ivese în cursul uneia din boalele generale, mai sus numite, afară de cazurile de otrăvire, mai întotdeauna este un semn al agoniei.

Comarnic. — Localitate de vilegiatură; comună mare pe valea Prahovei, între Câmpina și Sinaia. Stațiune de cale ferată. Înălțimea 556 metri.

Combustiuni. — V. *Arsuri*.

Compot. — V. *Chisălișă*.

Compresă. — O bucată de pânză fină, subțire, care servește la pansarea, sau legarea rănilor. Intocmai ca și la *fașe* pânza trebuie să fie veche, întrebuițată pe jumătate, bine spălată, fără cusături, fără dungi. Atunci compresa este foarte potrivită pentru a ține pe loc medicamentele și vata aplicată pe răni, iar pe deasupra ei se poate aplica cu înlesnire *fașă*. Pânza poate fi de in, de bumbac și chiar de lână, numai să fie curată, mlădioasă și permeabilă. Forma și întinderea compreselor variază după împrejurări, după trebuință, după părțile pe cari se aplică. Sunt comprese în 4 colțuri, ca un pătrat, cari se pun pe pânțec, pe piept, comprese lungi pentru orice loc, altele în trei colțuri (colțare sau trian-

gule), altele îndoite ca o basma de gât. Mai sunt comprese găurite, la mijloc, sau cu mai multe găuri (ciuruite), altele spintecate în două sau trei, altele încrestate la colțuri și în formă de pătrat, cum este *crucea de Malta*. Toate aceste forme și modificări sunt făcute ca să înlesnească aplicarea compreselor pe suprafețe cu diferite forme, fără să facă îndoituri supărătoare. În fine mai este compresa *gradată*, care se face îndoind de mai multe ori asupra ei însuși o compresă lungărească în patru colțuri, așa că îndoiturile să fie din ce în ce mai înguste și să se acopere între ele din ce în ce mai puțin și cari îndoituri împreună iau forma unei prizme triunghiulare. Pentru ca s'o ținem în această stare o pătrundem în mai multe puncte cu un fir de ață. Aceste comprese gradate servesc la apăsarea metodică a marginelor unei răni, sau a ține îndepărtate unele părți ca să nu se apropie între ele, cum se întâmplă cu oasele antebrațului frânt. Dacă în minutul accidentului n'avem nici o compresă la îndemână, ne putem servi de o batistă, căreia îi putem da forma trebuincioasă.

Condilom. — Una sau mai multe tumori, care se observă de obicei în



Fig. 125. — Condilome late ale vulvei

jurul orificiului anal sau în jurul vulvei (fig. 125), având o formă variată: sferică, ovalară, ca o nucșoară, ca o conopidă, ca creasta de cocoș, etc. și care e de natură sifilitică.

Condimente (lat. *condire*, a drege), *mirodenii*. — Mâncările trebuie să *drege*, pentru ca să aibă gust și să fie ușor de mistuit. Această dregerie se face cu

ajutorul unor mirodenii numite *condimente*, cari dau mâncărilor un gust special, o aromă, iar unele sunt chiar nutritive. Condimentele de căpetenie sunt *sarea, zahărul și oțetul*, apoi cele *acre și aromatice* cu gustul lor înțepător, cu mirosul și gustul lor special. Unele se întrebuințează simple în natură: *ardeiul, ceapa, dafinul, pătrunjelul, piperul, scorțișoara, usturoiul, vanilia*, etc. Altele sunt compuse: *muștarul* și diferitele *sosuri*. Folosul condimentelor nu se poate tăgădui. Ele înțetesc gustul, măresc cantitatea salivei (a bălelor) și a sucurilor stomacului și ușurează astfel mistuirea mâncărilor. Întrerebuințate în măsură mică sunt bune, dacă însă facem abuz de ele, ne putem îmbolnăvi. Copilul și adultul trebuie să întrebuințeze condimente în măsură mai mică, apetitul lor fiind bun din natură, ele sunt mai trebuincioase pentru omul mai înaintat în vârstă al cărui stomac este mai leneș. Nu trebuie să uităm că condimentele iuți, luate în măsură mare și continuu, pe lângă inflamația organelor digestive, mai produc la unii constipație și pot provoca diferite boale de piele.

Condurango. — Este coaja plantei *Gonolobus condurango*, din fam. asclepiadeelor, și se întrebuințează în contra durerilor de stomac, în contra reumatismelor și a nevralgiilor, sub formă de: decoct (fiertură) din 5 la 100, vin 30 gr. pe zi, extract moale 25 ctgr. până la 1 gr.

Congelație, degerătură. — De obicei degerătura se mărginește numai la o parte a corpului și atunci avem *congealație locală*, spre deosebirea de cea *generală*, când îngheață tot corpul și care este cu mult mai gravă. Cea *locală* poate fi uneori gravă. În aceste cazuri omul își poate pierde pentru totdeauna partea din corp înghețată, sau poate chiar să moară prin supurație mare, mai ales când îi intră puroiul în sânge (septicemie). Părțile corpului cele mai supuse la degerătură sunt acele cari sunt mai depărtate de inimă și cari sunt mai puțin îmbrăcate și chiar descoperite în timpul iernii: nasul, urechile, mâinile și picioarele. Pentru a înlesni descrierea degerăturilor locale le vom împărți în trei grade. În *gradul I* pielea are o culoare roșie vânoasă,

sau violacee, care pierе prin apăsarea cu degetul, pentru a se ivi din nou, îndată ce ridicăm degetul. Circulația sângelui se face cu greu, pielea se îngroașă, așa că partea degerată se umflă, ea este amorțită și îndată ce o apropiem de căldură, de foc, sau în căldura patului, simțim înțepături și mâncărimi foarte neplăcute. De obicei aceste semne pier în câteva zile, dar ele se pot ivi din nou, dacă ne expunem iar la frig, atunci degerătura *recidivează* și boala devine *cronică*, așa că mulți sufăr de degerătură în tot timpul iernii și de multe ori mai multe ierni de-a rândul, la nas, la urechi, sau la degete. În *gradul II* pielea se rănește, adică mai întâiu se ivesc niște beșicuțe, ca la vezicătoare, pline cu apă limpede sau roșietică, ce se sparg și în locul lor rămân niște răni vineții, cenușii și fără viață; arsura este foarte mare și cu mult mai supărătoare decât mâncărimea din *gradul I*. În forma *cronică* pielea se îngroașe și se umflă, se crapă și din crăpături se scurge o apă gălbuie, sau negricioasă, care la aer se întărește și formează coji de sub cari țîșnește puroi, de multe ori amestecat cu sânge. În *gradul III* boala este și mai gravă; nu numai pielea este isbită de moarte, ci câte odată și parte din cărnurile de deșubtul ei. Pielea are pete livide, pe ici pe colo și este presărată cu beșicuțe pline cu o apă roșietică. În alte cazuri se ivesc pete negre, cari sunt începutul gangrenii, pielea astfel mortificată se deslipește și cade, lăsând în urma ei o rană mare sângerândă. De multe ori cărnurile cad până la oase. Astfel se întâmplă că unii oameni își pierd mâinile și picioarele prin gangrena produsă de puterea frigului. Gangrena de multe ori este provocată printr'un tratament rău, atunci când omul, amorțit de frig și cu simțieră tocită, intră într'o casă încălzită prea tare, sau se apropie de foc. În acest caz partea degerată se poate gangrena repede. Pentru aceasta se recomandă ca părțile degerate să nu se expuie la foc, ci să căutăm să restabilim circulația sângelui prin frecături cu lichide foarte reci, cu zăpadă și numai după câțva timp să le frecăm cu lucruri calde. Mai întâiu să se frece părțile dege-

rate cu zăpadă, apoi cu apă rece de tot, după aceea cu apă stătută, și în urmă cu apă caldută. Frecăturile nu trebuesc făcute cu putere, nici cu asprime, ci încet, lin. Când părțile degerate încep a-și reveni în fire, a-și lua culoarea și consistență normală, este bine să se continue frecăturile cu cârpe înmuiate în apă rece, pentru a domoli inflamația. Mai târziu se pot face fricțiuni stimulente cu vin cald, vin aromatic, spirt, spirt camforat. Pentru crăpăturile pielei și pentru răni se recomandă vaselină cu acid fenic, cu iodoform, etc. Un tratament foarte bun este să introducem organul degerat — mâna, piciorul — într'un săculeț cu praf de talc și să-l lăsăm acolo; obținem vindecări frumoase și rapide. În *congelafія generală* omul este cuprins mai întâiu de amorțeală de înțepenire, de paloare, de slăbiciune, și mai cu seamă de o aplecare spre somn, cumplită, așa că omul se stânge, pierde pe nesimțite și fără suferință. Această moarte vine mai de grabă la cei ce sunt rău hrăniți, la cei obosiți și prea munciți. Când omul este supus la un frigare și mai mult timp, trebuie să se silească să nu adoarmă, să se miște în continuu, căci cel ce șade adoarme și cel adormit nu se mai deșteaptă. În cazurile de *congelafія generală* vom face același lucru cum am arătat mai sus: vom fricționa tot corpul cu zăpadă într'o cameră fără foc. În caz de *moarte aparentă* vom face *respirația artificială*, fără preget și timp de mai multe ceasuri. Se citează oameni cari au stat înfundati în zăpadă zile întregi (4—6—8 zile) și cari păreau morți, cari au fost readuși la viață prin aceste mijloace. După ce s'a făcut reacția, după ce omul și-a revenit, numai atunci i se pot da ceva băuturi calde, excitante, mai bine cafea și ceaiu decât băuturi alcoolice.

Congestie (*congestio*, dela *congerere*, a îngrămădi). — Îngrămădirea sângelui într'o parte a corpului, într'un organ, se numește *congestie*. Sângele nu ese afară din vase, cum se întâmplă în *emoragie*, ci numai se îngrămădește într'o cantitate așa de mare, încât împiedecă, sau îngreunează organul în care se adună, în slujba lui. Cele mai

supuse la congestiune sunt organele cari de obicei au sânge mult, cum sunt: *creeri, ficatul, plămânii*, dar mai cu seamă creerii, așa încât de cele mai multe ori când zicem numai *congestiune* înțelegem *congestia cerebrală*. Aceasta poate să provie dintr'o *insolație* în timpul căldurilor mari, când stăm prea mult în bătaia soarelui, dintr'o răceală repede, după o muncă prea multă, însoțită de băutură în cantitate mare, dintr'o emoție morală vie, dintr'un abuz de băuturi alcoolice, dintr'o baie făcută înainte de a se fi terminat mistuirea, sau poate să vie în cursul unei boale de plămâni, sau de inimă. Dacă sângele se urcă la cap cu putere, dar în cantitate potrivită, nu prea mare, bolnavul nu-și pierde cunoștința, însă fața i se înroșește, arterele dela gât i se bat cu putere, el se plânge de greutate și de durere la cap, de amețeală, de văjuituri de urechi, de visuri rele în timpul somnului. Aceasta este o *formă ușoară* de congestie, care se împrășteie lesne sub influența unei odihne, trupească și sufletească, într'un loc răcoros și bine aerat. Bolnavul va păstra dietă, adecă va mânca puțin și lucruri ușoare, păzindu-se de cafea, de vin și de orice băutură alcoolică. Va pune cârpe reci la cap, adeseori primenite. Când sângele se urcă la cap în cantitate mare și cu putere, atunci se pot ivi toate semnele unei *apoplexii*, fără ca să fie o *emoragie cerebrală*, adecă fără să se rupă vr'o arteră și sângele să se reverse asupra creierului. Apoplexia este *forma gravă* a congestiei, în care bolnavul își pierde cunoștința și care de multe ori se termină prin moarte, dacă nu s'a tratat la timp (v. *Apoplexie*). În *emoragia cerebrală*, când nu este fulgerătoare, adecă bolnavul nu moare îndată, se observă *paralizii* totală, sau parțială a unei jumătăți a corpului (*hemiplegie*). Primele îngrijiri sunt: purgative tari, muștare la ceafă și pulpe, lipitori după urechi, luare de sânge, din vinele mâinii (*venesecție*), apoi mai târziu, contra paraliziei, *electricitate* (curenți continui).

Coniac (*Spiritus vini gallici*). — Conține 45 până la 60 la 100 alcool. Stimulent difuzibil, care aduce mari foloase în alimentațiune și în tera-

peptică, adecă în tratamentul boalelor.

Conjunctivă. — V. *Ochiu*.

Conjunctivită. — Inflamația sau apărinderea pielii (mucoasei) care căptușește pe dinăuntru pleoapele și partea de dinafară a ochiului (a scleroției). Pentru mai bună lămurire caută la *Ochiu*.

Conjunctivita granuloasă. — V. *Ochiu*.

Consangvinitate. — V. *Căsătorie*.

Conserve alimentare. — Pentru conservarea, sau păstrarea acestor substanțe alimentare, s'au născocit diferite mijloace, prin cari să se împiedece stricarea lor. Substanțele alimentare preparate astfel ca să se împiedece stricarea se numesc *conserve*, fiindcă ele pot dura mai mult timp și pot fi întrebuințate în timpurile și în locurile unde nu putem avea aceste substanțe proaspete. Carnea se păstrează sub forma de *pastramă*, care este carne sărată și uscată la căldura soarelui și care la noi se consumă în cantitate mare de către locuitorii dela țară. Pastrama, când este bine și cu îngrijire preparată, este gustoasă și hrănitore. Ea produce însă sete multă, prin cantitatea de sare pe care o conține, din această pricină nu este bine ca pastrama să constituie singură hrana omului, căci îi obosește stomacul. Carnea afumată este greu de mistuit, din cauza uscăciunii ei. *Închetearea* cărnii este întrebuințată pentru transport și pentru păstrat, dar carnea înghețată, pe lângă că-și pierde din gustul ei, se descompune foarte repede, îndată ce o scoatem din gheață, sau din frig. *Lichidele antiseptice*, întrebuințate altă dată pentru conservarea cărnurilor, nu se mai recomandă astăzi. Cel mai bun mijloc pentru facerea conservelor este *metoda lui Appert*. Aceasta constă în a pune substanțele de conservat în vase, sau cutii de tinichea, închise de toate părțile; cutiile să fie așa de umplute încât să nu conțină decât foarte puțin aer, apoi se închid bine, lăsându-se numai o mică gaură deasupra. Se afundă în apă fierbinte de 75—100°, iar după câțva timp se astupă găuricea prin care au eșit aburii și se lasă să se răcească. Substanțele alimentare sunt puse astfel la adăpost

de stricăciune prin tierbarea ce au suferit și prin faptul că aburii de apă au alungat aerul, așa că ele se păstrează în gol. Acesta este cel mai bun mijloc de a conserva carnea, laptele, peștele și legumele. Mai avem conserve ținute în vase și în cari substanțele sunt acoperite cu un strat de ulei, sau de alt corp gras, cum sunt conservele de anghinare și măsline, păstrate în untdelemn. Fructele zaharisite, dulcețurile, compoturile sunt de asemenea conserve, precum și murăturile, făcute în oțet, sau apă sărată. Sunt primejdioase conservele făcute cu substanțe otrăvitoare, pentru ca să-și păstreze culoarea verde. Între aceste substanțe este sulfatul de cupru, care se întrebuințează la conservele de fasole, mazăre, etc. Apoi mai este și abuzul cu văpsirea murăturilor cu acetat de cupru, prin fierbarea lor în oțet în vase de cupru *nespoite*, în care vase rămân la răcirea lor, ori prin punerea de monede, de aramă, în vasele în cari fierb murăturile. Toate acestea pot da naștere la *otrăvire*. Să nu mâncăm nici odată conserve din cutii al căror capac este ridicat la mijloc (bombat), ceeace ne arată că au început să se strice (să fermenteze), nici pe acele cari sunt urite la înfățișare, sau cari au miros greu ori gust coclit.

Constanța. — Stațiune balneară și climaterică, pe malul Mării-Negre, mai înainte vechiul oraș roman *Tomis* (700 a. ch.). Orașul Constanța se află pe o limbă de pământ ce se întinde în mare, are clădiri și palate mărețe, vile frumoase, cu o mișcare foarte mare în port. Temperatura mijlocie în timpul verii e de 21°, umezeala aerului de 75%, presiunea atmosferică de 757 mm. Vânturile în timpul verii nu sunt mari, cerul e mai întotdeauna senin în timpul din Iulie—Septembrie. Aerul este încărcat cu săruri și foarte bogat în oxigen și ozon, este întăritor și reconstituant. El diferă de aerul continental prin ozonul pe care îl conține și prin emanațiunile caracteristice provenite din evaporațiunea apei de mare, foarte bogată în clorure, bromure și iodure. Această *cură de mare* se recomandă în anemie-cloroză, în unele convalescențe, în astmă, bronchite, dis-

CONS

pepsii nervoase, scrofuloză, în cazurile de predispoziție la oftică. *Băile* sunt proprietatea comunii și au o plajă întinsă. Temperatura apei vara este de 16⁰ până la 26⁰, iar a aerului de 14—28⁰. Pe plajă se fac *băi de soare*. Băile de mare se recomandă în boalele nervoase, neurastenii, isteriei, în scrofuloză, rachitism, limfatism, anemie, surmenaj, convalescență, debilitate generală. Aceste băi nu sunt bune în boalele de inimă, de rinchi, în gută, reumatism, nevralgii, colici de ficat, oftică. Sezonul începe dela 1 Iunie și durează până la 1—15 Septembrie.

Constipație. (lat. *constipatio*, dela *constipare*, a strânge, a încuia), *incuiere*, *incuietură*. — Sunt mulți oameni cari suferă de incuietură, adică nu pot merge zilnic afară, ceea ce le aduce mare supărare și în multe cazuri le poate chiar zdruncina sănătatea. Persoanele mai supuse la constipație sunt cele nervoase, cu deosebire femeile, apoi persoanele cari duc o viață sedentară, leneșă, acele cari întrebuințează prea mult băuturile spirtoase. La nașterea constipației mai contribuie și răul obiceiului, ce-l au unii, de a nu merge la scaun când le vine, de a nu merge regulat, la aceeași oră. Cei ce suferă de incuietură au slabă poftă de mâncare, au călduri în obraz, amețeli și o aplecare spre somn. Constipația ajută ivirea multor boale: anemie, migrenă, nevralgii, greutate și durere la venirea periodului, sucirea mitrei, apendicita. Cei ce suferă de constipație sunt supărăcioși, înverșunați, iritabili. *Tratament.* Cel mai bun lucru pentru a combate-o este să te duci în toate zilele, la același ceas, la scaun. Prin aceasta se regulează scaunele. Cele mai bune clistire sunt cele făcute cu *apă rece*, cari sunt întăritoare pentru mațe. Când clistiriile, făcute nu lucrează, punem în ele câte o lingură de unt de lemn, sau unt de ricină. Nu trebuie să pierdem din vedere că *dieta*, sau *regimul alimentar*, joacă un rol foarte mare în vindecarea incuietorii. Pâinea făcută cu țărâte (3 părți făină și 1 parte țărâte) este mai bună decât cea obișnuită, legumele verzi, fructele și mai cu seamă prunele și strugurii combat cu succes constipația. Laptele dulce luat în cantitate mai mare, mai ales

CONS

dimineata, și laptele bătut, cafeaua și chiar ceaiul ajută eșirea afară. Mierea de albine, o linguriță pentru copii și o lingură de supă pentru adulți, este foarte bună. Se mai recomandă să se bea dimineata, pe nemâncate, câte un *pahar de apă rece*. Se mai recomandă exercițiu în aer liber, plimbările în toate zilele, gimnastica. Apoi *masagiul mecanic*: când te culci și când te scoli stai culcat pe spate și-ți plimbi încet, pe pânțele, începând de jos din *dreapta* pânțecelui, mergând în sus până sub coaste, de aci de a curmezișul până în partea stângă și de acolo iar în jos, un săculeț de pânză umplut cu alică. Masagiul cu mâinile se face tot în același înțeles, dela *dreapta* spre stânga. *Medicamente laxative* avem multe: untul de ricină (30—40 gr.) o lingură de supă plină cu *semințe de in*, pe care le-am ținut 10 minute într'un păharuț cu apă rece (se vor bea semințele cu apă cu tot). *Purgative* bune: *saburul* (aloes), din care se ia, în timpul mesei, câteva grăuncioare în miez de pâine, reventul, cascara, cascariina, podofilina se iau la culcare. Bună este apa de Breazu și este sarea de Băltătești, o lingură într'un pahar cu apă; de asemenea folositor este și zerul, un păharuț dimineata pe nemâncate și alte două în timpul zilei. La copii mici se întrebuințează mult *săpunușele* (supozitoarele), făcute din săpun de casă, de glicerină, sau din săpun ordinar, de spălat rufe, din care se taie cu cuțitul câte o bucăciță mică, lunguiată, ale cărei capete se netezesc cu mâna, apoi se introduce cu mâna în șezutul copilului. Acest săpunuș, topindu-se, iese afară cu materiile din șezut. La copii se mai dă sirop de revent, siropul de mană (1—2 lingurițe pe zi *după* vârstă), untul de ricină în aceeași doză. Mierea de albine o jumătate, sau o linguriță e foarte bună și hrănitoare tot odată, uleiul de migdale dulci, 1 linguriță, magnezie calcinată (arsă), o jumătate, sau o linguriță, în apă îndulcită cu zahăr.

Constituțiune (lat. *constitutio*, dela *constituire*, a stabili, a întemeia, a întocmi). — Prin acest cuvânt se înțelege modul în care este organizată totalitatea corpului fiecărui individ, adică organizația particulară a fiecărui

om, sau mai bine zis starea lui *generală*, din care rezultă gradul său de putere fizică, starea funcțiunilor lui, rezistența pe care o are în contra boalelor, puterea de vitalitate. Când toate organele corpului se găsesc în condițiuni bune, corpul va avea multă putere, funcțiunile lui se vor îndeplini cu tărie și corpul se va împotrivi cu bun rezultat tuturor boalelor; însă, dacă acele condițiuni sunt rele, organele vor funcționa slab și corpul va fi cu înlesnire copleșit de boale. În cazul întâiu avem o *constituțiune forte* și în al doilea o *constituțiune debilă*. Constituțiunea atârnă de moștenire (ereditate) și de *împrejurările* în cari trăiește omul. Un om cu *constituțiune forte* are oasele bine dezvoltate, îmbrăcate în mușchi groși și vârtoși. Fața lui este roșie, vie, cu înfățișare trainică, pulsul puternic, se hrănește bine, respiră puternic, nu cade lesne și dacă se îmbolnăvește. Omul cu constituție debilă este subțire, cu mușchii slabi, se ostenește ușor, răsuflă greu, se supără numai decât, se îmbolnăvește mai iute și boala este mai primejdioasă. Cea mai bună constituție și ori cât de tare ar fi ea, se poate strica printr'o viață abuzivă, printr'o igienă rea, prin patima beției și printr'o viață sedentară, leneșă. O constituțiune din cele mai rele, mai slabe, se îndreptăază printr'o hrănire bună, prin traiul la aer curat, printr'o locuință igienică, prin gimnastică și plimbări regulate, zilnic, în aer liber.

Contagioase (Boale), *boale molipsitoare, epidemice*. — Aceste boale sunt: *colera, difteria, dizenteria* epidemică, *febra tifoidă, oftica, pojarul, scarlatina, vărsatul*, etc. În rândurile ce urmează ne vom ocupa de ceea ce trebuie să facem în timpul boalei și după ce a trecut boala. În timpul boalei trebuiesc luate măsuri, nimicindu-i germenii cari o produc și se pot adăposti pretutindenea: în crăpăturile de printre scânduri, sau podele, pe ziduri, în perdele, în tapete, rufărie, vestminte, apă, mâncări, etc. Camera bolnavului trebuie să fie ținută într'o stare de curățenie foarte mare, să fie bine aerisită și încălzită potrivit, după anotimp. Nu trebuie să cuprindă multe mobile, ci numai cele neapărat trebuincioase, să

n'aibă perdele, nici covoare; patul e bine să fie pus în mijlocul odăii. Bolnavul trebuie să fie *singur* în odaie numai cu persoana care îl îngrijește și care nu trebuie să vină în atingere cu celelalte persoane din casă, decât numai la neapărată trebuință. *Copiii* nu vor intra cu nici un preț în odaia bolnavului. În cameră nu trebuie să se țină *laptele* sau alte mâncări nici băuturi, ci numai în măsura trebuinții, iar ceea ce bolnavul a atins cu mâinile, dar n'a putut mânca sau bea, să se ardă, sau să se arunce într'un vas anume hotărit, pentru aceasta. Lângă bolnav să fie o scuiță, sau un vas, cu puțină apă, în care să scuipe, vasul să fie închis. Scuiatul fiind în apă nu se usucă și nu se ridică în aer, sub formă de praf, care ar putea întinde boala. Conținutul vasului se va arunca în foc, sau în latrină. În timpul boalei, toate camerele casei se vor ține în stare curată, se vor aerisi prin deschiderea ferestrelor, pentru a lăsa să intre aerul și soarele cât se poate mai mult timp, în toate zilele. Să ștergem podelele cu cârpe ude și stoarse. Cârpelile cu cari ștergem pe jos, trebuiesc arse. *Rufăria, ciarșafurile, hainele*, cari au fost în atingere cu bolnavul, nu trebuiesc ștergute pe ferești, ci se vor pune într'o cutie, sau într'un sac până se vor putea dezinfecța. Dezinfecțiunea rufăriei, a ciarșafurilor și a tuturor pânzeturilor și ștofelor de lână se va face prin fierbere, de cel puțin o oră, în apă clocotită, după care se vor pune îndată în leșie. Dezinfecțarea, acolo unde se poate, se va face cu etuva de aburi sub presiune. Pentru a dezinfecța lucrurile de piele, încălțăminte, se vor spăla cu îngrijire într'o soluție antiseptică (acid fenic 5%, sau sublimat 1 la 1000). *Materiile fecale*, sau scaunele bolnavului împreună cu udul, scuiatul, vărsăturile, nu trebuiesc aruncate în curte, sau pe stradă, nici în cursul unei ape, ci transportate în vase speciale, cari să fie în totdeauna pline pe jumătate cu sulfat de cupru (50 gr. la 1000 apă). Aceste vase trebuiesc apoi deșertate în latrine (privăți), sau într'o groapă în pământ, umplută pe jumătate cu var nestins, și făcută la mare depărtare de puțuri, sau de cursul apelor, apoi aceste vase

CONT

vor fi spălate pe loc cu o soluție de sulfat de cupru, înainte de a fi duse în odaia bolnavului. *Persoanele cari îngrijesc de bolnav nu trebuie să mănânce, nici să bea în odaia lui, iar când părăsesc această odaie trebuie să se spele cu îngrijire, pe mâini, cu apă și săpun și să-și clătească gura cu o gargară. După ce a trecut boala se va face dezinfecțiunea.* Toate obiectele din odaia bolnavului trebuiesc lăsate pe loc până ce s'a făcut dezinfecțiunea, care se va face cât se poate mai iute. Ru-făria, hainele, ciarșafurile, etc. se vor dezinfecța după cum s'a arătat mai sus, perinele, saltelele se vor dezinfecța la etuvă, sau, în lipsă, se vor arde, mobilele de lemn cu soluție de sublimat și cele de fier cu soluție de acid fenic, cum s'a mai arătat mai sus. Pentru a dezinfecța camera se vor spăla pereții, tavanul și podelele cu acid fenic, sau sublimat coroziv, sau cu cresyl (5 la 1000); pereții se vor vărui din nou. Acolo unde există serviciul special de dezinfecțiune ne vom adresa la acel serviciu, pentru a face o mai radicală dezinfecție. *Bolnavul vindecăt și numai după sfatul doctorului, înainte de a eși din casă, va face o baie, sau o spălare generală, cu săpun și apă. De asemenea tot doctorul va spune când elevul va putea merge la școală. Reintrarea în școală nu se poate face mai curând de 40 de zile dela începutul boalei pentru vărsat, scarlatină și difterie, de 16 zile pentru pojar. Profesorul nu va primi în școală pe elevii cari au fost bolnavi de boale molipsitoare decât numai cu un bilet de voie din partea doctorului; el mai este dator să trimită acasă, îndată elevii cari i-se vor părea bolnavi.*

Contagiune (dela lat. *cum*, cu, și *tangere*, a atinge) *molipsire*, — Când un om sănătos a venit în atingere cu un altul bolnav și s'a îmbolnăvit de aceeași boală, atunci zicem că a luat boala prin *contagiune*, prin atingere. Transmiterea sau trecerea unei boale, se poate face și dela un animal la un om, tot prin atingere. Boalele cari se întind în modul acesta se numesc *boale contagioase*. Contagiunea este *directă*, sau *indirectă*. Ea este *directă* atunci când omul sănătos ia boala venind în atingere cu alt om, sau cu un animal

CONT

bolnav. Un mijloc de contagiune directă este *sărulatul*, mulțumită căruia se pot lua foarte multe boale (sifilisul); apoi atingerea cu mâna a unei răni oarecare, bubele de vărsat, o brâncă. Ori de câte ori punem mâna pe ceva murdar, pe un lucru bănuț, pe o rană, pe un bolnav, îndată să ne spălăm pe mâni, cu apă și săpun, apoi spirt, apă de Colonia, acid fenic (5%), sublimat corosiv (I^0_{100}) sau cu orice altă substanță dezinfecțantă. Contagiunea este *indirectă* când luăm boala prin apă, aer, vestimente etc. (vărsat, pojar, scarlatină, febră tifoidă, coleră, etc.). Acest mod de întindere a unei boale este cel mai primejdios, căci ne îmbolnăvim fără să știm, fără să băgăm de seamă.

Contractură (dela lat. *contrahere*, a strânge). — Stare de rigiditate, de înțepenire, de sgâreire a mușchilor, cari strângându-se formează niște coarde tari pe sub piele și țin în nemișcare un membru (picior sau mână), în poziție de întindere (extensiune), sau de îndoire (flexiune), mai mult sau mai puțin tare. Contractura poate să se producă dintr'odată, sau să urmeze unor convulsii (spasme), sau unei paralizii a mușchilor. Ea este adeseori însoțită de dureri.

Contra-extensiune. — Lucrare prin care un ajutor ține partea de sus a unui membru (mână sau picior) frânt sau scrintit, în timp ce doctorul întinde membrul pentru a reduce frântura sau scrintitura restabilind raporturile normale, adică punând oasele la locul lor.

Contra-otrăvă. — Orice substanță care se dă pentru a nimici o otrăvă, sau a combate efectele ei (v. *Antidot*, *Otrăvire* și *Ser*).

Contuziune, *lovire*, *lovitură*, *pălitură*. — Prin cuvântul *contuziune* se înțelege o lovitură aplicată cu un corp tare și tocit, fără tăiș și fără colțuri (*contondent*), de exemplu un ciomag, un băț, un ciocan, sau o lovitură făcută cu corpul, sau cu o parte a corpului, asupra unui zid, unui copac, unei pietri mari, unei mobile (pat, masă, dulap, etc.). În contuziune pielea nu este ruptă, ceea ce o deosebește de o plagă (rănire) *contuză*. Poate fi foarte gravă, când interesează organele pro-

funde, cum sunt: ficatul, plămâni, etc. *Contuziunile* sunt de mai multe grade. În *gradul I* sunt *vânătăile*, sau *echimozele*, cari provin din ruperea vaselor capilare și revărsarea sângelui în țesături, în piele, formând pete vi-nete închise, cari după câteva zile devin cenușii, apoi verzui, gălbui, când încep a pieri. Durerea nu este mare și trece repede. Când te-ai lovit la ochi, sângele își păstrează culoarea roșie. În *gradul II* avem o revărsare de sânge mai mare, care ridică pielea sub formă de *cucui*, care este o umflătură fluctuantă la mijloc și tare la margini, care poate în unele cazuri să se transforme în abces, adică să facă puroi. Aceste *cucui* se văd acolo unde sub piele se află un os, cum este la cap și la frunte. În *gradul III* partea lovită este rece, vânătă, nesimțitoare (insenzibilă), apoi se înegrește se usucă și formează o *escară* gangrenoasă, care se deslipește și cade prin supurație. În *gradul IV* avem zdrobirea unei părți mari a unui membru, sau a membrului întreg (mână sau picior), însoțită adeseori de leșin (sincopă) și chiar de moarte. — *Tratament*. În *gradul I* se vor pune comprese, sau cârpe muiate în apă rece, în apă de plumb, sau în apă cu spirit de camfor, cari cârpe se vor muia din nou când vor începe să se încălzească, dacă va fi trebuință din sfert în sfert de ceas. Partea lovită se va ține în odihnă, nemiscare; când lovitura e la mână, aceasta se va ține legată cu un colțar pe după gât, iar dacă e la picior bolnavul va sta culcat. În *gradul II* se va face același tratament, făcând însă și o compresiune, sau apăsare ușoară, metodică, asupra părții lovite, cu o fașă de flanelă, sau de tifon, sub care se va pune un strat de vată. Celelalte grade se vor trata aplicând cataplasme, diferite alifii calmante, după povața doctorului, iar când vor cădea părțile gangrenate se va face un *pansament antiseptic*, ca la ori ce răni, iar ca tratament general, se vor da diferite medicamente tonice.

Convalescență (lat. *convalescentia*, dela *convallere*, a câștiga putere), *întremare*. — Când un om a fost bolnav de o boală grea, cum este febra tifoidă, chiar și după ce a trecut boala nu se

poate socoti îndată ca deplin sănătos. Dela trecerea boalei, până la recăstigare deplină a sănătății, trebuie să treacă un timp oarecare, mai mult sau mai puțin lung, după natura boalei. Acest timp, sau această perioadă, se chiamă *convalescență*. Și convalescența trebuie păzită, având și ea regulile ei. Omul convalescent, mai ales după o boală grea și lungă, este foarte slăbit, temperatura lui este mai scăzută de 36°5, care este cea normală, pulsul lui bate numai de 60 de ori pe minut în loc de 80, este palid, anemic, slab, n'are destulă poftă de mâncare, pentru a-și repara pierderile suferite, sau, din contră, are un apetit prea mare. În convalescență nu se mai dau medicamente propriu zise, căci boala a trecut, se vor da însă diferite preparațiuni tonice (întăritoare), de fier, de chinchină, amare, ca să întărească pofta de mâncare și să dea putere, dar mai mult decât toate aceste va trebui să ne îngrijim de condițiunile igienice. Convalescentul va trebui să petreacă în aer liber, în aer curat, la țară, sau într'un climat potrivit cu starea lui. Bolnavul, îndată ce intră în convalescență, trebuie să părăsească patul și camera în care a zăcut și să se mute în altă odaie mare, bine expusă și aerată, încălzită potrivit anotimpului. El fiind mai simțitor la frig va trebui să se îmbrace bine, în haine mai călduroase, de lână, apoi pe afară, în trăsura la început și mai târziu pe jos, fără însă a se obosi prea mult. Regimul, sau hrana convalescentului, trebuie să ne atragă deosebită băgare de seamă; omul nu trebuie să mănânce prea mult, nici prea puțin. Dacă mănâncă prea puțin nu-și câștigă puterea decât foarte încet. Mâncările să fie ușoare și hrănitoare.

Convulsii (lat. *convulsio*, dela *convellere*, a zguduit), *spasme*. — De multe ori un copilăș voinic, grăsuț, de odată se oprește din joc, se îngălbeneste la față, apoi îndată se învinețește, își dă ochii peste cap, rămânând astfel, după care i-se înțepenesc mușchii gâtului și ai membrilor (mâni și picioare) și i se oprește respirația. După câteva clipe, unu sau două minute, părțile înțepenite încep să tresară și înțepenitura mușchilor este întreruptă

prin sguđuituri, sau sdruncinături (spasme), care le fac să se miște în mod convulsiv, trecând prin situații din cele mai variate. Fața face strâmbături (grimasuri) de multe ori foarte urâte, ochii se învârtesc în cap în toate felurile, mâinile și picioarele de asemenea se îndoiesc, se întind și se succesc. Pieptul se înțepenește, încât crezi că se oprește respirația. Toate acestea se fac cu o repeziciune uimitoare și după un scurt timp înțepenirea dispare și mușchii își iau mlădierea lor de mai înainte, mâinile și picioarele se mai mișcă puțin, ochii își iau poziția obișnuită, tot așa și fața; respirația se restabilește, cunoștința, care era pierdută, apare și totul reintră în ordine, ne mai rămânând pentru copil decât o oboseală mare, însoțită de un somn adânc. Aceasta este ceea ce se chiamă un atac de *convulsiuni*, sau *spasme*. Sunt unele atacuri însă cari se mărginesc numai la ațintirea ochilor, la îngălbenirea feței, cu învinețirea buzelor, la o greutate în respirație, cu oarecare greutate la cap, fără ca copilul să aibă acele sguđuituri descrise mai sus. Spasmele vin în totdeauna sub formă de atacuri și nimic nu ne face să le prevedem. Uneori însă, înainte de atac, copilul este cam neliniștit, n'are somn cum trebuie și are arțag apoi privirea i-se rătăcește, ochii i-se întorc peste cap, mâinile se mișcă și atacul începe. Convulsiunile sunt un semn al multor boale: epilepsia, coreia, emoragia cerebrală, isteria, paralizia generală, eclampsia puerperală și a diferitelor otrăviri. Spasmele uneori se văd la începutul unor boale: meningită, pojar, scarlatină, inflamația matelor, și aproape la toate boalele cu căldură mare, mai ales la copii nervoși. *Cauzele* spasmelor sunt: ereditatea (multe femei nervoase, sau isterice, au copii cari sufăr de spasme), *emoțiunile morale vii*, pe cari le încearcă mamele în timpul sarcinii, predispun pe copii la spasme, copiii *pletorici* (prea sângeroși), grași, precum cei *anemici* (cu lipsă de sânge). *Simțiri vii*, de pildă o frică mare, mânie, gâdilire, o durere vie ce o încearcă copilul fiind prea strâns, sau când s'a format o încrețitură prea mare într'un loc, sau când i-a pătruns un ac în

piele, o căldură prea mare, sau stricarea aerului, toate pot fi pricina spasmelor. *Stricarea laptelui* la doici, sau laptele doicilor cari beau mult vin, sau țuică și se îmbată des, mânia și supărarea doicilor, pot provoca convulsiunile. *Turburările în funcțiunile digestive*, o indigestie provenită din mâncări grele de mistuit, sau din stricarea laptelui, o constipație (încuietură), *reținerea udului*. *Viermii intestinali*, limbricii, panglica, etc., *dentiția deficilă*, când dinții ies cu greutate și durere mare și trebuie să tăiem gingiile ca să înceteze spasmele, *frigurile palustre*, prin căldura lor ca și gripa însoțită de temperatură, pot produce spasme repetate. — *Tratament*. În timpul atacului copilul trebuie desbrăcat de haine, desfășat și, dacă e prea cald, trebuie dus în altă odaie mai mare și mai puțin călduroasă. Se va căuta bine tot corpul, ca să vedem dacă nu cumva i-a intrat vreun ac în piele, se va stropi corpul cu câteva picături de apă rece, îi vom pune la nas să respire oțet (nu amoniac), îi vom face o baie caldică prelungită, punând pe frunte cărpe înmuiate cu apă rece. Baia se poate face și cu puțin muștar în ea. Dacă bănuim că spasmele vin dela pânțele îi vom pune o clismă și îi vom face masaj pe pânțele, de jos în sus, la dreapta și de sus în jos la stânga; prin ieșirea materiilor și a gazelor copilul poate scăpa de spasme. Sau îi vom da un purgativ: ulei de ricină, mană, calomel, etc. iar dacă are limbrici îi vom da o bomboană pentru scoaterea lor. Dacă copilul e sângeros îi vom pune 2—3 lipitori după urechi, sau la picioare, în jurul glesnelor. Vom da antispașmodice: apă de flori de portocale, bromur de potasiu 50 ctgr. până la 1 gr., în 50 gr. apă, luat cu lingurița din $\frac{1}{2}$ în $\frac{1}{2}$ oră, sau cloral hidrat. *Nu vom da nici odată opiu, sau morfină.*

Copaiv (Balsam) — Se scurge dela sine, sau prin tăieturi făcute, din trunchiul mai multor arbori din genul *Copaifera officinalis*, fam. leguminoase-lor. — Se întrebuințează contra ble-noragiei, sub formă de picături, sau în capsule gelatinoase, ori în pilule, în doză de 5—20 gr., sau sub formă de opiat, singur sau asociat cu cube-

bul. Dacă se întrebuințează în cantitate prea mare și timp îndelungat, poate da naștere la inflamația rinichilor (nefrită) și la erupțiuni.

Copil de țată.—*Nou-născuți și sugaci.*

Copilărie.— Această perioadă a vieții începe din minutul nașterii și se sfârșește câtră anul al treisprezecelea, sau al patrusprezecelea, când copilul se transformă în adolescent. *Prima copilărie* ține dela naștere până la etatea de 7 ani și cuprinde trei faze deosebite: *nou-născutul*, *sugaciul* (copilul de țată), apoi copilul care își are *cei dintâi dinți* (prima dentițiune);— a doua copilărie în care copilul își schimbă dinții (a doua dentițiune), dela 7 până la 11 ani, după care el se *apropie de pubertate*, dela 11 până la 14 ani. Ceeace caracterizează copilăria este creșterea, care se face atât în statură cât și în greutate și care se face în mod mai simțitor îndată după naștere, în anul întâiu al vieții, după care creșterea începe a se face mai încet, fără să înceteze însă nici un moment la copilul care este sănătos. Copilul poate să capete multe boale, sub influențe foarte variate și de multe ori greu de cunoscut. *Iuirea primilor dinți, înțărcațul, frigul, umezeala* toate sunt cauze cari pot face copilul să sufere. Este bine să scoatem copiii la plimbare pe ori ce timp, cu condițiune numai ca să fie bine și potrivit îmbrăcați și cu oarecari precauțiuni. Plimbarea să se facă în locuri uscate și adăpostite, iar când este frig, sau când plouă, să facă mici curse, repede fără să facă pauze. Modul în care trebuie să fie ținut în brațe are mare influență asupra desvoltării lui, de aceea trebuie să băgăm de seamă ca copilul să șeadă comod pe brațul doicii, sau al mamei, șezutul lui să fie bine sprijinit, gambele să fie paralele, șira spinării să fie dreaptă, pentru ca corpul să nu fie silit să facă efortări ca să se țină în echilibru. Să nu i-se îndoiască mijlocul, să nu i-se strâmbe picioarele prin apropierea prea tare a genunchilor între ei, sau prin sucirea lor. Astfel dar trebuie să se dea o deosebită importanță copilului, din acest punct de vedere, întocmai ca și când el începe să umble, când este bine să i se dea un mic cărucior pe roțițe, cu care co-

pilul să învețe să umble, căpătând încredere în el însuși și fiind scutit de căderi și lovituri. — Odată copilul ajuns la vârsta în care se joacă, sau învață cu colegii lui de școală, el dă de alte cauze de îmbolnăvire, de *contagiune* și de *epidemie*. Pentru a evita aceste boli părinții sunt datori să supravegheze în deaproape pe tovarășii de joc ai copiilor lor și îndată ce observă ceva să-i depărteze. Același lucru trebuie făcut și în casă unde sunt mai mulți copii și unul cade bolnav de vreo boală molipsitoare: îndată trebuie izolati cu mare îngrijire cei sănătoși. *Alimentația*, sau hrana copilului, merită deosebită băgare de seamă. (v. și *Alăptare*). Vom căuta ca mesele să fie la ore regulate, mâncările să nu fie prea sărate, sau ardeiate, cum le place oamenilor mari, iar ca băutura să servească numai apa, fără ape minerale, fără vin sau bere, fără lichior și cafea, nici ceaiu. Copilul să mănânce până se sature, fără să treacă măsura; poate mânca orice mâncare, însă câte puțin din toate. — *Somnul* copilului să fie mai lung decât al omului mare, căci el ajută copilul să se dezvolte; în termen mijlociu se recomandă 8 până la 9 ore, iar pentru cei mici se mai permite după amiază un somn de o oră. Copiii trebuiesc culcați seara de vreme și în totdeauna la același ceas. — Cât despre durata studiului și despre recreațiuni, precum și despre pozițiile vicioase din timpul când învață copilul, vom vorbi la articolul: *școale*. — *Boalele copilăriei* sunt multe: accidente de dentițiunei, turburările digestive, oftalmia purulentă, tusa măgărească, meningita acută, convulsivunile, viermii intestinali, rachitizmul și scrofulele. Alte boale, cari aparțin și altor etăți, dar sunt mai frecvente în copilărie, sunt: pojarul, scarlatina, guturaiul, durerea de gât, etc. La copii este greu de multe ori să cunoști boala chiar dela începutul ei, mai ales la copiii mici, cari nu pot vorbi și prin urmare nu pot spune ce-i doare, așa că suntem obligați a-i cerceta cu deamănuntul. Nu trebuie să uităm că copiii, fiind foarte sensibili, adeseori sub influența unei cauze mici, neînsemnate, sunt cuprinși de odată de simptome foarte alarmante, cari dispar

după câteva ceasuri și prin urmare să nu ne înspăimântăm prea tare, dar nici să fim nepăsători. Trebuie să avem în *tratamentul* copiilor o răbdare mare. Este mai bine să procedăm cu blândețe, cu vorbe bune, iar dacă copilul nu poate lua medicamentele sub formă de pilule, buline, prafuri, i-le vom da sub formă de băutură în apă îndulcită cu zahăr, sau în dulceață, ori în siropuri. Mulți părinți au obiceiul de a da copiilor mereu curățenii, cari deși sunt în multe cazuri foarte folositoare (în constipații), dureri de gât, când limba este încărcată, etc.), dar abuzul și aci ca în toate nu este bun, căci putem obosi stomacul și mațele cu atâtea curățenii. Când nu putem da medicamentele prin gură, ele se pot administra și prin clistire, deși nu lucrează așa de bine.

Cord (dela lat. *cor*, inimă) și **Circulațiune**. — Vieța este o ardere. Țesăturile noastre au trebuință, pentru ca



Fig. 126. — Proiecțiunea inimii pe stern și coaste

să se reînnoiască, să fie puse în atingere pe deoparte cu *oxigenul*, care produce arderea adecă este *comburent*, iar pe de altă parte cu lichidul care rezultă din mistuire și care înlocuește materialul de ars sau *combustibilul*, adecă diferitele elemente ale țesăturilor noastre, pe măsură în care ele sunt oxigenate sau arse. Prin urmare, rolul *circulațiunii* este, pe deoparte, să aducă țesăturilor noastre *oxigenul* luat în plămâni și lichidul nutritor absorbit la suprafața stomacului și a mațelor, iar pe de altă parte să ducă ceea ce rămâne din acea nutrițiune, sau ardere, adecă cum s'ar zice *cenușa*, în

rinichi, ca să se strecoare, ca printr'un filtru și să meargă să se deșerte prin urină. — *Organele circulațiunii* sunt : o pompă care trage și împinge, *inima* sau *cordul*, canalele prin cari merge *sângele*, *arterele*, *vănele* și *capilarele* și alte canale, numite *limfatice*, cari cuprind un alt lichid, *limfa*. — *Sângele* este un lichid roșu deschis, când este oxigenat, roșu închis când cuprinde mult acid carbonic, care este rezultatul arderilor din țesuturile noastre. El este format din „*globule* și dintr'un lichid, *plasmă*. *Globulele* sunt *roșii* și *albe* ; cele *roșii* se numesc *ematii* și seamănă cu niște discuri înfundate pe amândouă fețele, cum sunt talgerile ce le pun bărbierii afară la prăvălie, ca semn al meseriei lor. Ele sunt așa de



Fig. 127. — Poziția inimii

subțiri, încât punând unul peste altul 120 discuri am avea o grosime de un milimetru și într'un milimetru cub de sânge se găsesc 5 milioane. Ele conțin o materie albuminoidă și fieruginoasă : *emoglobina*. *Globulele albe*, numite *leucocite*, sunt mai transparente, mai puține, o globulă albă la o mie roșii și își schimbă mereu forma, au *mișcări amiboide*. *Plasma* este un lichid gălbui, care, pe când curge sângele într'un vas, se descompune în firisoare solide, *fibrină*, și într'un lichid, *zăr* (serum), care conține albumină, zahăr (glicoză), săruri și apă. Această plasmă iese din vasele capilare sanguine, imbibă țesăturile, le pătrunde și le nutrește, ea este mediul interior al organismului. — *Limfa* este compusă din această plasmă modificată prin nutriția țesăturilor și care pătrunde în

CORD

limfatice, împinsă de un nou aport, ce vine din capilare și din globule albe, cari seamănă cu acele ale sângelui. Într-o parte a trunchiului nostru, în ceasurile cari urmează după digestiune (mistuire), limfa mai conține o mare parte din produsele acestei mistuiri, cari îi sunt aduse de limfaticele intestinului, cari poartă numele special de *chilifere*. Limfa este vărsată apoi în două vine, din partea de sus a pieptului unde se amestecă cu sângele. — *Inima* sau *cordul*, este organul central al *circulațiunii*, format dintr'un mușchiu gros, găunos, așezat între cei doi plămâni (bojoci), în piept, unde este susținut de canalele, sau vasele arteriale cele mari, cari pleacă din el. Cordul este înconjurat de o pungă fibroasă, numită *pericard*. Intre cord și




Fig. 128. — Schema aparatului circular

pericard se află o seroasă, o pungă închisă și care, în stare de sănătate, nu conține decât o cantitate mică de serozitate, trebuincioasă alunecării unei fețe asupra celeilalte în timpul mișcărilor de lărgire și strângere ale inimii. Cordul are forma unei pere, al cărei vârf este în jos. Cântărește cam 250 grame, este mare cât un pumn și direcția lui este oblică de sus în jos și dela dreapta spre stânga. Vârful inimii, care privește înainte și la stânga, se simte bătând de desupt și puțin înăuntru de vârful țâței stângi. Cordul este împărțit printr'un părete în două căsuțe (cavități): *dreaptă* și *stângă*, cari și ele la rândul lor sunt despărțite

CORD

fiecare, prin *valvulele auriculo-ventriculare*, într'o cavitate superioară numită *urechiușe* (auricul) și o cavitate inferioară numită *ventricul*. Valvulele se prind prin marginea lor de sus de jurul orificiului, iar marginea lor de jos este despăcată și anume cea din dreapta în *trei*, de unde și numele ei de *tricuspidă*, iar cea din stânga numai în *două*, valvă *bicuspidă* sau *mitrală*. De fața lor externă se alipesc niște coarde tendinoase, cari sunt terminațiunea unor stâlpi cărnoși, ce căptușesc suprafața internă a inimii. Mai sunt și alte valvule, numite *sigmoide*, cari pleacă din cord. Aceste valvule formează trei îndoituri, cari seamănă





Fig. 129. — Secțiunea inimii, cu săgeți care arată mersul sângelui

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1=vena cavă superioară | 4=vena plămânului |
| 2=ventricul drept | 5=ventriculul stâng |
| 3=artera plămânului | 6=aorta |

cu cuiburile de porumbel. Rolul tuturor acestor valvule este de a împiedeca întoarcerea sângelui îndărăt, în momentul contracțiunilor (strângerilor) cordului. Leziunea, sau stricarea lor, aduce mare supărare circulațiunii și se arată prin niște sgomote anormale, auzite de urechia doctorului. — Inima se lărgeste în mod alternativ, pentru a primi sângele (diastolă) și se strânge, pentru a-l arunca în artere (sistolă). Aceste mișcări se fac cam

de 70 de ori pe minut, la omul adult. La copii se fac mai de multe ori: 130 la naștere, 100 la 3 ani, 90 la 10 ani (vezi *Puls*). Această scădere merge deopotrivă cu respirația. Orice supărare în respirație (febră, boale de plămâni) mărește numărul contracțiunilor cordului. La unii oameni bătăile inimii sunt foarte rare. Fiecare contracțiune a inimii împinge cam 200 grame de sânge în artere. Greutatea totală a sângelui fiind de 6000 grame, este de ajuns o jumătate de minut pentru ca un globul să poată merge dela inimă până la vârful degetelor și să se întoarcă înapoi. — *Sgomotele și bătăile cordului*. Punând urechia în dreptul inimii auzim un fel de tic-tac (ca de ceasornic), format din două sgomote succesive. Cel dintâiu, care se aude bine la vârful inimii, este mai prelungit și mai închis; el coincide cu



ig. 130. — Circulația sângelui între inimă și plămâni

contracțiunea (strângerea) ventriculelor și pare a fi produs de frecarea sângelui de pereți. Al doilea, care se aude mai bine la baza inimii, este mai scurt, mai deschis și coincide cu începutul dilatațiunii (lărgirii) ventriculelor și este produs de îndreptarea valvulelor sigmoide. *Bătaia*, sau *lovitura* inimii, coincide cu contracțiunea ei care se întărește ca orice umșchiu când se strânge și sdruncină peretele pieptului, pe care îl lovește. — *Arterele* duc sângele dela inimă spre extremitățile corpului. Ele se micșorează pe măsura în care se depărtează de inimă și sfârșesc la *capilare*. Peretele lor cuprinde un strat gros de țesut

elastic și multe fibre (firișoare) musculare contractile. Ele rămân deschise când le tăiem, din care pricină rezultă gravitatea emoragiilor (pierderilor de sânge) când sunt rănite. Arterele ce pleacă din inimă sunt în număr de două: *artera pulmonară*, merge dela ventriculul drept la plămâni; cea-laltă, *aorta*, iese din ventriculul stâng, se ridică spre baza inimii, apoi se îndoiește sub formă de cârjă (*crossă*) și se îndreaptă înapoi, pentru a merge la columna vertebrală (șira spinării), dealungul căreia se scoboară, apoi în dreptul ligheanului (a soldurilor) se împarte în două trunchiuri, *arterele iliace*, cari se împart îndată fiecare în *iliaca internă* (pentru organele cuprinse în lighean) și *iliaca externă*, care se prelungește în coapsă sub numele de *artera femorală*, din care pleacă arterele gambei (*gionatei*) și piciorului. Arterele principale, cari pleacă din *aortă* sunt: arterele inimii sau *coronare*; apoi în dreptul cârjii (*crossiei*) *carotidele primitive* (cea din dreapta este o ramură a micului trunchiu brachiocefalic, care dă naștere și la subclavicularea dreaptă), *subclavicularele* cari se continuă fiecare prin *axilară* (subsuoară), *umerală* (braț), *cubitală* și *radială* (antebraț) și arterele mâinii. Dealungul aortei descendente (care se scoboară pe lângă șira spinării) avem arterele *intercostale*, a ficatului, a splinei și stomacului, arterele mezenterice (ale intestinelor), spermatice și renale. Arterele *carotide primitive* (vezi acest cuvânt), se ridică din *aortă* dealungul gâtului, câte una de fiecare parte, iar sub ureche fiecare se împarte în alte 2 ramuri, *carotida internă*, care merge înăuntrul capului și *carotida externă*, care merge la față și partea dinafară a capului (vezi fig. 65). — *Vănele* sunt canalele elastice cari aduc sângele la inimă, după ce le-au primit din capilare și din limfatice. Interiorul lor prezintă, din distanță în distanță, un fel de îndoituri în formă de cuiburi de porumbel, numite *valvule*, cari împiedcă sângele de a merge înapoi. Aceste valvule sunt mai numeroase la membrele din jos, unde greutatea sângelui supără circulația. Vinele se turtesc când le tăiem. Ele sunt din ce în ce mai mari și mai puține, cu cât se

apropie de inimă. Vănele urmează același drum ca și arterele; acele ale viscerelor (organelor interne) sunt în număr egal cu al arterelor, cele ale membrilor în număr îndoit, în fine cele superficiale, cari umblă pe sub piele, sunt izolate. Toate vânele membrilor inferioare merg de formează *vena cavă inferioară*, care, după ce a venit să se așeze deasupra aortei abdominale, primește toate vânele din pân-tece și merge de se sfârșește în ure-




Fig. 131. — Circulația sângelui

a=auricul stâng; b=ventricul stâng;
c=auricul drept; d=ventricul drept;
e=plămân; f=vase capilare; g=mă-nunchiu de vase limfatice; h=ficat;
i=canalul digestiv; j=artera fima-tului; k=vase capilare.

chiușa (auriculul) dreaptă. Vena *cavă superioară*, care sfârșește tot aci, este trunchiul format de reunirea vinelor capului și gâtului (jugulare) și ale membrilor superioare (subclaviculare). Cele patru vâne pulmonare aduc sângele, care a trecut prin plămâni, în urechiușa stângă. — *Capilarele* sanguine sunt vase transparente, cu pă-reții foarte subțiri, cari sunt puse în-tre artere și vâne. *Totalitatea* lor formează o masă mult mai mare decât

aceea a arterelor și vânelor. Ele șer-puiesc pretutindenea prin țesăturile noastre, așa că ori unde ai înțepa cu acul, curge sânge. — *Limfaticele*, con-stituite și ele din canale transparente, cu păreți foarte subțiri, nasc prin re-țele, cari brăzdează în abundență or-ganele noastre. Calibrul lor este în-totdeauna mai mare (de 2 până la 10 ori) decât acela al capilarelor. Forma lor este neregulată, din cauza umflă-turilor, cari seamănă cu acele ale vâ-nelor. Limfaticele merg în mod pa-ralel, unele lângă altele, până ce în-tâlnesc un *ganglion*, care este o glandă mică de mărimea unui bob de meiu până la aceea a unui bob de fasole și în care ele pătrund cu mai multe al-te (vase *aferente*), și ies pe partea opusă, numai într-un singur vas (*vas eferent*). *Ganglionii* de căpetenie sunt grupați în subsuori, la îndoiturile stin-ghiilor, la gât, în jurul bronhiilor la originea lor. După ce au străbătut acești ganglioni, limfaticele membre-lor inferioare, ale pântecelui ale jumă-tății stângi a pieptului, ale gâtului, ale capului, ale membrului superior stâng, merg de se reunesc în *canalul toracic*, care, după ce a urmat columna verte-brală (șira spinării), în toată lungimea ei, se îndoiește și se infundă în vena subclaviculară stângă. Restul limfati-celor sfârșește în vasul cel mare limfa-tic, din dreapta, care, după un drum numai de 2 centimetri, merge de se în-fundă în vena subclaviculară dreaptă. — *Circulația cea mare și cea mică*. Cordul este centrul celor două circu-lații. Jumătatea lui *dreaptă*, pe de o parte, primește prin cele două vine sângele din tot corpul, sângele cel *negru* din cauza prezenței acidului car-bonic, rezultat din arderele împlinite în țesăturile noastre, iar pe de altă parte aruncă sângele în artera pulmo-nară, care îl duce în plămâni, unde se oxigenează. Jumătatea lui *stângă*, pe de o parte, primește prin cele patru vâne pulmonare sângele *roșu*, care se întoarce din plămâni, iar pe de altă parte îl aruncă în *aortă*, care îl duce în tot corpul. Circulația dintre inimă și plămâni (dus și întors) se numește *circulația mică* (fig. 130), iar aceea care se face în restul corpului *circulația mare*. La aceasta din urmă

este alipit sistemul limfatic. — *Cauzele cari împing și poartă sângele și limfa* sunt mai multe puteri, cari fac să înainteze sângele și limfa în canale, sau vase, și anume: contracțiunile inimii, elasticitatea vaselor, micșorarea progresivă a calibrului total al vaselor de reîntoarcere, vinele, vidul sau golul care se produce în plămâni, în minutul dilatațiunii (lărgirii) pieptului, împingerea care rezultă din venirea în limfatice și în vine a lichidului, care rezultă din mistuirea ali-



Fig. 132. -- De câte ori bate inima la diferite vietăți

mentelor. Circulația se încetinește în capilare. — *Boalele de inimă.* Mulți oameni se cred bolnavi de inimă fără să fie. Ori ce durere în dreptul inimii, precum ori ce bătaie mai tare a ei, deșteaptă frica în om, frica morții, căci toată lumea știe că, odată cu încetarea definitivă a bătăilor inimii, se

sfârșește și viața. De aceea este bine ca îndată ce omul are bănuială numai de boală de inimă să alerge la un doctor, singurul în stare de a-l lămuri asupra sănătății lui. Nu ori ce durere în dreptul inimii este un semn de boală a acestui organ; sunt dureri *neuralgice*, dureri intercostale, în dreptul ei, fără ca ea să fie atinsă, bolnavă și dureri, cari nu sunt permanente, vin și dispar repede, cari, de cele mai multe ori, trec prin fricțiuni ușoare făcute cu un spirit de trandafiri, sau alte medicamente. — *Palpitațiunile*, adică bătăile prea repezi ale inimii, nu sunt în totdeauna un semn de boală. În stare de sănătate bătăile inimii se fac fără să ne dăm seamă de ele, fără să le simțim. Uneori însă inima începe să bată mai iute, mai tare, câte odată în mod regulat, altădată în mod neregulat. Și atunci aceste bătăi ne dau o simțire neplăcută, de multe ori foarte supărătoare, încât simțim în același timp și o greutate la respirație și la vorbire. Fața devine palidă și acoperită de sudori, mâinile sunt reci, iar după accese mai violente de palpitații poate urma un fel de leșin. Cauzele acestor *bătăi de inimă* sunt multe: anemia, cloroza, isteria, neurastenia, gușa exoftalmică, alcoolismul, excesele de orice natură, abuzul de ceaiuri, cafea, tutun, endocardita cronică (vezi mai jos), emoțiunile vii, mișcărilor violente, muncă prea multă. — *Angină de piept* (vezi *Angină de piept*). — *Endocardita cronică a valvei mitrale*. Această boală cumplită este produsă de reumatism, gută, boale infecțioase (difterie, scarlatină, sifilis, variolă), coree, pneumonie, excesele de orice natură, oboselile, alcoolismul, preocupările, sarcina, alăptarea pot predispute la ea. *Semnele* ei sunt: un fel de greutate cu apăsare pe piept, care uneori merge crescând mai ales când se iese și bronșita (tusa), la care cei bolnavi de inimă sunt predispuși, palpitații, un fel de simțire de strângere în dreptul inimii. Uneori se vede scuipare de sânge, cu miros de usturoiu, care poate dura multă vreme. De multe ori se vede umflătura picioarelor, care dispare noaptea când omul este culcat. Umflătura aceasta se poate întinde la gambe, coapse, trunchiu. Mistuirea

poate să fie grea și atunci bolnavul este aplecător spre somn, care nu este liniștit și uneori însoțit de visuri rele. Această somnolență poate fi înlocuită prin lipsă de somn (insomnie), atunci când sângele se îngrămădește la creeri, din pricină că circulațiunea sângelui nu se mai face cum trebuie. Pulsul este mic, neregulat, întrerupt prin poticniri. Această boală se desvoltă încet, pe nebăgate de seamă și în timp de mai mulți ani. Ea poate fi oprită în desvoltarea ei prin exercițiu moderat și progresiv, prin masagiu general și masagiu special al inimii, mișcări pasive. *Tratament*: regim de lapte la început, mai târziu regim ordinar, însă cumpătat. — *Endocardita orificiului aortic* are mai multe semne, cari însă apar cu mult mai târziu de începutul boalei: fața de obicei palidă, alteori foarte roșie. Această congestie poate să se însoțească de curgere de sânge din nas, de bătăi în temple, întunecarea vederii, vâjiituri de urechi. Uneori palpații, dureri în dreptul inimii și semne de *angină de piept* (vezi aceste cuvinte). Opresiunea, sau apăsarea pe piept și umflătura picioarelor se ivesc mai târziu. *Tratament*: ghiață pe inimă, vezicători, ventuze; pe dinăuntru: iodur de potasiu.

Cordea, cordică. — V. *Viermi intestinali* (Tenia).

Cordială (Băătură). — Se zice de o potiuine, sau băătură, că este *cordială*, atunci când ea are însușirea de a ridica repede căldura generală a corpului, de a mări puterea inimii și a stomacului. Intre băăturile cordiale se numără toate vinurile bune și vechi (Cotnari, Drăgășani, Malaga, Madera, Marsala, etc.), alcoolicele (rom, rachiu, coniac, kirsch, diferite licoruri), eterul, apele și licorurile de mentă, melisă, scorțișoară, într'un cuvânt toate lichidele stimulente.

Cordonul ombilical. — E cordonul care leagă fătul de mamă, prin *placenta*. Are la naștere grosimea unui deget mic, iar lungimea 40—60 cm. Cordonul, dacă-i prea lung, se încurcă, face noduri, strânge copilul de gât și-l omoară. *Legătura cordonului ombilical*. Cordonul nu trebuie tăiat decât după 2 minute dela încetarea bătăilor. Se leagă cu ață, sau mătășă curată, steri-

lizată, fiartă, sau ținută 20 de minute, cel puțin, în alcool. Se leagă la o distanță de 3 cm. buricul copilului. Legătura se face bine cu 2 noduri. Se taie apoi cordonul la $\frac{1}{2}$ cm. înaintea legăturii, cu o foarfecă sterilă, sau trecută prin flacăra, de 3 ori cel puțin. Apoi se aplică un pansament aseptice se scoate la 7 zile. Obiceiul, mai ales al babelor și moașelor fără carte, cari se mai găsesc prin satele noastre, de a tăia buricul copilului cu o foarfecă, sau un cuțit pe care le țin pe grinda casei, sau de cele mai multe ori sub streșină, ori sub pat, pe pământ, este foarte periculos. Microbii falcariței mai ales (tetanosul), cari se găsesc în pământ și se pot lua ușor pe aceste instrumente, se pot inocula, când am tăiat buricul și copilul se îmbolnăvește și moare de falcariță. Tot așa se pot inocula și alți microbi. luați de pe aceste instrumente murdare, sau de pe mâinile moașei nespălate și copilul va fi în pericol de moarte.

Coree (gr. *choreia*, dans, joc). — Este o boală de nervi (nevroză) care se mai numește și *dantul lui Saint-Guy* și care se arată printr'o neregulă în mișcările voluntare și prin contracții spasmodice, involuntare, ale mâinilor și picioarelor. Se vede mai cu seamă la fetele tinere, de 7 până la 16 ani, la anemici, la persoanele clorotice și la cei ce sufăr de reumatism. O spaimă vie, emoțiunile, frica, mânia, sarcina, imitația, etc. pot contribui la ivirea ei. Boala începe cu fața, care începe a se strâmba în diferite feluri, apoi se întinde la mâini și picioare, ale căror mușchi se strâng în mod involuntar, dând naștere la mișcări foarte ciudate și variate. Bolnavul nu mai poate să țină o cană cu apă, fără s'o verse, sau s'o scape din mână. Mersul lui este nesigur. Aceste mișcări dezordonate se întind la tot corpul și atunci bolnavul are mișcări continue, un fel de agitație generală, se sucește, se încovoie de mijloc, mâinile și picioarele fac mișcări contradictoare. Din pricina contracțiunilor limbii, gâtului și laringelui, bolnavul vorbește și înghite cu mare greutate. Câte odată se văd și paralizii limitate. Uneori boala se mărginește numai la o jumătate a corpului și atunci avem *emicoree*, când

cele mai adese ori se găsesc leziuni în centrul nervoși. Câte odată se văd la coreici turburări în inteligență, pierdere memoriei, halucinații dementă. Boala poate recidiva; s'a văzut moartea venind în mijlocul crizelor convulsive. *Tratament*: antispasmodicele (bromur de potasiu, valeriană), asa feticidă, etc.), narcoticele (cloral), anti-pirina, arsenicul. Se va combate anemia prin preparate fieruginoase, dușuri, iar diateza reumatismală prin băi sulfuroase. Pe lângă acestea se recomandă odihnă, nici o muncă intelectuală, viață liniștită și regulată, la țară, în aer liber, hrană ușoară, lapte, ouă, fripturi, legume verzi, grăsimi. S'au observat și epidemii de coree, când oamenii din sate întregi plecau cuprinși de furia danțului pe câmp și toți, copii, femei, tineri și bătrâni, danțau până când cădeau istoviți, ca morți. Aceste epidemii, mulțumită civilizațiunii, astăzi nu se mai văd.

Cori. — V. Pojar.

Coriandru, *culeandra*, (*Coriandrum sativum*, fam. umbeliferelor). — Plantă erbacee, ale cărei fructe când sunt proaspete au un miros neplăcut, de păduche de lemn (ploșnițe), iar când sunt uscate au un miros plăcut și aromatic, gustul dulce și dă o simțire caldă în gură și stomac. Originară din orient, se cultivă în Europa, în regiunea mediterană, pentru fructele sale aromatice, întrebuințate ca condiment. În medicină se întrebuințează fiind carminativă, excitantă și stomachică, (pentru a înlesni mistuirea), sub formă de ceaiu, 10 gr. la 1000.

Coriză, *guturaiu*, *rinită*, *șuhărie*. — Guturaiul este un catar al nasului și constă în aprinderea, sau inflamația pelitei care căptușește nările (*mucoasă*). Dacă ne uităm în nas vedem niște ridicături mari, netede, lipite de părții externe ai nărilor cari se numesc *cornete* și între cari se află niște adâncituri. Peste aceste ridicături și adâncituri se întinde mucoasa nazală. În fiecare nare se deschide câte un canal, care vine dela ochiul din acea parte, și prin care curg lacrimile, după ce ele au spălat ochiul. Nările se împreună înapoi într-o singură deschizătură, adevărată în gât, deasupra ceriului gurii și în laturile acestei deschizături se

află alte două deschideri, cari sunt ale canalelor ce merg din gât la urechi. Mucoasa, după ce a căptușit nasul, se întinde și căptușește atât canalele cari vin dela ochiul în nas, cât și pe acelea cari merg dela gât în urechi. Când se aprinde mucoasa, inflamația se duce prin toate adânciturile dintre ridicăturile nărilor și produce niște muci amestecați cu puroiu, cari se curăță cu greu. Din această pricină la unii bolnavi, mai ales la cei scrofuloși și slabi, guturaiul trece în stare cronică, adevărată se învechește și ține ani îndelungați. Mai mult decât atât, inflamația mucoasei se poate întinde mai departe, în canalele prin cari vin lacrimile din ochi și în canalele prin cari trece aerul din gât în urechi, astupându-le și din această pricină se îmbolnăvesc ochii, căci lacrimile nu mai pot curge în nas, se îmbolnăvesc urechile, căci prin canalele dela fundul nasului nu mai poate merge aer în urechea mijlocie, de dincolo de timpan. Guturaiul este contagios, microbian. Microbul lui se găsește în mucozitățile nasului și pe toate obiectele atinse de acele mucozități. Deși guturaiul este o boală ușoară (benignă) în cele mai multe cazuri paza în contra lui ne poate scăpa de multe urmări, sau complicațiuni rele, cum este de pildă *otita*, la care sunt supuși unii bolnavi și care poate duce la surzenie, sau chiar la moarte. Guturaiul trece dela om la om, mai ales la cei ce locuiesc în aceeași odaie. Agentul boalei se află în muci și în scuipatul bolnavului, precum și pe toate obiectele mănjite de aceștia. Se poate ca microbul să se afle și în atmosfera în care tușește bolnavul. Cei cu guturaiu *proaspăt* au nasul infundat, ochii lăcrămează, durere în frunte, strănutare cu iuteală pe nas, și din nas curge la început un fel de apă limpede, iute, iar după o zi, sau două, un fel de muci gălbui, încărcăți cu puroiu. Cei cu guturaiu *învechit*, au nasul întotdeauna mucos și când îl împrespătează, ceace se întâmplă foarte des, au toate turburările guturaiului acut. Cei cu guturaiul cronic încep dela o vreme să-și piardă mirosul, au nasul întotdeauna uscat, adevărat tocmai contrariul de ceace se întâmplă în guturaiu. La acești

bolnavi mucoasa s'a topit, din cauza aprinderilor prea dese și numai dă nici o mucozitate, nici chiar atât cât dă în stare normală ca să țină nasul umed. Rezultă că guturaiul, mai des la cei scrofuloși și reumatizanți, nu este așa ușor cum de obicei ne place să-l considerăm, ci o adevărată boală, cu urmări rele. *Cauza* cea mai comună a guturaiului este *frigul umed*. În timp de răceală și umezeală guturaiul este epidemic. Poate să fie și un semn al mai multor boale: pojarul, influența, difteria, morva. De asemenea mai poate fi provocat de unele medicamente, cum este iodul. *Tratament*. Cei predispuși la guturaiu trebuie să se aplece de frigul umed, îmbrăcându-se în haine uscate și călduroase, de lână, să locuiască în odăi uscate, expuse la bătaia soarelui. Când cineva a căpătat guturaiu, chiar dela început, să caute să înădușească bine și mult, stând în pat și luând de 2—3 ori în timpul zilei ceaiuri calde de nalbă, de teiu, de violele, de mușetel, băi de muștar la picioare, muștare la ceafă, aspirină, piramidon. Pe nas să tragă apă caldă, puțin sărată și iodată, vaselină cu mentol, ulei camforat, ulei cu gomenol. Gomenol: 50 ctgr., ulei de vaselină 10 gr. În cazurile învechite, când sunt răni și se fac coji în nas, se recomandă alifia aceasta: salol pulverizat, xeroform, câte 1 gr., vaselină: 20 gr., de pus în nas cu un pumătuf de 2—3 ori pe zi. Guturaiul poate deveni foarte serios la noii-născuți, cari nu pot respira în timpul când sug, așa că ei sunt amenințați de sufocație, ori de câte ori iau fața în gură și atunci, de frică, nu mai vreau să sugă, ceea ce îi slăbește foarte mult. Pentru aceasta nu ne rămâne decât să-i hrănim cu lingurița, sau mai bine să căutăm să le desfundăm nasul, punându-le în fiecare nare câte o picătură, de 3—4 ori pe zi, din soluția aceasta: gomenol 1 ctgr., ulei de olive sterilizat 10 gr. adrenalină 5 picături. În cazul când nasul este rău înfundat punem în fiecare nară, înainte de supt, câte 1—2 picături de adrenalină. În odaia bolnavului este bine să se afume, din când în când, cu ienupere și se să facă aerisirea cel puțin de 2 ori pe zi. Toate mucozitățile din nas și flegma din

piept să se dezinfecteze, aruncându-se în scui pători, sau vase cu antiseptice (acid fenic, sublimat coroziv, etc.) și trecând prin apă fierbinte în clocote toate obiectele cari au servit bolnavului.

Corn (lat. *cornu*, gr. *chéras*). — Uneori se văd pe suprafața pielii niște crescături, cari seamănă cu unghiile și cu coarnele prin înfățișarea și structura lor. Nu trebuie să se confunde adevăratele coarne cu diferitele coji și negii tari și lungi, cari se arată câte odată pe piele. Cornul din figura aci alăturată este format din țesut cu adevărat cornos, din care sunt făcute și coarnele animalelor. La om sunt două



Fig. 133.—Corn

varietăți de coarne: *generalizate*, adică împrăștiate pe toată suprafața corpului, și *solitare*, adică singurate, ale căror număr este mic, de cele mai multe ori este numai câte unul. Coarnele solitare (singurate) prezintă mai mare interes chirurgical. Cornul se arată de obicei la cap și la față, apoi pe fața dinăuntru a coapselor, pe dosul mâinii, pe piept, pe spate, în palme și tălpi, pe limbă, etc. *Cauzele* sunt: iritațiunile locale, loviturile, plăgile, cicatricele. Adeseori cornul crește pe o boală preexistentă a pielii, un neg, un chist sebaceu, etc. După ce a căzut cornul se constată că baza lui, mai mult sau mai puțin găunoșită, conține o materie albă ca seul și puturoasă, iar dacă ardem cornul răspândește un miros caracteristic, întocmai ca oricare corn ars. Cornul prin sine însuși este nesimțitor, dar mișcările cari i-se fac produc durere la baza lui, acolo unde este prins în piele, din această pricină coarnele sunt foarte supărătoare, mai ales în regiunile unde sunt expuse la dese mișcări. Cornul poate să cadă singur, dar crește din nou. Uneori se poate complica de cancer, la baza lui. Pentru a preveni toate aceste și pentru a scăpa bolnavul de o deformitate orice corn trebuie operat din vreme.

CORN

Corn de cerb (*Cervus elaphus*, Mami-fer rumegător). — Conține fosfat de calciu și gelatină. Se întrebuințează în contra urdinării, sub formă de praf, adică corn ras, (cenușe). Decocțiunea albă a lui Sydenham conține 10 gr. la litru, asociat cu flori de portocale, miez de pâine, zahăr și gumă arabică. — La țară babele suflă praf de coarne rase în ochi la cai, pentru albeață, iar pentru epilepsie (boala copiilor), dau copită rasă praf, amestecată cu oțet.

Corn de săcară. — V. Săcară cornută.

Cornee. — Partea transparentă a ochiului, care se află dinainte și prin care străbate lumina până în fundul ochiului, trecând prin pupilă. Corneea este prinsă de jur împrejur în sclero-tică (albul ochiului), întocmai ca o sticlă de ceasornic. Inflamația, sau aprinderea corneei se numește *cherati-tă*. Pe cornee se ivesc adeseori *pete*, cunoscute în popor sub nume de *al-beață* (vezi *Ochiu*).

Cornet acustic. — V. Surzenie.

Cornișor. — V. *Pedicușă*.

Cornuță. — V. *Ciumăfaie* și *Holeră*.

Corobatică. — V. *Dioc*.

Coroidă. — V. *Ochiu*.

Corovatie. — V. *Lumânărică*.

Coroziv. — V. *Caustice*.

Corozive. — V. *Caustice*.

Corset. — Este un adevărat instru-ment de tortură, ce-l poartă femeile, sub pretext de a-și susține talia, piep-




Fig. 134. — Poziția organelor din torace și abdomen

A = normală; B = strâns de corset

tu și pântecul. Neajunsurile corse-tului sunt foarte mari. Corsetul fiind țăpăn și prea strâns, supără *respirația*, apăsând pieptul. El împiedecă funcțio-

COSM

narea părților de jos ale plămânilor și lasă să respire numai vârful lor. Din aceasta rezultă a oplicare spre *oftică*, spre *astmă* și o agravare pentru celelalte boale, când există. Corsetul supără *inima* în slujba ei, producând *palpitațiuni* (bătăe de inimă) și poate duce la *hipertrofia*, sau îngroșarea ei. Corsetul *împiedecă mistuirea*, prin apăsarea și dislocarea organelor mis-tuirii, cum sunt: stomacul și ficatul. Din această pricină femeile încorsetate nu pot mânca decât foarte puțin. Corsetul, *apăsând pe pântece*, turtește mațele și provoacă între altele *ghiorăi-*




Fig. 135

stânga = organele la locul lor normal
dreapta = organele împinse în sus

turi foarte neplăcute. Corsetul împie-decă toate mișcările naturale ale cor-pului, pe care îl silește să stea țăpăn. *supără dezvoltarea* tuturor părților pe cari apasă cari la tinerile fete capătă forme cu totul artificiale și rămân a-trofiate și nedestoinice pentru slujba lor. Corsetul mai are ca urmări: *con-stipația*, *turburări la menstruație*, diz-locări și umflături de mîtră, de unde vine sterilitatea și *avorturile*.

Cosmetic, cosmetice, cosmeticuri. — Substanță întrebuințată pentru a as-cunde defectele feței și a-i scoate în relief calitățile prin artificii colorilor și a altor materii chimice din care sunt compuse. Colorile bătătoare la ochi în-totdeauna au jucat un rol important în tehnica înfrumusețării, atât la se-mințiile primitive, ca și la popoarele civilizate din toate timpurile. Intre-buințarea cosmeticelor — numită în mod obișnuit *șardare* (dela fard) — poate fi utilă sau dăunătoare, după compoziția lor chimică și dibăcia celui care le întrebuințează. Se folosesc pe o scară întinsă în toate păturile so-

ciale. Țăranca recurge la substanțe cosmetice naturale de origine animală sau vegetală, provenite din toate sursele imaginabile. Multe din ele sunt inofensive, dar numărul celor care dăunează e foarte mare.

V. și *Fard*. (Detalii mai multe se pot citi în cartea „Ingrijirea tenului”, de Dr. A. Voina).

Cosmetica (gr. *kosmeo*, împodobesc și: *kosmesis*, podoba, găteală). — Cosmetica este acea ramură a dermatologiei, care se ocupă cu igiena și estetica pielii și a părului, precum și cu bolile de piele care prezintă interes din cauza aspectului lor inestetic. Datorită importanței sale sociale, cosmetica a luat în ultimul timp o dezvoltare considerabilă, dându-i-se o îndrumare științifică, dictată de cunoștințele moderne privitoare la funcțiunile pielii și la legătura dintre piele și restul organismului.

Cosmetologia (aceeași etimologie ca și *Cosmetica*). — Știința care se ocupă cu înfrumusețea corpului. Are un înțeles mai larg decât *Cosmetica*, deoarece aceasta vizează în primul rând îngrijirea și înfrumusețerea pielii și a părului, câtă vreme Cosmetologia privește estetica întregului corp și recurge, pentru scopurile sale, la toate ramurile științelor medicale, care pot aduce vre-o contribuție la îndreptarea estetică a înfățișării corpului. Este înrudită de aproape cu *Cosmetica*, deoarece majoritatea manoprelor de înfrumusețare privesc mai ales pielea și părul.

Coși, coși de pe față. — V. *Acnee*.

Coșul pieptului. — V. *Piept*.

Cot. — Încheietura care unește brațul cu antebratul se numește *cot*. În partea dinainte, la *îndoitura cotului*, pielea are două, sau trei îndoituri în curmeziș, cari se produc cu timpul prin mișcările ce le face antebratul îndoindu-se asupra brațului. La mulți copii grași pielea dela îndoitura cotului se opărește, se înroșește și produce arsuri și mâncărimi, de aceea este mai bine să se aplice prafuri fine (de orez, feculă, lycopod), talc, în loc de alifii, sau cold-crem. Tot pe această față se mai văd vinele prin cari circulă sângele negru. Din aceste vine se lasă de obicei sânge (venesecție),

fiindcă ele sunt sub piele, care este foarte subțire, așa că se înțeapă cu multă ușurință. În partea dinapoi a cotului sunt trei ridicături, ușor de simțit cu mâna, puncte prin cari oasele brațului și antebratului se unesc între ele pentru a forma încheietura, sau *articulația cotului*. Această încheietură, în stare de sănătate, se mișcă cu înlesnire ceea ce face ca antebratul să se îndoiască asupra brațului așa de mult încât mâna să poată atinge umărul. Când aceste mișcări nu se pot face și încheietura stă înțepenită (*anchiloză*). Uneori aceste mișcări se fac în măsură mai mică decât în stare de sănătate și sunt foarte dureroase. Dacă se mai observă același lucru și în alte încheieturi, împreună cu fierbințeală, se poate să fie un *reumatism articular*. Mai putem avea la cot o *artrită*, care la copii scrofuloși sau limfatici, e de cele mai multe ori, o *tumură albă*, sau o *contuzie*, urmată de multe ori de o frântură de os.

Covasna. — Stațiune balneară și climaterică din jud. Trei-Scaune, la poalele munților, înconjurată de brazi. Apele sunt bogate în acid carbonic liber și bicarbonat de sodiu. Mai conțin fier și iod. Băile dela Covasna se recomandă celor cu afecțiuni catarale ale plămânilor, stomacului, intestinelor, boli de nervi, gută, scrofuloză, anemie.

Coxalgie (dela *coxa*, coapsă sau șold și *algos*, durere), *tumură albă* sau *artrită tuberculoasă* a articulației coxo-femorale. — Este o inflamație, sau aprindere de natură ofticoasă, a încheieturii șoldului, o inflamație cronică, cu lungă durată și care s'a mai numit și *tumură albă*. De multe ori durerea nu începe, sau nu se simte dela început la încheietura bolnavă, în șold, ci într'un punct mai jos, la genunchiu, sau la picior, iar uneori copilul singur nu știe să ne arate unde îl doare. Mai târziu durerea se localizează și se fixează în șold. Această durere, care la început este adâncă, surdă, devine din ce în ce mai simțitoare, inflamația se mărește, încheietura se umflă, face puroiu în adâncime, piciorul se strânge și se scurtează. Dacă lăsăm boala în voie ei bolnavul slăbește repede și în cele din urmă

moare, sau, la unii, umflătura se sparge și curge puroi mult, care nu se mai sfârșește, ținând uneori cu anii și în cele din urmă dacă copilul a putut rezista, se vindecă, rămânând cu șoldul strâmb și înțepenit. Dacă însă boala se ia dela început, aplicându-se un tratament apropiat, după cum ne învață știința cea mai nouă, coxalgia nu numai că nu omoară bolnavul, dar se poate vindeca cu foarte mică diformitate și cu o schiopătare neînsemnată, sau fără să lase nici o urmă. Cei mai predispuși la această boală sunt copiii de 5—10 ani, rău hrăniți, rău ținuți, fără aer îndestulător și fără mișcare; la adulți se vede rar. Cauza adevărată și cea mai lătită este tuberculoza. Copiii limfatici și scrofuloși cu moștenire tuberculoasă, sunt cei mai supuși la coxalgie, apoi copiii cari au zăcut de vre'o boală grea, cum este scarlatina și uneori pojarul, toți aceștia printr'o căzătură, sau o lovitură în șold se îmbolnăvesc. Un copil fără predispoziție și pe deplin sănătos poate să cadă și să se lovească ori de câte ori, el nu va căpăta coxalgie. — *Tratamentul* medical constă într'o bună igienă, în medicamente tonice (întăritoare), în hrană bună, ședere la țară sau pe malul mării, în aer curat și la soare, pentru a îmbunătăți starea generală a bolnavului. Soarele este cel mai bun medicament al tuberculozei oaselor, de aceea se va ține copilul cât mai mult timp pe malul mării, într'un spital, sau sanatoriu. Soarele (helio-terapia) se aplică și local, pe șoldul caré este bolnav. Dacă nu putem să ducem copilul la mare cumpărăm un aparat care produce raze cu aceleași proprietăți ca ale soarelui (lampa de quartz), sau ducem copilul la un spital să-i aplice aceste raze de soare artificial pe șoldul bolnav. *Tratamentul chirurgical* se rezumă în a *imobiliza* piciorul bolnav, adică a ține în nemișcare partea bolnavă timp îndelungat, căci fără această nemișcare nu se poate nădăjdui nici o vindecare. Înainte de a imobiliza membrul trebuie să-l îndreptăm și să-l punem într'o poziție potrivită, apoi îl punem într'o gutieră, sau mai bine se va face *extensiunea*, sau întinderea piciorului, cu ajutorul greutăților; și-l vom ține în

această poziție până ce bolnavul nu va mai avea dureri și va putea să pună piciorul în pământ. Nu trebuie să ne temem de *anchiloză*, căci dacă piciorul rămâne înțepenit și drept, bolnavul va putea umbla, iar dacă încheietura n'a fost cu totul stricată se poate la urmă, prin masaj și diferite mișcări făcute cu regulă, ca ea să-și recapete din mișcări. Bolnavul nu va începe să umble decât după ce au dispărut toate accidente și starea generală este bună. Dacă prin aceste mijloace nu reușim să obținem vindecarea, atunci nu mai rămâne decât să se facă operație, scoțând părțile osoase bolnave, dar aceste operații sunt foarte grele și rar dau rezultate bune.

Cozi de cireși. — Se întrebuințează ca diuretic (pentru a porni udul) în decoct (fiertură) din 10 gr. la 1000.

Cozla. — Localitate la marginea orașului Piatra-Neamț, pe dealul Cozla, la o înălțime de 390 m. Sunt mai multe izvoare salino-magneziene, neexploatare încă.

Cozmetice. — Multe femei caută să-și înfrumusețeze pielea feței și a mâinilor, sau părul capului cu tot felul de *cozmetice*. Intre aceste sunt diferitele *corpuri grase*: cold-cream, pomadă de castraveți, etc., cari împiedecă respirația pielii, iar când sunt vechi o iită, unele *oțeturi* așa zise de toaletă, cari însuflețesc culoarea pielii, dar cele mai de multe ori o aprind și dau naștere la diferite boale de piele, diferite *farfuri* (sulimanuri, dresuri, rumeneli) cari dau feței, obrazilor și pleoapelor un fel de lustru, dar cari sunt *epilatoare*, cari se întrebuințează pentru arsenicul din cari sunt făcute, ca și *pastele epilatoare*, cari se întrebuințează pentru a opri creșterea părului acolo unde nu trebuie, cum ar fi mustățile la femei. Mai amintim diferite *văpseli*, întrebuințate pentru ar da părului cărunț culoarea lui de mai înainte, sau de a schimba culoarea naturală a părului, din blond negru, sau vice-versa; mai sunt încă și alte *cozmetice*: *pușă, cremă, creioane, lapte* cu bază vegetală etc. Toate acestea nu sunt bune, căci toate strică pielea și unele chiar sănătatea și prin urmare să nu se întrebuințeze

cu nici un preț. Singurul cosmetic bun este *săpunul*. Nici cold-cremul nu trebuie întrebuințat decât numai ca medicament, din când în când, pentru a liniști o întăritare (iritație) de piele.

Cozonăcel. — V *Genunchiu*.

Crampe, cărcei, funiceii. — Provin din contracțiunea involuntară a mușchilor, contracțiune foarte dureroasă din cauza compresiunii unui nerv, sau a unei artere. Crampele acestea mai vin și în urma unui drum lung, pe jos, a unui exercițiu exagerat, sub influența frigului, etc. și ele însoțesc adeseori nevralgiile, în deosebi nevralgia sciatică. Am vorbit mai sus despre crampele dela pulpă, căci în acest loc se ivesc mai adeseori. În timpul lor pulpa se întărește, se umflă, formează o ridicătură tare, foarte dureroasă: suferința se ivește, ea apare și dispare repede. Unii scapă de ele întinzând piciorul cât pot de tare, pentru ca mușchii contractați să-și ia starea naturală, alții fac frecături pe pulpă cu mâna, cu o cârpă uscată, ori dată cu spirt camforat, cu balsam tranchil, ulei de mușetel, cloroform, etc. Crampele vin de obicei rar, foarte rar, la unii însă ele pot să se ivească mai des, și atunci este bine ca să se prevină prin băi calde generale, făcute des, și păzindu-se de băuturi excitante (licoruri, ceaiu, cafea), urmând un regim ușor, evitând pozițiunile care le pot da naștere. *Crampele femeilor însărcinate*, pentru cari se recomandă masajul mușchilor contractați, încețază cu fricțiuni cu liniment amoniacal camforat, iar pentru ca să nu se repete este bine ca femeile însărcinate să poarte o încălțătoare peste pânțele, să se combată constipația și să se dea bromuri de potasiu, 2 până la 3 gr. pe zi. — *Crampe profesionale (crampele scriitorilor, gravurilor și pianistilor)* constau într-o simțire de înțepenire și de amortire în degete, cu neputința de a mai lucra cu ele; ele vin prin accese sau sunt permanente. *Tratament:* La începutul boalei se recomandă odihnă de câteva zile. Scriitorii vor ține condeiul între degetele arătător și mediu, așa că el să se sprijine pe degetul mediu îndoit, pe care este ținut și apăsat cu arătătorul și cu degetul mare.

Se vor întrebuința condeie ușoare, de plută. Se mai recomandă electricitatea: curenți faradici și curenți galvanici, masaj în fiecare zi, timp de 4—6 săptămâni, injecțiuni sub piele cu strichnină. Se mai recomandă gimnastica și masajul. Se va trata starea nervoasă (neurastenia, isteria). În cele din urmă vom sfătui bolnavul să învețe a scrie cu *mâna stângă*, sau, dacă voește să scrie tot cu dreapta, să întrebuințeze un *aparai special pentru crampele scriitorilor*, pe care și-l poate comanda la fabricații de instrumente chirurgicale.

Crampe la stomac. — V. *Stomac*.

Craniu (*cranium*, *calvaria*), *căpățână*, *hârcă*, *scăfârlie*. — Craniul este o cutie osoasă, având forma ovală, așezată cu vârful înaintea, a cărei mărime este în termeni mijlocii de 18 cm. în lungime, 14 și jumătate în lărgime și 13 în înălțime. Nu trebuie să confundăm *capul* cu *craniul*, de oarece prin cap se înțelege toată ex-




Fig. 136. — Craniul (se văd suturile oaselor)

timitatea de sus a corpului omenesc, care este purtată de gât, pe câtă vreme craniul este numai partea de sus și de dinapoi a capului, a cărui parte de dinainte este *fața* (v. acest cuvânt), este deci numai scheletul osos al capului. Cutia craniană în partea de sus este rotundă și boltită, din care cauză se chiamă *boltă* sau *calotă*, iar în limba poporului se zice *feastă*, iar partea de jos este lată și neregulată,

baza craniului, care pe omul viu nu se poate vedea. In această bază se află o gaură mare, rotundă, prin care creerii se continuă cu *măduva spinării*. Căpăţana este formată din opt oase, late, cari sunt pe deplin cusute între ele la omul mare, însă la copiii mici ele sunt unite prin nişte peliţe sau membrane delicate cari se numesc fontanele, sau (*fântănele*), cari încep să se transforme în os adevărat numai dela 10 luni înainte şi până la 2 ani şi jumătate sunt complet osificate. Pentru aceasta trebuie să băgăm de seamă ca, până la această vârstă, să nu cadă copilul, nici să nu se lovească în cap, nici să nu-l apăsăm cu ceva, căci se poate să se rupă o fântănea şi să aibă urmări rele. Oasele craniului pe dinafară sunt acoperite cu o piele groasă cu păr, care trebuie îngrijit zilnic. Cutia craniană cuprinde *creerul*, a cărui formă se acomodează după forma acelei cutii, cu cât această formă este mai regulată, cu atât şi dezvoltarea creerului se face în condiţiuni mai bune. Sunt unele difor-maţiuni ale craniului care influenţează creerul şi pot aduce turburări în starea mintală a omului. Pielea capului poate fi atinsă şi aci ca şi în alte părţi de diferite boale: *abces*, *antrax* (serpengea), *furuncule* (furnicele), cari nu prezintă nimic deosebit, *erizipel* brân-că), fie în urma unei răniri, a unei lo-vituri fie prin întinderea unei brânci dela faţă (vezi *Erizipel*). Când se lo-veşte cineva la cap partea lovită se umflă, se formează ceea ce se numeşte *cucuiv*, care se vede mai des la frunte. *Rănirile* capului, mai ales la noi în ţară, se văd foarte des. Cele mai multe răniri ale capului sunt așa zisele *plăgi contuze*, apoi vin *plăgile prin instru-ment tăietor* (cuţit, topor, sapă, etc) şi în cele din urmă *plăgile prin armă de foc*, cari, deşi sunt mai rare, tre-buiesc îngrijite cu deosebită băgare de seamă. Țeasta capului, cât este ea de tare, se poate sparge printr'o cădere dintr'un loc înalt, sau o lovitură pu-ternică aplicată în vârful capului. Aceste *fracturi ale oaselor craniului* de multe ori sunt foarte grave, putând produce moartea bolnavului, din pri-cina vecinătăţii *creerului* şi a *menin-gelor*, cari se pot aprinde, dând me-

ningită. In toate aceste cazuri se va chiema grabnic doctorul, iar până la venirea lui vom culca rănitul cu cea mai mare băgare de seamă, ținân-du-i capul foarte ridicat pe perini, într'o cameră cu aer mult şi curat, punându-i la nas puţin eter, sau oţet, pentru ca să nu-şi piardă cunoştinţa şi ținându-l în nemişcare. Intru cât priveşte rănilile uşoare ale capului, în-ţepăturile pielii, cel mai bun lucru de făcut este să aplicăm pe partea rănită cârpe înmuiate în apă rece, des primenite, car micşorează durerile, îm-piedecă umflarea părţilor şi ivirea brâncii. Adeseori în rănirile capului mai ales în plăgile tăiate, curge sânge mult pe care-l vom opri cu cârpe în-muiate în apă rece, stoarse bine şi aplicate strâns asupra rănii, după ce mai întâiu am apropiat buzele rănii prin fâşiuţe de emplastru, lăsat mai multe zile pe loc.

Crastavete. — V. *Castravete*.

Creasta cocoşului. — V. *Ciuper-ci* (Barba caprei).

Creer, cerebrum (*cerebrum*, gr. *egke-phalos*). — Creerii omului se compun din două părţi, una cu mult mai mare, *creerul propriu zis*, sau *creerul cel mare*, aşezat înainte şi deasupra, şi altă parte cu mult mai mică, aşezată îna-poi şi de desupt numită *creerul cel mic*. Creerii sunt aşezaţi în *craniu*, sau




Fig. 137. — Creerul văzut pe dinafară

cavitatea craniană. Ei sunt înveliţi în nişte pieleţi, sau membrane subţiri, nu-mite *meninge*, cari sunt în număr de trei şi cari se numesc, începând de dinafară înăuntru: *dura-mater*, *arach-noida* şi *pia-mater*; aprinderea, sau inflamaţia acestor membrane, dă cum-plita boală cunoscută sub numele de *meningită*. Intre *pia-mater* şi *arach-noidă* se găseşte o apă limpede, ca

apa de stâncă, numită : *lichid cefalorachidian*, fiindcă el se întinde și la măduva spinării, care are aceleași învelitori ca și creerul. Pe suprafața creerului se văd niște ridicături șerpuitoare, ondulate, numite *circumvoluțiuni cerebrale*, despărțite între ele prin șanțuri cu cotituri, prin cari șerpuesc artere și vine. În aceste circumvoluțiuni, în locuri hotărâte, se găsește sediul mișcărilor membrelor, a memoriei, a cuvintelor vorbite, scrise, auzite, a memoriei vizuale. Substanța din care se compun aceste circumvoluțiuni este *cenușie*, pe câtă vreme cea de sub ele este *albă*. Ceea ce deosebește creerul omenesc de cel al dobitoacelor este mai cu seamă *greutatea lui*. În termin mijlociu creerul bărbatului ar cântări 1400 gr., iar al femeii 1250 gr. La oamenii mari, de geniu, creerul este de obicei mai greu; așa se pomeneste creerul lui Lord Byron cu 2380 gr., al lui Cromwell cu 2230 gr., al lui Cuvier cu 1829 gr., etc. Despre creerul marelui francez Gambetta se știe că nu trecea peste cifra mijlocie, dar se deosebea prin finețea elementelor sale nervoase, ceea ce arată că și structura trebuie ținută în seamă, ca și greutatea. Când greutatea creerului este mai mică cu mult decât cea mijlocie și dacă trece de o margine oarecare, atunci nenorocitul acela trebuie să fie tâmpit, idiot, sau imbecil. În creer șade inteligența, el este organul gândirii și al tuturor sentimentelor morale, la el vin toate senzațiile primite într'un punct oarecare al corpului, el dă poruncile după cari mâinile prind un lucru, picioarele încep a umbla, etc. — *Boalele creerului* sunt multe și foarte grave. *Răniurile creerului* fac ca fracturile craniului să fie grave. Aprinderea sau inflamația lui : *encefalita*, este tot așa de primejdioasă ca *meningita* (vezi acest cuvânt). Când structura creerului este stricată omul devine *nebun*, când creerul este prea mic omul este *idiot* (vezi *Idiotie*, *Nebunie*). Când sângele se urcă la creeri, în cantitate prea mare, avem *congestie*, sau *emoragie cerebrală*, iar dacă sângele merge la creeri, în cantitate prea mică, avem *anemie cerebrală* și *îmmoiare de creeri*. — *Paralizia generală* se ivește de obi-

ceiu dela 35 până la 45 ani, mai ales la bărbați. *Cauzele* : *sifilisul*. *Semnele*. *Perioada dela început* : slăbirea memoriei, schimbarea caracterului (trist, supărăcios, activitate foarte mare, perversiune morală), tremurătură în vorbă, neîndămânare în degete, inegalitate, pupilelor, vederea dublă (diplopie), slăbirea vederii și mirosului; câte odată accese ca de epilepsie. *Perioada de stare* : delir ambițios, delir de mărire, sau de persecuție, vorbirea greoaie, lucrarea cu mâinile cu anevoință. *Perioada terminală* : bolnavii cad într'un fel de toropeală, păstrând uneori oarecare conștiință de starea lor. Această boală durează 1 până la 6 ani, întrepruptă și câteodată grăbită prin atacuri de apoplexie.

Creeri (Mâncare de). — Multora le place să mănânce creeri fierți, sau prăjiți, de vacă, vițel, miel, purcel. Dar trebuie să știe că ei nu sunt așa de nutritori și sunt cam greu de mistuit, de aceea bolnavii și convalescenții precum și cei cu stomacul slab să nu prea mănânce creeri. Oamenii sănătoși pot să mănânce, dar nu prea mult nici prea des, ca să nu li-se facă rău.

Crema. — Cremele sunt produse cosmetice întrebuințate pentru îngrijirea tenului. Se împart în creme grase, indiferente și uscate. Se prepară din materii grase, substanțe colorante, parfumuri, apă și alte substanțe. Grăsimile cele mai obișnuite care intră în compoziția cremelor sunt : lanolina, untura de balenă, ceara de albine, untul de cacao, vaselina, parafina, glicerina și diferite uleiuri, de migdale, măsline, ricin, sesam. — Proporția în care se amestecă substanțele componente ale unei creme variază la infinit. Ca regulă generală cremele grase se folosesc pentru tenul uscat, cele uscate pentru tenul gras, iar cele indiferente pentru tenul normal. O cremă grasă foarte obișnuită este așa numita cold-cream. Cremele uscate se mai numesc și *creme de zi* cunoscute în comerț, sub numele de *vanishing cream* (cit.: vanishing crim). Tehnica de preparare a celor mai multe creme este destul de grea. Ca și pudra, crema poate fi folositoare sau dăunătoare, după cum se întrebuințează în mod

CREM

mai mult sau mai puțin rațional, potrivit cu calitatea pielei.

Cremațiune (*crematio*, ardere). — **Arderea morților**, care se pare a fi fost posterioară îngropării, dispăruse din obiceiul națiunilor civilizate, rămânând numai la unele popoare din Orient, la Indieni, dar de câțva timp a început a se introduce în unele țări din Europa. În războaiele din urmă s'au organizat crematorii ambulante, cari însoțeau armatele, pentru a să ardă toți morții rămași pe câmpurile de luptă, ceea ce, din punct de vedere sanitar, a fost un bine. Cea dintâiu autorizată de a arde cadavre a fost dată în 1873 de parlamentul Italiei; de acolo mișcarea s'a întins în Elveția și Germania. Arderea s'a făcut în mai multe locuri cu ajutorul unor aparate speciale, dintre cari cele mai cunoscute sunt cele din Milan și din Drezda. În Franța consiliul municipal al Parisului în 1874 a respins cremațiunea, sub cuvânt că ea ar fi în contra intereselor justiției, făcând să dispară unele feluri de otrăvuri, dar în 1883 camera deputaților a admis propunerea de a se da autorizație pentru arderea morților, după care s'a și instalat un aparat de cremațiune în cimitirul Père-Lachaise. Având în vedere multele avantaje pe cari le prezintă arderea morților credem că ea se va generaliza. Și în țara noastră s'a construit un crematoriu, în București.

Cremometru. — V. *Lapte*.

Creniță. — V. *Năsturel*.

Creolină, *cresyl*. — Lichid negru închis, cu reacțiune alcalină, care se scoate din gudron. Amestecată cu apă dă o emulsie albă, care se întrebuințează ca și apa fenicată.

Creozot. — Lichid uleios, incolor, cu miros tare, aducând aminte mirosul de păcură și de fum, cu gust foarte arzător, care se scoate prin distilațiune din gudronul (păcura) de lemn de fag. Se întrebuințează de mult timp de către dentiști, pentru a combate durerile de măsele fiindcă el arde pulpa dentară și o amortește. Se dă la începutul ofticeii și în bronchitele cronice, în doză de 1—2 gr. pe zi, amestecat cu vin, sau cu untură de pește (10—30 gr. la 1 litru), sau în capsule.

Creozotal (Carbonat de creozot). —

CRĂP

Lichid vâcos la rece, fluid la cald, neutru, de culoarea chihlibarului, fără miros, gust dulce și uleios. Luat pe dinăuntru nu turbură funcțiunile digestive, în intestine se descompune în creozot și acid carbonic, de unde rezultă o acțiune înceată și continuă. Se dă în tuberculoză (oftică) și în toate boalele de piept, în doză de 2—10 gr. pe zi, în vin, rachiu, sau untură de pește.

Crăpături, *plesnituri*, *crăpături*. —

De multe ori se întâmplă că pielea, pe vreme de frig mare și uscat, își pierde din moliciumea ei și se crapă, sau plesnește, în mai multe locuri. Aceste crăpături se ivesc mai mult iarna și numai pe părțile descoperite și supuse la atingerea aerului, cum sunt buzele, urechile, dosul mâinilor. Ele sunt uneori adânci, dureroase și câte odată sângerează. Pentru ca să se vindece să punem la adăpost de frig partea bolnavă, ungând-o cu alifie de trandafiri, cold-cream, glicerină, sau vaselină. **Crăpăturile sânelui**, la femeile cari alăptează, se pot vindeca cu *albuș de ou* și anume: se spală cu îngrijire sânul după fiecare sugere, apoi se ung crepăturile cu albuș de ou, care se lasă să se usuce. Când trebuie să sugă copilul se udă puțin sfârcul, iar după sugere se repetă același lucru și aceasta tot astfel până la vindecare. Se mai tratează cu praf de *ortoform*, adică se acopere cu el crepăturile și pe deasupra se pune o cârpă fină, de tifon și cu puțin bumbac, apoi gutapercă și pe urmă se leagă totul cu un tulpin sau fașă. Înainte de a da copilului să sugă se va ridica acest pansament, se va spăla sânul cu apă boricată caldută și se va șterge. După sugere, se va face o nouă spălătură, o nouă ștergere și un nou pansament întocmai ca mai sus. Prin acest pansament durerile sunt mai mici, apoi încetează și vindecarea se face repede. Se mai recomandă *ipermanganatul de potasă* în soluție (2—5 gr. la 1 litru apă), având aceeași grijă de a spăla sânul înainte de a da copilului să sugă și cu deosebire recomandăm următoarea unsoare: borat de sodiu 10 gr., glicerină 30 gr., cu care se unge sfârcul țâțelor când e crăpat și dureros.

Crepături la șezut. — V. *Fisuri*.

Crescătură. — V. *Tumoare*.

Creson. — V. *Năsturel*.

Creștere. — Creșterea este dezvoltarea progresivă a corpului omului. Această dezvoltare se face în înălțime, în lățime, și în grosime. Puterea de creștere variază după etate, după țară, după rasă și după condițiunile sociale. Dezvoltarea în lățime și grosime, în primii ani ai vieții, se face mai încet, apoi 15—20 ani se face mai cu putere și este completă pe la 40 ani la bărbat și pe la 50 ani la femeie. Creșterea în înălțime, din care rezultă *statura* (talie), mai mult sau mai puțin ridicată, se face foarte repede la începutul vieții, după care se face tot mai încet, până la 20—25 ani, când este completă. Când copilul se naște are o lungime cam de 45—50 cm. și în anul întâiu crește cu 20—30 cm., în anul al doilea numai cu 10—15 cm., în anul al treilea cu 7, în al patrulea cu 5 și apoi se continuă tot astfel până la vârsta pubertății, când statura ajunge cam până la 1 m. 65 cm., iar dela 16 până la 17 ani crește cu 4 cm., și în cei doi ani cari urmează numai cu 2 cm. și jumătate. În privința *greutății*, copilul la naștere cântărește cam 3—3½ kgr., câte odată chiar 5 kgr. Până la etatea de 11—12 ani băieții sunt mai mari și mai grei decât fetele, iar la această vârstă acestea cresc foarte repede și întrec băieții, atât în greutate, cât și în înălțime, în cei doi ani cari urmează, după care băieții o iau înainte și merg tot astfel până la sfârșit. Am spus că un copil cântărește la naștere în termen mijlociu 3.250 gr.; dacă el este sănătos și bine hrănit, adică laptele este bun, va cântări la sfârșitul lunei a 6—7.100 gr., iar la un an 8.800 gr. Se înțelege dela sine că nu toți copiii cresc așa iute. Creșterea se face cu atât mai iute și statura omului va fi cu atât mai înaltă, cu cât el se găsește în condițiuni igienice mai bune, adică hrană, îmbrăcăminte, locuință mai bună, cu cât oboselile și lipsurile încercate în copilărie și junetă vor fi mai mici. — Iată acum cari sunt *turburările* și *boalele creșterii*. Turburări din partea *inimii*: *palpitațiuni*, *junghiu* în dreptul inimii, *durere de cap*, cari se vor combate

prin hrană bună și prin odihnă la pat de mai multe zile. Dela 7—14 ani, șira spinării are o rezistență slabă, din care pricină trebuie ca copilul să nu poarte greutateți mari, nici să nu umble aplecat numai într-o parte, căci pot să rezulte diformități: spatele aplecat înainte, sau un umăr mai sus decât celălalt, etc., cari pot să rezulte și din atitudinile vicioase prelungite în școală și în timpul mersului. Diformitățile acestea se observă mai des la fete, căci ele fac mai puțin exercițiu și stau mai mult pe scaun. Multe boale de natură scrofuloasă: caria vertebrelor, coxalgia, tumorile albe, o-presc dezvoltarea corpului, dar mai cu seamă *rachitizmul* este cel mai primejdios, al cărui început se poate bănuia la un copil care dela o etate oarecare nu mai crește. Când creșterea este prea repede, când trece de 6—7 cm. pe an și aceasta în mai mulți ani dearândul, vom recomanda exerciții cari să înlesnească creșterea în *grosime*. Când creșterea este mai mică de 5 cm. atunci vom recomanda odihna relativă, mers potrivit fără oboseală. Rar se întâmplă ca copilul să crească așa de repede încât să aibă *friguri*, așa zise *de creștere* și în totdeauna este bine să fim cu mare băgare de seamă și să cercetăm dacă aceste friguri provin cu adevărat dintr-o creștere prea repede, sau sunt începutul unei boale generale grave, lucru asupra căruia de altfel numai doctorul ne poate lămuri.

Cresyl. — V. *Creolină*.

Cretă (Carbonat de calce). — V. *Calce*.

Cretinism. — Prin acest cuvânt se înțelege o oprire de dezvoltare a organismului, însoțită uneori de *gușă*. Tipul omului cretin este: corp mic, ghemuit și schimonosit, membre subțiri și neputincioase, încheieturi îngroșate, mâini și picioare scurte, butucănoase, cap mare, pocit, față lată, nas pleostit și turtit la rădăcină, nările largite, ochii depărtați între ei și îndreptați pieziș spre înăuntru, pleoapele îngroșate, urduroase și abia întredeschise, umerii obrajilor eșiți, gura largă, buzele groase, cărnoase și răsfrânte înafară, limba îngroșată eșind din gură, urechile pleostite, pielea feții galbenă pământoasă, fleșcăită și sbârcită. Fi-

zionomia cretinului este fără expresiune, înfățișarea îmbătrânită, gâtul scurt și gros, cu sau fără gușă, inteligența greoaie, leneșă, tâmpită, glasul se mărginește mai mult la țipete răgușite, toate simțurile mai mult sau mai puțin tâmpite. — *Cauzele* cretinismului sunt mai multe: ereditatea sau moștenirea, căsătoriile între rudeni, apa încărcată cu săruri de calciu și lipsită de iod și de brom, văile adânci, umede, închise, lipsite de aer și de lumină, casele scunde, umede și murdare, sărăcia și traiul rău.

Crețușcă, *barba caprei*, *caprișoale*, *pepeneaua*, *smântânică*, *taula* (*Spiraea ulmaria*, fam. Rozeelor). — Plantă erbacee care crește prin livezi umede, prin păduri și pe marginea pădurilor din regiunea muntoasă. În medicină se întrebuințează florile, cari lucrează ca tonic, diaforetic, diuretic, antitataral. Se dă sub formă de ceaiu (infuziune) din 10—30 la 1000. Esența de crețușcă conține aldeidă salicilică (acid salicilos).



Fig. 138.-Crețușcă

Criogenină. — Antitermic; nu este toxic. Doză: 20 ctgr. până la 1 gr. 20 ctgr., în buline de câte 20 ctgr.

Cristalin. — Lintea străvăzătoare a ochilor, care slujește a strânge razele luminoase pe retină (fundul ochiului). *Cataracta*, sau *perdeaua*, constă în opacificarea cristalinului, care se albește și împiedecă pătrunderea razelor luminoase prin el.

Criză (gr. *krisis*, judecată). — Schimbare în desfășurarea, sau evoluția unei boale însemnate prin modificări importante (sudoare multă, emoragie, urină încărcată). Se mai dă numele de criză și la unele accidente nervoase, cum ar fi: convulsii (spasmele), isteria, epilepsia, eclampsia.

Crizarobină. — Medicament care se extrage din rădăcina de revent, sau din praful de Goa. Se întrebuințează pe din afară în boalele de piele (eczemă, psoriază) și în contra trâنجilor, sub formă de alifie și de săpunase.

Crizofanie (Acid). — Se scoate din

praful de Goa. Este purgativ *energic*, din care pricină nu se întrebuințează iar pe din afară se dă în boalele de piele (psoriază, petele de sarcină, sau efelide) în soluții, alifii, colodiu.

Cromic (Acid). — Se întrebuințează amestecat cu apă în părți egale, pentru a arde negii și bătăturile, iar în soluție de 1 gr. la 10 gr. apă pentru cauterizarea gingiilor.

Cronică (dela grec. *chrónos*, timp). — Acest cuvânt înseamnă durată lungă a unei boale, boală lungă, boală învechită. Sunt boale cronice prin natura lor și boale *acute*, cari au devenit *generale* și *locale*, aceste din urmă pot să atârne de o stare generală, de o dis-crazie (scrofule), de o cachexie (scorbuto, sifilis). Pentru mai multe amănunte caută la: *Boale*.

Croton tiglium (fam. *Euforbiaceelor*). — Se întrebuințează sămânța, care se prezintă sub formă de grăunțe negre, mari cât sămburile de cireșe, din care se extrage *uleiul de croton*, un purgativ foarte drastic, din care pricină trebuie întrebuințat cu mare băgare de seamă. Se dă pe *dindăuntru* 1 până la 3 *picături* în pilule sau într-o poțiune. Uleiul de croton lucrează și ca antielmintic (contra viermilor intestinali). Pe *dinafară* se întrebuințează în fricțiuni, rar curat, mai întotdeauna amestecat cu uleiul de migdale dulci și în cantitate mică. Ne servim în cazurile în cari sunt indicate vezicătoarele, pentru a avea o acțiune mai repede, în inflamațiunile cronice ale laringelui și bronhiilor, în răgușeli învechite, când se face o fricțiune pe partea dinainte a gâtului și pieptului, având grija de a acoperi partea unsă cu bumbac, sau cârpă pentru ca aburii să nu irite pielea feței, nasul și ochii.

Crucea de Malta. — V. *Comprese*.

Crude (Alimente sau Mâncări) —

Orice lucru de mâncare ce n'a fost supus la acțiunea focului, sau care se mănâncă înainte de a fi ajuns la coacere, cum sunt fructele și legumele verzi, salata, ridichile, afară de câteva fructe dulci dela natură, cum sunt strugurii, caisele și zarzărele, toate sunt grele de mistuit, mai ales pentru stomacurile slabe. Chiar și stomacurile tari nu le pot mistui decât în câ-

time mică și mai rar. Alimentele crude fiind de felul lor fibroase, sunt atacate cu mare greutate de sucurile gastrice (ale stomacului), din care pricină cel care le mănâncă are răgăituri, acreli, arsuri și dureri de stomac.

Crup (scoțian *cróp*, însemnează *tusă răgușită*), *gușter*. — În angina difterică se formează în fundul gurii, pe amigdale, pe omușor, niște pelițe numite *false membrane*, cari se pot întinde până în gâtlee (laringe), pe care îl astupă, așa încât aerul nu mai poate pătrunde în plămâni și omul, ne mai putând respira, moare de *asfixie*. În acest caz avem *crup* sau *gușter*. Dar aceasta se petrece nu numai în cazurile de angină difterică, ci și în unele aprinderi (inflamații) simple ale gâtleeului, în *laringite* și mai cu seamă în *laringita striduloasă*, care, spre deosebire de crupul adevărat, adică de cel difteric, se numește *crup fals*. Semnele acestui crup se aseamănă cu ale celui adevărat, într-un cât privește greutatea la respirat. În crupul fals copilul este prins în timpul nopții de un fel de înecăciune, sau sufocație și de o tusă sgomotoasă caracteristică. Accesele acestui crup n'au de obicei nici o urmare rea; ele vin mai cu seamă noaptea și după ce accesul a trecut copilul doarme liniștit și dimineața este bine. Accesele se pot ivi de mai multe ori. *Crupul difteric* aproape mai în totdeauna este precedat de *angină difterică*, însă fiindcă aceasta adeseori are un început și un mers domol și ascuns, se întâmplă că pelițele sau falsele membrane din fundul gurii s'au dus până în laringe. Are trei semne de căpetenie: o *tuse deosebită*, o *turburare a glasului* și o *supărare mare la respirație*, care se face cu mare anevoință. Celelalte semne cum sunt: indispoziția, febra, greutatea la înghițit, umflarea gâtului se văd în orice fel de angină, fie simplă, fie difterică. *Tusa* crupului este uscată și vine prin chinte foarte dese, foarte apropiate. La început ea este răgușită, surdă, și se poate asemui cu lătratul unui câțeluș, iar mai târziu se închid și mai mult și se strânge cu totul, pe măsura în care chintele se depărtează, se răresc. *Glasul* sau *vocea* și *șipetul*, la copiii cari nu vorbesc încă, trec prin aceleași stări

ca și tusa: la început răgușite, apoi închise, stânse. Aceste semne nu le găsim decât în crupul adevărat, nici odată în crupul fals, despre care am vorbit mai sus și care trece repede, pe câtă vreme crupul difteric merge crescând, din rău în mai rău, până la moarte. Supărarea sau *greutatea la respirație* în crupul adevărat vine, la început, prin accese destul de depărtate, ținând câte 4—5 minute, provocate printr-o schimbare de poziție, o emoțiune, etc., sau izbucnind fără nici o pricină vădită. Apoi accesele se apropie, devin din ce în ce mai tari, mergând până la sufocație (înecăciune). Bolnavul, într-o stare de neliniște grozavă, se ridică repede, se apucă cu mâinile de orice lucru, strângând și rupând totul, se agață cu mâinile de gâtul mamei, sau a celor din jurul lor și îi strânge cu putere, sau caută să se agațe de orice îi cade în mână, pentru ca să-și ia un punct de sprijin, sau își duce repede mâinile spre gât, ca și cum ar căuta să smulgă, sau să rupă ceea ce-l înăbușe. În cele din urmă agonia începe și lupta sfârșeste fără alte accese de sufocație. *Tratament*. Când ne găsim în fața unui crup adevărat îndată trebuie să facem bolnavului o injecție sub piele cu *ser anti-difteric forte*, apoi să-i dăm un *vomitiv*, adică ceva ca să verse, *ipeca* de preferință, care se va repeta de 2—3 ori în aceeași zi, adică ori de câteori copilul se înecă tare și nu mai poate să răsuflă. Să-i punem mustare pe gât, să-i atingem fundul gurii cu lămâie, dacă vedem ceva pelițe albe, să-i dăm perclorur de fier, 6—12 picături, după etate, în apă îndulcită cu zahăr, din ceas în ceas. Să-i susținem puterile cu supă de carne de vacă, cu lapte și chiar cu vin, cu cafea neagră, etc. În fine vom face același tratament ca la angina difterică (v. *Difterie*). Dacă însă acest tratament nu ajunge atunci trebuie să se facă *tracheotomia*, adică să se deschidă gâtleeul în partea de jos și să se pună o țeavă de metal (o canulă tracheală) prin care bolnavul va respira până se va vindeca de crup, după care se scoate țeava și tăietura se vindecă în câteva zile. În loc de tracheotomie se mai poate recurge la *intubațiune*, care constă în a introduce

prin gură, până în laringe un tub mic de metal, care dă la o parte falsele membrane și prin el aerul pătrunde în plămâni. Tubul rămâne pe loc până se vindecă crupul, dar acest tub poate fi aruncat prin tuse. De aceea este greu să se facă intubațiunea la casa bolnavului, unde este de preferat să se facă tracheotomia, iar intubațiunea pentru spital unde este personal dressat și suficient.

Crup fals. — V. *Laringită stridu- loasă*.

Crustacee. — Răciile noastre și tot felul de raci de mare, în frunte cu homarul, sunt foarte hrănitori. Ouăle de raci de mare, mai ales, cuprind o mare câțime de azot. Au însă pentru unele persoane un mare cusur, că le provoacă blândă (urticarie) constipație sau diaree.

Cruste, coji. — Când o rană, o tăietură sau înțepătură, începe a se vindeca, a se cicatriza, sau când un coșuleț, care este plin cu un fel de apă, se usucă la aer, se formează pe piele un fel de coajă alb-gălbui, roșietică, sau neagră, acea coajă se numește *crustă*. Dacă acea crustă se rupe mai înainte ca ea să se fi uscat, se reproduce repede și aceasta se va repeta până atunci până când vom lăsa crusta să cadă singură. Prin urmare cel mai bun lucru este să nu ne atingem de ea. Când crustele produc mâncărime le vom acoperi cu praf (pudră) de orez, de scrobeală, de feculă de cartofi, la care putem să adăugăm și puțin camfor. Dacă crusta uscată întârzie să cadă, o putem înmuia cu puțină glicerină.

Cuasie (*Ouassia amara*, fam. simarubelor), *lemn amar de Surinam*. — Arbore care crește în Guiana. Lemnul său vine în bucățile mărunte. Ele sunt ușoare, albi sau gălbui, decorticate, fără miros, însă de o amărăciune cumplită, mai cu seamă rădăcina, care de altfel nu conține de loc tanin și prin urmare nu produce constipațiune, nici iritația tubului digestiv. Principiul activ se cheamă *cuasină* sau *quasină*, care este amorfă și cristalizată. Acțiunea cuasiei este aperitivă, stomachică, tonică generală (fără astringență și acreală), febrifugă. Cuasia este foarte bună în dispepsie, debilitate ge-

nerală, anemie, cloroză, vărsături repetate. Ea deschide pofta de mâncare, ațâță mistuirea și ajută la repararea puterilor. Cel mai bun mod de preparare este de a pune 5—10 gr. într-un litru de apă, pe timp de 24 ceasuri și a tăia vinul cu acest lichid, la mâncare, sau a bea 3—4 cești pe zi între mese, înainte de mâncare. Această macerațiune (plămădeală) este mai bună decât decoctul (fiertura), care se face din 5 gr. la 1000. Se mai dă cuasia sub formă de extract, 20—50 ctgr., praf 1—5 gr., tinctură 2—10 vin 30—100 gr.

Cuasină, quasină. — Principiul activ al *cuasiei*. Ea este de 2 feluri; amorfă și cristalizată. Aceasta este cu mult mai tare decât cea amorfă. Se prezintă sub formă de lamele rectangulare și este solubilă în 400 părți apă. *Cuasina cristalizată* mărește secrețiunea salivară, secrețiunea ficatului, a rinichilor, deșteaptă acțiunea fibrelor musculare ale tubului digestiv. *Cuasină amorfă* se dă în doză de 25 mgr. până la 20 ctgr. cea *cristalizată* 2 mgr. până la 2 ctgr. (la copii un mgr. pentru fiecare an de vârstă).

Cubitul. — Este unul din cele două oase ale antebrațului. Pentru *fracturi* caută la *Antebraț*.

Cucuiu. — Este o ridicătură, sau mai bine zis o umflătură, țuguată, de culoare roșie închisă sau neagră, provenită din pricină că prin lovitură s'a rupt o vinișoară de sub piele și sângele, care a curs din ea, s'a îngrămădit între os și piele pe care a ridicat-o. Acest sânge infiltrându-se apoi în piele îi dă culoarea de mai sus. Cucuiu nu este altceva decât o lovitură, o *contuziune* și trebuie tratat ca atare, adică: punând cârpe înmuiate în apă rece, în apă de plumb, în spirt de camfor amestecat pe jumătate cu apă. Aceste cârpe trebuiesc înmuiate cât de des, adică îndată ce se încălzesc. Este bine ca cârpele să fie ținute asupra cucuiului cu niște colțare sau feși, legate mai strâns, ca prin apăsare sângele adunat sub piele să se împrăstie mai degrabă.

Cucuruz. — V. *Porumb*.

Cucută, buciniș, duduie. — Sunt trei feluri de cucute, toate otrăvitoare: *cucuta mare*, *cucuta mică* și *cucuta în-*

veninată, sau *cucuta de apă*. *Cucuta* mare și cea mică cresc prin locuri necultivate pe lângă garduri și locuri dosnice, iar *cucuta înveninată* crește prin mlăștini, bălți și apă stătătoare. Frunzele de cucute seamănă cu cele de asmățui, baraboi și pătrunjel și se pot confunda făcându-se greșeli și punându-se în mâncare. — *Otrăvirea* cu *cucută* are următoarele semne: dureri mari la stomac și pânțece, vărsături, urdinare, amețeli, spasme, apoi toropeală, moleșală și somnolență. În



Fig. 139.—*Cucută* ipeca pentru ca să aibă vărsături. Apoi

i-se va se da ceaiu tare, în cantitate mare, cu rom, rachi, vin cald, amoniac, fricțiuni pe tot corpul, cărămizi sau sticle cu apă caldă în jurul corpului, etc. — În medicină se întrebuințează frunzele și fructele, a căror principiu activ este *cicutina* sau *conicina*, pe *dinafară*, sub formă de alifii, cataplasme și plastore la scrofuloși, sau pentru a calma durerile; pe *dinauntru*, sub formă de praf, 5 ctgr. până la 1 gr., extract 5—25 ctgr. tinctură 10—30 picături pe zi, contra spasmelor. — La *țară* se fac oblojeli de frunze pentru a potoli durerile la umflături. Sămânța prăjită cu se u se întinde pe o cârpă și se pune la gât, pentru gâlci. Cu zeamă de *cucută* fiartă, amestecată cu ulei, se spală rana la mușcătura de șarpe.

Cucută mică. — V. *Pătrunjel*.

Cucufică de bălți. — V. *Mărăraș*.

Cufureală. — V. *Diaree*.

Cuișoare. — Muguri floral, sau bobocii unui arbust în totdeauna verde, *Caryophyllus aromaticus* din fam. mirtaceelor. Ele sunt un condiment aromatic, care ajută mistuirea, mai ales la bătrâni și la cei limfatici. Pentru femei, copii și pentru oamenii nervoși cuișoarele nu sunt bune. În medicină

se întrebuințează pentru a masca gustul și mirosul medicamentelor și



Fig. 140.
Cuișoară

pentru a alunga gazele, când sunt prea multe, dându-se 20—30 ctgr. de praf cu zahăr și gumă. Se mai dă ca excitant, stomachic, tonic sub formă de: apă distilată: 30—60 gr., ulei volatil: 1—12 picături, ceaiu: 1—10 la 1000, praf: 50 ctgr. până la 2 gr., tinctură: 10 gr. Pe *dinafară* sunt bune pentru durere de dinți

și de măsele, punând un tampon mic de bumbac, înmuiat în esență de cuișoare. În bucătărie se pun 2—3 cuișoare în zeama de carne, pentru a-i da gust.

Culbec. — V. *Melc*.

Cumarină. — Principiu activ al plantei *Angraecum fragrans* din fam. Orchideelor, care lucrează ca excitant. Se întrebuințează frunzele sub formă de ceaiu (infuzie), 4 gr. la 250.

Cumis sau Kumis. — Lapte de iapă fermentat. Sunt două calități: *prosapăt*, sau slab, care conține 1 la 100, și mai *vechiu*, sau tare cu 2—3 la 100 alcool. Se recomandă ca și chefiru. în boalele de stomac și în cazurile de slăbire.

Cumpătare. — V. *Sobrietate*.

Cununie. — V. *Căsătorie*.

Cupru, aramă. — Metal foarte răspândit în natură, tare, sonor, care formează cu staniu un aliaj cunoscut sub numele de *bronz*, cu *zincul* formează *cioaia*, iar cu acidele formează diferite săruri, dintre cari mai principale sunt: 1. *Carbonatul de cupru*, care ia naștere când mâncările sunt, preparate și păstrate în vase de aramă de aceea este bine să nu se pregătească decât în vase *smălțuite*. — 2. *Sulfatul de cupru* (calaican albastru, piatră vântă), care se întrebuințează în agricultură la spălarea grâului, înainte de a-l semăna, în arte la prepararea vâpșelor și la fabricarea cernelii în medicină ca antispasmodic, astringent, caustic, febrifug, vomitiv (10 până la 30 ctgr., într'o poțiune compusă din 150 gr. apă și 25 gr. sirop de mentă, din care se va lua câte o lingură la fie-

care 10 minute). Pe *dinafară* se întrebuințează în diferite alifii sau pomezi, 5—10 ctgr. la 25 gr. vaselină, sau în colir. Se mai întrebuințează sub formă de condeiu (creion) în boalele de ochi (conjunctivita granuloasă). — *Otrăvirea cu sărurile de cupru* (acetat, carbonat, sulfat de cupru). Criminalii otrăvesc lumea cu oțet, în cari au pus bani de aramă. Se mai poate otrăvi omul mâncând struguri stropiți cu sulfat de cupru, din care cauză este bine să se spele cât se poate de bine, înainte de a se mânca. *Semnele*: un sfert de oră după ce am înghițit mâncarea otrăvită avem vărsături abondente, cari au gust metalic, de cocleală, sau de cerneală, uscăciune în gură, strângere de gât, apoi diaree. Vărsăturile sunt verzui, apoi gălbui și cenușii, iar dacă punem amoniac ele se colorează în albastru, ceea ce arată că este cupru în ele. *Tratament*: la început se va da să verse bolnavul (ipeca) și dacă se poate se va spăla stomacul, se va da apă cu albuș de ou (albuminoasă), apoi lapte și ouă cât de multe, zeamă de orz, cafea neagră. Injecții cu morfină, sau laudan, pe gură (30 picături), cataplasme de in pe pânțele.

Cură (lat. *cura*, îngrijire). — Intrebuințarea mijloacelor particulare proprii pentru a vindeca o boală, de exemplu: *cură de iod*, *cură de mercur* pentru sifilitici. Se mai zice *cură* și despre unele tratamente cari conzistă în întrebuințarea unor agenți străini de farmacie, de exemplu: *cură de aer*, *cură de struguri*, *cură de zăr*.

Cură cu apă rece. — V. *Idroterapie*.

Cură cu zăr. — V. *Lapte*.

Cură de sânge. — V. *Sânge*.

Cură de soare. — V. *Soare*.

Cură de struguri. — V. *Struguri*.

Curara. — Un fel de rășină provenită dintr'o plantă din fam. *Strichneelor*, cu care indigenii din America își otrăvesc săgețile. *Otravă foarte puternică*. În medicină se întrebuințează în contra epilepsiei, coreei, turbărei și tetanului, în injecțiuni subcutan te, soluție apoasă de 1/10, o jumătate până la un ctgr. odată. — *Otrăvirea cu curara* are ca semne: durere de cap, turburări în vedere, tremurături fibrilare în diferiți mușchi, paralizia picioarelor, salivăție, urinare multă, scă-

derea temperaturii centrale, paralizia mușchilor respiratorii, asfixie. *Tratament*: respirație artificială timp îndelungat, până la eliminarea otrăvii, stimulente multe: rachiu, vin cald, eter, carbonat, sau acetat de amoniac. Dacă otrava a intrat în corp, printr'o rană, se va lega membrul între rană și inimă și se va spăla rana cu antiseptice, după care se va desface încet legătura. — Curara este antidotul *strichninii*.

Curățenie. — V. *Purgativ*.

Curățitoare (Medicamente.) — Caută la *Depurative*.

Curbatură (*deșelare*). — Prin acest cuvânt se înțelege un fel de indispoziție, în care simțim o moleșală mare și oboseală generală a mușchilor. Ni se pare ca și cum am avea mâinile și picioarele sdrobite. Curbătura vine de cele mai multe ori în urma unei oboșeli prea mari, a unei munci prea îndelungate, a unui mers prea lung, a unei fugi, vâslitului, etc. În aceste cazuri curbătura vine de obicei singură, cu prea puțină căldură din cauza oboșelii. Când însă curbătura se ivește fără vreo pricină cunoscută și când merge crescând, atunci trebuie să ne gândim la o boală serioasă care este pe drum de a se ivi, cum ar fi o febră tifoidă, pojar, vărsat, etc. sau la o răceală mai mare cu toate urmările ei, cum ar fi: o durere de gât, o bronchită (tusă), o congestiune, etc.

Curcan. — Carnea de curcan este hrănitore și gustoasă și, deși cam tare, se mistue ușor. Mai ales curcanul tânăr, cam de trei luni, bine hrănit și gras, este delicios. Mai bun este curcanul fript.

Curechiu. — V. *Varză*.

Curenți de aer. — Multe boale vin din pricină că omul stă în *curent* și răcește. Intr'o odaie putem să deschidem două *ferestre deodată, fără să fie curent, dar ele trebuie să fie în aceeași parte, în același perete, căci dacă vor fi așezate una în fața celeilalte, adică în doi pereți opuși, atunci între acele două ferestre se stabilește îndată un curent de aer; tot așa și când două odăi vecine comunică între ele printr'o ușă și fiecare din ele are o fereastră deschisă. Curenții de aer sunt foarte buni pentru a primeni aerul

dintr'o casă, sunt însă periculoși când aerul, care vine din afară, este mai rece decât cel în care ședem. Curentul poate da naștere la boalele cele mai grave: pleurezie, congestiune sau îngrămădire de sânge la piept, bronchită (tusă), etc. La unii se poate ivi numai o durere de gât (angină catarală sau amigdalită), un guturaiu, o răgușeală (laringită), alții pot căpăta o durere de șale (lumbago), dureri reumatice sau nevralgice, sau durere de ochi, ori de urechi.

Curgere albă. — V. *Leucoree*.

Curgere de sânge. — V. *Emoragie*.

Curgere de sânge din nas. — V.

Epistaxă.

Curmale. — Fructele unui arbore frumos numit *curmal*, sau *jinic* (*Phoenix dactylifera*, fam. palmierilor), care crește și se cultivă în insulele Canarice, în oazele Saharei, în Asia. În Europa se cultivă în Italia, în sudul Franței, la noi prin casele oamenilor bogați, sau prin florării, ca plantă decorativă. Curmalele la noi se mănâncă uscate, ele sunt foarte hrănitoare și au gust vinos și dulce, foarte plăcut, dar sunt greu de mistuit, din care



Fig. 141.
Curmal

pricină nu trebuie să se mănânce multe de odată. Fac parte din cele patru fructe pectorale. Se întrebuințează în ceaiu (50 gr. la 1 litru apă).

Cursă (lat. *cursus*). — V. *Fugă*.

Curtea de Argeș. — Localitate de vilegiatură în județul Argeș. Situată într'o vale din cele mai pitorești, la o înălțime de 450 m. Stațiune de cale

ferată. Clima dulce, plăcută. La capul orașului, pe un frumos platou, se află minunata Mănăstire Curtea de Argeș, cu reședința episcopului. Pe drumul ce duce la mănăstire au început să se construiască vile și căsuțe confortabile. Imprejurimi frumoase pentru excursiuni prin munții Argeșului.

Cușmă. — V. *Căciulă*.

Cuso sau Kuso. — Astfel se chiamă florile femele ale unui arbore care crește în regiunea muntoasă a Abisiniei, la o înălțime de 2500 până la 3000 metri. Aceste flori, uscate la etuvă și pulverizate într'un mojar de fier, dau un praf roșietic, cu miros slab aromatic, dar care se desvoltă în atingere cu apă caldă, cu un gust astringent, apoi acru și amar. Acest praf este cel mai bun medicament pentru a vindeca pe om de *panglică* (tenia) și se dă în doză de 20 gr. la adult, într'un pahar de apă îndulcită cu zahăr și călduță, cu puțină zeamă de lămâie, sau de portocale. După 2—3 ceasuri se vor lua 30—40 gr. de unt de ricină, odihnă și dietă. Panglica este dată afară cu cap și corp. Pentru copii se vor da numai 5 gr. Dar fiindcă gustul acestui medicament este foarte rău, când se ia sub formă de praf, s'a inventat cuso *granulat*, bomboane făcute din cuso și zahăr. Rezina de cuso se dă în doză de 50 ctgr. până la 2 gr. Arborele, care ne dă cuso, se numește *brayera anthelminthica* și este din familia Rozaceelor.

Cvartă sau Ouartă (Febră). — Accese de friguri intermitente, cari vin la patru zile odată (vezi *Paludism*).

Cystită sau Cistită. — Inflamația vezicii (beșice) urinare. — V. *Beșică*.

D

Dacriocistită (gr. *dakry*, lacrimă și *kystis* sac). — Este aprinderea, sau inflamația sacului lacrimal. Dacriocistita începe printr'o umflătură dureroasă a sacului lacrimal, cu roșeață durere, febră, apoi colorațiunea violacee a pielii în dreptul sacului lacrimal, în sfârșit formațiune de puroiu cu fluctuație. Puroiul poate ieși afară, sau să se împrăștie în țesutul celular

din jur. Uneori puroiul se deschide în nări. Această boală se vindecă dacă se sondează canalul nazal de mai multe ori, pentru ca să se dea curgere liberă lacrimilor, iar după ce inflamația s'a pronunțat se vor aplica vată cu apă de plumb. Când s'a format puroiul se va deschide sacul pentru ca să se deșerte și se va introduce o sondă în canalul nazal pentru ca să se deschidă

drumul lacrimilor și pentru ca boala să nu se mai ivească din nou. Dacriocistita *cronică*, sau învechită, numită și *tumora lacrimală*, care urmează dacriocistitei *acute*, mai sus descrisă, sau care poate să se ivească dintr'odată în urma unei strâmtoări a canalului nazal, se arată sub forma unei umflături a sacului lacrimal. Dacă apăsăm pe acest sac, de jos în sus, se scurge prin punctele lacrimale un lichid gros, format din lacrimi și mușchi. Bolnavul poate singur să-și deșerte sacul lacrimal, iar dacă nu face aceasta, sacul se transformă într'o tumora, care poate fi închisă de toate părțile sub formă de chist (*mucocel*). Tumora lacrimală se tratează fie prin lărgirea, sau tăierea canalului lacrimal, fie prin crearea de căi lacrimale artificiale (găurirea osului unguis) sau, în fine, prin scoaterea sacului și astuparea punctelor lacrimale. Puroiul care se revarsă asupra ochiului poate da multe boli și chiar pierderea ochiului.

Dafin, dafnu, lurbăn (*Laurus nobilis*, fam. laurineelor). — Arbore mic și frumos, întotdeauna verde, cu fructe în forma de boabe ovoide, de mărimea măslinelor celor mici, de culoare neagră, cu gust acru și aromatic, originar din sudul Europei, se cultivă și pe la noi. Frunzele sale aromatice cunoscute de popor sub numele de *foi de dafin*, sau de *lurbăn*, se întrebuințează în bucătărie. Din partea cărnosă a fructelor se extrage un ulei esențial și o substanță grasă, întrebuințate în medicină ca tonice și stimulente. Cu foile și boabele de dafin se prepară o *alifie* sau pomadă care se întrebuințează la legarea rănilor, cari nu se vindecă.

Dalac. — V. *Pustulă malignă*.

Dalie. — V. *Gherghină*.

Daltonism, discromatopsie. — Este un defect al vederii, care constă în a nu putea să cunoaștem și să deosebim colorile. Se numește daltonism după numele unui învățat englez, Dalton, care a suferit de acest cusur și care l-a descris pentru întâia oară. Daltonismul este de 2 feluri: unii nu văd decât numai două colori, albastru și roșu, alții cari nu văd lămurit nici roșul viu, care li se pare verde murdar, nici galbenul, care li se pare verde

pronunțat și cari nu deosebesc albastrul de violet. Acest defect este din naștere și nu se poate îndrepta cu nimic. Cei ce sunt atinși de daltonism nu pot să îmbrățișeze nici o meserie în care au a face cu colori (pictura, tapițeria, croitoria, vopsitoria), nu pot fi slujbași la drumul de fier, la marină, unde sunt semnale roșii și verzi. Nu se cunoaște cauza daltonismului din naștere (*congenital*), dar atât se știe că el atinge mai mult sexul bărbătesc. Atrofia progresivă a nervilor optici produce și ea, la început, un fel de daltonism incurabil, care sfârșește prin orbire completă.

Dambla. — V. *Emiplegie și Paralizie*.

Dânsele. — V. *Emiplegie*.

Danț, joc. — Danțul este o îndeletnicire, ca și mersul. Tactul cu care se face danțul este un bun mijloc pentru corp de a lua pozițiuni plăcute, cari să preîntâmpine și să îndrepteze străbăturile staturii și să-l facă să stea drept. Astfel danțul este o gimnastică bună și lecțiile de danț sunt foarte priincioase pentru dezvoltarea fizică și, trebuie să facă parte din educațiunea tinerilor. Păcatul mare al danțului este abuzul care se face cu el din partea tinerilor, cari nu vreau să știe că danțul are și multe cusururi și poate da naștere la multe boale.

Danțul lui Saint-Cuy. — V. *Coree*.

Dartră crustoasă. — V. *Impetigo*.

Dat. — V. *Fapt*.

Daucus carota. — V. *Morcov*, iar *Daucus carota sylvestris*, caută la *Morcov sălbatic*.

Debilitante. — Sunt cazuri în care este trebuință să provocăm o scădere a energiei cu care funcționează unele organe, de exemplu când inima bate prea tare, sângele circulă cu prea mare putere, cum se întâmplă în *pletora*, când cineva este supus la apoplexie, în febră mare, în inflamațiunile acute. Agenții și medicamentele de cari ne servim în aceste cazuri se chiamă *debilitanți* și anume: lăsare de sânge (venesecție), lipitori, regim sau dietă, băuturi emoliente, băi calde prelungite, cataplasme și oblojeli calde, etc.

Debilitate, (lat. *debilitas*), *fără vlagă*,

slăbiciune. — Nu trebuie să confundăm acest cuvânt cu *slăbirea*, care ne arată pe un om lipsit de grăsime, pe un om slab. Prin debilitate se înțelege o lipsă, sau împuținare de putere, o scădere de energie mai mult sau mai puțin pronunțată, o slăbiciune momentană și întâmplătoare, care rezultă din oboseli, sau excese prelungite, dintr-o boală lungă și gravă (toți convalescenții sunt debili până se întrec). Mulți copii mici sunt debili, din pricină că n'au aer, nu fac exercițiu. Pentru a combate debilitatea se recomandă un regim bun și medicamente întăritoare.

Decoțiune, fierătură. — Pentru a prepara o decoțiune, sau un *decoct*, se fierbe o plantă în apă. Decoțiunea nu e bine să se facă la foc mare, ci la foc potrivit pentru ca fierberea să se facă mai încet. Vasul în care se fierbe este bine să aibă capac, pentru ca principiile volatile, sau aromatice să nu fie duse în aer de către aburii de apă. Dacă vasul e acoperit, aburii se condensează pe capac pentru a cădea din nou în vas. Cu toate acestea, o bună parte din aceste principii se pierd, din care cauză decoțiunea, sau *fierătură*, nu este așa de bună ca *infuziunea* sau *ceaiul*, nici ca *macerațiunea*, sau *plămădeala*. Decoțiunea se va întrebuița numai pentru acele plante cari au trebuință de a fierbe mult, pentru ca să scoatem principiile active din ele și anume: lemnele (cimșirul etc.), scoarțele (stejar, rodiu, etc.), rădăcinile (ferigă, pir, etc.), fecula unor fructe (curmale, gutui, smochine), unele frunze verzi (limba mielului, ci-coare, tălăhărea, măcriș).

Decolarea. sau *deslipirea retinii*. — V. *Ochiu*.

Decrepitudine (dela lat. *decrepitus*, căzut, slăbit). — V. *Bătrânețe* și *Degenereșcență*.

Decubit (lat. *decubitus*). — Înseamnă *a sta culcat*; decubit *dorsal*: a sta culcat pe *spate*, decubit *lateral*: culcat *pe o parte*, etc. În medicină când zicem *decubite*, de obicei, se înțeleg niște răni (*escare*), cari se produc în punctele corpului pe cari stăm mai mult culcați, așa că, prin apăsare continuă și prelungită părțile moi (pielea și carnea) se mortifică prin gangrenă, după

cum se întâmplă în febrele grave (febra tifoidă) și în boalele sistemului nervos, rămânând osul de desupt descoperit.

Dediței, adormițele, dedeței, dediță, vânturele (*Anemone pulsatilla*, fam. ranunculaceelor). — Plantă erbacee veninoasă, cu frunzele păroase, florile în formă de clopot, albastre-violacee, fructele păroase. Crește pe coline uscate, prin poieni și margini de păduri. În popor se întrebuițează la văpsit, iar babele fac din frunze un ceaiu cu care spală ochii când sunt roșii. Din planta întregă, cu flori cu tot, fac băi. În medicină se întrebuițează rădăcinile, frunzele și florile. Principiu activ: *anemonina* (acidul anemonic). Proprietăți: în contra boalelor de piele (antidartros). Se dă: alcoolatură 2—20 picături, apă distilată: 30—50 gr., extract alcoolice: 5—10 ctgr., extract apos: 5—30 ctgr., praf: 20—40 ctgr. — *Anemonina* se dă în catartul bronhic, la tusa măgărească și astmă: 2—5 ctgr. pe zi, în buline.

Defaianță. — V. *Lipotimie*.

Defardarea. — Îndepărtarea fardului de pe față. Trebuie făcută negreșit în fiecare seară, înainte de culcare. În acest scop se întrebuițează diferite creme grase. După defardare se spală fața cu apă caldă sau rece și săpun, mai mult sau mai puțin, după calitatea tenului.

Defecațiune. — Acțiunea care are de scop de a da afară materiile rămase după mistuire și cari nu s'au absorbit. Aceste materii numite *fecale*, se îngrămădesc în partea de jos a mătului gros, în *rect*, deasupra șezutului, de unde sunt date afară. Defecațiune însemnează eșire afară, mergere la scaun.

Degenereșcență. — Omul este supus la transformări în virtutea cărora organele lui se strică, se degradează, *degenerează*. Aceste transformări sunt *naturale* când ele rezultă din înaintarea vârstei și în acest caz avem *degenerescență senilă*, sau de *bătrânețe*, care atinge pe rând toate organele, mai cu seamă inima, creierul, ficatul, rinichii, beșica, ochii și care constă mai ales în înlocuirea unor elemente anatomice folositoare prin *grăsime* (*degenerescență grăsoasă*). Când această grăsime este prea multă, ea înăbușe elemen-

tele vecine și le împiedecă în slujba lor, așa că întreg organul ajunge cu timpul de nu mai poate funcționa de loc și atunci moartea se apropie, moarte prin bătrânețe. — Afară de acest fel de degenerescență mai este una care vine în urma unei boale cronice, foarte rar în urma unei boale acute, și aceasta se numește *degenerescență accidentală*, cum se întâmplă după mai multe atacuri de gută, sau de reumatism, când încheieturile nu mai sunt în starea lor de sănătate, așa că mișcările lor sunt greoaie și incomplete, fiindcă elementele din cari se compun sunt stricate, degenerate. O inimă bolnavă se încarcă de grăsimi, care face ca bătăile ei să fie mai slabe, fiindcă ea este degenerată. Tot astfel creierul atins de degenerescență își face slujba mai cu anevoință, ceea ce se vede prin diferitele turburări ale inteligenței. Același lucru se întâmplă și cu celelalte organe degenerate, cari toate sunt împiedecate în slujba lor. Pentru a întârzia *degenerescența senilă* trebuie încă din tinerețe să ducem o viață cât se poate de igienică, în privința hranei, locuinței, aerisirii, îmbrăcăminte, muncii, etc., să nu facem nici un abuz de băuturi alcoolice, nici de altă natură. Iar pentru a preveni tîmpina, sau micșora degenerescențele *accidentale*, singurul mijloc este de a căuta din vreme orice boală, ca să nu se învechească, să nu degenereze.

Degerătură. — V. Congelațiune.

Degetar, degetariță, degețel, țăța oaci (*Digitalis ambigua*, fam. scrofulariaceelor). — Plantă erbacee *veninoasă*, cu frunzele în formă de lance și cu florile mari galbene, în formă de clopoței, ce crește prin pădurile din regiunea câmpiilor până în regiunea de munte. Se întrebuințează frunzele sub formă de praf de tinctură, sau de ceaiu, (infuziune). Ea își datorește proprietățile unui principiu activ numit *digitalină*, care se poate întrebuința singură. Degetarul, sau digitala, încetinește și regulează bătăile inimii, mărește cantitatea urinii (face ud mult), micșorează fierbințeala, pentru aceasta se dă în boalele de inimă, la cei cu dropică (boală de apă) și în boalele cu căldură mare: pneumonia, febra tifoidă, etc. Praful, sau pulberea de foi

se dă în doză de 20—50 ctgr., într-o ceașcă de cafea, de luat în două rânduri în timpul zilei, cinci zile în șir, apoi odihnă. Tinctura de digitală: 5—30 picături pe zi; extractul: 5—20 ctgr.; siropul: 10—50 gr. Digitala este un medicament periculos și nu trebuie luată în doză mare, nici prea multe zile în șir, ca să nu se îngrămăpească în corp și să de a semne de otrăvire. — *Digitalina* este și mai primejdioasă. Se dă în granule de $\frac{1}{10}$ mgr. — *Otrăvirea* cu digitală are ca semne: durere la



Fig. 142.
Degetar

stomac și de-a lungul șirii spinării, vărsături, durere cumplită de cap, moleșeală generală, bătăile inimii încete, neregulate și cu intermitențe, sincopă. *Tratament*: vomitiv (ipeca, apomorfina), sau spălarea stomacului. Tanin (2 gr.) în apă caldă, sau ceai ori cafea tare și caldă. Stimulente: rachiul cald cu apă; săruri de amoniac, eter, injectate în rect dacă nu sunt suportate de stomac. Injecțiuni sub piele cu aconitină, sau 30 ctgr. de tinctură de aconit, prin gură sau șezut, repetat după o jumătate de ceas, dacă este ameliorare în bătăile inimii. Bolnavul va sta culcat și după ce au trecut semnele otrăvirii, câteva timp. — La țară babele, dau ceaiul de flori și de frunze de degetar contra nădufului și dropiceii cu durere de piept.

Deglutițiune (lat. *deglutire*, a înghiți), *înghițire*. — Pentru ca mâncarea, solidă sau lichidă, să meargă în stomac trebuie să fie înghițită. Înghițirea se face cu ajutorul mai multor organe, cari toate intră în joc pentru a împinge hrana dela buze până în stomac, și aceste organe sunt: dinții, limba, cerul gurii, migdalele, gâttelejul și esofagul. Dacă unul din aceste organe se inflamează, sau se strânge, el nu mai poate funcționa bine și înghițirea se face cu greutate și cu durere. Gâttelejul sau înghițitoarea comunică în sus, cu nasul, în jos cu laringele (organul vorbirii). Pe acolo trece aerul pentru a se duce în plămâni și tot pe acolo se duc mâncările și băuturile în stomac.

Această trecătoare are două supape: una în sus, *omușorul*, și alta în jos, *epiglota*, cari, în minutul înghițirii, închid pe deoparte nasul, iar pe de altă parte laringele (răsuflătoarea) așa că mâncarea se duce deadreptul în stomac. Dacă aceste două supape își împlinesc rău slujba, se poate întâmpla că unele bucățele, sau picături, să pătrundă pe sus în nas, de unde sunt date afară cu sgomot, sau să cadă în laringe (răsuflătoare), care este cuprins îndată de o tasă uneori dure-roasă, care ține până când dăm afară ceea ce am *înghițit rău*. Aceasta se întâmplă de obicei când bem prea repede, sau atunci când bând ne vine pofta de râs, sau când în minutul înghițirii ținem capul prea aplecat în jos. Dacă lucrul acesta se întâmplă adeseori, sau ori de câte ori încearcă să înghiță, solide sau lichide, lucrul este foarte grav. Atunci dacă examinăm gura, putem descoperi mai multe lucruri: sau că în cerul gurii se află un orificiu, pe unde mâncarea sau lichidele trec în nas, sau că limba este paralizată, sau că laringele este bolnav și foarte simțitor, ori că esofagul este prea strâmtat, sau osul fălcii rupt și în aceste cazuri trebuie să hrănim bolnavul în mod artificial.

Deletere (Gazuri) sau *gaze stricătoare*. — Sunt acele care turbură sănătatea, punând vieța în joc și putând produce chiar moartea, când le respirăm curate, sau când sunt amestecate în cantitate prea mare cu aerul, care pătrunde în plămânii noștri. Astfel de gaze stricătoare, sau vătămătoare sunt: acidul carbonic, gazul de iluminat, gazurile cari ies din canale și din latrine. Aceste gaze, intrând în plămâni, dau naștere la asfixie, care poate fi mortală dacă nu este tratată la timp.

Delir, *aiurare*, *buiguieală*. — Este o turburare a facultăților mintale. Un om este în delir, sau aiurează, când simțirile sale nu sunt în raport cu lucrurile din afară și este stăpânit de idei false, închipuite pe cari el le ia drept lucruri adevărate. Delirul nu este o boală propriu zisă, ci un semn care se vede fie la începutul, fie în cursul mai multor boale. Când vedem pe cineva aiurând, cel dintâiu gând

al nostru este ca nu cumva să fie nebun, căci *nebunia* este una din cauzele de căpetenie ale delirului și mai toate formele de nebunie sau *alienație mentală*, au ca semn principal un fel de aiurare. Dar nu trebuie să uităm că omul poate buigui și în alte împrejurări, fără ca să fie nebun. Aceste împrejurări sunt: 1. *Emoțiile morale*, vii sau prelungite, cari pot provoca delirul, excitând sistemul nervos (mânia, bucuria prea mare, un succes strălucit, o indignare adâncă), sau deprimându-l (o supărare neașteptată, o spaimă mare). — 2. Unele *boale de creeri* și ale meningelor, cum sunt: meningita, congestiunea și anemia creierului, lovitură asupra capului, răniri ale craniului, tumorile cerebrale, etc., cari aduc o turburare în slujba creierului. — 3. *Febrele grave*: scarlatina, vărsatul, pojarul, febra, tifoidă, frigurile palustre, apoi unele aprinderi sau inflamațiuni grave: pneumonia (aprinderea de plămâni), brânca, etc. — 4. Unele *otrăviri*, fie rezezi cum se întâmplă acele cu beladonă, opiu, etc. fie încete și cronice, cum sunt cele cu plumb, cu mercur, cu alcool (vezi *Delirium tremens*). În toate aceste împrejurări delirul este trecător; când însoțește o boală oarecare este în totdeauna precedat, sau însoțit, de febră. El începe în mod brusc și are o durată scurtă, trecătoare, apoi, bolnavul nu-și dă seamă de ceea ce spune sau face, vorbește fără să se audă măcar, sau bagă de seamă numai după ce a vorbit. Ideile lui sunt fără legătură, variind dintr'un minut în altul și după ce a încetat, el nu-și mai aduce aminte nici despre ceea ce a vorbit, nici despre ceea ce a făcut. În *nebunie* delirul nu se însoțește de febră, începe mai încet, are o durată mai lungă. Sunt mai multe feluri de delir: *delirul de mărire*, când bolnavul se crede bogat, prinț, frumos, sau plin de talente și exagerează tot ceea ce se raportează la ființa sa, *delirul de persecuție*, în care se crede urmărit din partea unuia, sau a mai multor indivizi, adeseori are în același timp halucinații (închipuiri sau vedenii), cari pot să-l îndemne la crime, pentru a se scăpa de cei ce-l persecută. Delirul boalelor este de obicei *liniștit*, bolnavul este absorbit în sine însuși

și pe jumătate adormit, murmură cu-vinte neînțelese, fără șir și aproape fără gesturi, în delirul *nebulniei* bolnavul trăiește cu toții cei din casă, însă aiurează într'una și nimic nu-l poate scoate din ideea lui fixă. *Delirul furios*, se arată prin mișcări și țipete violente, cari revin prin accese, se vede foarte rar în boale. De obicei acest delir furios caracterizează cel mai mare grad de nebunie. — *Tratament.* La copii, cari deși sunt foarte excitabili nu sunt supuși la nebunie, delirul poate să provină dintr'o insolație, sau dintr'o mistuire rea, sau poate fi începutul unei boale grave, cum este meningita, vărsatul, scarlatina, pojarul, etc. La *adolescent* delirul poate fi începutul febrei tifoide, sau a febrei eruptive. La *adult* cauza delirului poate să fie una din cele de mai sus, în frunte cu *nebulnia*. Se vor recomanda bolnavului distracții, călătorii, dacă delirul vine din vreo emoțiune morală, întăritoare dacă el vine dintr'o pierdere mare de sânge, sau dintr'o nemăncare prelungită, antidote potrivite dacă este vorba de otrăvire. Cel ce delirează să se culce singur într'o odaie mare și aerată, fără lumină prea vie, nici sgomot, să fie cea mai mare liniște în jurul lui, evitând tot ce poate să-l întărească. La cap se va pune o pungă de gheață, se vor face spălături reci pe tot corpul, sau se va înveli bolnavul câte 2—3 minute în cearșafuri reci, apoi muștare la picioare și pulpe, vezicătoare la ceafă, curățenii și clisme. Dintre medicamente se recomandă eter, apă de laur-cireș, în apă îndulcită cu zahăr, opiu sub formă de laudan, 10—15 picături odată. Când delirul este *furios*, bolnavul trebuie legat de pat cu cearșafuri trecute peste piept și peste genunchi, sau pus în cămașa de forță.

Delirium tremens, delir tremurător.

— Acest delir este caracterizat prin tremurătura membrilor cu aiurare și se vede numai la oamenii otrăviți cu băuturi alcoolice. *Semnele* lui sunt: omul este cuprins de o neliniște mare și continuă, are tremurături în mâni și picioare, îi tremură buzele și limba, fața ia înfățișare de mirare, de neliniște, sau de spaimă. El vorbește într'una cu o voce scurtă, întreruptă și

poruncitoare, are halucinații, Alții, fără să fie așa furioși, vorbesc cu persoane pe cari le cred a fi lângă ei; vorba lor este fără șir și nesfârșită. *Cauzele ocazionale*: excесе de băuturi, emoțiuni, nemăncare, boale febrile. *Tratament.* Bolnavul să nu mai bea nici o băutură alcoolică, să-i dăm să bea lapte mult, cât se poate de mult și limonade pentru ca să se elimine alcoolul din corpul lui, băi calde prelungite și repetate, să stea în cameră mare, bine aerată și în care să nu poată strica nimic.

Demență, tâmpeală. — Această stare se confundă cu *idioția* de care însă se deosebește prin aceea că demența vine cu timpul, în urma unei boale. Omul dement a fost cumințe în viața lui, ca toți oamenii, pe câtă vreme idiotul se naște tâmpit. Prin cuvântul demență se înțelege o slăbire a facultăților intelectuale și morale, care merge până la suprimarea lor. Cea care este rezultatul etății, a bătrâneței se numește demență *senilă*, cea produsă de emoragia cerebrală, sau de paralizia generală progresivă, demență *paralitică*, aceea care se vede în diferitele forme de *alienațiune mentală*. Mai este o demență care se produce câte odată, la copii prin degenerescență alcoolică sau nervoasă, demență *precoce*. La început boala se arată prin pierderea memoriei mai întâiu a faptelor recente. Bolnavul începe a fi neîndemânatic la lucru, neîndemânare care merge din ce în ce crescând, apoi din pricină că nu-și mai poate coordona ideile se repetă mereu la vorbă, devine supărăcios sau nepăsător. În perioada a doua inteligența lui se întoarce la aceea din primele luni ale vieții, vorbirea îi este neînțeleasă prin uitarea cuvintelor trebuincioase, viața îi este inconștientă, dar funcțiunile celorlalte organe se execută regulat, așa că bolnavul nu slăbește până mai târziu, când începe slăbirea mușchilor. În perioada a treia încep și celelalte organe a nu-și mai face slujba și atunci bolnavul se topește repede și moare. Demența este fără leac și ea poate dura mai mulți ani. *Tratamentul* se reduce la îngrijiri igienice, pentru care este mai bine ca bolnavul să fie internat într'un ospiciu special unde poate fi mai

bine și mai cu înlesnire îngrijit decât acasă.

Dentifrice. — Se numesc diferitele preparate cu cari ne spălăm gura, în deosebi dinții și măselele, cu scopul de a nimici acțiunea stricătoare pe care o pot avea mâncările asupra lor precum și lichidele băute, sau formate în gură. Aceste preparate trebuie pe lângă miros și gust plăcut, să intru-nească și următoarele însușiri: să curețe cu ușurință dinții și căptușeala (mucoasa) gurii, să fie antiseptice să fie dezodorizante (să ia mirosul greu al gurii), să nu fie otrăvitoare, să nu fie iritante și să nu strice dinții și măselele. Preparațiunile dentifrice sunt *solide* (prafuri de dinți), *lichide* (apă de gură) și *mai* (diferite paste). — Mulți își spală gura cu alcool mai slab, obiceiul bun căci spiritul topește structurile lipite de dinți și măsele, curățind bine și fiind un bun antiseptic, fără să strice și luând mirosul greu al gurii. El întărește și gingiile. O apă bună de gură și cu gust plăcut este aceasta: alcool curat 90 grame, chinol 10 gr., esență de mentă 30 picături, din care se vor pune 5 picături într-o jumătate pahar de apă; sau: alcool curat 320 gr., esență de bergamot 10 gr., esență de scorțișoară 1 gr., tinctură de benzoe 6 gr., din care se vor pune câteva picături într-o jumătate de pahar de apă. Trebuie să ne spălăm gura după fiecare mâncare pentru ca să nu rămâie bucățele printre dinți și măsele. Spălarea aceasta trebuie să se facă cu *peria*, care trebuie să fie cât se poate de mică, pentru ca să poată pătrunde prin tot locul. Părul periei trebuie să fie astfel aranjat ca să poată pătrunde bine printre dinți și măsele, el va fi mai aspru, pentru cei ce au smalțul tare și mai moale, pentru cei cu smalțul slab, dar nu trebuie să pierdem din vedere că o perie prea tare slăbește smalțul, iar una prea moale nu curăță în deajuns. Înainte de a întrebuința peria trebuie să ne curățăm dinții cu o scobitoare, iar cu peria vom freca dinții pe dinăuntru ca și pe dinafară și pe sus, purtând peria pînă la toate părțile. Spălarea gurii cu peria trebuie făcută de 2 ori pe zi, dimineața și seara, mai cu seamă seara, căci în timpul nopții se produc

în gura necurățată dospiri (fermentații), cari sunt foarte stricătoare pentru dinți. — *Prafurile de dinți* se fac de obicei cu *cretă* spălată, care de altfel se poate întrebuința și singură, ea are mai mult o acțiune mecanică. Tot așa este *piatra ponce*, care este însă prea aspră și poate să strice smalțul. Mai bun este praful de *magnezie*. Ca antiseptic se poate întrebuința acidul boric, chinolul și esența de mentă. Dăm aci 2 formule: *cretă* spălată 100 gr., carbonat de magnezie pulverizat 13 gr., clorat de potasă 50 gr., esență de mentă 30 picături; — sau: *cretă*, spălată 100 gr., chinol 20 ctgr., esență de mentă 30 picături. După ce se freacă dinții cu praf, ne clătim gura cu apă curată, sau cu apă dentifrice. *Pastele și săpunurile*, cari de altfel curăță frumos dinții, nu sunt tocmai bune, fiind prea active, prea aspre prin *piatra ponce* ce o au, sau prin alcalii ce se găsesc în săpunuri. Se mai întrebuințează pentru curățit dinții *ce-mușa de țigară*, care irită gingiile, și *cărbunele pulverizat* (ardem pe foc o bucată de pâine, apoi o pisăm fin și cu acest praf frecăm dinții).

Dentist. — Se cheamă medicul a cărui specialitate este să îngrijiască dinții bolnavi. Până acum profesau dentistica o mulțime de persoane; acum se cere să fii doctor în medicină, ca să fii dentist și să te fi specializat în această ramură a medicinei.

Dentițiune. — Eșirea dinților se numește *dentițiune* și ea se face în mod natural la două epoce diferite. În anul întâiu al vieții începe eșirea dinților *de lapte*, sau *vremelnici* (temporari), cari la vârsta de 7 ani cad, pentru a fi înlocuiți de dinții *definitivi*, sau *permanenți*. Descrierea dinților și a măselelor se poate găsi la articolul: *Dinți*. Vom începe cu *prima dentițiune*. Cei dintâi dinți încep a eși prin luna a șasea și eșirea lor continuă până la 2 ani și jumătate, când copilul are 12 dinți și 8 măsele. La unii copii dinții încep a eși târziu, la 8 luni, la un an și chiar la un an și jumătate, la alții se poate să iese mai de vreme, la 4 luni, la 3 luni; s'au văzut copii născându-se cu câțiva dinți. Iată acum care este ordinea și epoca eșirii dinților și măselelor din prima dentițiune:

DENT

1. Patru dinți tăietori mijlocii . 5 luni
2. Patru dinți tăietori laterali . 1 an
3. Patru cele dintâiu măsele mici 1 an $\frac{1}{2}$
4. Patru dinți cănești 2 ani
5. Patru cele de al doilea măsele mici 2 ani $\frac{1}{2}$

Să vedem acum cari sunt *accidentele primei dentițiuni*. La cei mai mulți copii dinții ies foarte ușor, pe neașteptate de seamă și fără nici o suferință, afară numai că copiii în acel timp, au boale mai multe, sunt mai băloși decât de obicei și își țin mereu mâna în gură, sugându-și degetele. Pentru a înlesni eșirea dinților este obiceiul ca să se dea copiilor inele de fildeș, sau de metal, destul de mari, ca să nu le poată înghiți, cu cari se joacă ținându-le mereu în gură și strângându-le între gingii, dar acestea mai mult în-



Fig. 143. — Ordinea apariției dinților copilului

tăresc gingiile și întârzie eșirea dinților. Mai bine este să li se dea lucruri mai moi, cum este un dop de plută, sau o rădăcină de nalbă mare; după ce au fost bine fierți, pentru a fi dezinfectate. Uneori copiii au la gingii mâncărime foarte mare, ceea ce îi silește să-și frece gingiile mereu cu degetele, au salivă în cantitate prea mare, gingiile și gura sunt roșii, umflate, sau acoperite de besicute albe (afte), au căldură (febră), neliște, tipă și n'au foame, alte ori sunt abătuți. În aceste cazuri se zice că au *friguri de dinți*, și tot ce putem face este să căutăm a le micșora durerile prin atingerea gingiilor cu mierică (mel rozat), cu borax (4 gr. la 30). Tăierea gingiilor nu se face decât numai în cazuri grave, când copilul suferă prea mult și este amenințat de alte complicații. Pentru liniște și somn li se poate da copiilor de 6—8 luni: 30 ctgr. de bromur de potasiu, într'o lin-

DENT

gură de lapte îndulcit cu zahăr, seara la culcare. La nevoie se poate îndoi doza, dar nu se va continua cu acest medicament mai mult de 4—5 zile. În cazuri de neliște mare se poate pune o clizmă cu: cloral hidrat: 25 ctgr. tinctură de mosc și tinctură de valeriană: câte 5 picături, apă 30 gr. — Afară de acestea, în prima dentițiune, se mai pot ivi și alte *complicațiuni*: *diaree* (urinare), *tusă* (bronchită), diferite *erupțiuni* pe piele cum este *eczema* (bube dulci), cari se vindecă foarte greu, fără însă a lăsa vreo urmă, vreo pată. Aceste complicațiuni nu trebuie să înspăimânte prea mult pe mame, precum nici nu trebuie să le lase cu totul nepăsătoare. Copilul are trebuință de o îngrijire deosebită, i se va da să sugă regulat, la ore hotărâte, sau, dacă a fost întârziat și i s'au dat alte mâncări, este bine să revenim la lapte și, până trec complicațiile, să-i dăm numai lapte, însă în câtime potrivită, nu prea mult odată. Să i-se facă băi calde în fiecare zi. Apoi



Fig. 144. — Desvoltarea dentiției a doua (o secțiune în maxilare)

fiecare complicație, diareea, tusa, eczema, etc. se va trata în mod special, căci nu e bine să se lase netratate sub cuvânt că ele provin din dentițiune. *Convulsiunile*, sau spasmele cari vin foarte rar în cursul dentiției și nu se ivesc decât atunci când s'au ivit și alte complicațiuni (diaree sau constipație), trebuiesc tratate cu deosebită îngrijire. *Dentițiunea a doua* începe la 7 ani și se compune din 20 dinți și măsele de înlocuit și 12 măsele noua, cari ies în locuri neocupate până a-

tunci, în total 32. Iată ordinea și epoca ivirii lor :

1. Patru cele dintâu măsele mari (din nou) . . .	7 ani
2. Patru dinți tăietori mijlocii	7 ani
3. Patru dinți tăietori lăturalnici	9 ani
4. Patru cele dintâu măsele mici	10 ani
5. Patru cele de al doilea măsele mici	11 ani
6. Patru dinți cănești	12 ani
7. Patru cele de al doilea măsele mari (din nou) . . .	13 ani
8. Patru măsele de minte (din nou)	20—30 ani

În această dentițiune *accidentele* sunt mai rare. Se poate ivi o inflamație de gingii (gingivită), mai ales când ies din nou primele măsele mari. Se vede uneori puțină fierbințeală (febră), o oboseală, oarecari erupții pe piele, dar toate n'au mare importanță și trec dela sine. Întru cât privește îngrijirile ce trebuiesc date în momentul căderii dinților de lapte să se vadă la *Dinți*. În fine, adeseori se întâmplă că falca este prea mică pentru a cuprinde toți dinții și măselele și atunci se încăleacă unii asupra altora, ceea ce nu se poate opri decât prin scoaterea unuia, sau mai multora din ei, pentru ca ceilalți să se poată desvolta în linie. Măselele de minte, mai ales cele de jos, la unii ies foarte greu, cu durere și inflamație de gingii, putând produce abcese. Cel mai bun lucru este de a ne adresa la un dentist. — S'au văzut, în cazuri foarte rari, *dinți eșind pentru a treia oară*, la persoane foarte bătrâne, ceea ce s'ar putea numi *dentițiunea a treia*, asupra căreia credem de prisos a mai stăruî.

Dentură. — V. *Dinți artificiali*.

Deochiu. — La țară adeseori auzim vorbindu-se de această indispoziție sau boală, care în cărțile de medicină nu este descrisă. Mai ales copiii sunt foarte mult supuși la *deochiu*, boală care în cele mai multe cazuri vine și trece repede. Caiuza acestei boale, după credința poporului, ar fi privirea pătrunzătoare a unei persoane asupra pătimășului, iar această privire pătrunzătoare ar fi provocată de frumusețea celui *deochiat*, cu toate că sunt și mulți urți cari se *deoache*. Fiindcă această suferință este crezută ca efect al privirii ochilor, ea s'a numit *deochiu*, adică *din ochiu*, sau boală *provocată de ochi*. Prin *deochiu* poporul înțelege o durere de cap, însoțită uneori de o căldură ușoară și de aprinderea feții. Unii au și greață, căscătură, amețală,

etc., mai ales acei ce sunt mai nervoși. Această stare poate să provină dintr'o răceală produsă de cătră un curent de aer, dintr'o constipație, dintr'o indigestie. În toate aceste cazuri deochiul trece repede printr'o curățenie ușoară, odihnă și trăsături cu oțet de trandafiri pe frunte, ceafă și pe celelalte părți ale corpului, sau în lipsă de oțet de trandafiri cu oțet ordinar, sau cu spirit, cu rom cu sare și piper, alteori cu un muștar la ceafă, sau muștare la pulpe. Pentru ca un copil să nu se deoachie, ca măsură preventivă, i se face un *benchiu* sau *sbenghiu*, care este o pată neagră făcută pe fruntea copiilor frumoși, cu tină (noroiu), cenușe, tăciune, sau cu piatra iadului. În cap i se face, din păr, un moț legat cu panglică sau cordea roșie. Benchiul și cordeaua roșie se zice că aduc aminte privitorilor puțința de a deochia și prin această simplă aducere aminte deochiul nu se mai face.

Depurative (lat. *depurare*, a curăți)

— În stare de sănătate sângele nostru se curăță de toate produsele stricăticioase formate în corpul nostru, sau introduse de afară, prin sudoare, urină și scaune. Dacă se întâmplă ca pielea, rinichii și mațele să funcționeze rău, toate acele produse stricăticioase, numite *ptomaine* și *toxine*, rămân în corpul nostru și strică sângele. Pentru curățirea sângelui se dau medicamentele *depurative* sau *curățitoare*, cari alungă din corp toate aceste principii vătămătoare sănătății, cele care le alungă prin piele se numesc *diaforetice* sau *sudorifice*, prin *rinichi diuretice*, prin *mațe purgative*. Atât unele cât și celelalte sunt folositoare și de multe ori este bine să le asociem, dându-le de o dată, sau pe rând. Dacă ele nu sunt de ajuns, doctorul va recurge la alte medicamente mai tari: alcaline, arsenic, iod, mercur, sulf, etc., după trebuință.

Deranjare de pânțe, de stomac. — V. *Diaree*.

Deratizare. — Sub această denumire se înțeleg toate măsurile, ce se iau, pentru stărpirea șobolanilor (guzganilor). Această operațiune se numește astfel, pentru că „*rai*” înseamnă „șobolan”, în limba franceză. Atari măsuri trebuiesc aplicate mai cu seamă

în timp de epidemie de ciumă, din cauză că această grozavă boală se întinde prin șobolani și prin purecii de pe ei, în cari trăește microbul ciumei. Dar nu numai în timp de epidemie trebuiesc stârpiți șobolanii, ci și ori-când, fiindcă aceste animale rozătoare distrug substanțele alimentare, stoffe, haine, materii grase industriale ș. a., făcând zilnic pagube foarte mari. Contra șoarecilor mici (de casă ori de câmp ș. a.) se întrebuințează cu folos deplin niște microbi, (bacili tifusului șoarecilor), cu cari se face în laboratoare un fel de lichid, ce se toarnă pe fărmituri de pâine, mămăligă și alte alimente, pe cari mâncându-le șoarecii, se îmbolnăvesc și mor. Contra șobolanilor însă nu avem așa ceva, deși s'au încercat, pentru distrugerea lor, astfel de culturi microbiene. Lupta contra șobolanilor este mai cu seamă foarte grea, atunci când vom să-i distrugem în *locuri deschise*, iar nu în *spații închise*. Această distrugere este cât se poate de grea, din cauza lipsei de mijloace sigure, în care ne găsim până în prezent, precum și din pricină că șobolanii sunt foarte deștepti, simt imediat unde este pericolul și fug. Cea mai bună măsură este, în primul rând, de a-i împiedeca să se înmulțească. Pentru aceasta vom căuta să ferim, prin grilaje metalice, sau prin alte mijloace, orice alimente sau resturi alimentare, de a fi mâncate de guz-gani. Totodată, vom întrebuința, contra lor și alte mijloace cum sunt: astuparea găurilor lor, cursele (capcanele), pisici ori câini, otrăvuri chimice, ș. a. *Otrăvurile chimice* utilizate sunt preparațiuni cu bază de: *arsenic*, *fosfor*, *scila* ori *strychnină*, după cum vom arăta în formulele ce urmează. Ținem însă, să atragem atențiunea că reușita atârână, în prima linie, de grija cu care se face prepararea (mâncarea) cu otravă, de oarece șobolanii sunt totdeauna și lacomi la mâncare și bănuitori; în foarte scurt timp ei ajung să cunoască, cu ajutorul mirosului sau prin modul de preparație, substanțele ce pot să-i îmbolnăvească ori să-i ucidă. Din această cauză trebuie să se varieze foarte adesea natura preparatelor distrugătoare de șobolani. Este bine, de asemenea, ca, în ajunul întrebuințării

unui preparat omoritor, să obișnuim șobolanii, ca să dea peste un produs nencigător, dar având gust și înfățișare asemănătoare cu ale preparatului conținător de otravă, pe care îl vom pune a doua zi. *Cele mai bune formule de otrăvuri chimice sunt*: 1. seu topit 1000 gr., făină de grâu 1000 gr., acid arsenios praf 100 gr. Negru de fum 10 gr., oleu volatil de anis 1 gr., sau 2, fosfor 1 gr., apă 20 gr., făină 20 gr. oleu de ceapă 10 gr., zahăr pulverizat 14 gr. Această pastă trebuie întinsă în pături fine pe felii de pâine subțiri, izolate sau puse una peste alta. În camere, magazii, grajduri etc., foarte bine închise, ca și în *calele* vapoarelor, distrugerea șobolanilor se poate face mult mai lesne decât în locuri deschise. În camere se poate întrebuința *sulfurizarea*. Pentru deratizarea *calelor* (camerile cele mai de jos ale vapoarelor) cel mai bun mijloc este aparatul „Clyaton-Notyale”. Foarte multe vapoare au astfel de aparate pe bord și se servesc de ele, atât pentru deratizare cât și pentru deparazitare (pureci, păduchi, ploșnițe). Porturile maritime posedă, deasemenea, aparate, instalate pe șalupe, cu cari deratizează vasele, ce sosesc din localități contaminate de pestă (ciumă) și cari vapoare sunt infectate ori suspecte de această boală. În porturile Constanța și Sulina, dela Marea Neagră, avem și noi astfel de aparate. E bine ca toate vapoarele, fără a fi infectate, ori suspecte de pestă, să fie deratizate cel puțin odată la șase luni. Șobolanii omoriți prin sulfurizarea vapoarelor nu vor fi aruncați în apă, ci vor fi arși în cuptoarele cazanelor vapoarelor, mai cu seamă atunci când vreun vas (vapor) este infectat, ori măcar suspect de pestă. (După Med. General Dr. A. Papiu și medic Colonel V. Pănaiteșcu).

Derivative (lat. *derivare*, a abate).—Sunt medicamente cari fac o *derivație*, adică abat sângele, sau altă umoare din calea sa naturală, îl trag fie înspre afară, fie spre un organ vecin, sau depărtat de acela în care lichidul năzuiește a se aduna și unde ar putea pricinui oarecari accidente. Pentru a înțelege mai bine lucrarea medicamentelor *derivative* sau *revulsive* vom da

câteva exemple: la un om cu durere mare de cap, cu congestiune cerebrală, cu apoplexie, sângele s'a îngrămădit la cap, iar pentru a-l trage în jos spre mațe îi vom da curățenii, spre picioare îi vom pune muștare. În acest caz curățeniile și muștarele sunt derivative. Un altul are congestiune în piept adecă o îngrămădire de sânge în plămâni, la acesta vom căuta să tragem sângele în afară prin lipitori, ventuze sau luare de sânge. Toate acestea sunt derivative. Altul are reumatism la o încheietură, care este umflată, la care îi punem o vezicătoare ca să scoatem afară o parte din apa sângelui; vezicătoarea e un derivativ. Apoi punctele de foc, purgativele, sudorificele, diureticele sunt tot atâtea derivative. Despre fiecare vom vorbi la locul său.

Dermă. — Partea dinăuntru a *pielei*. — V. (*Piele*).

Dermatol (Galat bazic de bismut). — Pulbere de culoare galbenă ca pucioasa, fără miros, nu se topește în apă, alcool, eter, preconizată ca succedaneu al iodoformului, iodolului, aristolului. Se dă în aceleași doze și în aceleași cazuri. Pe *dinăuntru* se dă 2—6 gr. pe zi. Dă rezultate bune în diarea tifică, oftică, enterită, enterocolită (a-prindere de mațe).

Dermatologie. — Este partea din medicină care se ocupă numai cu studiul bolilor de piele.

Dermatoză. — Sinonim cu *boală de piele*.

Dermoid (Chist). — O tumoră sau umflătură formată dintr'o pungă plină cu părți cari constituie pielea: păr, dinți, unghii. Acești chiști sunt de obicei formați din invaginațiunea unei îndoituri de piele în cursul dezvoltării fetului. Ei se formează la coada sprâncenelor, la gât și în alte părți și nu se vindecă decât prin operație, scoțându-se.

Descamațiune (dela lat. *desquamare* a curății de solzii). — Căderea părții superficiale a epidermului. Această *scămoșare* se face în stare de sănătate în mod continuu și pe nevăzute din cauza micimei solzilor, dar ea se vede bine în pojar, scarlatină, precum și în unele boale de piele: ichtioză, pitiriază, psoriază etc. Febrele eruptive,

(pojar, scarlatină, etc.) se întind prin această scămoșare, de oarece solzii epidermului sunt îmbâcsiți de microbi.

Deșelare. — V. *Curbătură*.

Desgust, scârbă. — Aversiune pentru mâncare. Nu trebuie să se confunde desgustul cu inapetența, care nu este altceva decât pierderea poștei de mâncare (v. și *Apetit*).

Dextrină, cîriș. — Se prepară din feculă de cartofi: 200 gr., apă distilată: 1000 gr., acid oxalic: 5 gr., puse într'un vas de porțelan și amestecate, pe baie de apă, până ce masa devine consistentă, apoi se diluiază cu o soluțiune de apă fierbinte, 500 gr., carbonat de calce 6 gr. Se lasă o zi, apoi se filtrează. Filtratul se evaporază până se îngroașă de se lipește de degete, apoi se usucă la 30° și se transformă în praf. Dextrina este solubilă în apă și alcool diluat. Subțiată cu apă în cantitate suficientă se întrebuițează la facerea aparatelor inamovibile (pentru fracturi).

Dezinfectante. — Dacă ne-am lua după înțelesul adevărat al cuvântului prin *dezinfectante* s'ar înțelege acele substanțe cari fac să dispară mirosul neplăcut, sau cel puțin să-l ascundă. În medicină *dezinfectantele* sunt tot una cu *antisepticele*, omoritoare de microbi, și mai cu seamă a microbilor cari sunt răspândiți pe obiectele și în lucrurile cari au fost în atingere cu un bolnav ce a suferit de o boală contagioasă. Astfel un dezinfectant poate să nu aibă nici un miros, cum este sublimatul coroziv. Cel mai bun dezinfectant este *soarele*. Cele mai de căpetenie dezinfectante chimice sunt: alcoolul, acidul fenic, acidul sulfuros, formolul, ozonul, sublimatul coroziv, clorurul de calciu, săpunul, sulfatul de fier, clorul, cărbunele, iodoformul, ortoformul, protargolul, timolul, sulfatul și clorurul de zinc, xeroformul, benzonaftolul. (v. și *Antiseptice*). Pentru modul cum se întrebuițează dezinfectantele caută la: *Contagioase* (Boale) și *Dezinfecțiune*.

Dezinfecțiune. — Dezinfectarea constă în a nimici agenții, sau microbi patogeni (producători de boale) și a împiedeca astfel întinderea boalelor *contagioase*. Dezinfecțiunea poate fi făcută prin mijloace chimice sau prin

agenți fizici. — *Dezinjecțiunea chimică.* Sunt foarte multe produse chimice bune pentru a nimici microbii, dar în practică nu se pot întrebuința decât numai acele care lucrează repede fără să strice lucrurile, sau obiectele pe cari le dezinfectează. În multe cazuri dezinfectantele nu pot lucra bine și sigur decât numai dacă dezinjecțiunea a fost precedată de o curățenie îngrijită. *Sublimatul coroziv* este unul din cele mai puternice dezinfectante, căci el moară microbii în scurtă vreme și în soluție destul de slabă (1 gr. la 1000), chiar și microbii cari fac spori rezistenți. Sublimatul fiind foarte otrăvitor nu trebuie întrebuințat decât după porunca doctorului. Soluțiunile de sodă de 1 sau 2 la 100, încălzite cel puțin la 50° , dezinfectează foarte bine obiectele întrebuințate zilnic, uneltele cari servesc la mâncare și băut. *Acidul fenic curat*, în soluție apoasă de 2—5 la 100 este un dezinfectant puternic. Intrebuințarea soluțiilor mai concentrate este primejdioasă, căci ele ard pielea. Soluțiunile prea slabe n'au nici o putere. *Acidul fenic brut* nu se topește în apă decât foarte puțin și prin urmare nu poate servi la dezinfectare. Cresolii pe care îi cuprinde au o mare importanță, deși ei se topesc foarte greu, dar îi putem face solubili dacă îi tratăm cu acid sulfuric, sau dacă îi emulsionăm într'o soluție de săpun. *Cloralul* în soluție este foarte activ și foarte bun în practică, pentru a dezinfecta scaunele bolnavilor (febra tifoidă), dar soluția trebuie să fie proaspătă, făcută atunci când se întrebuințează și să fie păstrată într'o sticlă bine astupată; se pune cam un gram pentru 100 gr. de materii fecale. *Calcea vie* (varul nestins), sau laptele de var și apa de var dezinfectează foarte bine scaunele și prețul lor este mic. Pentru a prepara laptele de var se ia un litru de var gras, zdrobit și se pune în 9 litri 75 de apă. Varul absoarbe apa, se desface și cade la fund sub formă de praf, apoi mai punem 3 litri 25 de apă și amestecăm bine cu un băț. Dacă nu întrebuințăm laptele de var atunci când îl preparăm, trebuie să-l păstrăm într'un vas bine astupat, pe care înainte de a ne servi trebuie să-l batem, să-l

clătinăm. *Săpunul de potasă* topit în apă caldă se întrebuințează foarte cald și lucrează bine. *Săpunul de acid fenic* este și mai activ și se prepară luând 20 părți din soluțiunea caldă de săpun de potasă și adăogându-i 1 parte de acid fenic, agitând în continuu. Această soluție se poate păstra mult timp și este minunată pentru dezinfectarea podelelor. *Dezinjecțiunea prin agenți fizici.* Ne vom ocupa numai de lumină și de căldură. Căldura se întrebuințează sub formă uscată, sau sub formă de aburi, sau vapori de apă. Lumina directă a soarelui, insolația, omoară în foarte puțin timp microbii și chiar sporii; lumina difuză omoară microbii cari nu fac spori. Când nu se




Fig. 145. — Autoclav

poate să facem dezinjecțiune completă, vom lăsa lumina să lucreze un timp oarecare, pentru ca ea să poată să desăvârșească dezinjecțiunea. Vaporii de apă lucrează și mai repede și mai sigur. Se întrebuințează vaporii la 100° și vaporii sub presiune peste 100° în aparatul numit *autoclav*. Vaporii la 100° sunt cel mai puternic dezinfectant dintre toate. Sporii cei mai rezistenți, cari pot trăi mai multe ceasuri în soluțiuni tari de sublimat coroziv, sau de acid fenic, sunt omorâți în câteva minute în vaporii de apă sub presiune, la 100° . Sporii dalacului (a pustulei maligne) mor în 5—10 minute. Apoi cu vaporii de apă putem

dezinfecă toate obiectele, toate lucrurile, : mobile (dacă nu sunt lipite) pa-turi, rufărie, vestminte, cărți, fără să se strice; obiectele de piele nu pot suporta acțiunea acestor vapori, căci se încrețesc, se stăresc. — *Dezinsecțiunea locuințelor.* Dezinsecțiunea locuințelor și a mobilierului nu trebuie lăsată la voia fiecăruia. S'au făcut legi și regulamente de poliție, cari să hotărăscă boalele pentru cari dezinsecțiunea să fie obligatoare. Pentru familiile sărace dezinsecțiunea trebuie făcută de către comună, în mod gratuit. Trebuie un personal îndemănat pentru a face această dezinsecțiune, care să știe să umble cu aparatele. Numai astfel se poate face o dezinsecție eficientă și fără să producă vreo pagubă. — *Dezinsecțiunea vestmintelor, a așternutului și a rufăriei.* Vestmintele, așternutul, stofele, nu pot fi în mod serios dezinsecțate decât nu-




Fig. 146.—Etuvă purtată de cai

mai prin ajutorul etuvei cu vapori, în-trebuințată în mod potrivit. Aceste obiecte nu trebuie îndoite, nici legate, nici strânse, ci lăstate liber, luându-se toate precauțiunile ca ele să nu se păteze de rugină care provine din părțile de metal ale etuvei. Indată ce de-zinsecțiarea s'a terminat, obiectele tre-buiesc scoase din etuvă, scuturate și întinse la aer ca să se usuce. Rufăria n'are trebuință de a fi dezinsecțată la etuvă, care ar coagula și face insolubile prin căldura cea mare materiile albuminoide, de cari este îmbăscită pe unele locuri lărgia murdărită de di-ferite secrețiuni și escresțiuni. Din această cauză se produc pete ce nu se mai șterg, pe rufe ce s'au pus în etuvă fără să fi fost de mai înainte cu-rățite. Se recomandă ca să se cufunde rufăria murdărită de bolnavi în vase cu o soluțiune fenicată de 5 la 100, unde vor sta 12—24 ceasuri, sau în-

tr'o soluție de 1 la 10 de săpun cu cresol, mai multe ceasuri, după care se vor curăți petele. Se mai poate în-trebuința cu bun succes cresolul, cresa-lină, lisol, în soluțiune de 2 la 100. Cel mai bun lucru este de a trata cât se poate mai iute rufăria infectată prin soluțiuni alcaline, încălzite progresiv până la fierbere, soluțiuni cari seamănă cu leșia obicinuită din cenușe. Este foarte bună o soluție de carbonat de sodă, care este un mijloc foarte sim-plu și cel mai eficient pentru rufărie, afară de lucrurile făcute din lână și din mătasă. Leșia așa cum se face prin case, cu cenușe de lemn, sau cu carbonat de sodă, dacă lucrează la temperatură aproape de fierbere, este mijlocul cel mai sigur și mai repede pentru dezinsecțiunea rufăriei murdă-rite de bolnavi infecțioși. — *Etuve de dezinsecțiune.* Sunt mai multe feluri de etuve: unele cu vapori cari func-tionează sub presiune mică, așa că temperatura se menține la 101—102°, altele cu vapori cari lucrează sub pre-siune mare, în cari temperatura se ri-dică și chiar trece peste 115°, cum sunt etuvele fixe, sau locomobile. O etuvă trebuie să îndeplinească urmă-toarele condițiuni: temperatura să nu varieze, sau să varieze cel mult un grad în toate părțile aparatului, obiec-tele dezinsecțate să nu-și piardă din rezistența lor, să nu se strice culoarea stofelor, să aibă aparate înregistrato-re, cari să permită controlul regula-rității operațiunilor făcute. — *Pulve-rizațiunile* se întrebuințează adeseori. Ele se fac cu o soluțiune de sublimat coroziv sau cu formol și cu aparate pulverizatoare, constituite dintr'un ci-lindru cu două despărțiri, cari comu-nică printr'un tub îngust; în despăr-țirea de jos se găsește lichidul dezin-fectant, în cea de sus se comprimă aerul prin mijlocul unei pompe de mână. Lichidul și aerul pleacă atunci din despărțirile lor, fiecare printr'un tub de cauciuc, pentru a se întâlni într'o cameră mică terminală, în care se face pulverizarea propriu zisă. Pul-verizațiunea se întrebuințează nu nu-mai pentru tavanuri și ziduri, ci și pentru cele mai multe mobile. Ea tre-bue făcută cu multă îngrijire și repe-tată de 2—3 ori pentru același loc.

Pulverizațiunile cu formol se fac cu o soluțiune care conține 976 centimetri cubi de apă și 24 cm. cubi de formol. O pulverizațiune de 30 secunde omoară în timp de 24 de ore microbii difteriei, ai febrei tifoide; microbul piocianic, streptococii uscați pe hârtie, stafilococi și sporii dalacului mor mai greu. — *Dezinjecțiunea instrumentelor chirurgicale* se poate face la flacăra de spirt, ceea ce le cam strică, în apă care fierbe în clocote, care le sterilizează foarte bine, sau în alcool.

Dezodorizațiune. — Prin acest cuvânt se înțelege ridicarea, sau nimicirea mirosului rău al bolnavului, sau al locuinții sale. Când bolnavul miroase a urină din cauză că nu poate să-și ție udul, îi vom da de 3 ori pe zi câte 10 picături de ulei, sau esență de terbentină. Dacă mirosul vine din nădușeală vom întrebuința băile în care vom pune 3—4 gr. de iperman-ganat de potasă. Locuința bolnavului vom scăpa-o de mirosul rău prin *aerisire* cât se poate mai deasă, deschizând ferestrele când este soare, sau făcând-o să comunice cu altă odaie aerisită de mai înainte. Să se scoată din cameră tot ceea ce face miros rău. Să se întrebuințeze lichide antiseptice odorante: timol, creolină, acid fenic, etc., dar *să se facă în același timp și aerisirea.*

Diabet (gr. *diabētēs*, a trece prin, se înțelege prin rinichi), *boală de zahăr.* — Diabetul este o boală în care urina sau udul bolnavului, cuprinde zahăr, lucru care nu trebuie să fie în timp de sănătate și care boală are și alte semne, după cum vom arăta mai la vale. Cuvântul *glicozurie* înseamnă numai urinare cu zahăr, fără nici un alt semn, fără nici o suferință și prin urmare glicozuria simplă nu trebuie să se confunde cu diabetul. Este bine să se cunoască diabetul dela cele dintâi semne, căci pentru ca să se poată vindeca, sau cel puțin să i se micșoreze suferințele și urmările trebuie ținut un regim deosebit și să ducă o viață hotărâtă. Și aceasta cu atât mai mult cu cât perioada întâiu a boalei se desfășoară pe tăcute și în timp destul de îndelungat. Cel mai de căpetenie semn al diabetului este o *sete* neastâmpărată, care silește pe bolnav să bea într'una, ceea ce produce

urină multă, așa încât bolnavul trebuie să facă foarte des udul. Adevseori boala se arată prin alte *semne bănuitoare*: o aprindere, sau inflamație cronică a gingiilor, cari sângerează cu ușurință, uscăciunea gurii, căderea dinților, mâncărime pe corp, sau se pot ivi diferite boalele de piele, cum sunt: eczema, furuncule, cari se ivesc și trec, repetându-se de multe ori; apoi se mai întâmplă la unii ce li se slăbește vederea prea de timpuriu, (presbiție prematură). Se mai văd diferite turburări nervoase: slăbire fără pricină vădită, moleșală generală, crampe (cârcei), dureri nevralgice, scăderea memoriei, aplicare spre somn, neputință de muncă. Pe de altă parte prezența zahărului în urină se cunoaște prin pătarea cămășii, sau a pantalonilor, cu niște pete alburii. Boala, odată pronunțată, are patru semne de căpetenie, pe cari le cunoaște, le simte și le vede fiecare bolnav: sete mare (*polidipsie*), ceea ce îl silește să bea zilnic 3—8—12 litri de apă, urinare multă (*poliurie*), făcând ud tot în așa mare cantitate (3—8—10), poftă de mâncare mărită, din pricină că bolnavul pierzând mult zahăr prin ud, trebuie să mănânce mult (*polifagie*). Cu toată mâncarea cea multă bolnavul începe a *slăbi*, fiindcă funcțiunile digestive, cari la început se fac bine, încep să devie mai greoaie, prin obosirea stomacului și mai târziu să se ivească vărsături și urdinare, cari slăbesc bolnavul din ce în ce mai mult, așa că el trăiește din grăsimea și carnea proprie, mâncându-se pe sine însuși (*autofagie*). Cel mai principal semn pe care bolnavul nu-l simte și nu-l vede este *glicozuria*, adică *zahărul în urină*. În cazurile obișnuite cantitatea de zahăr în urină în 24 de ore, poate fi de 25 până la 60 gr. Această cantitate poate merge până la 500 gr. și chiar până la 1 kgr. pe zi, în cazurile foarte grave. Cantitatea zahărului variază foarte mult dintr'o zi în alta, după regimul pe care îl urmează bolnavul. Mâncările zaharate și făinoase măresc cantitatea zahărului, iar dacă suprimăm aceste mâncări zahărul scade foarte mult și în cazurile ușoare poate să dispară de tot. — Diabetul are multe *complicații*, care îl fac să fie așa de

primejdios : pneumonia (aprinderea de plămâni), gangrena plămânilor, oftica, albuminuria, turburări nervoase, între cari diferite nevralgii, amorteți, turburări cerebrale (coma), turburări din partea vederii, cari merg până la orbire din cauza îmbolnăvirei retinei, sau datorită opacifierii cristalinului (cataractă diabetică), turburări digestive, furuncule, antrax (serpengea), edem, gangrenă, etc. — *Cauzele* diabetului sunt : ereditatea care are mare influență asupra ivirii acestei boale (unul din părinți a suferit de diabet, sau de o altă boală din grupul numit *artritic* (reumatismul, obezitate, o boală *nervooasă*). Alcoolismul, sau beția, agravează diabetul. Mediul social are mare influență asupra dezvoltării diabetului, lucrul intelectual mai cuseamă, din care pricină diabetul se vede mai des la oamenii învățați, medici, artiști, oameni de afaceri funcționari în administrații mari etc. — *Tratament*. Pentru a un bolnav de diabet să se vindece, sau cel puțin să poată trăi cu boala sa, fără să sufere, trebuie să aibă *voință*, hotărâre : să te culci și să te scoli de vreme, să ocolești emoțiunile, oboselile cu mintea, fără însă să fii leneș. Prin aceasta se va întări funcționarea pielii și se vor preveni diferite erupțiuni. Se mai recomandă plimbări zilnice în aer liber, dar fără oboseală, mai ales că diabetul se obosește cu ușurință și răcelile pentru el sunt periculoase. Sunt foarte bune jocurile în aer liber, vânătoarea, bicicleta cu mers moderat, grădinăritul. Gura trebuie îngrijită foarte bine, făcând gargară după mâncare. Mai important decât toate este regimul *alimentar*. Diabetul face mult zahăr în urină, din cauză că acest zahăr se formează în organismul său în cantitate foarte mare și din cauză că organismul consumă o cantitate de zahăr mai mică, decât în stare de sănătate. Pentru aceasta trebuie scăzută din hrana bolnavului proporția de zahăr și de materii cari se transformă în zahăr, materii numite hidro-carbonate (amidon, feculă, alcool), fără însă să suprimăm cu totul aceste materii, ceace n'ar fi lucru înțelept și cu neputință în practică, de oarece mai toate alimentele conțin hidrocarbonate. Inpuținarea mâncărilor hidrocarbo-

nate nu are numai avantajul de a micșora câtimea de zahăr în organism, ci va face ca aceste mâncări hidrocarbonate să fie mai bine tolerate un timp oarecare, după ce au fost luate. Tipul alimentelor hidrocarbonate este *pâinea*, a cărei cantitate variază după puterea fiecărui bolnav de a transforma, în mod complet, acest aliment. Să se mănânce miezul nu coaja, fiindcă miezul conține mai puțin zahăr și nu este așa gustos ca coaja, care ispitește pe bolnav să mănânce mai mult. Este bine să se mănânce în loc de pâine *cartofi*, cari conțin cu mult mai puțin zahăr (17 la 100), sau pâine de gluten care are 18 la 100. Unele specialități din comerț făcute cu migdale (pâine) sunt bune. Bolnavul de diabet se va feri de alimentele feculente și zaharate, macaroane, orez, fidea. El va consuma carne de tot felul, fiartă sau friptă, fără sos, însă bulion și ciorbe, ouă, pește, grăsimile, legumele verzi și salate, fructe (afară de cele prea dulci, cum sunt strugurii cireșile, pepenii), poate mânca, mai cu seamă : caise, zarzăre, piersici, nuci, migdale, alune, portocale. Laptele este foarte bun pentru diabeticii cari fac și albumină în urină ; mai bun este chefirul. Nu sunt bune băuturile *alcoolice*, cari sunt prea zaharate (șampania, vermulul) sau cari cuprind multe hidrocarbonate : berea, cidru. Se va lua vin alb în cantitate mică, sau mai bine vin roșu, cu apă minerală. Ape minerale bune sunt : Vichy, Carlsbad, Bourboule, Evian, Vals. Ca *medicamente* se recomandă acele cari modifică glicogenia. Cel mai important medicament cu ajutorul căruia bolnavii pot trăi și munci în bune condiții zeci de ani, este *insulina*, care este o mare descoperire a timpului nostru și care se dă, sub formă de injecții, numai de medic.

Diabet insipid. — O boală caracterizată prin sete mare, urinare în cantitate mare și mâncare multă, din cauza foamei foarte mare pe care bolnavul o are. Urina *nu conține* zahăr și poate ajunge la o cantitate de peste 20 litri în 24 ore. Se crede că diabetul insipid se datorește alterării unor părți ale creierului. Tratamentul încercat cu antipirină, bromur sau hipofizar a

DIAC

DIAR

dat uneori rezultate. În caz de Sifilis tratamentul antisifilitic dă rezultate foarte bune. S'a recomandat mult drojdia de bere, 1—2 lingurițe pe zi. S'a mai recomandat *opoterapia hepatică*, *pancreatică* cu diferite rezultate și *Insulina* (vezi acest cuvânt cu rezultate admirabile). Pentru *coma diabetică* sunt bune injecțiunile rectale, cu 40—60 gr. de bicarbonat de sodă, sau injecțiunile intravenoase cu 250—500 gr., dintr'o soluție apoasă de bicarbonat de sodă, de 3—5 la 100. Diabeticul nu trebuie să se chinuiască prea mult de sete, el poate să bea apă cât îi trebuie, căci prin aceasta oprește dezvoltarea țesuturilor și înlesnește darea afară a zahărului.

Diachilon (gr. *dia*, cu, și *chzlos*, suc), *talion*. — Este un fel de plasture (emplastru), care se prepară din untură de porc (2 părți) și plumb oxidat pulverizat (1 parte), cari se fierb împreună pe un foc moderat, agitându-se necontenit și adăugând, din când în când, câte puțină apă, până când plumbul oxidat (litargiriul) s'a topit cu totul, apoi se fierbe până se evaporază apa, rămânând la fund plasturul. Diachilonul astfel preparat se numește *simplicu*; din el se prepară diachilonul *compositus* astfel: se ia emplastru diachilon simplu, 1410 gr., se topește apoi se adaugă ceară galbenă 240 gr. și colofoniu 120 gr., topite la un loc; după aceasta se mai pune gumă rezină de amoniac, 170 gr., dizolvată în terebentină comună 60 gr., după care se formează plastorul, malaxându-se cu ajutorul apei. Acest plasture întins pe pânză se întrebuințează astăzi numai ca *aglutinativ*, pentru a uni buzele unei răni (plăgi), pentru a fixa piesele de pansament, sau o vezicătoare. Se mai pune pe furnicele ca să grăbească coacerea, spargerea lor și să tragă materia afară. De obicei se tae fâșiute de diferite lungimi și lățimi, după trebuință, sau bucățele patrâte încrestate pe la colțuri.

Diacod (Sirop). (grec. *dia*, cu, și *kōdia*, cap de mac). — Este tot una cu sirpoul de opiu (V. *Opiu*).

Diaforetice. — Medicamente cari produc diaforeză, sudoare. (V. *Sudorifice*).

Diaforeză (gr. *diaphorein*, a răspân-

di). — Însemnează transpirație, sau nădușeală (sudoare) abundentă.

Diafragm (gr. *dia*, cu, și *phragma*, părete despărțitor). — Mușchiu așezat între piept (torace) și pânțe (abdomen), care joacă mare rol în respirațiune.

Diagnostic sau *diagnoză* (gr. *dia*, între, prin, și *gnōsis*, cunoaștere). — Cunoașterea boalelor și deosebirea lor, unele de altele, după semnele fiecăreia.

Diaree, *cufureală*, *eșire afară*, *pânticărie*, *pârțuică*, *treapăd*, *urdinare*. — Când cineva iese afară de mai multe ori, în timpul unei zile, zicem că are diaree. Urdinarea este de mai multe feluri și în cele mai multe cazuri ea nu este o boală propriu zisă, ci un semn al altei boale. Intrucât privește *abundența* materiilor și în special cantitatea de apă pierdută prin scaune, ea variază dela câteva sute de grame până la 10, 20 și chiar 40 de litri, în 24 ceasuri. Numărul *scaunelor*, 4—6 pe zi în termen mijlociu, câte odată se urcă până la 100, iar *consistența*, ca noroiul, ca albușul de ou, sau ca apa (seroasă), ne pune în stare de a ne da seama de gravitatea diareei. Afară de acestea trebuie să mai ținem seamă și de alte semne și anume: de *culoarea* scaunelor. Când ele sunt galbene, sau închise avem a face cu o diaree obișnuită, când sunt de culoarea lutului este vorba de o febră tifoidă, când sunt verzi, ca iarba, e vorba de o diaree verde infecțioasă a copiilor, tot verzi sunt scaunele și după ce a luat cineva calomel. Culoarea verde închisă se vede în catarul stomacului și duodenului și în unele ictere (gălbinare) cu policolie, culoarea albă, cenușie argilooasă în gălbinarea prin oprirea fierii (acolie), culoarea roșie, ruginie în dizenterie (urdinare cu sânge), sau neagră în emoragiile de stomac și mafe. Culoarea apoasă, sau fără culoare, se vede în diarea colerică sau coleriformă. Când mirosul este fetid (puturos) este vorba de o putrefacțiune a resturilor alimentare, cum se întâmplă în diarea celor ce deșează privășile, a celor ce sufăr de dispepsie, a celor ce au mâncat carne stricată. În general, în diareele acute, scaunele sunt la început fecaloide, apoi bilioase (ca fierea) și câteodată seroase, în-

chise, sau apoase. Altele, scaunele, în parte lichide, pot să conțină *materii fecale tari* (enterolite și coprolite), sau corpi străini, cum sunt *calculii* (pietricele) biliari, viermii intestinali. Câteodată se văd în scaunele alvine ale diareei cronice mai cu seamă *alimente nemistuite* (lenterie), ceea ce ne arată de obicei o mărime a contracțiunilor intestinale, sau existența unei fistule gastro-intestinale. La bolnavii cari suferă de ficat, sau de pancreas, se văd adeseori *scaune grăsoase* (stearee), în care grăsimea înnoată la suprafață în formă de picături uleioase, sau de mici pete albi, mari ca bobul. În scaune se mai poate observa uneori puroi; când este în cantitate mare este semn că s'a deschis în mase o colecțiune mare purulentă. *Cauzele.* Cei mai predispuși la diaree sunt copiii și bătrânii, cei ce suferă de mistuire grea (dispepsie) și cei ce suferă de mistuire grea (dispepsie) și cei ce suferă de boale nervoase (nevropații). Intre cauze, avem: *răceala*, o mâncare rea, carne stricată, mezeli vechi, legume nefierte bine, fructe necoapte. Diarea care se însoțește de dureri, sau de colici, precum și de scremete, este mai gravă și datorită unei inflamațiuni de stomac și mase, sau unei alte boale grave microbiene. În cele mai multe cazuri trebuie respectate, cum se întâmplă la cei ce suferă de dropică (boală de apă), la cari această diaree le mai împuținează din apă pe care o au în pântece, la cei ce suferă de ficat, la care diarea le desumflă ficatul, stricându-l de fiere, la cei ce suferă de boale de piele și la cari constipația le face rău. În toate celelalte cazuri diarea trebuie oprită, cât se poate mai iute, căci, dacă o lăsăm în voia ei, bolnavul slăbește repede și-și strică sănătatea generală. *Tratament.* Incepem tratamentul printr'un purgativ pentru a curăți tubul digestiv de materiile iritante ce se mai găsesc în el. La copii se recomandă un calomel (10—30 ctgr. după etate) sau ulei de ricin (10—15 gr.), iar la adulți o sare amară (30 gr.). La copii trebuie să supraveghem hrana, să vedem dacă laptele este bun și câtă cantitate bea copilul peste zi, căci de multe ori hrana este pricina diareei. Dăm în ziua întâi numai calomel, sau

ricină, iar ca regim numai lapte; în ziua următoare vom putea pune în lapte apă de var (3—6 lingurițe la un litru) dându-i și un sirop de gutui, sau de tătăneasă (*Symphytum officinale*), curat, sau amestecat cu lapte. Dacă copilul e mai mare de 2 ani pe lângă lapte îi vom mai da apă de orez, făină lactată. Dacă lucrul este mai serios vom recurge la bismut (1—2, 4 gr. pe zi, luând câte o jumătate de gram odată), sau vom da astringente (tanin, ratania, tanigen, tanalbin, dermatol) și antiseptice intestinale (benzozonafol, 1—2 gr. pe zi). La nevoe recurgem la *laudan*, dând, dela etatea de $\frac{1}{2}$ an în sus, numai o picătură, dela 1—2 ani 2 picături, dela 2—3 ani 3 picături, la 4 ani 4 picături, împărțite aceste doze pentru tot timpul zilei. Pentru durerile de pântece vom pune cataplasme calde, simple, sau ungând mai întâi pântecele cu clo-roform (10 gr.) și ulei de hiosciam (100 gr.). În diarea de *origine alimentară*, la copiii hrăniți numai la sân, vom da puține doctorii, dar îi vom pune să sugă numai de 7—8 ori în 24 ore (de 6 ori în timpul zilei și de 2 ori noaptea), vom regula regimul mamei, sau al doicei, care se va feri de mâncări grele de mistuit și de băuturi spirtoase. Dacă, cu toate acestea, copilul iese afară lapte brânzit, nemistuit, vom da copilului câte o jumătate de linguriță de apă de var. Vom căuta să nu înțarcăm copiii decât la etatea de 12—14 luni și cu metodă, preparându-i pentru aceasta cu câteva săptămâni mai înainte. Înțarcarea se va face mai bine primăvara, sau toamna. Vom da lapte sterilizat și preparate cu lapte, supă preparată cu făină lactată, sau cu făină de ovăz, de tapioca. Vom da lapte de pasăre, ouă fierte moi, bulion fără grăsimi, mese regulate și nu mult de odată. Să nu se dea carne, feculente și legume, nici vin, cidru, bere. Pentru diarea *verde*, infecțioasă, cel mai bun lucru e dieta absolută, dând dela început calomel, apoi 24 ore numai apă (dietă hidrică), sau: apă fiartă și răcită 1 litru, acid lactic 5 gr., sirop de gutui 50 gr., pe care va bea-o în 24 ore în mici cantități, apoi se va da lapte sterilizat, tăiat cu apă de orez, apă de

var, apă albuminoasă, bulion fără grăsimi, sau o amestecătură în părți egale, de apă albuminoasă, bulion fără grăsimi și lapte. Se mai poate da fiertură de orz, strecurată și răcită, mai pe urmă antiseptice intestinale (benzoznaftol, betol, salol, salicilat de bismut, xeroform în doză de 60 ctgr., până la un gram într'un julep gumos) și astringente (ratania, tanin, tannigen, tanalbin, dermatol) mai ales când diareea este abundentă. La copiii sugaci diareea se oprește, de cele mai multe ori, numai prin regularea sup-turilor. La *adulți*, după ce am dat la început un purgativ, de multe ori este de ajuns oarecare dietă (ceaiuri multe și cartofi fierți, sau orez cu apă, în loc de zahăr), pentru a se vindeca. Dacă diareea se prelungește vom recurge la bismut (4—10—20 gr. pe zi) și la preparate de opiu. Dacă diareea este și mai gravă vom da dietă absolută, iar ca băutură vom da apă albuminoasă (apă fiartă 1 litru, patru albușuri de ou, apă de flori de portocale 10 gr., sirop de gutui 100 gr.). După 24, sau 36 ore, se va da dietă lactată, apoi ouă, orez, carne crudă tocată, alcool. La trebuință se vor da antiseptice intestinale, când diareea este fetidă, infecțioasă (benzoznaftol cu salicilat de bismut).

Diastază. — Este o substanță azotată sub formă de praf alb, solubilă în apă, insolubilă în alcool, care se scoate din orz, ovăș, grâu, cartofi, în momentul germinației (incolțirii) și care are însușirea de a transforma amidonul în dextrină, care se transformă ea însăși în zahăr. Saliva cuprinde diastază și se întrebuințează ca medicament atunci când materiile amidonate nu sunt în de ajuns mistuite (vezi *Maltnă*).

Diateză (gr. *diathēsis*, constituție). — Dispozițiune generală a organismului, congenitală sau câștigată, însă permanentă, care produce la individul care este atins, diferite boale, având o origine comună, de exemplu: diateză *artritică*, *limfatică*, *urică*.

Dietă (gr. *diata*, regim). — S'ar părea că cuvintele *dietă* și *regim* au aceeași însemnare, ceea ce nu este tocmai adevărat. Cuvântul dietă are un înțeles mai strâns decât cuvântul *regim*. Dieta se apropie foarte mult de

abstinență sau *ajunare*, dar nu *completă*, așa că am putea zice că dieta este o *abstinență incompletă*, relativă, iar nici de cum o abstinență absolută, sau totală. Când prescriem unui bolnav o dietă, nu-l vom lipsi nici odată de orice mâncare, solidă sau lichidă, ci, sau îi vom micșora cantitatea obișnuită a mâncării (*dietă incompletă*), sau îl vom opri numai dela mâncările solide, lăsându-l să ia pe cele lichide, cari, chiar când ele nu sunt așa de hrănitoare ca laptele, totuși hrănesc și ele într'un grad oarecare (*dietă completă*): bulionul, sau unele ciaiuri, sau băuturi zaharate. Ori cum ar fi o dietă produce o pierdere din greutatea corpului, o pierdere de forță, de căldură vitală, o sărăcire a sângelui, etc. Avem trebuință de această dietă, pentru a vindeca, sau a ajuta vindecarea bolnavului, în cele mai multe aprinderi sau inflamațiuni: pneumonie, pleurezie, meningită, etc., această dietă nu va fi așa aspră decât numai la începutul boalei. De asemenea trebuie s'o prescriem în *febră*, sau boalele *febrile* (cu fierbințeală) cum sunt: febra tifoidă, scarlatina, pojarul, vărsatul, iarăși numai la început, după care vom reveni la alimente lichide și în convalescență la mâncări mai hrănitoare. În boalele cronice ne vom feri de dietă, care ar slăbi bolnavul și mai mult, de pildă pe un ofticos nu e bine să-l punem la dietă, ci dimpotrivă, trebuie să-l hrănim cât se poate de bine, să-l punem la supraalimentație, mai cu seamă la începutul boalei. Oamenilor *grași* nu le vom da dietă, care i-ar slăbi prea repede și prea mult, ci le vom prescrie un regim alimentar potrivit. Nici *răniților* nu e bine să le dăm dietă, decât numai în anumite cazuri, căci astăzi mai toți doctorii se silesc să-și vindece bolnavii fără să-i slăbească, căutând să le întrețină forțele printr'un regim apropiat.

Dietă lactată. — V. *Lapte*.

Diformațiuni. — Se întâmplă câte odată ca un organ al corpului ome-nesc să nu aibă forma obișnuită și atunci zicem că este *diformal*, pocit. Dintre toate organele, cel care prezintă mai multe și mai interesante di-formațiuni este *capul*: turtit înapoi, fruntea turtită și capul tras înapoi,

tuguiat, în forma căpăţânei de zahăr, turtit în părţile lui laterale. Uneori capul se opreşte de timpuriu în dezvoltarea lui, nu mai creşte, rămânând mic în raport cu corpul, ceea ce se chiamă *microcefalie* (cap mic); oamenii cari au capul mic au mintea slabă, sunt idioţi sau imbecili, dar nu sunt primejdioşi pentru alţii. În general se poate spune că diformităţiunile capului sunt un semn de valoare, din punct de vedere al turburărilor inteligenţei, dar, precum ori ce regulă are şi excepţiuni, aşa şi aci sunt multe capete diforme, cari cuprind o inteligenţă vie, bine dezvoltată. Celelalte diformităţiuni ale spatelui, ale pieptului şi ale membrilor pot fi semnul unor boale de cari sunt cuprinse acele părţi, asupra cărora nu vom stăruia, de oarece ele nu pot fi apreciate decât numai de doctor şi nu cer nici o îngrijire deosebită, iar pentru a le îndrepta trebuie combătută boala care le-a produs.

Diformităţi. — Orice viciu de formaţiune a corpului, sau a unei părţi a corpului, ori ce defect în forma sa, sau în proporţiunile sale, cari îi dă o înfăţişare urită, se chiamă *diformitate* sau *sluţanie*. Intre diformităţi se numără boala numită *torticolis*, în care omul îşi ţine capul aplecat spre umăr fără să-l poată îndrepta, *picioarul strâmb*, în care omul calcă pe marginea piciorului, nu pe talpă, *cocosarea* spatelui şi *deviaţiunile columnei vertebrale*, lipituri de părţi între ele, în urma *cicatricelor vişioase*, lipituri şi strâmtorări de orificii naturale, datorite aceleiaşi cauze, etc. Unele diformităţi sunt congenitale, din naştere, altele sunt câştigate în urma accidentelor, sau a obiceiurilor rele. Aceste diformităţi tratate la timp, prin operaţiuni chirurgicale, sau prin mijloace ortopedice potrivite, pot fi vindecate sau micşorate.

Difterie (gr. *diphthera*, membrană, pelită). — Este o boală provenită dintr-o intoxicaţiune sau otrăvire generală, produsă prin înmulţirea în organism a unui microb special, numit *bacilul lui Klebs-Loeffler*. Această boală molipsitoare este caracterizată prin formarea unor membrane, sau peliţe, pe amigdalele din fundul gurii, pe cerul gurii, pe faringe (angină), în la-

ringe sau răsuflătoare (crup), în bronchii, pe conjunctive (la ochi) şi în nări, fie izolat, fie în acelaşi timp. Timpul care trece din minutul contagiunii şi până la ivirea primelor semne de boală variază dela 12 ceasuri şi până la 8 zile. Intre *cauzele* cari predispun la această boală avem: împrejurări rele igienice, sărăcie, hrană neîndestuiătoare, locuinţă rău aerată şi umedă, slăbire fizică şi morală. Etatea cea mai expusă este 3—7 ani, însă boala nu cruţă nici o vârstă. Agentul infecţios, un *microb special*, este conţinut în falsele membrane, sau peliţele cari se văd în fundul gurii. Aceste membrane, uscându-se şi prefăcându-se în praf, sunt respirate cu aerul atmosferic, sau absorbite prin căile digestive şi în acest mod se capătă boala. Dacă se pune din acest praf pe căptuşeala pleoapelor (conjunctive), sau pe căptuşeala



Fig. 147.—Microbul difteriei

nasului, de asemenea se poate da naştere la boală. Acest microb este foarte trainic (mai multe luni). De multe ori se întâmplă să fie întovăraşit de alţi microbi, mai cu seamă de *stafilococi* şi atunci boala este foarte gravă,

cu atât mai gravă cu cât injecţiunile de ser nu mai au nici o putere asupra ei. — *Angina difterică*, are următoarele semne: amigdalele din fundul gurii sunt umflate şi acoperite de pete, la început albui, apoi gălbui, cari se împreună între ele şi se întind pe omuşor, pe cerul gurii, pe faringe; ele se ridică foarte uşor cu pămătu ful, dar îndată se fac la loc. Ghindurile din afară dela gât se umflă, bolnavul înghite greu, are căldură, este palid la faţă şi foarte abătut, moleşit. — *Crup*. Când boala s'a întins la laringe (răsuflătoare) avem *crup*, sau guster, ceea ce agravează foarte mult starea bolnavului. Crupul poate să se ivească dintr'odată, fără să fie angină. În crup vocea este răguşită, apoi din ce în ce se stânge până ce nu se mai aude de loc. Tusea devine mai rară şi se face prin chinte scurte, ea este la început

răgușită, acoperită și în cele din urmă stânsă. Prin tuse bolnavul aruncă pielețe rupte din gât, respirația devine din ce în ce mai grea și șuerătoare, cu apăsare la lingurea. Bolnavul are accese de sufocațiune, cari se îndesesc din ce în ce, febra nu este mare (vezi *Crup*). — *Bronchita difterică* poate să însoțească crupul și atunci respirația este foarte grea: bolnavul scuipă o flegmă formată din false membrane. — În *coriza difterică* partea dinăuntru a nasului este acoperit de false membrane și din nas se scurge un lichid galben roșietic. — *Oftalmia difterică* poate să fie în același timp cu angina — sau cu crupul — de cele mai multe ori vine în urma intrării în ochi a unor bucățele mici de membrane; conjunctiva este acoperită de un strat albui, ochii lăcrămează. — Intre *complicațiuni* avem mai cu seamă paraliziiile *musculare*, cari se observă mai ales după vindecarea difteriei. La mulți se paralizază cerul gurii, din care pricină multă vreme vorbesc pe nas și le iese apa pe nas. — *Tratament*. Spălături mari cu apă boricată, făcute cu irigatorul în fundul gurii. *Injectiuni cu serul antidifteric* (Bering-Roux) cari se repetă, după cazuri și se recomandă cât mai repede posibil. Pentru a *immuniza* persoanele din jurul bolnavului, li-se va face injecție cu *ser preventiv*. În cazurile de crup vom recurge la *tracheotomie*, ori la *tubaj*, sau *intubațiune* (v. *Crup*). Cei ce caută bolnavii de difterie trebuie să ia pentru ei însuși măsuri foarte aspre de igienă. Să nu se obosească prea mult. Copilul nu va fi ținut în brațe, nu va fi sărutat. Să nu se respire duhoarea (alena) lui. Sgârieturile de pe față, de pe mâini trebuiesc acoperite cu colodiu elastic. Să facă gargară de mai multe ori peste zi cu o soluție de *hiperol*, sau cu acid boric 4 la 100, cu care își vor spăla și ochii; să-și spele fața și mâinile cu o soluție slabă de sublimat coroziv, să poarte haine speciale, cât stau în odaia bolnavului, rufăria trebuie fiartă în leșie, sau trecută prin *etuvă*. E bine să-și pună de 2—3 ori pe zi în ochi, câte 2—3 picături, din: Argirol 1 gr., apă distilată 10 grame. De când s'a descoperit serul antidifteric mortalitatea de difte-

rie a scăzut dela 50, 60 și 70% la 9—10%. Angina difterică se numește la țară *bolfe*, *șopârlaiță*, *șopârlaița cea rea*, *șopârlaghiță*.

Digestiune și absorbțiune. — Digestiunea sau *mistuirea* cuprinde toate schimbările prin cari trec alimentele, pentru a se transforma într'un lichid, care trece în sânge pentru a-l reînoui. Din alimente numai o parte se mistue, iar cealaltă parte, neputându-se transforma, este dată afară prin deschizătura de jos a tubului digestiv. — *Aparatul digestiv* se compune din: un



Fig. 148. — Aparatul digestiv

tub lung cam de 11 metri, din *glande* cari varsă în acest tub lichide cari înmoaie, subțiează și transformă hrana în așa fel încât să poată pătrunde în vasele absorbante. — *Tubul digestiv* începe cu *gura* în care alimentele sunt îmbucătățite și zdrobite de *dinți* și *măsele*, apoi sunt împinse înapoi de *limbă* prin *gâtlee* în *faringe* (înghițitoare), care se continuă cu *esofagul*, un tub lung ce se scoboară dealungul șirii spinării și străbate diafragma

pentru a ajunge în *stomac*, o pungă mare în forma unui cimpoi, închisă la partea de sus prin *cardia*, iar la partea de jos prin *pilor*, care îl separă de *intestinul subțire* (matele subțiri). Acest intestin este lung de 8 metri și



Fig. 149. — Glandele salivare

a = cerul gurei; b = limba; c = glanda sublinguală; d = osul maxilar; e = glanda submaxilară; f = glanda parotidă

pentru a încăpea în pânțece se îndoește de mai multe ori asupra lui însuși (circumvoluțiuni intestinale), până în punctul în care intestinul subțire se îmbucă aproape în unghiul drept în *intestinul* (mațul) gros. Acesta formează un fel de ramă pentru intesti-




Fig. 150. — Glanda pancreatică

a = beșica fierei; c = canalul bșiceii; d = arteră; e = venă; f = duoden; g = pancreas; h = canalul pancreasului; i = mijlocul canalului; j = mijlocul intestinului; k = venă; l = pereții duodenului; m = arteră

nul subțire ocolindu-l de jur împrejur. El se îndreaptă mai întâiu de jos în sus, în partea dreaptă a pântecelui, apoi merge de-a curmezișul pe sub stomac și, în fine, se scoboară pe partea stângă a pântecelui până la partea de jos a spatelui, unde se deschide printr'un orificiu numit *anus*,

sau șezut. — *Glandele digestive* sunt: în gură, *glandele salivare*, cari fac saliva (balele), destinată a transforma materiile amidonate (cum ar fi pâinea), în zahăr asimilabil (glicoză). În stomac glandele *gastrice*, cari fac




Fig. 151. — Cum se face digestia

1 = bolul alimentar în stomac; 2 = trecerea în intestin, unde se unește cu sucul pancreatic; 3 = fierea se adăogă și ea; 4 = secrețiunile intestinului aduc ultima schimbare

a = bobul alimentar b = suc pancreatic digestiv; c = fierea. d = secrețiunile ale intestinului

de a înlesni absorbirea grăsimilor.



Fig. 152. — O secțiune în intestin

a = arteră; b = vână; c = chilifer; d = nerv; e = peritoneu; f = muschi; g = strat submucos; h = strat mucos; i = folicul

În părății intestinului subțire glandele *intestinale*, al căror suc intestinal preface substanțele albuminoide în peptonă, schimbă materiile amidonate în zahăr (glicoză) și face asimilabil zahă-

rul ordinar descompunându-l. — *Vasele absorbției.* Pereții stomacului conțin numeroase capilare sanguine, cari absorb o mare parte din băuturi și o cantitate mică de peptone; dar absorbția de căpetenie se face în *vilozitățile*, intestinului, cari sunt niște ridicături mici, cam de 1 mm. lungime, în cari se găsesc un capilar și o rețea de vase albe, la început foarte mici, cari se termină într'un vas central chilifer. Acest chilifer se reunește cu alți chiliferi pentru a constitui canalul comun al tuturor limfaticelor, *canalul toracic*, care merge de își varsă conținutul în vena subclaviculară dreaptă. Pe de altă parte, capilarele vilozităților sfârșesc în vene, cari iau iarăși



Fig. 153. — Digestie

Umflarea organelor de digestie, atunci când digestia și evacuarea resturilor nu s'au putut face normal
Numerile și săgețile arată drumul parcurs de bolul alimentar și diferitele transformări

o parte din lichidul produs prin digestiune și-l duc în ficat. Pentru urmarea absorbției caută la *Circulațiune*. Să vedem acum cari sunt *condițiunile unei bune mistuirii*. Digestiunea este una din funcțiunile cari se turbură mai ușor, fie în mod trecător (*indigestiune*), fie în mod obicinuit (*dispepsie*, *gastralgie*, etc.) și în acest caz ea se însoțește de dureri, este urmată de vărsături, de diaree și alte suferințe, cari dacă nu sunt tratate la timp, produc o slăbire din ce în ce mai mare (*v. Diaree*, *Dispepsie*, *Intestin*, *Stomac*). Dar fiindcă este mai ușor de a preveni tâmpina o boală decât a o vindeca,

iată ce ne învață igiena să facem. Înainte de a deuna să facem ceva exercițiu, prin urmare să nu ne sculăm tocmai aproape de ora mâncării. Între dejun și prânz să treacă un timp îndestulător, pentru a flămânzi. Mesele să fie servite la ceasuri regulate, fixe. Nu trebuie să luăm băuturi aperitive, cari nu deschid apetitul, nici nu ușurează mistuirea. În timpul mesii vom mesteca și măcina bine și cu îngrijire mâncarea în gură, iar în lipsă de dinți și măsele vom pune *dantură artificială*. Când mâncăm putem conversa, dar nu este bine să cetim. Vom căuta alimente variate și ușor de mistuit, în cantitate potrivită după etate și după muncă. Nu vom bea prea multe lichide, ne vom feri de lucrurile fierbinți, precum și de cele prea reci. După mâncare putem să luăm o băutură stimulentă și caldă, cum ar fi o cafea turcească, coniacurile și lico-rurile aproape de loc, sau foarte rar și în cantitate cât se poate de mică. După masă nu este bine să începem îndată lucrul, fie intelectual, fie fizic. Este bine însă să facem o plimbare la aer liber, fără să ne obosim, fumătorul poate să fumeze o țigară după masă dar niciodată înainte de a mânca.

Digestive. — *V. Stomachice.*

Digitală (*Digitalis ambigua*). — *V. Degetar.*

Dilatație de stomac. — *V. Stomac.*

Dinamometru (gr. *dynamis*, putere și *mètron*, măsură). — Un mic aparat pentru a măsura puterea, sau forța musculară. Prin apăsare pe un resort circular de oțel, un ac se mișcă pe un cadran, arătând astfel puterea de apăsare.

Dinți și măsele. — Omul, pentru a putea mânca alimente solide, are trebuință de dinți și măsele, cari sunt oase mici, împlântate pe marginile ficărei făci și cari slujesc pentru a tăia și a măcina substanțele alimentare. Copilul are 20 de *dinți de lapte* (12 dinți și 8 măsele sau molari), iar omul adult are 32 *dinți permanenți* (12 dinți și 20 măsele). (vezi *Dentițiune*). Se întâmplă câte odată să fie *dinți supra-numerari*, printre dinții normali, sau înapoia lor, cari pot să supere esirea celor normali. Pentru a preveni această ei trebuiesc scoși. Direcțiunea din-

ților este verticală și așezarea lor este astfel încât formează două arcuri arcade), dintre cari cel de jos este cercuit de cel de sus. Câte odată lucrul poate fi întors, adecă arcul de sus să fie cercuit de cel de jos, ceea ce face ca bărbia să fie prea scoasă înainte dând figurei o înfățișare neplăcută. Alteori se întâmplă ca dinții în loc să fie drepți, verticali, să fie strâmbați înainte, sau înapoi, sau în laturi și în



Fig. 154. — Dinți

a = incisivi; b = canini; c = premolari; d = molari

aceste cazuri trebuiesc îndreptați cu aparate speciale, cu ajutorul cărora ei se îndreptează cu ușurință, mai ales când tratamentul se face din bună vreme, la etatea fragedă. Fiecare dinte se compune din două părți: *coroana*, care se vede, și *rădăcina* în al-



Fig. 155. — Diferite forme de carii și plombe

veolă, săpată în falcă. Intre coroană și rădăcină se găsește *gâtul*, acoperit de gingie. Coroana este acoperită de *smalt*, este o substanță albă, strălucitoare și foarte tare; sub smalt se află o altă substanță alb-gălbuie, numită *ivoriu* sau *dentină*, partea principală a rădăcinii, unde este acoperit cu *ciment*. Ivariul este găunoșit la mijloc

unde se află *pulpă dentară*, sau *măduva dintelui*, singura parte simțitoare: în ea pătrund, prin vârful rădăcinii, *vasele cu sânge și nervii*. După *forma* și *locul* lor dinții se împart în: *incisivi*, sau *tăietori*, în număr de patru pentru fiecare falcă, la mijlocul ei. Ei au o margine tăietoare și o singură rădăcină. *Canini*, sau *cânești*, doi de fiecare falcă, sunt așezați la o parte și în afara tăietorilor. Măselele se împart în: *măselele mici*, două de fiecare parte, sus și jos, îndată după dinții cănești. Coroana lor are două ridicături conice și ele au câte două rădăcini. *Măselele mari*, spre fundul gurii, în număr de trei în fiecare parte. Ele au o coroană cu mai multe ridicături și câte două sau trei rădăcini de obicei depărtate între ele. Cele din urmă măsele se numesc *de minte* fiindcă ele ies între 20—30 ani. Dinții, servesc pentru a tăia și măselele pentru a sdrobi și măcina alimentele. Operațiunea aceasta se numește *masticățiune* și fără ea nu se poate face mistuirea cum trebuie. Dinții incizivi taie, cei cănești rup și măselele sdrobesc și macină mâncarea. Rău fac toți toți aceia cari se grăbesc când mănâncă, în loc să macine încet și bine. În acest caz stomacul este silit să macine el mâncarea pentru a putea mistui, ceea ce îl obosește și îl îmbolnăvește. Astfel se produce boala numită *dispepsie*, sau mistuirea grea. Cei care au dinți și măsele în gură să mănânce încet iar cei ce nu au dinți, sau măsele, să-și pună *dantură artificială*, dacă vor să fie sănătoși. — *Boalele dinților și măselelor*. Când mâncăm lucruri acre, fructe verzi, necoapte, ni se strepezesc dinții. Această strepezire dispare și dela sine, după câțva timp. De multe ori se întâmplă să se formeze un fel de *piatră* pe dinți și măsele, ceea ce face ca gingiile să se deslipească și o parte din rădăcina lor să nu mai fie acoperită de gingie. Piatra care se adună la gâtul dinților poate să fie albuie, sau gălbuie. Ea este produsă de inflamația gingiilor, sau de salivă acidă, de dispepsie, febră, bomboane și alte lucruri zaharate, de neîngrijirea gurii. Pentru a preîntâmpina toate acestea trebuie să ne spălăm des în gură de 2—3 ori pe zi, cu peria muiată.

DINT

DINT

într'o apă de dinți și cu praf de dinți. La unii se întâmplă să se *clatine* dinții, din cauza pietrii care a desgărdinat gingiile. Pentru aceasta trebuie curățită piatra bine și să se facă gargară mai des cu clorat de potasă (4 la 100). Dinții se pot *rupe*, sau să se *crape*, prin mănecarea lucrurilor tari, prin




Fig. 156. — Dinți deformați

spargerea alunelor în gură, prin lovitură și căderi asupra fălcilor, ceea ce predispune la stricarea dinților, la *carie*. *Caria* dinților și a măselelor este boala care se ivește mai des și de care mai nimeni nu scapă. Ea începe prin stricarea smalțului, ceea ce se cunoaște printr'o mică pată, care la început este albuie, apoi galbină-brună și pe urmă neagră. După câțva timp pata se înlocuiește printr'o mică gaură neregulată, care descoperă dentina și care, fiind mai slab, stricăciunea aci se face mai repede. Ivoriul se distruge la rândul lui și durerile de dinți, sau de măsele încep; se întesc când vine în atingere cu mâncări, sau băuturi acre, sau zaharisite, prea calde, sau prea reci. Caria merge și mai adânc, ajungând la pulpa sau măduva dintelui, unde dă de nerv și atunci durerile sunt mari. Pentru a preîntâmpina toate aceste boale și mai cu seamă *caria* trebuie să ne



Fig. 157. — Secțiune într'un dinte

ocupăm de gură, s'o îngrijim din cea mai fragedă copilărie, dela etatea de 2 ani înainte. Gura trebuie spălată și dinții curățiți dimineața și seara cu operie înmoiată în apă de dinți. Dela 4 ani în sus copilul singur își poate face aceasta.

Spălarea gurii seara, la culcare, este cea mai importantă, căci mănecarea rămasă printre dinți și măsele în timpul nopții se dospește, fermentează și atacă smalțul. Nu trebuie să se mănânce supă, să bea cafea, sau ceai prea fierbinte. Este bine ca din când în când să consultăm un dentist, care va examina gura și îndată ce va observa un început de carie se va îngriji să *plombeze*, adică să *astupe* gaura, după ce mai întâu a curățit bine toate părțile stricate. Când o măsea, sau un dinte stricat, nu se poate plumbui, atunci singurul mijloc de a scăpa de durere este de a-l scoate. *Scoaterea dinților* este bine să se facă de un dentist. Câte odată se întâmplă că dinții ies *strâmbi*, sau se *încălesc* unul asupra altuia. Aceste *deviațiuni* se datorează mai mult împrejurării că *dinții de*

lapte cad prea de vreme, așa că alveola se strâmtează, sau se astupă până la eșirea dinților definitiv. Aceștia neavând drumul deschis, trec sau înafară, sau înăuntru de arcul fălcii. Pentru aceasta trebuie ca dinții de lapte să fie bine îngrijiți să nu se strice, iar dacă s'au stricat să se plumbiască, ci nu să se scoată înainte de vreme. *Încălcarea* dinților provine din aceea că arcul fălcii este prea mic pentru a putea cuprinde toți dinții în rând, așa că ei sunt siliți să se încălece. În acest caz trebuie scos unul sau doi dinți, pentru ca ceilalți să se poată dezvolta în linie. — *Dinți artifițiali și dantură*. — Când omul pierde mai mulți dinți, sau măsele, este bine să-și pună alții artifițiali, pentruca să poată mânca, să poată sdrobi și măcina mănecarea. Când se pun mai mulți dinți și măsele se zice că se pune o *dantură simplă* (când se aplică numai pe o falcă) și *dublă* când se aplică pe



Fig. 158. — Cum lucrează caria dentară

a=nerv; b=cavitate săpată de carie; c=fesut atacat de carie; d=fesut inflammat

Fig. 158. — Cum lucrează caria dentară

amândouă fălcile. Se poate pune și numai câte un dinte, sau câte o măsea. Dinții și măselele cari se întrebuințează astăzi sunt de un fel de portelan. Dantura se face dintr'o placă de aur, de celuloid sau de cauciuc vulcanizat, după un tipar luat pe falcă, și pe care se fixează dinții și măselele. O dantură bună trebuie să se aplice în mod exact pe falcă. Numai un dinte se poate fixa printr'un șurub de rădăcina dintelui natural sănătos. Acest mod de fixare se aplică numai la dinții tăietori și cănești de sus. Se mai fixează dinții și prin ajutorul cârligelor de metal, dar aceasta nu este bine, căci omul își poate înghiți dinții și să moară din pricina lor. Dinții artificiali, sau dantura trebuiesc întreținuți în stare de curățenie perfectă. Să fie spălați după fiecare mâncare, iar noaptea trebuiesc scoși (pentru a nu fi înghițiți) și puși într'un pahar cu apă simplă, sau amestecată cu apă de dinți.

Dioc, *fierea pământului, floarea florilor, ghioc, smoc*, (*Centaurea phyrgia*, fam. Compozitelor). — Plantă erbacee indigenă cu florile roșii-violete, care crește pe câmpuri, în livezi și poieni pe lângă păduri. Se întrebuințează vârfurile și florile cari sunt amare și au proprietăți aperitive, tonice și digestive, ca și celelalte amare. Se dă și contra frigurilor, deși nu poate ține locul chininei. Se dă sub formă de: ceai, făcând să fiarbă 15—30 gr. în 500 gr. apă, praf: 2—10 gr. extract: 2—4 gr. pe zi. La țară se fac băi cu flori și ceaiul se bea pentru *poală albă*. Tătarii din Dobrogea fac băi copiilor bolnavi de spasme și la cei cărora le ies dinții târziu și cu greutate.

Dionină. — V. *Morfină și Opiu*.

Diplococi. — V. *Microbi*.

Diplopie (gr. *diploos*, dublu, îndoit, și *ops*, ochiu). — Vederea îndoită a unui lucru. Cauzele: paralizia mușchilor ochilor datorită, mai multor boale (ataxie locomotrice, isterie, intoxicațiuni, paralizie generală, boala somnului, sifilis) sau unei leziuni a craniului (plăgi sau fracturi). Caută și la *Strabism*.

Diplosal. — Derivat al acidului salicilic (acid salicilo-salicilic). Se recomandă în reumatismul muscular și ar-

ticular, nevralgii, sciatică, migrenă, influență, pleurezie, cistită. Doză: 50 ctgr. până la 1 gr. pentru odată, iar pe zi se dă 3 până la 6 gr., în lapte, sau în tablete de câte 50 ctgr.

Dipsomanie (gr. *dipsa*, sete și *mania*, manie, nebunie). — Starea bolnăvicioasă în care omul bea cu exces și în mod irezistibil băuturi și cu deosebire pe cele alcoolice. Bețivii beau de plăcere și când au prilej, dipsomanii se îmbată când le vine accesul, când le vine furia de a bea. Această boală izbește mai ales pe cei deprimați, cu sau fără predispoziție; adeseori este ereditară. Accesele vin în mod regulat și între ele bolnavul este liniștit, îi pare rău de ceea ce a făcut și are spaimă de băuturile alcoolice. Când vine accesul, bolnavul se simte slab, dezgustat de toate, și bea pentru a se întări, dar aceasta îl îndeamnă să bea apoi în continuu, fără să se mai poată opri, și aceasta ține de multe ori mai multe zile în șir. Dipsomania adese ori se complică de alte turburări nervoase cari caracterizează mania și cari de cele mai multe ori sfârșesc prin demență și prin leziunile ultime ale alcoolismului. Boala aceasta nu se vindecă și tratamentul ei este acela dela *alcoolism*. Bolnavii de multe ori sfârșesc în casa de nebuni.

Discromatopsie. — V. *Daltonism*.

Dismenoree (gr. *dys*, cu greutate, *men*, menstruația, *rhein*, a curge). — Prin acest cuvânt se înțeleg diferite turburări ce se ivesc la venirea, sau în timpul regulelor, mai ales când acestea vin cu greutate și sunt însoțite de dureri. (v. *Menstruație*).

Dispepsie (gr. *dys*, cu greutate, *pepsis*, coacere, mistuire), *mistuire grea*. — Prin dispepsie înțelegem o digestiune sau mistuire grea, anevoioasă și dureroasă. Avem dispepsie ori de câte ori simțim mistuirea, căci în stare de sănătate omul nu trebuie să-și simțească stomacul, nici să-și dea seamă de actul digestiunii. În dispepsie de obicei omul simte în minutul când mâncarea ajunge în stomac un fel de supărare, de umflare, de greutate la lingurea (epigastru), o greutate la lingurea (epigastru), o greutate pe stomac, care uneori merge până la durere, dar această durere nu este așa

DISP

de mare și nu vine sub formă de crize nesuferite, cum se întâmplă în *gastralgie*. În dispepsie mistuirea se face încet, cu mult mai încet decât ar trebui și în timpul ei omul simte un rău general, oboseală, greutate la cap, un fel de tristețe și aplecare spre somn, cu căscături, uneori puțină căldură spre seară, alteori bolnavul mai are *răgăituri* acre (*dispepsie acidă*, *acrimie de stomac*), sau se umflă la stomac în timpul mâncării, ori după mâncare. Cel care suferă de dispepsie are turburări în pofta de mâncare, uneori o are micșorată, alteori prea mare (bulimie). Setea de obicei este mărită, acum are diaree, acum constipație, dar mai des constipație. Cu timpul bolnavul începe să slăbească și sănătatea să sufere, dacă nu se caută din vreme și cum se cuvine. Nu trebuie să se confunde *indigestiunea*, care este o turburare trecătoare, cu dispepsia care este o boală lungă și greu de vindecat. — *Cauzele*. Dispepsia se poate observa uneori chiar și la copiii mici de tot, la sugători, fiind produsă de lapte de calitate rea, sau de întârțarea prea din vreme. Se vede foarte rar în copilăria a doua și în adolescență, se observă mai des în etatea adultă și la bătrânețe sub influența multor cauze. Viața sedentară predispune la această boală, astfel femeile sunt mai atinse, precum și cei ce șed și scriu tot timpul, birocrații. Apoi, obiceiul de a ceti mâncând, de a mânca și a bea prea mult odată, de a lucra îndată după masă, de a dormi sau de a face exercițiu prea mare în timpul celor două dintăi ceasuri după mâncare, de a se strânge prea tare corsetul, etc., sunt tot atâtea cauze de dispepsie. La aceste mai putem adăuga abuzul de băuturi alcoolice, excesele de mâncare des repetate, întrebuițarea prea des de mâncări grele, insuficiente. Vom mânca încet, la ceasuri hotărâte, lăsând între mese un timp potrivit de lung, să nu bem mult, etc. Regimul alimentar trebuie să fie supravegheat cu mare îngrijire. Alimentațiunea cea mai bună pentru dispeptici este cea *mixtă*, adică: ouă, pește proaspăt, brânză, carne în câțime îndestulătoare, legume verzi. Ne vom feri de feculente (fasole, mazăre, linte, cartofi), cari în-

DISP

carcă stomacul și umplu mațele de gaze, etc. Uneori trebuie să recurgem numai la regim de lapte, sau la carne crudă. De altfel trebuie să știm că în dispepsie apetitul este foarte capricios omul se desgustă repede de aceeaș mâncare și că mâncarea va trebui să fie foarte variată. În dispepsia obișnuită, în care durerea de stomac este mică, se va lua înainte de masă o preparațiune amară, cu gențiană, nucă vomică, absint, iar la sfârșitul mesii o ceașcă de cafea neagră. La început sau după masă, 1 până la 2 gr. de bicarbonat de sodă, mai ales când bolnavul are răgăituri acide se face *spălarea stomacului*, care are de scop să deserte lichidele putrede, cari se îngrămădesc în el în timpul dela o masă până la cealaltă. Dispepsia la *copiii de față*, la sugaci, se va trata supravegând alăptarea. Copilul va suge de 7—8 ori în 24 ceasuri, prin intervale de 2—3 ore și va suge numai câte 10 minute în loc de 15—20. Se va da după fiecare sugere (supt) un sfert de linguriță de apă de var, în puțin lapte de mamă, sau al doicii. Se va supraveghea în același timp regimul doicii care nu va abuza de băuturi alcoolice și nu va mânca lucruri greu de mistuit. Se va combate constipația copilului și a doicii. La copii din a doua copilărie, se va combate cloroanemia, limfatismul, recomandându-se plimbările, exercițiile și jocurile în aer liber, șederea la țară, la munte, idroterapia caldă sau rece. Se vor da tonice, înainte de masă preparatele amare, iar după masă acid cloridric și pepsină în doză de 1/2 până la 1 gr. La copiii cari au prea mult *acid* în stomac se vor da apele alcaline, bicarbonat de sodă, carbonat de magnezie, magnezie calcinată, cretă preparată, carbonat de bismut. Se vor opri mâncările iuți, grase și zaharate, băuturile alcoolice, vinurile tonice și digestive.

Dispeptină. — V. *Opoterapie*.

Dispnee (gr. *dys*, cu greutate, și *pnein*, a respira). — Când respirația se face cu greutate și aerul curat intră în plămâni în cantitate neîndestulătoare, așa că se îngrămădește prea mult acid carbonic în sânge se produce dispnee. În dispnee mișcările respi-

rației sunt grăbite și dureroase. Cauzele dispneei sunt: boalele organelor respiratoare (laringită, crup, bronchită, pneumonie, bronco-pneumonie, oftică, pleurezie, astmă, năduf), toate boalele cari provoacă o apăsare, directă sau indirectă, a pieptului (tumori în mediastin, ascită, sarcină), unele boale nervoase (alienațiune mentală, isterie).

Disurie (gr. *dys*, cu greutate, și *ourcin*, a urina). — Greutate în a face udul, produs prin mai multe cauze: strâmtorarea uretrei, mărirea prostatei, piatră în beșică, cistită, blenoragie.

Diuretice. — Medicamente cari fac urină multă, cari măresc cantitatea udului. Cel mai simplu diuretic este apa, care lucrează în mod mecanic intrând în sânge și mărindu-i masa totală. Pentru ca apa să aibă efect diuretic trebuie luată în câtime mare, curată, iar temperatura ei să fie moderată; dacă este caldă devine *sudorifică* (face nădușeală multă). *Zerul, vinul alb și berea*, sunt de asemenea diuretice. Cele mai de căpetenie diuretice sunt: digitala, scila, cozile de cireșe, mătașa de porumb. Pulberi diuretice: azotat de potasă (nitru), lactoză, nalbă, lemn dulce. Diureticele sunt folosite mai ales în boalele acute, ori cronice, în cari febra (fierbințeala) face ca udul să fie puțin și gros, în boalele de inimă însoțite de dropică (boală de apă) și în care trebuie să dăm afară apa din pânțele prin urină, ca și prin sudorifice și purgative, în otrăviri, în cari urina multă scoate o bună parte din otravă.

Diuretină — V, Teobromină.

Diureză (gr. *dia*, cu, și *ouron*, urină, ud). — Facere de urină mai multă ca de obicei. Diureza este uneori un semn al unor stări nervoase. Ea este un bun mijloc de derivație, în unele boale, cum este *dropica* (boală de apă) și face ca bolnavul să se desumfle. Când diureza a devenit permanentă, se chiamă *poliurie*.

Dizenterie. — (gr. *dys*, cu greutate, și *enteron*, intestin), pânticărie cu sânge, sfânta de boală, treapăd cu sânge, urdinare cu sânge, vintrea. — Dizenteria este o boală grea, care, prin necăutare, aduce moartea. Se ivește de

obiceiul vara; uneori atinge mai mulți oameni deodată, sub formă de *epidemie*. Este cu mult mai omoritoare în țările călduroase decât la noi. Dizenteria este o aprindere (inflamație) a mațelor groase, cari se acopăr de răni pe fața lor internă și cari răni pot merge, adâncindu-se din ce în ce mai mult, până găuresc mațul. Ea este molișitoare, se întinde dela om la om prin scaună (materii fecale), cari, aruncate afară, intră în pământ și de aci în apa de băut. Toți cei ce beau această apă stricată capătă la rândul lor urdinare cu sânge. Prin acest mijloc boala se poate întinde într-o mare parte de oraș, sau în tot satul și atunci avem o adevărată molimă (epidemie). — *Cauzele ei sunt mai multe.* Intre acelea cari predispun la dizenterie avem: fructele necoapte, o hrană stricată care slăbește corpul omului, osteneala, locuirea multor oameni îngrămădiți la un loc (închisori, cazarme, tabere, vapoare, etc.) abuzurile de băuturi alcoolice și cu gheață. În țările calde (tropicale) dizenteria este produsă de un fel de amibă, *amiba dizenteriei*, sau *amoeba coli*. Aceste amibe sunt cele mai inferioare animale, cari se prezintă sub formă de mase mucilaginoase, fără membrană (peliță) de înveliș, se mișcă încet și târându-se. Ele se găsesc în număr foarte mare în scaunele celor ce suferă de dizenterie. În Europa nu s'a găsit niciodată această amibă în epidemiile de dizenterie, dar s'a găsit un microb, *bacilul dizenteriei* (Chantemesse), care seamănă cu acel al febrei tifoidă. — *Semnele.* Dizenteria începe cu un fel de moleșală, cu fiori și cu urdinare simplă. În cazuri de molimă ea începe în mod repede, fulgerător; omul poate muri în câteva ceasuri. Ceeace este mai supărător în această boală sunt durerile de pânțele, cari la început sunt peste tot, iar mai târziu se mărginesc în partea de jos și în stânga pântecelui, dar mai ales la șezut. Bolnavul simte un fel de greutate acolo, de corp străin, care-i deșteaptă trebuința de a merge la scaun, dar în zadar se duce bietul om, căci nu face mai nimic; mai târziu se repetă același lucru și asta se repetă de nenumărate ori. Incercările dintâi

golesc mațele de conținutul lor, apoi încep adevăratele scaune ale boalei, scaune cari sunt formate dintr'un fel de *muci* spumoși, gălbui sau verzui și mai târziu înroșiți de *sânge*, care provine din despoiala mațelor de căptușala lor. Mațele se jupoaie și se rănesc, iar scaunele sunt formate atunci aproape numai de sânge. Unele se aseamănă cu drojdiile de vin, având niște pielite mici, sau niște grăuncioare mici și albul, cari sunt formate din însăși căptușala mațelor despoiată și ruptă. După câțva timp scaunele iau un miros foarte greu și seamănă cu răzuirea de pe mațe, fiind formate dintr'un fel de zeamă apoasă, în cari se mai văd rămășițe din căptușala mațelor, cari cu timpul se rănesc peste tot și se înegresc, iar scaunele, conțin pielite mai mari și mai negre, după care bolnavul moare. Scaunele în această boală sunt foarte numeroase. În cazurile cele mai ușoare sunt în număr de 10—12, iar în cazurile mai grele ele nici nu se pot număra, ajungând până la 200 în 24 ceasuri. Bolnavii sunt torturați în mod cumplit, pielea șezutului se înroșește, plesnește și se rănește, iar trecerea scaunelor pe acolo produce arsură mare. În cazurile ușoare bolnavii n'au fierbințeală, pofta de mâncare însă li s'a micșorat. Când boala este mai grea, ea se însoțește de fierbințeală, greață și vărsături. În cazurile și mai grele omul slăbește de tot, ochii i-se înfundă în cap, se înegrește la față, buzele se usucă și crapă. Bolnavul cade într'un fel de amețeală și istovit de putere și de viață se stânge, păstrându-și cunoștința de sine până în momentul cel din urmă. Dizenteria ușoară se poate vindeca în câteva zile; în cazurile de epidemie ea omoară multe ființe. În țările călduroase ea este una din boalele cele mai omoritoare. Pentru *preîntâmpinarea* boalei trebuie să ne hrănim bine și îndestulător, să nu mâncăm fructe necoapte, să nu trăim în murdărie, să nu ne obosim peste măsură. În acest mod corpul nostru nu slăbește și nu este primitor de boale. Când cineva cade bolnav, pentru a preîntâmpina lățirea boalei, este bine să-l despărțim de oamenii sănătoși, să-l așezăm într'o cameră

mare, bine aerată și bine luminată. Rufăria lui să fie deosebită, mai ales rufăria murdată să fie pusă la o parte, dezinfectată și bine spălată, să nu se amestece cu rufăria omului sănătos. Scaunele lui să fie stropite cu calaican. și aruncate într'o groapă departe de puțuri și de râuri. *Tratamentul* dizenteriei acute este următorul: mai întâi vom prescrie bolnavului regim lactat, să mănânce lapte rece, tăiat cu apă de var, doze mici și repetate. Când nu poate suferi laptele vom da, ceai, apă albuminoasă, apă de orez. În cazurile ușoare îi vom permite ouă, zeamă de orez, bulion fără grăsimi, carne crudă tocată. Ca medicament se va prescrie: pulbere de *ipeca*, se va da *calomel*, fie în doze masive, fie în doze fracționate, *ulei* de *ricin*, din care se va da în ziua 1-a 40 gr., în ziua a 2-a 30 gr., și în celelalte zile câte 20 gr. până ce materiile fecale sunt normale. *Tratamentul* cel mai sigur este cu *serul anti-toxic al dizenteriei* care dă rezultate minunate.

Doică, (lat. *nutrix*), *mancă*. — În articolul despre *alăptare* am spus că este cu mult mai bine ca copilul să fie alăptat de mamă, sau în caz de neputință de o *doică*, decât să fie hrănit cu biberonul. Tot acolo am arătat și regimul pe care trebuie să-l urmeze o femeie care alăptează. Aci ne vom ocupa numai de *doică* arătând însușirile ce trebuie să le aibă ca să fie bună. *Alegerea unei doici* trebuie făcută cu mare băgare de seamă și numai după un examen minuțios (examinarea plămânilor, sângelui, sputei), făcut de un doctor atât femeii cât și copilului său. Se va examina și compoziția chimică și caracterele microscopice ale laptelui. Înainte de toate este de preferat o femeie delă țară și numai în caz de mare trebuință se va lua o doică din oraș. O doică trebuie să aibă etatea de 20—30 de ani, să mai fi avut un copil sau doi, căci în acest caz știe să îngrijească mai bine copilul, având o bună practică. Vârsta laptelui ei trebuie să fie pe cât se poate apropiată de a copilului pe care are să-l alăpteze, iar diferența să nu fie mai mare de 6 luni. Se va căuta o doică de constituțiune tare (forte), cu înfățișare sănătoasă și plăcută, să nu fie nici prea

grasă, nici prea slabă, să aibă *gura* bună și întreagă, ca să poată mesteca bine, gingiile să fie tari. Să nu aibă ghinduri pe la gât, nici pete, sau răni pe piele, *pieptul* să-i fie mare, bine dezvoltat, *sămurile* potrivite, nici prea mari, nici prea mici, iar *sfârcurile* să fie destul de mari pentru ca copilul să le poată prinde în gură cu înlesnire, fără să se obosească. Copilul doicii trebuie să fie sănătos, bine dezvoltat și în raport cu vârsta lui, să fie cu înfățișare veselă, cu pânțelele nici prea mare, nici tare. Dacă se întâmplă că doica se îmbolnăvește, sau își pierde laptele, sau este de o fire prea ciudată, trebuie înlocuită cu alta, căci copilul poate să schimbe mai multe doici fără să se îmbolnăvească, cu condiție însă ca ele să fie sănătoase și să aibă lapte bun. Doica nu trebuie să-și țină în același timp și copilul ei, căci va da în totdeauna să sugă mai mult acestuia, ci trebuie despărțită de copilul ei îndată ce a intrat în serviciu. Dacă doica este măritată, nu trebuie să se mai întâlnească cu bărbatul ei, căci rămânând însărcinată laptele i-se va împuțina. Doica trebuie să fie bine hrănită, să se poarte cât se poate de curată, primenindu-se des și făcând baie generală din când în când. Celor ce vor să citească mai multe despre doică le recomandăm cârticica: „*Cum să ne creștem copiii*” de Dr. I. Glăvan, din editura „Cartea Românească”.

Domolitoare (Medicamente). — V. *Calmante*.

Dormitor, cameră sau odaie de dormit. — Igiena cere ca dormitorul unei case se fie mare, cât se poate de mare, cu tavanul înalt, cel puțin de trei metri, să aibă aer curat și mereu primenit, prin urmare să aibă ferestre mari în raport cu mărimea lui, ferestre înalte de doi metri și largi de un metru, să aibă cuptor sau sobă, care de asemenea ajută la ventilație. Foc să se facă puțin în odaia de dormit și numai seara, iar nu și în cursul nopții căci produce durere de cap și greutate la respirație. În camera de dormit trebuie să fie cât se poate de puțin mobilier, numai strictul necesar; mobilele multe se umplu de praf și de microbi și împiedică aerul de a

circula. Alături de dormitor este bine să fie odăița de toaletă, unde omul să se desbrace și îmbrace, astfel nu va respira în timpul somnului toate mirosurile și microbii ce ies din hainele pe cari le-a purtat în timpul zilei. Patul, sau paturile, să fie astfel așezate ca să nu fie între ferestre și uși, să nu fie puse în curenți de aer, cari te pot răci în timpul nopții, când se întâmplă să te descoperi fără știință și lumina să nu vină în ochi când dormim.

Dorna. — Stațiune climaterică de munte situată în munții Sucevei, pe o culme de colină în satul Șarul-Dornei. Dorna se găsește la o depărtare de 130 km. de orașul Fălțiceni. Vegetațiunea de care e înconjurată se compune din întinse și seculare păduri de brazi, ceea ce face ca aerul să fie ozonizat. Înălțimea deasupra nivelului Mării Negre este de 1100 m. Tezaurul Dornei este izvorul cu apă bicarbonată *arsenicală*: *Apă de Dorna*. Clima este plăcută, constantă, aerul curat și uscat, localitatea scutită de vânturi, timpul admirabil de frumos în timpul verii; sunt puține zile ploioase. Temperatura mijlocie în Iulie și August (ziua) e de 20—26°, în Septembrie și Octombrie ea scade la 16—10°. Diminețile și seările sunt răcoroase, vara ca și toamna. Toamna e plăcută și foarte lungă ea durează până către sfârșitul lui Noembrie. Acolo se poate face o adevărată cură de aer ozonizat, de zăr și lapte de capră, prin împrejurimi fiind numeroase stâni; de asemenea băi reci în râul Dorna. Apa de Dorna este o apă minerală arsenicală naturală. Izvorul numit *Carmen Sylva* e situat în satul Șarul-Dornei. Apa e limpede, incoloră, inodoră, efervescentă, degajând acid carbonic. În contact cu aerul devine opalescentă (tulbure) din cauza sărurilor de fier (arseniate și fosfate) ce conține. Apa de Dorna poate înlocui cu succes apa de Roncigno, Levico, Bourboule. Se recomandă în boalele nervoase, în nevralgii și nevroze, în paludism, anemie, pelagră, boale de piele, gastrite, rachiism, oftica la început; scrofuloză, artritiism. Ca apă de masă, conținând o mare cantitate de acid carbonic (1.20/100), se poate bea

în locul apei de Vichy, Gieshübler, Borsec. Nu este bună în boalele acute, în general și cu deosebire în boalele de inimă și de plămâni. — Dela Dorna se pot face excursiuni foarte interesante la Dorna Vatra și Câmpulungul din Bucovina, apoi la satul frumos Broșteni și la Bistrița, de unde se pot face irumoașe plimbări cu plutele pe apa Bistriței.

Dos (lat. *dorsum*), *spate*. — Se numește astfel partea dinapoi a trunchiului, care se întinde dela gât până în șale. Spatele este format din șira spinării (columna vertebrală) și din capetele dinapoi ale coastelor. Când vertebrele formează în dreptul spatelui o rădicătură prea mare atunci zicem că omul este *cocoșat*. Pielea și mușchii spatelui sunt groși, după cum omul este mai gras sau mai slab, dar nici odată ei nu sunt așa de groși ca să nu se audă murmurul plămânilor când punem urechea să ascultăm respirația. Plămânii fiind destul de apropiați, ungerile cu tinctură de iod pe spate, ventuzele (paharele) și vezicătorile au mare influență asupra lor. Plăgile sau rănirile spatelui, fie cu un cuțit sau cu armă de foc, pot fi foarte grave când interesează plămânii. *Căderile și loviturile* (contuziunile) adânci mai ales când s'au rupt și din coaste sau columna vertebrală, pot fi iarăși foarte grave. Pe spate, mai ales în partea de sus, adeseori se ivesc *furuncule* și *antrax* (serpengea). Adeseori omul are dureri în spate, cari pot fi produse de mai multe cauze. Sunt dureri cari se însoțesc de febră, de tuse, etc. și atunci ele atârnă de o boală de plămâni, de pleură, de bronchii (*pneumonie*, *pleurezie*, *bronchită*, *oftică*) și durerile nu dispar decât odată cu boala. Alte ori durerile sunt trecătoare, apar și dispar repede, în același loc, sau în locuri diferite; în acest caz ele sunt de natură nervoasă și se chiamă *nevralgii*. Când durerile se mărginesc la mușchi avem *reumatism muscular*. Pentru toate aceste sunt bune ungerile cu tinctură de iod, muștar, fricțiunile cu spirit de trandafir, oțet de trandafir, spirit de camfor cu ulei de terbentină, balsam tranchil și la trebuință puncte de foc, sau o vezicătoare. Câte odată *durerea de spate*

nu vine din nici o boală, ci numai din oboseală, din stare prea îndelungată într-o poziție aplecată, cum se întâmplă la femeile cari coase mult, la bărbatii cari scriu, sau lucrează mult în aceeași poziție. Pentru a preîntâmpina această durere este bine să nu ne aplecăm prea tare când scriem sau cetim; prin aceasta se preîntâmpină și deviațiunile sau strâmbăturile spatelui.

Dospire. — V. *Fermentațiune*.

Dotienenterle (gr. *dothien*, mugure, nasture, boboc). — V. *Tifoidă* (Febră).

Dower (Pulberea lui). — Un amestec egal de ipeca, de opiu, de azotat și sulfat de potasă. Are acțiune calmantă și sudorifică. Doză: 5 ctgr. până la 1 gram. Se dă la gută, tuse, reumatism.

Doză (lat. și grec. *dosis*). — Cântitatea, sau câtimea unui medicament simplu, sau compus, care se prescrie, sau se dă de obicei în căutarea, sau tratarea boalelor. Doza variază după etate, sex, temperament, etc. Doza *completă* nu se dă de obicei decât la bolnavii dela 20 până la 60 ani, la copiii de 7 săptămâni se dă 1/16, la copiii mai mici de un an 1/12, dela 1 până la 3 ani, 1/6, dela 3 până la 7 ani 1/3, dela 7—14 ani 1/2, dela 14—20 ani 2/3. Rețeta, sau ordonanța doctorului, are însemnată în totdeauna doza în care trebuie să se dea medicamentul scris, doză însemnată de către farmacist pe sticlă, sau pe cutie, întotmai după rețetă. Bolnavul, sau cei ce îl îngrijesc, trebuie să dea medicamentul așa cum este scris, după cum a ordonat doctorul. Variind dozele unui medicament, variază și efectele lui și se poate să se obțină cu totul alt efect decât cel așteptat. Femeia, fiind de obicei de o constituțiune mai debilă decât bărbatul, va lua cam 2 treimi din doza acestuia. Dozele se prescriu în *linguri*, *lingurițe*, *păhăruș*, *picături*, *hapuri* (pilule), *buline* (capsule), sau *prafuri*, atâtea pe zi.

Drăcilă, *agriș roșu*, *drăgină*, *lemn galbin*, (*Berberis vulgaris*, fam. Berberidaceelor). În medicină se întrebuințează rădăcina, frunzele și fructele, cari sunt bune contra frigurilor. Se dă sub formă de extract alcoolic, sirop, suc, *după voie*. În popor dulceața fă-

cută din fructe se întrebuințează pentru durere de piept.

Dragavei, stevie (*Rumex crispus*, fam. Polygonaceelor). — Rădăcina acestei plante este bogată în fier (0.40 la 100) pentru care se dă în cloroză și anemina tuberculoasă, sub formă de praf,



Fig. 159
Drăcilă



Fig. 160
Dragavei

1—2 gr. pe zi și în buline de câte o jumătate de gr. — La țară frunzele tinere de ștevie se fierb și se mănâncă. Cu zeama de frunze și de rădăcină (pisată) se vindecă bubele dulci și pe-cinginea. Ceaiul de semințe, amestecat cu coajă de porumbel, se bea pentru vărsături.

Drastic (grec. *drastikos*, dela cuvântul *dran*, a lucra cu folos). — Purgativ sau curățenie foarte tare, care nu trebuie să se dea decât în cazuri grave și numai după porunca doctorului. Cele mai de căpetenie drastice sunt: jalapa, aloe, scamonea, uleiul de *croton*, semințele de ricin, etc.

Dren. — Tub de cauciuc, de gută-percă, sau de metal, destinat pentru a face *drenajul*, adică a sbici, a svânta, a usca o rană, o plagă, înlezniind scurgerea puroiului sau a lichidelor formate sub piele. Pentru a înlesni această scurgere, drenurile, sau tuburile de drenaj, sunt găurite din distanță în distanță. Ele trebuiesc păstrate într-o soluție *antisepctică*.

Dres. — V. *Fard*.

Drojii, drojii de bere. — V. *Bere* (Drojide de) și *Fermentațiune*.

Dropică. — V. *Anazarcă, Ascită*.

Dropică la cap. — V. *Idrocefal*.

Dubolzină. — Se găsește în *Duboisia myoporoide* (Solaneae). Lucrează ca și *atropina*. Contra otrăvirii cu duboizină se recomandă cafea neagră tare. Se

dă în doza maximală de 1 miligram.

Ducă-se pe pustiu. — V. *Epilepsie*.

Dudaie. — V. *Cucută*

Duh, duhoare. — V. *Alenă*.

Duhan. — V. *Tutun*.

Dulceață. — Dacă fierbem pulpa diferitelor fructe cu zahăr, timp mai îndelungat, apoi o lăsam să se răcească, ea se întărește, ia o consistență semi-solidă și atunci avem *dulceața* propriu zisă. Dacă se întrebuințează numai sucul, sau zeama fructelor, avem ceea ce se chiamă *peltea*, iar dacă fierbem fructele numai pe jumătate, așa că ele își păstrează forma și consistența, avem *chisălița*, sau *compotul*. Dulceața îngroșată ca o alifie se numește *șerbet* (de trandafiri, de vișine). Dintre toate aceste feluri de dulceață, *peltea* este cea mai bună pentru stomacurile slabe, pentru convalescenți, Dulceața luată la sfârșitul mâncării, în măsură mică, este bună, căci ușurează mistuirea. Se înțelege dela sine că cei ce sufar de diabet și de obezitate nu trebuie să mănânce de loc dulceață, nici alte lucruri preparate cu zahăr, cari îngrașe.

Dumbăț, buruiiană de spulberături, jurgărel, spulburătură (*Teucrium chamaedrys*), fam. Labrietelor. — Plantă care crește prin tufișuri, pe marginea pădurilor, prin locuri pustii și pietroase. În medicină se întrebuințează vârfurile înflorite ca excitant, amar, tonic, sub formă de ceai. din 10—20 la 1000, de praf: 2—8 gr., extract: 2—4 gr. — La țară se dă pentru durere de piept, sub formă de ceai, câte trei cești pe zi; pe dinafară se fac spălături, la abecesele de măsea.

Durău. — Schit de călugări la poalele Ceahlăului, lângă satul Hangu, județul Neamț, la înălțime de 800 m. Localitatea climaterică alpină și de vilegiatură, foarte mult vizitată în timpul verii. Clima dulce, lipsită de curenți, temperatura medie vara 16°.

Durere (lat. *dolor*). — Simțirea de durere este produsă de ceva din afară, care lovește, înțeapă, taie sau arde o parte a corpului, sau ea se află într'un organ adânc, care devine dureros din cauza unei boale interne (durere de cap, durere sau crampe de stomac, colici de ficat, colici de intestine, etc.).

DURE

Cauzele durerii sunt multe și variabile, durerea variază în ceea ce privește sediul, natura și intensitatea ei. Durerea este simțită de creier, deși nouă ni-se pare că o simțim acolo de unde pleacă, la locul lovit, tăiat, ars, etc. Durerea este : *greoaie*, care ne dă simțirea de greutate și arată o inflamație; *svâcnitoare*, arată începutul unei supurațiuni (facere de puroiu), unui abces; *pulsativă*, care ne dă simțirea de bătaie, cum sunt bățile pulsului, în partea inflamată (aprinsă); *surdă* care este caracterizată printr'o simțire de greutate neplăcută; *străpungătoare*, în care ni se pare că partea dureroasă ar fi străpunsă, sau sfredelită printr'un corp oarecare și alte multe feluri de dureri, asupra cărora nu vom mai stărui. Medicamentele întrebuițate contra durerii se numesc : *anestezice*, *calmante* și *narcotice*, despre cari nu ne ocupăm aci, de oarece indicațiunile și modul de întrebuițare, deosebindu-se după natura și sediul suferinții, vor fi arătate când se va vorbi despre diferitele boale cu dureri și despre organele în cari se află localizată durerea.

Durere de cap, cefalalgie. — Durerea nu este o boală propriu zisă, ci un semn al multor boale și al multor stări bolnăvicioase; ea poate să se simtă în pielea capului, în mușchi, în oase, poate să se localizeze pe traiectul unor nervi și să atârne de o simplă nevralgie, sau de vreo turburare circulatorie a creierilor, sau meningelor. Durerea de cap poate fi *difuză*, atunci când ocupă tot capul, deși este mai tare în frunte și la tâmpile (febră, anemie, congestiune cerebrală, etc.) și în aceste cazuri orice mișcare a capului este foarte dureroasă, pe câtă vreme liniștea domolește durerea, nelăsând decât numai o greutate la cap. Mai poate fi *circumscrișă* adică să se arate numai într'o parte a capului, fie în vârf (isterie), fie în diferite puncte dela frunte spre ceafă (meningită, sifilis, leziuni intra-cerebrale, etc.). Când durerea de cap este foarte tare, circumscrișă și persistentă, ea se numește *cefalee*. Uneori durerea de cap se arată numai la o jumătate a capului și atunci avem ceea ce se numește *migrenă*. Durerea de cap, sau *cefalalgia*,

DURE

este foarte variată; ea este generală (peste tot capul), însoțită de greutate la cap, de svâcnituri dureroase și de bătaie, în *congestiunea cerebrală*. Este foarte vie și însoțită de contracțiuni musculare, provocând țipete sfâșietoare în *meningita acută*, în *meningita tuberculoasă*. Este difuză și foarte variabilă ca intensitate și durată în *înmoierea creierilor*, este localizată și mai tare noaptea, în *sifilis*, este localizată și provocată prin apăsare în unele puncte determinate în *erizipel* brăncă, în *nevralgiile faciale*. Toate *febrele* se însoțesc de dureri de cap, a căror intensitate și durată sunt foarte variabile. În *febrele eruptive* (pojar, scarlatină, vărsat, etc) cefalalgia cele mai adeseori se arată înainte de erupție. Durerea de cap mai poate fi provocată de otrăvirile cu narcotice, de abuzul de tutun, de aburii de cărbune, de luarea chininii sulfurice și ea poate fi adeseori foarte tare și de lungă durată. În *nevroze* și mai cu seamă în *isterie*, cefalalgia localizată în vârful capului, este aproape caracteristică. Durată, intensitatea și localizările cefalalgiei sunt foarte variabile după indivizi. Cei mai supuși la durere de cap sunt cei ce sufăr de anemie, de artrism și de boale nervoase. Cei ce au turburări digestive (dispepsie, indigestiune, constipație, etc.) deasemenea pot avea durere de cap, care de altminterlea nu lasă să treacă nici cel mai mic *guturaiu*, sau *tusă*, fără să nu chinuiască și ei pe bolnav. Din toate acestea se poate constata că cefalalgia nu are mare importanță în cunoașterea, sau în diagnosticul boalelor; pe lângă durerea de cap trebuie să mai ținem seamă și de alte semne, pentru ca să putem cunoaște boala de care suferă cineva. Durerea de cap singură, oricât de tare ar fi, nu este gravă prin sine însăși, ci totul atârnă de împrejurările în cari se ivește. — **Tratament.** O durere de cap nu se poate vindeca, nici ușura, decât tratând starea generală, sau boalele cari o produc, prin urmare totdeauna trebuie căutată mai întâiu cauza și apoi să se institue un tratament potrivit. Vom recomanda bolnavului odihnă completă, atât fizică cât și morală, într'o odaie curată, lăsându-l să doarmă

puțin, apoi îi vom da ceaiu cald și aromatic (de mușătel, de teiu, foi de portocale, etc.), îi vom pune la cap cârpe muiate în apă rece. Il vom pune să facă la picioare bae foarte caldă și cu muștar, îi vom da : antipirină, fenacetină, piramidon, antifebrină, chinină, aspirină, etc. Acest tratament este foarte bun când durerea de cap este *simplică*, când ea este singură fără de alte semne, precum și în cazurile de *migrenă* și de *nevralgie*.

Durere de rinichi. — Se confundă de multe ori cu *durerea de șale*, sau *lumbago* (vezi acest cuvânt). Regiunea rinichilor se află în partea de jos a regiunii dorsale și poate fi dureroasă în mai multe împrejurări. De multe ori așa zisa durere de rinichi nu este decât un simptom al unor boale : gravelă și colică nefretică, nefrită, nevralgie, sciatică, vărsat, o boală de măduva spinării, etc., sau ea există singură, de sine stătătoare, și atunci este numai o durere reumatică de mușchi (vezi *Lumbago*), care de multe ori poate dura mult timp, devenind cronică sub influența frigului, a umezelii, etc.

Durere de șale. — V. *Lumbago*.

Duș. — Prin acest cuvânt se înțelege o coloană de apă, sau de aburi, cari isbește cu o putere variabilă o parte a corpului, cu scopul de a schimba impresiunile periferice, de a întări forțele, sau a determina unele reacțiuni locale. Dușurile : *generale și locale*. Între cele *generale* avem : 1. *Duș în formă de ploaie*, în care apa cade dintr'o stropitoare cu găurele multe și mici de un milimetru diametru. Stropitoarea aceasta este cam la o înălțime de 3 metri deasupra podelii pe care stă bolnavul. Aceste dușuri stimulează organismul, dar produc câte odată accese de sufocațiune, pentru care trebuiesc făcute cu băgare de seamă. Înainte de dușuri este bine să facă omul un exercițiu moderat și să facă baie caldă de picioare. După duș omul trebuie fricționat, sau să i-se facă masaj, apoi să se îmbrace și să meargă la plimbare. Durata totală a unui duș în ploaie, făcut cu apă rece, nu trebuie la început să treacă de 12 secunde. Dacă apa rece este cu greu suportată se poate face duș cu apă caldă, de 15—20°. 2. *Duș în coloană*, se face

îndreptând spre suprafața corpului, afară de cap și piept, o coloană de apă dintr'un tub cu un diametru de 2 centimetri. 3. *Duș în formă de lame concentrice* se face cu o stropitoare ale cărei găurele sunt înlocuite prin două despicături circulare, concentrice, cu deschizătură de 1 milimetru fiecare ; înlocuiește cu succes dușul sub formă de ploaie. 4. *Duș în formă de cerc*, sau *de praș*, se face cu un aparat compus din 9—10 cercuri de metal, suprapuse în mod orizontal pe o coloană verticală, depărtate între ele de 12—15 centimetri și având fiecare o mul-

țime de găurele de câte un milimetru. Fiecare cerc poate funcționa separat. Aparatul este în general completat cu un duș în formă de ploaie. Acest fel de duș este foarte excitant și nu trebuie făcut decât după porunca doctorului.

5. *Dușul mobil*, care este forma cea mai întrebuintată, se instalează foarte ușor adaptând un tub de cau-



Fig. 161. — Duș

ciuc, de lungimea voită, la conducta de apă. Acest tub are la extremitate un robinet, la care se poate fixa un aparat pentru stropire, sub formă de ploaie, de evantai, etc. Temperatura apei în acest duș poate fi caldă sau rece în mod alternativ. Operatorul, ținând în mână tubul de cauciuc al aparatului, plimbă aruncătura apei pe diferite părți ale corpului, putând face astfel un duș general, sau local. Bolnavul trebuie să stea cam la 2 metri de operator. — *Dușuri locale* sunt acele ce se îndreaptă spre diferite regiuni ale corpului. Astfel sunt dușurile cari se aplică în regiunea ficatului, a splinei, în regiunea anală și chiar asupra mitrii ; dușul *ascendent* în care apa vine de jos în sus, este un fel de clismă forțată,

făcută cu un tub în raport cu o coloană de apă. Dușurile se împart în : *temperate*, cu apă caldută, *reci*, cari se întrebuințează mai mult ; *scofiante*, cari constau într'un duș cu apă caldă urniat îndată de un duș cu apă rece, cel dintăiul prelungit și ajungând gradat până la cea mai înaltă temperatură suportabilă, iar al doilea mai scurt și urmându-i fără întrerupere, duș *alternativ*, aplicațiune de mai multe ori repetată de un duș cald și de un duș rece, amândouă de durată scurtă și egală. Pentru duș rece apa va avea 10—13°, nici odată mai puțin de 8°, dacă nu vrem să fie dureroase și reacțiunea dificilă. *Puterea* cu care apă izbește corpul trebuie să fie potrivită după starea de impresiune a bolnavului și după efectele pe cari vroom să le obținem. *Durata* trebuie să fie foarte scurtă, mai ales la început : un sfert de minut, o jumătate de minut, pentru ea să nu determine sufocațiune și nu trebuie să prelungim durată dacă respirația se face greu. În general dușurile trebuiesc făcute pe *nemâncate*. Efectul dușului este mai bun când omu-

lui îi este cald, sau e chiar puțin înădușit. Dușurile reci măresc activitatea tuturor funcțiunilor, a tuturor organelor, atât ale digestiunii, cât și ale sistemului nervos și ale mușchilor, pe cari îi fac mai mlădioși și mai puternici. Întăresc organismul și îl ajută să suporte căldurile mari din timpul verii. Nu vor face duș bătrânii, nici cei cu temperament nervos supraexcitat, nici cei ce au tuse obositoare. Vor face însă duș acei ce au o *constituție slabă, debilă*, fără boală organică determinată, cărora le convin mai ales dușurile în formă de ploae, sau de sulită (lance). Dușurile sunt foarte bune în *anemie* și *cloroză*, la cei tineri și *limfatici*. Se recomandă mult în *alienația mentală* (nebunie), mai ales când se fac cu socoteală și moderat, calmând furia maniacilor. Sunt bune în multe *boale nervoase* (isterie, nevroze, atacuri de nervi), în nevralgii, *reumatism cronic*, în înțepenituri de închieturi, de asemenea și în unele umflături de ficat, de splină. Nu sunt bune dușurile în boalele acute, boale de plămâni și de inimă.

E

Eberth (bacilul lui).—V. *Febră tifoidă*.

Ebrietate (lat. *ebrietas*, beție). — Este o stare de beție ușoară, care seamănă cu amețea și clătinarea picioarelor, produsă de congestiunea cerebrală (îngrămădirea sângelui la cap), sau de boalele de stomac.

Echimoză. (gr. *ek*, afară, și *chymós*, suc.), *vânătăie*. — V. *Contuziune*.

Echitațiune, călărie. — Călăria este un bun exercițiu, căci ea, prin mișcările și sdruncinările ce le produce în corpul călăreților, înlesnește dezvoltarea mușchilor, mărește pofta de mâncare, întetește mistuirea și respirațiunea. Pentru ca să fie cu adevărat bună, călăria trebuie făcută în aer liber, iar nu în *maneaj*, unde atmosfera se strică cu înlesnire. Călăria, ca ori și ce lucru, își are și partea rea ; ea produce rosături și sdrcliri la șezut, mai ales când șeaua nu este bună, sau calul are mers rău, înlesnește ivirea (emoiziilor). La femei poate produce boale de mitră și lepădături, etc.

Eclampsie (gr. *eclampsis*, ivire repede, fără veste). — Această boală se arată prin convulsii (spazme) și contracțiuni (sgârciuri) cu pierderea cunoștinții. Despre *eclampsia copiilor* am vorbit la *convulsii*. Aci ne vom ocupa de *eclampsia femeilor*, care este o boală foarte gravă, dar din fericire foarte rară. Ea se poate ivi în timpul sarcinii, în cursul nașterii sau după naștere și se arată prin unul sau mai multe accese convulsive, urmate de încetarea vremelnică a mișcării și a inteligenței. Semnele premergătoare ale atacului de eclampsie sunt : o durere foarte mare și foarte perzistentă, (ținând uneori mai multe zile), durere care se simte deasupra ochilor și poate fi câte odată însoțită de greață, de vărsături, de amețeli, de vâjiituri de urechi, de surzenie, de întunecarea vederii. Nu se știe precis *cauza eclampsiei*. Azi se crede că este o intoxicare generală a organismului cu substanțe ce se formează în corpul femeii însăși

la schimbul de substanțe placentare, substanțe cari atacă ficatul și rinichiul care, ne mai funcționând bine, le rețin în trupul femeii și astfel o intoxică. — *Tratament*. Pentru ca să preîntâmpinăm boala se recomandă, a examina în totdeauna urina unei femei însărcinate cel puțin în timpul din urmă al sarcinii și mai ales când ea se plânge că i-se umflă pleoapele și picioarele. Când se ivesc, pe la sfârșitul sarcinii, vărsături, dureri de cap mari, trebuie să ne gândim la un acces de eclampsie; este bine de a pune femeia în pat, cu capul mai jos de cât picioarele, pozițiune care de multe ori este de ajuns ca să previe atacul. Când eclampsia a izbucnit se recomandă o clizmă purgativă urmată de o clizmă cu cloral idrat (4 gr.), băi calde prelunge de o jumătate de oră, iar pentru ca bolnava să nu-și muște limba i se va pune o batistă îndoită de mai multeori între dinți, împingând limba înapoi. Dacă accesul se prelungește se va face o injecție cu morfină. Intre accese: regim lactat absolut, băi calde prelunge, purgative saline sau drastice, sudorifice și diuretice, inhalațiuni de oxigen, cloral asociat cu bromur de potasiu. În caz de comă: luare de sânge din vine (venesecție) de 300—500 gr., uneori urmată de injecțiune intravenoasă de ser artificial, sau mai bine injecțiuni subcutanate cu acest ser. Când facerea întârzie trebuie grăbită, lărgind colul, dacă este de trebuință, aplicând forcespul, sau făcând craniotomia, după cum se prezintă cazul. Dacă mama a murit și copilul încă trăește, acesta se va extrage sau cu forcespul, sau făcând operația cezariană, post mortem.

Ectasie (gr. *ectasis*, dilatație). — Se zice despre un vas de sânge că este ectasic, sau ectasiat, când s'a dilatat. Prin ectasia organelor care prezintă o cavitare, în interiorul lor se înțelege acelaș lucru: ectasia aortei, a esofagului, etc.

Ectima (gr. *ekthyma*, erupțiune, isbucnire). — O boală de piele cu mersul repede care se arată sub formă de pete mici roșii, în număr mic, cari se transformă repede în niște beșicuțe pline cu puroiu. Aceste beșicuțe (pus-

tule) au o mărime dela aceea a unei gămălii de ac până la a unui bob și după câteva zile se rup formând o coajă închisă sau gălbuie, în urma căreia rămân semne (cicatrice indelebile) ca după vaccinat. Ectima, la început, se însoțește de mâncărime și uneori de o mică febră (fierbințeală). Această boală este microbiană și se întinde prin contagiune, mai ales la persoanele slabe (copii, bătrâni); se ivește de obicei la mâini, picioare, fese. — *Tratament*: spălături antiseptice (cu acid fenic, sau sublimat coroziv), mai ales după ce au căzut cojile, după care se presară praf de iodoform, de aristol, etc. Pe dinăuntru se recomandă tonicele.

Ectopie (gr. *ex*, afară și *topos*, loc). — Se cheamă schimbarea locului, unui organ. Când stomacul, sau inima de pildă, se scoboară mai jos din locul unde trebuie să fie, se zice că avem o ectopie a inimii, sau a stomacului.

Ectropion (gr. *ek*, în afară, și *trepein*, a întoarce). — Intoarcerea în afară a pleapelor, din pricina unei cicatrice vițioase, a conjunctivitei cronice, sau în urma unei contracțiuni, ori paralizii, a mușchiului orbicular. Această boală nu se vindecă decât prin operație.

Eczemă (gr. *ekzema*, fierbere), *bube dulci*. — Este una din boalele cele mai răspândite ale pielei, care are mai multe forme și se vindecă de multe ori foarte greu. La unele persoane eczema se arată numai printr'o roșeață cu umflarea pielei (*eczema eritematoasă*), sau prin niște beșicuțe tari, mari cât gămălia de ac, palide sau roșii, cari pier după 2—3 zile (*eczema papuloasă*). Când căderea solzilor epidermului, care se face în urma acestor două forme, se prelungește prea mult, se zice că eczema este *scuamoasă*. Acestea sunt formele cele mai ușoare (benigne) ale eczemei. Cele mai adeseori beșicuțele sunt foarte dese, apropiate unele de altele și conțin un fel de apă gălbue, lipicioasă, care înăsprește rufăria (*eczema veziculoasă*). Aceste beșicuțe se pot turti și să intre în piele (să se resoarbă) sau să se spargă și apa din ele să curgă (*eczema umedă*). Această apă în atingere cu aerul se usucă formând coji (cruste)

ECZE

EDEM

galbene (*eczema crustoasă*). În unele cazuri grave apa secretată după formarea cojilor se transformă în puroiu verzui, rupe cojile și iese afară, având o înfățișare urâtă (*eczema impetiginosă*). Oricare ar fi forma, sau varietatea, eczema în totdeauna este însoțită de *mâncărime*, foarte supărătoare pentru bolnavi, cari se scarpină, rup cojile și își măresc astfel boala și suferința. Aceste forme de eczemă pot să se ivească în același timp și la aceeași persoană, prezentând diferite modificări, după locul pe care îl ocupă. Eczema se poate dezvolta în câteva săptămâni, sau se poate prelungi timp de mai multe luni și chiar ani, dispărând uneori pentru a se ivi din nou mai târziu, sub aceeași formă, sau sub alta. Eczema se poate complica, mai cu seamă la sugaci și la copiii mici, de *impetigo* (*eczema impetiginosă*). — *Cauzele* sunt multe: limfatismul, scrofulele, constipația, anemia, artrismul, diabetul, etc. Toate acestea sunt cauze cari predispun la ivirea acestei boale. Eczema impetiginosă pare a fi contagioasă. Intrebuintarea fără socoteală și prea mult timp a unor substanțe iritante, cum sunt terebentina și arnica, sau muștarul este, de multe ori, cauza eczemei. — *Tratament*. Pentru a preveni ivirea boalei se recomandă să nu se facă abaterii dela regim, să nu se mănânce cârnuri afumate și sărate, carne de porc, să nu se bea cafea, băuturi alcoolice. *Tratamentul general* al boalei variază după temperamentul bolnavului, tratând cauza care a produs-o. *Tratamentul local* comun constă în a se feri de tot ceea ce poate mări inflamația și mâncărimea, de orice apăsare sau frecare de haină; căldura și sudoarea face rău. *La început*, în formele *eritematoasă*, *papuloasă* și *veziculoasă*, se va presăra *puđră* de: amidon 100 gr., talc 20 gr., oxid de zinc 10 gr. *Indoiturile* (*încręțiturile*) pielei se vor depărta între ele prin cărpe, sau vată, pline cu această puđră, cari se vor reînoui de 2 ori pe zi. În cazurile de eczemă *umedă*: cataplasme de feculă (de cartofi) sau comprese cu acid boric, acoperite cu o pânză subțire, de cauciuc vulcanizat. Dacă eczema *zămuește* mult se va aplica o cărpă

găurită, unsă, cu liniment oleocalcar. *La cap* se vor face pulverizații cu apă boricată călduță timp de 10 minute, iar ca să cadă cojile se vor unge cu vaselină boricată. Când *nu mai e roșeață* se va unge cu: amidon curat 10 gr., glicerină 40 gr., sau cu vaselină boricată. În eczema *scuamoasă* vom pune oleu de cadiu 5 gr. cu oleu de migdale dulci 10 gr.; mai târziu vaselină boricată tot la 2 zile. Dacă *mâncărimea este foarte mare* se va unge mai întâiu cu: acid salicilic 1 gr., spirt de vin 150 gr., tinctură de lavandă (leventică) și apă de Colonia câte 24 gr. din fiecare, glicerină 2 gr.; apoi se va presăra puđră cu amidon (scrobeală) mai sus arătată. Tot în aceste cazuri de mâncărime mare se mai recomandă să se ude părțile atinse cu: acid picric 5 gr., apă 1000 gr.; mâncărimea dispare repede și se formează un fel de coajă sub care vindecarea se face în câteva zile. Iată cum se întrebuințează soluția cu acid picric: se unge tot la 2 zile partea bolnavă și se acopere cu cărpe muiate în această soluție și stoarse bine, apoi pe deasupra se pune vată și se leagă. În contra mâncărimei se mai recomandă și cărpe înmuiate în *apă oxigenată*, mai ales când eczema este în jurul sau în apropierea șezutului. — *La țară* se crede că eczema vine din *spurc*, sau *spurcăciune* și se vindecă cu unsoare de piatră vânăță arsă în foc și amestecată, după ce s'a făcut praf, cu groștior sau se ia fasole, bucăți de postav și piatră vânăță, se ard în foc, se pisează la un loc, se amestecă cu smântână și se ung bubele, până ce cad, sau cu unt de vită proaspăt topit la foc, cu tămăie într'o lingură de tinichea până se topește tămăia.

Edem (gr. *oidema*, dela *oidein*, a îngroșa, a se îngroșa), *buhăială buhav*. — Prin cuvântul *edem* se înțelege un fel de umflătură, mai mult sau mai puțin moale, care nu este durerioasă, fără să se înroșească pielea și care este produsă printr'o infiltrație de serozitate (un lichid ca apa) în țesutul celular de sub piele, sau în țesutul celular din adâncime, mărginită la o parte a corpului, sau în țesutul organelor interne (plămâni, etc.). Când edemul este întins peste tot corpul (generalizat), el

se numește *anazarcă*. Când edemul se află numai la pleoape, el ne arată că avem a face cu o boală de *rinichi* (Morbil lui Bright), iar când se află la picioare trebuie să ne gândim la o boală de inimă, sau la varice. Dacă e vorba de un ofticos, sau de un canceros, edemul la picioare ne prevestește că sfârșitul omului nu este departe. Cei ce iau mult timp *arsenic* se umflă la față (edem la pleoape). — Serozitatea, sau apa edemului, este limpede, puțin citrină (de culoarea lămâiei), cu reacțiune alcalină; ea cuprinde puțină albumină și sare, n'are fibrină. Ea se infiltrează în ochiurile țesutului celular, pe care îl transformă într'un fel de masă



Fig. 162.— Edem al mânei, provocat

din aceea parte sunt întotdeauna lărgite; dacă apăsăm cu degetul pe pielea regiunii edemațiate rămâne în acel loc o gropiță care ține câțva timp. Apa edemului este apa sângelui care iese din vase în urma unor turburări ale circulației sângelui, sau ale circulației limfatice, sau în urma alterațiilor discredite ale sângelui, așa că edemul poate fi produs de o mulțime de boale, unele mai grave decât altele din care cauză și tratamentul lui variază după cauză. Edemul se micșorează dacă dăm părții umflate o pozițiune ridicată, sau dacă facem pe aceea parte o compresiune metodică. În cazurile când pielea este prea întinsă se pot face înțepături cu acul

sau cu un vârf de bisturiu, pentru ca să curgă apa. Dintre medicamente se dau cu succes diureticele (cari fac ud mult) și purgativele (curățeniile); uneori se recomandă medicamentele tonice și reconstituante. — *Edemul glotei* constă în infiltrația cu serozitate, sau cu puroiu, a mucoasei (căptușelii) glotei și a îndoiturilor cari merg dela sgârțurile aritenoide la epiglotă și dela epiglotă la limbă (vezi *Laringe*). *Semnele* sau *simptomele* acestei boale apar foarte repede și cu mare furie în unele cazuri, alteori apar mai domol. Ele constau într'o simțire de un corp străin care sugrumă (strânge de gât); *greutate crescândă în respirație* care se agravează în unele minute prin accese de sufocațiune cari țin 10 până la 15 minute și în cari bolnavul cu fața vântată, cu gura deschisă, cu nările lărgite, cu ochii lăcrămânzi și bulbucăți, cu pielea plină de sudori reci, caută toate mijloacele ca să-i intre aer în piept. Inspirația este cu mult mai grea decât expirațiunea. Aceste accese sunt provocate printr'un spasm al glotei. Vocea și tusa sunt acoperite, răgușite, înghițirea anevoioasă. *Cauzele* sunt: răceala, arsurile prin lichide fierbinți, boalele de rinichi (nefrită cronică sau morbul lui Bright, nefrită scarlatinoasă, nefrită dela otrăvirile cu plumb), erizipelul (brânca) faringelui (înghițitoarei), cancerul, oftica, și sifilisul gâtului (laringelui). *Tratament*: se va da un *purgativ* drastic, se vor pune pe gât *revulsive* (muștare, vezicători, puncte de foc), băi de muștar la picioare, se va lăsa sânge local (lipitori, ventuze tăiate), se vor face scarificațiuni pe mucoasa edemațiată, apoi pulverizațiuni calmante, sau astringente. Se va da pe dinăuntru: alcoolatură de rădăcini de aconit 2 gr., sirop de muguri de brad 100 gr., sirop diacod, 100 gr., la fiecare ceas câte o lingură; vom da bolnavului să respire aburi de apă încărcată cu *cloroform* (40 picături la 500 gr., apă de 65°, adăugând la fiecare 5 minute tot atâtea picături, până la sfârșitul accesului). În caz de nereușită vom face *tubajul* sau *tracheotomia*.

Edem alb dureros sau *phlegmatia alba dolens*. — Această boală constă într'o umflătură dureroasă a unui mem-

bru, de obicei a unui membru inferior, în care pielea rămâne tot albă. Cauza ei este un chiag de sânge (trombus) care se formează într-o vână oarecare, care chiag împiedecă circulația sângelui și dă naștere la umflătura acestei părți a corpului. Acel chiag se poate întinde încetul cu încetul până să ajungă în *vena cavă*, sau se poate îmbucătăți dând naștere la *embolii*, urmate de moarte repede. Sub influența unui tratament bun boala se vindecă cele mai adese ori. Această boală se observă foarte des la femeile lehuze, la cei ce sufăr de oftică, de cancer, de febră tifoidă, de supurațiuni abundente, etc. — *Tratament*. Membrul bolnav se va ține în poziție orizontală, sau puțin ridicată; se va înveli în vată și se va așeza într-o *gutieră*, fără să se frece, fără să se facă masaj. Bolnavul nu va face nici o efortare și nu se va mișca de loc. În contra febrei se va da chinină cu fenacetină, câte 30 ctgr. din fiecare, de trei ori pe zi. Regim de lapte, supă, apă cu vin. Bolnavul nu se va scula din pat și nu va umbla decât numai după o lună dela trecerea boalei. Când edemul persistă și după aceea, bolnavul va purta ciorap elastic.

Efelide (gr. *epheleis*, dela *epi*, din cauza, și *helios*, soare), *pistrui*. — Sunt niște pete galbene, brune, netede și la nivel cu pielea din jur, rotunde sau neregulate, mari cât un bob de meu și uneori mai mari, ajungând la mărimea unei monede de 50 bani, când se unesc mai multe la un loc. Ele se ivesc în părțile expuse la soare, față, gât, mâini și nu produc mâncărime. În timpul iernii pier și primăvara reapar, fiind produse de soare și de vânt. Mai expuse sunt persoanele limfatice. Se ivesc uneori la femeile însărcinate. *Tratament*. Pentru a preveni ivirea acestor pete omul trebuie să se păzească de soare îndată ce începe primăvara, purtând pălării cu marginile late, cocoanele văluri de un țesut mai gros și strâns, lăsate liber în jurul feței ca să nu producă congestie la față. Nu se va da arsenic, nici nitrat de argint, nu se vor atinge petele cu tinctură de iod, nu se vor pune vezicători, nici puncte de foc. Se va trata anemia, cloroza, dispepsia, scro-

fulele, boalele de mitră. *Local*, se vor fricționa petele cu o soluțiune de sublimat corosiv 1 gr. alcolat de lavandă (levăntică) 150 gr. apă 350 gr. Se mai pot face spălături cu soluțiune de cloridat de amoniac, sau cu ceai de pădăie, iar pentru noapte să se ungă petele cu alifia următoare: acid salicilic 30 ctgr. oxid de zinc 3 gr., praf de lycopod 3 gr., vaselină, lanolină, din fiecare câte 10 gr. esență de violele 5 picături. Dacă cu acestea nu trec se va recurge la apă oxigenată și la acid fenic (1 la 10 sau 1 la 5).

Electricitate (gr. *electron*, chihlibar, succin). — Este un agent fizic a cărui natură nu ne este cunoscută, care se manifestă prin a atrage, sau a respinge corpuri ușoare și care are însușirea de a excita sistemul nervos. Descoperirea electricității s'a făcut prin veacul VII înainte de Christos, de către învățatul Thales. În medicină și chi-




Fig. 163. — Aparat pentru produs electricitate faradică

urgie ea se întrebuințează pentru a recunoaște și a trata diferite boale. Natura intimă a fluidului electric nu se cunoaște. Se admite însă că sunt două fluide electrice: un fluid *pozitiv* și unul *negativ*; fiecare corp conține amândouă electricitățile în mod natural, însă în stare latentă, în cantități egale, cumpănindu-se una cu alta. Electricitatea se întrebuințează în medicină mai cu seamă în *boalele nervoase*, și ceea ce se caută sunt sgudiviturile pe cari ea le imprimă corpului omenesc și cari, prelungindu-se mai mult timp, scot partea bolnavă din nemișcarea-i bolnăvicioasă, astfel electricitatea se recomandă în *paralizii*. Pentru a mărgini puterea electrică în mod exact asupra unui nerv sau mușchiu, este de ajuns ca să aplicăm pe regiunea în care se află acel nerv, sau mușchiu, cele două fire cari aduc curentul dela pilă, după ce am udat

pielea acelei regiuni cu apă sărată, pentru a înlesni trecerea curentului. Atunci se produc în acea regiune mișcări și o sensibilitate determinată, fără să se producă scântei sau arsuri. Putem cunoaște gradul paraliziei cu ajutorul electricității: dacă electricitatea provoacă contracțiunea mușchilor, cari nu se mai pot mișca prin ei însăși, din cauză că lipsește acțiunea creierului, paralizia este mai puțin gravă decât în cazul când trecerea curentului nu mai provoacă nici o contracțiune, nici o mișcare și în cazul întâiu paralizia se poate vindeca. În acest caz forțând mușchii să se întindă și să se contracte în fiecare zi, electricitatea îi face să-și reia slujba lor naturală, îi împiedecă




Fig. 164. — Bae electrică pentru mâni și picioare

să se imobilizeze cu totul, grăbește minutul în care ei vor lucra prin ei însuși. Electricitatea lucrează tot așa de bine și când nervii sunt atinși, paralizați, ea face să reapară sensibilitatea pierdută odată cu mișcarea. Se mai întrebuințează în diferite *nevralgii*, în contra durerilor, în *reumatismul* cronic pentru a da libertate în mișcarea încheieturilor, etc. În *asfixie*, în sincopă (leșin), în accidentele produse de *cloroform*, electricitatea este de mare folos, căci ea restabilește respirația, care este pe drum de a se stânge. În chirurgie electricitatea se întrebuințează într-o mulțime de cazuri: pentru a căuta un corp metalic în corp, glonț, un nasture de haină, etc., cari au putut să pătrundă în corp

printr'o plagă produsă prin armă de foc. — Se întrebuințează electricitatea în vindecarea fistulelor, a anevrismelor, a tumorilor de orice natură, vindecare ce se obține prin producțiunea căldurii, înlocuind în multe cazuri fierul roșu. Din acestea se vede cât de multe sunt cazurile în cari se poate întrebuința cu succes electricitatea. Abuzul care se face de multe ori cu tratamentul electric este tot așa de rău și de vătămător ca și abuzul de medicamente. De altfel trebuie să se știe că electricitatea nu se poate întrebuința decât după porunca doctorului și nu se poate aplica decât de doctor, sau de o persoană cu știință și practică, sub controlul doctorului. *Accidentele produse de electricitate.* Când corpul omenesc este străbătut de un curent electric de o intensitate prea mare, sgueditura poate fi așa de puternică în cât vieța sa înceteze prin această electrocuție. Despre accidentele determinate de electricitatea din atmosferă ne vom ocupa în alt loc (v. *Aer și Trăsnet*), aci vom vorbi numai despre accidentele produse de curenții electrici. Se pot prezenta mai multe cazuri: în primul caz *când a încetat orice contact între victimă și conductorii*, vom recurge la tratamentul asfixiei, adică vom face tracțiuni ritmice ale limbii și respirație artificială (v. *Asfixie*), vom prelungi tratamentul o oră și jumătate, salvându-se în acest mod oamenii cari au primit curenți de 4500 volți în timp de mai bine de jumătate de ceas. În al 2-lea caz, *când victima este încă în contact cu conductorii electrici*, și în care cel dintâiu lucru de făcut este de a nimici acest contact, cu băgare de seamă ca să nu cadă victimă salvatorul, contactul se va nimici sau prin depărtarea firului electric, sau depărtând bolnavul. Firul se depărtează *fără pericol* cu ajutorul unui băț de lemn, a unui instrument cu mâner de lemn, sau acoperind mâinile înainte de a atinge firul cu mânuși de lână foarte groasă și la trebuință învelind mâinile cu stofă de lână de o grosime de cel puțin jumătate de centimetru. Se va lua seama ca firul să nu atingă fața, sau altă parte descoperită a victimei. De asemenea să nu se atingă,

chiar atunci când ambele mâni sunt acoperite, în același timp două fire diferite. Victima se depărtează *fără pericol* dacă ne învelim mâinile ca mai sus, ne prinzând-o de părțile umede (subsuori, picioare). Să nu se atingă fața victimei cu firul electric; dacă are degetele încheștate asupra firului, îi se va desface mâna cu forța depărțând degetele unul după altul cu precauțiunile următoare: când victima este atârnată, se va lega cu frânghii și se va scobori evitând ca să fie pusă din nou în contact cu firul; dacă nu se poate evita căderea, se va așterne pe jos paie, sau o saltea. Dacă nu putem ajunge la victimă, vom preveni cât se poate mai iute uzina, ai cărei funcționari singuri sunt în stare să taie unul sau mai mulți conductori electrici și să stabilească un circuit scurt. Nu trebuie să atingem cu picioarele șinele sau firele, chiar și când suntem bine încălțați.

Electroterapie.—V. *Electricitate*. (Tratarea boalelor prin).

Elefantiază (gr. *elephas*, elefant; sinonim cu cuvântul arab *dal-fil*, picior de elefant), *pachidermie*. — Această boală ciudată se observă de obicei în țările calde, tropicale, mai cu seamă în Arabia, mai puțin în Europa. Și la noi s'au observat asemenea cazuri. Boala numită și *Elefantiaza Arabilor*, este considerată astăzi ca o manifestare a *filariozei*, generalizată la membrele inferioare și la organele genitale externe. Părțile atinse: picioarele, gambele, coapsele, scrotul sau vulva sunt deformate printr'un *edem* enorm. S'a văzut scrotul ajungând până la mărimea unui cap de om mare; se citează cazul unui scrot care cântărea 100 kgr. Piciorul ajunge la mărimea unui *picior de elefant*, cum este cel din figură. Elefantiaza începe printr'o serie de inflamații ca la brâncă (limfangită repetată), însoțite de căl-



Fig. 165. — Elefantiaza membrului inferior

dură și vărsături; pielea rămâne după fiecare inflamație mai îngroșată, uscată, aspră, roșie închisă, sau negricioasă, netedă sau buburoasă, de multe ori cu mici ulcerăriuni pe ici și colo. La membre boala interesează toate părțile moi până la oase. — *Tratament*. S'a recomandat iodul și iodurile, fără rezultat. Tratamentul chirurgical, punctiunea idrocelului și a exudatelor locale, rezecția varicelor limfatice, micșorează într-o câțva accidentele locale. Fiindcă *filariile* se găsesc în număr mare răspândite în vasele limfatice profunde nu ne putem gândi la o cură radicală. Din fericire starea generală rămâne bună și boala poate dura 20—30 și chiar 50 de ani fără ca omul să moară. Moartea filariilor aduce câte odată o vindecare spontană, ceea ce de altfel se întâmplă foarte rar, căci și viața lor este de obicei foarte lungă. Pentru părțile genitale, când volumul lor este prea supărător se recomandă extirparea lor.

Elelixr. — Medicamente lichide cari se prepară prin topirea, sau macerația (plămădeală) unor substanțe medicinale în alcool. Cele mai obicinuie sunt: *elelixirul acid al lui Haller*, preparat din alcool de 90° 3 părți, acid sulfuric concentrat pur 1 parte; — *elelixirul lui Garus* care se prepară plămădind în timp de 2 zile în 5 litri de apă de flori de portocale, sabur, mi-xandă și șofran, câte 5 gr. din fiecare, miră 2 gr., scorțișoară 20 gr., nucșoară 10 gr., la cari se mai adaugă 5 gr. de vanilie și 500 gr. sirop de strașnic (*asplenium trichomanes*). Elelixirul acesta este foarte plăcut la gust și se dă ca tonic stimulent în doză de un păhăruț de țuică la sfârșitul mesei. — *Elelixirul paregoric* se prepară din: extract de opiu, acid benzoic, din fiecare câte 25 ctgr., camfor 18 ctgr., esență de anason 20 ctgr. la 60 gr. de alcool de 90°; se dă în doză de 15—40 picături, în contra diareei (a urdinării) ca astringent și calmant. — *Elelixirul de viață lungă*, preparat din: sabur, gențiană, revent, șofran, agaric, alcool, se dă ca purgativ în doză de 5—20 gr.

Ematemeză, hematemeză (gr. *haima*, sânge și *emein*, a vărsa), *vărsare de sânge*. — Când sângele vine din plă-

mâni, el este de obicei amestecat cu aer și este de culoare roșietică; în acest caz avem *scurpare de sânge*, sau *emoptizie*. Când sângele vine din stomac, el este de obicei negru, ca drojdia de cafea și atunci avem *ematemază*, care se însoțește de scaune sangvinolente, de aceeași culoare (*melenă*). Ematemeza se produce ori de câte ori sângele se scurge în stomac, fie din păreții lui (ulcer, cancer, gastrită, etc.), fie din cauză că sângele este stricat în urma unei boale de ficat, sau de splină, după cum se vede în febrele grave, în febra galbenă, în icterul grav, în intoxicațiuni în boalele infecțioase. Sângele mai poate veni și dintr'un organ vecin, din esofag, din aortă (anevrism). Ematemeza se mai poate produce la fetele tinere foarte anemice dând astfel naștere la un fel de regulă (menstruație) suplimentară. Am spus că culoarea sângelui care vine din stomac este neagră, ca drojdia de cafea, dar ea poate fi și roșie, ca a sângelui curat, însă în acest caz curgearea de sânge trebuie să fie abundentă (ulcer al stomacului). Nu trebuie să ne speriem de orice vărsare de sânge, până ce mai întâiu nu ne vom îndrăgini de pricina care o produce, căci sunt multe ematemeze cari nu sunt grave și se pot vindeca fără să lase vreo urmă. Pentru tratament caută la *Emoragie* și *Vărsături de sânge*.

Ematocel, hematocel (gr. *haima*, sânge, și *kélé*, tumoare, umflătură). — Se numește astfel o tumoare produsă de o îngrămădire de sânge în unele țesături. — La bărbați ematocelul se arată de obicei la învelișurile testiculelor. Când sângele este numai *infiltrat*, sau împrăștiat în grosimea învelișurilor externe, pielea boșelor este albastruie, puțin întinsă, iar când sângele este revărsat (îngrămădit), pielea este violacee (vânătă) întinsă și prezintă o tumoră în formă de pară cu coada în sus, moale la început, apoi păstoasă, dacă sângele este îngrămădit în învelișurile externe, rămânând moale (fluctuantă) dacă sângele ocupă tunica vaginală, sau profundă. În cazul întâiu cauza boalei este o lovitură, iar în al doilea umflătura se produce sau în mod spontan, sau în urma unui *idrocél*. Ca tratament se recomandă

odihnă, cârpe cu apă rece, iar când ematocelul este adânc, în tunica vaginală, trebuie să se opereze. — La femei ematocelul se face în fundul de sac dinapoia mitrei și se vede mai cu seamă la femeile cari au *menstruație* neregulată. Inceputul boalei este adeseori brusc, regula se oprește de odată, femeia are fiori, căldură, dureri în partea de jos a pântecelui, greață, vărsături, apoi aceste semne, cari seamănă cu acele ale unei *peritonite* localizate, se domolesc după câteva zile și bolnava suferă numai de o slăbiciune și de constipație. Cu timpul sângele se poate *rezorbi*, după una sau mai multe luni, sau tumora se poate inflama și în cele din urmă să se deserte prin șezut sau vagin. Ca tratament se recomandă odihnă la pat, bucăți de ghiată pentru vărsături, beșică cu ghiată pe pânțe, clistire pentru constipație și spălături vaginale antiseptice.

Ematom, hematom (gr. *haimatoun*, a umplea de sânge). — Tumoare, sau umflătură, formată de sânge.

Ematoză, hematoză (grec. *haimatosis*, dela *haima*, sânge). — Act prin care sângele venos, trecând prin vasele capilare ale plămânilor, se transformă în sânge arterial, adică se desface din acidul carbonic și se încarcă cu oxigen.

Ematozoarul lui Laveran. — V. *Paludism*.

Ematurie, hematurie (gr. *haima-sânge*, și *ourcin*, a urina). — Boală în care udul iese amestecat cu sânge, care poate proveni din rinichi, din bazine, din uretere, din beșică, sau din canalul udului (uretră). Ematuria poate să provină dintr'o leziune traumatică, dintr'o leziune congestivă, din prezența unui corp străin, sau dintr'o alterațiune organică a rinichilor, a ureterelor, a beșicii, sau a uretrei. Sunt boale generale cari pot da naștere la ematurie: febra tifoidă, scarlatina, vărsatul, febra puerperală, febra bilioasă, otrăvirile cu mercur, plumb, cantaride (gândăcei), boalele de inimă, etc. Pentru tratament trebuie să ne adresăm la cauza ematuriei, la boala care o produce.

Embolie (gr. *emballein*, a împinge). — Chiag de sânge (fibrinos) care se

formează într'o arteră și merge de astupă o altă arteră mai mică, din care rezultă *gangrena* regiunii irigate de acel vas. Câte odată acest chiag poate fi format dintr'o bucatică de valvulă. Avem embolie *cerebrală*, embolie *pulmonară* etc., după cum astuparea arteriei se face în creier, în plămâni, etc.

Embrilotomie. — V. *Fetus*.

Emeragog (dela grec. *emmena*, regulă, soroc, și *agein*, a împinge). — Medicamente și procedee cari provoacă *menstruația*, sau regulile. Unele medicamente regulatează *menstruația* în mod indirect, cum sunt: tonicele, mai ales fierul, chinchina și celelalte preparate amare, altele lucrează în mod direct: băile de șezut, de picioare și diferite plante: asmățui, apiol, cetenă de negi (sabină), pelin, pelinăriță, rosmarin, șofran, virnaș (rută).

Emeralopie, hemeralopie (gr. *hêmpera*, zi, și *optesthai*, a vedea), *orbul găini-lor*. — Boală în care omul nu mai vede după asfințitul soarelui. În timpul zilei vederea este bună spre apusul soarelui se slăbește, iar după ce a înop-tat nu mai vede de loc. Emeralopia este epidemică în armată, marină, dar mai cu seamă în țările calde unde lumina soarelui este foarte tare și se observă foarte adeseori la populația care se hrănește rău, cu alimente lipsite de vitamine. Ea mai poate fi un semn al boalelor corneei, cristalinelui și retinei, al unor stări generale, debilitante (gălbinare, friguri, palustre, alcoolism). Miopii, cei mai mulți, nu văd seara aproape de loc. Se mai observă la cei slăbiți, sau răniți, oboșiți. Emeralopia începe dintr'o dată, repede și se vindecă prin odihnă, prin medicamente tonice (întăritoare), hrană bună, viață în aer liber, la țară.

Emetic (gr. *emetos*, vărsătură). — Astfel se numește de obicei tartratul de potasă și de antimoniu. Numele de emetic se mai dă câte odată și la alte medicamente, cari produc vărsături mai cu seamă sulfatului de cupru.

Emeto-Cataric (gr. *emetos*, vărsătură, și *kathairo*, curățesc). — Medicament care are însușirea de a provoca vărsături și urdinare în același timp: emetic 5—10 ctgr., sulfat de sodă, 15 gr., apă 350 gr., să se bea în

trei rânduri, la intervale de câte un sfert de ceas.

Emetropie (gr. *en*, *metron*, în măsură și *ops*, vedere). — Ochiul normal, în care imaginea obiectelor privity se formează chiar pe retină, se cheamă emetrop. (V. și la *Ochiu*).

Emfizem (gr. *en*, înăuntru, și *physis*, suflare). — Prin cuvântul emfizem se înțelege o umflătură formată de aer, sau de un gaz oarecare, ce se îngrămădește sub piele, în țesături sau în organe. Aerul poate să pătrundă și să se îngrămădească în țesutul celular subcutanat (sub piele), în urma unei răniri a laringelui (răsufătoarei), a tracheei și a bronhiilor, sau atunci când în urma unei rupturi de coaste, sau a unei plăgi (răniri) penetrante a pieptului, plămânul a fost rupt sau sdrobot. Acest emfizem subcutanat se mai poate ivi și în urma unor chinte violente de tusă (tusă măgărească, catar sufocant, etc.) și poate ocupa toată regiunea gâtului și a pieptului. Se mai poate ivi, fără ca plămânul să fie rănit, în urma unei plăgi mici, atunci când mișcările bolnavului fac ca aerul din afară să intre pe sub piele (emfizem traumatic). Umflătura produsă de emfizem este moale, pielea este normală și dacă o apăsăm cu degetele simțim un fel de crepitații, sau pârâituri, ca și cum am strânge zăpadă între degete. Înțepând pielea iese aerul. Emfizemul se deosebește de *edem*, care este o umflătură a pielei formată prin infiltrația unui lichid, prin faptul că la emfizem, dacă apăsăm pielea cu degetul, nu rămâne groapă ca în edem. Emfizemul de obicei dispăre delat sine; în caz contrar se tratează prin compresiune, aplicațiuni astringente, înțepături, cari de altfel pot fi periculoase, sau în cazurile de abces gangrenos, prin inciziuni largi, urmate de spălături și injecțiuni cu lichide antiseptice.

Emfizem pulmonar, năduș, șui. — Această boală este produsă prin lărgirea beșicuțelor plămânilor (*emfizem vezicular*), al căror pereți nu se mai pot strânge pentru a goni aerul în timpul expirațiunii. Uneori se întâmplă că pereții beșicuțelor se rup formând cavități, în cari aerul nu se poate îndea-juns primeni. Plămânii se măresc, dar

capacitatea lor respiratoare este micșorată pe jumătate. Cele mai adeseori emfizemul este o complicație a altor boale de plămâni (bronchită cronică, tusă măgărească, etc.). — *Cauzele* emfizemului sunt mai multe: sforțările brusce pe cari le fac plămânii în expirațiune, la bolnavii de astmă, tuse măgărească, crup, bronchită, atrofia senilă la bătrâni, ereditatea (moștenirea). — *Semnele*: respirația este foarte grea (dispnee), pieptul se deformează, devine globulos, bombat înainte, la percuție pieptul este foarte sonor, iar ascultând cu urechia murmurul vezicular este foarte micșorat. Se observă diferite turburări în circulație și mai ales fața se înroșește sau se învinețește. Emfizemul este o boală chinuitoare pentru cel ce suferă, căci simte veșnic o apăsare pe piept și are accese de tuse chintoasă, uneori sufocantă, cari de altfel nu-i scurtează întotdeauna viața. Năduful nu se vindecă, se poate însă ușura printr-o căutare îngrijită. — *Tratamentul*: bolnavul va purta haine de lână, păzindu-se de variațiile brusce de temperatură, nu va eși din casă pe frig mare, nici pe timp de ceață, de ploaie rece, de viscol, va combate cu îngrijire cel mai mic guturaiu, nu va fuma, când are bronchită va sta în casă. Dacă are avere se va duce în timpul iernii în țările calde, cu o atmosferă liniștită și nu prea uscată, vara va șede la țară, la munte cu brazi. Nu va munci până la oboseală, nici nu va umbla mult și iute, va căuta să nu fie constipat. Cu *medicamente* se va trata artrismul când există, dându-se arsenic, iodur de potasiu și alcalinele; pentru bronchita cronică se vor da balsamicele (gudron, benzoe, terebentină, terpină, creozot, eucaliptol), expectorantele (poligala, ipeca, kermes, guma amoniac), pentru tusă și dispnee: opiu, iosciam, eroină; pentru accese de astmă: injecții cu morfină, inhalatii cu oxigen, nitrit de amil, eter, lobelia, hârtie nitrată, țigarete antiasmice, bromoform. Contra congestiei pulmonare se vor da ventuze uscate, sau tăiate, vezicători; pentru dilatația inimii: digitală, strofantus, cafeină. Se mai recomandă *aeroterapie*.

Emianestezie, hemianestezie (gr. hé-

misus, jumătate, și anestezie, fără simțire). — Pierderea simțirii, într-o jumătate a corpului, care se observă în unele boale de creeri: emoragie cerebrală, sau înmoierea creierilor, în isterie, în istero-epilepsie, etc. În aceste din urmă cazuri se poate vindeca, prin electricitate și prin aplicarea unor metale pe piele (*metaloterapie*).

Emiopie, hemiopie, hemianopsie, (gr. hemisus, jumătate, și ôps, ôpos, ochiu). Pierderea vederii într-o jumătate a câmpului vizual (într-o jumătate a retinei) așa că bolnavul nu vede decât jumătatea obiectelor pe cari le privește. *Emiopia orizontală* în care se vede numai jumătatea de sus, sau cea de jos a unui obiect, provine din deslipirea retinei și este foarte gravă. *Emiopia verticală* în care se vede numai jumătatea dreaptă, sau cea stângă a unui obiect, poate fi trecătoare (migrenă), sau permanentă, provenind dintr-o boală de creeri (o tumoră, etc.). *Emiopia încrucișată*, în care ochiul drept vede jumătatea stângă și ochiul stâng jumătatea dreaptă a unui obiect, provine dintr-o tumoră care se află pe încrucișarea nervilor optici, în dreptul chiasmei. *Emiopia* de multe ori este semnul orbirii, adică a pierderii totale a vederii.

Emiplegie, hemiplegie (gr. hemisus, jumătate și plêssein, a lovi), *dânsele, dambla, iecele, lovitură din iece, șoimanele, vânturile cele rele*. — Paralizia unei jumătăți a corpului, datorită unei leziuni care ocupă în creeri partea opusă părții paralizate: când boala este în partea dreaptă a cererilor omul este paralizat în jumătatea stângă a corpului și vice-versa. Cauza poate să fie o *emoragie*, sau o înmuiere de creeri, câte odată numai o simplă congestiune, sau o tumoră la creeri. Ea se mai poate ivi în isterie, sau în unele otrăviri (sulfură de carbon), în sifilis, etc. În emiplegia zisă *alternă* este paralizia feței dintr-o parte și a corpului din partea opusă. — În *popor* se știe că *damblaua* vine când ieși înădușit afară și te ia din de vânt (întâlnituri cu ceas rău). Pentru această boală se descântă cu apă neîncepută; se stâng 9 cărbuni la 9 încheieturi: cap, umeri, mâini, genunchi, tăpile picioarelor. Te mai apucă ologeala aceasta și când

calci în zoile dela o femeie lehuza, sau chiar dela o femeie care nu este curată. Pentru *dânsele* pătimășul face baie de trei ori, făcută dintr'un mușuroiu de furnici, pusă într'o oală nouă care apoi se umple cu apă și se pune la foc să fiarbă. Apa după baie se aruncă într'o apă curgătoare pentru ca boala să se ducă cu apa și să nu se mai întoarcă înapoi. Se mai tratează această boală cu coarda elelor (ghlechoma hederacea), pălămidă (serrata tinctoria), sburătoare (epilobium angustifolium), slăbănog (impatiens nolitangere), velnis (ulmus effusa). — Intru cât privește tratamentul *medical* al emiplegiei caută la *Apoplexie* și *Paralizii*.

Emodină. — Pulbere galbenă roșietică insolubilă în apă, solubilă în alcool și alcali, care există în aloes, cascara sagrada, revert. Purgativ în doză de 1—5 ctgr.

Emofilie, hemofilie (gr. *haima*, sânge, și *philia*, prietinie). — O predispoziție a organismului, din naștere, spre emoragii spontane, sau în urma unei răniri oarecare (o sgărietură, o tăiere o scoatere de măsea, o mușcătură de lipitori etc.). Aceste pierderi de sânge sunt în totdeauna mari și se opresc cu multă greutate. Cei cu emofilie pierd adeseori sânge din gingii, din nas, din stomac, etc., sunt slabi și palizi. Această predispoziție scade cu etatea. Tratamentul constă în fier, chinină, tanin, ergotină, hidroterapie, (v. *Emostatice*). Boala nu se poate vindeca și este moștenită dela mama.

Emoglobină, hemoglobină (gr. *haima*, sânge, și lat. *globus*, glob). — Partea constitutivă de căpetenie a globulelor roșii ale sângelui. Ea cuprinde carbon, oxigen, sulf, idrogen, azot și fier. — *Emoglobină* se mai numește și un medicament fieruginos extras din globulele sângelui și care se dă în anemie (lipsă de sânge) în doză de 3—10 gr. pe zi.

Emoliente (lat. *emmollire*, a înmoia, a face moale). — Medicamente cari înmoaie, relaxează, părțile corpului pe cari sunt aplicate, sau cu cari vin în atingere și prin aceasta fac durerea să fie mai mică. Se întrebuintează în cazurile de iritațiune a unor organe, sau țesături. Cel mai simplu și mai la

îndemână emolient este *apa caldă*, sau *căldușă*, aplicată sub formă de cârpe înmuiate, sau sub formă de băi prelungite. *Cataplazmele* de scrobeală, de cartofi, de făină de in, etc., cari lucrează mai mult prin căldura lor. *Oblojeli* făcute cu diferite plante emoliente: nalbă, nalbă mare, lumânărică, bătătarnică, paracherniță, în părți egale: se fierb foile, sau rădăcinele și se aplică pe părțile dureroase. Se mai întrebuintează ca emoliente *corpurile grase*, sau *uleiurile* (uleiu de migdale dulci, etc.), diferite cerate, cold-cream etc. Pe *dinăuntru* se întrebuintează ca emoliente diferite (băuturi, făcute din gumă, nalbă mare, gutui, smochine, flori pectorale, etc. apoi diferite *gargarisme*, făcute cu decoctiune (fiertură) de orz, de nalbă, etc.

Emoptizie, hemoptizie *haima*, sânge, și *physis*, scuipat.) — V. *Scuipare de sânge*.

Emoragie, hemoragie (gr. *haima* sânge, și *rhégnysthai*, a rupe), *curgere de sânge*. — Pentru ca sângele să curgă afară din vasele prin cari circulă (artere sau vine) trebuie ca acestea să se rupă, dintr'o cauză externă (o lovitură, înțepătură, sau tăietură) ori internă (o boală de creeri, de inimă, de stomac sau de mățe, de plămâni). Când se rănește capul, sau trunchiul, sau un membru, sângele curge îndată și atunci zicem că emoragia este *externă*. Sângele poate să curgă în cantitate foarte mică, câteva picături, sau în cantitate mare, câteva sute de gr. și chiar un litru, sau mai mult. După tăietură curgerea este mai mare decât după înțepătură. Când *artera* este ruptă sângele este roșu, rumen și curge cu putere țâșnind, iar când este ruptă o *vână* sângele este negru și curge în continuu, se prelinge. Uneori sângele, înainte de a fi dat afară, se îngrămădește într'o cavitate sau un conduct al corpului, de unde apoi iese cu încetul cum se întâmplă la curgerea de sânge din nas (*epistaxă*), scuiparea de sânge (*emoptizie*), vărsare de sânge (*emameză*), eșirea sângelui prin șezut (*melena*). Alteori sângele se oprește în locul unde s'a spart vasul, cum se întâmplă în *cucuite*, unde el se adună sub piele, sau în *apoplexia cerebrală*, când se răspândește la suprafață, sau

în adâncimea creierilor, etc. În aceste cazuri zicem că emoragia este *internă*. — Dacă emoragia nu este mare, ori de ce natură ar fi, nu este primejdioasă, dacă însă este mare, atunci fața se pălește, mâinile și picioarele se răcesc, omul are sfârșeală și leșin (sin-copă), uneori și vărsături, spasme, iar dacă sângele a curs în cantitate mare de tot, 3—4 kgr. dintr'o singură dată, omul moare. În urma unei emoragii mari, dacă omul nu moare, rămâne într'o stare de *anemie* foarte pronunțată. — *Tratament*. Cel dintâiu lucru ce trebuie să-l facem este să oprim curgerea sângelui, mai ales când avem a face cu o emoragie externă. Lucrul acesta se face cu ușurință de către ori și cine. În acest caz, până să vină doctorul, n'avem decât să punem pe rana care sângerează o substanță spongioasă, cum ar fi o cârpă arsă, puțin bumbac, sau iască, cari, absorbind sângele, acesta se închiagă formând astfel un fel de dop, care oprește curge-




Fig. 166. — Oprirea emoragiei la antebraț

a — legătura b — ghiomotocul
c — rana

rea, sau putem încerca spălarea răni cu apă rece, sau cu ghiață, care face ca vasele să se strângă și să se închidă, încât sângele nu mai poate curge. Putem încerca și amândouă lucrurile acestea, adică după ce am spălat rana cu apă rece, simplă, sau cu ghiață, punem cârpă, bumbac, sau iască peste ea și facem o legătură strânsă cu o batistă, sau un șervet sau mai bine cu o față. Dacă nu isbutim cu aceasta vom întrebuința *astringentele*, adică vom pune, în apa cu care spălăm rana, oțet, piatră acră, rachi, spirt, rom, ori ce ne cade în mână, sau putem să înmuiem o cârpă în aceste lichide curate, fără apă și s'o punem pe rană, legând-o strâns. — Mai putem întrebuința pericourt de fier, dar nu curat, ci înjumătățit cu apă. Dacă nici cu acestea nu putem opri sângele vom

apăsa cu mâna vasul rănit, adică punând degetele pe traiectul (drumul) lui, deasupra răni, sau chiar în rană, sau legând membrul deasupra răni cu o față, strângându-l bine până se oprește sângele. Dacă emoragia este la antebraț, sau la gambă, o putem opri ușor punând o periniță de vată, sau o bucată de cârpă strânsă ghem, pe fața dinainte a cotului, în primul caz (Fig. 166) sau în regiunea poplitee în cazul al II-lea (Fig. 167) apoi strângem antebrațul pe braț, gamba pe coapsă și le legăm. Se înțelege că




Fig. 167. — Oprirea emoragiei la gambă

a — ghiomotocul b — rana c — legătura

toate acestea se vor face până la venirea doctorului, care va face ceea ce va crede că este bine, recurgând în cazurile grave la *legătura* vasului rupt. Pentru emoragiile interne se va căuta la *Apoplexie*, *Contuziune*, *Scuipare de sânge*, *Epistaxă* (Curgere de sânge din nas), *Dizenterie*, *Tifoidă* (Febră), *Vărsături de sânge*, *Emostază* (*Emostatică*) și *Ematurie* (Urinare, cu sânge).

Emoragie cerebrală. — V. *Conges-tiune*.

Emoragie nazală. — V. *Epistaxă*.

Emoragie uterină. — V. *Metroragie*.

Emoroizi, hemoroizi (gr. *haima sânge și rhein, a curge*), *trâni*. — Se numesc astfel niște umflături, sau tumori mici, formate prin lărgirea venelor dela șezut (anus), a căror mărime variază după cantitatea de sânge care vine în ele, uneori mai mică, alte ori mai mare, câte odată așa de mare încât ele se întind peste măsură și

sparg, iar sângele curge. Trânzii sunt *externi*, când umflăturile sunt afară pe marginea șezutului și *interni* când ele sunt în mațul șezutului și nu se văd. Ei pot fi în același timp *externi* și *interni*. Când trânzii sunt mici, cu puțin sânge, cresc se întind, devin



Fig. 168. — Emoroizi (secțiune care arată pănjeniișul vaselor sanghine în plină congestie)

tari și dureroși, lăsând să curgă sânge curat, sau amestecat cu materii fecale, iar când se inflamează ei produc mari suferințe, dureri cumplite, însoțite de durere de cap, umflarea pântecelui și alte turburări ale mistuirii. Mulți bol-



Fig. 169. — Emoroizi

navi pierd sânge foarte mult, așa încât devin *anemici* în gradul cel mai mare. — Emoroizii pot strica o sănătate cât de bună, prin suferințele la cari dau naștere și prin pierderile cele mari de sânge. — Între *cazurile* cari dau naștere la trânji se numără ereditatea

(moștenirea), în deosebi artritismul, hrana prea bună și prea multă, lipsa de mișcare, șederea prea multă, cum se întâmplă la funcționarii cari lucrează toată ziua la masă, șederea prelungită în pat, constipația (încuietura), sarcina. — Pentru a preveni ivirea lor trebuie să ducem un regim potrivit, dulce, să nu facem uz de băuturi alcoolice, nici de condimente excitante, să mâncăm ciorbe apoase, carne fără grăsime, legume verzi, fructe, și compoturi. Să combatem constipația cu purgative slabe, cu masagiu, electricitate. În fiecare dimineață să se facă o baie de șezut, aproape rece, de 5—10 minute, spălând partea dureroasă. Sunt bune și clismele reci, făcute în fiecare dimineață, exerciții, plimbări zilnice, nici odată cu bicicleta. Când trânzii sunt umflați și tari: băi, cataplasme calde de in, spălături de 4—6 ori pe zi cu vată înmuiată în apă foarte caldă (45—50°) și clistire calde. Când durerile sunt prea mari să se pună săpușe (supozitoare) cu: extract de opiu 2 ctgr., cocaină 3 ctgr., unt de cacao, 2 gr., pentru un supozitor; se pot pune 2—3 pe zi, sau supozitoare de *adrepalină*. În contra emoragiei (pierderii de sânge) sunt bune clismele calde de 45—50°, făcute cu apă care cuprinde 10 la 100 *gelatină*, iar pe dinăuntru se vor da medicamente cari opresc sângele de a curge, *emostatic*. Când emoragia este prea mare și des repetată, așa încât poate să dea naștere la o *anemie* profundă, care ar pune în pericol chiar viața bolnavului, se va recurge la *operație*. — La *țară* cei bolnavi de trânji se vindecă cu: cânepă, hrean, otrăfel (onosma arenarium), plop, praz, rădăcina pământului (arum maculatum), săcară stejar.

Emostază, hemostază (gr. *haima*, sânge, și *stasis*, stare, oprire pe loc), *emostatic* (*hemostatic*). — Prin cuvântul *emostază* se înțeleg atât fenomenele naturale cari se opun la curgerea sângelui prin orificiul unui vas tăiat, în mod accidental, cât și mijloacele chirurgicale cari se întrebuintează pentru a opri o curgere de sânge (o emoragie). Când voim să oprim o emoragie vom întrebuinta mijloace cari înlesnesc închegarea sângelui. Pentru acest scop sunt mai multe mij-

loace, fizice sau chimice, adică : punem pe rana care sângerează iască tanin, apă rece, ghiață, etc., sau astringente stiptice și caustice : perclorurul de fier, acidul sulfuric, acidul fenic, clorurul de zinc, nitratul de argint (piatra iadului), etc. Se înțelege că în toate cazurile de emoragie se recomandă bolnavului odihnă, liniște și tăcere. Iată acum cari sunt medicamentele *emostatice* (opritoare de sânge), cari se pot da pe *dinăuntru* : *secara cornulă*, *ergotina*, *ergotinină*, *hamamelis virginica*, *idrastris canadensis*, *idrastrinină*, perclorur de fier, *adrenalina*, etc., cari lucrează asupra circulațiunii generale și înlesnesc acțiunea emostatică a mijloacelor externe. În multe cazuri de emoragie toate aceste mijloace nu sunt îndestulătoare și trebuie să lucrăm deodreptul asupra vasului din care curge sângele. Procedeele chirurgicale, cari se pot pune în practică sunt : *compresiunea*, sau *apăsarea pe vas*, *legătura vasului*, *tampnarea*, etc.

Empiem (gr. *en*, în, și *pyon*, puroiu). — Se numește astfel o operație care are de țință de a deschide pieptul (cavitatea pleurală), pentru ca să iasă puroiul ce se află acolo și pentru a face spălături antiseptice (cu acid boric, sublimat, tinctură de iod, alcool, sulfat de zinc, etc.). Empiemul constă în a tăia strat cu strat țesăturile dintr'un spațiu intercostal și a introduce un tub de drenaj. Se mai numește *empiem* și boala pentru care se face această operație : *pleurezia purulentă*. (v. *Pleurezie*).

Empirism (gr. *empiria*, experiență). — În antichitate era o școală medicală numită *empirică*, ce considera experiența ca bază a medicinei, fără să caute cauzele ascunse ale boalelor și proceda întotdeauna prin analogie. Empirismul a avut și are chiar și astăzi un rol în practica medicinei, căci el suplinește imperfecțiunile științei; multe progrese se datoresc lui și prin urmare putem să ne adresăm lui ori de câte ori trebuie ună cere, fără ca să pierdem din vedere că singură știința este capabilă a stabili o terapeutică rațională. Empirismul, din nenorocire, în ziua de astăzi de multe ori este sinonim cu *șarlatanismul*.

Empiroform. — Product rezultat din condensatia gudronului și a formolului. Pulbere de culoare închisă, cu odoare specială. Sicativ și antiseptic neiritant. Se recomandă în tratamentul plăgilor (rănilor), a eczemei, boalelor de piele și ale pielii capului. Alifie din 1—15 la 100.

Emplastru, *plasture*. — Medicament extern, solid la temperatură ordinară, care se înmoaie la căldură și se lipește pe părțile cari se aplică. Plastrul are ca bază un corp gras, la care se adaugă rășină și ceară pentru a-l întări. Această întărire se mai poate face și cu ajutorul oxidelor metalice (oxid de plumb). Pentru ca să se aplice pe piele, plastrul de obicei se întinde pe o bucată de pânză. Tipul plasturelor e cel numit *diachilon* (vezi acest cuvânt) sau *talionul*. Sunt multe feluri de plasture : de *beladonă*, de *cicută* (cucută), de *opiu*, de *molotru*, de *miniu camforat*, de *șofran*, de *cantaride* (vezicătoare), de *mercur* (Vigo), plasture de *om sărac*, făcut din gudron, colofon și ceară galbenă, bun contra durerilor reumatismale; mai bun pentru acestea este *plasturul american* (Benson).

Emprostotonos. — V. *Tetan*.

Emulsiune. — Este un medicament lichid care de obicei seamănă cu laptele. Este formată din apă și din uleiul sau rezina divizată și ținută în suspensie în lichid cu ajutorul unui albuș de ou, sau a gumii arabice. Emulsiunea, sau *laptele de migdale*, se prepară astfel : se pisează într'un mojar migdalele dulci curățite de coaje, turnându-se în continuu câte puțină apă, până când se îngroașe lichidul și se albește ca laptele. Tot așa se prepară și *laptele de cânepă*. Emulsiunea făcută din semințe de dovleac este bună pentru panglică (tenia). Emulsiunea cu balsam de *tolu* se întrebuințează în guturaiu.

Encefal (gr. *en*, în, și *kephale*, cap) și **Encefalită**. — *Encefal* este sinonim cu *creer*, *encefalită* înseamnă aprinderea (inflamația) creierului (vezi *Creer*).

Encefalita letargică, *encefalita epidemică* (incorect numită și boala somnului). — *Semne* : *forma cu somnolență*. Boala începe brusc cu *fiori*, *dureri de cap*, *febră*, uneori cu *vărsături*. Bolna-

vul foarte adesea cu mult înainte se plânge de oboseală și stare rea. Somnolența vine pe nesimțite, aspectul bolnavului devine al celui somnoros. Uneori, când este întrebat răspunde, dar foarte scurt, la întrebările ce i se pun, alte ori nu. Somnul uneori e așa de adânc că bolnavul nu poate fi hrănit decât artificial (prin clizme) are și incontinență de urină și materii fecale. Paralizările ating nervii ochilor. Se produce ptoză, strabism, diplopie (bolnavul vede dublu), vedere proastă. În cazuri grave constipație, alenă puturoasă, febră 39'—40'. Afară de această formă se întâlnește o formă paralizică. Bolnavul e paralizat complet. Alte ori e o formă miotonică (contractarea mușchilor), cu aspect de boala lui Parkinson, forme coreice, epileptiforme, uneori sughiț (ca în epidemia din 1920—1921). Nu s'a putut găsi cauza. Boala a fost descrisă prima oară de Economo în 1917. În 1919—20 o epidemie a cuprins și țara noastră. Boala este gravă, mortală în 25—30% din cazuri. Urmările boalei, la cei vindecați, sunt foarte serioase și unele determină invaliditatea. E o boală infecțioasă, epidemică. Levaditi (român) și Harvier, cred că encefalita letargică e datorită unui virus filtrant ce se distruge la 55°. Virusul are predilecție pentru sistemul nervos central (creierul mijlociu), dar se găsește și în căile superioare respiratorii (nas, gură, gât). Contagiunea se face prin salivă și respirație. — *Tratament*. Injecții cu diferite seruri (antidifteric, antitetanic, ser de convalescenți, de gripă sau encefalită letargică), injecții cu electrargol, cu urotropină, abcese de fixație. — *Profilaxie*. Fiind o boală contagioasă bolnavii și contactii se izolează.

Endemie (gr. *en*, în, și *demos*, popor). *Boale endemicc.* — Se numesc astfel acele boale cari se găsesc totdeauna în anumite localități, sau acele cari predomină într-o localitate, cum sunt frigurile palustre la noi în țară. Pentru ca aceste boale să dispară trebuie combătute cauzele cari le produc.

Endocardită (gr. *endon*, înăuntru, și *kardia*, inimă, cord). — Inima este căptușită pe dinăuntru cu o membrană (pelită), care se numește *endocard*. In-

flamația sau aprinderea acestei membrane se chiamă *endocardită* (v. *Cord*).

Endoscop (grec. *endon*, înăuntru, și *skochein*, a observa, a vedea). — Instrument care se întrebuințează pentru a cerceta părțile dinăuntru ale corpului, cari sunt în comunicație cu exteriorul printr'un orificiu sau canal prea strâmt în care se poate intra în linie dreaptă.

Enervare (lat. *enervatio*, dela *e*, fără, și *nervus* nerv). — Dacă ne luăm după înțelesul acestui cuvânt trebuie să înțelegem *enervare* un fel de abatere, de apatie, de lăncezeală a tuturor funcțiunilor, care se arată câte odată în timpul căldurilor mari de vară, sau la începutul febrei tifoide, ori al febrilor eruptive (pojar, scarlatină, etc.). Această lipsă de energie provine din faptul că acțiunea sistemului nervos este pentru moment micșorată. — Astăzi prin cuvântul *enervare* de cele mai multe ori se înțelege o stare în care sistemul nervos este excitat, iritat, și caracterul omului este schimbăcios dintr'un minut în altul, când omul n'are astâmpăr, nu-i vine să stea locului, mutându-se din loc în loc în fiecare minut. În acest caz omul zice că este *enervat* și aci starea de abatere, de toropeală, este înlocuită cu agitație (neliniște), o agitație mai mult morală decât fizică, bine cunoscută de studenți în perioada examenelor, de acei cari așteaptă o veste, cari au o neliniște oarecare. În toate aceste cazuri medicamentele n'au nici o putere.

Enoftalmie (gr. *en*, în, și *ophthalmos*, ochiu). — Infundarea ochiului în orbită se cheamă enoftalmie. Ea e datorită ori reducerii grăsimii din orbite, din care cauză ochiul se infundă mai adânc în orbită, ori paraliziei nervului simpatic cervical.

Enterită (gr. *enteron* maț, intestin). — Inflamația sau aprinderea acută, sau cronică, a *Intestinului*.

Enterocliză. — V. *Clistire*.

Entero-colită. — V. *Intestin*.

Enteroragie (gr. *enteron*, maț, și *rhagien*, a isbucni). — Emoragie sau curgere de sânge în mațe (vezi *Emoragie*, *Intestin*, *Melena*).

Entorză (lat. *intorsus*, sucit), *sucitură*. — Când o încheietură face o mișcare rea, falsă, contrarie felului ei de a fi, sau când face o mișcare natu-

rală dar forțată, silită și mai mult decât trebuie s'o facă, ligamentele cari țin unite oasele între ele se întind prea tare, plesnesc, se rup. În aceste cazuri zicem că ni s'a *sucit* mâna sau piciorul, că avem o *sucitură*, o *entorză*. Cele mai dese sucituri se întâmplă la încheietura piciorului cu gamba. Se poate să avem entorză la genunchi, șold la mână, cot și umăr. *Semne*: *durerea* pe care o simțim chiar în minutul când se face sucitura; poate fi foarte mică, sau poate fi mare, uneori așa de mare încât să leșinăm. Durerea chiar când este mică ne împiedecă de a face mișcări cu încheietura bolnavă. *Umflătura* la început este mică, dar se mărește în cele dintâi 24 sau 35 de ceasuri, iar pielea se întinde, devine lucitoare și este caldă. După 2—3 zile, se ivește o *vânătaie* (echimoză), datorită sângelui eșit din vinișoarele rupte și care s'a răspândit prin țesuturi. Această pată este la început albastră, apoi verzue și în cele din urmă gălbue, până ce dispare, în trei sau 4 săptămâni. Un alt semn mai este și o *mare greutate în mișcări* și uneori chiar o *neputință* de a mișca încheietura bolnavă, fără însă ca aceasta să fie așa de pronunțată ca în scintire (luxație) sau fractură. — *Tratament*. Când entorza nu este complicată nici de fractură, nici de luxație, vom încerca s'o vindecăm prin mișcări de îndoire și de întindere ale încheieturii, însoțite de *masaj* (trăsături). Aceste mijloace însă nu sunt bune decât în cazurile de entorză *simplă*, când nu există nici o complicație. Când nu avem a face decât cu o întindere de ligamente, este de ajuns să facem fricțiuni (frecături) ușoare, urmate de apăsări din ce în ce mai tari, făcute dela vârful membrului spre rădăcină, cari fac ca să se micșoreze, apoi să dispară umflătura și vânățiile. Durerea se micșorează printr'un masaj metodic și în câteva zile omul poate fi vindecat. După masaj, precum și atunci când nu se poate face masajul, trebuie să imobilizăm adecă să ținem nemiscată încheietura bolnavă, aplicând asupra ei cârpe (comprese) înmuiate în apă rece, apă sărată sau apă cu oțet, în apă de plumb, simplă sau cu tinctură de arnică, în spirit de camfor, etc.

Cârpele trebuiesc schimbate din jumătate în jumătate de ceas și lichidele să fie cât se poate de reci. În cazurile de entorză cronică (învechită) vom face masaj zilnic, urmat de mișcări de îndoire și de întindere, din ce în ce mai mari.

Entropion (gr. *en*, în, și *trepein*, a întoarce). — Se numește astfel întoarcerea înăuntru a pleoapei, cu iritațiunea conjunctivei și a corneei, cari sunt frecare de gene. Poporul nostru îi zice acestei boale *peri râi*. Entropionul este *cicatricial*, când vine în urma unei răniri, arsuri, după trachom, sau în urma difteriei, el se mai ivește la *bătrâni*, cari sufer de spasmul mușchiului orbicular al pleoapei de jos. Pentru vindecarea acestei urite boale trebuie să se facă operație, căci medicamentele n'o pot vindeca. — La *țară* babele scot perii râi cu *cîmbrista* (un fel de clește mici) unul câte unul, după ce întorc mai întâi pleopa înafară și îi scot numai în zile cu soare, ca să-i poată vedea și numai în zile de sec (post).

Ențură, *inșură*, *ochincea* (*Gentiana lutea*, fam. Gențianaceelor). — Plantă erbacee care crește pe coastele munților și prin văile subalpine. Se întrebuințează rădăcina care are gust foarte amar, din care cauză ea întetește pofta de mâncare și ușurează mistuirea. În același timp ea este întăritoare și ușurează eșirea afară (laxativă). Pentru acestea gențiana se dă în anemie, în debilitate, în dispepsie, în contra frigurilor. Se ia sub formă de praf, în doză de 25 ctgr. până la 1 gr. înainte de mâncare, în băutură preparată din 8 gr. de rădăcină într'o jumătate de litru de apă, în vin, 60—120 gr. în sirop, 10—100 gr., în tinctură 2—50 gr. în extract 20 ctgr. până la 3 gr. — La *țară* se bea în rachiul în contra frigurilor.

Enucleație (lat. *ennucleare*, a scoate afară). — Extirparea unei tumori, sau scoaterea unui ochi.

Epanșament (franz. *épanchement*, dela *épancher*, a vărsa încet, a turna lin, a curge). — Ingrămădirea unui lichid într'o parte oarecare a corpului, unde nu trebuie să fie când omul este sănătos. Sângele care iese din vase pentru a se îngămădi sub piele în ca-

zurile de lovituri, formând *echimoze* sau *depozite*, acela care se răspândește la suprafață, sau în adâncimea creierului în cazurile de *apoplexie*, lichidul care se adună în pânțele în cazurile de *idropizie* (dropică, boală de apă), în pleură (cămașa plămânilor) în cazurile de *pleurezie*, sunt tot atâtea *epanșamente*.

Epatică, hepatică (Colică), *colică* sau *durere de ficat*. — Este o durere cumplită în dreapta pântecelui, sub coaste, durere care se întinde la umărul drept, uneori așa de mare încât îți ia răsuflarea, mergând câte odată până la leșin (sincopă) și convulsii (spasme). Această *colică epatică*, sau de *ficat* este produsă de o pietricică (calcul mic), care s'a desvoltat în beșica fierii, de unde a fost dusă de fiere în canalele prin cari fierea se duce în mațe (duoden). Pietricica fiind mai mare decât canalul se oprește în drum, dar este silită să înainteze de către fiere, care o împinge și atunci canalul se întinde, se lărgeste ca să-i facă loc. Această trecere a pietricicelei produce acea durere grozavă. Colica epatică se mai însoțește de fiori, de sughiț, de vărsături și câte odată de gălbănare (icter). Ea revine prin accese, cari sunt provocate de eforturi violente, de sdruncinăturile trăsuri, de o emoțiune vie și mai ales de mâncare prea multă. Durata ei variază dela câteva ceasuri până la 2—3 zile și se termină când pietricica a ajuns în maț. — *Tratament*. Pentru a calma durerea se pun pe partea dureroasă cataplasme de făină de in foarte calde, cari se primesc foarte des, cel puțin odată la ceas, iar când se schimbă cataplasma se freacă locul cu o bucată de flanelă muiață în cloroform, în ulei de mușetel camforat, sau într'un amestec de balsam tranchil și laudan. Bolnavul poate să facă și o baie caldă prelungită. Pe dinăuntru se va da antipirină, 1 gr. odată, repetat de trei ori pe zi, se vor pune săpunașe cu : extract de opiu 3 ctgr. extract de beladonă 2 ctgr., unt de cacao 2 gr. pentru un săpunaș; se pot pune 2 pe zi. Dacă durerea este din cale afară de mare se recomandă injecțiuni sub piele cu *morfină*, de 1 ctgr., maximum 2 ctgr. odată. Se mai recomandă inhalatii-

nile de cloroform și de eter. În cazurile foarte grave cu căldură și fenomene infecțioase se face *operație*. În timpul crizei bolnavul va lua numai lapte, dulce sau bătut și apă de Vichy. După criză se va înlesni eșirea pietricicelei dând bolnavului unt de ricină, 40 gr. sau untdelemn, 200—400 grm. Bolnavul va urma un regim special. (v. *Calculi*).

Epatită, hepatită (gr. *hépar*, ficat, și terminația *itis*, care înseamnă inflamație, aprindere). Inflamațiune de ficat, acută și cronică. — V. *Ficat*.

Epidemice (Boale). — V. *Contagioase*. (Boale).

Epidemie (gr. *epi*, pe asupra, și *demos*, popor), *boleșniță*, *molimă*. — Se numesc boale epidemice acele cari atacă un mare număr de persoane în aceeași localitate, sub influența unor cauze trecătoare, pe câtă vreme boalele zise *endemice* atârnă de cauze cari țin de localitate și sunt mai mult sau mai puțin permanente. O boală epidemică se poate întinde departe de locul ei de naștere (colera, ciuma), prin transportul microbilor din loc în loc prin bolnavi sau prin obiectele, ori hainele lor; sunt unele boale cari se întind prin mijlocirea aerului, sau a apei. Intre boalele epidemice cele mai cunoscute, afară de coleră și ciumă, sunt : angina difterică, febra tifoidă, pojarul, scarlatina, vărsatul, tusa măgărească, oreioanele, etc. Fiindcă multe din aceste boale se propagă prin atingere, prin contact, ele se mai numesc și boale *contagioase*, sau *molipsitoare*. Boalele epidemice au fiecare semnele lor și tratamentul lor, dar au și oarecare puncte comune cari le leagă între ele : origina lor și mijloacele proprii pentru a preîntâmpina sosirea lor, în țară, sau întinderea lor pe loc. Aceste mijloace cari se cuprind în așa numitul *tratament profilactic*, sau *preventiv*, sunt privitoare la hrană, la izolarea bolnavilor, la carantine și la alte măsuri internaționale.

Epiderm (gr. *epi*, pe, și *dermea*, piele). — Stratul de deasupra al pielii (vezi *Piele*), care câte odată se îngroașe foarte mult pentru a produce *prea cunoscutele bătăături* (vezi acest cuvânt).

Epididimită (gr. *epi*, pe, și *didymos*,

testicul). — Inflamația sau aprindearea epididimului. (v. *Testicul*).

Epifiza. — Este un mic organ așezat în cutia craniană și care cântărește la om cam 14 ctgr. Este considerată ca glandă cu secreție internă; distrucția, sau alterațiile ei, datorită diferitelor tumori cari o pot înăbuși, produce o desvoltare prea de vreme a organelor genitale, îngroșarea vocii, creșterea părului în regiunea pubiană, toate semne ale unei pubertăți prea de vreme (uneori la copiii de 7 ani), la ambele sexe. Dacă funcțiunea acestui organ este prea mare, prea activă, organele genitale întârzie în desvoltare, este deci tocmai contrariu de ceea ce se întâmplă cu alte glandă din creier, cu hipofiza.

Extractele de epifiză, injectate la bolnavi cu hemoragii, coagulează sângele și opresc hemoragiile, după cum a arătat profesorul Parhon (în hemoptizii, menstruații abundente, etc).

Aceste injecții lucrează asupra nutriției organismului, influențând în bine copiii cari vorbesc prea târziu, sau a căror evoluție psihică este întârziată.

Epigastru (gr. *epi*, pe, și *gaster*, vîntre, stomac), *lingurea*, *lingurică*. — V. *Abdomen*.

Epiglota (gr., *epi*, pe, și *glotis*, glotă, răsuflătoare). — O membrană mobilă sau mai pe înțeles un fel de capac, care se află înapoia limbii și care astupă răsuflătoarea, când înghițim, pentru ca mîncarea și apa să nu intre în ea. Caută la *Laringe*.

Epilație (lat. *epilatio*, dela *e*, afară, și *pilus*, păr). — Când cineva are perirăi la gene, cari îi înglodesc ochii, medicul îi smulge cu o pensă mică și această operație se cheamă *epilație*. Se face și în tratamentul *cheliei*, unde se poate spune că este singurul tratament care reușește. Iată cum se face epilația: mai întâiu se tunde capul, apoi se unge cu unt de lemn, sau mai bine cu ulei cadin, în timp de mai multe ceasuri, după care se spală bine capul cu apă și săpun, pentru ca să se înmoaie cojile și pe urmă se începe a se smulge cu o pensă părul, fir cu fir, trăgând încet și în direcția firului ca să nu se rupă. Firele bolnave ies cu înlesnire. De altfel această mică ope-

rație este puțin dureroasă și cere o răbdare mare atât din partea bolnavului cât și din partea operatorului, în schimb însă, când ea este bine făcută, reușește în totdeauna. — Sunt și diferite preparațiuni care fac să cadă părul, numite *epilatoare*, sau *depilatoare*, sub formă de paste, cari se aplică pe părțile păroase, se prepară cu calciu și arsenic, sunt arzătoare (caustice) și *otrăvicioase*, însă lucrează numai asupra părului eșit din piele, așa că după câțva timp el crește din nou. Epilațiunea electrică dă bune rezultate și se face aplicând polul negativ al unui curent continuu la rădăcina fiecărui fir, care distruge definitiv părul, însă această operație este foarte supărătoare și de durată lungă, mai ales când e vorba de epilația părului de pe cap. Cel mai modern mijloc de epilație și cel mai bun tot odată este cu ajutorul razelor Roentgen.

Epilepsie (grec. *epilepsis* dela *epilamvanein*, a atârna, a precurma), *boala copiilor*, *ceas-rău*, *ducă-să pe pustiul*, *fulgerătură*, *stropșală*. — Epilepsia este o boală nervoasă cronică, ce vine prin accese (atacuri) și este caracterizată printr-o pierdere repede a cunoștinții, urmată îndată de convulsiuni (spasme) cari sguđuie corpul întreg. Accesul, sau atacul de epilepsie, de obicei are un început brusc (neasteptat); câte odată însă bolnavul este înștiințat de apropierea accesului printr-o simțire neobișnuită de frig, de cald, de gâdilire, de amorțeală sau de durere, care pleacă din piept, dela un braț, sau dela un picior și ajunge repede la cap. Atunci omul cade ca trăs-nit, pe loc, fără să mai aibă vreme să-și aleagă locul căderii, el cade acolo unde se găsește în acel minut, în foc, în apă, etc., dând în același timp un țipăt *unic* și ascuțit; apoi își pierde cu totul cunoștința, toate facultățile lui sunt nimicite dintr'odată, nu mai are nici o știință de existența lui, nici de a celora din jurul lui, iar când se deșteaptă nu știe nimic din ceea ce s'a întâmplat. În timp de 30 până la 50 secunde el stă în nemișcare completă, cu fața palidă, cu capul întors într-o parte, iar după o jumătate de minut fața devine violacee, lividă și capul, apoi trunchiul și membrele (măinile

și picioarele), încep să se sguđuie în mod violent, încep convulsiiunile (spasmele), fruntea se încrețește, sprâncenele se apropie între ele, pleoapele întredeschise lasă să se vadă ochii nemișcați, sau mișcându-se fără orânduială în orbitele (culcușul) lor, fața se strâmbă în toate felurile, dinții scrâșnesc încât pot să se rupă, iar limba, dacă este prinsă între ei, se rupe, se taie și sângele curge din gură amestecat cu bale și spumă. Capul se ridică și cade pe loc în mod alternativ, corpul se mișcă, se sucește și răsucește în diferite sensuri, mâinile și picioarele se îndoaie și se întind sbătându-se uneori așa de tare în cât se pot rupe oasele și scriinti încheieturile. Mâinile sunt închise (pumnii strânși), degetul cel mare (policele) este îndoit în palmă și acoperit de celelalte degete. Această agitație (sguduire) ține 2 până la 3 minute, când sguđuiriile încetează și sunt înlocuite cu un fel de tremurătură ușoară, care la rândul ei dispăre și ea, iar respirația se restabilește în același timp și fața își recapătă culoarea ei normală, nesișțirea însă mai dăinuiește câțva timp până ce, în fine, după un sfert sau după o jumătate de ceas bolnavul își vine în fire pentru câteva minute, plângându-se de oboseală și de durere de cap, apoi adoarme și după un somn greu și lung se deșteaptă fără să știe ceva din cece s'a petrecut cu el. Așa este *atacul adevărat* de epilepsie și cel ce l'a văzut odată nu-l mai uită. El nu trebuie să se confunde cu *atacul de apoplexie*, în care omul stă nemișcat, nu se sguđuie, nici cu *atacul de isterie*, sau *atacul de nervi*, în care țipetele sunt numeroase (nu e un țipăt ca în epilepsie) și repetate, bolnavul nu cade pe loc în care îl găsește atacul, ci are timp de a-și alege locul, un pat, o canapea. Accesul de epilepsie care vine noaptea în timpul somnului de multe ori trece nebăgat în seamă, nu numai de bolnav ci și de cei din jurul lui. Bolnavul se trezește dimineața ud, cu patul murdărit de urină, de materii fecale, sau de vărsături făcute fără voe în timpul convulsiiunilor, fără să-și poată da seama de cauză, ceea ce îl pune în mare nedumerire, sau se pomeniște dimineața, când se tre-

zește că este jos lângă pat, fără să știe când a căzut și de ce a căzut. Are durere de cap, vorbirea greoaie, limba umflată și dureroasă din cauza mușcăturii. — Sunt multe cazuri de epilepsie în cari bolnavul nu are accese tipice, după cum am văzut mai sus și boala se poate arăta sub diferite forme ușoare la aparență, dar cari pot avea urmări rele. Aceste forme sunt *amețelă* cu cădere și pierdere de cunoștință, după care omul își vine în fire; *absență*, în care omul se oprește în mijlocul unei cetiri, sau conversații, cu privirea rătăcită și strângând, sau amestecând din dinți, apoi după un timp foarte scurt își continuă cetirea, sau vorba, înainte ca și când nimic nu s'ar fi întâmplat; *aiurare* (delir), care are o durată mai mult sau mai puțin lungă; *alergare* fără scop fără rost, inconstiență, de o durată variabilă. — Accesele mari ale epilepsiei se pot repeta în fiecare zi, sau de mai multe ori în aceeași zi. Alte ori, în formele mai ușoare, pot veni la o săptămână odată, sau la o lună, ori la mai multe luni odată. Epilepsia este o boală foarte gravă, prin faptul că se vindecă foarte greu; și poate da loc la diferite accidente. Repetarea acceselor prea des slăbește facultățile intelectuale ale bolnavului, îi schimbă firea, caracterul, îi scade memoria, îl face să fie supărător, nervos, trist, el poate să aibă uneori delir, halucinațiuni, cari îl înspăimântă și îl împing la diferite acte: furt, sinucidere, omucidere, sfârșind prin nebulie, manie. — *Tratamentul igienic* constă în a trăi, dacă se poate, la țară, a ocoli locurile unde se adună mulți oameni (cafenelele, concertele, teatrele, etc.) exerciții dese, însă fără oboseală. Să se ferească de jocuri violente, de a sta mult la soare, să nu-și obosească bolnavul mîntea cu cetitul, sau scrisul, să ducă o viață regulată și liniștită, să evite emoțiunile, să aibă rar raporturi sexuale, să nu fie constipat, să nu doarmă mult și să nu doarmă ziua. Regimul alimentar să fie îngrijit, hrană mai mult vegetariană, foarte puține băuturi alcoolice. În momentul atacului să împiedecăm bolnavul ca să nu se lovească, să nu se rănească și să-l ajutăm ca să respire liber (îi vom des-

face hainele la gât și la piept, ca nimic să nu-l strângă, îl vom pune pe o saltea (nu în pat), aplecându-i capul la o parte pentru ca spuma și balele să-i curgă cu înlesnire din gură, sub cap îi vom pune una sau două perini, ca să nu se lovească, îl vom stropi pe față cu apă rece). *Tratamentul medicamentos*: se pot da asociate cele trei bromure (de potasiu, de amoniu și de sodiu). Metoda cea mai bună în toiu boalei este de a da bromurul în *continuu*, iar nu întrerupt, ceea ce nu este bine să se facă decât atunci când vom să suprimăm medicamentul, sau în unele stări psihice, cari se arată în timpul vindecării. *Se va da bromurul în doze crescânde*, până vom potrivi *doza suficientă* ca să taie accesele. Din când în când bolnavul va lua un purgativ salin (sulfat de sodă, 20—30 gr.). *Copiii* vor lua doza mai mică, după etate. Mai sunt și alte multe medicamente cari se întrebuintează la tratamentul epilepsiei, dar până azi nu se cunoaște unul singur, care s'o vindece. Când epilepsia este de natură *sifilitică* se va face *tratamentul antisifilitic intens*. În cazurile de *tumori cerebrale* trebuie operație. Când epilepsia este *toxică* se va combate alcoolismul, absintismul, tabagismul, saturnismul, uremia, etc. În epilepsia produsă prin *congestiune cerebrală*, vom lua sânge (venesecție) dela braț, vom da purgative și ergotină.

Epiozină. — Product sintetic de constituțiune analoagă cu cea a morfinei. Sedativ puternic, toxicitate foarte slabă, succedaneu al morfinei. *Doză*: 10—15 ctgr. la adult, în pilule de câte 5 ctgr.

Epiploon (gr. *epi*, pe deasupra și *plein*, a pluti), *prapor*. — Se numește astfel o îndoitură a *peritoneului* care leagă unele de altele organele din *abdomen*. Epiploonul se împarte în: *marele epiploon*, sau cum se numește în limba poporului *praporul*, care merge dela stomac pe deasupra mațelor, acoperindu-le ca un șorț: *micul epiploon*, sau *epiploonul gastrosplenic*, care unește stomacul cu splina.

Episcopești (băile). — Stațiune balneară și climaterică lângă Oradea, la 7—8 km. Are ape termale (calde), la o temperatură de 40°, cari isvorăsc

în cantitate abundentă. Sunt foarte bune pentru tratamentul reumatismului și al bolilor de femei. În lacul de lângă instalația de băi se găsește un nămol asemănător puțin celui dela Techirghiol, cu ajutorul căruia se face împachetări (oblojeli) ale părților dureroase. Apa acestui lac este caldă în toate anotimpurile, în ea crescând planta numită *lotus*, care se mai găsește pe malurile Nilului. Stațiunea este așezată în marginea unei întinse păduri, unde vine multă lume să petreacă vara și are un bazin cu valuri (produse de mașini) conținând apă termală. De aci se pot face excursiuni frumoase la Oradea și la băile Felix, cari sunt la o depărtare de 2 km.

Epispastic (gr. *epispan*, a sgândări, a ațâța, a întărâta). — Medicament care se pune pe piele pentru ca să producem o iritație, o revulsie, fie prin înroșire numai (făină de muștar), fie prin ridicare de beșici (vezicătoare). Se mai aplică astfel de medicamente și pentru a opri vindecarea unei răni produsă prin vezicătoare și a întreține supurația, de ex. alifia epispastică formată din: cantaride (gândăcei), 1 gr., ungvent populeu 28 gr., ceară albă, 4 gr.

Epistaxă (gr. *epi*, pe, și *stazein*, a curge picătură cu picătură), *curgere de sânge din nas*. — Curgerea de sânge din nas are cauze foarte multe. O *cădere* pe nas, sau o *lovitură* poate să-i dea naștere, o *fractură* (ruptură) a oaselor nasului, sau a bazei craniului. o *insolație* (soare sec), o *ședere prelungită* într'un loc prea cald, sau o *schimbare bruscă* (repede) de temperatură, cari au produs o *congestie* la cap. Când epistaxa este însoțită de fierbințeală, de desgust de mâncare, de un fel de toropeală, atunci ne putem gândi la începutul unei *febre tifoide*, iar dacă sunt dureri de stomac și mațe, diaree, la o *febră eruptivă* (pojar, scarlatină, etc.). În cazurile de *anemie*, de *cloroanemie*, în boalele de ficat, de *inimă*, în boalele de nas (răni, polipi) adeseori avem curgere de sânge din nas. Se întâmplă câteodată să curgă sângele prin fundul nasului în gură și în stomac și atunci omul scuipă și varsă sânge, fără să aibă o boală de plămâni sau de stomac. Cantitatea sân-

gelui uneori este mică, dar când este mare și curgerea se repetă des, atunci ea este gravă putând da naștere la anemie (cloro-anemie) cu toate urmările ei. — *Tratament.* Curgerea de sânge din nas trebuie oprită în toate cazurile cât se poate mai iute, afară numai când ea vine la persoane în vârstă și sângeroase, predispuse la congestii (îngrămădiri de sânge) sau emoragii la cap, la cari le face bine, dar și în aceste cazuri nu trebuie să fie în cantitate prea mare. Bolnavul trebuie pus într'o odaie rece, în poziție șezândă cu capul ridicat; pe frunte



Fig. 170. — Tamponarea posterioară a nasului, în caz de epistaxă gravă

și pe cap să i se pună cârpe cu apă rece în continuu primenite, sau mai bine o pungă de gheață; să tragă pe nas apă rece cu oțet, să-și ridice mâna, din partea nării din care curge sânge, în sus și s'o țină astfel până la 5 minute; să i-se astupe narea din care vine sângele cu vată, sau cu *tampoane de bumbac* bine îndesate, cari să fie legate cu câte un fir de ață pentru ca la trebuință să se poată scoate afară, tampoane înmuiate într'o soluție de *antipirină* (1 la 5), de *feropirină* (1 la 20), sau în *adrenalină* (tonogenul Richter este foarte bun). Se mai recomandă și irigații cu apă caldă de 48°, simplă sau cu puțin *perclorur de fier* (5 gr. la 1000 gr.). În cazurile grave este bine să se facă și injecții sub piele cu *ergotină*, sau *ergotinină*.

Când sunt răni în nas se vor arde cu *nitrat de argint* (piatra iadului), *acid cromic*, sau cu *galvano-cauterul*. Când sângele vine din partea de dinapoi a nasului, se va face tamponarea pe dinapoi cu *sonda lui Beloc*, sau în lipsa ei cu o *sondă de cauciuc uretrală*, sau cu un tampon de tifon și vată, cum se poate vedea în fig. 141. În cazurile de epistaxă cu repetiție vom opri oboselile, mersul prea mult, băuturile alcoolice, lucrarea cu mintea prea îndelungată, starea la soare; se va combate anemia, cloro-anemia, debilitatea generală, paludismul cronic.

Epiteliom. — V. Cancer.

Eratic (lat. *errare*, a schimba locul); *dureri eratice*. — Se chiamă astfel durerile cari fug dintr'un loc într'altul. Frigurile cari vin în mod neregulat se zic *eratice*. Erizipel *eratic*, sau erizipel *ambulant* se chiamă brânca ce se întinde din loc în loc, ocolind astfel o parte a corpului. Mai sunt dureri eratice: *nevralgiile* cari de asemenea se duc din loc în loc, unele dureri *reumatice*, etc.

Ereditate, hereditate (lat. *haereditas*), *moștenire*. — Prin acest cuvânt se înțelege condițiunea organică în virtutea căreia ascendenții transmit unele particularități fizice, sau morale, ale ființii lor descendenților. Ereditatea poate fi *directă* dacă aceste particularități vin dela tată sau dela mamă și *indirectă* când copilul nu seamănă cu tatăl sau mama ci cu un colateral (unchi, mătușe, veri, verișoare), Alteori ereditatea trece peste o generație sau două, așa că copilul seamănă unui bunic sau bunică, sau chiar unui străbun. Mai este o ereditate zisă *de influență* și anume când o femeie văduvă se mărită și face un copil, care nu seamănă cu tatăl său, ci cu bărbatul prim al mamei sale. Pe noi ne interesează în articolul de față mai mult ereditatea *morbidă*, adică transmiterea boalelor, infirmităților sau vi-



Fig. 171.
I. G. Mendel
(1822—1884)

țiilor de conformațiune dela părinți la copii. Intre aceste din urmă avem *buza de epură* și *picioarele strâmbe*. Dintre boalele *sistemului nervos* cari se transmit din tată în fiu avem: *nebulnia* (alienația mintală), *epilepsia*, *isteria*, *idiofia*, *apoplexia*, *migrena*, *astma*. Dintre boalele *constituționale* avem: *scrofulele*, *oftica*, *cancerul*, apoi *diabetul*, *guta*, *reumatismul*. Unele boale de inimă, unele boale de piele, unele boale de ochi (miopia, strabismul). Boalele ereditare pot lua o altă formă la copii, diferită de a părinților, astfel: *isteria*, sau *epilepsia* părinților se poate transmite sub formă de *nebulnie*, *alcoolismul* la părinți se transmite sub formă de *epilepsie*, etc. În general din părinți bolnăvicioși se nasc copii în stare de slăbiciune, cu o putere de rezistență mică față de diferite boale, în special față de boalele microbiene.— Pentru ca să putem îndepărta întru câtva influența rea a eredității, putem lua diferite măsuri față de părinți și față de copii. Se vor opri căsătoriile între rudeni cari nu sunt pe deplin sănătoși și căsătoriile între persoane de diferite familii, cari au o sănătate subredă, sau rea. Mama bolnavă, sau bolnăvicioasă, nu va alăpta cu nici un preț copilul; vom da copilului soare și aer curat și pentru aceasta este bine să-l creștem la țară.

Eretism (grec. *erethizein*, a excita, a întărâta, a atâta). — Este o stare de întărâtare a sistemului nervos senzitiv, în total sau parțial. În cazul dintâu avem agitație (neliniște), sensibilitate (simțire) prea mare la impresiunile fizice și morale, creșterea acțiunilor reflexe, trebuința de a umbla, etc., în cazul al doilea avem o întărâtare neobișnuită a sensibilității, sau a contractilității în unele părți ale corpului de exemplu: simțirea prea mare a unei răni, bătaia vie a arterelor, tresăriturile mușchilor, etc.

Ergotină. — Este extractul apos al *săcarei cornute*. Are proprietatea de a provoca contracțiunile mitrei, de a opri curgerea de sânge (emostatic) și de a combate căldura (antipiretic). Se dă în doză de 50 ctgr. până la 4 gr. pe zi, sub formă de pilule, sau într'o poțiune (băutură) oarecare. Se mai poate da și în injecțiuni subcutanate.

Pentru cazurile de otrăvire, caută la *Săcară cornută*.

Ergotinină. — Alcaloid cristalizat extras din *săcară cornută*. Lucrează ca și *ergotina* și se dă în doze cu mult mai mici: un sfert de miligram până la 1 miligram în injecțiuni sub piele, sau în sirop, socotit pe un sfert de miligram pentru o linguriță.

Ergotism. — Prin acest nume se înțelege otrăvirea cu *săcară cornută*. În stare *acută* această otrăvire se arată sub formă de amețeli, cu dureri de cap și prostrație musculară. Mai des se vede ergotismul *cronic* la cei ce se hrănesc cu făină de săcară stricăta. El se arată sub două forme: *convulsivă* și *gangrenoasă*. Boala începe cu furnicături, cu amorteală și anestezie, apoi tresărături în mușchi și o contracțiune tonică (sgârcire) a membrelor, adeseori amețeli, anxietatea precordială, pierdere de cunoștință și câte odată leșin (sincopă) mortal. În forma gangrenoasă, pe lângă semnele acestea mai avem gangrena uscată a picioarelor și mâinilor. Tratamentul acestei cumplite boale constă în purgative, antiseptice și mai cu seamă în hrană și igienă.

Eritem. — Prin acest nume nu se înțelege o boală de sine stătătoare, ci niște pete roșii, de întindere variabilă cari se ivesc pe piele și cari pier prin apăsarea cu degetul pentru a se ivi din nou după ridicarea lui. Sunt multe feluri de eriteme după cum sunt și cauzele cari le produc: *polimorf*, *nodos*, *rubeolic*, eritemul (opăreala) *copiilor mici*. — *Eritemul polimorf* se arată pe dosul mâinilor, la gât, la glezne, sub formă de pete, de beșicuțe, de bubulițe. Durata lui e de una până la șase săptămâni, el poate fi produs de unele alimente, de boale de mitră, de reumatism, de sifilis. *Tratament*. Se va combate starea generală; când se formează beșicuțe se va da pe dinăuntru: sulfat de chinină, ergotină, câte 10 ctgr., extract de beladonă, 1 mgr., pentru 1 pilulă, se vor da astfel de pilule 4—8 pe zi. Dacă nu este febră se va da iodurul de potasiu 1—3 gr. pe zi. *Local* se va aplica alifia următoare: oxid de zinc 5 gr., talc, 10 gr., amidon, 20 gr. Când sunt dureri se vor pune cârpe cu apă

ERIT

de plumb, sau cu o soluție de acid fenic (1 la 100), sau alifie cu: mentol 2 gr., vaselină, 50 gr., acid salicilic 1 gr. Când sunt beșicuțe mari dureroase se vor înțepa cu un ac trecut prin flacări, apoi se vor spăla cu o soluție de acid fenic, sau sublimat corosiv. În eritemul sifilitic se va face tratamentul specific. — *Eritemul nodos* se ivește de obicei la gambe, pe dosul picioarelor, sub formă de pete roșii, ridicate, tari și dureroase la apăsare, cari din roșii închise devin în cele din urmă vineții, apoi gălbui și după ce pier lasă în urma lor pete închise. Aceste pete se însoțesc de febră, de indispoziție generală, de dureri în mușchi și în încheieturi. Boala poate dura 15 zile până la 6 săptămâni. Cauzele acestui eritem sunt: reumatismul, limfatismul, frigul umed mai ales la fețele tinere. *Tratament.* Odihnă în pat, curățenii (unt de ricină), iar contra căldurii se va da: chinină, antipirină, salicilat de sodă. Dacă n'are căldură se va da iodurul de potasiu, 1—3 gr. pe zi; la cei sifilitici se va face tratamentul antisifilitic. La cei cu friguri palustre se va da chinină. *Local* se va pune de 2 ori pe zi din alifia următoare: acid salicilic, ulei de terbențină, lanolină, din fiecare câte 5 gr., vaselină, 40 gr. — *Eritemul rubeolic* se numește astfel fiindcă se aseamănă cu erupția dela pojar și are drept cauză o infecțiune generală, cum se întâmplă în febra tifoidă, în gripă (influență), în coleră, în piohemie, etc. și uneori este produs de medicamente: balsam copaiv, iod, brom, chinină, etc. *Tratamentul* este cel al boalei generale și în cazul din urmă suprimarea medicamentului și curățenii. — *Eritemul copiilor mici*, cunoscut în popor sub numele de *opăreală*, se ivește de obicei la îndoiturile gâtului, la stinghii, la șezut, în partea de jos a pântecelui și între picioare, unde este produs de urină și materiile fecale, producând usturimi mari și uneori răni întinse prin neîngrijire. *Tratament.* Îngrijire și curățenie mare. Copilul trebuie primit curat ori de câte ori se udă, sau se murdărește, să se spele pielea cu apă caldută sau cu fierțură de foi de nuc, să se șteargă, apoi să se presare pudră de talc, licopod, oxid de zinc.

ERIZ

Părțile cari se ating trebuiesc depărtate, punând vată între ele, cum este la subțiori, la gât și între picioare. — La *fară* se scaldă copilul, apoi se presară pe opăreală humă făcută praf, sau făină de porumb cernută prin pânză deasă, sau praf galben de licopod (chedicuță sau brădișor).

Eritem solar. — V. *Insolațiune*.

Eritrol. — Iodur dublu de bismut și de cinconidină. Analgezic, antiseptic, eupeptic. Doză: 1—5 centigrame asociat cu magnezie (1 la 10).

Erizipel (gr. *eryein*, a atrage, și *pelas*, aproape), *brâncă*, *orbalt*. — Se ivește de obicei la față, începând de multe ori cu nasul, de unde se întinde la cap, la urechi, la gât și mai departe, părăsind sau nu locurile atinse dela început. Adeseori erizipelul se ivește în jurul rănilor de orice soi, dar mai cu seamă în jurul rănilor produse prin armă de foc, ori prin lovituri. În acest caz erizipelul se numește *chirurgical*, spre deosebire de celălalt, care se zice *medical*, fiindcă vine dela sine fără vr'o cauză vădită. Brâncă este molipsitoare se întinde, dela om la om, mai ales în localurile unde este multă lume adunată, de pildă în spitale, căzărni și școale. Ca toate boalele molipsitoare, erizipelul își are și el un microb, care este *streptococul piogen*, care de altfel se găsește și în alte boale. Acest microb se arată sub forma unui șirag de *coci*, dispuși în formă de mătăni. Nu se știe bine cum se face infecțiunea, dar este probabil că microbul se introduce printr'o sgârțură foarte mică și nevăgată în seamă, care s'ar afla în nas, la buze, la pleoape, pe obraz, la ureche, de unde se și explică de ce erizipelul se ivește mai des la față. De altfel microbul se poate introduce prin orice rană, cât de mică și ori unde s'ar afla ea. — Brâncă este o boală cu fierbințeală mare și care se arată în afară prin niște pete mari (plăci) roșii cu marginile ridicate puțin deasupra pielei dimprejur și cari în cele din urmă se scămășează și pier. La început bolnavul se simte rău, după care este apucat de un fior strașnic, îi este frig, așa de frig de-i scârșnesc dinții în gură, apoi este cuprins de căldură mare. Temperatura corpului ajunge câte odată până la 41 grade

iar bolnavul are durere de cap, sete mare, lipsă de poftă de mâncare, vârsături, urdinare, lipsă de somn și uneori aiurare; gâlcile sau ghindurile din apropierea locului atins se umflă și produc durere, după cum se întâmplă cu gâlcile dela gât, când brânca este la față. După 2—3 zile începe să se arate o pată mare roșie, formată de pielea aprinsă (inflamată), care se întinde din ce în ce mai mult, de culoare roșietică, dar cu timpul devine din ce în ce mai închisă. Roșeața piere prin apăsarea cu degetul, pentru a se ivi din nou îndată după ridicarea lui. Marginile acestei pete sunt puțin mai ridicate decât pielea din jur și sunt de culoare gălbue. Părțile de dedesuptul pielei se umflă, câte odată foarte mult, mai ales la față, așa că chipul omului este cu totul schimbat. În tot timpul cât ține pata bolnavul se simte foarte rău și are fierbințeală mare. După 4—5 zile pata se vestejește, se pălește, își pierde culoarea și se sbârcește, apoi se scâmoșează și cade sub formă de pelițe late, după care bolnavul începe a se simți mai bine și a intra pe cale de vindecare. Peste tot boala ține cam 10 până la 12 zile. Câte odată se formează sub pată puroiu, alte ori părțile atinse cad în putreziciune (gangrenă). Când brânca are o formă grea aduce cu sine moartea; puterile bolnavului se sleiesc din ce în ce, buzele și dinții se acopăr cu un strat negricios, limba se usucă, pânțele se umflă, o urdinare strașnică începe, pielea corpului se îngălbenește, apoi omul cade într'un fel de toropeală, din care nu se mai deșteaptă. — *Tratament.* Vom ține bolnavul într'o odaie curată și bine aerisită; așternutul va fi curat întreținut, odihna la pat și liniște; vom da tonice (întăritoare), alcool, stimulente difuzibile, căldura se va combate cu chinină, *rubiazol*, *prontosil*, *antipirină*. Drept hrană se va da lapte, zeamă de carne, vin cu apă, limonadă cât vrea bolnavul. Pe brâncă se vor aplica comprese, sau cârpe înmuiate în acid fenic (2 la 100), în sublimat corosiv (1 la 1000), în ichtiol (1 la 10), sau se vor face pulverizațiuni cu acid fenic (3 la 100), cu sublimat (1 la 500). Se mai poate unge

cu: ichtiol, glicerină și apă, din fiecare câte 20 gr., sau se va întrebuința colodiu iodoformat, sau colodiu cu sublimat, din fiecare câte 20 gr., cu cari se vor unge părțile atinse, de 3—4 ori pe zi, până pe părțile sănătoase. Se mai fac injecțiuni sub piele, în grosimea petei, sau pe la marginile ei, cu acid fenic (3 la 100), de 3—5 ori pe zi, sau cu sublimat sau cu soluție iodoiodurată. Se mai recomandă diferite alifii: *resorcină*, 5 gr., *ungvent cince-reu* 10 gr., *vaselină* 20 gr., sau cu: acid salicilic, 2 gr., *mentol*, 1 gr., *vaselină*, 30 gr., sau cu: acid fenic, 1 gr., ichtiol, 10 gr., *uleiu de terbentină*, 10 gr., *lanolină* 20 gr., sau cu: sublimat, 40 ctgr., *vaselină* 30 gr. În cazurile grave, cu aiurare și căldură foarte mare, se recomandă băi calde sau reci, alcool și opiu în doze mari, când bolnavul este alcoolic. În cazurile de intoxicație gravă: injecțiuni sub piele cu *ser artificial*, diuretice și cafeină, apoi *seroterapie* cu serul anti-streptocic. — La *fară* se fac diferite descânțece pentru ca să se vindece brânca, iar ca leacuri se întrebuințează piele de cal, de căine, așin (albus glutinos), bobovnic (*veronica baccalunga*), brâncă (*salicornia herbacea*), corn (*cornus mas*), cucurbitică (*aristolochia clematitis*), iarba tâlharului (*actaea spicata*), mintă, muștar, nufăr galben (*nuphar luteum*), patlagină (*plantago maior*), podbal (*tussilago arfara*), ridiche, soc.

Ermafrodisism, *hermafrodisism* (grec. *hermēs*, mercur, și *aphoroditē*, *venus*). — Prin acest cuvânt se înțelege existența organelor genitale masculine și femeiești în același timp la unul și același individ, așa că el este destoinic de a feconda și a fi fecondat tot odată. Ermafrodisismul trebuie studiat atât din punctul de vedere al anatomiei comparate, cât și al teratologiei. Ne vom ocupa numai din acest din urmă punct de vedere la articolul *Monștrii*.

Ernie, *hernie* (lat. *hernia*, grec. *kèle*, tumoare, umflătură), *boșorogeală*, *surpătură*. — Când am vorbit de *abdomen*, sau *pânțele*, am arătat că cea mai mare parte a acestei cavități este ocupată de intestine (mațe), subțiri și groase și că peretele acestei cavități este format de pereți groși, formați

din mușchi tari și din piele (vezi *Abdomen*), dar în unele locuri acești pereți sunt mai subțiri și mai slabi, și anume la *buric* (ombilic) și la *stinghie* în amândouă părțile, în așa zisele *regiuni ingvinale*. Când intestinalele sunt împinse printr'o împrejurare oarecare dinăuntrul pântecelui în afară, în dreptul unuia din aceste locuri, ele străbat peretele și ajung sub piele formând o umflătură (o, tumoare), care merge crescând și poate da naștere la accidentele mortale. Această tumoare se numește *ernie*, sau *surpătură* și ea se zice *ombilicală*, când este la *buric*, și *ingvinală*, când este într'una din *stinghii*, iar când ea se formează mai jos de îndoitura stinghiilor se zice *crurală*. Aceasta este cea mai rară, pe câtă vreme cea ingvinală



Fig. 172. — Hernia strangulată (și amănunt anatomic explicativ)

se vede cele mai adeseori. — Unii copii se pot naște cu ernie și atunci ea se numește *congenitală*. În cele mai multe cazuri surpătura se ivește mai târziu, în primii ani ai vieții, în urma unei violențe exterioare, a unei căderi, sau a unei lovituri pe pântec, sau a unei răniri, care slăbește peretele și mai mult în părțile lui deja mai slabe, și intestinul poate să-l străbată mai cu înlesnire până sub piele. Ernii se formează în urma unei sforțări în cari mușchii se contractă, se strâng puternic și împing de toate părțile mâțele cari caută atunci să scape prin părțile cele mai slabe mai sus pomenite. Astfel ernia se ivește la copiii cari plâng mult, cari tipă, cari tușesc, iar mai târziu la oamenii cari muncesc din greu, ridică lucruri grele, mai grele decât puterile lor, din care pricină bărbații sunt mai supuși la această boală decât femeile. Mulți se nasc cu pântecelul mai slab și predispus la

ernie, din părinți cari au suferit și ei de această boală. — O surpătură se cunoaște ușor, căci ea se vede și se simte. Ea se vede sub forma unei umflături în dreptul buricului, sau într'una din stinghii, umflătură rotundă, sau conică, sau cilindrică, moale și elastică, alteori păstoasă, care nu produce nici o durere, nici nu schimbă culoarea pielii, și care se mărește când bolnavul stă în picioare, tușește, sau face vr'o efort, iar când se culcă umflătura de multe ori pierde dela sine, adică mâțele se trag în pântec. Ele se pot împinge înapoi cu înlesnire, apăsând cu degetele asupra umflăturii. Când ernia se reduce, adică mâțele intră în pântec, se aud niște *borboroseli* (vezi acest cuvânt) produse prin amestecarea gazelor cu lichidele. Mărimea erniei este foarte variabilă, dela aceea a unei alune, sau nuci, până la aceea a unui cap de om. Ernii crurale de obicei sunt mici. Dacă ernia este simplă, adică așa precum am descris-o până aci, nu este gravă, nu este primejdioasă



Fig. 173. — Bandaje herniare

pentru vieață, dar se întâmplă uneori că ernia se *inflamează* (se aprinde), sau se *stranglează* (se gâtuește, se sugrumă) și atunci vieața este în primejdie. Ernii, care mai înainte intra lezne înăuntru (se reducea) acum nu mai poate intra (nu se mai poate reduce); bolnavul




Fig. 174. — Bandaj herniar aplicat la bolnav

simte mari dureri în pântec, scaunele sunt întrerupte cu totul, încep vărsăturile, cari la început sunt de alimente, apoi de lichide biliase (de fiere, de venin) și mai târziu de materii, cari prin mirosul și culoarea lor seamănă cu materii fecale; în fine, fața se trage, mâinile și picioarele se răcesc, bolnavul are fiori și peste câțva timp moare

dacă nu este operat. — *Tratament.* Ne vom ocupa mai întâiu de ernia simplă, necomplicată, care este *reducibilă* (adecă intră în pânțele când stăm culcați, sau o apăsăm). Pentru a opri ernia de a crește și la copii pentru a o vindeca chiar, se întrebuițează un *bandaj* (cerc) special, care este foarte bun dacă se aplică bine. Bandajul pentru hernia inghinală este format dintr'o perinuță fixată pe un resort de oțel, foarte elastic, căptușit cu vată și îmbrăcat în piele de căprioară întocmai ca și perinuța. Pentru erniile ombilicale se întrebuițează o înșingătoare, care are o perinuță la mijloc, pentru a apăsa buricul. Când ernia inghinală este dublă, adecă în amândouă părțile se întrebuițează bandajul dublu, cu două perinuțe. Un bandaj bine aplicat nu se mișcă din loc, oricare ar fi pozițiunea bolnavului. Nu este trebuință să se poarte bandajul și noaptea în pat, afară numai de cazurile în care bolnavul are tuse. Când se irită pielea vom întrebuița pudră de orez, de talc, sau de amidon, punând și un strat de bumbac pe deasupra înainte de a aplica bandajul. Astăzi însă nimeni nu mai are răbdare de a purta ani întregi bandajul, care, ori cât de bun ar fi, este plicticos și cu drept cuvânt, când fiecare se poate vindeca definitiv în 8—10 zile, prin operația așa numită *cura radicală* și pe care o recomandăm cu toată stăruința, fiindcă dă în totdeauna rezultate admirabile, mai ales acum când se face așa de ușor și de comod, amorfându-se bolnavul prin *rachistovainizare* sau cu simpla *anestezie locală*. Când ernia este strangulată vom căuta s'o reducem, pentru aceasta vom da bolnavului o poziție astfel ca șezutul să fie mai ridicat decât umerii și capul, coapsele îndoite și răsturnate în afară, apoi vom pune ghiață pe ernie, într'o pungă sau vom pulveriza-o cu eter și apoi vom face apăsări potrivite asupra ei, până ce va intra. Dacă nu reușim, nu trebuie să pierdem vremea și să recurgem la operație. — La *fară* surpătură se vindecă bând rachiul cu iarba lui Tatin, sau raci vii pe cari îi pisează și așa cruzi îi leagă la buric, cu ceapă, culbec, iarba surpăturii (herniaria

glabra), mac, iarba acului, pătrunjel, etc.

Erpes (gr. *herpes*), *arșiță*, *spuzeală*. — Când te scutură frigurile îți ies niște beșicuțe pe buze, cari în câteva zile se usucă. Aceste beșicuțe se numesc *erpes* și spre deosebire de alt *erpes*, care se ivește în alte părți, acest *erpes* se zice *labial*, adecă *pe buze*, iar în popor îi se zice *arșiță* sau *spuzeală*. Erpesul este o boală de piele, care constă în ivirea unor beșicuțe sau vezicule mici, albui, transparente, și cari sunt reunite mai multe la un loc, așezate pe o suprafață (o pată) roșie. Aceste beșicuțe sunt pline cu un lichid limpede, citrin, care după 24 de ceasuri se turbură, devine purulent ca puroiul, apoi fiecare beșicuță se turtește și se usucă cojindu-se, sau se transformă într'o cojiță gălbue. De obicei în opt zile totul se sfârșește, afară numai de cazul când se ivesc alte beșicuțe. Aceste beșicuțe se arată de preferință la buze, după cum am spus mai sus, dar ele se mai pot ivi la pleoape, pe corneea pe aripele nasului (la nări), sau la ureche; pot să se arate și în gură, pe gingii, pe limbă și chiar în gât. Erpesul se arată la cei ce au friguri, influență, gastrită, pneumonie, el se vindecă dela sine și prin urmare nu trebuie să ne ocupăm mult de el. Putem să spălăm beșicuțele cu apă de plumb, sau cu acid boric, apoi le presărăm cu pudră de scrobeală, de licopodiu, de feculă de cartofi, de orez, etc. — Când se ivește la organele genitale, la bărbat sau la femeie, se chiamă *erpes genital*. Pentru a-l preveni se vor face spălături în fiecare zi pe acele regiuni cu o soluțiune astringentă (apă de frunze de nuc, apă cu piatră acră, 30—50 gr. la un litru). Pentru vindecare se întrebuițează o alifie cu oxid de zinc și vaselină, iar dacă nu se vindecă iute vom arde beșicuțele cu nitrat de argint (1 la 20). Când sunt răni vom pune pudră aceasta: salol, bismut subnitric și oxid de zinc, câte 10 gr. din fiecare. — Când erpesul este în gură (*bucal*), vom atinge beșicuțele cu un *colutor* făcut din: borax, 10 gr., glicerină, 15 gr., apă de laur ceras, 25 grame. Se va face gargară cu clorat de potasă, etc. Erpesul este cu mult mai periculos

când se ivește la corneea (vezi ochiu). Se vindecă foarte greu și uneori se pierde vederea la ochiul la care s'a arătat, sau, în cazul cel mai bun, vederea rămâne mai slabă.

Erpes circinat. — V. *Tinea*.

Erpes tonsurant. — V. *Tinea*.

Erpes zoster. — V. la *Zona zoster*.

Erupțiune. — (lat. *eruptio*, dela *erumpere*, a eși). — Ori de câte ori se ivește pe piele vreo pată, roșeață, beșicuțe, sau alte bube, zicem că este o *erupție*. Toate boalele de piele nu sunt altceva decât tot atâtea erupțiuni. Când este vorba de acele boale în cari petele sau beșicuțele ies însoțite de *febră* mare, cum este scarlatina, pojarul, vărsatul, vărsatul de vânt, etc., ele se chiamă în mod general *febre eruptive*, adică boale cari se caracterizează prin căldură mare și erupțiuni.

Eruptive (Febre). — V. *Erupțiuni*.

Eșarpă, eşarfă. — Este un bandaj sau legătură care are de scop de a susține mâna, antebratul sau brațul, în cazurile de rănire, dându-le o poziție potrivită. Afară de aceasta, eşarpa oprește partea bolnavă de a se mișca, mai ales că ori ce mișcare produce durere. Ea se aplică în cazurile




Fig. 175. — Eșarfă

de fracturi, de scintiri, de răniri, precum și atunci când mâna este atinsă de un sugiu, de flegmon sau abces, și în cari cazuri toate mișcările sunt dureroase. Eșarpa se va face cu un colțar, cu un tulpă în 3 colțuri, sau cu un șervet îndoit în triunghi în modul următor: se trece unul din colțuri pe subțioara din partea bolnavă, ridi-

cându-se pe dinapoia pieptului până pe umărul din partea sănătoasă, iar celalt colț se trece pe dinaintea brațului bolnav și a pieptului tot spre umărul din partea sănătoasă, unde se împreună cu colțul cel dintâiu printr'un nod, sau un ac de siguranță, sau prin cusătură. Se obține astfel un șghiab (o gutieră) în care se odihnește brațul al cărui cot este îndoit orizontal. La cot răspunde colțul din mijloc al colțarului, care fiind prea lung este dus peste cot și fixat în partea dinainte cu un ac. Dacă numai mâna are trebuință de a fi susținută ne putem mulțumi numai cu o *eșarpă mică*, ce se face cu o batistă sau cu un șervet îndoit în două și fixat de haină cu niște ace, sau după gât printr'un nod.

Escară. (gr. *eschara*, crustă, coaje).

— Se numește astfel coaja negricioasă care rezultă din mortificația unui țesut gangrenat. Se produc escare în arsuri, sau prin aplicare de caustice, sau prin zăcere îndelungată în boalele grave (febra tifoidă, etc.). Pentru a preîntâmpina ivirea acestor escare trebuie să supraveghiem șoldurile și șalele bolnavilor cari sunt siliți să zacă mult timp, spălând părțile înroșite cu soluțiuni de clorat de potasă, sau de tanin, sau de acid boric, pudrându-le cu praf de talc, de scrobeală, de bismut, de tanin, etc., sau punând sub șezutul bolnavului saltea de lână și la trebuință o perină de cauciuc umplută cu aer, sau cu apă. După ce s'a format escara vom face pansament sau vom aplica praf de tanin, de chinchină, sau xeroform, ori alifii cu tanin, cu chinchină, cu xeroform, cu dermatol sau iodoform. După ce cade escara, rana vom spăla-o cu soluție de acid boric, acid fenic sau sublimat coroziv și apoi vom pune praf, sau alifie ca mai sus, iar pe deasupra un ștrat gros de vată.

Escarotic. — Orice substanță care, fiind aplicată pe piele, produce escară se zice că este *escarotică*. Astfel de substanțe escarotice sunt: acidele concentrate, calciul viu (varul nestins), clorurul de zinc, potasa și soda, fosforul, acidul arsenios, amoniacul.

Eschilă, așchie, țăndără. — Bucățiță mică ce se deslipește dintr'un os

frânt, sau necrozat (os mort). Pentru popor bucatelele de os mort se chiamă

colți de lup. Pentru eschile caută la *Fracturi și Necroză*.

Escoriațiune, *julitură, jupuitură, sgârietură*.

— O mică rănire foarte superficială, produsă de obicei printr'o frecare cam aspră și care nu interesează de-



Fig. 176. — Eschile osoase

cât stratul cel mai din afară al pielei, *epidermul*. Dacă se pune pe deasupra o bucată de talion, pentru a o scuti de atingerea aerului și de praf, se formează la suprafața escoriației o coaje și vindecarea se face în câteva zile. Cel mai bun lucru pentru a ne pune la adăpost de vreo infecție este de a spăla cu băgare de seamă orice sgârietură, cu multă apă sau cu o soluție antisepctică (acid boric, acid fenic, sublimat coroziv) și a face un pansament ușor. În acest mod se vor evita multe complicații: limfangită, adenită, sugiu.

Esculap. — Zeul medicinei, fiul lui Apolon și al Arsinoei. Esculap a avut de învățator pe centaurul Chiron care l-a învățat arta medicală, sau doftoricescul meșteșug. Esculap nu s'a mărginit numai în a vindeca boalele, dar s'a apucat să învie și morții, din care cauză Pluton s'a plâns lui Joe că împărăția lui se pustiește. Atunci Joe supărat l'a trăsnet pe Esculap, punându-l în numărul stelelor. Coșul, emblema pazei, și șerpele, emblema înțelepciunii, au fost consacrații lui Esculap. În vorbirea obișnuită un *discipol al lui Esculap* în-



Fig. 177. — Esculap

seamnă medic; un *Esculap*, un medic iscusit; *nu este un Esculap*, nu-i medic bun.

Esențe. — Se numesc *esențe*, sau *uleiuri volatile* ori *esențiale*, niște lichide obținute prin distilarea plantelor proaspete cu apă. Esențele au de obicei un miros tare, un gust arzător, din care cauză nu se pot întrebuița pe dinăuntru curate decât numai în doze foarte mici. Avem mai multe feluri de esențe naturale: de absint (pelin), de mentă, de scorțișoară, de lămâie, de flori de portocale, de laur-ceraș, de trandafiri, și terebentină. și *artificiale*, cari sunt niște eteruri scoase din gudron. Esențele sunt foarte active și trebuiesc date cu mare băgare de seamă pentru ca să nu producă *otrăviri*, chiar și când sunt date în doze mici, cum este esența de absint (vezi *Licoruri*).

Esofag (gr. *oisophagos*, dela *oisen*, a duce, și *phagein*, a mânca). — Se numește astfel canalul care leagă înghițitoarea (faringele) cu stomacul. Lungimea esofagului este de 25 centimetri, iar lărgimea de 2 centimetri și jumătate. El trece pe dinaintea șirii spinării și pe dinapoia laringelui (răsuflătoarii), a tracheei și a inimii, străbătând mușchiul diafragm, care desparte cavitătea pieptului de cavitătea pântecelui. Esofagul este format din două tunici: una externă *musculoasă* și alta internă *mucoasă*. Cea *musculoasă* este constituită din două straturi de fibre (firicele): unul superficial ale cărui fibre sunt *longitudinale* și celalalt profund care este mai subțire și ale cărui fibre sunt *circulare*. Contractiunea (strângerea) fibrelor longitudinale apropie unele de altele inelele formate din fibrele circulare, cari strângându-se împing de sus în jos mâncarea prin mișcări așa zise *peristaltice*. Când se întâmplă ca omul să aibă vărsături acțiunea este inversă, adică mâncarea este dată afară din stomac, și atunci mișcările se numesc *antiperistaltice*. Tunica mucoasă conține niște glande cari secretă un lichid care înleznește alunecarea mâncărilor în trecerea lor prin esofag. — *Boalele esofagului* cele mai principale sunt următoarele. *Infламаția*, numită *esofagită*, care se produce prin înghițirea

lichidelor fierbinți, a lichidelor caustice (*arzătoare*) cum sunt: vitriolul (acidul sulfuric) și potasa, a unui corp străin, cum este un os, un os de pește, un ac de cusut sau cu gămălie, etc. Ea mai poate fi produsă prin întinderea unei inflamațiuni din vecinătate (angină, mărgăritărel) sau ca complicație a unei boale generale (febra tifoidă, variola). Ca *semne* ale acestei boale avem o *durere* dealungul esofagului, care se mărește prin înghițirea mâncărilor, o greutate la înghițit și uneori chiar spazme care împiedică introducerea mâncării în esofag, apoi vărsături și emoragii. Tratamentul constă în băuturi calmante și reci din ghiață, în a suge bucățele de ghiață, în a aplica beșică cu ghiață pe gât, iar ca mâncare: lapte. *Esofagismul*, sau *spazmul esofagului*, poate fi de natură nervoasă (isterie, ipocondrie, panglică), sau de natură inflamatoare (esofagită). Se produce pe neașteptate cu prilejul unei emoțiuni, sau a înghițirii unei mâncări oarecare. El se însoțește de o simțire de apăsare și de strângere în partea de sus a gâtului. *Cancerul esofagului* are aceleași semne ca esofagita și esofagismul, la cari se mai adaugă o slăbire generală și repede, stângerea vocii, etc. *Corpi streini*. Se întâmplă uneori să se oprească în esofag o bucată de os, un ban, sau un alt corp străin și în acest caz, suntem nevoiți să recurgem la razele lui Roentgen, cu ajutorul cărora îl vom putea vedea și astfel îl vom scoate fie prin operație, fie prin alte procedee, pe care numai medicul le știe.

Espectorație, sau expectorație. — V. *Scurpare*.

Esuflare, gâfăire. — Când cineva face o efortare mare, sau când aleargă prea repede, sau când urcă o scară prea mare, respirația lui devine mai repede, mai scurtă, neregulată și foarte obositoare. Schimbarea aceasta în numărul și regularitatea mișcărilor respiratoare se cheamă *esuflare, gâfăire, înecăciune de piept*. Omul sănătos nu gâfăie decât atunci când se ostenește și această gâfăire încetează prin odihnă. Dar când gâfăirea se arată la cea mai mică mișcare și se repetă la fiecare minut, fără ca omul să facă vre-o efortare care s'o explice, atunci

ne arată o stare de slăbiciune generală, o anemie, o cloro-anemie, sau poate să fie semnul unei boale acute sau cronice de inimă, sau de plămâni, lucru despre care numai doctorul își poate da bine seama.

Etate (*aetas*, vârstă, vrâstă). — Acest cuvânt însemnează timpul petrecut dela naștere până la moarte. Când zicem *etăți* înțelegem diferitele perioade ale vieții în timpul cărora organismul nostru încearcă schimbări cari atrag după sine oarecare modificări fiziologice și patologice. Modificările fiziologice sau naturale se fac pe încetul, treptat și cer ca să se facă oarecari schimbări în modul de a trăi și explică varietățile de formă, de natură și de intensitate pe cari le prezintă boalele la diferitele etăți. Hrana, de pildă, nu poate fi aceeași în copilărie, în vârsta adultă și la bătrânețe. Copilul este scutit de boalele de inimă și artere, de înmoierea creierilor, de gută, de astmă, boale cari sunt mai mult pacostea bătrânilor, pe câtă vreme copiii suferă de turburări provocate de eșirea dinților, de alăptare, de inflamații (aprinderi) ale stomacului și mățelor (gastro-enterită), cari se observă mai ales în timpul verii. În copilăria a doua și în adolescență (junie) se văd febrele eruptive, pojarul, scarlatina, etc. și febra tifoidă. Creșterea începe la naștere: *nou-născut, copilărie, adolescență* (junie, tinerețe) și se prelungește până la etatea adultă sau virilă, care este perioada staționară. de stat pe loc. *Bătrânețea* este vârsta de scoborâș, declin. Inceputul adolescenței se mai numește și vârsta sau *etatea ingrată*. Iar *etatea critică* este încetarea regulilor, când femeia se mai zice și *iertată*.

Eter (gr. *aithér*, aer superior, dela *aithên*, a arde). — În chimie prin eteruri se înțeleg niște lichide mirositoare, cu gust arzător, foarte ușoare, foarte volatile și foarte inflamabile (cari iau foc foarte ușor), produse prin distilațiunea alcoolului cu unele acide al căror nume îl iau. Sunt mai multe feluri: *eter acetic*, care lucrează ca excitant și antispasmodic, dându-se în doză de 10—40 picături; pe dinafară se întrebuințează sub forma unui balsam în care e întovărășit cu camforul. *Eter*

bromidric sau *bromur ac etil*, întrebuințat ca anestezic, în contra isteriei, în contra epilepsiei; se dă sub formă de inhalațiuni repetate (anestezie generală), iar pe dinafară în pulverizațiuni (anestezie locală). *Eter sulfuric*, care este cel mai întrebuințat și lucrează ca: excitant difuzibil foarte energetic, antispazmodic, anestezic general și local. Pe *dinăuntru* se dă ca stimulent în leșin, sfârșeală, asfixie, etc., ca potolitor în durererile de stomac și de mațe, în colica de ficat, în astmă, și în stări nervoase. Se ia sub formă de picături, 5—6 picături pe o bucătică de zahăr, sau într'o jumătate de păhar cu apă îndulcită cu zahăr, sau în ceaiu de teiu, de flori de portocale, etc., sub formă de sirop (1 linguriță la copii, o lingură la adulți), în perle, cari se înghit cu apă și se topecs în stomac. Pe *dinafară* fiind aplicat dă o răceală foarte simțitoare pe locul unde se pune, și aceasta din cauză că se evaporează foarte repede. (fiind foarte volatil). Prin această răceală produce un fel de stare de liniște (de calm), astfel se întrebuințează în durerea de cap, migrenă, nevralgii, în arsuri, aplicându-se cărpe înmuiate, sau turnând picătură cu picătură. La durerea de dinți, de ureche, se pune bumbac înmuiat în eter, după care dispare durerea. Se întrebuințează în anestezia locală când se fac operații mici (scoaterea unei unghii încarnate); pentru anestezia generală se fac inhalațiuni.

Eter cloridric. — V. *Chelen*.

Eteromania. — Este obiceiul rău de a bea eter până te simți beat ca de alcool, obicei de care nu se mai pot scăpa cei ce au fost stăpâniți de această patimă. Eterul se bea sau se inhalează; unii beau până la 1 litru pe zi. Inhalarea e mult mai periculoasă, căci se poate trece ușor peste doza trebuincioasă beției eterice și atunci corpul ajunge la anestezie și chiar la moarte. Beția e de scurtă durată și dispare brusc, fără să lase în urmă-i senzații neplăcute. Eteromanului îi lipsește tendința irezistibilă către toxic. Lipsa toxicului nu-i dă turburări, deci se deosebește de ceilalți intoxicați, la care suprimarea bruscă dă accidente foarte grave. În

timpul beției fața se congestionează, pupilele se dilată, are halucinații, apetitul sexual este mărit și eteromanul se simte ușor ca un fulg. Această senzație îi este plăcută. Beția eterică poate să fie însoțită de convulsii asemănătoare cu cele epileptice, dar fără să aibă simptomele epilepsiei. Delirul tremens eteric are aspectul celui alcoolic. Eterismul cronic dă insomnie, iritabilitate, eteromanul este mai periculos ca alcoolicul. În acest stadiu prezintă tremurături, instabilitate, amețeli, dureri de cap. Simțul diminuat, impulsii și perversiuni sexuale, iar la urmă eteromanul devine dement. (După dr. Retezeanu).

Etil (Clorur de). — Lichid inflamabil ca și eterul sulfuric, care se întrebuințează în pulverizațiuni pentru a produce anestezie. Se recomandă în nevralgii.

Etiologie. (gr. *aitia*, cauză, pricină, *logos*, tratat, vorbire). Partea medicinei care se ocupă cu studiul cauzelor boalei din senin, fără cauză, boale spontane. Cauzele boalelor se împart în două: *interne*, cari atârnă de individ, cum sunt: moștenirea, constituția, temperamentul, etatea, sexul, etc. și *externe*, cum sunt: influențele atmosferice sau cosmice, climatice, influența locuințelor, a alimentației, a îmbrăcăminte și mai ales influența exercitată asupra organismului de către paraziții animalii, sau vegetali (microbi).

Etuvă. — Se numește astfel aparatură




Fig 178. — Sterilizator electric cu aer cald

tul cu ajutorul căruia putem obține o temperatură mare, în mod artificial,

cu ajutorul aburilor sau al căldurii, pentru a nimici paraziții animali, sau vegetali, cari produc boale. Sunt mai multe feluri de etuve: *etuvă de sterilizare*, care este un fel de cutie metalică încălzită cu gaz, spirt sau electricitate, la o temperatură de 140—170° pentru a steriliza instrumentele de chirurgie. — *Etuvă de dezinsecțiune* (v. *Dezinsecțiune*). — *Etuvă pentru cultura microbilor*, care este ca un dulap în care, prin încălzirea cu gaz, se obține o temperatură favorabilă vegetațiunii microbilor; — *etuvă de aburi* (v. *Băi*).

Eucalipt (*Eucalyptus globulus*, fam. mirtaceelor). — Se întrebuințează foile în contra frigurilor, ofitei și catarului sub formă de: ceai (infuzie), 20 la 1000, praf 4—16 gr., sirop, 30—100 gr., tinctură alcoolică, 1—10 gr., extract alcoolice, 50 ctgr. până la 2 grm.

Eucaliptol. — Este principiul activ sau esenția *eucaliptului*. Se întrebuințează sub formă de inhalații în contra răgușelii (laringitei), în injecțiuni sau sub formă de perle (1—3 gr.) în contra ofitei. Se mai pune în untura de pește pentru a-i da un gust mai plăcut.

Eudermol. — V. *Tutun*.

Euforb. — Este o gumă rezină care se scoate din niște plante grase succulente (*Euphorbia officinarum*, *E. antighuorum*, *E. canariensis*, fam. cuforbiaceelor), cari cresc în unele țări subecvatoriale ale Africii și Asiei. Luat pe dinăuntru este un purgativ drastic, iar aplicat pe piele produce roșeață și beșici ca o vezicătoare. Produce și strănutare. Fiind *otrăvicios* trebuie păstrat cu multă îngrijire. Nu se prea întrebuințează.

Eunatrol. — V. *Oleat de sodă*.

Euphorbia Pilulifera (familia euforbiaceelor). — Se întrebuințează planta întreagă, contra respirației grele (antidispneic). Se dă sub formă de: extract apos 4—10 ctgr. — extract fluid 2—4 gr.; — tinctură alcoolică 10—30 picături.

Eustație (Boalele trompei lui). — V. *la Ureche*.

Evonimin. — — Extract hidroalcoolic din planta *Evonymus atropurpureus*, (fam. celastraceelor). — Se întrebuințează varietatea brună. Lucrează ca laxativ, colagog. Se dă 5—15 ctgr. pe zi, în pilule: evonimin, 1

gr., extract de iosciam 20 ctgr., să se facă 20 pilule și să se ia 1—2 seara la culcare.

Exalgină, *metilacetanilidă*. — Analgezic (taie durerea) puternic, mai bună decât antipirina și în doză cu mult mai mică. Se dă în nevralgii (mai ales în cele dela față), în contra durerilor cari le au unele femei înainte de regule, în contra paraliziei agitante. Doza: 25—40 ctgr. de 2 ori în 24 ceasuri. Se poate da până la 1 gr. 50 ctgr. în 24 ore, în doze de câte 25 ctgr. Se dă în buline, prafuri sau într'o poziune alcoolizată.

Exantem (dela grec. *ex*, afară, și *anthos*, floare), sinonim cu *erupțiune* (vezi acest cuvânt).

Excipient (lat. *excipere*, a primi). — O substanță în care se încorporează, sau se dizolvă unele materii cari servesc la confecționarea unui medicament. Excipientul servește pentru a masca mirosul diferitelor preparațiuni cari intră în compoziția medicamentului, sau ca să-i dea acestuia o consistență potrivită pentru prepararea pilulelor (hapurilor).

Excitante. — Medicamentele *excitante*, sau *stimulente*, au însușirea de a reînsușește puterile aproape pierdute. Se deosebesc de cele *tonice*, cari măresc puterile în măsură mică și gradată, pe nesimțite, prin aceea că lucrează repede și cu putere, scăpând pe bolnav din ghiara morții. Excitante se întrebuințează în cazuri grave și de urgență, atunci când omul este pe cale de a se pierde, de a-i ieși sufletul, de a-și pierde cunoștința, de a leșina sau de a se răci tot, fie în urma unui accident (rănire, arsură, înecare, asfixie), fie în urma unei emoțiuni vii, fie în urma unei boale care, ca și colera, oprește în câteva ceasuri toate funcțiunile organelor. Intre excitante se numără și *căldura*, care este la îndemâna tuturor și care se întrebuințează sub formă de *cârpe* (comprese), încălzite sau înmuiate în apă fierbinte și aplicate la lingurea, *băi calde* de picioare, cu sau fără *muștar*, *fricțiuni* peste tot corpul făcute cu o cârpă foarte caldă, băuturi sau *ceaiuri* calde de *melisă*, *mentă*, *angelică*, *anason*, etc., cari excită deadreptul stomacul și căldura lor se transmite de acolo la tot

corpul. Un excitant puternic este *electricitatea*, care întetește respirația, în cazurile de asfixie. Apoi *aerul rece* de asemenea este un bun excitant și pentru a-i mări efectul ne vom servi de un evantaiu (vânturătoare). *Amoniacul eterul*, *oțetul* la nas produce o excitațiune salutară, scăpând pe mulți leșinați. Pe dinăuntru vom da *cafea*, *ceaiu*, *vin curat* și *vechiu*, *rachiu*, *rom*, care se vor da în cantitate potrivită după vârsta și puterea bolnavului, curate sau tăiate cu apă. *Eterul* se dă pe o bucătică de zahăr, sau în puțină apă îndulcită cu zahăr, 5—10 picături odată. *Apă de melisă*, *apa de mentă*, *kola*, *coca*, etc., sunt tot atâtea excitante. Prin urmare când vom fi în fața unui caz de leșin, de sfârșeală, de pierdere de cunoștință, îndată îi vom încălzi picioarele și mâinile cu ajutorul căldurii, vom face să-i vie aer rece asupra feței, îi vom pune la nas eter sau amoniac, îi vom da să bea un ceaiu cald cu coniac sau rom, și aceasta, bine înțeles, până să vină doctorul.

Excoriațiune. — V. *Escoriațiune*.

Excrement (dela lat. *excernere*, a separa, a curăți). — V. *Fecale* (Materii).

Exercițiu (lat. *exercitium*, deprindere îndeletnicire). — Se numește exercițiu orice mișcare făcută cu voință, cu metodă și cu un scop igienic hotărât, pe care o execută mușchii membrelor și ai trunchiului. Intre exerciții se numără *călăria* sau *echitațiunea*, *țuga*, *danțul*, *gimnastica*, *înotarea* sau *natațiunea*, *mersul* sau *umbletul*, *scrima*, *vâslitul* (vezi aceste cuvinte), precum și diferitele jocuri, cum sunt: oina, popicele, tenisul, etc. Fiecare din aceste exerciții lucrează într'un mod special, unele pun în mișcare mușchii mâinilor, altele ale picioarelor și altele ai trunchiului, dar toate au și efecte comune și anume: activează (întetesc) *respirațiunea*. Cei ce fac exercițiu de mai mult timp și se obișnuiesc cu el au mișcările respiratoare ceva mai dese și plămâni se lărgesc și primesc aer mai mult, din care cauză un exercițiu, mărit încetul cu încetul, este bun pentru cei ce sufăr de astmă, pentru cei ce au răsuflarea scurtă în urma unei tuse învechite pentru cei aplecați spre oftică, etc. La cei ce fac pen-

tru prima dată exercițiu respirația este mai frecventă și mai scurtă, ba unii se înneacă. Ii se ia calea sufletului și trebuie să se oprească; lucrul acesta însă dispare în curând prin obișnuință. — Exercițiul grăbește *circulația*, așa că inima bate mai repede și mai cu putere. Pentru cei ce sufăr de *palpitațiuni* (bătăie de inimă) exercițiul mult nu este bun. Exercițiul moderat este foarte folositor, căci el face să circule regulat sângele în toate părțile corpului și îl împinge până la extremitățile cele mai depărtate de inimă. Pentru aceasta el este bun la cei ce sufăr de anemie, cloroză, limfatism, pentru cei ce au de obicei picioarele reci. — Exercițiul mărește *transpirațiunea* (nădușeala), ceea ce face bine, căci prin sudoare ies afară multe lucruri rele din corp, deschide *pofta de mâncare* și ușurează *mistuirea*, din care pricină este foarte bun pentru cei ce sufăr de dispepsie (mistuire grea). Nu trebuie făcut îndată după mâncare, fiindcă atunci sângele se duce spre mușchi în loc de a merge spre stomac, care are mai mare trebuință de el. — Exercițiul desvoltă *mușchii*, în volum și în energie, și dă corpului o putere nouă. Mușchii cei mai munciți se desvoltă mai mult, la brutari, fierari, zidari, etc., mușchii brațelor, la cei ce aleargă, dansează, etc., mușchii picioarelor (pulele). Igiena însă cere ca să exercităm toți mușchii de o potrivă, prin urmare să facem tot felu de exerciții. — Exercițiul micșorează *greutatea corpului*, din care cauză se recomandă foarte mult la cei grași și la cei predispuși la grăsime, la cei ce sufăr de obezitate. — Exercițiul face *corpul* să fie mai puțin simțitor la influențele stricătoare, cum sunt: căldura, frigul, oboseala, etc., astfel se explică de ce lucrătorii suportă bine frigul, umezeală, iarna aspră, pe câtă vreme cei ce stau în casă, lucrând la masă, cari duc o viață sedentară, capătă numai decât reumatism. — Pe lângă toate acestea, exercițiul îndreptează *deformațiunile*, deviațiunile, strâmbăturile corpului, atât pe cele din naștere, cât și pe cele câștigate prin ațitudine vicioasă, prin cădere, etc. Să nu facem exercițiu îndată după masă, lăsând să treacă cel puțin o

EXOF

EXOS

jumătate de ceas la mijloc, iar când am mâncat mult și în timpurile călduroase, acest interval trebuie să fie și mai lung. La început exercițiul îl vom face mai încet, apoi din ce în ce mai iute și spre sfârșit iar mai încet, pentru ca circulațiunea și respirația să se facă în mod regulat și să nu se obosească sistemul nervos. Respirația trebuie să fie adâncă și largă, iar nu grăbită în timpul exercițiului, căci nu este bine să introducem aerul trebuincios în plămâni prin înmulțirea respirațiilor adânci. Astfel vom face exercițiul cu multă înlesnire și fără oboseală. Nu trebuie ca hainele să fie strânse în jurul gâtului și a pieptului. Nădușeala este bună chiar și când este multă, cu condiție însă ca ea să fie absorbită de îmbrăcăminte pe măsura în care se face și ca evaporarea apei, care pătrunde în haine, să se facă pe încetul pentru ca să nu răcească corpul. Pentru aceasta se recomandă hainele de lână, flanelele. Când suntem prea asudați nu este bine să stăm pe loc în curenți de aer, în vânt, nici să bem multă apă rece; s'o bem încet, înghițitură cu înghițitură. Când se poate este bine după exercițiu să facem o spălătură *repede* de apă rece, duș, după care îndată să ni se facă o fricțiune uscată și să ne îmbrăcăm repede. E bine ca exercițiul să se facă în totdeauna în aer liber, iar nu în loc închis, acoperit, în sala de gimnastică, în manej, unde aerul se strică repede. Exercițiul se recomandă în anemie, în artrism în constipație și în boalele nervoase. El nu este bun când cineva are febră (fierbințelă), sau curgere de sânge (emoragie), nici în convalescență. Un lucru nu trebuie să uităm: să nu facem abuz de exercițiu, să nu mergem cu el până la osteneală, ci să ne oprim îndată ce începem să ne oboșim. Exercițiul *pasiv*, adică acela care îl fac mușchii puși în mișcare de un agent exterior, fie un alt om, fie un animal, sau o mașină (*masajul, gimnastica suedeză, mecanoterapia*) este bun și se recomandă ca tratament în multe stări bolnăvicioase, după cum vom arăta la articolele respective.

Exoftalmie (gr. *ex*, afară și *ophthalmos*, ochiu). — Eșirea ochilor în afară de orbitele lor, din cuibul lor,

în urma unei boale a regiunii orbitare, a globului ocular însuși, sau generală (boala lui Basedow).



Fig. 179. — Exoftalmie



Fig. 180. — Exoftalmie basedowiană

Exogonium jalapa. — V. *Jalapa*.

Exostoză (dela grec. *ex*, afară, și *ostion*, os). — Se observă uneori, la suprafața oaselor, alte mici oscioare, crescute neregulat, dar bine prinse de

osul din care au luat naștere, așa cum se vede în figura alăturată. Aceste oase crescute neregulate se cheamă exostoze.

Expectorante (lat. *ex*, afară și *pectus*, piept). — Se numesc astfel medicamentele cari ușurează scoaterea flegmei, a scuipatului, curățind astfel *bronchiile* (vezi *Bronchie*) de materiile pe cari le cuprind. Expectorantele lucrează fie că fac scuipatul mai lichid, mai subțire (tolu, terbentina, gudronul, etc.), fie că excită (întetesc) mușchii bronhiilor ca să se strângă (ipeca, kermes, etc.). Aceste din urmă luate în doze mai mari produc vărsături, sunt *vomitiv*, din care pricină trebuesc luate cu băgare de seamă. Iată și lista expectorantelor: acidul benzoic, antimoiu, apocodeina, apomorfina, obligeana (acorus calamus), iarba mare, (inula helenium), diferitele balsamuri, mixandra sălbatică (erysimum), guma amoniaca, gudronul, isopul, ipeca, stânjinii (iris), kermes mineral, naftalina, poligala, ceapa de mare (scuilla), răculețul (polygonum bistorta), terbentina, topo-rașii (viola odorată).

Expirațiune (lat. *ex*, afară și *spirare*, a sufla). — Timpul *respirațiunii*, în care aerul este dat afară din plămâni, din piept (vezi *Respirație*).

Exsudat (lat. *exsudare*, din *ex*, afară, și *sudare*, a asuda). — Se dă acest nume la niște produse cari se găsesc în organe sau în țesuturi și cari se formează acolo în urma eșirii prin pereții vaselor a unor părți constitutive ale lichidelor sanguin. Cauzele exudatelor pot fi mai multe: o alterație discrazică a sângelui, permeabilitatea anormală a pereților vaselor capilare sau presiunea exagerată a sângelui în vase. Exudatele arareori sunt *seroase*, mai totdeauna ele cuprind mucină și fibrină. Exudatele *mucose* se văd la suprafața mucoaselor și în cavitățile articulare (în încheieturi). Exudatele *fibrinoase* sunt constituite prin acțiunea exercitată asupra substanței fibrinogenă care iese din vase prin materia fibrino-plastică ce vine din celule, sau prin niște fermenți ai căror germeni se găsesc în atmosferă. Nu se poate afirma dacă aceste exudate se pot organiza.

Extază (gr. *ex*, afară, și *stasis*, stare).

— Este o stare nervoasă în care exaltarea unor idei, privirea unor obiecte, absorb așa de mult atențiunea încât impresiunea venite din afară încețază de a fi simțite și mișcările voluntare sunt pentru moment nimicite. În timpurile mai vechi se observa adeseori *extaza religioasă*, atunci când credința în religie era foarte mare și întinsă. În acele vremuri adeseori se vedeau persoane în extază, cari absorbite în contemplațiunea lor internă, stăteau în nemișcare și nu vedeau chiar și când erau cu ochii deschiși cele ce se petreceau în jurul lor, nu auzeau nimic și păstrau timp îndelungat atitudinii în raport cu ideile, sentimentele, imaginile, născute în creerii lor, viziuni interne a căror subiect era de obicei vreun episod din viața lui Christos, mai ales din patimile lui. În zilele noastre extaza se vede rar, și, pentru noi medicii, ea este o *nevroză* caracterizată prin starea de nemișcare a mușchilor, prin fixitatea feței, printr'o atitudine generală a corpului care exprimă o exaltare mentală particulară ce se însoțește de o anestezie generală și câte odată prin existența unor stigmatice sau pete de sânge, cari se ivesc pe diferite părți ale corpului. Imaginațiunea, inteligența și voința extaticilor sunt cu totul turburate: ei se supun la o abstenență (ajun) de bună voie, care poate să țină mult timp, ei trăesc într'o stare permanentă de exaltare cerebrală, predicând, cântând și vorbind o limbă neînțeleasă, mistică. Extaza este o boală și trebuie tratată ca atare și cu deosebită îngrijire dacă nu voim să sfârșească prin alte turburări psihice mai ciudate, prin nebunie.

Extract (lat. *ex*, afară și *trahere*, a trage). — Se numește astfel un produs obținut prin tratarea unei substanțe vegetale sau animale printr'un disolvent apropiat și evaporând apoi amestecul astfel încât rămâne un reziduu moale, sau solid. *Extract farmaceutic* este partea activă a unei plante obținută prin disolvarea sucului sau în apă (*após*) sau în spirit (*alcoolic*).

Extravazat (lat. *extra*, afară și *vas*, vas). — Se numește astfel sângele, sau alte lichide eșite din vasele lor.

Ezerină. — Este principiul activ al bobului de Calabar (*Physostigma venenosum*, fam. leguminoaselor). Contractează (strânge) pupila, contrar de

ceea ce face atropina. Se întrebuințează bromidratul și sulfatul, 5 ctgr. la 10 gr. apă distilată, în colir, în boala numită *apa neagră* (glaucom).

F

F. — Litera F într'o ordonanță sau rețetă înseamnă *fa*, sau *să se facă*. F. s. a. (dela lat. *fiat secundum artem*), *să se facă după artă*.

Fabulație. Povestiri inventate, imaginare, după o impresie actuală sau o greșită, interpretare a unui fapt, rămășițe de amintiri, de care se servesc anumiți bolnavi de delir alcoolic, delir de imaginație, *mitomanie* (manie de a spune povești; *mythos* pe grec. = povești), *psihoză polineoretică*. Acești bolnavi, în cazuri de chestiuni judiciare, trebuesc bine controlați căci pot da naștere la multe încurcături.

Facere (lat. *partus*, *naștere*). — Prin cuvântul *facere* se înțelege darea afară, sau scoaterea meșteșugită a produsului concepțiunii (fetus) și ale anexelor sale (casa), la o epocă în care copilul este *viabil* (în stare de a trăi) către ziua a 270-a. Facerea se zice *întârziată* când se întâmplă pe la a 280-a zi, ea este *timpurie* (precoc) când se îndeplinește înainte de ziua a 260-a și *înainte de vreme*, sau *prematură* între ziua 180-a și a 270-a. Facerea este *naturală* sau *spontană* când nu se cere nici o manoperă și când copilul se prezintă cu capul sau cu șezutul, ea este *simplă* (un copil), *gemenară* (2 copii) și *multiplă* (mai mulți copii). Facerea *artificială* (meșteșugită) este aceea care cere o intervenție chirurgicală, adică se scoate copilul cu fiarele (forceps). Facerea este rezultatul contracțiunilor mitrei și a efortărilor pe cari le face femeia care naște. Contracțiunile mitrei sunt dureroase (*dureri de facere*) și se urmează la intervale mai depărtate la început, apoi se îndesesc din ce în ce, devenind mai puternice. Durerile cele mari, adevăratele dureri de facere, cari dau copilul afară, se simt în șale, în pânțele, în trup și în șezut. În timpul contracțiunilor gâtul mitrei se întinde, se lărgeste și în cele din urmă se pierde, deschizându-se gura mitrei din ce în

ce mai mult; în același timp se formează *punga*, sau *beșica apelor*, care se rupe atunci când gura mitrei este pe deplin deschisă, iar apele se scurg. Facerea cuprinde doi timpi: în primul întâiu iese copilul și în al doilea anexele lui (pelitele, casa și cordonul). — *Semnele* cari prevestesc facerea sunt următoarele: în cele opt, sau 15 zile din urmă ale *sarcinii* pânțele se lasă




Fig. 181.—Treie faze ale actului facerii spre a se vedea formele pe cari le ia uterul

în jos, se turtește, din pricină că copilul se scoboară în *basin*. — În ziua facerii femeia simte *dureri* (contracțiuni uterine) cari vin din ce în ce mai des (la 20 minute, apoi la 15 la 10, la 5 minute) și cari se pot opri câte odată mai multe ceasuri pentru a începe din nou, apoi vine *curgerea apelor* (după

ce s'a rupt punga) în cantitate mai mult sau mai puțin mare, după care vine eșirea copilului și a casei lui. *Durata* facerii este de 10 până la 20 ceasuri uneori nu durează de cât 1—2 ore, alte ori câteva zile. — Pentru facere trebuiesc următoarele *preparate*: femeia va face un clistir pentru ca să i-se deserte mațul gros, apoi va urina în casă, fără să meargă la latrină; va lua numai puțină zeamă de carne (bulion), un ceaiu. Se va îmbrăca cu o cămașe curată, se va culca la începutul durerilor, sau când ele încep a se întepi. Camera va fi mare, curată, bine aerată și cu o temperatură de 16—17 grade, patul de o singură persoană, așezat în mijlocul odăii și așternut cu un cearșaf peste saltea, iar pe deasupra o mușama acoperită cu un alt cearșaf îndoit în patru. Femeia va fi acoperită cu o plapomă subțire, ușoară, se va avea la îndemână un lighian de șezut, un lighian ordinar, un borcănaș cu vaselină, cearșafuri curate mai multe pentru a schimba pe cele murdărite, apă fiartă caldă. Pentru copil se va avea la îndemână un fir gros de ață, fiert și păstrat în vasul în care s'a fiert, pentru legatul buricului, un vas și săpun pentru a-l spăla, un prosop de șters și toate cele necesare pentru îmbrăcarea și înfășurarea lui. Dacă în timpul facerii femeia are *crampe* i-se vor face fricțiuni pe coapse și pe gambe, dacă voiește să se plimbe poate s'o facă la începutul nașterii, în timpul nașterii, în timpul primelor dureri, afară numai de cazul când ea este prea slabă, supusă la leșin sau la emoragii, sau când are hernie. În timpul facerii femeia trebuie să fie acoperită ca să nu răcească. După două minute dela nașterea copilului se va lega buricul, la două lățimi de deget, strângând bine ața. Eșirea casei se face cam după unul sau două ceasuri dela eșirea copilului. Casa trebuie cercetată cu deamănuntul ca să se vadă dacă a eșit toată și în caz contrar să se cheme îndată doctorul. După ce s'a isprăvit facerea cu totul se va face toaleta, adică se vor spăla părțile pe dinafară, apoi se va pune vată sterilizată și pe deasupra un bandaj la intrarea vaginului. În jurul lehuzei se va păstra liniște (să nu se

vorbească, să nu se primească vizite), pentru ca să se poată odihni, să poată dormi, iar la deșteptare i-se va da să bea un ceaiu slab. Ca hrană i se va da zeamă de carne și lapte în ziua primă și a doua, iar dacă femeia își alăptează copilul i-se va da chiar de a 3-a zi, ouă, carne, legume, compoturi și câte puțin vin cu apă; după o săptămână va mânca de toate ca orice om sănătos. Dacă mama nu voiește, sau nu poate, să alăpteze, i-se va da în cele dintâi trei zile zeamă de carne și lapte, a 4-a zi o curățenie (sulfat de sodă 30 gr., luat în două rânduri câte o jumătate odată) în zeamă de carne, sau în apă. După această curățenie i se va da în zilele următoare hrana obișnuită. Femeia va sta într-o poziție orizontală, făcând mici mișcări laterale din când în când. În jurul lehuzei se va păstra liniște, ocotind tot ce ar putea s'o impresioneze, emoțiunile vii, oboseala, conversațiunile, cetitul, sgomotul, etc. Se va combate constipația, făcând în fiecare dimineață câte o clizmă (cu apă și cu glicerină). Lehuza nu va părăsi patul până după 12 zile, când merg toate bine, iar din casă nu va eși până după 6 săptămâni.

Facială. — V. *Fată* (Nevralgie facială, Paralizie facială). *Nevralgii* și *Paralizii*.

Fag (*Fagus silvatica*, fam. fagaceelor). — Coaja de fag se întrebuințează



Fig. 182.—Fag

ca astringent în decoctiune, 50 gr. la un litru. — La *țară* se despică fagi groși, se iau fâșiile subțiri de la mijloc, cari învelesc, măduva, se fac țigări din ele și se fumează pentru *îndușeală*. Pentru *negi* se pune cenușe din lemn de fag în apă și aceasta se fierbe mai bine de o oră, apoi se spală negii de mai multe ori pe zi. Din scoarța de fag se fac roțițe cari se pun pe *buboaie*, după care se leagă într-o cârpă și se asvârlă în drum.

Fagedenism (gr. *phagedaina*, foame devorantă, lupească). — O rană se zice că este *fagedenică* atunci când, în

FAGO

loc să meargă spre vindecare, se întinde din ce în ce mai mult; cu toate leacurile ce se întrebuințează, durează timp îndelungat și roade țăsăturile din jurul ei pe futindere mare, atât în suprafață cât și în adâncime. *Tratamentul* local constă în ardere cu fierul roșu și în atingere cu tinctură de iod, băi și spălături antiseptice. *Tratamentul intern* constă în a combate starea generală a bolnavului: regim tonic, repaus iar dacă bolnavul este *sifilitic* se va institui un tratament *iodomeric*.

Fagocite, Fagocitoză. — V. *Microbi.*

Făină. — Pentru fabricarea pâinii se întrebuințează de obicei făină de grâu, care iese din moară amestecată cu *tărâte*, pentru care ea trebuie *cernută* prin sită. Cernerea nu trebuie făcută prin sită prea deasă, căci nu este bine ca făina să fie prea fină, de oarece s'a constatat că tărățele cuprind multe materii nutritive. Din făina cepe lângă pâine se mai prepară diferite paste alimentare, diferite aluaturi, prăjituri, pesmeți, etc. Făina de secară, de orz, de ovăz, de porumb, este mai puțin nutritivă decât cea de grâu. Diferitele *făine lactate* sunt preparate din lapte concentrat în vid și la o temperatură scăzută, totul redus la un fel de praf mai gros de o culoare alb-gălbui și care diluat cu apă dă un lichid lăptos. Aceste făine nu pot înlocui, după cum se pretinde, laptele de femeie sau de vacă, și prin urmare nu trebuiesc întrebuințate decât în cazuri de forță majoră, când n'avem ce face și n'avem ce da copilului să mănânce. În al treilea loc sunt diferite *făine farmaceutice*: de *în*, de *muștar*, de *orez*.

Falange, Falangine, Falangete. — Se numesc astfel oasele degetelor mâinilor și picioarelor. Falangele se articulează cu metacarpienii la mâini și metatarsienii la picioare; falanginele se află între falange și falangete cu cari se articulează.

Falcă (lat. *maxilla*), **maxilar.** — Omul se servește la mestecarea mâncării de *fălci*, și anume de *falca de sus* și de *falca de jos*, numite în termeni științifici *oasele maxilare*. Fălcele sunt formate de două arcuri în cari sunt înfipti dinții și măselele în cuiburile

FALC

lor numite *alveole*. Falca de jos este formată numai de un singur os, numit *maxilarul inferior*, iar falca de sus este formată de mai multe oase și anume din două oase, *maxilare superioare* (drept și stâng), din oasele *malare* (umerii obrazului), oasele *proprii ale nasului* și oasele *palatine*. Dintre cele două fălci numai una se mișcă, cea din jos. Mai la toți oamenii falca de sus vine ceva mai înainte decât cealaltă, așa că dinții ei cad peste și înaintea celor din jos. Foarte rar se întâmplă contrariu, ceea ce dă figurii o înfățișare urâtă. Fălcele sunt organele de căpetenie ale *masticățiunii*, adică ale actului prin care mestecăm, rupem și sdrobim alimentele, întocmai după cum fac și pietrele de moară când ma-



Fig. 183.—Maxilar inferior

cină grâul sau porumbul. În această lucrare falca de sus stă nemișcată, iar cea de jos se scoboară și se ridică în mod alternativ, mișcându-se în același timp asupra fălcii de sus de dinapoi înainte și puțin în lături. Aceste mișcări sunt făcute cu ajutorul unor mușchi puternici, cari se prind pe deo parte pe oasele capului, iar pe de altă parte pe falca de jos. — Sunt unele boale (spasmele, epilepsia, isteria, meningita, tetanul) în cari bolnavul strânge din fălci, adică mușchii cari pun în mișcare falca de jos se strâng, se contractă foarte tare, fără voia bolnavului, uneori așa de tare încât este cu neputință de a deschide gura, sau

se deschide foarte puțin. În aceste cazuri bolnavii nu se pot hrăni, nici nu pot lua medicamente prin gură, ci trebuie să le introducem toate aceste prin alte căi, prin clistere. Mai sunt și unele boale de gură care împiedică deschiderea ei și anume o inflamațiune de gingii cu abces (abubă), greutatea în eșirea dinților, o carie dentară, o carie a fălcilor chiar, etc. Atât în aceste cazuri, cât și în celelalte va trebui să tratăm și să vindecăm mai întâiu boala care este pricina acestei neputințe de a deschide gura, să combatem inflamațiunea, să deschidem abcesul când este format, să tratăm boala nervoasă, etc. — Se întâmplă uneori că în urma unui căscat prea mare, a unui râs exagerat, a unei căderi pe bărbie, sau în urma unui pumn aplicat de cineva asupra fălcii de jos, să avem *scrintirea* sau *luxațiunea maxilarului inferior*, adică sărirea din loc a fălcii de jos. Pentru a vindeca această lu-



Fig. 184. — Cum se suprapun maxilarele

xațiune trebuie *s'o reducem*, adică să împingem și să punem la locul ei falca sărită, după cum am arătat la articolul *luxație*. — Mai grav lucru este când se întâmplă vreo *fractură* sau *ruptură* de falcă, mai cu seamă a fălcii de jos, ruptură produsă de o lovitură puternică, de o strivire, de un glonț, etc. Vindecarea se face mai greu căci oasele rupte se dislocă, se depărtează unele de altele la cea mai mică mișcare, așa că ele nu se pot bine fierbe, nu se pot bine lipi. Pentru aceasta bolnavul nu trebuie să vorbească nu trebuie să mănânce, adică să mestecă, ci se va hrăni în mod artificial. Pentru a micșora inflamațiunea care poate rezulta din această fractură și mai ales supurațiunea, vom recomanda bolnavului să se spele des în gură cu apă fenicată, boricată, sau oxigenată, etc., iar pentru a înlesni vindecarea osului vom imobiliza falca cu ajutorul unui bandaj sau a unui aparat special, pe care numai doctorul știe cum să-l facă și cum să-l aplice. Astăzi

chirurgii cos oasele cele rupte cu fire de argint. — Cei cari lucrează cu fosfor cum se întâmplă în fabricile de chibrituri, adeseori capătă o boală cumplită de fălci, cari se umflă, devin dureroase și se cariază (putrezesc), formând abcese și fistule, etc., (v. *Fosfor*).

Fălcarită, trismus. — Este o boală foarte cunoscută la țară, din pricină că ea seceră mulți noi-născuți. După datele statistice mai vechi rezultă că la o mie de morți o sută se datoresc fălcaritei; azi, din fericire, acest număr este mai mic. Se ivește de obicei în primele zile după naștere, prin încheștarea *fălcilor*, de unde îi vine și numele, iar copilul se află în neputință de a mai suge. Încheștarea fălcilor provine din strângerea sau contractiunea permanentă a mușchilor, cari pun în mișcare fălcile. Această contractiune se întinde apoi și la alți mușchi, la ceafă, la șira spinării și în cele din urmă la toți mușchii, așa că copilul este țeapăn peste tot și nu se mai poate îndoi, întocmai ca o scândură. Afară de aceasta bolnavul are și fierbințeală mare. Fălcarita corespunde cu termenul medical *trismus*, care este un simptom al boalei numită *tetanos*, boală *microbiană* și prin urmare *molipsitoare*. Este de ajuns ca microbul acestei boale să vină în atingere cu o rană, sau cu o sgârietură cât de mică, pentru ca să intre în sânge și omul să capete tetan. Se știe că microbii tetanului se desvoltă și trăiesc în pământ, de unde se depun sub formă de praf pe rufe și pe mâinile moașelor, cari nu se spală nici odată, iar de aci pătrund în sângele copilului prin *rana dela buric* și copilul cât de voinic ar fi fost, în minutul nașterii, moare în câteva zile. Cunoscută fiind cauza acestei boale și împrejurările în cari se capătă, este foarte ușor ca prin măsuri igienice ea să se preîntâmpine și să scăpăm de o moarte sigură atâtea sute și mii de victime. Pentru aceasta trebuie înmulțit numărul moașelor cu carte, sau să se învețe moașele de sat să fie curate, iar femeile să fie oprite de a mai naște copii pe paie, sau pe pământ. Moașele vechi, cari n'au învățat moșitul la o școală, păstrează foarfecile, sau cuțitul, cu care taie buricul copiilor, sub strașina casei, sau aruncate

FALS

într'un colț sub pat, considerându-le ca spurcate. Astfel aceste obiecte vin în atingere cu pământul, unde se găsesc germenii falcariței și așa duc boala copilului, în momentul când se taie buricul. Patul să fie curat și acoperit cu rufe curate, iar foarfecile cu cari se taie buricul copilului și așa cu care se leagă, să fie bine fierte în apă. În acest mod falcarița va dispărea totdeauna dintre cauzele mortalității copiilor noi-născuți.

Falsificațiuni. — Un lucru se zice că este falsificat atunci când cu voe i s'a adăugat o substanță care-i micșorează valoarea și aceasta cu scopul unui câștig neiertat. Untul este falsificat când i se pune cretă, cartofi, făină, zeamă de morcovi. Făina de grâu este falsificată când se amestecă cu făină de mazăre, de linte, etc. Întru a constata falsificațiunile, mai ales ale substanțelor alimentare, toate orașele mari au înființat laboratoare speciale unde se face analiza lor exactă. Orice falsificațiune făcută intenționat este pedepsită de lege, mai ales că multe falsificațiuni sunt periculoase pentru sănătate. Se falsifică *laptele*, în care se pune apă, scrobeală, fierătură de orez, de orz, de țărâțe, etc.; — *untul* cu apă, zăr, sare, feculă de cartofi, cretă, făină, lapte concentrat, brânză, grăsime de vițel, șofran, zeamă de morcovi, flori de filimică; — *cafeaua* cu bob, grâu, ovăz, făină prăjită, caramel, melasă, cicoare, etc.; — *bomboanele* cu săruri de arsenic, cupru, mercur, plumb; — *ciocolata* cu scrobeală, feculă de cartofi, gumă, untdelemn, migdale, gălbenuș de ou, grăsime de vițel, de miel, de porc, migdale prăjite, etc.; — *cârnățaria* cu carne stricată, cu carne de cal și de alte animale, cari de obicei nu se mănâncă; — *rachiul* cu apă, spirit de bucate, zahăr, melasă, caramel, ceaiu, teiu, piper, ardei, gherghină, laur-ceras, vitriol, amoniac, piatră acră, etc.; — *oțetul* cu apă, vitriol, apă tare, muștar, piper, ardei, zahăr, melasă, caramel.

Familiare (boli). — Sunt boli cari ating, fără a-și schimba înfățișarea, mai mulți urmași, sau mai multe generații succesive ale *aceleiași familii*. Încep aproape la aceiași vârstă, ade-

FARD

sea la copiii de același sex. Boli familiare sunt: *hemofilia*, anumite forme de *diabet*, bolile de *piele* și mai ales bolile de *nervi*.

Fapt, dat, făcătură. — În popor se dau aceste numiri unei boale produsă din pricina farmecelor făcute de femei. Această boală se arată sub forma unor erupții care se ivesc pe față și pe mâini în număr foarte mare.

Fard, dres, rumineală, suliman. — Atât la țară cât și la orașe dresurile, sau sulimanurile, au ajuns la modă și se întrebuințează pe scară întinsă cu scopul de a ascunde sbârciturile și diferențele pete ale pielei, de a colora pielea în roșu sau alb. Rumenelile făcute cu *carmin*, sau cu *carlam* nu sunt periculoase, tot așa și dresurile albe preparate cu bismut, oxid de zinc, amidon curat (scrobeală), făină de orez curată, de cretă (tibișir) nu sunt vătămătoare sănătății și se pot întrebuința fără frică. Cele mai multe sulimanuri însă sunt făcute din substanțe *otrăvitoare* și otrava pătrunde prin piele în sânge producând boale foarte grave, cari de multe ori se arată târziu și cari se vindecă cu atât mai greu, cu cât otrava a fost aplicată pe față un timp mai îndelungat. Cele mai primejdioase dresuri sunt cele cari cuprind plumb și argint viu. Ele se prepară mai ales cu *carbonat de plumb* (ștubet, ceruză) în formă de pudră, de alifie, sau pomadă și cu argint viu (mercur) tratat cu apă tare și amestecat cu biclorur de mercur (sublimat corosiv, sau săricică). Multe dresuri din străinătate și destul de scumpe conțin plumb, care strică obrazul, sbârcesc pielea dându-i o culoare albăstruie, apoi ele atacă și sistemul nervos, producând de mai multe ori paralizii. Cele de argint viu strică dinții produc miros urit în gură și distrug sângele. Din acestea rezultă că sulimanurile în cele mai multe cazuri sunt periculoase, producând boale grave și de multe ori mortale.

Fard. — Substanță folosită pentru corectarea estetică a defectelor de culoare și conformație ale figurii. După consistență deosebim farduri uscate, lichide și grase; după culoare cele mai obișnuite farduri sunt: albe, roșii, negre și albastre. Fardurile uscate se

apropie mai multe de pudrele obișnuite de toaletă, sunt însă mai aderente și se prezintă sub forma compactă. Fardurile lichide se prepară din pudre amestecate cu apă, apă de trandafiri, glicerină și alte substanțe. — Fardurile grase au la bază lanolină, vaselină, ceară și alți corpi grași, amestecați cu materii care albesc puternic, oxidul de zinc sau oxidul de bismut. — Fardurile colorate se prepară cu diferite materii colorante și se folosesc pentru a restabili, sau a accentua, diferite umbre ale figurii, necesare expresivității.

Fardarea. — Prin fardare înțelegem aplicarea fardurilor, cu scopul de a da tenului coloritul dorit și chiar o frăgezime aparentă. Tehnica fardării nu e ușoară. Din cauza lipsei de îndemănare se fac greșeli care pot transforma o figură acceptabilă într-o mască ridicolă. Fardarea de zi diferă de cea de seară; în casă fardul este altfel decât pe stradă. La lumină artificială regiunile fardate cu alb devin mai aparante și mai proeminente; deaceia o față lată, cu pomeții bombați, se va retușa cu roșu, ca de altfel orice figură pudrată prea alb. Roșul are de scop să învieze figura; în același timp el face mai puțin vizibile părțile pe care se aplică, cu excepția buzelor.

Faringe. — V. Gât.

Fașa lui Esmarch. — Este făcută din gumi-elastic, sau din cauciuc și slujește la oprirea curgerii de sânge (vezi *Emoragie*).

Fașe. — V. Feși.

Fasole, făsui, păsule. — La noi se cultivă foarte mult pentru trebuințele culinare, pentru hrană. Fasolea, întocmai ca și linte, mazărea, bobul, este foarte bogată în principii nutritive, atât azotate (legumină) cât și neazotate (amil); conține fier de două ori mai mult decât carnea. Fasolea uscată conține 25% substanțe azotate, 55% substanțe neazotate, 2,80% grăsime, 2,90% celuloză, 3,20% săruri, 9,90% apă. Din acestea se vede că fasolea e tot așa de hrănitore ca și carnea dacă o gătim cu grăsime, de aceea ea și toate celelalte leguminoase (lintea, mazărea, bobul) se pot numi cu drept cuvânt: *carne vegetală* și omul poate trăi foarte bine cu ele, fără să mai

aibă trebuință să mănânce carne animală. Leguminoasele însă nu se mănâncă așa de ușor ca cerealele și carnea, din care pricină produc oboseli, dilatație de stomac, diaree, gaze intestinale. Pentru ca să înlăturăm întru câtva acest cusur este bine să curățim boabele de coji, căci cojile nu sunt topite de sucurile digestive și nu se mistuie; astfel putem mânca mai des fasole sleită, mazăre bătută, linte zdrobită, toate curățite bine de coji. Ori cum le-am prepara este bine ca cei ce suferă de stomac, de dispepsie (măstărire grea), să nu le mănânce, de asemenea și cei ce suferă de obezitate (grăsime prea mare) sau de diabet (boală de zahăr), căci amidonul lor se transformă în zahăr. — In *medicină populară* se întrebuințează fasolea în contra frigurilor: se bea câte o lingură de masă de zeamă rece în ziua când îl prinde frigurile. Boabele de fasole arse în foc, sau prăjite de o mașină curată până ce se ard ca cele de cafea, se pisază, se amestecă cu unt sau cu grăsime și se unge pe obraz la *bube dulci*. Boabele de fasole albe fierte și făcălite se pun la *degerătură*; uscate se pun pe o cârpă și se leagă la cap pentru durere de cap și scurgere de sânge. Boabe de fasole albe fierte la un loc cu 2—3 rădăcini de pătrunjel și o mână de făină de secară, până se fac aluat, se pun pe pânțele la femeile ce suferă de durere de *matcă* în urma facerii.

Făt, foetus. — În timpul dela fecundare și până la naștere, oul poartă numele de *embrion*. De regulă prîn cu-




Fig. 185. — Desvoltarea embrionului de om dela fecundare până la luna 5-a

vântul embrion, la om, se înțelege oul de la fecundare până pe la luna a 4-a, iar de la această dată până la naștere poartă numele de *făt*. În tot timpul cât stă în uter fătul trece printr-o mulțime de modificări, până să ajungă la forma și mărimea pe care le are la naștere. El este legat de uterul mamei printr'un mănunchiu de vase de sânge,

FAȚĂ

prin care se hrănește, căci din sângele mamei se hrănește fătul până în ziua când s'a născut. Este

învelit, în uter, de lichidul numit *amnios*, care-l apără de loviturile cari l'ar atinge din afară. Timpul cât trebuie să stea fătul în uter variază între 265—270 de zile, la care dată el este expulsat (dat afară) din uter, adică s'a născut. Data de mai sus se socotește dela ultimul raport sexual.

Față (lat. *facies*). — Partea de dinainte a capului și care se află dedesubtul și înaintea craniului se numește *față*. Ea se mărginește în sus prin linia de implantare a părului, în lături de urechi și în jos de marginea



Fig. 186. — Poziția fătului în uter



Fig. 187. — Aceiași figură ca la 186 mărită

inferioară a fălcii de jos. Fața se împarte în mai multe regiuni, și anume: *frunte*, *tâmplă*, *pleoape*, *pomete* sau *pometi* (umerii obrazilor), *obrazi*, *buze*, *bărbie*. Afară de aceste regiuni, fața

FAȚĂ

are mai multe cavități: *gură*, *nas*, *ochi* și *urechi*. — Fața este expusă la tot felul de necurătenii, cari se depun pe ea din aer și prin mijlocirea mâinilor. Pentru aceasta ea trebuie spălată des, dacă nu voim să suferim de *furnicele*, de *serpengea*, de *abcese* la față, cari sunt foarte dureroase și de multe ori primejdioase, prin faptul că în apropiere se află ochii și creerii și se pot ivi complicațiuni grave, uneori chiar mortale. — Fața mai este expusă la diferite *răniri* (plăgi) prin înțepătură, tăietură sau prin armă de foc și la *arsuri* (combustiuni). Toate acestea nu numai că pot primejdii vieața, dar adeseori lasă în urma lor *cicatrice* urâte, cari de multe ori împiedică câte un organ de a-și îndeplini slujba, astfel: pleoapele nu se mai pot apropia între ele, rămânând vecinic deschise, sau se lipesc între ele și ochiul nu se mai poate deschide, ori o nare se lipește de vârful nasului și se astupă așa că aerul nu mai poate pătrunde prin ea. Pentru a preîntâmpina toate acestea este bine ca ori ce rănire sau arsură să se caute din vreme și cu multă băgare de seamă. — O boală foarte supărătoare și de multe ori periculoasă este *brânca*, sau *erizipelul*; apoi la față mai avem a face cu *bubele dulci*, sau *eczema* și cu alte boale de piele sau *dartre*. La bărbați barba cu mustățile pot fi pricina iritațiunilor de piele și a unor boale lipicioase, sau contagioase. Uneori se întâmplă să simțim o jumătate a feții amorțită, fără s'o mai putem mișca, fără să mai putem închide ochiul din partea cu gura strâmbă și în neputință de a mai fluera, cu greutate la vorbire, semne cari ne slutesc figura și din care pricină poporul îi și zice la această boală *pocitanie*, iar noi, doctorii, o numim *paralizie*. Această paralizie se poate vindeca în 20—30 de zile, cu vezicatori puse la tâmplă, sau după urechi, cu electricitate și cu dușuri. Când însă această paralizie vine dintr'o boală de creeri ori din cauza sifilisului la creeri, ea este mai greu de vindecat și de multe ori rămâne așa pentru totdeauna. — Multă lume suferă de dureri, sau *neuralgii*, ale feței provenite în urma unei răceli, sau a unei măsele stricate.

Favă. — V. *Bob*.

Favus. — V. *Tinea*.

Febră (lat. *febris*, dela *fervere*, a fierbe; grec. *pyretos*, dela *pyr*, foc), *căldură, fierbințeală*. — Prin cuvântul *febră* se înțelege o stare de boală în care *căldura* (temperatura) corpului este mai ridicată decât în stare de sănătate (care variază între $36\frac{1}{2}$ și 37^0), *inima* bate mai iute și prin urmare *pulsul* este mai grăbit, *respirațiunea* este mai deasă și omul are o *indispoziție generală*. Afară de acestea bolnavul cu febră mai are uneori dureri de cap, sete mare și nădușeală multă, alteleori însă sudoarea lipsește și pielea este uscată. Adeseori omul mai are fiori, greață, vărsături la începutul febrei, mai târziu aiurare (delir), convulsii ori numai trăsărituri, sau, din contră, bolnavul se găsește într-o stare de prostrație adâncă (zace dus). Căldura sau *temperatura* corpului în febră începe cu 38^0 , urcându-se până la $38\frac{1}{2}$ în cazurile *ușoare*, până la $39\frac{1}{2}$ în cele *grave* și până la 41^0 în cele *foarte grave*; după 41^0 omul mai întotdeauna *moare*. S'a observat însă ca maximum și 43^0 , dar aceasta foarte rar. Temperatura se constată cu *termometrul* (vezi acest cuvânt) cu *maximă*, care se pune în subsuoară la oamenii mari și în șezut la copii. Este de ajuns să se ia temperatura de două ori pe zi, dimineața între orele 7—8, iar seara între 5—6. În frigurile palustre este bine să se ia și la amiază (12—1). — În stare normală *pulsul* bate de 60 până la 70 de ori pe minut, în febră el poate bate de 80—100 de ori în cazurile *ușoare*, de 100—140 de ori în cele *grave* și de 140—160 ori în cele *foarte grave*. — Omul *respiră* pe minut cam de 16 ori, în stare de febră el va respira de 20, 30, 40 de ori și uneori și mai des. Când febra se însoțește de vreo boală de piept numărul respirațiilor pe minut crește cu atât mai mult cu cât partea de plămâni care nu funcționează este mai mare.—*Udul* (urina) în febră este mai mare, roșu de oarece arderile în organism se fac în măsură mai mare. Din cauza acestor arderi omul slăbește, căci elementele organice arse mai repede decât în stare de sănătate nu pot fi înlocuite în deajuns printr-o hrană ne-

îndestulătoare. — Afară de aceste semne cari de obicei se văd în orice febră, mai sunt unele semne simțite sau văzute de bolnav ori numai de doctor, cum sunt: diferite erupțiuni, diferite nevralgii, urdinare, turburări de plămâni sau de stomac, etc. și cari semne ne pun pe cale de a cunoaște boala la care ține febra. — Febra poate avea un mers *regulat* sau *neregulat*: în cazul dintâiu ea se ridică din ce în ce până la un grad oarecare, apoi stă pe loc câțva timp, după aceea scade repede sau puțin câte puțin. În febrele ordinare (*remitente*), temperatura care este foarte mare seara scade spre dimineață în mod simțitor, de multe ori până la gradul normal. În febrele *intermitente*, temperatura cea mai mare se produce de obicei dimineața. Febrele *continue* au dimineața temperatura ceva mai mică decât seara, cum este de exemplu febra tifoidă. În aceste febre continue nu sunt *accese* cum se văd în febrele *intermitente* (frigurile palustre) și ele însoțesc un număr mare de boale. Astfel în febrele *eruptive* (pojar, scarlatină, vărsat, etc.) febra ține cam opt zile și însoțește o erupțiune de pete sau bube pe piele; în febra tifoidă ea durează 3 până la 6 săptămâni și se însoțește de o slăbiciune din ce în ce mai mare. În aprinderile sau *inflamațiunile acute*, cum sunt: pneumonia, reumatismul articular acut, etc. febra durează cât și boala, terminându-se deodată, în mod brusc, sau încetul cu încetul. — Urmările febrei sunt în raport cu durata ei. Ea poate fi așa de mare, așa de intensă, încât poate să omoare omul în câteva zile. Din fericire aceste cazuri sunt mai rare, dar un lucru este constant și anume: cu cât febra durează mai mult cu atât bolnavul slăbește mai tare. — *Tratament*. Pentru a combate febra trebuie ca bolnavul să șadă în pat, într-o cameră bine aerată, cu temperatură potrivită și o lumină dulce. Va lua băuturi răcoritoare mai des și în cantitate mică cum sunt: apă, limonadă, lapte simplu sau tăiat cu apă sau ceaiu slab, etc. I se vor face fricțiuni pe corp cu apă cu oțet, cu oțet de trandalir, la cap se vor pune cârpe udate în apă rece și stoarse și la trebuință se vor da lea-

curi *febrifuge*: chinină, antipirină, crio-genină, aspirină, etc. — *Febră* sau *friguri de lapte*. Uneori se întâmplă că la 3 sau 4 zile după naștere, odată cu venirea laptelui, lehuza să aibă fiori urmate de căldură (39°) și nădușeală, cu grăbirea pulsului (100), sete vie, lipsă de poftă de mâncare, greutate la cap. Toate aceste semne dispar după 24 ore. Pentru aceasta este de ajuns un purgativ (ol. de ricin), odihnă, dietă (numai lapte) și oarecari băuturi răcoritoare. Copilului i-se va da să sugă la intervale regulate, afară numai de cazul când mama nu vrea, sau nu poate să dea lapte. — *Febră larvată*. Febră mascată, deghizată, una din formele febrei intermitente (v. *Paludism*). — *Febră malignă*. Formă gravă de febră. — *Febră pernicioasă*. Forma cea mai gravă a febrei intermitente, palustre. *Febră tifoidă*, *friguri tifoid*. (vezi *Tifoidă*). — *Febră urinoasă*. Febră care se observă în boalele uretrei, sau ale beșicii și uneori în urma sondajului. — *Febră galbenă*, vezi *Galbenă* (Febră). (Caută și la *Temperatură*).

Febră gastrică. — Caută la *Stomac*.

Febră mucoasă. — Caută la *Tifoidă* (Febră).

Febră puerperală. — V. *Puerperală*.

Febrifuge. — Medicamente cari se dau în contra frigurilor, în contra febrei (v. *Antipirină*, *Chinchină*, *Chinină*, *Arsenic*, *Cașea*, *Febră*).

Fecale. — Se numesc astfel materiile cari nu se pot absorbi prin mistuire, rămășițele digestiunii, cari după ce au trecut prin mațe se adună în partea de jos a mațului gros (*rectum*), pentru a fi date afară prin șezut (*anus*) la intervale mai mult sau mai puțin regulate (v. *Defecațiune*). Materiile fecale prezintă caractere speciale în boalele de mațe, de ficat (icter), în coleră, în dizenterie, în febra tifoidă. Ele de obicei sunt de culoare închisă, sau chiar neagră, cenușie sau albuie (alimentațiune cu lapte), verzuie (legume verzi), neagră (fier), gălbuie (revent).

Fecaloide. — Se numesc astfel materiile date afară prin gură, vărsate, cari au aparență sau mirosul materiilor fecale. Materiile fecaloide de obicei au trecut din stomac în intestine, de unde s'au întors înapoi și au fost date

afară prin vărsături (v. *Ernie*, *Intestin*, *Peritonită*).

Fecule, feculente. — Fecula este o materie identică cu amidul sau amidonul, și se găsește în grăunțele, fructele, tulpinile și rădăcinile unui mare număr de vegetale. Ea se prezintă sub forma unei substanțe albe, fără miros, fără gust și care nu se topește în apă. Alimentele cari cuprind feculă se numesc *feculente*. Cea mai răspândită feculă alimentară este cea de *cartofi*. Fecula se scoate din mai multe legume: *fasole*, *mazăre*, *bob*, *linte*, din *castane*, *ghindă* de stejar, grăunțele cerealelor etc. Toate feculele, sau materiile feculente sub influența salivei din gură se transformă în *zahăr*. Transformarea aceasta constituie digestiunea sau mistuirea alimentelor, care se face în gură și se continuă în stomac. În stare de zahăr aceste alimente trec în sânge și joacă un rol în alimentațiune (v. *Alimente*). Prin urmare aceste materii feculente nu sunt bune pentru cei ce suferă de *diabet*, de *obezitate*. Alimentele feculente sunt foarte hrănitoare, dar sunt cam greu de mistuit; în special fasolea, mazărea, linteaua produc gaze multe în stomac și mațe din cauza pelițelor de pe boabe cari se mistue foarte greu, din care pricină ele nu sunt bune pentru cei ce suferă de stomac și mațe (*dispepsie*). Este bine ca acestea să se mănânce sub formă de *pirea* (fasole sleită, mazăre bătută). În general se recomandă feculentele la oamenii sănătoși cari au trebuință de a se îngrășa.

Fecundația. — Faza reproducerei constituită prin fuziunea celor 2 elemente sexuale: *spermatozoidul* (elementul bărbătesc) și *ovulul* (elementul feminin). Rezultatul este *oul*, originea unei ființe nouă. *Sperma* conține cam 60.000 de spermatozoizi pe mmc. Unul singur ajunge ca să se facă fecundația. Acesta, după ce a stat un timp oarecare în vagin și gâtul mitrei, se suie în interiorul mitrei până ajunge la trompă unde, în mod general, întâlnește un ovul pe care-l fecundază. Femeia este gata de fecundat dela începutul menstruației până la începutul *menopauzei* (vârsta când i se opresc regulele, menstruația).

Fecundația artificială. — Injectarea

cu ajutorul unor aparate și manopere speciale a lichidului sexual bărbătesc în uterul unei femei, când fecundația naturală nu se poate face din diferite motive (conformația proastă a organelor genitale).

Felix. — În jud. Bihor. Stațiune balneară înconjurată de păduri frumoase, la 8 klm. de Oradea. Ape termale (49°C) bune pentru căutarea reumatismelor, boalelor de nervi, anemii, boli de ficat, boli de femei.

Femur. — Os lung, pereche, care formează scheletul coapsei (vezi fig. Capătul de sus formează cu basiful, articulația șoldului, *coxo-femorală* (vezi acest cuvânt), capătul de jos, cu tibia și rotula formează încheietura (articulația) genunchiului.

Fenacetină sau **Fenedină.** — Este o pulbere albă, fără miros, fără gust, care lucrează ca antitermic și antinevralgic (taie căldura și durerea). Se dă în praf, în buline sau în pilule în doză de 25—30 ctgr. repetate de mai multe ori pe zi, sau 50 ctgr. până la 1 gr. și jumătate odată.

Fenat de sodă. — Dezinfectant, antiparazitar, antiemoragic. Se întrebuințează pe *dinafară* sub formă de alifie (1 la 10) sau în soluțiune (10 la 100).

Fenic (Acid), *fenol*, *acid carbohic*. — Acidul fenic *brut* este un lichid negricios, cu miros tare, prea puțin solubil în apă. Acidul fenic *cristalizat* este de mai multe feluri: *fenol absolut* sub formă de cristale mici albe, solubil în apă în 16 părți, foarte solubil în alcool, eter, glicerină, miroasă foarte puțin, este foarte curat, anhidru; *fenol ca zăpadă* (omătos), foarte solubil și în apă; *fenol cristalizat ordinar* sub formă de ace lungi, incolore sau roșietice, solubil în 20 părți apă rece, foarte solubil în alcool. *Fenolul lichid* este un amestec de 90 părți acid fenic și 10 alcool, solubil în 18 părți apă. În combinațiune cu camforul dă *fenol camforat*. Acidul fenic este *toxic*; el este antiseptic, antiputrid, antipiretic, caustic și bun în contra boalelor de piele. Pe *dinăuntru* acidul fenic se dă în doză de 10—50 ctgr. sub formă de sirop sau limonadă, sau în *injecțiuni* pe sub piele. Pe *dinafară*, sub formă de apă fenicată (2 la 100 sau

5 la 100), vaselină sau ulei fenicat (1 la 100), oțet fenicat (1 la 100), tifon fenicat. — *Otrăvirea* cu acid fenic are următoarele semne: arsură vie dela gură până la stomac, căptușala (mucoasa) buzelor și a gurii este albă și tare, pielea rece și vâscoasă, buzele, pleoapele și urechile livide, pupilele contractate, urina închisă, neagră, uneori suprimată, insensibilitate, comă, nici o mișcare reflexă, respirația slabă și repede, moarte. — *Tratament*. Sulfat de magnezie și sulfat de sodă în doză de 30 gr. în 750 gr. apă caldă (sulfatele solubile formează în sânge sulfofenate cari nu sunt otrăvicioase). Vomitive: ipeca, apomorfina, spălarea stomacului cu sulfat de magnezie, cu sulfat de sodă, sau cu sulfat de calciu, și disolvat într'o mare cantitate de apă caldută, până ce nu se mai simte mirosul acidului. Se va lăsa stomacul plin cu soluțiune pentru ca s'o poată absorbi. Se va da apă albuminoasă în cantitate mare. Aplicațiuni calde la picioare și mâini, fricțiuni, injecțiuni sub piele cu un miligram de sulfat de atropină. Inhalațiuni de nitrit de amil, de oxigen. În cazurile disperate lăsare de sânge din vine, sau transfuziune.

Fenilamină. — V. *Anilină*.

Fenol. — V. *Fenic* (Acid).

Fenoltaleină. — V. *Purgen*.

Fenolsalil. — Este un amestec lichid de mai mulți agenți antiseptici prezentând o putere microbicidă foarte mare. Formula acestui amestec este: fenol cristalizat 9 gr., acid salicilic 1 gr., acid lactic 2 gr., mentol 10 ctgr., esență de eucalipt 50 ctgr. Fenolsalilul se întrebuințează foarte rar curat (caustic), ci mai adeseori în soluțiune în apă, de 1—4 la 100, glicerină sau alcool. Se întrebuințează mai cu seamă ca apă de gură (10 picături într'o jumătate de păhar de apă caldută), sau în gargarisme (1 la 100 apă și 5 glicerină) sau ca colutoriu (1 p. la 5 glicerină), în injecțiuni vaginale (5—10 la 1000), în infecțiunile genitale, sau pentru trebuințele obstetricale.

Ferigă, feligă, ferică, ferigea, năvalnic, spata dracului, (*Aspidium filix mas*, fam. polipodiaceelor). — Plantă erbacee care crește prin locuri umede și umbroase din păduri (Iulie—Au-

FERM

gust). Este cel mai bun medicament în contra *panglicii* (teniei). Se întrebuințează rădăcina în praf, 2 până la 4 grame, sau fiartă în apă, mai bun însă este *extractul eterat* de filix mas, 2—4 gr. la copii, 4—8 gr. la adulți, în capsule gelatinoase, sau într'o porțiune (băutură), mascându-i gustul cu câteva picături de zeamă de portocale, sau de lămâie sau cu sirop de smeură ori de izmă. La 2—3 ore după ce s'a luat medicamentul este bine ca suferindul să ia ol. de ricin pentru a grăbi efectul. Se dă și asociat cu calomel, și anume pentru adult: extr. eter. filix mas 6—8 gr., calomel 1 gr., în 6—8 capsule gelatinoase, luându-se câte o capsulă din 10 în 10 minute; sau în porțiunea următoare: extr. eter. fil. mas. 6—8 gr., calomel, 1 gr., apă și



Fig. 188.
Ferigă



Fig. 189.
Feriguță

sirop gumos, câte 25 gr.; să se bea toată dintr'odată. În ziua în care se ia acest medicament, din cauza calomelului, bolnavul nu va mânca nimic sărat, ci numai 2 litri de lapte dulce.— La *fară* se scoate rădăcina de ferigă toarnă, se spală, se păstrează în locuri uscate și din ea se ia cam 30 gr., se pisează mărunțel, se amestecă cu miere, făcându-se un fel de magiun, care se ia dimineața pe nemâncate de cei ce sufăr de *panglică*. Tot astfel se întrebuințează și fieritura (decoctul). Rădăcina pisată se bea cu vin pentru durere de inimă.

Fermentațiune (lat. *fermentatio*, dela *jervere*, a fierbe, a clocoti), *fierbere*, *dospire*. — Prin cuvântul *fermentațiune* se înțelege descompunerea unei substanțe sub influența unui *ferment* (*aluat* sau *drojdii*, *drojdii de bere*, *maia*, *plămădeală*), sau a unor

FERM

condițiuni de aerațiune și de temperatură prielnice dezvoltării *microbilor zimogeni*, cari dau naștere la diferite fermentațiuni. Astfel, pasta făcută din făină de grâu și din apă, dacă îi punem aluat sau drojdii, începe să fermenteze, să dospească și, mulțumită acestei dospiri, *pâinea se umflă*, devine ușoară și se mistuie cu înleznire. — Dacă într'un amestec de hameiu, orz încolțit și apă punem drojdii, lichidul începe să se miște, să clocotească, să facă spumă, să degajeze gaze și să se încăzească, într'un cuvânt să *fermenteze*, producând *berea*, care este un lichid fermentat. — În alte împrejurări fermentul ia naștere în lichidul expus la aer, cum se întâmplă cu *mustul* din struguri, care fiind în condițiuni favorabile de temperatură începe să *fiarbă* în clocote și aceasta din pricină că zahărul din must se transformă în alcool producând *vinul*, care este un lichid fermentat și alcoolic.

Același lucru se întâmplă cu vinul făcut din mere (cidru) și din pere, în care mustul acestor poame, prin fermentație, s'a transformat în vin prin schimbarea zahărului în alcool.

— Vinul la rândul său fiind expus câțva timp la aer se schimbă în *oțet*, mulțumită microbilor sau bacteriilor zimogene (*bacillus aceti*), cari formează la suprafața vinului care se oțetește o peliță mucegăită, care nu este altceva decât o mare cultură microbiană, care joacă rolul de ferment și transformă alcoolul subțiat cu apă în *acid acetic*. — *Laptele* expus la aer se strică, se corăsește, din cauză că zahărul se schimbă în *acid lactic* mulțumită unor bacterii speciale (*bacillus lacticus*), cari joacă rolul de ferment. — În fermentațiunea *butirică* este o bacterie (*bacillus butyricus*), care transformă zahărul, celuloza, materiile amidacee în acid butiric. Astfel se explică digestiunea animalelor erbivore, în sotmacul cărora se află foarte mulți



Fig. 190.—Fermentul
acetic

microbi butirici, cari topesc celuloza pe care sucurile stomacului nu ar putea-o ataca. Acești microbi fac să se *topească* cânepa, dizolvând celuloza și izolând astfel firele acestei plante. — Braga, chefirul și varza acră de asemenea se datoresc unor bacterii sau microbi zimogeni. — *Fermentul nitric*, care schimbă amoniacul mai întâi în nitrite și apoi în nitate. Acest ferment nitric, care este constituit de niște bacterii speciale, face ca azotul să fie asimilabil, să reîntre în ciclul vital și plantele să trăiască; el face ca azotul să poată trece din regnul neorganic, în cel organic, întreținând astfel vieața pe pământ. — Mai toate fermentațiunile fac să se degajeze acid carbonic, care este un gaz ce produce *asfixie* când se află în cantitate prea mare în aerul pe care îl respirăm. Astfel este foarte primejdios să stea cineva în locul unde fierbe vinul sau fermentează berea și de aceea trebuie ca acele locuri să fie în totdeauna bine ventilate. Pentru mai bune lămuriri privitoare la fermentațiune să se caute la: *Bere, Oțet, Pâine, Vin*.

Feși (lat. *fascia*). — O bucată de pânză îngustă și lungă care se învârteste sau se strânge în formă de sul, se numește *fașe*. Feșile se pot face



Fig. 191.—Cum se strânge fașa

din tot felul de pânză, din tifon, din lână, flanelă, sau din cauciuc, pentru bandaj compresiv. Lungimea ca și lățimea variază după trebuință, astfel pentru degete o fașe va fi lungă până la 1 metru și lată de 2—3 cm., pentru membre (mâini și picioare) lungimea va fi de 1 metru până la 5—6 metri, iar lățimea de 5—7 cm. Pentru a strânge o fașe începem cu un capăt pe care îl îndoiem asupra lui însuși de mai multe ori, apoi luăm micul sul cu mîna stîngă, degetul mare ținându-l pe deasupra și arătătorul pe de desupt, iar celelalte 3 degete tot pe dedesupt îl susțin. Mîna dreaptă trage asupra

părții libere a feșei ca s'o întindă, pe câtă vreme cea stîngă continuă a • îndoi potrivit. Când am strâns întreagă fașa, o fixăm cu un ac cu gămălie ca să nu se desfacă până la întrebuițare. Uneori o fașe se strânge pe la amîndouă capetele așa că avem 2 suluri. Curățirea feșilor se face astfel: se fierb în apă un sfert de ceas, apoi se spală și se trec prin leșie în clocote (cu sodă și săpun), după care se mai dau prin apă curată, se usucă și se strâng în formă de sul.

Fete tinere. — La etatea de 13—14 ani, organismul fetei, trece printr'o revoluțiune, sau mai bine zis printr'o evoluțiune organică ce o deosebește din punctul de vedere igienic și medical de băiat. Fata pe lângă cheltuielile cerute de creșterea sa mai trebuie să îndeustuleze și cheltuiala produsă de *pierderea lunară* a unei părți din propria ei substanță, de *menstruație*, sau *regule*. Această evoluție se face uneori fără nici o sdruincinare, de multe ori însă ea se îndeplinește cu greutate și aducând oarecare prejudicii sănătății fetei. În acest timp sângele devine mai sărac dacă o igienă bine regulată nu repară pierderile ce el le încearcă, mai întâi fiindcă el curge dintr'un organism nepregătit bine pentru acest *deficit lunar*, apoi fiindcă turburările a petitelui și ale mistuirii fac ca el să primească materiale cari îl repară în mod neîndeustulător. Pe de altă parte sistemul nervos, care joacă un rol mare în această îngrămădire de sânge într'un anumit punct al corpului, stă fără încetare treaz și primește o excitație care, dacă nu este calmată în fiecare lună prin ușurarea așteptată, se transformă în iritație cu adevărat bolnăvicioasă, care poate duce la isterie. Așa dar punctul de căpetenie al igienei fetei tinere este să facem ca sângele ei să fie întreținut în bune condițiuni, ca el să-și urmeze cu ascultare cursul care-i este desemnat, ca sistemul ei nervos să nu-și ia nici odată o preponderență de care poate ușor abuza. Prima condițiune de succes este o hrană bună, substanțială, conștând mai cu seamă din ouă, pește, carne. A doua condițiune este ca fata să facă *exerciții* sau *gimnastică* în mod îndeustulător, să se miște, să facă pliu-

bări pe jos, mai bine decât în trăsură, cel puțin două ceasuri pe zi să facă exerciții de gimnastică apropiate sexului ei. Afară de acestea, puțină idroterapie este foarte folositoare; în lipsă de dușuri reci poate să facă spălături cu apă rece. *Somnul* trebuie să fie de 7—8 ore și pe cât se poate fetele să se culce mai devreme pentru ca să se scoale mai de dimineață. *Somnul* de noapte este cu mult mai bun decât cel de ziua. Pentru fetele de oraș se recomandă ca cel puțin două luni de vară să le *petreacă la țară*, unde pot să-și facă o bună provizie de aer și de lumină. Cât despte *îmbrăcăminte* vom aminti că ea trebuie să fie astfel făcută ca să asigure cea mai mare libertate creșterii și mișcărilor corpului, să nu producă nici un fel de strângere asupra corpului.

Fibrom (dela *fibră* și terminațiunea *om*, care înseamnă tumoră, bolfă, umflătură). — Sub acest nume se înțeleg toate bolfele sau umflăturile formate de țesut *fibros*, adică dintr'o substanță fasciculată cu celule plasmatiche anastomozate unele cu altele, cari au nucleu și o masă de protoplasmă. Fibromul este o tumoră tare la pipăit, bine limitată, care se poate mișca sub piele, rotundă sau lobulată, uneori foarte voluminoasă și care poate fi ușor scoasă (enucleată). Fibromul face parte din tumorile zise *benigne*, adică cele cari nu strică sângele.

Fibromiom. — Un fibrom care conține și fibre musculare netede, se întâlnește adeseori la mîtră (uter).

Ficat, main (lat. *hecur*, grec. *hepar*). — Este un organ foarte mare având o greutate de 1500 până la 2000 gr. și o formă ovoidă. Ficatul se află în pânțece, în partea dreaptă, sub coaste ocupând tot ipocondrul drept și întinzându-se în epigastriu pe dinaintea unei părți a stomacului. El este acoperit de diafragm, care îl desparte de plămânul din dreapta. Fața lui superioară este bulbucată, netedă și împărțită printr'un șanț în două părți, doi *lobi*, (drept și stâng); fața inferioară este concavă și prezintă două șanțuri laterale reunite printr'un șanț transversal *hilul* ficatului. Pe această față se vede: *vena portă*, care duce în

ductele digestiunii (mistuirii) ce se face în mațe. Vena portă se împarte într'o mulțime de ramuri și rămurele în interiorul ficatului; *vena cavă inferioară* în care vine să se verse *vena supraepatică*, formată din reunirea tuturor capilarelor venei porte; *artera epatică*, ce aduce în ficat sânge roșu; *vezicula biliară* (beșica fierei); — *canalul coledoc*, care este format din unirea *canalului epatic*, ce aduce fierea, deadreptul din ficat și din *canalul cistic* care aduce fierea ce se află adunată în vezicula biliară. Canalul coledoc merge să se deschidă în mațul subțire (duoden), unde varsă fierea. — Ficatul are două slujbe de căpetenie: el face *bilă* sau *fiere*, (1200—1300 gr. pe zi), care se scurge prin canalul coledoc în mațul subțire pentru a ajuta la mistuirea și absorpțiunea grăsimilor; ficatul fabrică și un fel de *zahăr* special, *glicogen*, pe care îl varsă în circulație prin vena cavă și înmagazinează zahărul adus în cantitate prea mare de către vena portă. — *Bila* sau *fierea* este un lichid gălbui, de unde vine și colorațiunea galbenă a corpului când a intrat fierea în sânge, cum se întâmplă în *gălbinare* (icter). Colorațiunea verzue se vede în vărsăturile *bilioase* (de venin); gustul fierei este dulceu, apoi amar. Bila se compune din *apă*, din *săruri*, cari sunt formate din combinațiunea sodei cu acizii grași (*colat* și *coleat* de sodă), din *colesterină*, care se precipită și formează *pietricele* (calculi), cari se găsesc așa de des în beșica fierei; din *substanțe colorante*, cari colorează materiile fecale (când bila nu trece în mațe materiile fecale nu se mai colorează și ele sunt albiu ca mazărea bătută, după cum se vede în *gălbinare*). Cea mai mare parte din fiere se resoarbe în mațe după ce a suferit oarecari transformări. — *Boalele ficatului*. Fiind adăpostit de coastele cele din urmă sub cari se află, *rănirile ficatului* sunt rare. Când se întâmplă ca ficatul să sufere vreo *contuziune* violentă, produsă printr'o lovitură sau prin trecerea unei trăsurii peste el, ori când se întâmplă să fie înțepat cu vre'un cuțit sau o sabie, ori să fie pătruns de vreun glonte de armă de foc, atunci starea bolnavului este întotdeauna gravă. În

aceste cazuri ficatul se poate inflama (aprinde), poate să se desvolte un abces în interiorul lui sau se poate produce o peritonită. *Boalele ficatului*, sunt numeroase și foarte deosebite cu privire la natura și gravitatea lor. O *durere* în dreptul ficatului nu înseamnă numai decât o boală a acestui organ, căci durerea poate să fie numai o simplă *neuralgie*, ori o colică intestinală în dreptul acela. *Coloarea gălbue* a feței iarăși nu ne arată întotdeauna o boală de ficat, căci sunt unii oameni cari de felul lor sunt cam galbeni fa piele; alteori această gălbineală poate




Fig. 192. — Ficatul

A = văzut din față, B = văzut pe fața inferioară
a = lobul drept, b = viziucula biliară, c = canalul coledoc, d = lobul stâng, e = ligamentul rotund, f = artera hepatică, g = vena cavă inferioară, h = vena portă.

să provină din cauza unui cancer de stomac, sau dintr'o boală de inimă. Câte odată această gălbineală poate să provină dintr'o deranjare de stomac trecătoare, care mărește pentru un moment cantitatea de fiere secretată de ficat, fără ca acest organ să fie cu adevărat bolnav, precum se poate întâmpla și învers, adică ficatul să fie cu adevărat bolnav, fără ca ochii să aibă colorațiunea care se vede la *gălbinare*. *Inflamațiunea ficatului*, numită și *hepatită*, poate fi acută sau cronică. Cea *acută* poate să fie produsă de o lovitură sau de o cădere

pe partea dreaptă a pântecelui și atunci de obicei este urmată de un *abces* al ficatului. În țările calde epatita acută se vede mai des și se însoțește adeseori de *dizenterie*. Dacă nu se formează abces se poate întâmpla ca epatita să treacă în stare *cronică* și semnele ei sunt: o greutate mare în dreptul ficatului, o gălbinare mare, neîntreruptă și turburări digestive variate, diaree bilioasă (urdinare verzuie), lipsă de apetit, vărsături de venin, etc. *Umflarea ficatului*, care provine din inflamațiunea lui, sau care însoțește o inflamațiune de stomac sau de intestine, sau care se vede uneori la cei ce sufăr de o boală cronică de inimă sau de plămâni, etc., se cunoaște ca și epatita cronică printr'o durere surdă, care se întinde până la umărul drept prin gălbinare, prin mistuiri a-nevoioase și mai cu seamă prin pipăire care ne arată cât de mult se întinde ficatul umflat sub coaste. Ficatul mai este supus la o inflamațiune cronică (dela grec. *kirrhos*, galben, rumen), care nu se mai poate vindeca. *Ciroza* este *ipertrofică*, dacă ficatul este mărit de volum, și *atrofică* dacă ficatul se micșorează din ce în ce. Între cauzele cirozei se numără *alcoolismul* și *paludismul*. În ciroza ipertrofică avem ca semne diferite turburări în mistuire, umflarea ficatului și gălbinare (icter), materiile fecale rămân însă colorate, ca în adevăratul icter, urina este închisă; mărirea ficatului uneori este așa de mare încât supără respirația. În ciroza atrofică avem la început pierderea apetitului, greutate la mistuire, când constipație, când diaree, mâncărimi curgere de sânge din nas, durere în dreptul ficatului, apoi mai târziu pântecul începe a se umfla, umplându-se cu apă (ascită) care poate ajunge până la 10—18 litri (dropică), iar bolnavul slăbește grozav rămânând numai piele și oase, curgeri de sânge din nas, scuipeare de sânge, vărsături de sânge, scaune cu sânge. *Tratament*. Cine nu voește să sufere de ficat trebuie să ducă o viață regulată, să nu facă nici o abatere de regim, să nu mănânce prea mult, să nu bea băuturi alcoolice, să nu ducă o viață prea leneșă, sedentară, ci să umble; să facă exerciții, cu atât mai

mult cu cât se hrănește mai bine. Odată ficatul îmbolnăvit, cel mai bun regim este cel de lapte și apă de Carlsbad sau de Vichy. Cancerul ficatului foarte rar se ivește deadreptul în ficat, cele mai deseori el se întinde dela stomac. In cancer avem ca semne: dureri surde în dreptul ficatului, gălbina-re, ascită, scaune negre, slăbire, uneori febră. Cancerul ficatului nu se poate vindeca.

—*Chistul hidatic* al ficatului este un fel de pungă plină cu apă limpede produsă prin dezvoltarea ouălor unei tenii speciale (*echinococ*), care trăiește în stare adultă în căne și a cărei lungime este de 4—5 cm., fiind de grosimea unui ac cu gămălie. Această boală este foarte greu de cunoscut la început, uneori însă începe cu dureri în umărul drept, cu un fel de blândă pe corp, desgustul pentru mâncările grase.

—*Tratament.* Fiind sigur că această boală se produce prin introducerea ouălor de echinococ în intestin fie prin apă, fie prin legumele cari au fost în atingere cu materiile fecale ale cânelui, lucrul cel mai bun pentru a o preveni este să nu mâncăm decât legume fierte și să nu bem decât apă filtrată, sau fiartă. Chistul hidatic se poate deschide în tubul digestiv, în căile aeriene (plămâni) sau în peritoneu; pentru a preîntâmpina aceasta este bine ca chistul să se opereze din vreme. — Despre *pietrele* la ficat (*liti-
tiază* și *colicele epatice*) caută la *Epa-
tică* (Colică).



Fig. 193.—Circulația între inimă ficat și intestin

a = inima, b = vâna cavă inferioară, c = vâna suprahepatică, d = rețeaua capilară din ficat, e = vâna portă, f = intestin.




Fig. 194.—Ciroză hepatică (ficat mărit)

Ficat de pucioasă, trisulfur de potasiu, hepar sulfuris. — V. Sulf.

Fier, Fieruginoase. — De când s'a dovedit că sângele omului, sunt cam vreo două sute de ani de atunci, conține în stare normală fier, acest metal a început să fie întrebuințat în tratamentul boalelor în cari s'a constatat că este împuținat în sânge, sau lipsește cu totul, cum sunt unele boale generale, *anemia* și mai ales *cloroza*. Cele mai multe preparate fieruginoase se dau ca *tonice*. Fierul se întrebuințează în *natură*, în combinațiuni diverse, sau *săruri* și sub formă de *ape minerale naturale*. — În *natură* se dă *pilitură de fier porfirizată*, adică fier moale pilit și redus în praf foarte fin, din care se iau câte 5 ctgr. înainte de fiecare masă, sau în pilule, pastile ori bomboane de ciocolată; apoi *fierul redus prin idrogen*, care este un praf fin, cenușiu închis, fără gust și fără miros, din care se ia câte 10 ctgr. înainte de mâncare, fără ca acest fier să obosească stomacul, sau să strice dinții. — Din *combinațiunile fierului* cele mai întrebuințate sunt: *arseniatul de fier*, în pilule de câte 1 ctgr. 10—20 pe zi; bun în anemie, la persoanele limfatice, sau atinse de boale de piele. *Bromurul de fier*, în dragee de câte 5 ctgr. 2—10 pe zi; bun în anemie, la oamenii nervoși. *Cacodilatul de fier*, în pilule de câte 5 ctgr. 2—4 pe zi. *Carbonatul de fier*, foarte bună preparațiune, dar care se strică repede la aer, în doză de 20 ctgr. până la 1 gram pe zi, în 4 până la 10 pilule. *Citratul de fier*, în pilule de câte 5 ctgr., 4—8 pe zi, sau în sirop ori vin, 1—3 linguri pe zi. *Clorurul de fier*, foarte bună preparațiune, transformându-se în stomac în protoclorur; 10—20 ctgr. în 2—6 pilule. *Iordurul de fier*, recomandat în scrofule, sub formă de *sirop* (2 linguri pe zi), sau în pilule *Blancard* 2—10 pe zi. *Lactatul de fier*, care deși nu obosește stomacul, dar nu prea îmbogățește globulele sângelui, în pilule sau dragee de câte 5 ctgr., 4—6 pe zi. *Oxidul feric idratat* sau *rugina*, preparațiune economică care constă în a pune *cuie* în apă până se ruginesc și a bea 2—3 pahare pe zi din acea apă. *Fosfatul de fier*, în pilule de câte 5 ctgr., 4—6.

pe zi, sau în sirop, 2—3 linguri pe zi. *Tartratul de fier și de potasă*, în pilule sau sirop, 50 ctgr. până la 4 gr. pe zi. *Valerianatul de fier*, tonic, antispasmodic, în pilule de câte 5 ctgr., 4—10 pe zi. *Metilarsinatul de fier* se dă în doze de 0 gr. 02—0 gr. 05; *Fierul coloidal* (Electro-marțiol) este o soluție coloidală electrică ce conține 1%⁰ fier. Se fac injecții sub piele sau în mușchi. Un bun preparat de fier este *Feroconstans*, care se prezintă în pilule plăcute la gust. *Ape minerale fieruginoase naturale* la noi: Slănicul-Moldovei, Strunga, Predeal, Umbrărești. — Pentru întrebuințarea pe dinafară sunt: *sulfatul de fier* (calican verde), bun pentru dezinfectarea latrinelor, canalelor, grajdurilor, etc. și *perclorur de fier*, care se întrebuințează în medicină pentru a opri emoragia aplicându-se sub formă de bumbac înmuiat într-o soluție de perclorur de fier pe rană, (*epistaxă*), ori trăgând pe nas din acea apă; se mai dă și *intern* câte 10 picături într-o jumătate de pahar de apă, de 2—3 ori pe zi, niciodată însă să nu se aplice pe o rană perclorur de fier curat.

Fierbere. — V. *Fermentațiune*.

Fierbinteală. — V. *Febră*.

Fiere, bilă, venin. — Este știut că *fierea* se fabrică în *ficat* și că are un mare rol în mistuire. Uneori *fierea* se face prea multă și atunci se scurge prin *mațe* și scaunele se văpesc în *verzui*; scaunele fiind mai dese avem *diarea* sau *urdinarea bilioasă* (vezi *Diaree*), sau *fierea* dintr-o pricină oarecare nu poate merge în *mațe* și rămâne în corp, în sânge, care o duce pretutindenea, văpsind pielea și albul ochilor în galben și atunci avem *gălbănare* sau *icter* care de multe ori este un semn de boală de *ficat*, dar poate să fie trecător. Sunt unele persoane oacheșe, a căror piele bate în gălbui, fără însă ca să fie bolnave, după cum se întâmplă la oamenii cu *temperament bilios*. În unele boale de stomac și de ficat unii bolnavi varsă *venin*, adică bilă amestecată cu mâncare (vezi *vărsături*). Intrucât privește *compoziția fierii* caută la *Ficat*.

Fierea pământului, cîntaură, floare de friguri, frigurică, potroacă, țîntaulă,

țîntaură (*Erythraea Centaurium*, fam. *gentianeelor*). — În medicină se întrebuințează vîrfurile înflorite în contra frigurilor, ca stomahice, aperitive și carminative, sub numele *herba centaurii*. Se dă sub formă de ceaiu, 10 la 1000, de extract, 2—4 gr., de praf, 2—10 gr. pe zi. — La *țară* se plămădește *fierea pământului* în apă, sau *rachiu* (40 gr. la un litru de apă), se face o băutură în contra frigurilor din care se beau 100 gr. în ziua când n'are friguri, se mai bea în contra durerilor de stomac și pentru ca să facă poftă de mâncare cu o jumătate de ceas înainte de masă.

Fiertură. — V. *Decocțiune*.

Filarioză. — Boală produsă de un vierme din ordinul *Nematozilor*, fam. *Filaridelor*, numit *Filaria*, care intrând în organism dă naștere la diferite turburări și accidente. Din cele șapte specii de viermi, *filaria nocturna* este care s'a găsit mai des în sângele omului bolnav, apoi *filaria loa*, sau a ochiului, numită astfel fiindcă ea se observă mai bine la ochi, sub conjunctivă, unde produce dureri și mâncărime mare. Aceste două varietăți



Fig. 195. — *Filaria*

circulă prin sângele omului, intră prin vasele limfatice și împiedecă circulația limfei, producând în regiunea unde se face această împiedecare: *varice limfatice* cu toate urmările lor. Boala cunoscută sub numele de *elefantiază* nu este altceva decât o *filarioză* generalizată la membrele inferioare (*picioare sau picioare de elefant*) și la organele genitale externe. *Filariile* trăiesc în țările tropicale, în Africa, India, China, Antile, Golful Mexicului, etc., unde se găsesc în cursul apelor și omul le ia prin apa de băut; ele au forma unor viermi albi lungi de 35 milimetri masculul, iar femela de 76 milimetri. Mai este o altă specie: *Filaria medinensis* sau de Medina, care, intrând în corpul omului, se dezvoltă și ajunge la o lungime de 70—80 centimetri. Ea se duce din tubul digestiv în țesături, așezându-se sub pielea dela glezne, dela gionate (gambe), dela coapse, câte odată la sân, la nas sau

în limbă, producând acolo o ridicătură care la pipăire ne dă impresiunea unei sforicele înghemuite și care provoacă ivirea unui abces din care iese un capăt al viermelui. *Tratament*: în țările unde se află *filaria* este bine ca apa să se bea în totdeauna fiartă, iar când se ivește abcesul el trebuie deschis prinzându-se una din extremitățile viermelui și extrăgându-l în totalitate încetul cu încetul, răsucindu-l în jurul unui bețișor.

Filimică, clinică, gălbinele, roșioară, roșuliță, rușnică, rușnici, rușuliță (*Calendula officinalis*, fam. compozitelor). Plantă erbace cu florile galbene-aurii, sau galbene roșietice, originară din sudul Europei. Se cultivă adeseori ca decorativă. La țară se fierbe în vin și se bea pentru *gălbinare*.

Filtru, Filtrarea apei. — Filtru este un aparat care se întrebuințează la curățirea apei de băut de toate lucrurile stricătoare sănătății, cum sunt: diferitele materii organice, ouăle unor viermi (limbriți, panglică, etc.) și *microbii*. În orașele mari

apa care se înparte locuitorilor se filtrează mai întâiu în niște havuzuri (basinuri) mari, unde stă câțva timp și unde trece prin straturi alternative de nisip și de pietriș. Dar aceasta nu este de ajuns fiecare casă trebuie să aibă un filtru pentru a filtra apa de băut, fie aceasta venită prin țevi sau luată din râuri, ori din fântâni și aceasta nu numai în timp de molimă, ci și în timpurile bune. Dintre filtrele de casă cel mai bun este a lui Chamberland, care se compune dintr'un tub de porțelan prin care se filtrează apa pusă în vasul de metal în care se află așezat tubul și aceasta mulțumită presiunii pe care o suferă apa. Pentru ca să avem mai multă apă filtrată vom întrebuința un filtru compus din mai multe tuburi de porțelan. Nu trebuie însă să pierdem din vedere că acest filtru, ca să fie în totdeauna bun, trebuie încălzit de 2 ori pe săptămână cu ajutorul unei



Fig. 196.
Filtru Chamberland

lămpi de gaz aerian, sau de spirt, sau într'un cuptor de brutărie. Cu toate acestea în timp de epidemie este bine ca apa de băut să fie fiartă.

Fimoză (gre. *phimos*, sfoară). — Se numește astfel strâmtorarea din naștere, sau de natură inflamatoare, a deschiderii *prepuțului* (sulacului), din care cauză capul membrului viril nu se poate descoperi. Fimoza împiedecă de a ține în stare de curățenie capul membrului din care pricină se pot produce inflamațiuni și chiar ulcerări cari nu se pot trata. Ca tratament se recomandă *circumciziunea* (tăierea împrejur), operațiune ușoară de făcut și care se vindecă repede (vezi *Circumciziune*).

Fior (lat. *horror*). — Un fior se arată sub forma unei tremurături însoțită de o simțire de frig, care pleacă din spate și șale și sguđuie tot corpul în mod integral și neregulat. Sunt mai multe feluri de fiori: uneori totul se mărginește numai la un fel de tremurare (fiori ușori), care oțărăște pielea fără sguđuituri, alte ori este o înfiorare generală (*horripilațiune*) mai pronunțată în care se sbârleşte părul. În alte cazuri fiorul este așa de mare încât dinții clănțănesc și tot corpul se cutremură. Durata variază foarte mult: dela câteva clipe până la 2—3 ceasuri. Nu orice fior este începutul unei boale; o emoțiune morală o spaimă, o frică mare, o mistuire greoaie, o expunere repede la frig sunt de ajuns ca să ne producă fiori ușori, scurți, cari dispar dela sine și nu se însoțesc de fierbințeală (febră). Dar de obicei fiorul ne arată un început de febră eruptivă cum este pojarul, scarlatina, etc., sau începutul unei inflamații (aprinderi) însoțindu-se de o mișcare febrilă (fierbințeală), cum este o fluxiune de piept, pneumonie, sau o peritonită, etc. În aceste cazuri fiorul este puternic și de lungă durată. Cel mai bun lucru pentru a combate astfel de fior este de a te culca îndată în pat, de a te acoperi până sub bărbie cât se poate de bine, de a bea un ceaiu cald sau alt lichid fierbinte, de a cere să ți se pună la picioare și dealungul corpului cărămizi calde, sau sticle umplute cu apă fierbinte, bine astupate și învelite în

șervete, toate acestea, bine înțeles, până la venirea doctorului, care va căuta să afle la ce ține acest fior și va prescrie cele de trebuință.

Fioraventi. — V. *Balsam*.

Fistulă (lat. *fistula*, bortă, canal, gaură, țeve). — Se numește *fistulă* un canal strămt, de multe ori cu cotituri (sinuos), care este produs și întreținut printr'o colecțiune de puroiu, într'un punct mai mult sau mai puțin depărtat de piele, care în cele din urmă se sparge, se găurește, dând scurgere la acel puroiu. Colecțiunea de puroiu (abcesul) care dă naștere la fistulă poate să provină din mai multe cauze: un corp străin care trebuie să se elimine, cum ar fi o bucătică de os mort (colț de lup), un glonte, etc., sau o inflamație (aprindere) a unui canal, cum ar fi a canalului lacrimal, *fistulă lacrimală*, a canalului salivar, *fistulă salivară*, a canalului udului, a uretrei. *fistulă uretrală* sau o conformațiune specială a unei regiuni care face ca vindecarea unui abces să se facă cu mare greutate, cum este regiunea șezutului, *fistulă anală*. Fiindcă toate fistulele dau naștere cu timpul la diferite accidente în locul unde se găsesc și pot chiar să tulbure sănătatea generală împuținând puterile bolnavului, este bine ca ele să se trateze din vreme și în mod radical prin operație. — *Fistulă la șezut* (anus). Acest fel de fistulă se observă des și bolnavii au mare spaimă de ea, mai ales că demulțorii ea este o arătare a ofitei, dar ea poate să fie produsă și de trânji (emo-roizi) și de un abces simplu. Poate să aibă numai o deschidere fie în mațul șezutului (*fistulă oarbă internă*), fie pe pielea din jurul șezutului (*fistulă oarbă externă*); când ea se deschide de amândouă părțile se numește *completă*. Această fistulă se vindecă foarte greu din pricină că părții nu se pot apropia fiind formați de doi mușchi depărtați unul de altul. Intre *semnele* fistulei avem: mâncărime, uneori durere, întotdeauna o scurgere de puroiu. *Tratamentul* constă în operație, adică în tăierea întregului canal fistulos și arderea lui cu fierul roșu după ce bolnavul a fost bine amorțit. — *Fistulă lacrimală* se numește astfel un canal care merge din conductul

lacrimal la obraz, prin care se scurg lacrimile, uneori amestecate cu puroiu, în cazurile de abces. *Tratamentul* constă în arderea traiectului fistulos, sondarea conductului lacrimal, pansament compresiv, sau scoaterea sacului lacrimal.

Fisuri (lat. *fissura*, crepătură), *crepături* sau *plezmituri la șezut* (la anus). — Această boală se arată prin niște răni lunguiețe, cu marginile tari, așezate între încrețiturile dela marginea șezutului, din cari se scurge puțin puroiu. Aceste răni dau naștere la dureri foarte mari, după ce bolnavul a eșit la scaun, din care pricină mai toți bolnavii au spaimă de aceasta și nu se duc afară când le vine, se țin cât pot, zile întregi fără a eși afară. — *Tratament*. Pentru a preveni durerile se recomandă clistire, băi de șezut, ungeri pe răni cu vaselină, înainte de fiecare scaun, iar pentru vindecare se recomandă lărgirea sau dilatația forțată a șezutului, după ce bolnavul a fost adormit prin cloroform, sau amorțit prin rachistovainizare.

Fitină. — Principiu fosfo-organic de rezervă al plantelor cu clorofil, izolat din alimente vegetale. Se prezintă sub formă de praf alb, cu gust acid, aproape insolubil în apă, conținând 20 la 100 fosfor. Fitina lucrează ca tonic reconstituant și aperiativ puternic; ea excită nutrițiunea intimă a țesuturilor și celulelor. Fitina este alimentul fosforat *natural* cel mai bogat în fosfor organic asimilabil. Se dă în doză de 1—2 gr., la copii 25 ctgr. până la 1 gr., în buline, sau comprimate, sau sub formă granulată, în momentul mâncărilor.

Fiziologie (gr. *physis*, natură și *logos*, tratat). — Este știința fenomenelor vieții, adică a proprietăților și funcțiilor țesuturilor și organelor animalelor în viață. Stare *fiziologică* va să zică stare normală, sau *naturală*.

Fizionomie (gr. *physis*, natură și *nomos*, lege). — Se numește astfel înfățișarea dată figurii (feței) prin totalitatea trăsăturilor cari o compun și cari variază dela om la om, sub diferite influențe. Cea dintâiu influență este *ereditatea* (moștenirea), mulțumită căreia aceeași înfățișare a trăsăturilor feței se vede la generațiuni succesive ale aceleiași familii. Altă influență este

conformațiunea deosebită a oaselor feței și mai ales acțiunea mușchilor, cari produc cele mai variate jocuri ale fizionomiei, prin încrețirea frunții, strângerea sprâncenelor, lărgirea nărilor, ridicarea colțurilor gurii, etc. (vezi *Față*), dislocând pielea în diferite sensuri. Când contracțiunile mușchilor se repetă foarte des ele fac ca încrețiturile și îndoiturile pielei să rămână permanente dând fizionomiei un caracter propriu, pe care nu-l mai pierde niciodată. Astfel obiceiul gândirii încordate mărește încrețiturile frunții mai ales pe cele verticale, obiceiul de a râde mult și des, face ca să se ivească încrețiturile dela partea din afară a ochilor (*laba găstii*) și colțurile gurii să fie ridicate. Apoi, privirea omului exprimă blândețe, dulceață, răutate, vicleșug, spaimă, după cum se contractă (se strânge), mai mult sau mai puțin, cutare sau cutare din mușchii cari pun în mișcare sprâncenele și pleoapele. — Fizionomia omului se schimbă în stare de boală așa de mult și în așa mod în cât de multe ori numai după înfățișarea ei putem ghici felul boalei. In cazurile de *alienație mintală* (nebunie) fizionomia variază după forma boalei: ea poate avea o înfățișare răzătoare sau tristă, rătăcită sau tâmpită, care nu se potrivește cu mediul în care trăiește bolnavul, nici nu are vreun motiv aparent. De multe ori această schimbare de fizionomic este cel dintâiu semn al nebuniei. In multe boale, fie de natură nervoasă, fie de altă natură, trăsăturile feței se schimbă; astfel în *meningită* pleoapele sunt pe jumătate închise și, clipind mereu de frica luminii, descoperi niște ochi vii, roșii, înșuflețiți, uneori mișcându-se repede în orbitele lor, alteori fiind ficși, nemîșcați, întorși înăuntru sau înafară, buzele sunt tremurătoare, obrazii sunt roșii sau palizi, calzi sau reci, acoperiți de sudoare. — In *congestiunea* și *apoplexia cerebrală* fizionomia își pierde ori ce expresiune. — In *coree* fața se desfigurează prin tot felul de strămbături. — In *paralizia facială* fizionomia are o înfățișare ciudată, căci într-o jumătate a feței mușchii funcționează bine, cum trebuie, iar în cealaltă jumătate ei stau în nemișcare

(vezi *Față*). — In *febra tifoidă* cu formă gravă fizionomia prin imobilitatea trăsăturilor și privirea rătăcită capătă o expresiune de tâmpeală ca și la idiota. Afară de aceste cazuri fizionomia se schimbă mult și în *boalele de pânțec*, cum sunt *peritonita* și *colicele*, în cari trăsăturile feței sunt strânse și contractate asupra lor însăși, subțiate și pielea este încrețită, sbârciturile sunt mai pronunțate decât de obicei, ochii sunt înfundați și tăiați. In *enterita coleriformă* fața la copiii mici devine galbenă-vănată, rece, buzele se decolorează, nasul se subțiază, obrazii se turtesc, ochii își pierd strălucirea. In *inflamațiunile cronice ale stomacului și intestinului* fața slăbește pe încetul și din ce în ce mai mult, luând înfățișarea prea de timpurie a bătrâneții, pielea este moale, fleșcăită și cu sbârcituri, figura ia un aspect pământos, slăbită; copiii seamănă cu niște bătrâni mici, aproape de sfârșit. In *febrele mari*, sau o *inflamațiune localizată* (febra tifoidă la început, febrele eruptive, brânca, reumatismul acut, meningita, etc.) fața este *vultuoasă*, adică roșie peste tot și cam umflată, obrazii ca și buzele umflați, ochii bulbucați, vii și injectați. In *congestiunile pulmonare* fața este roșie în dreptul umerilor obrazului. In *boalele grave de plămâni* și în *boalele de inimă* cu tendință spre *asfixie* fața este vănată și buhăită, buzele livide. Din toate acestea se poate vedea cât de schimbătoare este fizionomia omului, atât în stare de sănătate, cât și în stare de boală și în acest din urmă caz de multe ori ea ne poate da oarecari indicii asupra naturii și gravității unei boale.

Flanelă. — Rolul flanelelor nu este de a întreține căldura corpului, ci de a suga, a absorbi sudoarea (nădușeală) pe măsura în care iese din piele și de a o lăsa să se evaporeze încetul cu încetul, pentru ca să nu se răcească corpul, după cum se întâmplă când pe piele se află o cămașă de pânză udă de nădușeală și care se evaporază prea repede. Flanela este bună de purtat pentru toți, chiar și pentru copii, atât vara, pentru a preîntâmpina răceala produsă de nădușeală, cât și iarna, pentru a mări căldura

produsă de îmbrăcăminte. Cei slabi de piept, cari tușesc sau capătă guturaiul cu înleznire, ar fi bine să poarte în totdeauna flanelă. Vestimintele de flanelă, cari se poartă dinafară, se pot purta și vara, fiindcă ele nu absorb razele soarelui și nu sunt așa de calde ca celelalte stofe. Ne putem lipsi de flanele dacă ne obișnuim corpul cu răceală, întărindu-l în contra schimbărilor de temperatură prin spălături generale cu apă rece, făcute în fiecare zi, vara-iarna.

Flatulență. — Ingrămădire de gaze într-o cavitate oarecare : *flatulență de stomac, de intestin*, etc.

Flatuozități. — V. *Gazuri intestinale*.

Flebită (gr. *phlebitis*, dela *phleps*, vână și terminațiunea *itis*, care însemnează inflamație). — Prin acest cuvânt se înțelege aprinderea sau inflamația vinelor. Flebita se observă mai mult la gambe, la persoanele atinse de *varice*; ea poate fi produsă de o lovitură a gambei, sau o plagă (rănire) care interesează vreo vână, sau se poate dezvolta sub influența frigului, a unei oboseli prea mari, sau în urma unei lăsări de sânge dintr-o vână, a unei nașteri (faceri) grele, în cursul unei febre tifoide, a unei boale de inimă, a unui reumatism; se mai observă la cei ce sufer de gută, sifilis, cancer sau de orice infecție a organismului. — *Semnele* flebitei sunt *durere* pe traiectul vânei inflamate greutate, amorțeală; pe piele se vede o *suvită roșie* și o *umflătură* (ca o coardă) care nu este altceva decât vâna inflamată și care este foarte simțitoare la pipăit; de altfel toată regiunea ocupată de vână poate fi umflată. Dacă flebita se produce în apropiere de o plagă, aceasta ia o înfățișare urită. Când flebita este întinsă bolnavul are *febră* (fierbințeală) mai mult sau mai puțin mare cu fiori cari se repetă. De obicei flebita se vindecă după un timp mai îndelungat, câte odată cu astuparea vânei. Se poate întâmpla ca inflamația să sfârșească prin *supurație* și atunci bolnavul are dureri mari, svăcnituri, indispoziție generală, fiori repetate, febră vie, urdinare și el poate muri pe încetul prin intrarea puroiului în sânge (septicemie), sau subit (repede)

prin formarea unui chiag în vâna inflamată și care se duce până în plămâni, sau inimă, împiedecându-le funcționarea. — *Tratament*. Repaus absolut; membrul bolnav se va ține în poziție orizontală cu extremitatea puțin mai ridicată, protejat de un cerc, sau o gutieră, se va înveli cu un strat gros de vată, după ce s'a uns cu o alifie compusă din : ichtiol 6 gr., iodur de potasiu 6 gr., extract de cucută 3 gr., extract de beladonă 2 gr., vaselină 30 gr. sau se va acoperi cu un cearșaf ud în apă rece. În contra febrei se va da chinină, fenacetină, antipirină. După vindecare se va trata cauza : varice, etc.

Flebotomie (gr. *phleps*, venă sau vână, și *tome*, tăiere). — Luare sau lăsare de sânge prin înțeparea unei vâne.

Flegmon (gr. *phlegma*, a arde). — Este aprinderea sau inflamația țesutului celular așezat sub piele (*flegmon superficial*), sau mai adânc sub aponevroză, în intervalul organelor (*flegmon profund*). După gravitate și întindere flegmonul se împarte în *simplu* sau *circumscribit* și în *diffus*. 1. Flegmonul este *simplu* sau *circumscribit* când inflamațiunea se mărginește pe o întindere mică. El se ivește în urma loviturilor, sau a plăgilor infectate, sau supuse la iritațiuni mecanice, sau poate fi produs de un lichid iritant (urină, materii fecale), cari a pătruns în țesutul celular sau printr-o inflamație din vecinătate (adenite, fracturi, tumori). *Semnele* acestui flegmon sunt : umflare, căldură, roșeață și durere (svăcnituri). Bolnavul are febră, neliniște și nu poate dormi. Flegmonul se poate termina sau prin *rezoluțiune*, adică să dea înapoi, sau prin *supurație*, adică să facă puroiu, să coacă și în cele din urmă să spargă. 2. Flegmonul *diffus* vine mai cu furie decât cel simplu și se întinde pe o suprafață mare și în adâncime. Umflătura se face repede și este împăstată, păstrând apăsarea (tiparul) degetului, durerea este foarte mare, părțile inflamate se mortifică, se gangrenează și mai târziu se elimină, (cad) când începe și supurația (cam pe la a 6-a zi). După căderea părților gangrenate rămân răni mari, întinse, cari aduc după sine schimbare în conformația

membrului; febra este foarte vie. *Tratament.* In flegmonul *simplu* se recomandă la început antiflogistice locale și generale: poziția ridicată a membrului, repaus, lipitori, cataplasme de in, curățenie (purgativ), regim de lapte; când s'a făcut puroiu (când a copt) se va deschide printr'o tăiere largă și adâncă. In flegmonul *disus* se recomandă la început revulzive, compresii, etc., dar este mai bine să se facă chiar dela început tăieturi (*incizii*) largi, adânci și multe, lăsând între ele însă 4—5 centimetri de piele pentru a preveni gangrena ei. Se va înlesni scurgerea puroiului prin drenaj metodic și spălături repetate, cu medicamente antiseptice. Pe dinăuntru vom da bolnavului medicamente tonice.

Flictene (gr. *phlyzein*, a fierbe), *beșici*. — Flictenele sunt niște *beșicuțe* sau *beșici* pline cu un fel de apă limpede, transparentă, cari se ivesc în palme, sau tălpi în urma unor apăsări tari și repetate. La mâni sunt produse prin lucrarea cu sapa, lopata, săcurea, toporul, furca, grebla, ciocanul, etc., iar la picioare prin umblet mult, silit și prin încălțăminte rea. Când beșicile sunt produse printr'o apăsare violentă și repede, ele au o culoare violacee sau negricioasă din cauză că lichidul ce cuprind este amestecat cu sânge. Flictenele se mai ivesc în cazurile de arsură (*combustiune*), sau prin aplicare de *vezicătoare*. *Ca tratament* se recomandă să se înțepe beșicile pentru ca să curgă apa din ele, cu un ac sau cu foarfeci, după ce au fost trecute mai întâiu prin flacări. Nu trebuie însă să se ridice pielea după ce s'a scurs apa, pentru ca să nu se producă dureri mari, ci se va lăsa pe loc punând pe deasupra o bucată de tifon unsă cu vaselină boricată, vată și fașe.

Floare de pucioasă. — V. *Sulf*.

Flori. — In medicină se întrebuințează un număr foarte mare de flori: de mușătel, de nalbă, de portocal, de teiu, mai ales florile zise *pectorale*, adică de piept (v. *Pectorale*). Strângerea florilor se face la început, în momentul fecondațiunii, de oarece mai târziu sucurile se pierd pe învelișurile florilor cari dispar repede. Florile trebuie uscate repede la umbră și păstrate în saci de pânză, ferite de lumină

și umezeală. Ele se întrebuințează mai mult sub formă de ceaiu (infuziune). Nu trebuie să pierdem din vedere că multe flori cuprind *otravă*, cum sunt: aconitul, oița, floarea broștească, luminoasa, știrigoaia, mătăguna, brândușa de toamnă, ciunăfaia, degetarul, măsălarita. Nu este bine să lăsăm să stea în odaia de dormit în timpul nopții nici plantele în ghiveci, nici florile în buchet, căci iau oxigenul din aer și dau acid carbonic, mai ales florile cu parfum, sau cu miros tare (leandru, crin, iasomie, trandafir, soc, toporași).

Flori pectorale. — Sunt bune pentru *ceaiu de piept* care înmoaie tusa (5 la 1000). Ceaiul de piept se compune din florile de nalbă, nalbă mare, parpian (*antennaria dioica*), mac roșu, lumânărică, toporași, în părți egale.

Fluctuație (lat. *fluctuatio*, hălțacări, legănarea sau mișcarea unui lichid într'o parte și într'alta). — Este un semn care ne ajută să recunoaștem prezența unui lichid adunat într'un țesut, sau revărsat într'o cavitate seroasă. Prin pipăire căpătăm simțiri sau senzațiuni tactile cari adeseori ne pun pe cale să cunoaștem cu înlezniere un abces, un chist. Se întâmplă câte odată să simțim o *fluctuație falsă* datorită moliciunii țesăturilor, cum sunt *lipomele* (tumorile de grăsime), etc., cari, fără să aibă lichid, dau degetului o senzație de moliciune care seamănă cu aceea a fluctuațiunii. — Fluctuațiunea sau *senzațiunea de undă* (de val) se simte și atunci când un lichid s'a revărsat în câtime mai mare într'o cavitate seroasă. Astfel, într'o *ascită* (apă în pânțec), dacă punem o mână (cu palma) pe perețele pântecelui într'o parte declivă și cu cealaltă mână dăm în partea opusă o mică lovitură, un hobărnac de pildă, mâna dintâiu va simți o undă, un val, cu totul caracteristic.

Fluer. — V. *Gambă*.

Fluxiune (lat. *fluxio*, dela *fluere*, a curge). — Fluxiunea se deosebește de *congestiune* prin aceea că acolo este o îngrămădire de lichid (sânge sau alt lichid), pe câtă vreme prin *fluxiune* se înțelege însuși mișcarea care duce și fixează lichidul într'un punct oarecare al corpului—Congestiunea de sânge

poate să provină dintr'o piedică în trecerea sângelui, sau dintr'o paralizie a nervilor vazo-motori, etc. Fluxiunea este o chemare, o atragere a sângelui spre un organ printr'o cauză excitantă a cărei natură de multe ori nu se cunoaște (*fluxiune reumatismală, fluxiune guloasă*), sau fără o cauză locală apreciabilă (unele fluxiuni *oculare* sau *pulmonare* simple). Fluxiunea de sânge este foarte mobilă, apare și dispare repede, dispare dintr'un loc pentru a se ivi în altul, ceea ce nu se întâmplă la congestiune sau inflamație. Fluxiunile se tratează prin derivație și revulsiune, astfel o fluxiune *emoroidală* se derivă (se abate) prin lipitori la șezut o fluxiune *de piept* se combate prin revulsiune, cum este (vezicători), etc.

Foale. — V. *Abdomen*.

Foame (lat. *fames*). — Foamea rezultă dintr'o trebuință generală a organismului și nu se potolește decât prin introducerea substanțelor reparatoare în organism prin gură, sau pe alte căi (prin șezut sub formă de clizme nutritoare, prin stomac deodreptul cu sonda, sau prin injecțiune în vine a unor substanțe asimilabile). Foamea o simțim în stomac, la lingurea, din pricină că experiența de toate zilele ne arată că ea încetează când introducem mâncare în stomac, în realitate însă foamea este o senzație generală a întregului organism, întocmai ca și *setea*. Primul grad al foamei este *apetitul*. Senzațiunea opusă foamei este aceea a *săturării*, a ghiftuirii, pe care o avem când stomacul este plin. Lipsa simțirii de foame în mod constant și anormal se numește *anorexie*.

Foeniculum officinale. — V. *Molură*.

Foi, frunze. — În medicină se întrebuințează foile multor plante. Foile trebuiesc strânse în momentul când încep a se dezvolta florile. Dacă sunt culese mai înainte ele sunt prea apoase, dacă se culeg mai târziu, ele ar pierde din însușirile lor, o parte din puterea lor s'ar pierde în profitul florilor. La unele plante se strâng foile dela partea superioară a plantei împreună cu florile și acestea se numesc *vârfuri înflorite* (izma, pelin, țintaură, etc.). Strângerea foilor se face pe timp uscat, 2—3 ore după ce a răsărit soarele:

se vor arunca foile uscate, atacate de viermi, murdărite de pământ precum și acele cari sunt uscate și vesele. Proprietățile sau însușirile foilor variază mult, astfel: foile de nuc sunt astringente, cele de lumânărică sunt pectorale, cele de nalbă sunt emoliente, etc. Foile se întrebuințează de obicei sub formă de ceai (infuzie) sau de fiertură (decoct) în apă.

Fomentațiuni (lat. *fomentum*, dela *fovere*, a încălzi, a cloci), *oblojeli*. — Aplicațiuni pe o parte a corpului a unor substanțe, lichide sau solide, încălzite în mod artificial; prin extensiune se numesc fomentațiuni și aplicațiuni de lichide reci. Aceste oblojeli se fac în mai multe feluri: o cârpă, un șervet, un prosop, încălzite, sau un săculeț plin cu nisip cald, sau un vas de tinichea umplut cu apă caldă și învelit într'o bucată de lână sau de flanelă, care încetinează răcirea apei și domolește lucrarea căldurii asupra pielei. Toate acestea sunt fomentațiuni *uscate*, cari se întrebuințează pentru a readuce căldura într'o regiune, într'o parte a corpului care este rece, în urma unei loviri violente, sau când este amenințare de gangrenă. — Cele mai deseori se întrebuințează fomentațiuni *umede*, cari se fac aplicând un lichid cald prin mijlocul unui burete, a unei bucăți de flanelă, de cârpă, cari se lasă în permanență pe locul bolnav, având grijă să le udăm din nou, înainte de a se răci; pentru ca răcirea să nu se facă iute este bine ca compresele ude să se acopere cu gutapercă sau tafta cerată. Aceste oblojeli *umede* sunt mai bine decât cataplazmele, căci se prepară mai cu înlesnire și sunt mai ușoare; ele calmează înmoaie părțile pe cari se pun. Ele se fac de obicei fierbând în apă diferite foi, de mătrăgună, de cucută, de meișor, flori de soc, rădăcini de nalbă mare, capete de mac, cari sunt substanțe narcotice și emoliente. Aceste oblojeli sunt foarte bune în cazurile de durere mare, nevralgie, dureri reumatice și altele, în cazurile de iritațiune, de mâncărime și arsură de piele; ele pot preveni sau micșora o inflamație.

Fonațiune (gr. *phone*, voce). — V. *Voce*.

Fondant. — Medicament care ajută rezoluțiunea sau împrăștierea unei inflamațiuni. Pentru aceasta se întrebuințează substanțe cari au ca efect reînsuflețirea vitalității țesuturilor bolnave, ajutând astfel rezorbirea, lichidelor revărsate. Cele mai de căpetenie fondante sunt plastorele, sau alifiile cu iod, cu iodur de potasiu, cu mercur sau medicamentele interne cari cuprind iod sau mercur.

Fongozitate (lat. *fungus*, ciupercă). — Vegetațiuni molatice, cari se ivesc la suprafața unei răni, unui ulcer, a unui cancer; ele sângerează cu ușurință și împiedecă cicatrizarea; ele se distrug de obicei prin ardere cu nitrat de argint.

Fongus. — Tumoră canceroasă care iese dintr'o cavitate închisă și seamănă cu o ciupercă.

Fontanelele, Fântânele. — V. *Craniu*.

Forceps, fiare. — Un fel de clește mare, cu care se scoate copilul în cazurile de facere anevoioasă.



Fig. 197. — Forceps

Formiat de sodă. — Se întrebuințează în pneumonia fibrinoasă; tonic muscular și diuretic. *Doză:* 1—2 gr. a adult.

Formină. — V. *Urotropină*.

Formol, formaldehidă, aldehidă formică, formalină. — Gaz obținut prin trecerea vaporilor de alcool metilic asupra cărbunelui înroșit; este foarte solubil în apă și alcool. Formolul este un antiseptic tot așa de puternic ca și sublimatul coroziv, nu este toxic și lucrează în stare de vapor. Pentru dezinfectat se întrebuințează în soluție apoasă 1 la 200, pentru pansamente 1 la 4000.

Fornăire, sforăit. — Tîmbru particular al vocii, când sunetele răsună prin nas, în loc de a se produce numai prin gură, ceea ce se chiamă a vorbi pe nas. Lucrul acesta se întâmplă când aerul care vine din plămâni, în mo-

mentul când vorbim, trece prin nas în loc să treacă prin gură, fiind oprit de umflarea amigdalelor, printr'o inflamație simplă sau o anghină. Se întâmplă și când o parte din aerul care trece prin nas, fără să se oprească, dă de o piedecă (guturaiu); atunci se oprește acolo și răsună. Sunt persoane cari vorbesc pe nas din pricină că perețele despărțitor al nărilor este încovoiat într'o parte astupând nărea din acea parte. Fornăirea se mai vede în cazurile de paralizie a vîlului palatin, mai ales în paralizia care urmează după o anghină difterică, în leziunile scrofuloase, sifilitice și canceroase ale cerului gurii și nasului.

Fortifiante, întăritoare. — V. *Tonice*.

Fosfate. — Sunt niște săruri formate prin unirea acidului fosforic cu bazele (calciu, sodă, etc.). Dintre toate fosfatele cele mai importante sunt fosfatul de calciu, apoi lactofosfatul, glicerofosfatul și cloridofosfatul de calciu (v. *Calce*).

Fosfor. — Corp chimic foarte răspândit în natură, în stare de fosfate metalice. Se găsește în combinație în sânge, urină, creier și nervi și cu deosebire în oase în stare de fosfat de calciu, din care industria îl extrage nu atât pentru trebuințele medicinei, cât pentru fabricarea chibriturilor. Fosforul este foarte otrăvitor. Sunt două varietăți: fosforul ordinar, care este solid, alb-gălbui, semi-transparent, cu miros tare de usturoiu, răspândește în aer un fum alb, luminos la întunec și se aprinde cu mare înlesnire. — Fosforul roșu sau amorf, care este roșu, opac, fără miros, nu răspândește fum în aer și nu se aprinde decât în condițiuni deosebite. O cantitate foarte mică de fosfor ordinar otrăvește animalele, din care cauză se prepară cu el un fel de pastă fosforată pentru omorîrea animalelor stricătoare, fosforul roșu însă nu este otrăvitor din cauză că el nu se topește în sucurile stomacului; el nu dă loc la nici o emanație și nu este primejdios pentru lucrătorii cari umblă cu el, din care pricină astăzi chibriturile se fabrică mai mult cu fosfor roșu. — Fosforul are proprietatea de a fi: excitant, afrodisiac periculos. Se dă în contra febrei adinamice, în paralizia musculară și mai

cu seamă în ataxia locomotrice, s'a dat și în contra anorexiei. Se dă în doză de 1—3 mgr. pentru adulți și $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ mgr. pentru copii, de obicei sub formă de ulei fosforat (1 la 100) în capsule de câte un mgr. Pe *din afară* se întrebuințează în fricțiuni (alifie), ulei fosforat (1 la 100). Pe *dinăuntru* însă este mai bine să se întrebuințeze *fosforul de zinc*, care nu este așa de primejdios (vezi *Fosfur de zinc*). — *Otrăvirea* se face cu fosful luat dela chibrituri, sau cu pastă fosforată, care servește la omorirea șoarecilor (15—30 ctgr. pot să omoare un om). *Semnele* acestei otrăviri sunt: *durere* la stomac, puține vărsături (materile vărsate pot fi luminoase la întunecare), *miros de usturoiu* iese din gura otrăvitului, slăbiciune mare, puls foarte mic, adeseori palpitațiuni. Apoi *durere la ficat* și *gălbănare* (cam după trei zile), curgere de sânge din nas, vărsături de sânge, pete de sânge sub piele, diaree cu miros urât, arsură la șezut, furnicături și crampe în mușchi, în urmă delir, agitație, neliniște mare, spasme, respirația grea, moarte. *Tratament*: vom face ca bolnavul să verse dându-i *emetic* (10 ctgr.) sau mai bine *sulfat de cupru* (câte 20 ctgr. la fiecare 5 minute până varsă, apoi câte 5 ctgr. la fiecare sfert de oră, cu scopul de a se forma în stomac fosfat de cupru, care este puțin solubil), iar până să avem aceste medicamente vom provoca vărsăturile, dând otrăvitului să bea apă caldă în abundență și îi vom gădila fundul gurii cu o pană de gâscă, sau cu vârful degetului. *Nu trebuie să dăm* bolnavului lapte, unt de ricin, nici orice altă grăsime cari grăbesc toate absorpțiunea otrăvii. Pentru deșertarea mațelor ne vom servi de clizme sau de curățenii saline (sare amară, etc.). — *Otrăvirea cronică*. Lucrătorii cari fabrică chibriturile cu fosfor ordinar și cari respiră vaporii lui, după câțva timp încep să-și piardă puterea, să tremure și să aibă slăbiciune în picioare și mâini, dureri în gură, dinții se clatină și cad, gingiile se umflă și sângerează, fălcile devin dureroase, se umflă și se cariază (mortifică). *Tratamentul*: Se va îngriji gura și în deosebi dinții și măselele. Otrăvitul se va lăsa de lucru, se va pune

pe traiu bun și apropiat stării lui, iar oasele moarte vor fi scoase de doctor prin operațiune.

Fosforic (Acid). — Soluțiunea oficială cuprinde 50 la 100 de acid fosforic. Se întrebuințează în cazurile de impotență, gravelă fosfatică, rachitism, etc. Se dă în doză de 20 ctgr până la 2 gr., în limonadă fosforică (2 gr. la 1000).

Fosfur de zinc. — Se întrebuințează în medicină ca excitant și afrodisiac. Se dă pe *dinăuntru* în doză de 8 mgr., până la 4 ctgr.

Fotofobie (gr. *phos*, lumină și *phobos*, temere, frică). — Este un simptom care constă într'o senzibilitate foarte mare a ochiului la lumină, încât nu o poate privi și bolnavul trebuie să stea ziua cu ochii închiși. Acest simptom se vede în multe boale ale ochiului: conjunctivită, cheratită, retinită, etc.

Fotoliu, *jeț*. — Scaun mare cu spate și brațe, pe roțițe, construit astfel încât prin ajutorul unei manivele i-se poate ridica și lăsa în jos spatele după voință, putându-se în același timp mișca cu ușurință în toate direcțiunile. Aceste scaune sunt foarte folosite pentru suferinzii atinși de boale cari îi pun în neputință de a umbla, cum sunt: coxalgia, caria (os mort) la șira spinării la copii, paralizia picioarelor, sau fractura oaselor dela picioare la adulți. atunci când este de neapărată trebuință ca acești infirmi să fie duși la plimbare în aer curat în fiecare zi. Mai este un *fotoliu leagăn*, care se găsește în multe case, fiind foarte potrivit pentru *siesta* persoanelor cu mistuirea grea și înceată.

Fototerapie (gr. *phos*, lumină și *therapeuein*, a vindeca). — Este o metodă de tratament bazată pe acțiunea razelor luminoase asupra pielii. Se întrebuințează sau *razele chimice* (ultra-violete, *fototerapia pozitivă* a lui Finsen), sau *razele roșii* cu excluderea celor dintâi (tratamentul variolei prin *fototerapia negativă*), sau *lumina întreagă* (băi de lumină). *Fototerapia lui Finsen* dă rezultate bune în tratamentul boalelor de piele: lupus tuberculos, cuperoză, sicoză, peladă, mici epiteliome, etc. *Fototerapia generală* (cu lumina întreagă), adică *băile de lumină*, sunt bune în anemie, neurastenie și în toate stările

de depresiune organică, aceste băi fiind urmate de *duşuri reci*.

Fractură (lat. *frangere*, a frânge, a rupe, a sdrobi), *frântură*, *ruptură*. — Prin cuvântul *fractură* se înţelege *ruptura* unuiu, sau a mai multor oase, produsă printr'o violenţă exterioară, cum ar fi : o lovitură, o cădere, glonţul unei arme de foc, etc. Un os se poate frânge şi printr'o contracţiune peste măsură de mare a muşchilor cari se prind de el şi cari, făcând efortări în sens contrar asupra celor două capete ale lui, îl rup în punctul cel mai slab, lucru ce se poate întâmpla în spasme, în epilepsie, etc., sau numai printr'o mişcare bruscă făcută cu scopul ca să nu cădem când am alunecat, sau călcat rău. Uneori oasele sunt mai slabe, mai puţin rezistente din pricina unei boale generale, cum este rachitismul, scorbutul şi altele, aşa că ele se rup cu înlesnire la cea mai mică efortare sau lovitură ; se pot rupe chiar de mai multe ori în acelaşi loc. Tot astfel se întâmplă şi la bătrâni la cari oasele nu mai au suc, sunt uscate şi frângăcioase, ceea ce le face să se rupă cu înlesnire chiar în timpul mersului, sau la scoborîrea pe o scară. Osul se poate rupe în locul unde s'a primit lovitură, sau la o depărtare oarecare de acel punct. În căderea pe mână se poate rupe unul din cele două oase ale antebrăului, sau osul braţului ; un pas strâmb poate să producă ruptura oaselor gambei (gionatei) sau a coapsei. — Fracturile sunt de mai multe feluri ; fractura este *completă* când osul se rupe în toată grosimea lui şi *incompletă* când osul este numai crăpat, sau pleznit. Când este numai osul rupt, fără altă stricăciune, fractura se numeşte *simplă*, când însă, pe lângă ruptura osului, mai este o rană sau o plagă mai mult sau mai puţin întinsă, urmată uneori de inflamaţiune şi formare de puroiu, cu ferbinţeală şi aiurare, alteori de gangrena părţilor moi, în aceste cazuri fractura se zice *complicată*. Osul poate fi rupt în mai multe bucăţi, cari se numesc *eschile*, iar fractura se chiamă atunci *cominutivă*. Dintre toate acestea *fractura simplă* este aceea care se vindecă mai uşor şi mai iute (3 până la 6 săptămâni), după os şi după locul rupturii ; vindecarea se

face prin formarea unui inel, sau a unui cerc osos numit *calus*, care uneşte cele două capete ale osului rupt. Se întâmplă uneori că vindecarea unei fracturi se face cu scurtarea membrului rupt şi atunci omul rămâne *schiop*. Oasele capului de multe ori când se rup se înfundă în cap şi apasă creierul, ceea ce poate produce moartea bolnavului ; acelaşi lucru se poate întâmpla şi cu oasele şirii spinării, cari, înfundându-se, apasă măduva. Coastele rupte se pot înfunda în plămâni, sau în inimă. Oasele membrelor se pot îndrepta mai cu uşurinţă. — O ruptură de os se cunoaşte prin mai multe *semne* : o *durere* foarte mare în locul unde osul este rupt, o *deformaţiune* a membrului prin dislocarea bucăţilor osoase, care se vede foarte bine la început, până nu se umflă regiunea în care se află fractura, o *mobilitate anormală* adică o mişcare neobişnuită a celor două părţi ale osului rupt, o *neputinţă de a mişca* membrul cu osul rupt, adică de a ridica mâna sau piciorul, sau de a umbla, o *infiltraţiune de sânge* în ţesutul celular de sub piele (echimoză, vânătaie), care adese ori merge crescând mai multe zile, deărândul. În fracturile *incomplete* există numai semnul *durere*, căci părţile îşi păstrează poziţia lor obişnuită. În orice fractură *radiografa* ne dă bune şi precise lămuriri. — *Tratamentul* unei fracturi constă, dela început chiar, în a ţine în nemişcare membrul care are un os rupt, punând membrul bolnav într'un jgheab (gutieră) de sârmă, căptuşit cu vată pe dinăuntru, sau în lipsa lui să-l punem într'o poziţiune bună şi să-l imobilizăm cu ajutorul unui aparat *provizoriu* din perinute, cearşafuri şi servete (vezi *Aparate şi Imobilizaţiune*), iar pe locul fracturii vom pune cârpe muiate în apă rece, sau în apă de plumb, cari se vor primeni cât se poate de des, pentru a potoli durerile, a preîntâmpina inflamaţiunea şi a micşora umflarea membrului. Dela o bună *reducţiune* a fracturii atărnă şi bunul rezultat al tratamentului precum şi dela menţinerea unei bune poziţiuni printr'un aparat bine făcut.

Fragi, *fragi de pădure*, (*Fragaria vesca*, fam. rozaceelor). — Ele constitue

o hrană sănătoasă, cam grea de mistuit pentru stomacurile slabe; se mistue și mai greu când se mănâncă amestecate cu smântână. Sunt unele persoane cari îndată ce mănâncă fragi eapătă blândă (urticarie). Aceștia, precum și persoanele cari sufar de boale



Fig. 198.—Fragi

de piele, trebuie să se păzească de fragi. Luat în cantitate mare sunt bune în gută și la cei ce sufar de pietriș la ud. În medicină se întrebuințează rizomul și fructele pentru însușirea lor de a lucra ea *aromate, astringente, diuretice, stimulente*. Se dă sub formă de fiertură (decoct din rizom), 20—30 la 1000, sirop de fragi, după voie. — La țară se bea ceaiul de fragi uscați, când se oprește udul, ceaiul de frunze când cineva are mistuire slabă, decoctul de rădăcini pentru tusă. Foi de fragi și de căpșuni pisate și amestecate cu sare se pun la măsă.

Frântură de os. — *Fractură*.

Frasin, frapsin (*Fraxinus excelsilor*, fam. oleaceelor). În medicină se întrebuințează frunzele și scoarța ramurilor, cari au proprietăți *amare, laxative și diuretice*, pentru care se întrebuințează în gută, în reumatism și în multe boale de piele. Se dă sub formă de ceaiu (infuzie din frunze), 15—30 la 1000 (purgativ), infuzie din scoarțe, 10—15 la 1000 (contra frigurilor), praf de frunze 1 gr.

Frâul limbii. — *V. Ață la limbă*.

Frențe. — *V. Sifilis*.

Frică, temere (lat. *timor*), spaimă. — Unora li se face părul măciucă din cauza spaimii, altora le produce dureri de stomac (crampe), colici intestinale, turburări în mistuire, vărsături, urdinare, bătăi de inimă, leșin, spasme. La cei cu temperament nervos vom vedea turburări nervoase, cari variază în intensitate după fiecare individ: la unul câteva palpațiuni ușoare, sau o pierdere trecătoare de cunoștință, la altul atacuri de nervi, sau spasme, iar la altul atacuri de isterie sau de epilepsie, în fine la un altul menin-

gită, sau chiar moarte subită. — La cei cu stomacul și cu intestinele delicate vom vedea diferite turburări digestive de diferită intensitate. Întru cât privește tratamentul accidentelor produse de frică ne vom călăuzi de natura și intensitatea lor, dând diferite calmante: ceaiu de teiu, de flori de portocale, apă de flori de portocale, în apă îndulcită cu zahăr, puțin bromur de potasiu, vom pune cărpe reci pe frunte și cap sau chiar ghiată, sau vom da stimulente: apă de melisă, câteva picături de eter în apă sau pe zahăr. Frica are mare influență asupra sănătății și prin urmare vom căuta s'o ocolim pe cât este cu putință.

Fricțiuni (lat. *frictio*), *frecături trăsături*. — Fricțiunile sunt *uscate și umede*. Cele dintâi se fac cu mâna ca și în masaj, cu o perie făcută din fire de lână, din fire vegetale sau metalice, cu o mânășă de păr, cu o bucată de pânză, sau de flanelă. Fricțiunile umede se fac cu lichide calmante, sau stimulente, cu uleiuri, alifii, etc. Fricțiunile uscate sunt foarte bune pentru a excita (ațâța) funcțiunile pielii și se recomandă în cazurile de sfârșeală, slăbiciune, asfixie, etc. Același lucru îl fac și fricțiunile umede, când sunt făcute cu lichide excitante ca spirtul camforat, oțetul, simplu, sau de trandafir, uleiul de terbenină și când ele sunt întinse peste tot corpul. Când se aplică numai pe o parte a corpului, ele potolească durere nevralgică, sau reumatismală. Aceste fricțiuni mai au și scopul de a introduce în sânge unele medicamente, când ele nu se pot introduce prin gură sau prin clisme, sau cum sunt: laudanul, cloroformul, mercurul etc.

Frig (lat. *frigus*). — Când căldura aerului în care trăim este cu mult mai mică decât căldura corpului nostru zicem că este frig. În țările temperate, cum este România, simțim frigul când termometrul se scoboară la +5 grade, dar această temperatură ni se pare călduță când ea vine după un ger care a ținut mai multe zile. De altfel omul suportă frigul cu atât mai ușor cu cât este mai bine hrănit, cu cât face mișcare mai multă și cu cât este aerul mai liniștit. Când bate vântul chiar și când este mic, și omul este

râu hrănit și stă în odihnă, frigul devine mai simțitor și acțiunea lui asupra corpului mai periculoasă. — *Efectele frigului*, atârnă după cum el este *moderat* (mic) și *foarte intens* (foarte mare). În cazul dintău, când omul este potrivit îmbrăcat, cu stomacul în deajuns de plin și face exercițiu în aer liber, frigul este bun, este folositor, căci el face ca pofta de mâncare să crească, activitatea trupească și sufletească să se mărească și omul să se simtă bine. Pentru aceasta se recomandă ca să se scoată la plimbare copiii în fiecare zi, după amiază. chiar și în timpul iernii, lucrul care trebuie de altminterlea să-l facă și oamenii mari. Frigul *intens* (mare) are influență foarte puternică asupra corpului; el produce mai întâu o simțire generală de frig pe toată suprafața corpului, pielea se sbrăleşte și seamănă cu pielea de găină, produce durere de cap, supără respirațiunea și micșorează puterea și iuțeala pulsului. Dacă frigul este și mai mare atunci simțirea de frig e și mai neplăcută, chiar dureroasă; mâinile, picioarele, nasul, urechile, fiind mai departe de inimă și primind mai puțin sânge devin palide, albe și dacă omul se găsește în rele condițiuni fizice și morale atunci se ivesc turburări parțiale și generale, a căror totalitate este cunoscută sub numele de *degerătură*. Pentru ca să ne apărăm de acțiunea unui frig aspru se recomandă o alimentație (hrănire) substanțială, întăritoare, compusă mai cu seamă din carne, grăsimi, vin, cafea și de licoruri în cantitate mică, o încălzire sistematică, regulată, un exercițiu continuu și îmbrăcăminte aleasă și potrivită. Afară de aceste turburări frigul poate produce și altele, cari de altfel se pot produce și sub influența altor cauze, turburări cari se ivesc sau în partea care a fost atinsă de frig, sau într-o parte mai depărtată. Astfel frigul poate să dea naștere la diferite nevralgii, la dureri reumatice, urdinare, durere de gât, guturaiu, tuse, congestiuni de plămâni, pneumonie, pleurezie, etc. Alteori guturaiul și durerea de gât pot proveni din răcirea la picioare. Cele mai multe din aceste boale vin în urma unei *răceli*, din trecerea repede dela căldură la frig,

precum și din starea în frig mare, timp îndelungat; astfel, oftica este mai mult în țările temperate unde aceste treceri dela cald la frig sunt mai repezi și mai dese. — În medicină ca și în chirurgie se întrebuințează frigul în multe boale, fiindcă el amortește locul asupra căruia se aplică mai mult timp, frigul se întrebuințează în potolirea durerilor în diferite *nevralgii*, pentru care se toarnă pe locul dureros eter a cărui evaporare produce o răceală repede și prin aceasta încetarea durerii. Ghiata înghițată micșorează sensibilitatea stomacului și domolește vărsăturile. Ghiata mai este bună și în vărsăturile de sânge, precum și în orice emoragie internă și externă. Sunt multe pausamente cari se fac cu apă rece: în lovături se pun cărpe muiate în apă rece, pentru a preveni inflamațiunea, la cap, în cazurile de meningită, se pun de asemenea cărpe muiate în apă rece sau beșici (pungi) cu ghiată; tot așa în cazurile de congestiune și apoplexie cerebrală, de migrenă etc. Apoi, pe pânțele când este vorba de peritonită. Frigul se mai întrebuințează în medicină și sub formă de băi, dușuri, idroterapie.

Friguri, frigui palustre. — V. *Paludism*.

Friguri de cap. — V. *Meningită*.

Friguri de creștere. — V. *Creștere*.

Friguri galbine. — V. *Galbenă (Febra)*.

Friguri puerperale. — V. *Puerperală febră*.

Friguri rele. — V. *Paludism (Febra pernicioasă)*.

Friguri tifoid. — V. *Tifoidă*.

Frigurică. — V. *Fierrea pământului*.

Fripturi. — O friptură se poate prepara în mai multe feluri: prin *coacere* și *frigere*, adică la tigae, tingere, tavă (în cuptor) și la frigare, sau pe grătar. Ne vom ocupa mai întâu cu cea mai greu de preparat, cu friptura făcută la *frigare*. Un mușchiu de vacă, pus în fața unui foc viu, este foarte gustos la mâncare și este moale. Dacă însă punem mușchiul în fața unui foc mic a cărui căldură o mărim încetul cu încetul, lichidele din carne se evaporază și nu lasă în urmă decât o carne uscată, lipsită de sucuri nutritive și care, fiind tare, se mistue cu anevoință. Carnea albă, cum este cea

de vițel, de miel, de pasere, trebuie friptă la un foc încet, domol, iar pentru a suplini evaporățiunea lichidelor care ar face friptura uscată, este bine să udăm carnea, în timpul frigerii, în continuu fie cu sucul ei, fie cu saramură, fie cu unt sau grăsime topită. Pentru carnea roșie (de bou, vacă, porc, etc.) trebuie foc viu, iar pentru carnea albă foc domol. Astfel vom avea fripturi bune, gustoase, cari ne dau carnea în natură cu toate principiile hrănitoare, fără adăugire de grăsime, sau alte produse indigeste. Friptura la *grătar* (cotletele de vacă, de berbec, biftecurele) este aproape tot așa de bună ca și cea la frigare și ca variație se poate mânca din când în când. Friptura la *tingire* se mistue mai greu decât cele la frigare și la grătar și are marelă neajuns de a provoca adeseori o sete mare. Ori care ar fi grăsimea în care s'a fript carnea, friptura trebuie să se mănânce în totdeauna bine scursă și foarte caldă, dacă vroom să fie bine digerată (mistuită).

Frontal. — Osul frunții. Os lat, nepereche.

Fructamin. — Este un medicament care conține vitamina C și P (1 cmc. de fructamin pentru injecții conține cantitate de vitamină C și P pe care le conțin 100 gr. de zeamă de lămâe). Este un medicament folositor în scorbut, alterarea oaselor și dinților, carii dentare, sângerarea gingiilor, etc. Se dă în injecții și sirop (de 2—4 ori pe zi câte o lingură, în apă).

Fructe (dela lat. *fructus*). — Dacă fructele nu sunt substanțe alimentare așa de hrănitoare, nu-i mai puțin adevărat că ele contribuie mult la variațiunea hranei noastre, făcând-o mai plăcută prin zahărul și aroma lor. Din această pricină ele sunt așa de căutate în toată lumea și mai cu seamă în toate țările calduroase, unde formează alimentația obișnuită a unor popoare. Nu trebuie să pierdem din vedere că dacă hrana cu fructe este cea mai lesnicioasă, ea nu este îndestulătoare, pentru că substanțele albuminoide sunt în cantitate prea mică iar cele producătoare de căldură sunt în cantitate prea mare. Fructele conțin multe săruri: fosfate, clorure și acizi vegetali

(citric, malic, pectic, etc.). Dacă mâncăm fructe prea multe, ne strică stomacul, produc vărsături și urdinare, cari ne slăbesc ne predispun la boale grele. Dacă le mâncăm în câtime mică împreună cu celelalte mâncări, adică la masă, ajută mistuirea măbind cantitatea sucurilor digestive, fac să se absoarbă mai repede prin sărurile lor și în același timp ele regulează scaunele făcându-le mai moi. După compoziția lor fructele se împart în 5 grupe: zaharate cu amidon, zaharate, mucilaginoase, acrișoare (acide) și uleioase. Fructele *zaharate amidonate* se găsesc mai cu seamă în țările prea calde și cel mai de căpetenie este *banana*, care dă o făină ce se apropie în compoziție cu aceea a orezului, pentru care ea are aceleași întrebuintări ca și orezul. Fructele *zaharate* au o însemnătate mare în hrana omului (*smochinele, curmalele, strugurii*). Fructele *mucilaginoase* cuprind *pepenele verde, pepenele galben, cantalupul și dovleacul*. Luate în cantitate mică, mai ales vara, ele răcoresc organismul, spală rinichii făcând urină mai multă. Semințele, mai ales cele de dovleac, sunt hrănitoare pentru că au oleiuri și mai sunt bune și în contra panglicei. Fructele *acrișoare* (acide) sunt reprezentate prin: *agrișe, căpsuni, cireșe, coacăze, fragi, gutui, lămâi, mere, pere, portocale, prune, smeură, vișine*, etc. Când sunt verzi aceste fructe au multă pectină, acizi (citric, malic, pectic, tartric, etc.) și amidon, care la coacere se schimbă în zahăr. Fructele acide, ca și cele zaharate, potolesc mai bine setea și se mistue mai ușor, dar trebuiesc luate în cantitate mică și la sfârșitul mâncării, iar nu pe nemâncate. Când se iau printre mese este bine ca odată cu ele să se mănânce și puțină pâine, pentru ca să nu irite stomacul așa tare. Ele trebuiesc mâncate, numai când sunt coapte și nici odată verzi. Fructe zaharate nu trebuiesc să mănânce cei ce sufăr de boală de zahăr (diabet), nici cei prea grași (obezi); ele sunt bune pentru convalescenți, căroră le înțește pofta de mâncare și le ușurează mistuirea. Cei bolnavi de stomac se vor feri de aceste fructe, mai ales de cele acide. Fructele mucilaginoase (pepenii, strugurii) conținând

multă apă trebuiesc luate în cantitate mică dacă nu voim să suferim de urdinare și colici intestinale. Fructele *uleioase* sunt: *alunele, migdalele și nucile* (vezi aceste cuvinte). Toate sunt bogate în uleiuri și în substanțe albuminoide. Din ele se fac uleiurile vegetale, și au o valoare alimentară însemnată.—Fructele se întrebuințează *proaspete*, sau *conservate*; cele proaspete servesc la hrană mai mult ca *condimente*, iar cele conservate intră în comparațiunile de bucătărie asociate cu grăsimi și cărnuri (caise cu carne, etc.). Din fructele proaspete sau conservate se mai prepară așa zisele compoturi (chiselite) prin fierbere, cari se mistue mai ușor. Din unele fructe se prepară băuturi fermentate: vin de pere, de mere (cidru), vin de struguri, sau unele băuturi spirtoase (kirș, etc.), din altele se prepară tizane (băuturi), siropuri și sucuri (coacăze), cireșe, fragi, smeură, lămâi, smochine, etc.) cari sunt foarte folositoare.

Fructe pectorale. — se numesc astfel patru feluri de fructe: curmale, jubube (*zizyphus vulgaris*), smochine uscate și stafide, cari se întrebuințează în cantitate egală în decoctiune (fier-tură) în doză de 50 gr. la un litru, în boalele de piept, ca domolitoare, sau calmante de tuse (vezi *Pectorale*).

Frunzișoară. — Coaja cărnoasă a semințelor arborelui *Myristica fragrans*, product vegetal aromatic de culoare galbenă, care constituie un articol important de comerț, fiind un condiment mult întrebuințat (vezi *Nucșoară*).

Frunte (lat. *frons*.) — Se numește astfel partea feței care se întinde dela sprâncene până la părul capului, iar în lături merge dela o tâmplă până la cealaltă. Se zice că o frunte bulbucată, bine dezvoltată, este un semn de mare inteligență, ceea ce nu este întotdeauna adevărat. Se înțelege dela sine că o frunte dezvoltată în mod uniform, regulat, bulbucată atât în lărgime cât și în înălțime, presupune o bună dezvoltare a creierului și prin urmare o inteligență vie, deosebită, pe câtă vreme o frunte țuguiată la mijloc și turtită în părțile laterale arată o inteligență mică, întocmai ca și o frunte turtită.—Pielea în dreptul frunții este aplicată deadreptul pe os,

ea este rar atinsă de furuncule, în schimb însă foarte des puntea de trecere dela față la cap a *brâncii*. În urma căderilor, a loviturilor mai în totdeauna se ivesc *cucui* (umflături de sânge), cari se tratează prin apăsare cu ceva tare, cum ar fi un ban mai mare și cu cârpe înmuiate în apă rece, în apă de plumb. *Înțepăturile și tăeturile* (plăgile) nu prezintă nimic particular din ceea ce se vede în celelalte părți ale capului. Semnele bătrâneței, încrețiturile și masca, se arată mai cu seamă la frunte.

Frunze. — V. Foi.

Ftizie (grec. *phthisis*, dela *phthinesthai*, a se consuma). — V. *Tuberculoză*.

Fuesină, cloridrat de rozanilină. — Substanță foarte vătămătoare prin cantitatea cea mare de acid arsenios pe care o conține. În medicină se întrebuințează în contra *albuminuriei* în doză de 5—10 ctgr. pe zi.

Fugă (lat. *fuga*), *alergare, cursă.* — Fuga este un exercițiu care pune în mișcare cel mai mare număr de mușchi și care lucrează mai mult asupra respirației și a circulațiunii sângelui; ea are multe foloase, cari însă nu se potriveșc la toate lumea. Fuga este un fel de mișcare care constă în a merge înainte printr'o serie de salturi mai mult sau mai puțin repezi. Ea se deosebește de *umblet* sau *mersul* obișnuit prin aceea că în umblet unul din picioare se află în atingere cu pământul în fiecare moment, pe câtă vreme în fugă corpul omului părăsește pământul pentru o clipă plutind în aer. Acest exercițiu nu poate fi susținut mai mult timp decât numai dacă cineva are plămâni tari și bine dezvoltati, pentru ca să conțină o bună proviziune de aer dela început și, mai cu seamă, dacă nu va respira de loc prin gură, ci *numai prin nas*. Pentru a înlesni intrarea aerului în plămâni se recomandă ca în timpul fugii să se *țină coatele lipite de corp și antebrațele îndoite* fiindcă în această poziție pieptul stă lărgit cât se poate mai mult. Fuga nu se potrivește pentru toată lumea, nu este bună pentru cei ce au respirația scurtă, cei cu palpații, cei ce au suferit sau sufer de boală de inimă, sau de plămâni. Ea este bună însă pentru cei sănătoși, cari sunt puțin

robuști și pe cari îi ajută foarte mult la întărire. La începători, la copii, la oamenii grași cari vreau să slăbească, se recomandă curse moderate, numai de câteva minute.

Fulgerătură. — V. *Epilepsie*.

Fumărică, fumăriță, fumul pământului, (*Fumaria officinalis*, fam. papaveraceelor). — Plantă erbacee, mică și delicată, care crește prin locuri nisipoase, cultivate sau deșerte. În medicină se întrebuințează ca *depurativ* (*curățitor de sânge*), mai ales când este proaspătă, culeasă în primăvară, în scrofulă și în boale de piele, sub formă de : suc (60 până la 200 gr. pe zi, în timp de 2—3 luni, sirop, 1—2 linguri pe zi la copii; ceaiu (infuziune) 20 la 1000, extract 2—10 gr. Fumărica intră și în compozițiunea vinului antiscorbutic. — La țară se clătește cu ceaiul și se ține în gură pentru *studențită*.

Fumigațiuni (lat. *fumus*, fum), *fumuri*. — În medicina babelor fumurile joacă un mare rol, mai ales cele mercuriale, cari nefiind aplicate unde trebuie și cât trebuie de multeori, în loc să vindece, iau vieța celui care s'a dat pe mâna lor. O fumigațiune constă în a îndrepta fum sau aburi asupra corpului, sau numai asupra unei părți a corpului, cu scopul de a vindeca o boală. Cele mai întrebuințate sunt fumigațiunile sulfuroase (cu pucioasă) emoliente (apă caldă, specii aromatice, enupere, etc.), mercuriale, narcotice, astringente. Fumigațiunile generale se fac cu un aparat special în formă de cutie în care stă bolnavul dezbrăcat, având numai capul afară. În acea cutie se dezvoltă fumul sau aburii trebuincioși și omul stă astfel 10—30 minute. Fumigațiile locale, adică mărginite numai la o parte a corpului se fac în modul următor : se pune într-o strachină apă fierbinte, curată sau în care s'a fiert flori de nalbă, de soc, rădăcină de nalbă mare, etc., iar bolnavul își înclină capul acoperit de un prosop, șervet sau cearșaf, deasupra strachinii, așa că aburii ce se ridică din strachină, nu se pot împrăstia prin casă și sunt aspirați de bolnav. Procedul acesta însă are un cusur că este obositor, că produce greutate la cap și congestionează fața. Cel mai bun lucru este de a te culca în pat

punând strachina lângă capătăiu și de a înveli patul cu perdele bine împreunate între ele. Se fac astfel de fumigațiuni în cazurile de guturaiu, de durere de gât, de răgușeală, de tuse, fiindcă aburii lucrează asupra nasului, a gâtului și a plămânilor în cari se duc. Afară de aceste fumigațiuni *emoliente*, mai sunt altele *excitante*, cari se fac cu aburi de apă în cari s'au pus substanțe aromatice, terbentină, etc., cari sunt ca și niște *băi de aburi*. Mai sunt încă fumigațiunile *uscate*, cari se fac fumând țigări și țigarete antiastmatice, sau arzând hârtie nitrată pucioasă, mercur, etc.

Fumuri. — V. *Fumigațiuni*.

Funicel. — V. *Crampe*.

Funigei. — V. *Acnee*.

Funinginea, (lat. *fuligo*) *stirigie, șperlă*, Product al arderii incomplete a materiilor organice, care se depune pe părțile reci ale cuptoarelor, sobelor, ale coșurilor, sub forma unei mase negre pulverulente, iar pe părțile încălzite sub formă de coji (cruste) lucitoare și compacte. Funinginea are un miros neplăcut și un gust mare; ea conține cărbune, o materie uleioasă, acid acetic și clorur de amoniac. Funinginea s'a întrebuințat ca astringent, s'a dat în contra viermilor intestinali (panglică, oxiruri), în contra spasmelor, a rachitismului, ca emenagog, apoi în alifie în contra boalelor de piele, a cheliei, în contra leucoreei (poală albă), etc.

Furfuracee (Descuamația). — Detășarea, deslipirea epidermului sub formă de foarte mici lamele, bucățele, ca de pildă în pojar.

Furnicături. — Furnicăturile sunt niște înțepături ușoare și multe; se numesc astfel fiindcă se aseamănă cu simțirea pe care ne-o dau furnicele alergând pe o parte a corpului. Dacă se întâmplă însă că furnicăturile se ivesc într-o parte a corpului la un om în vârstă mai înaintată, fără nici o lovitură sau violență externă, fără nici o atitudine anormală și prelungită, care să le poată explica și dacă ele se repetă adeseori și fără o pricină binecuvântată, în același loc, sau în aceeași parte a corpului, atunci furnicăturile au o deosebită importanță și trebuie să ne gândim la o boală gravă, cum ar fi o apoplexie.

Furnicel, buboiu (lat. *furunculus*). — Se arată pe piele sub forma unei ridi-cături ce seamănă cu un mușuroi de furnici, cu vârful ascuțit și cu baza largă, ca un con, de mărimea unui bob de porumb sau unei alune, câte odată și mai mare. Pielea este la început roșie, întinsă, lucitoare și pro-duce mâncărime, durere, de multe ori mare și cu svâcnituri, apoi pielea se albește la vârf și după 4—5 zile se sparge și se scurge un fel de materie gălbue, iar în fund se vede o materie mai tare, albicioasă și bine legată, care este inima furnicelului și care trebuie să iese afară pentru ca buboiul să se vindece. Furnicelul se datorește unui microb numit *stafilococul piogen aurii*, întocmai ca și antraxul sau serpen-geaua (v. *Antrax*), care pătrunde în piele prin orificiul unui fir de păr), producând acolo o inflamație, care se întinde repede la întreagă areola co-râspunzătoare a dermului (a pielii). Antraxul este format prin reunirea mai multor furnicele. Furnicelul dă naștere și el la căldură (fierbințeală), sete, lipsă de poftă de mâncare și lipsă de somn. Suferința este mare atunci când omul are mai multe furnicele, venite pe rând unul după altul. Bu-boaietele, de multe ori, sunt semnul unei boale și mai grave, numită *diabet*, sau boală de zahăr. Intre cauzele buboiului se numără : necurătenia, iri-tațiile locale, prezența unor insecte (păduchi, ploșnițe) sau arachnide (râie), etc. Furnicelul deși este dureros nu are nici o gravitate, atunci când este

singur ; când se află la nas, sau aproape de ochi, poate să fie primejdios din pricina complicațiilor, cari se pot ivi la creier, de aceea este bine să se deschidă furnicelul cât se poate mai iute. Locul unde se arată mai mult este gâtul și în deosebi ceafa. *Tratament.* E bine să consultăm medicul, care va determina cauza care a produs boala și atunci va prescrie medica-mentele trebuincioase. Pe *dinafară* se recomandă la început atingeri cu tinctură de iod, acid fenic, nitrat de argint, dar mai bine sunt *pulveri-zațiile* cu lichide antiseptice (acid fenic, sublimat coroziv) de 3—4 ori pe zi, iar la intervale se face pansament umed ori cataplasme boricat ; durerea, ro-șeața și umflătura se micșorează. Când s'a copt e bine să fie deschis (taiat) de doctor, căci prin operație și pan-samentele ce le va face ajută ca vin-decarea să se facă mai repede. — La *țară* buboaele nu se descântă ca alte boale. Înainte de a fi copt buboiul se pune pe el ceapă coaptă în foc, ori se presară cu cenușe de nod de funie găsit, ars în foc. Unii pun diferite monede deasupra lui, după mărimea buboiului și după ce țin banul o noapte îl aruncă în drum, crezând că găsindu-l cineva buboiul se va vindeca și va trece la cel ce a găsit banul. Se mai lecuește cu seu de oaie, cu fag, stejar, etc. Buboaietele oarbe, cari nu scot cap, sau stau vârtoase sub piele și coc cu mare greutate, se tratează cu ceapă coaptă, sau cu seu de lumâ-nare.

G

Gâfăire. — V. *Esuflare*.

Gaiac (*Guajacum officinale*, fam. ru-taceelor). — Arbore mare care crește în Antile. În medicină se întrebuin-țează lemnul de trunchiu și rășina (rezina). Principiul activ : acidul gaia-cic. Proprietăți : antigutos, antireuma-tismal, diaforetic, stimulent. Se dă pe *dinăuntru* sub formă de : decoct (fier-tură) 50 la 1000, extract 1—5 gr., praf 2—10 gr., sirop 20—60 gr., pe *dinafară* : tinctură 5—10 gr.

Galacol. — Un medicament în formă de prisme incolore cu miros aromatic.

Se topește în 53 părți apă, în alcool, eter, glicerină, și uleiuri. Se absoarbe repede prin piele și mucoase. Este mai bine tolerat de tubul digestiv decât creozotul, de altfel este și mai puțin toxic decât el. Se elimină prin rinichi. Este un bun antiseptic al căilor res-piratorii și este indicat în tuberculoza pulmonară, catarul bronhiilor, brôn-chită cronică. Ușurează tusea, diminueă sudoarea tuberculoșilor și ajută nutriția generală. Calmează durerea locală, de aceea se aplică prin badijonaj, pomezi, injecții, în dureri nevralgice, articulare

sau musculare. La adulți se dă intern : o gr. 25—1 gr., la copii o gr. 10 pe an de vârstă. *Extern* : o gr. 50—2 gr. în unsori, sau pomezi, o gr. 10—o gr. 50 în soluții uleioase pentru injecții ipodermice. O rețetă bună de uns, când ai dureri în spate (te ungi de 2 ori pe zi) este : Gaiacol 3 gr. T-ra de Iod și glicerină câte 20 gr. din fiecare.

Galactogog. — (grec. *gála*, sau *galaktós*, lapte, și *agógós*, care aduce). — Medicament care face să vie lapte la o mamă sau doică, sau care mărește cantitatea laptelui. Pentru acest scop se dă : siropul sau ceaiul de chimion, de sămânță de anason, de fenicul, de negrilică (*nigella sativa*), de ciurărea (*galega officinalis*), asociate sau nu cu cretă, cu fosfat de calce, cu magnezie. O formulă bună este : extract de galega, lactofosfat de calce, tinctură de fenicul, câte 5 gr. din fiecare, sirop simplu 200 gr. ; se iau 4—8 linguri pe zi. Se mai recomandă : ceaiu de anason (anisum pimpinella) din 30 gr. la 1000 ; se iau 12—20 linguri pe zi și pe dinafară să se pună oblojeli, tot din acest ceaiu (cârpe înmuiate în el) pe sânuri de 5—6 ori pe zi. Femeia care alăptează trebuie să se hrănească bine ; berea și ceapa ajută producerea laptelui.

Galactoree (*gála*, *galaktós*, lapte, și *rhein*, a curge). — Scurgerea prea mare de lapte în timpul, sau după încetarea alăptării, care poate să producă o slăbire din ce în ce mai mare a femeii și prin urmare o adevărată boală, care trebuie combătută cu tărie. Înainte de toate femeia va trebui să înțerce, apoi să i-se dea diaforetice (să asude), diuretice (să urineze mult), purgative (curățenii) mai ales purgative drastice (tari). Să i-se lege strâns sânurile. Se mai recomandă tinctură de iod și preparațiunile iodurate, astringentele și rezolutivele aplicate pe sânuri, ungerile de colodiu, regim tonic (hrană înțărtoare) și preparațiuni feruginoase.

Gălbeneală. — V. *Cloroză*.

Galbenă (Febră), *friguri galbene*, *vomito negro*. — Febra galbenă este o boală infecțioasă care bântue în țările calde, pe litoralul golfului Mexic și al Antilelor, în Brazilia, în Africa. Foarte rar vine în Europa, transportată cu vapoarele în Spania, în Franța,

rar în Anglia și Italia. — *Semnele* acestei boale sunt : fior urmat repede de o căldură foarte mare (40—41°), însoțită de neastâmpăr, (agitație și insomnie), sete mare, ochii roșii (injectați), fața și corpul de-asemenea, dureri dealungul șirii spinării, dureri de cap, corpul sdrobit ; apoi vărsături, la început alimentare, pe urmă lichide și bilioase (verzui) cu dureri mari în dreptul stomacului. Către a pătra zi, toate semnele acestea încetează definitiv, când avem forma *ușoară* a boalei, sau încetează numai vremelnic ; în forma *gravă* și pielea se îngălbeneste peste tot corpul, de unde și numele de *friguri galbene*. În acest moment cei mai mulți bolnavi încep să aibă vărsături negre (*vomito negro*), cari pot să coincidă cu eromagii sau curgeri de sânge în intestine și cu pete mari roșietice pe piele. *Mortalitatea* este foarte mare, putând varia între 15—20 la sută. Unii bolnavi mor în 2—4 zile. — *Cauza* adevărată nu se cunoaște exact ; tot ce se știe e că frigurile galbene se transmit la un om sănătos prin *înțepătura unui țânțar* numit *culex fasciatus* sau *stegomyia fasciata*, după ce s'a hrănit cu sânge de om bolnav de acele friguri. Perioada de incubațiune, adică timpul dela înțepătura țânțarului până la izbucnirea boalei este de 2—6 zile. Cazurile de febră galbenă transportată la depărtări mari, prin vapoare, se explică prin faptul că în ele se adăpostesc țânțari, cari au în ei otrava boalei (*virus amaril*). Toate măsurile profilactice trebuie îndreptate în contra țânțarilor cari propagă boala, despre cari noi nu ne vom ocupa, întru cât nu trăesc la noi.

Gălbinare. — V. *Icter*.

Gălbineală. — V. *Paloare*.

Gălci. — V. *Amigdale*, *Amigdalite* și la *Angină*.

Galic. (Acid). — Are însușirea de a fi *astringent*. El se găsește format gata în diferitele vegetale, mai ales în *gogoșii de ristic* (vezi aceste cuvinte). Se dă în doză de 30 ctgr. până la 1 gr. pe zi, în pilule sau poțiune.

Galvanocauter. — V. *Cautere* și *Cauterizație*.

Gambă, *gionată*. — Partea membrului inferior cuprinsă între genunchi și picior. Gamba este formată din două

GAMB

GAMB

oase : unul mai gros numit *tibia*, *fluer*, sau *furloiu* și celălalt mai subțire, așezat în partea dinafară, numit *peroneu* (vezi fig. 199). Capetele din jos ale acestor oase se încheie cu oasele dinapoi ale piciorului, formând articulația *tibio-tarsiană* sau încheietura dela *gleznă*, cu cele 2 *oușoare* laterale, unul înăuntru și celalt în afară, numite *maleole*. Gamba deasupra gleznei este foarte subțire (formând *gâtul piciorului*) și se îngroașe din ce în ce mai mult, cu cât se apropie de genunchi, unde are mulți mușchi groși cari formează *pulpa*, așa că forma generală a gambei este aceea a unui con răsturnat cu vârful în jos. Cei ce umblă mult pe jos, cei




Fig. 199. — Anatomia gambei

a = genul extern, b = solearul, c = lungul peroneu lateral, d = extensorul comun al degetelor, e = gambierul anterior, f = lungul abductor comun, g = tendonul lui Achile. 1 = genul intern, 2 = olearul, 3 = lungul abductor comun al degetelor, 4 = gambierul posterior, 5 = tendonul lui Achile, 6 = tibia (fața internă).

ce aleargă și dansează mult, au pulpele foarte desvoltate. — *Fracturile*, sau *frânturile* oaselor gambei, se văd foarte des și la orice vârstă, mai ales la bătrânețe. Ele sunt produse prin lovituri, căderi, când calci strâmb, etc. Pot fi rupte amândouă de-odată, sau numai unul; peroneul fiind mai subțire se rupe mai des. Fracturile gambei se vindecă greu, 4—6 săptămâni cel puțin, dar până să meargă omul bine îi mai trebuie încă mult. Când fracturile se însoțesc de plăgi, produse prin lovitură sau prin bucățile rupte ale osului, vindecarea se face și mai greu și de multe ori viața omului este în primejdie. Oricare ar fi întinderea fracturii semnul cel mai vădit al ei este neputința bolnavului

de a merge, sau de a se ridica, dacă a căzut pe jos și primele îngrijiri ce trebuie date sunt aceleași cari se dau în toate cazurile de fractură. Gamba are mușchi foarte puternici, cari formează *pulpa* și cari mai în jos se subțiază și se înlocuesc cu tendoane, dintre cari tendonul cel mai puternic este numit *tendonul lui Achil* și se află la partea dinapoi. Mușchii și tendoanele slujesc la îndoirea piciorului asupra gambei și a gambei asupra coapsei; cu ajutorul lor omul umblă, aleargă, fuge și sare. Câte odată aceste mișcări se micșorează sau chiar se pierd, cum se întâmplă când mușchii sunt *paralizați*, după cum se vede în diferite boale ale măduvei spinării și mai cu seamă după un atac de apoplexie. Congestia cerebrală, adică îngrămădirea sângelui la creeri, produce numai o paralizie trecătoare. Paralizia există de obicei în ambele picioare în boalele măduvei (*paraplegie*), într'un singur picior în boalele de creeri. În acești mușchi ai pulpii se ivesc cunoscuții *cârcei*, cari sunt așa de dureroși. *Loviturile* sau *contuziunile*, *tăieturile* și *înțepăturile* (plăgile), *abcesele*, *furunculele* și *brânzele* nu prezintă nimic particular la gambă. Aci se văd adeseori *varice* (lărgirea vinelor) și *ulcere* (răni), cari sunt produse și întreținute prin faptul că gamba are o rețea foarte bogată de vâne, iar sângele aci circulă mai greu prin vâne decât în alte părți (vezi *Ulcere* și *Varice*). Oasele gambei și în deosebire *tibia*, sau *fluerul*, din cauza loviturilor sau căderilor, se pot *inflama* și *căria*, mai ales la copiii scrofuloși și rachitici. Vindecarea în aceste cazuri se face cu multă greutate și îngrijire: repaus în pat, nemișcare, aplicațiuni de cataplasme și alte oblojei (Priesnitz), untură de pește, chinchină, fier, hrană bună. — *Gambă artificială*. Când dintr'o pricină oarecare se face *amputația* sau tăierea gambei, după vindecare trebuie să se pună o gambă artificială. Cel mai simplu aparat este *pilugul*, care se compune dintr'o cutie de lemn, deschisă înapoi, închisă înainte printr'o placă de piele, în care se așează genunchiul îndoit, în unghiul drept și dintr'un băț, rotunjit la capătul din jos și acoperit cu piele pentru ca să nu alunece. Pentru cei bogați

cari vreau să-și ascundă întru câțva diformitatea se fac picioare artificiale și articulate cu glezne și genunchi, cari se mișcă cu ajutorul unui resort elastic aproape ca și piciorul natural.

Gândăcei sau *gândăcei verzi*. — V. *Cantaride*.

Gândaci de frasin sau *Gândăcei de turbă*. — V. *Cantaride*.

Gângăvire. — *Gângăvirea* constă într-o greutate la vorbire și se arată sau prin repetarea unor cuvinte, ori a unor silabe, sau printr-o împiedecare totală ori momentană de a articula unele vocale sau consonante, pentru cari trebuie oarecari mișcări deosebite ale limbii. Uneori gângavul fiind de un temperament nervos se grăbește la vorbă, dar este împiedecat de repetări involuntare: bbb, ggg, ppp, ttt, etc.; alteori el vorbește încet și din când în când nu poate câteva minute să pronunțe un singur cuvânt, cu toată silința ce-și dă. Nu trebuie să confundăm gângăvirea cu *bălbăirea*, căci cel bălbăit vorbește întrerupt și cam neînțeles. Gângăvirea apare de obicei pe la 4—6 ani, merge crescând și dispare spre bătrânețe. Una din cauzele acestei infirmități sunt emoțiunile vii, cari pot face gângav pentru moment pe o persoană care nu este și a cărei sistem nervos este foarte impresionabil. Mulți devin gângavi imitând pe camarazii lor de școală. *Tratament*. Pentru a te vindeca de gângăvire trebuie să te dedai la o adevărată gimnastică de vorbă și de limbă: să citești și să declami încet, cu glas tare, pronunțând fiecare silabă, articulând cât se poate de deslușit, ținând limba pe cât se poate lipită de cerul gurii. În intervalele acestor exerciții gângavul trebuie să tacă, să nu vorbească de loc; exercițiile acestea dau limbii însușirea de a face mișcări pe cari mai înainte nu le putea face decât cu ezitare și în mod incomplet. Când un copil începe să gângăvească, părinții nu trebuie să caute să-l vindece prin muștrări și pedepse, cari în loc de bine mai mult rău fac, mărinde emoțiunile, ci prin metoda rațională descrisă mai sus. Se zice că marele orator al antichității, Demostene, s'a vindecat de acest cusur declamând pe malul mării și având petricele în gură. Nu se știe

dacă acest mijloc a mai produs vr'un orator sau ar mai fi vindecat vreun gângav.

Ganglion, *ghindură*, *modălcă*, *moșiță*. — O umflătură rotundă sau în



Fig. 200. — Sistemul vaselor limfatice

a = nodul dela umăr, b = legătura acestui sistem cu cel al venelor, d = nodul limfatic al stînghei.

forma fusului, așezată pe drumul unui vas limfatic sau a unui nerv (ganglioni limfatici și ganglioni nervoși). Ganglionii limfatici se găsesc izolați sau reușiți în grupe în diferite părți ale corpului, dar mai cu seamă la gât, la subsuori, în stînghe etc., după cum se vede pe fig. 200. În stare de sănătate acești ganglioni sunt niște ghinduri mici, puțin dezvoltate cari abia se simțesc prin piele, mai ales la persoanele grase. Dela ganglionii diferitelor regiuni pornesc o multime de vase mici, limfatice, cari se răspândesc la organul respectiv. Pe fig. 200 și 201 se pot vedea



Fig. 201. — Ganglionii axilari și vasele limfatice ce pornesc dela ei

vasele limfatice ale membrelor, cari pornesc dela grupurile ganglionare ale

axilei și regiunii inguinale. Sub influența unor turburări locale sau generale acești ganglioni pot să se mărească, să se umfle dintr'odată, sau pe încetul, să ajungă cât nucile de mari și să devină dureroși, cum se întâmplă cu ghindurile dela gât la persoanele limfatice, sau scrofuloase, pe cari poporul le mai numește și *jolne* (v. *Scrofulă*). Inflamația sau aprinderea unui ganglion limfatic se numește *adenită* (vezi acest cuvânt). — *Ganglionii nervoși* sunt așezați pe drumul nervilor și sunt formați de celule nervoase, numite *ganglionare*, cu cari tubii nervoși sunt în legătură.



Fig. 202. — Ganglionii inghinali

Gangrenă. — Înseamnă mortificarea, moartea țesuturilor unei regiuni oarecare a corpului, pe o întindere mai mică sau mai mare. Intre *cauzele* gangrenei putem cita următoarele: degenerarea, arderea, lovitura, strivirea, strângerea, compresiunea mare și de lungă durată (bandaj prea strâns, decubite, escare), turburări în circulația sângelui datorite unei infecțiuni, unei intoxicații (diabet, febră tifoidă, saturnism, alcoolism, etc.), sau o stavilă, un dop într'un vas cu sânge (*embolii* în boli de inimă sau aortite), *tromboze* în inflamația arterelor (*arterite*), în arterioscleroză, sifilis. *Semnele de gangrenă*: Gangrena se chiamă *umedă* când partea bolnavă este plină de lichide; în cazul contrar ea este *uscată*. Când gangrena ocupă un membru întreg sau toate țesăturile unui organ, ea se numește *sfacel*. Gangrena unui os se chiamă *necroză*; partea moartă se zice *escară*. Adeseori gangrena începe prin ivirea unor beșicuțe (flictene). Coloarea pielii se schimbă, la început ea este palidă, lividă, apoi cenușie și în cele din urmă neagră. În

gangrena umedă partea moartă este umflată, păstoasă, infiltrată de un lichid gros și merge spre putrezire; în gangrena uscată partea bolnavă se strânge, se întărește, se face ca o mumiă, nu se putrezește. Părțile atinse de gangrenă își pierd căldura, se răcesc din ce în ce, nu mai sunt simțitoare la pipăire, apăsare sau strângere, dar adeseori pot fi sediul unor dureri mai mult sau mai puțin mari; părțile gangrenate se mișcă cu greutate sau de loc, au un miros fetid (*puturos*), care arată putrezirea lor. Aceste semne cari se văd mai cu seamă la extremitățile membrelor, la mâni și la picioare, merg crescând în timp de mai multe zile. Coloarea se închide mai mult, răceala și nesimțirea cresc de asemenea. După această *primă perioadă* a gangrenei urmează *perioada a doua*, în timpul căreia se ivește împrejurul părții moarte un șanț roșu care o desparte de partea sănătoasă ca un fel de graniță, iar partea gangrenată pierzând orice comunicație cu restul corpului începe a se desface, se separă dela sine și după 12 până la 15 zile cade, lăsând în urma ei o rană mai mult sau mai puțin adâncă, apoi începe a se cicatriza, a se vindeca, ceea ce constituie *perioada a treia* sau cea din urmă a boalei. Sănătatea generală se turbură și ea cu atât mai mult cu cât gangrena înaintază: bolnavul are fierbințeală, lipsă de poftă de mâncare, sete, etc. cari îl slăbesc din ce în ce mai mult, în timp ce boala se întinde la țesăturile din vecinătate, atât în adâncime cât și la suprafață, nimicind un membru întreg, stricând mușchii nervii și alte organe ce întâlnește în calea sa. — **Tratament.** Gangrena în multe cazuri se poate ocoli dacă depărtăm la timp cauza. Astfel într'o boală cu zăcere lungă trebuie schimbată poziția bolnavului, punându-i sub el saltele moi, de lână, sau perini de cauciuc umflate cu apă sau cu aer. Când o legătură sau un bandaj este prea strâns trebuie să-l slăbim, îndată ce vedem că *mâna* sau *picioarul* se umflă. Când gangrena este pe punctul de a începe, trebuie să așezăm partea amenințată într'o poziție mai ridicată pentru ca circulația sângelui să se facă mai ușor, s'•

înconjurăm cu oblojeli calde pentru a întreține sau a readuce căldura naturală, s'o spălăm adeseori cu vin aromatic cu alcool camforat, cu o soluție de acid fenic sau alte lichide antiseptice. În perioada a doua vom ajuta ca partea gangrenată să se desfacă mai iute și mai cu înleznire cu ajutorul cataplazmelor dacă părțile sunt roșii și umflate. Rana rămasă după căderea gangrenei se va alege ca ori care altă rană. În tot timpul boalei trebuie să hrănim bolnavul cât se poate de bine pentru ca să-i susținem puterile, să-i dăm vin și alte lichide întăritoare (tonice). Sunt cazuri în cari scăparea bolnavului nu se poate face decât prin tăierea (amputațiunea) membrului atins de gangrenă.

Gangrena gazoasă. — Sau gangrena infectată este o gangrenă datorită unei infecții prin microbi *anaerobi*. Infecția gangrenoasă poate să se observe în cursul: febrei tifoide, febrei eruptive, paludism, diabet, în cazuri de traumatisme și răniri de război, mai ales prin schije de obuz, grante și dum-dum. Infecția gangrenoasă poate să se întâlnească și la gură (vezi *noma*), plămâni, planșul gurei (anghina lui Ludwig). Gangrena gazoasă se însoțește de un miros puturos (*fetid*) și de degajări de gaze. Aci nu ne ocupăm decât de semnele acestei infecții. Tratatamentul trebuie făcut de urgență. Fiecare clipă neglijată e un pericol pentru viața individului. În toate cazurile de răniri de război nu vom uita a face la toți răniții injecții cu ser antitetanic și seroterapie anti-gangrenoasă. Apoi curățirea rănei, pansarea cu soluție Dakin sau bulion-vaccin și deschiderea largă a plăgii.

Gardenalul sau Luminalul. — Este un medicament derivat din *veronal*. Trebuie luat numai după prescripție și sub supraveghere medicală. Dă rezultate bune mai ales în *Epilepsie*. Se dă la adulți 20—30 ctgr. pe zi în 2—3 reprize cu ceai cald.

Gargarisme (dela grec, *gargarizein*, a-și spăla gura). — Medicamente lichide cu cari ne clătim gura și fundul ei cu ajutorul mișcărilor limbii și obrazilor și prin puterea aerului care vine din răsufătoare (laringe), ținând în același timp capul plecat pe spate. După ce

ne-am spălat astfel bine gura scuipăm gargara fără a o înghiți. Nu toată lumea poate gargarisi, deși lucrul este așa de ușor; mai ales copiii până la o vârstă oarecare sunt neputincioși s'o facă și atunci ne vom mulțumi a-i atinge (badijona) în gură și în gât cu o pensulă sau cu un pământ înmuiat în medicamentul prescris de doctor. Se întâmplă uneori chiar și oamenilor mari că făcând gargară să înghită din greșeală o parte din medicamente, din această pricină trebuie întotdeauna să fim cu băgare de seamă în compunerea gargarei, ca ea să nu cuprindă lucruri cari, pătrunzând în stomac, să vatăme sănătatea. — Gargarismele sunt de mai multe feluri: *emoliente* sau *îmmoi-toare*, cari se prepară făcând să fiarbă rădăcina de nalbă în 250 gr. de apă și la care se poate adăuga și 30 gr. de miere sau miericică; dacă punem în apa care clătește și o jumătate de căpătină de mac, sau după ce a fiert o linguriță de laudan, ori 2 lingurițe de apă de laur-ceras, gargara este și mai calmantă, domolind și mai iute durerile. Laptele curat și cald, laptele în care s'au fiert smochine, laptele de migdale cu sirop de gumă, apă caldă cu sirop de gumă sunt toate bune când gura este aprinsă (inflamată) și dureroasă. — *Astringentele* se prepară din flori de trandafir fierte în 250 gr. apă în care se pune pe urmă miere de trandafir (miericică) 30 gr. sau piatră acra (alun) 4 gr., sau o lingură de oțet sau tanin 2 gr. Florile de trandafir se pot înlocui cu frunze de rug (mur) sau de nuc; acest fel de gargară se întrebuințează în aprinderile de gură și gât numai când aceste părți nu sunt prea inflăcărâte, nici prea dureroase, adică la începutul sau spre sfârșitul boalei. *Antisepticele* se prepară din acid boric 4 gr. la 100 gr. apă, sau din borax 4 gr. la 250 gr. ceai de trandafir la care se mai poate pune și 30 gr. de miericică, sau din clorat de potasă 10 gr. la 250 gr. apă caldă, la care se mai poate adăuga și 50 gr. de sirop de mure, cari toate sunt bune în inflamațiile de gingii și în durerile simple de gât (anginele catarale). Acestea sunt gargarismele cari se pot face în casă, bune în boalele de gură simple și ușoare, dar în ca-

zurile grave, serioase, se vor prescrie de doctor.

Gargarisme (Chauvin). — Soluție de timol, fenosolil, glicerină, alcool de mentă, foarte eficace în amigdalitele cronice și acute, laringite, faringite, stomatite, gingivite. Se pune o linguriță din acest dezinfectant într'un pahar cu apă și se face gargară. Se întrebuințează și ca apă de gură, având un gust plăcut și un efect nimicitor asupra microbilor cari se desvoltă în gură.

Garoafă, flori domnești, (Dianthus Carophyllus, fam. cariofilaceelor. — Plantă erbacee, originară din regiunea mediteraniană, care se cultivă mult și prin părțile noastre (Iulie-August). Se întrebuințează în medicină ca tonic, antispasmodic ușor, pentru a face un sirop care se dă în doză de 15—16 gr. — La țară se bea de gălbinare rădăcină plămădită cu țuică iar rănilor cu viermi se spală cu decoctul (fiertura) de garoafe).

Garoafe. — V. Viorea.

Gâscă. — Carnea de gâscă este grasă, grea la mistuit și prin urmare cei bolnavi, convalescenți și toți cei cu stomacul slab se vor feri de ea; tot astfel este și grăsimea de gâscă, din care pricină se întrebuințează rar. *Ficatul gras*, care se obține dacă ținem gâsca în nemișcare și la întuneric mai multe luni, în timpul cărora o îndopăm cu porumb, este foarte gustos și bun la mâncare, dar și el are păcatul că se mistue cu anevoință așa că nu se potrivește decât numai pentru un stomac tare.

Gasterină. — V. *Opoterapie*.

Gastralgie (gr. *gastier*, stomac, și *itis*, terminație care exprimă inflamație, aprindere). — V. *Stomac*.

Gastro-entero-stomie (gr. *gastér*, stomac, *enteron*, și *stoma*, gură). — Se cheamă comunicarea făcută, prin operație, între stomac și intestin, în cazurile când pilorul s'a strămtorat prea mult, din cauza unei boli oarecare și nu mai lasă alimentele să treacă din stomac în intestin.

Gastroptoză. — Lăsarea în jos a stomacului, din cauza unei dilatații prea mari.

Gastroragie (gr. *gastér*, stomac, și *rhein*, a curge). — Curgere de sânge, sau

emoragie care se face în stomac și care este urmată de vărsare de sânge sau ematemeză.

Gastrostomie (gr. *gastér*, stomac, și *stoma*, gură). — Operațiune cu ajutorul căreia se stabilește în pereții stomacului o deschizătură permanentă prin care se hrănește bolnavul, atunci când el nu se poate hrăni pe gură.

Gastrotomie (dela grec. *gastér*, stomac și *tome*, tăiere). — Operațiune care constă în a deschide stomacul pentru a scoate un corp străin.

Gât, grumaz. — Prin mijlocirea gâtului capul și prin urmare creierul comunică cu pieptul și cu restul corpului. Gâtul prin organele pe care le cuprinde are o deosebită importanță și trebuie bine cunoscut. În adevăr, gâtul este locul de trecere pentru vase sangvine (ar-




Fig. 203. — Gâtul cu mușchii și vasele sanghine

1-2 = sterno-cleido-mastoidianul, 3 = cleidohioidianul, 4 = vâna jugulară externă, 5 = vâna subclaviculară, 6 = lobul drept al corpului tiroid
b = trapezul, c = sterno-cleido-mastoidian, d = cleido hioidian

terele carotide și vânele jugulare) foarte mari și pentru mai mulți nervi foarte importanți. Afară de aceasta gâtul mai este ocupat de *laringe* (gâtleej), care este organul vocii și al respirației și de *esofag*, canalul prin care trece mâncarea din gură în stomac. Sunt unele persoane grase cari au *gâtul scurt* și *gros*, dar gâtul la oamenii groși este mai scurt numai la vedere, în realitate însă el este tot așa de lung ca la toți ceilalți și numai grăsimea cea multă, adunată în jurul gâtului, ca și pretutindenea, face să ni-se pară că gâtul lor este mai scurt. El trebuie să-și aibă toate mișcările libere, prin urmare rău fac cei ce poartă gulere tari, înalte și strâmte, cari supără circulația sângelui între creier și inimă, precum și respirația. Gâtul trebuie ferit de acțiunea aerului rece și umed, mai ales că cele mai multe răgușeli vin în urma

unei răceli. Pentru aceasta trebuie să purtăm gulere ceva mai ridicate, dar să fie destul de largi pentru ca să nu ne strângă de loc gâtul, iar la trebuință vom pune câte o basma, sau șal. Gâtul trebuie spălat în fiecare zi întocmai ca și fața, căci și el este supus la praf și la murdării fiind descoperit mai în tot timpul altfel este expus la furuncule și antrax, care se ivește de obicei în *ceafă*, așa că trebuie să ținem foarte curată această parte. Se mai ivesc la gât, mai ales la copiii scrofuloși și limfatici, *abcese*, cari trebuiesc căutate cu mare băgare de seamă. Rănile gâtului variază mult după cauzele, adâncimea și gravitatea lor. Chiar și rănirile mai ușoare trebuiesc căutate cu multă îngrijire de oarece gâtul, fiind în continuă mișcare, vindecarea se face mai cu anevoință. La gât se mai observă diferite *tumori*, între cari mai cunoscută este *gușa*.

Gât, gâtlej (lat. *fauces* și *guttur*). — Dacă ne uităm în fundul gurii la cineva vedem mai întâiu *omușorul* (lat. *uvula*, *uva*, *columella*), care este o prelungire



Fig. 204. — Boalele mai obișnuite ale nasului și gâtului

a = hipertrofia cornetelor, b = laringita,
c = vegetația adenoidă, d = amigdalita,
e = angina granuloasă.

mobilă a vălului palatin (a cerului gurii) și care, ridicându-se în momentul când înghițim, împiedică mâncarea și băuturile să pătrundă în partea dinapoi a nasului, de o parte și de alta a omușorului și ceva mai înapoi se văd două corpuri roșietice în formă de migdale, numite din

această pricină *amigdale* (vezi acest cuvânt). În fund de tot se vede un părete neted, care ține de *faringe* (înghițitoare), care este un canal prin care trece mâncarea în drumul ei spre stomac (esofag) și aerul înainte de a intra în *laringe*. Spațiul cuprins între toate acestea, care se strânge și se lărgeste după trebuință, se cheamă *gât, gâtlej*. Când cineva este bolnav de gât, ca să-l putem bine examina, trebuie să-l așezăm pe un scaun în fața ferestrii, apoi după ce a deschis bine gura cu o coadă de lingură îi apăsăm limba și ne uităm drept în fundul gurii, inspectând cu deamănuntul toate părțile de mai sus pomenite. Dacă este seară, sau întunec, vom examina gura cu o lumânare, sau cu o lampă electrică, dacă avem, îndreptând lumina în spre fundul gurii. Când pe cineva îl *doare în gât* este semn că este acolo o inflamație, (*amigdalită* (gâlci), sau *angină*). Pentru a preveni aceste boale trebuie să ne păzim de orice răceală, de curenți de aer, să nu răcim la gât mai ales când suntem asudați, să ne păzim mai cu seamă de aerul rece și umed. — Când s'a oprit în gât un *corp străin* (o bucată de os, etc.) vom căuta să vărsăm gâdilindu-ne omușorul, iar dacă corpul străin în loc să iese afară a alunecat în stomac ne vom arăta medicului.

Gât strâmb. — V. *Torticolis*.

Gatism. — Se numește astfel o stare în care bolnavul nu mai poate ține udul și materiile fecale, punându-se pe el fără voia sau știrea lui, în urma unei paralizii sau a unei turburări a inteligenței.

Gâtlej. — V. *Gât și Laringe*.

Gātuire. — V. *Asfixie și Strangulare*.

Gavaj, ghițuire, îndopare. — Hrănire cu ajutorul unei sonde introdusă în stomac, prin gură sau prin nas, la unii nebuni. În capătul sondei se pune o pâlnie prin care se toarnă lapte, zamă de carne, peptone etc. Se întrebuințează în oftică, dispepsie, cachexie, etc.

Gaz de iluminat. — V. *Iluminat*.

Gaze de luptă. — Întrebuințarea substanțelor chimice vătămătoare, ca armă de luptă, a dat o nouă dezvoltare războiului și a avut ca rezultat o categorie cu totul nouă de răniți: *gazații*. Apariția acestei noi categorii de răniți a

Fost o surpriză chiar pentru lumea medicală care nu avea informațiuni suficiente asupra cazurilor de intoxicări cu substanțe chimice și care, mai ales la început, nu a avut posibilitatea să vie efectiv în ajutorul acestor bolnavi. A fost nevoie de studii și experiențe intense, de observații atente din partea medicilor, pentru a se putea cunoaște mecanismul acțiunii acestor substanțe vătămătoare: *Gazele* de luptă. Pe măsură însă ce războiul chimic se desvolta, în aceeași măsură apăreau noi categorii de gaze de luptă și deci noi accidente care cereau de asemenea să fie cunoscute și apoi tratate. Se evaluază la 507.000 cazuri de gazări petrecute în armatele germane, franceze, engleze și americane în războiul dela 1914—18. Pentru a răspunde cu folos proporției ce o lua utilizarea acestor gaze, nu era suficient numai să se cunoască mijloacele de protecție. Accidentele vătămătoare produse trebuiau să fie cunoscute și tratate. În acest scop s'au creat servicii și laboratoare speciale care se ocupau cu cunoașterea efectelor fiziologice. Odată cunoscute, organele sanitare erau informate pentru a ști ce tratament trebuie să se dea gazaiților. Și nu numai atât, a fost nevoie ca serviciile sanitare să creeze anume secțiuni de gazaiți, conduse de medici care se ocupau exclusiv de acești bolnavi, dotate cu un personal auxiliar anume educat pentru astfel de îngrijiri. Pentru a se cunoaște mai bine felul rănilor produse de aceste gaze, ca apoi să fie tratate, gazele au fost împărțite în: — *Gaze sufocante-asfixiante* care atacă aparatul de respirație și în special părțile delicate din acest organ. Substanțele care intră în această grupă produc — în esență — arsuri datorite acizilor ce-i conțin. Se produc acolo congestii, edem (apă în plămâni), și complicații de tot felul datorite microbilor ce găsesc teren bun de dezvoltare. Toate aceste îmbolnăviri sunt cunoscute în cea mai mare parte medicilor și ele trebuiau tratate ca atare. Numai diagnosticarea acestor răni era un punct delicat. În cazurile de răni cu astfel de gaze tratamentul ușura mult starea bolnavilor și s'a ajuns ca în ultimul timp procentul de morți să fie chiar mai mic, decât față

de acela produs de celelalte arme de luptă. — *Gazele vezicante* produc în special arsuri ale pielii, însoțite de bășici și infecții în cazurile de îngrijiri insuficiente. Tratamentul acestor răni a fost destul de anevoios, pentru că nu s'au cunoscut medicamente și tratamente cari să grăbească vindecarea arsurilor ce durau săptămâni și luni. Substanțele din această categorie produc însă și altfel de răni: în stomac, plămâni, ficat, rinichi, sistem nervos, etc. Pentru fiecare din aceste răni trebuie să se cunoască tratamentul corespunzător. — *Gazele iritante* sunt de mai multe categorii: *lacrimogene*, care produce iritații la ochi, *grețoașe*, care produc greață și vărsături, *strănulătoare*, care produc strănături și diverse iritații pe nas și în restul conductelor aeriene ale aparatului respirator. Aceste gaze produc numai turburări temporare și tratamentul lor este relativ ușor. Pericolul cel mare al acestor gaze este că prin iritațiile ce le produc fac ca măștile să nu poată fi ținute pe figură. — *Gazele toxice generale* produc de obicei morți fulgerătoare. În toate aceste cazuri îngrijirile trebuiesc date imediat — în câteva minute dela accident — altfel fiind de prisos. Mai sunt și alte gaze, cum sunt gazele de explozie (oxidul de cărbune) și fumul de luptă, care deasemenea produc îmbolnăviri. În special intoxicațiile cu oxid de cărbune cer o îngrijire cu totul specială. Nu sunt excluse surprizele apariției de noi gaze, necunoscute. Toată lumea trebuie să cunoască, cât de sumar, efectele gazelor de luptă pentru a da la nevoie primele îngrijiri până la sosirea medicului, îngrijiri ce trebuiesc date imediat și care pot salva viața unui om — întocmai ca la un înecat, la un asfixiat de gaz aerian, sau la un curentat de un fir electric. — Prin urmare, îngrijirile ce trebuiesc date gazaiților trebuie să deștepte interesul tuturor și pentru aceasta este nevoie de cât mai mulți care să cunoască atât efectele gazelor cât și tratamentul lor. Numai astfel s'ar putea micșora numărul morților produse prin gazări, cu atât mai mult, cu cât accidentele se pot produce mai ales în populația civilă, mai greu de protejat. (După S. A. C. G.).

Gazoasă (Apă). — V. *Apă gazoasă*.

Gazuri delectere sau *vătămătoare*. — V. *Asfixie, Carbon, Carbonic, Canale, Delectere și Hasnale*.

Gaze intestinale, meteorism, timpanism, vânturi. — În tubul digestiv al omului se găsesc în mod natural gaze, începând dela stomac și până la sfârșitul lui, cu deosebire că în stomac ele se află în măsură mică și sunt compuse din acid carbonic, azot și oxigen, fiind formate mai mult din aerul pe care îl duce acolo măncarea, pe câtă vreme în mațele subțiri gazele sunt în măsură mai mare și variază după felul mâncărilor, ceea ce dovedește că ele rezultă din mistuire, conținând acid carbonic, azot și idrogen, care a luat locul oxigenului, iar în mațele groase, pe lângă aceste gaze, se mai adaugă acidul sulfidric, care face ca vânturile date prin șezut să aibă miros urît. — Sunt unii oameni cari fac de felul lor multe gaze, fără ca să fie bolnavi și cari îi supără foarte mult prin sgomotul pe care ele îl fac eșind; ca să nu le dea afară, pe măsura în care ele se produc, ar fi un adevărat chin pentru ei. Pentru a face cât se poate mai puține gaze trebuie să nu mâncăm legume făinoase, cum este bobul, fasolea, linte, mazărea, sau să le mâncăm zdrobite, bătute, sleite, fără pețițele lor, să mâncăm puțină pâine, să nu mâncăm prăjituri, varză, legume crude și alte lucruri cari se mistue greu, în fine, să nu bem lichide decât în cantitate foarte mică. — De cele mai multe ori producțiunea de gaze multe este un semn de boală: o aprindere sau inflamațiune de stomac (gastrită), sau de mațe (enterită); o stare nervoasă cum este în isterie, ipocondrie, gastralgie, (durere nervoasă de stomac). Această îngrămădire de gaze poate să fie durabilă, obișnuită, cum se întâmplă la cei ce sufăr de dispepsie (mistuire grea), la cei ce sufăr de constipație (încuietură), sau poate fi trecătoare după cum se întâmplă într'o simplă indigestiune (nemistuire), în febra tifoidă (lingoare), în peritonită, etc. În toate aceste cazuri de îngrămădire de gazuri pântecul se umflă, se balonează, devine tare, rezistent, elastic și sună ca o tobă când o ciocănim cu degetele (la percuție), iar

când apăsăm ușor pe pântec auzim borboroseli, cari de altfel se aud și fără să-l atingem; apoi încep dureri în mațe, colici intestinale, cari se simt în jurul buricului sau în deșerturi, însoțite de răsuflare grea, bătaie de inimă, durere de cap și altele. Pentru a combate aceste îngrămădiri de gaze trebuie păstrată dieta mai sus pomenită, apoi ca medicamente să se ia cărbune vegetal (1 lingură după fiecare mâncare), apă de var, bismut, magnezie, toate având de scop de a împuțina gazele, de a le absorbi pe măsura în care se fac, așa că pântecul nu se mai umflă. Apoi se mai recomandă ceaiurile (infuziunile) calde de anghelică, de anason, de flori de portocale, de izmă, de mușetel, de teiu, etc., luate la sfârșitul mâncării și cari au de scop de a înlezni eșirea gazelor pe jos pe măsura în care se fac.

Gelatină (dela lat. *gelare*, a îngheța). Este o substanță care rezultă din fierberea prelungită a oaselor (oseină), a cărnurilor grase (țăsut conjunctiv, cartilage, sau sgârciuri, tendoane, gelină, etc.) și care este solidă, fără culoare, sau de culoare gălbue, fără miros, solubilă în apa în clocote și din care se separă prin răcire sub formă de *piștie* (răcitură). Insușirea nutritivă a gelatinei este nulă; piștiile prin ele înșile nu hrănesc, ci numai prin carnea din ele și plac numai prin gustul lor. — În farmacie gelatina are o mare întrebuințare în prepararea capsulelor cu ajutorul cărora multe medicamente se administrează cu mare ușurință, mascându-le mirosul și gustul. — În medicină gelatina are mai multe întrebuințări: în contra emoragiilor (a curgerilor de sânge) în poțiune la care se mai adaugă sirop de izmă, sau în clistere de 40°—45°, sau în injecțiuni pe sub piele în cazurile de *aneurism*. Pe dinafară se aplică pe partea sângerândă un strat de bumbac înmuiat în gelatină. Astfel de tampoane se pot pune și în nas când curge sânge. Se mai întrebuințează în contra *mâncărimei de piele* (în blândă, etc.), în aceeași soluțiune, sau sub formă de băi gelatinoase (1000 gr. la o baie).

Gemeni (lat. *geminus, gemellus*). — Statistica ne spune că la 70 de nașteri este una de gemeni, la 6000 de

nașteri una de trei gemeni, la 150.000 una de 4. Se citează cazuri în cari s'au născut 5 gemeni. Când se nasc doi gemeni li se va da aceleași îngrijiri cari se dau și când se naște numai un copil (vezi *Nou-născuți*); același lucru se face și pentru mamă. Greutatea mare însă este în *nutrirea* gemenilor. Dacă mama este sănătoasă, de constituție bună și dacă n'a pierdut mult sânge la facere îi va alăpta dânsa pe amândoi, până când vor fi mai mari, cam pe la 6 luni, când li se va mai da și lapte de vacă cu biberonul, sau cu lingurița. Dacă însă mama este slabă, de constituție debilă, atunci cel mai bun lucru este de a le căuta o doică bună și lăptoasă, care să-i poată hrăni și crește cel puțin până la etatea de un an, putându-le da în lunile din urmă și lapte de vacă. Prin hrană bună și îngrijiri potrivite gemenii se pot dezvoltă bine.

Gene. — V. *Ochiu și Pleoape.*

Gentiana lutea. — V. *Ențură.*

Genunchiu (lat. *genu*). — Incheietura care unește coapsa cu gamba. Ea este formată de trei oase: înainte este *rotula* (oușorul genunchiului, cozonăcelul), care este un os mic și gros, cu trei colțuri rotunzite cari se simt foarte bine, dintre cari unul (vârful) privește în jos. În sus este *femurul*, care, în capătul de jos, are două umflături mari (condilii), în jos este *tibia* (flueul), care, în capătul de sus, are două suprafețe cam scobite pe cari se mișcă condilii. Aceste trei oase sunt unite între ele prin legături puternice, cari nu le dau voie să se miște decât în două direcțiuni, adică numai pentru a îndoi și întinde gamba (flexiune și extensiune). — Genunchiul nefiind acoperit decât numai de piele, orice violență exterioară, cădere, lovitură, se resimte deadreptul asupra oaselor. Când ni se întâmplă una ca aceasta îndată trebuie să ne odihnim, stând astfel până ce încetează durerea, dacă voim ca să nu se ivească ceva mai grav, vreo inflamație (aprindere) a încheieturii. Loviturile și rănilor (plăgile) superficiale ale genunchiului se tratează punând cârpe înmuiate în apă rece, în apă de plumb, sau în apă amestecată cu spirt de camfor, pe cari le prime-nim des, dar condiția de căpetenie este

să stăm în odihnă în pat. Tot astfel vom face și când lovitura a fost mai tare și am căpătat *entorză* sau *sucitură*. În cazurile și mai grave, atunci când avem a face cu o *luxație*, sau cu o *fractură* durerile sunt foarte mari. Indoitura genunchiului, care este un fel de groapă în forma unui romb, cuprinde numeroși ganglioni limfatici (ghinduri) împrăștiați într-o grămadă de grăsime și este străbătută de o arteră, o vână și mai mulți nervi importanți. *Rănilor* acestei regiuni sunt rare, dar în schimb pot fi foarte grave, căci tăindu-se vinele omul poate muri de pierdere de sânge (emoragie), sau dacă s'au tăiat nervii piciorul rămâne paralizat. Articulația genunchiului este supusă la o mulțime de boale, unele mai grele decât altele. Între acestea avem mai întâiu inflamațiunile, sau aprinderile (*artritele*), cari se pot ivi în urma unei răceli, a unui mers lung și forțat, a unui reumatism. În aceste cazuri încheietura este foarte dureroasă și de multe ori se umflă. *Reumatismul* adeseori se localizează aci, ca și *tumora albă* (*artrită tuberculoasă*), *hidrartrroză*. Din toate acestea se poate vedea că genunchiul este una din încheieturile cele mai de căpetenie, atât prin rolul ei la umblet, cât și prin boalele multe și grele cari o pot atinge.

Geoagiu. — În jud. Hunedoara. E o stațiunea balneară și climaterică. Apele acestei stațiuni sunt termale (32^o,9 C) bogate în carbonat și fer. Băi de nomol bune pentru reumatism, gută, anemie, debilitate, boli de stomac, intestine, ficat, piele, căi urinare și boli de femei.

Gerontoxon (gr. *geron*=bătrân, *toxon*=arc), *arc senil*. — Un cerc cenușiu la început, apoi alb-gălbui, care se observă la bătrâni în jurul corneei. Cercul ocupă întâi partea superioară a corneei, apoi partea inferioară, fiind așezat la marginea ei.

Gherghină, dalie, (*Dahlia variabilis*, fam. compozitelor). — În medicină nu se întrebuințează, dar la țară babele fac ceaiu de gherghină și-l dau să-l bea femeile cu scurgere și poală albă (leucoree).

Ghete. — V. *Incălțăminte.*

Ghiță. — Înăuntrul corpului nostru

căldura constantă este în termen mijlociu de 36° și organele noastre sunt obișnuite cu această temperatură, iar dacă introducem în stomac lichide reci până la 0°, digestiunea (mistuirea) nu se poate face bine. Pericolul este și mai mare când luăm printre mese ghiață și băuturi cu ghiață, căci ele lucrează deadreptul asupra pereților stomacului, iritându-i și dând naștere la dureri (crampe de stomac), la colici, la diaree, etc., deci să nu lăsăm ghiață și băuturi cu ghiață nici la masă, nici printre mese. *Înghietatele*, cari sunt preparate cu sucuri de fructe (coacăze, lămâie, smeură, etc.) sau *creme* (cu cafea, ciocolată, vanilie) înghețate, sunt și ele rele pentru sănătate ca și ghiața, dacă se iau când omului îi este prea cald, sau când corpul este asudat. Atât înghețata cât și celelalte preparate cu ghiață, sau în ghiață, trebuiesc înghițite încet și numai după ce s'au topit și încălzit în gură, dacă voim să nu ni se răcească stomacul. — Ghiața are însă o întrebuințare foarte igienică, aceea care se face la păstrarea unor alimente (vezi *Conserve alimentare*). — Cea mai bună ghiață pentru trebuințele alimentare este cea *preparată cu apă curată*, iar nu cea luată de prin bălți, de prin lacuri și de pe râurile cari trec prin orașe și care este foarte bogată în *microbi*, așa că multe boale molipsitoare se pot propaga prin ghiață, mai ales febra tifoidă, ai cărei microbi trăiesc în ghiață mult timp. De ghiața recoltată iarna nu ne vom servi decât numai pentru a răci sticlele puse în ea și pentru alte întrebuințări *externe*. În medicină ghiața are multe întrebuințări. Multe *hemoragii* pot fi oprite cu ghiață. Când cineva scuipe, sau varsă sânge cel mai bun lucru este să țină în gură bucățele mici de ghiață înghițând apa pe măsura în care se topește. Când cineva are curgere de sânge din nas (epistaxă) va trage apă răcită cu ghiață pe nări, sau poate chiar să introducă în nas o mică bucățică de ghiață, sau să pună o cârpă răcită în ghiață pe frunte. Când cineva s'a tăiat la deget va putea opri sângele punând pe rană ghiață într-o cârpă. *Vărsăturile* se opresc repede sugând bucățele de ghiață, iar în peritonită este bună ghiața atât

pe dinăuntru cât și pe dinafară (pe pânțele) aplicată în *pungi de cauciuc*, tot astfel și în *apendicită*. În diferite turburări de creeri, în *meningită*, în *congestiune cerebrală*, *apoplexie cerebrală*, *delir* și alte boale acute, ghiața este de mare folos. Afară de acestea este bună de pus pe rănilor roșii, aprinse, ca să micșoreze inflamația. Dacă amestecăm două părți de ghiață zdrobită cu o parte de sare de bucătărie și le punem amestecate într-o cârpă pe o parte a corpului, căldura scade până la 20° și partea aceea devine nesimțitoare la tăiat, așa că se pot face mici operații, fără durere, cum este o smulgere de unghie încarnată sau deschiderea unui abces.

Ghimbir, *ghimber*, *imbir*, *rădăcină de piper alb* (*Zingiber officinale* sau *Amomum officinale*, fam. zingiberaceelor). — În medicină se dă în unele cazuri de dispepsie (mistuirea grea) și de sfârșeală, sub o formă de praf, 50 ctgr. până la 2 gr., sau în pilule aceeași doză, în tinctură 2—10 gr., în ceaiu (infuziune) din 4—8 gr. rădăcină în



Fig. 205.
Gherghină

500 gr. apă. Pe dinafară în cataplasme revulzive.

Ghimpe, *ghimpe pădureț* (*Ruscus aculeatus*, fam. liliaceelor). — În totdeauna verde; el are fructul de forma unei boabe roșii cam de mărimea unei cireșe, care persistă și peste iarnă; crește prin păduri și tufișuri (Martie—Aprilie). În medicină se întrebuințează rizomul și rădăcinile, cari au însușirea de a fi amare, aperitive și diuretice. Se dă sub formă de fiertură (decoct), 30 la 1000.

Ghindă. — V. *Stejar*.

Ghindură. — V. *Ganglion*.

Gimnastică (gr. *gymnasein*, a deprinde). — Prin acest cuvânt se înțelege o totalitate de exerciții, sau deprinderi, făcute în mod metodic și rațional, cu un scop bine hotărât, de a dezvolta toate părțile corpului. Ea întărește omul și-l face să reziste la osteneală, la intemperii și la boale, perfecționează sau desăvârșește în mod

armonios corpul pentru a stabili echilibrul între activitatea fizică (trupească) și activitatea intelectuală (mentală), constituind astfel sănătatea. Prin exerciții potrivite și bine conduse toți mușchii se măresc și se întăresc, încheieturile își câștigă libertatea și agerimea mișcărilor, oasele și în special



Fig. 206. — Exercițiu făcut în clasă, pentru obținerea unui mers armonios

șira spinării se îndreaptă și își păstrează o ținută dreaptă, sângele circulează cu iuteală în toate părțile corpului, până în cele mai depărtate puncte și, trecând mai des prin plămâni, a căror funcționare este mai regulată și mai ușoară, el se încarcă cu mai mult oxigen, ceace îl pune în




Fig. 207. — Exercițiu bun pentru dezvoltarea mușchilor abdomenului

stare de a hrăni mai bine sistemul nervos. Astfel gimnastica lucrează asupra tuturor organelor și tuturor funcțiilor, având o acțiune generală întăritoare și stimulentă, din care pricină ea se recomandă ca măsură de igienă la toți copiii, aproape fără excepție, la toți tinerii și adulții slabi

de constituție. În orașe cu deosebire se simte trebuința ei căci condițiunile de aerățiune și de mișcare nu sunt ca cele dela țară. Gimnastica mărește capacitatea plămânilor, atâta pofta de mâncare și ușurează mistuirea. Ea trebuie condusă de un maestru instruit și care cunoaște bine anatomia omului și funcțiunile lui. Exercițiile se fac în casă, în aer liber, sau în săli mari și deschise mai peste tot. Mișcările vor fi potrivite după etatea, temperamentul, creșterea și forțele omului. Este foarte folositoare la copiii rachitici și scrofuloși. Ea este bună pentru cei limfatici, pentru cei nervoși și predispuși la boale nervoase, înlesnește creșterea și dezvoltarea corpului, mărește puterile celui ce o face. Gimnastica este de 2 feluri : cu *aparate* și *fără aparate*. Cea *fără aparate* constă într'o serie de mișcări raționale cari pun în lucrare toți mușchii membrelor și ai trunchiului. Mișcările trebuiesc făcute în mod cadentat, dând măsura, unu, doi, etc. cu voce tare. Pe când o mișcare s'a făcut de mai multe ori în șir, de 10—20 de ori, se execută o serie de respirațiuni adânci și tari pentru ca să între cât se poate mai mult aer în plămâni. Astfel la comanda *unu*, se ridică brațul sau brațele deasupra capului, mâna deschisă sau închisă, la comanda *doi*, se lasă pumnii la înălțimea umerilor, la comanda *trei* se lasă mâinile în jos la coapse. Apoi se duce mâna înainte și înapoi alternativ făcând o mișcare circulară. Același lucru la picior : îndoind genunchiul și ridicându-l pe cât se poate, apoi se întinde repede piciorul. Aceste mișcări de mâni și de picioare se pot face stând pe loc sau mergând, ori fugind în pas gimnastic. Trunchiul însuși se poate mișca în mod ritmic, sucindu-se la dreapta, la stânga, aplecându-se înainte, înapoi, în lături, cu mâinile întotdeauna întinse. Gimnastica cu *aparate mobile* se face întocmai ca mai sus, cu deosebire că omul ține în mâni greutatea de fier (halter), cari urmează brațele în toate mișcările, sau măciuci conice cari se manevrează alternativ sau de odată cu amândouă mâinile, sau un băț pe care îl trece când înaintea, când înapoi trunchiului. Exercițiul cu *aparate fixe* se face cu drugi (bare)

paralele, cu scări fixe, cu prăjini, cu frânghii și altele. Gimnastica fără aparate se potrivește fetelor tinere și băieților mai mici de 12 ani; făcută cu

târziu se va ajunge la haltere, la băț etc. Cel mai bun timp de făcut gimnastică este dimineața, sau înainte de amiază, nici odată după masă, în



Fig. 208.



Fig. 209.

metodă și în timp de o oră pe zi ea întărește organismul, face ca pielea să funcționeze bine, tot așa și plămânii și dă o ținută dreaptă corpului. Mai

timpul când se face mistuirea. Este bine ca pentru gimnastică să aibă omul costum special, de lână sau de bumbac, destul de larg. Pantalonii jos

Pot fi mai strâmți ca să nu se ridice ; o cingătoare de lână este bună pentru ca să susțină pânțele fără ca să-l apese și pentru ca să prevină hernia (surpătura). După gimnastică se recomandă spălarea corpului nădușit cu un burete înmuiat în apă rece, după care se va fricționa cu o pânză uscată (un prosop) sau cu o mânășă aspră ; e mai bun însă un duș rece, urmat de fricțiuni și de o plimbare iute. Pentru a termina vom spune că cel mai bun și mai igienic sistem de gimnastică este *sistemul suedez*, în care mișcările se fac încet, fără oboseală, fără efort, aducând cele mai bune foloase în dezvoltarea corpului și în armonia formelor și care se poate face de către oricare om.

Ginecologie, (gr. *gynè*, femeie, și *logos*, tratat). — Știință care tratează în mod special despre boalele de femei.

Ginecomastie sau gynecomastie, vine dela grec. *gynekon* = de femei, *mastos* = țâță). O anomalie care consistă din existența la bărbați, a unor țâțe ca ale femeii. De regulă toată înfățișarea acestor bărbați este schimbată ; corpul are mai multă asemănare cu al femeii, de cât cu al bărbatului, având, în afară de țâțe, un bazin mai larg, coapsele mai groase și rotunde, toracele mai strâmt, în fine o asemănare mare cu trupul unei femei. (Vezi fig. 210).



Fig. 210.
Ginecomastie

Gingii, *gingeni* (lat. *gingiva*). — Se numește astfel partea aceea a căptușelii sau mucoasei gurii care îmbracă marginea liberă a fălcilor (maxilarelor) și se prelungește printre dinți, de care se prinde cu putere la nivelul unirii coroanei cu rădăcina, adică la gâtul lor (v. *Dinți*). Coloarea gingiilor în stare normală este roșietică ; ea poate să devie roșie închisă, lividă, când se aprinde (se inflamează), se umflă și produce dureri. Această inflamație se

numește *gingivită*. Pentru a preveni această boală trebuie să ne spălăm des în gură cu apă fiartă (sterilizată) și dacă gingiile se rănesc ușor și sângerează, să ne spălăm cu ceai rusesc, sau cu ceaiu făcut din frunză de nuc și să le atingem cu peria înmuiată în părți egale de praf de coaje de chinchină cu clorat de potasă și cu bicarbonat de sodă. În alte cazuri gingiile în loc să fie roșietice devin *palide*, aproape albe și atunci ele ne arată că avem a face cu boala cunoscută sub numele de *anemie* (lipsă de sânge). În *scorbut*, în *diabet*, în *albuminurie* gingiile se moaie, sângerează cu înlezniire, se acopăr de fongozități, se deslipesc și se depărtează de dinți și de măsele (se desgrădinează), întocmai cum se întâmplă și atunci când se pune *piatră* pe dinți. Când se ivește pe marginea gingiilor un fel de linie, sau chenar cenușiu, trebuie să știm că este vorba de o *otrăvire cu plumb*, cum se întâmplă la tipografi și la cei ce lucrează cu acest metal. Apoi, când se ivesc pe gingii niște puncte mici albe, est un semn de *aște* sau gurar, plesne (v. *Aște*), dacă ele sunt transparente și de *mughet* (acrum, plesniță) dacă ele sunt opace și albe ca smântâna. Gingiile se pot *râni* și ele în mod accidental, pot fi rănite, tăiate, etc., producând o durere, care de obicei nu este mare și sângerând de multe ori foarte tare. În aceste cazuri sângele se oprește ușor punând o picătură două de perclorur de fier cu puțin bumbac ; ele se vindecă foarte repede. Sunt multe persoane sănătoase la cari sângerează gingiile cu mare înlezniire și foarte des ; pentru aceasta vor întrebuința perii moi și praf puțin astringent, cum este cel de chinchina.

Glande (lat. *glandula*, dela *glans*, ghindă). — Se numesc astfel niște organe cari secretă un lichid deosebit, care poate să fie vărsat pe suprafața unei mucoase, cum sunt glandele salivare, gastrice (ale stomacului), intestinale, ale ficatului, sau să fie absorbit de sânge, cum este glanda tiroidă, etc.)

Glaucum. — V. *Ochiu*.

Glezne. — V. *Gambă*.

Glicerină (gr. *glykeros*, dulce). — Este un lichid gros, siropos, fără culoare, fără miros, cu gust dulce, care

are însușirea de a disolva un mare număr de medicamente. Ea se extrage din corpurile grase prin saponificație, cu ajutorul oxidului de plumb și al apei, sau numai cu ajutorul aburilor de apă supraîncălzită. Glicerina se deosebește însă de corpurile grase din cari se scoate prin aceea că ea nu se rânzește niciodată și prin urmare ea nu irită părțile pe cari se aplică. Glicerina se întrebuințează în pansamentul rănilor de tot soiul: înțepături, sgărieturi, tăieturi, apoi la crăpături, roșeață, mâncărime de piele, eczema etc. Pe *dinăuntru* se dă ca reconstituant, tonic (întăritor), în doză de 10—20 gr. pe zi, simplă sau amestecată cu apă de mentă, cu apă cu vanilie, cu flori de portocale, etc. Este bună pentru cei ce sufăr de piept și cari nu pot lua untură de pește și la diabetici. Ea se mai dă în contra constipației (încuietării), 15—20 gr. în băutură sau în climă (1—2 linguri) sau sub formă de săpunase (supozitoare), 4 gr. la 8 gr. de unt de cacao.

Glicerofosfate. — Sunt preparațiuni de fosfate și glicerină. Cele mai întrebuințate sunt: glicerofosfatul de calciu și de fier; câte odată li se asociază glicerofosfatele de magnezie, de potasă și de sodă. Se dau pe *dinăuntru* în granule, buline, pilule sau sirop, în doză de 30 ctgr. până la 1 gr. afară de cel de fier, din care nu se dă mai mult de 30 ctgr. pe zi. În injecțiuni subcutanate (pe sub piele) 1—10 c.m.c. dintr'o soluțiune de 5 la 100.

Gliceroleu. — Medicament lichid preparat cu glicerină ca excipient; când are consistența unei alifii (unguent) se numește *glicerat*. Gliceroleul de amidon conține 10 gr. de amidon pentru 100 de glicerină.

Glicirizină. — Caută la *Lemn dulce*.

Glicoză (gr. *glykys*, dulce). — Se numește astfel „zahărul de struguri”, sau de amidon (v. *Zahăr*).

Glicozurie (gr. *glykos*, zahăr, și *ourein*, a urina). — Când se ivește zahăr în urină zicem că este glicozurie, ceea ce arată că omul suferă de o boală gravă, de *diabet*. Glicozuria poate să se ivească câte odată în mod trecător în urma unor mâncări bogate în zahăr și în feculente. Pentru a ne da bine seamă

de aceasta trebuie să facem mai de multe ori analiza urului.

Glosită (gr. *glossa*, limbă, și *itis*, terminație care arată inflamație sau aprindere). — Inflamațiunea limbii (v. *Limbă*).

Glotei (Edem al). — V. *Edem*.

Gluten (lat. *gluten*, cleiu), *albumină vegetală*, *cleiu vegetal*, *triticina*. — Este o substanță azotată cenușie, moale, foarte elastică și fără gust hotărât, care seamănă prin compozițiunea ei cu albumina din ouă și din carne și care se scoate din făina de cereale (vezi acest cuvânt). Glutenul dă făinii însușirea de a forma cu apă o pastă cleioasă, aluatul, din care se face pâinea. Făina de cereale cuprinde două lucruri de căpetenie: *amidonul*, care se găsește în alimentele feculente și *glutenul*, care este partea hrănitoare a pâinii. — Bolnavii de *diabet* nu trebuie să mănânce feculente, al căror *amidon* se transformă în corpul omului în zahăr. Pentru aceasta se fabrică *pâinea de gluten* din făina din care s'a scos amidonul prin spălarea ei cu multă apă, care îl duce cu sine, rămânând numai glutenul.

Gogoși de ristic sau *răstic*, *gale turcice*. — Se numesc astfel gogoșile formate pe ramurile tinere ale unui stejar care crește în Asia mică (*Quercus infectoria*) făcute de o insectă cunoscută sub numele de *Cynips gallae tinctoriae* din clasa himenopterelor terebrante. Gogoșile de ristic sunt rotunde, de mărimea unei cireșe, de culoare închisă sau verde, compacte și foarte grele, cuprinzând o mare cantitate de *acid galic* sau *tanin*, care le dă însușiri astringente. Ele se întrebuințează în contra emoragiilor, mai ales în contra vărsăturilor de sânge, sub formă de praf sau de pilule (hapuri) în doză de 50 ctgr. până la 1 sau 2 gr. pe zi, sau sub forma de extract. Gogoșile de ristic sunt cel mai bun antidot (contra-otravă) în contra otrăvilor cu vegetale cu alcaloide cum sunt: digitalina, morfina, strichnina, etc., dând otrăvitului să bea un ceaiu din 30—60—120 gr. în apă fierbinte. Pe dinafară se dau în gargară la durere de gât (gălci) și în prafuri pe răni cari fac puroiu mult în alifie (2 la 20 vaselină). În industrie ele se întrebuințează la fabricarea

cernelii și pentru a văpsi în cenușiu și negru.

Gonococul. — Este microbul *blenoragiei*. Are forma unui bob de fasole. Se găsește în abundență în scurgerea blenoragică. Gonococul atacă ochii dând *oftalmia blenoragică*, boală care duce la orbire dacă nu este tratată repede (v. și *Blenoragie* și *Ochiu*).

Gonoree. — Este numele care se mai dă blenoragiei învechite.

Govora. — Stațiune balneară situată la poalele munților Vâlcei, la o înălțime de 250 m. deasupra nivelului Mării Negre. Este așezată într-o poziție din cele mai încântătoare, pe un platou înconjurat de dealuri acoperite cu păduri întinse de fag, stejar și brad, fiind încinsă pe din trei părți într'un semicerc și rămânând deschisă numai în partea din spre vale, dela sud, unde se arată o frumoasă priveliște spre întinsa și roditoare vale a Oltului. Govora este una din cele mai repute stațiuni balneare din țară, prin minunatele ei ape minerale bogate în iod și puciosă. Clima este temperată, constantă și plăcută, temperatura mijlocie în timpul verii este între 16—25°C. Aerul din cauza puținei variabilități a tensiunii electrice și din pricina bogatei vegetațiuni din jur, este ozonizat, uscat, curat și răcoritor. Localitatea este ferită de curenți, n'are bălți și ape stătătoare și prin urmare este scutită de miasme și paludism. Numărul isvoarelor este de 18, dintre cari 2 sunt *cloruro-sodice-iodurate* (unul din acestea este și *fieruginos*), iar 16 *cloruro-sodice-sulfurate*. Isvorul cloruro-sodic-iodurat conține o foarte mare cantitate de iod (poate unul din cele mai bogate în iod în toate Europa). — Apele dela Govora sunt bune în diferitele manifestări reumatice, în afecțiunile nervoase, în boalele tubului digestiv, în boalele de piele (eczemă, psoriază, râie), în boalele aparatului respirator; boalele chirurgicale în boalele organelor genitale la femei (leucoree, metrită, ovarită, amenoree, dismenoree), în anemie, limfatism, scrofuloză, artritis, arterioscleroză, lepră tuberculoasă. Apele dela Govora nu sunt bune în boalele de inimă.

Granat. *iarbă amară, matricea, poala Sfintei Marii, tarhon* (*Pyrethrum parthenium*, fam. Compozitelor). — Plantă

erbacee aromatică, ce crește prin tufșurile dela poalele munților din Dobrogea, pe lângă locuințe și garduri, uneori cultivată în grădini. Lucrează ca stimulent ușor, stomachic, carminativ și în contra spasmiilor. Se dă sub formă de ulei esențial 2—6 picături în puțină infuziune 4—10 picături la 1000. Pe dinafară în fiertură și ceaiu pentru oblojeli și injecțiuni.

Granulațiuni. — V. *Ochiu* (Conjunctivită granuloasă).

Granulom. — V. *Ochiu*.

Grăsimi. — V. *Obezitate*.

Grăsime (Boală de). — V. *Obezitate*.
Grăsimi. — În alimentația omului grăsimile joacă un rol foarte mare, căci ele întrețin căldura corpului (vezi *Alimentație*). În țările friguroase se consumă grăsime multă, cu mult mai multă decât în țările calde. O alimentație grasă încetinează slăbirea pe care o cauzează boalele cronice, cum este oftica, etc., iar o alimentație lipsită de grăsime produce slăbire, de oarece omul trăiește în parte în paguba substanței sale proprii. Oamenii cari au aplecare spre îngrășare (obezitate) trebuie să nu mănânce grăsimi decât foarte puțină, pe câtă vreme cei ce-și văd corpul slăbind mereu să se silească a mânca pe cât se poată mai multă. Afară de unt și de ulei omul se hrănește cu grăsimi animale sub mai multe forme. Astfel odată cu carnea mâncăm în totdeauna și o câtime de grăsime; alteori întrebuițăm această grăsime la prepararea unor feluri de mâncare, fripturi, etc., câte odată mâncăm grăsimea în natură asociată cu pâine, etc. Grăsimea este mai bună de mâncat în timpul friguros, iarna, sau atunci când avem trebuință de a ne îngrășa, dar numai cu o condiție, adică să avem stomac bun care s'o suporte fără ca să ne producă durere, sau urdinare. Mai este o condițiune de care trebuie să ținem seamă și aceasta este ca grăsimile să fie proaspete, fără miros și fără gust de rănazeală. Nu toate grăsimile sunt de o potrivă primite de stomac: untura de gâscă este foarte



Fig. 211.— Granat

grea și indigestă, grăsimea de *oaie*, deși este mai ușoară la mistuit are un gust urât, grăsimea de *vacă* este cu mult mai ușoară și mai igienică. Grăsimea de *porc* se consumă sub formă de *slănină* și *untură*, cari sunt bune când sunt proaspete, de consistență tare, de culoare albă și nu sunt râncede.

Gravelă, *litiază* (gr. *lithos*, piatră), *nisip*. — La unii oameni se formează în rinichi și în vezică un fel de corpusculi mici granuloși, cari seamănă cu nisipul și a căror mărime este ca aceea a unei gămălii mici de ac, poate și mai mică și cari la pipăit sunt tari. Acest nisip roșu, sau *pietriș* poate să se adune și să formeze grăunțe mai mari, cari să nu mai poată trece prin țevile (ureterele) prin cari se aduce urina dela rinichi în vezică și să se oprească acolo, formând ceea ce se chiamă *calculi* (pietre). — Iată cari sunt semnele gravelei: în fiecare dimineață sau numai din când în când omul vede pe fundul vasului de noapte niște nisip roșu, pe care îl depune urina după ce s'a răcit. Acest nisip roșu, sau galben portocaliu, este format de *acidul uric* curat, sau amestecat cu *urate*; alte ori nisipul poate fi albui și atunci el este format din *fosfate* și *oxalate*. În timpul zilei bolnavul simte în dreptul rinichilor oarecare supărare, un fel de greutate sau de amorțeală, uneori un fel de arsură și câte odată durere mare, cumplită (*colică nefretică*). Aceste simțiri le are în dreptul unui rinichiu, fie în dreapta fie în stânga șirii spinării, alte ori însă le poate avea în amândouă părțile, în același timp sau pe rând. De acolo durerile pleacă înainte spre flancuri, putând merge până la buric și până în partea de jos a pântecului. Aceste dureri prin apăsare pot fi liniștite sau mărite; în tot cazul ele cresc prin exercițiu, prin umblare repede forțată, prin fugă, prin sărituri, călărie, etc. — Gravela este una din formele *artritisului* (v. acest cuvânt) și arată o încetinire în nutriție și o ardere nedeșăvârșită a rămășițelor acestei nutriții. Gravela se ivește foarte rar în copilărie, este mai deasă în vârstă adultă și cu mult mai deasă dela 50 până la 70 ani; atacă mai des pe bărbat decât pe femeie și se transmite

prin moștenire ca și guta și diabetul de cari se cam apropie. Se arată de obicei la cei mănăcioși, cari mănâncă des carne de vânat și pește, cari beau licoruri alcoolice, etc. — *Tratament*. Cei predispuși la gravelă prin moștenire trebuie să facă exercițiu potrivit după vârstă, după sănătatea și după obiceiurile lor, nu vor călări însă pentru ca să nu aibă dureri la rinichi. Se vor hrăni cu carne albă, legumi verzi, fructe lapte simplu sau tăiat cu ape minerale, vin alb tot astfel. În gravela *urică* se vor prescrie ape minerale diuretice, cum sunt cele dela *Căciulata*, etc. și ceaiuri diuretice din cozi de cireșe, mătasă de porumb, arenaria rubra; bicarbonat de sodă 2—3 gr. pe zi, carbonat de litină 50 ctgr. până la 1 gr., benzoat de sodă 30—50 ctgr., saliformină. În gravela *oxalică* se va prescrie un regim alimentar mixt și reparator. Sunt oprite: spanacul, măcrișul, pătlăgelele roșii și fructele acide ceaiul, cafeaua. Se vor da diuretice, apele minerale diuretice și ceaiurile diuretice, de cozi de cireșe, pir, paracheriță, arenaria rubra din 20 la 1000 și alcaline: bicarbonat de sodă, bicarbonat de potasă, carbonat de litină.

Graviditate (lat. *graviditas*). — V. *Sarcină*.

Greață (lat. *nausea*, grec. *nausia*, dela *naus*, vas, corabie), *scărbă*, *poftă de a vărsa*. — Este o simțire foarte supărătoare, care se însoțește de o contracțiune involuntară a mușchilor faringelui, esofagului, stomacului și părților pântecului. Ea dă naștere la o indispoziție generală care se aseamănă cu aceea care precedă vărsăturile. Greața poate să fie urmată de *vărsături*. Se observă la începutul multor boale de stomac, de creier și de măduva spinării, în urma otrăvirilor, înainte de a se ivi leșinul și înainte de răul de mare, etc. Greața se poate produce prin multe medicamente, mai ales prin acele cari au însușirea de a provoca vărsăturile. Starea de greață astfel provocată este urmată de o slăbiciune foarte mare. Pentru greața produsă de o mistuire rea (indigestie) se recomandă cu bun succes băuturile stimulente calde, ceaiu rusesc, ceaiu de mușetel sau câteva picături de spirt de mentă sau de melisă.

Grefă (gr. *graphion*, stil sau stilțel pentru scris), *grefă animală*. — Când în urma unui accident s'a luat dintr'o parte a corpului o parte mare de piele, așa că vindecarea s'ar obține greu și târziu, se face operațiunea numită *grefă animală*, care constă în a transplanta o porțiune de piele dintr'alt loc în locul despoiat de piele. Porțiunea de piele care s'a transplantat poate să rămână încă lipită de locul său printr'un colț al ei, sau poate să nu mai aibă nici o legătură cu acel loc și să fie transplantată la o depărtare mare. În acest caz pielea care se transplantează poate fi luată și dela altă persoană. — Grefa poate fi și osoasă, nu numai a pielii, sau cartilaginoasă, grăsoasă, etc., în cari cazuri luăm o bucată de os, de cartilaj, grăsime, etc., dintr'un loc și le punem în altul, pentru a repara lipsa.

Greutate la stomac. — Când mistuirea (digestiunea) se face greu simțim o greutate care ne apasă la lingurea (în epigastru), adică deasupra stomacului. Această greutate poate să fie *trecătoare* și s'o simțim numai când am mâncat mult, sau vr'o mâncare grea, sau poate să fie *obișnuită*, după orice mâncare, după cum se întâmplă la cei ce suferă de *dispepsie*. Această greutate la stomac poate să dispară dacă luăm un ceaiu cald și aromatic, de exemplu : ceaiu de ismă, de melisă, de flori sau frunze de portocale, de mușețel, etc., sau un păhăruț de un licor oarecare, rachiu de ismă, sau de flori de portocale.

Grindelia robusta. — Conține o materie rășinoasă care are însușirea de a lucra ca *antiastmatic* și ca *expectorant stimulent*. Se dă sub formă de extract fluid 10—20 picături la începutul atacului de astmă, doză care se poate repeta la fiecare oră, sau tot la două ore.

Gripă. — V. *Influență*.

Gris, grisă. — V. *Orz*.

Grog. — Vorbă englezească prin care se înțelege o băutură compusă din apă, zahăr și rachiu. Zahărul se pune în cantitate potrivită cu gustul omului, iar cătimea rachiului atarnă de vârstă și de constituție; dela una până la patru lingurițe pentru un păhar de băut; când voim ca grogul să aibă un efect mai repede și mai stimulent.

vom pune mai mult. În loc de rachiu putem pune kirș sau rom. Pentru ca băutura să fie mai plăcută mai putem pune și câteva picături de suc de lămâie. Grogul este o băutură sănătoasă, mai ales în timpul căldurilor de vară sau la culcare și se poate bea în loc de apă. Nu trebuie însă luat în cantitate prea mare, nici prea rece. În cazurile de boală grogul este bun când bolnavul se află într'o stare de slăbiciune mare, în timpul sau la sfârșitul boalelor febrile și a inflamațiunilor de lungă durată, cu condițiune însă ca sistemul nervos să nu fie prea excitat. În aceste cazuri grogul lucrează ca *tonic* (întăritor), iar dacă doza de alcool este mai mare și se ia zilnic ca *cordial*.

Gudron, catran, păcură (lat. *pix*). —

Sunt două feluri de gudron : unul numit *gudron mineral* sau *coaltar* și altul care se scoate din brad sau molift, numit *gudron vegetal*. Ne vom ocupa în acest loc numai de *gudronul vegetal*, care se obține arzând și distilând diferitele părți ale bradului și moliftului când ei nu sunt prea bătrâni pentru a da terebentină prin inciziune. Acest gudron este un lichid gros, siropos, de culoare negricioasă, cu miros tare și cu gust amar, iute și greșos. El se topește în cantitate mică în apă, pe care o vâpșește în galben. Se întrebuințează cu bun efect în boalele învechite de piele, în catarul căilor respiratoare și urinare, mai ales în bronchită (tusă) și laringită cronică, apoi în catarul beșicii udului și la ofticoși. Gudronul lucrează ca stimulent, diaforetic (produce nădușeală) și diuretic (produce ud mult. Se dă sub formă de *apă de gudron*, care se prepară vărsând apă pe gudron purificat, așezat pe fundul sau pe pereții unui vas de pământ și având grija de a primi des apa pentru ca să nu se strice. Să bea această apă de mai multe ori pe zi, printre mese sau mai bine în timpul mâncării, amestecată cu vin. Se mai dă în doză de 25—60 ctgr. pe zi sub formă de *pilule*, de *capsule*, de *bomboane*, dar toate acestea nu sunt așa bune ca apa de gudron și nu se întrebuințează decât atunci când bolnavul nu se împacă cu mirosul și gustul gudronului. *Siropul* de gudron se ia curat sau subțiat cu apă, sau într'o tiză pectorală, 2—4

linguri pe zi. În *oftică* se întrebuintează mai mult *fumigațiunile* de gudron, cari se fac în două feluri : sau la rece, punând în camera bolnavului o farfurie plină cu gudron, sau la cald, ținând la un foc încet un amestec de apă și de gudron așa că evaporațiunea se face fără ca aburii să aibă un miros prea tare din pricina fierberii. Pe *dina-țară* se dă în pomade (alifii) punând 1 parte la 3 părți de pomadă, de glicerină sau de plastore (*plastore de om sărac*).

Gumă elastică sau *Gumi elastic*. — V. *Cauciuc*.

Gume. — Sunt substanțe foarte răspândite în regnul vegetal. Ele sunt fără culoare, fără gust sau cu un gust fad, fără miros și cari, dacă se amestecă cu apă, aceasta devine mucilaginoasă, adică groasă și cleioasă. Sunt mai multe feluri : *guma arabică*, ce se scurge din coaja arborelui *acacia vera*, care crește în Arabia și Africa etiopică, de unde ne vine în grunzi, este emolientă, folositore în boale de gât, ale tubului digestiv, ale plămânilor. *Guma adragantă* sau *tragacantă* care se scurge din arbustul *Astragalus creticus*, din America, Persia, Creta, este mai bogată în principiu gumos decât cea arabică ; cu ea se prepară pastile, pilule și diferite băuturi, cari sunt calmante și bune în inflamațiile de stomac. *Guma-gută* care se scurge din arborele *Garcinia Hamburgi*, este un amestec de gumă și de rezină și este un purgativ energic, care se dă în pilule în doză de 10—50 ctgr. dar irită intestinele, producând dureri mari. Mulți din arborii noștri, cireșul, prunul, caisul, lasă să se scurgă în timpul verii o substanță gumoasă, care n'are nici o însușire vrednică de luat în seamă.

Gură. — De gură, sau mai bine zis cavitatea bucală, ne slujim la mâncare, la vorbă și câte odată la respirație, care de obicei se face prin nas. Această cavitate se împarte în două părți inegale prin *gingii*, *dinți* și *măsele* : o parte înainte de *gingii*, care este foarte strâmtă și este mărginită înainte de *buze* și înapoi de *gingii* și altă parte înapoi de *gingii*, mult mai largă, mărginită înapoi de *amigdale* și *gât*, în sus de *cerul gurii*, în jos de *limbă*, iar în lături de *obrazi*. Gura slujește la mân-

care, vorbire și uneori la *respirație*. Copilul mic (nou-născutul) suge cu ea laptele din țate, sau din biberon, prin diferite mișcări de sugere. Mai târziu gura mestecă și înmoaie cu bale (salivă) alimentele solide. Este bine ca mâncările tari să stea mai mult timp în gură înainte de a le înghiți, mai întâiu fiindcă unele din ele, cum sunt materiile feculente și zaharate, au trebuință de a fi transformate prin salivă, ceea ce este ca un fel de mistuire aproape completă, apoi fiindcă altele vor fi mistuite de stomac cu atât mai ușor cu cât au fost mai bine înmuiate cu salivă și mai mult măcinate de măsele, de limbă și de cerul gurii. De aceea este bine ca omul să mănânce încet. Gura mai slujește la vorbire, dar în articularea cuvintelor ea nu are decât un rol pasiv, de mare importanță. *Respirația* se face de obicei prin nas, fără să fie trebuință să deschidem gura, dar când avem un guturai, când nasul e cu totul infundat, atunci vrând-nevrând trebuie să deschidem gura pentru ca să respirăm, deși ni se cam usucă gâtul. *Boalele gurii*. Dela prima vedere putem constata dacă bolnavul are *buză de iepure*, sau alte boale (v. *Buze*). Culoarea dinăuntru gurii are mare importanță și este un semn al multor boale : când *gingiile*, în loc să fie roșii, sunt *palide*, albuli, este semn de *anemie*, când *buzele* sunt *vinete* este semn de *asfixie*, sau de începutul *agoniei*, când sub limbă culoarea este *galbenă* este semn de *icter* (gălbinare). *Arsurile* cu lucruri fierbinți, sau cu otravă (vitriolul, esența de oțet, acidul fenic, etc.), produc umflătura gurii cu diferite pete *cenușii*, sau *negre*. Cavitatea gurii este de multe ori *foarte roșie*, ceea ce ne arată că avem a face sau cu o *brâncă* (erizipel), cu o *febră*, sau cu o *inflamație* a gurii (*stomatită*) Cel mai bun lucru este să se facă gargară, sau atingeri locale cu un lichid : clorat de potasă 4 gr. la 100 gr. apă, cu miere de trandafiri și borax (30 la 4), etc. Când gura este *umflată* cauza poate fi un *abces* la *gingii*, o *aprinde* sau *inflamație* locală sau vreo *arsură* după cum am arătat mai sus. La mulți gura *miroase* urît, semnul mai multor boale : *carie dentară*, *gangrenă*, sau *scorbut*, sau o boală de sto-

mac, etc. In gură mai sunt *plesne* sau *aște*, *acrum* sau *mughet* apoi și diferite *răniri* din greșeală, sau cu voie, în scop de sinucidere, unele foarte înținse, cari pot produce moartea, altele fără însemnătate cum sunt *mușcăturile de limbă*, provenite din cădere sau cum se întâmplă la cei cu *boala copiilor* (epilepsie). Mai sunt și diferite *ulcerații* sau *spuzeli*, cum se întâmplă la țărani cari țin scrum de tutun în gură. Fumătorii de tutun și mai ales cei cu *pîpa* sunt supuși la îngroșarea buzei sau chiar la *cancer* în locul unde țin țeava. Unii au un *gust rău* în gură când se deșteaptă dimineața, sau câțva timp după mâncare, ceea ce este un semn de mistuire grea, anevoioasă. *Ingrijirile* ce trebuie să-i dăm : cel ce voește să-și păstreze pofta de mâncare, să aibă o mistuire ușoară și să nu miroasă gura să-și curețe gura de mai multe ori pe zi de particulele de mâncare și straturile ce se pun pe pereți. Dimineața când se scoală, înainte și după fiecare mâncare și seara când se culcă, să se spele cu apă curată, simplă sau câteva picături de spirt de mentă, să facă gargară mai multe minute, să-și curețe dinții și măselele în același timp cu o perie. Să nu ne slujim de peria altuia, ca să nu căpătăm vreo boală. Fiecare să-și aibă lucrurile proprii când este vorba de gură.

Gurar. — V. *Afte*.

Gușă. — Boală farte cunoscută la noi în părțile muntoase, unde se văd foarte mulți gușați prin sate; se observă și în județele de câmp, în satele de pe marginile râurilor. Gușa se însoțește adeseori de *cretinism*. Este o tumoră a *tiroidelor* caracterizată prin mărirea volumului acestei glande și prin anumite modificări în țesutul ei. Cauzele sunt *pre-dispozante* și *determinante*. Cele



Fig. 212. — Gușă

pre-dispozante se întâlnesc mai des la femei decât la bărbați și mai ales în timpul adolescenței, sau a sarcinei. Gușa există în mod endemic în anu-

mite regiuni muntoase. Se crede că și *ereditatea* ar avea un rol principal în apariția gușei. Copiii gușaiilor sunt foarte adesea *cretini*. Cauzele *determinante* nu sunt cunoscute. S'au emis multe ipoteze în legătură cu apa și cu un microb. Gușa este foarte periculoasă mai ales când este voluminoasă căci apasă pe trahee și nervii gâtului. *Tratatamentul* : *Tiroidă* și uneori operație. Iodul este un medicament care ajută ca gușa să se oprească în creștere, sau să dispară dacă este mică, aceasta însă nu se întâmplă totdeauna.

Gușa exoftalmică. — V. *Tiroidă*.

Gust (lat. *gustus*). — Este unul din cele cinci simțuri ale omului. Organul gustului este limba, dar nu peste tot, ci numai la rădăcina limbii simțim gustul amar, prin vârf și margini gustul dulce, acru și sărat. Limba simte gustul prin niște organe mici numite *papile*, cari la rădăcina limbii se văd foarte bine ca niște brobonele și sunt așezate în formă de V. În aceste papile se găsesc terminațiile *nervului gustativ*, în formă de mugurași ai căror pori ies la suprafață; mugurele este compus din mai multe celule nervoase, lunguețe, al căror număr corespunde cu fibrele nervului ce dă în el. Ca să se simtă gustul unui corp, trebuie ca acel corp să se topească într-o cantitate oarecare de salivă și limba să fie sănătoasă. O limbă uscată sau bolnavă nu simte gustul. Într-o gură sănătoasă dacă pui un corp gustos îndată începe să iese saliva din glandele gurii, care moaie corpul. Aceste bale se ivesc de multe ori numai la vedere și chiar numai la aducerea aminte de unele mâncări gustoase. Gustul este strâns legat de *miros* așa încât multe lucruri sau mâncări, își pierd gustul când îți astupi nasul în timpul masticăției, sau când ai guturaiu, care micșorează sau nimicește de tot gustul. Când gura și limba sunt uscate în urma unei boale, o febră sau o inflamațiune oarecare, când limba este acoperită de un strat gros, gălbui, sabural, orice vom mânca ni se pare rău, fără gust, chiar greșos. Gustul este *acid* în cazurile de dispepsie de acreli de stomac, de inflamațiune de stomac și de mațe, așa că tot ce mâncăm ni

se pare acru. Gustul este amar când fierea fabricată de ficat este în câtime prea mare, în loc să meargă în jos se urcă în stomac și până în gură și atunci toate lucrurile ni se par amare cum se întâmplă și în *icter* (gălbinare). Gustul este dulce la cei ce lucrează cu plumb și se otrăvesc încet cu acel metal și la diabetici este urât, greșos, fetid, la persoanele cari au dinți și măsele stricate, la cei ce nu-și spală gura după mâncare, la cei ce sufăr de stomac, este sărat la cei ce sufăr de piept, la ofticoși. Prin urmare ori de câte ori gustul s'a schimbat, sau simțim un gust neobișnuit, fără să fi băut sau mâncat ceva, sau găsim că mâncările și băuturile au alt gust decât cel știut, trebuie să ne gândim la o turburare a sănătății vremelnice sau durabilă—Pentru a păstra gustul trebuie întreținută gura în stare bună, să nu abuzăm de tutun, de băuturi alcoolice, de condimente iuți, acre, etc., să avem o hrană potrivită după etate, sex, climă și diferitele boale, să evităm toate cauzele de boale cari scad gustul. Vom întrebuința numai apa de băut, care spală limba și păstrează simțirea gusturilor.

Guster. — V. *Crup.*

Gută. *podagră* (gr. *podos*, picior, și *agra*, pradă). — Guta este una din principalele manifestări ale diatezei artritice. Se arată la articulațiuni ca și reumatismul, de care se deosebește prin aceea că ea foarte adeseori se moștenește, se ivește mai des la bărbați și este produsă de traiu bun, hrană prea substanțială, bere, vin și alte băuturi alcoolice. Atacă la început una, sau mai multe încheieturi mici, mai ales acele ale degetului mare dela picior, producând o durere mare și fierbințeală (febră) moderată, care revine prin accese periodice, formând un atac care ține 8—10 zile; produce la încheieturile mânilor și picioarelor, precum și la urechi, niște umflături sau noduri tari, pietroase (calcare), puțin dureroase dar foarte supărătoare. — Guta începe de obicei prin turburări de stomac (dispepsie) sau mistuire grea, durere de cap, semne cari durează până într-o noapte când izbucnește *atacul de gută* (cam între miezul nopții și ceasurile 3), când bolnavul se deșteaptă

printr'o durere foarte vie în dreptul încheieturii dela rădăcina degetului mare dela picior, mai rar la glesne. Durerea se mărește la cea mai mică atingere sau mișcare, încât devine de nesuferit și se poate întinde la tot piciorul și la gambă. Pielea degetului mare devine roșie și lucitoare, toată partea aceea se umflă, bolnavul are fața congestionată, durere de cap, fiori, căldură de 40° și udul roșu. Spre ziuă durerea scade și în timpul zilei toate semnele scad, până spre seară când toate semnele se ivesc din nou cu aceeași furie și așa se urmează mai multe zile de arândul (3—8 zile), în care timp bolnavul are sete mare, lipsă totală de poftă de mâncare și constipație, udul rar și închis. După ce s'a terminat *atacul*, încheietura își revine la starea de mai înainte și bolnavul se simte parcă mai bine decât înainte. Atacurile cari urmează se aseamănă cu cel dintâiu, dar pot să se deosebească prin năvălirea mai multor încheieturi mici dela picior sau chiar a încheieturilor mai mari. Ele pot fi constituite din mai multe atacuri mici succesive întrerupte prin câteva zile de odihnă. Atacul de gută rar este unic, de obicei un alt atac se ivește după mai mulți ani. Primele atacuri se ivesc iarna, mai târziu primăvara sau la începutul toamnei. Astfel este gută așa zisă *acută*, inflamatoare, regulată. Această formă poate să sfârșească prin forma *cronică*, în care există dureri la încheieturi mai mult sau mai puțin vii într'o mare parte a anului. Picioarele, genunchii, mâinile sunt deformate de mici umflături (tofus) de mărime variabilă, dela aceea a unui bob până la aceea a unei nuci, formate prin săruri de urat de sodă, de urat și fosfat de calce, cari se depun sub piele, sau chiar în grosimea pielei după fiecare acces. Bolnavii cu gută cronică slăbesc repede din pricina turburărilor digestive cari însoțesc această formă sau din pricina complicațiunilor cari se pot ivi la inimă, rinichi). Mai este o formă de gută numită *anormală viscerală*, în care boala este constituită prin diferite accidente cari pot să se producă în cursul unui atac de gută: dureri sau crampe de stomac sau de mâțe, cu vărsături cari nu se pot opri,

convulsii, atac de apoplexie, palpitațiuni, angină de piept, leșin.—Cauzele gutei sunt cele ale *artritisului*: se datorește mai cu seamă existenței în cantitate prea mare a acidului uric prin distrucțiunea incompletă a materiilor organice, sau prin formarea excesivă a acestor materii.—*Tratament*: Hrană cumpătată și regulată compusă din legume, fructe, carne albă, de pasăre, foarte rar carne roșie, puține ouă, pește și grăsimi; oprit vânatul și scoicile (raci, stridii, midii, etc.), legumele proaspete afară de măcriș, spanac, pătlăgele, trufe, ciuperci; puține feculente și pâine; fructele toate, mai cu seamă strugurii, fragile. Oprită berea, licorurile și alte băuturi spirtoase; Tratamentul gutei *acute* constă în: preparatele de colchic (brândușa de toamnă), antipirină, salicilat de sodă, băuturi abundente, repaus complet în pat, învelirea încheieturii bolnave cu vată sau flanelă stropită cu uleiul de mușetel camforat, uleiul de terbențină. Ca tratament preventiv și curativ, se recomandă: cura de struguri, ape minerale la Căciulata. Pentru guta *cronică* se recomandă săruri de litină, benzoatul sau iodurul de litină; piperezina, iodată, bicarbonat de sodă.

Gutapercă. — Substanță ce se aseamănă cu cauciucul, formată prin întărirea sucului lăptos care se scurge prin tăieturile făcute în coaja arborelui *Isonandra gutta*. În stare curată gutaperca este galbenă deschisă, translucidă, impermeabilă. Uscată și tare la temperatura ordinară, ea devine flexibilă și rezistentă la căldură, se lipește tare de degete. Ea nu se topește în apă rece, dar în apă fierbinte devine moale, maleabilă, putându-i-se da forma voită pe care o păstrează răcindu-se și devine foarte tare, care stare poate dura la infinit. Se întrebuințează la facerea bandajelor ortopedice, la facerea aparatelor pentru

fracturi, etc. În bucăți mai mult sau mai puțin mari, gutaperca cea moale și subțire ca hârtia se întrebuințează la facerea pansamentelor umede (Prisnitz).

Gutieră, sghiab, uluc. — Aparat de sârmă căptușit pe dinăuntru cu vată, sau iută, acoperită cu o cârpă sau cu un șervet, care se întrebuințează în cazurile de fracturi (rupturi de oase) pentru a ține în nemişcare toată partea bolnavă. Gutierile au diferite forme și mărimi după cum este și partea bolnavă; cotite pentru membrele superioare, drepte pentru cele inferioare, iar pentru fractura șirii spinării, sau în boalele șoldului, trebuie să recurgem la marea gutieră a lui Bonnet.



Fig. 213. — Gutieră de sârmă

Gutui. — Se întrebuințează în medicină pentru acțiunea sa astrigentă. Se pune în băuturile contra diareei pentru a le da un gust plăcut. — La țară ceaiul de gutui cu puțin zahăr se bea pentru tusă și răgușeală. Zeamă de frunze de gutui, curpân de castroave și vermari (un fel de buruiănă) pisate toate la un loc, se stoarce în rănilile cu viermi.

Gutunar, guturaiu. — V. *Coriză*.
Cynocardia odorata, chaulmoogra. — Se întrebuințează semințele. Principiul activ este acidul ginocardic și palmitic. Se dă în boalele de piele, în lepră, sub formă de *ulei* de ginocardia sau de chaulmoogra, 5—30 picături (în capsule). Pe dinafară se aplică sub formă de plastore. Se întrebuințează și în boala de ochi numită trachom.

H

Haitiș (franț. *bancal*). — Se zice de omul care are picioare strâmbe, adică genuchii apropiați și gambele cu glesnele depărtate, că este *haitiș*. Această

diformitate se observă la copiii debili și rachitici. Când este foarte pronunțată, mersul se face cu greutate și omul își freacă genuchii cari se sgârie și

se rănesc. Această diformitate trebuie îndreptată cu aparate, ceea ce se face pe încetul. Chirurgical însă printr'o operație potrivită o poate îndrepta mai iute. S'a observat că această diformitate vine și din pricină că copiii sunt rău înfășați mai ales la țară, unde româncele strâng cu fașa prea tare genunchii copilului, de aceea este bine ca înfășurarea să se facă cu cea mai mare băgare de seamă, lăsându-se genunchii și picioarele cât se poate de slobode.

Halocalciu. — Este un preparat al clorurei de calciu, cu un gust plăcut și puțin aromatizat. Se dă în toate stările cari necesită administrarea sărurilor de calciu (debilitate, pretuberculoză, tuberculoză, sarcină). Adulții iau 4—5 lingurițe pe zi, copiii sub 12 ani jumătate din această doză. Granulele se sfarmă în gură, sau se amestecă cu apă.

Hamamelis virginica (fam. saxifragaceelor). — Arbore mic ce crește în America de Nord, cu deosebire în Virginia și în Japonia. Se întrebuințează coaja și frunzele proaspete, având însușirea de a opri sângele (emostatic). Se dă și în contra trânturilor (emorozilor), sub formă de: extract fluid până la 20 gr. extract uscat 5—15 ctgr., tinctură ($\frac{1}{2}$) 2—6 gr. Pe dinafară în alifie (1 parte tinctură la 10 părți vaselină sau untură de porc).

Hameiu hemeiu (*Humulus lupulus*, fam. ulmaceelor). — Plantă erbacee care crește prin lunci, prin crânguri și păduri, pe garduri și cultivată pentru uzul industrial și economic. Mai toate părțile inflorescenței femele ale acestei plante sunt acoperite cu peri glanduloși, cari secretă o substanță aromatică și amară numită *lupulină*, pentru care hameiul se întrebuințează la fabricarea *berii*. Tot din cauza lupulinei hameiul se întrebuințează în medicină ca amar, tonic, în contra scorbutului, în contra scrofulei și în contra dispepsiei ca narcotic și sedativ. Vârfurile tinere de hameiu gătite sunt bune de mâncat. Florile de hameiu (conurile) se întrebuințează sub formă de ceai sau de fiertură (decoct), 15—30 gr. la un litru de apă. În medicină se mai dă hameiul sub formă de extract, 30 ctgr. până la 2 gr., de sirop 30—100 rame, iar *lupulina* 50 ctgr. până la

2 gr. — La țară din foi și flori se fac cataplasme potolitoare de dureri. Florile de hameiu (conurile) adunate toamna sunt bune de umplut saltelele pe cari se culcă cei ce nu pot dormi (în contra insomniei). O mână de flori fierte într'o litră de apă, strecurate și îndulcite cu zahăr, este o băutură folositoare la sculamentul (blenoragie), calmând durerile din timpul nopții, înlesnind urinarea și domolind erecțiunile.

Hangu. — Localitate de vilegiatură la poalele Ceahlăului, situată la o înălțime de 370 metri. La o depărtare de 4 Km. de Durău. Sunt două izvoare minerale, unul alcalin fieruginos forte, al doilea mai slab. Nu se exploatează.

Hap. — V. *Pilulă*.

Hârtie. — Ne vom ocupa de *hârtiile medicinale*. 1. *Hârtia antispasmodică* conține nitrat de potasă, beladonă, digitală, stramoniu (ciumăfaie), pheilandriu (mărăraș) și miră. Această hârtie se aprinde și arde în jurul bolnavului, care respirându-i aburii se ușurează. 2. *Hârtia nitrată* ordinară este hârtie înmuiată în soluție de nitrat de potasă; ea se întrebuințează ca cea de mai sus și este bună în astmă, când se ușurează acelese. 3. *Hârtia chimică* este un fel de sparadrap făcut cu unt de lemn, unt de in, ceară galbenă, esență de terbenină, usturoiu pisat, ceruză și miniu. Ea stimulează pielea și se pune pe piept în caz de tusă, pe o încheietură dureroasă sau pe un punct nevralgic. Această hârtie se mai numește și *hârtia Fayard*. — *Hârtiile* se întrebuințează pentru a câptuși pe dinăuntru păreții locuințelor. Igiena cere ca aceste hârtii să fie colorate cu *substanțe nevătămătoare*, iar nu cu preparațiuni de *arsenic*, sau de *plumb*, cari sunt foarte otrăvitoare dacă le ducem la gură cu degetele cu cari am atins hârtia astfel colorată, sau dacă respirăm aerul care cuprinde praful ce s'a ridicat de pe această hârtie.

Hașiș. — Este o preparațiune din frunzele *cânepei de India* numită *Cannabis indica*, ce are însușirea de a fi amețitoare, excitantă și narcotică în același timp, însușire datorită principiului numit: *hașișină* sau *canabină*.

Se întrebuințează în contra *astmei*, a *isteriei*, a *sughiiului*, în *catarul* bătrânilor și în *delirium tremens* în doză de 5—10 gr., sau sub formă de tinctură ($\frac{1}{2}$), 10—15 picături. Popoarele orientale (în Turcia, Egipt și chiar în Algeria) fumează și mestecă în gură mult hașis, lucru foarte periculos căci acest abuz pe mulți îi slăbește, îi tâmpește și poate să-i ducă până la nebunie.

Hasnale. — În orașele unde nu există *canale*, materiile fecale din latrină cad în *hasna*. Hasnalele pot fi: *mobile* sau *stabile* (fixe). Cel mai bun sistem pentru depărtarea excrementelor sunt *hasnalele mobile*, cari sunt niște lăzi sau butoaie impermeabile, nu prea mari pentru ca, să se poată transporta cu înleznire, cari comunică printr'un ventil cu tubul prin care trec materiile fecale. Aceste butoaie, după ce s'au umplut, sunt duse afară din oraș, unde se deșartă și se spală. Fiecare locuință trebuie să aibă mai multe hasnale mobile pentru ca să se pună îndată cele curate în locul celor pline. O hasna trebuie să aibă trei deschizături: una prin care comunică deadreptul cu țeava pe unde trec excrementele, alta prin care iese o țeavă mai subțire pentru eșirea gazelor și care merge afară la acoperișul casei, sau într'un coș, iar a treia deschizătură slujește pentru scoaterea materiilor fecale și trebuie să fie de 3 ori mai mare decât grosimea unui om, ea se închide printr'un capac. Deșertarea hasnalelor fixe (stabilite) precum și transportarea hasnalelor mobile trebuie să se facă numai în timpul nopții.—S'au inventat diferite *aparate* cari să *separe* materiile solide de cele lichide; excrementele solide rămân în hasna până la deșertarea lor, iar urina trece îndată din hasna în canale. Dar acest sistem nu se poate pune în practică decât acolo unde este canalizare, iar canalele să aibă o înclinațiune (pantă) suficientă și apă în abundență pentru a fi mereu curățite și spălate. Astfel acest sistem expune mai puțin la pericolul ce rezultă din descompunerea materiilor prin producerea de gaze vătămătoare amoniacul și gazul sulfidric, etc. Pericolul există atât pentru locuitorii casei, când gazele intră în coridoare și camere (vezi *Latrină*),

cât și pentru cei ce deșartă hasnalele cari pot fi asfixiați. Câte odată asfixia și moartea vin repede ca și cum cel ce deșartă hasnaua (*hăsnătarul*) ar fi lovit de trăsnet, alteori el simte o durere la stomac, o strângere de gât, greutate la cap, sfârșeală, greață, aiurare, spazme până ce-i încetează respirația. În astfel de cazuri omul trebuie scos la aer liber, stropindu-l pe față și pe tot corpul cu apă rece și cu oțet și făcându-i fricțiuni cu cârpe uscate și aspre, iar când și-a revenit în fire să i-se dea să verse câteva linguri de untdelemn, urmate de un mic păhăruț de rachiu, sau să i-se dea *emetice*, apoi apă de melisă și alte licoriuri spirtoase. Hasnalele trebuie din când în când desinfectate cu ajutorul unor substanțe cari lucrează repede și energic și cari să nu coste prea mult, cum este *sulfatul de fier* sau, cum se chiamă în comerț, *calaican verde* ori *vitriol verde* topit în apă, iar când se deșartă hasnaua, pentru ca să nu miroase prea tare și mirosul să nu se răspândească prea departe, este bine ca să se pună peste materiile fecale niște praf de cărbune sau mangal.

Hebefrenie. — Este una din formele *demenței* precoce. Este starea patologică psihică și mintală pe care autorii de odinioară o denumiau „*demență* precoce constituțională a pubertății”.

Hebetudine (lat. *hebetudo*, dela *hebetere*, a tâmpi), *tâmpeală*, *tâmpire*. — O stare de toropeală în care bolnavul este cufundat într'o amortire generală și pare a fi nedestoinic de orice lucrare voluntară. Fața lui are un aer de uimire, sau de nepăsare; ochii lui sunt în nemișcare, deschiși sau pe jumătate închiși. Nu răspunde la întrebări, sau răspunde foarte încet, uneori numai prin semne, de altfel își păstrează cunoștința, aude ceea ce vorbește în jurul lui. Uneori această stare este trecătoare și dispare repede, după cum se întâmplă în unele lovituri asupra capului, sau în durerea de cap cunoscută sub numele de *migrenă*, este deajuns pentru ca ea să dispară un repaus absolut, în pat sau pe un fotoliu, într'o cameră întunecată și aerată, câteva cârpe înmuiate în apă rece pe cap. Alteori starea de hebetudine poate să țină mai mult timp,

după cum se întâmplă în febra tifoidă, când durează cât și boala, până ce bolnavul intră în convalescență. Câte odată ea este începutul unei boale grele de creeri, sau este imoiera creerilor, sau apoplexia cerebrală. Mai poate fi semnul unei forme de nebunie (ipochondria, melancolia).

Hectică. — V. *Tuberculoza*.

Hedonal. — Metil-propil-carbinol. Lucrează ca ipnotic în insomniile ușoare, în urma boalelor organice sau funcționale ale sistemului nervos, în neurastenii. *Doză:* 1—3 gr. deodată, în soluțiune idro-alcoolică, sau în buline de câte 50 ctgr.

Heleșteu. — V. *Mlaștină*.

Helioterapie (gr. *helios*=soare). — Este aplicarea puterii fizice și chimice a soarelui în tratamentul anumitor boli și stări, dar mai ales în diferitele forme ale tuberculozei. Lumina solară are o foarte bună acțiune asupra ființelor vii. Este microbicidă, cicatrizantă, resolutivă, analgezică, grăbește schimbările nutritive și stimulează starea generală, mărește numărul globulelor roșii din sânge. Helioterapia se poate face oriunde, dar se recomandă a se face la marginea Mării (cum ar fi la noi la Mamaia, Constanța și Balcic) sau la munte. Lumina solară trebuie să cadă direct pe pielea omului. Helioterapia trebuie să fie *totală*, să acționeze asupra întregului organism. Cura trebuie supravegheată, căci făcută fără socoteală poate da naștere la accidente importante. Local, din cauza acțiunii prelungite a razelor solare, pielea suferă, se face un eritem, care jenează și chiar produce dureri. În cazurile acestea se va întrerupe cura câteva zile, se va unge pielea cu vaselină și se va reîncepe cu prudență; ședințele vor fi scurte. Uneori pielea se ulcerază și atunci trebuie pansată cu vaselină boricată, sau zincată și ferită de infecții. Cura trebuie făcută progresiv. Ședințele prime vor fi de 5 minute maximum, altminteri apar accidente generale ca: ridicarea temperaturii corpului, accelerarea pulsului și a ritmului respirator, oboseală, amețală, diaree. Apoi ședințele se prelungesc cu câte 5 minute în fiecare din zilele următoare și astfel ajungem în 10—12 zile să stăm cu tot corpul la soare ore în-

tregi, fără să suferim vreun neajuns. — **Contraindicații:** febră continuă și mare din cauza unei infecții generale. Bolnavul trebuie să fie în aer liber și cu capul apărat de acțiunea soarelui. Cura de soare nu se va face cu o oră înainte de masă și o oră după. În nici un caz când termometrul arată afară mai puțin de 3⁰ și mai mult de 40⁰—50⁰. Helioterapia este admirabilă în tuberculoza pielii și mucoaselor, a ganglionilor, a oaselor și încheeturilor mai ales Tuberculoza plămânilor și ganglionilor traheo-bronșici trebuie cu multă băgare de seamă supusă acțiunii puterii razelor solare. Tuberculozii pulmonari cu febră și hemoptizii nu vor face helioterapie. În multe cazuri de tuberculoză genitală la bărbat, helioterapia dă rezultate frumoase. Acțiunea soarelui este atât de bine făcătoare asupra organismului, în cât nu putem recomanda îndeajuns tuturor să stea în aer și soare cât mai mult. Copiii în special cresc, se îngrășă și se înviorază văzând cu ochii, după o cură de soare, și din contră, întocmai ca florile, copiii se ofilesc și slăbesc, dacă îi ținem ascunși de soare.

Helminți (gr. *helmins*, vierme). — Se numesc astfel *viermii intestinali*, cari se mai zic și *entozaori*. — v. *Limbrici*, *Oxiuri* și *Tenia*.

Helmitol. — Combinația urotropinei cu acidul anhidrometilen-citric. Diuretic, antiseptic. *Doză:* 3—4 gr. pe zi în soluțiune în apă.

Hematozoarul lui Laveran. — V. *Paludism*.

Hematurie. — V. *Ematurie*.

Hemeralopie (gr. *himera*=zi, *opș*=ochi). — Stare în care vederea, normală la lumina solară, devine anormală la crepuscul, sau când este o lumină slabă artificială. În general acești bolnavi văd bine ziua și rău, sau uneori deloc, în timpul nopții. Se arată la persoanele rău hrănite, din alimentația cărora lipsesc vitaminele și cu deosebire pe Mări și în răsboaie, când oamenii sunt lipsiți de alimente proaspete. Miopii de asemenea au o vedere rea în timpul nopții.

Hemianestezie. — V. *Emianestezie*.

Hemicranie. — V. *Migrenă*.

Hemiopie. — V. *Emiopia*.

Hemiplegie. — V. *Emiplegie*.

Hemofilie. — Este o boală familială și ereditară. Este foarte periculoasă și constă într-o predispoziție la emoragii abundente și dificile de oprit, chiar când rana este mică și foarte superficială. Cauza ar fi întârzierea coagulării sângelui, din lipsa unui ferment coagulant din sânge, care se numește trombokinază. *Tratament:* Injecții cu soluție peptonală 5%, de clorură de calciu 20 cgr. pe zi și pe an de vârstă, cură de aer la țară.

Hemoglobină. — V. *Emoglobină*.

Hemoptizie. — V. *Emoptizie*.

Hemoragie. — V. *Emorație*.

Hemoroizi. — V. *Emoroizi*.

Hemostază, hemostatice. — V. *Emostază*.

Hemostil. — Este un ser de cal mult întrebuințat azi în cazurile de anemii și mai ales în acelea cari sunt pricinuite de pierderi de sânge. Acest ser se culege dela cai cari au fost supuși la mai multe sângerări consecutive; din sângele unui asemenea cal se separă serul și acesta, pregătit cu un sirop oarecare, formează siropul hemostil, cel mai întrebuințat dintre formele sub cari se ia hemostilul. Din acest sirop se dau 2—3 lingurițe pe zi copiilor și 2—3 linguri adulților, într'un pahar cu apă. Produce o bună poftă de mâncare, o înmulțire a globulelor roșii din sânge și o îngrășare a persoanei care-l ia. Cura se face cam 18—20 zile dea rândul. Cu serul, așa cum se recoltează dela cal, sterilizat, se fac injecții în cazuri de emoragii.

Hepatită. — Inflamația ficatului.

Herculane (Băile). — Una din cele mai importante stațiuni cu apă minerală sulfată. E așezată în sudul Banatului românesc pe linia ferată principală Timișoara—București, la 28 Klm. departe de Orșova și 7 Klm. de Mehadia. Altitudinea 168 m. Băile herculane sunt cunoscute încă de pe timpul împăratului Traian și aci era locul de întâlnire a aristocraților romani. Azi a ajuns o foarte reputată stațiune balneară dela noi și din Europa. Regiunea în care se află aceste băi e pitorească, apărată de crestele și masivul păduros al Carpaților, parfumată de brădetul bogat, cu aer purificat și ozonizat, face ca această stațiune balneară, să fie căutată și ca

stațiune climaterică. E adăpostită de vânt, are o climă temperată și plăcută, confort și în plus 17 izvoare dintre cari numai 8 întrebuințabile. Afară de izvorul Hercule care este de categoria izvoarelor cloruro-sodice *termale*, celelalte sunt sulfuroase termale naturale. Temperatura variază între 37° și 56° Celsius. Sezonul durează dela 1 Mai—15 Octombrie. Băile termale sulfuroase dela Herculane se recomandă în bolile de femei: *amenoree, dismenoree, uretritile, vaginitele* cronice, *parametritele* cronice, *salpingitele, ovaritele, sterilitate, în sifilis, în reumatism, în boli cronice de piele, în paralizii, în intoxicații cu mercur și plumb în boli de oase, în catare vechi ale aparatului respirator, în cazuri de lipsă de bilă, în turburări de circulație ale organelor din pânze (ficat, splină, stomac) (vezi toate aceste cuvinte subliniate). Nu se recomandă aceste băi tuberculoșilor, (în grad înaintat), anemicilor, cei cu arterioscleroză, nervoșilor, boli acute ale pielei, boli cu febră și hemoragii, gravidelor, sau celor cari au avortat.*

Hermafrodisism. — V. *Ermafrodism*.

Hernie. — V. *Ernie*.

Heroină (Clorhydrat de). — Are acțiune remarcabilă calmantă asupra tusei (bronșite, faringite, laringite, catar pulmonar); bună în combaterea emoptiziilor, insomnie nervoasă, tusă convulsivă, influență, în durerile datorite cancerului, orhită, sciatică, scleroza în plăci, crize gastrice tabetice, anevrism al aortei, neurastenii. Bun anafrodisiac. Doza maximă în 24 ore 0.02 cgr. Doza simplă 0 gr. 005 repetată de 2—3 ori pe zi (pentru adult). La soluțiile de heroină nu se adaugă nici o substanță alcalină.

Herpes. — V. *Erpes*.

Herxheimer (Reacția lui). — Când într'un caz de sifilis secundar, cu rozeolă, facem injecție cu neosalvarsan și acea rozeolă se accentuează, atunci zicem că e vorba de reacția lui Herxheimer.

Hialin (gr. *hyatós*, sticlă). — În anatomie se chiamă hialin, sau hialină, ori ce substanță sau corp care este transparent ca sticla, d. ex. cilindri hialini, etc.

Hidatidă. — V. *Idatidă*.

Hidrargir. — V. *Mercur*.

Hidrargirism. — Intoxicație cu mercur
Hidrocefal. — V. *Idrocefal.*
Hidrocel. — V. la *Idrocel.*
Hidrofobie. — V. *Idrofobie.*
Hidrolat. — V. *Idrolat.*
Hidromel. — V. *Idromel.*
Hidropizie. — V. *Idropizie.*
Hidropizie. — V. *Idropizie.*
Hidroterapie. — V. *Idroterapie.*
Hidrotorax. — V. *Idrotorax.*
Higienă. — V. *Igienă.*
Higroma. — V. *Igroma.*
Higrometrie. — V. *Igrometrie.*
Hilimică. — V. *Filimică.*
Himanic. — V. *Pepene verde.*
Hiosciamină. — V. *Măsălarită.*
Hiperclorhidrie. — V. *Ipercloridrie.*
Hiperemie. — V. *Iperemie.*
Hiperestezie. — V. *Iperestezie.*
Hipermotropie. — V. *Ipermetropie* și la *Ochi.*
Hipertrofie. — V. *Ipertrofie.*

Hipnal (*Monocloral antipirină*) — Combinațiunea cu echivalent egal a cloralului și antipirinei. Produce somn și domolește durerile. Se dă în doză de 1 gr. (dintr'odată sau în 2 rânduri) până la 2 gr., în buline, capsule, poțiune, sirop, elixir.

Hipnone. — Medicament care produce somn; să nu se dea celor ce suferă de boale de inimă. Se dă în doză de 50 ctgr. cel mult; doza obișnuită 6—8 picături într'o infuzie de ceaiu.

Hipnotism. — V. *Ipnatism.*

Hipoclorhidrie. — V. *Ipclocloridrie.*

Hipocratice. (degete). — Se cheamă degetele îngroșate mult la capete, cu unghia lătită și încovoiată, prezentând o dungă în latul ei. Asemenea degete se observă uneori la tuberculoși. (Vezi fig. 214).



Fig. 214.—Degete hipocratice

secreție este foarte trebuincioasă unei bune desvoltări a corpului.

Datorită unei turburări în secția internă a hipofizei, provocată de o tumoră a ei, putem să avem o desvol-

tare anormală a oaselor corpului, constituind boala numită acromegalie, sau gigantism. Mulți dintre nenorociți giganti, expuși la bălciuri, sunt victimele acestei boale. Ingrășarea anormală a unor persoane, cari devin diforme, este datorită de multe ori tot unei turburări a secreției hipofizei, după cum tot ei i se datorește și lipsa în desvoltare a altora, cari rămân pitici, adevărați copii și la vârste înaintate. Pentru a remedia aceste rele dăm bolnavilor extract din glanda hipofiză



Fig. 215. — Glanda hipofiză

a = hipofiza, c = creierul mic, d = măduva spinării, f = creierul mare, g = bulbul șirii spinării.

(preparatul numit pituitrină), sau facem radioterapia glandei, ca să distrugem tumorile cari îi turbură secreția, sau, în fine, putem, prin operație, să scoatem complet glanda. Hipofiza are o strânsă legătură și cu dentiția; Insuficiența de secreție a glandei dă turburări dentare, cari se combat cu preparate de hipofiză.

Hipogastru. — V. *Ipogastru.*

Hipopion. — V. *Ipopion.*

Histerie. — V. *Isterie.*

Holeră (Boala). — V. *Coleră.*

Homar (lat. *homarus*), *rac de mare.* — Racul de mare nu trebuie să fie mâncat decât de cei sănătoși și cu stomac bun, iar cei ce suferă de boale de stomac, (gastralgia, dispepsia) cei ce au boale de piele (eczemă, etc.), sau blândă (urticarie) să se păzească de el.

Homeopatie. — V. *Omeopatie*.

Horeăire, sforăire. — Sgomot mai mult sau mai puțin sonor, care se produce în timpul somnului, mai cu seamă în timpul inspirațiunii, câte odată și în expirațiune și care rezultă din vibrațiunea vâului platin, mai cu seamă când gura este deschisă.

Hrană, hrănire. — V. *Alimente*.

Hrean, hirean, irean (*Cochlearia ar-moracia*, fam. cruciferelor). — În medicină se întrebuințează rădăcina proaspătă, care lucrează ca antiscorbutic puternic, antigutos, stimulent energic, depurativ, diuretic și rubefiant. Se dă sub formă de vin antiscorbutic, 30—125 gr., de sirop compus antiscorbutic (Codex), 20—50 gr., tinctură compusă 30—50 gr. — La țară hreanul se întrebuințează în mai multe boale. Astfel; dulceața de hrean se ia pentru tusă măgărească. O lingură de hrean ras pe răzătoare, 2 linguri de zahăr galben (candel) bine pisat, se amestecă pe un taler de lemn, se pun într-o strachină și se lasă să stea 3—4 ceasuri, dându-se din această doctorie câte o linguriță de 4—5 ori pe zi pentru tusă. Pentru stomatită se face gargară de 3 ori pe zi. Rădăcina de hrean rasă și stropită cu apă servește drept cataplasmă în cazurile de junghiu și nevralgii. Turta de hrean ras, mălaiu, meiu, miere de faguri și sare, toate puse pe piele de cal, se pune la gât pentru gâlci. Rădăcina rasă se mai pune și la junghiu în loc de muștar.

Hribi. — V. *Ciuperci*.

Humerus. — Osul brațului. V. *Braț*.

Hydrargyrum. — V. *Mercur*.

Hydrastis Canadensis. — (fam. ranunculaceelor). — În medicină se întrebuințează rădăcina acestei plante pentru a opri curgerile de sânge (emoragiile), îndeosebi cele din mîtră, în contra regulilor prea abundente, ca tonic (întăritor) și ca diuretic (care înleznește udul). Se dă sub formă de: decoctiune sau fiertură 60 la 1000, extract fluid 30 picături de 2—3 ori pe zi. Principiul activ este *hydrastina*, care se dă în doză de 5 până la 20 ctgr. pe zi în hapuri (pilule) de câte 5 ctgr. *Hydrastinina* se dă în doză de 5—10 ctgr. în injecțiuni sub piele.

Hydrophobie. — V. *Turbare*.

Hygrol. — V. *Mercur* (*Mercur coloidal*).

Hyperhidroza. — O asudare abundentă, o secreție exagerată a sudoarei la mâni și picioare. Se întâlnește la nervoși, anemici sau limfatici și în diferite boli acute. *Tratament*: Întăritoare (tonice, arsenic, fier); tratamentul bolii respective; încălțăminte ușoară, schimbarea des a ciorapilor, băi frecvente căldicele, pudrarea locurilor asudate cu talc, amidon la care se poate adăoga acid salicilic, băi locale (mâni și picioare) cu soluție de alun, de borax, formol, de hiper-manganat de potasiu.

Hyperolul, sau Hydrogen peroxidat în stare solidă. — Este un compus cristalizat de apă oxigenată cu carboemidă. Se prezintă sub forma unui praf alb, inodor, liber de orice săruri minerale și acizi anorganici, ușor solubil în apă, ceva mai greu în alcool. Hyperolul întrece toate celelalte preparate de apă oxigenată prin cantitatea considerabilă de hydrogen peroxidat, în proporție de 35% aproximativ. Față de celelalte preparate de H_2O_2 mai are și alt avantaj. Cu ajutorul hyperolului în orice moment și în orice loc putem avea o soluție proaspătă de apă oxigenată, în orice concentrație și cantitate voim. Grație compoziției chimice uniforme și a dozării comode, sub forma de tablete, se potrivește foarte bine pentru acest scop. Se găsește în comerț sub formă de pulbere și tablete. O tabletă (de 1 gr.) dizolvată în 10 gr. apă ne dă o soluție de apă oxigenată 3%, bună pentru gargară și pentru badijonări în gât.

Hypertensiune arterială. — Mărirea permanentă sau tranzitorie a presiunii sîngelui, care în mod normal, măsurată cu aparatul lui Vaquez—Laubry, sau Lian, este 12—14 (tensiunea maximă=mx.) și 6,5—9 (tensiunea minimă=mn.). Se cunoaște și după un număr oarecare de turburări locale și generale: a) Turburări din partea arterelor: *rupturi* arteriale, dând epistaxis sau chiar emoragii cerebrale, *spasme*, fenomenul de deget mort, afazie, *hemi* sau *monoplogie* trecătoare, *scleroza arterelor*; b) Turburări din partea inimii: Insuficiența inimii (dispnee mai ales noaptea, tusă, congestia bazelor plămânilor, dureri anghinoase, tachicardie, edeme); c) Turburări din partea

rinichilor : Poliurie (urinare abundentă) Hipertensiunea arterială poate să fie permanentă sau trecătoare. Prima este gravă. Bolnavii mor de *caşexie, uremie, edem pulmonar, anghină de piept, emoragie cerebrală. Sifilisul, hereditatea, guta, diabetul, alcoolismul, menopauza, intoxicaţiile cu plumb, eclampsia puerperală, nefrita scarlatinoasă, dau hipertensiune arterială. Tratament : nu-*

Iahnîe. — Este un mod de preparaţiune a mâncărilor, care se întrebuiţează foarte mult în bucătăria noastră, bun atât din punct de vedere economic, cât şi din punct de vedere igienic. Când se prepară cu prea multă grăsime şi cu ardei, sau piper, în cantitate prea mare, este indigestă (grea de mistuit) şi iritantă pentru stomac. Cei slabi de stomac, cari mistue greu şi cari sunt expuşi la dureri şi la diaree, se vor feri de iahnîe.

Iarbă (lat. *herba*). — Sub numele de *iarbă* poporul român înţelege orice plantă *herbacee* a cărei tulpină este subţire, moale, tot aşa de mlădioasă ca şi frunza şi care pierе după câteva luni de vegetaţiune). Babele noastre cunosc şi culeg un număr foarte mare de ierburi pe cari le numesc după forma, culoarea, gustul sau însuşirea lor de a vindeca. În general recolta ierburilor se face înainte de deschiderea florilor, după dezvoltarea completă a frunzelor, dimineaţa pe vreme bună, uscată, după ce s'a ridicat roua. Cele cari au suc mult se pun la soare, sau într'o etuvă cu temperatura de 20—25° care se ridică până la 36° pentru ca să se usuce bine, întorcându-se pe toate părţile ; cele mai puţin succulente se usucă mai uşor.

Iarba mare, homan, oman (*Inula Helenium*, fam. Compozitelor). — Plantă erbacee mare şi frumoaşă, care creşte prin fâneţele umede, pe lângă păraie şi pe marginea pădurilor. La ţară se bea ceaiul de rădăcină uscată pentru năduşală. Fiartă cu vin alb se bea pentru tuse, pentru oftică, un păhar dimineaţa şi altul saera. În medicină se întrebuiţează rădăcina care are un principiu activ *inulina* şi ale cărei

mai după sfatul şi sub supravegherea medicului. Boala este gravă. În orice caz se tratează cauza, se aplică măsuri de igienă (repaus aer curat şi fără variaţii de temperatură), băi şi ape minerale (Buziaş, Lipova).

Hypertrichoza. — Este dezvoltarea anormală şi foarte exagerată a părului.

Hyssopus officinalis. — V. *Isop*.

proprietăţi sunt : tonică, excitantă, diaforetică (adecă face să năduşeşti). Se dă intern : conserve 4—16 gr., fiertură 5 la 1000, extract 50 ctgr. până la 4 gr., praf 2—10 gr., tinctură 5—20 gr., vin 50—150 gr. pe zi.

Iarba roşie. — V. *Răculeţ*.

Iarba stupului. — V. *Roiniţă*.

Iarba usturoasă, dumbăt, usturoi de lac (*Teucrium scordium*, fam. labiatelor).

Plantă erbacee, care creşte prin locuri umede şi mlăştinoase. Intră în compoziţia electuarului *diascordium* (vezi acest cuvânt).

Iarnă. — Boalele bântue mai cu furie în acest anotimp : guturaiul, tusa, pneumonia, pleurezia, sunt obişnuite în acest timp. Oftica loveşte pe cei slăbiţi şi predispuşi şi se agravează la cei deja atinşi. Pentru a preîntîmpina toate aceste rele trebuie să fim cu mare băgare de seamă şi să ascultăm de poruncile igienei. Trebuie să ne obişnuim din vreme cu frigul făcând plimbări zilnice şi obişnuindu-ne încă din timpul verii cu apă rece, făcând fricţiuni reci în fiecare zi, dacă nu pe tot corpul, cel puţin pe jumătatea de sus a corpului. În casă să avem căldură potrivită, afară să eşim în totdeauna bine îmbrăcaţi, să ne ferim de curenţii mari de aer, să nu eşim prea de dimineaţă, nici seara, mai ales pe viscol sau pe umezeală. Bogaţii pot să petreacă iarna în staţiunile marine mediteraneene.

Iască (ital. *esca* ; span. *yesca*). — Sunt două feluri de ciuperci *polyporus* care cresc pe cireşi, pruni, sau pe copacii



Fig. 216.
Iarbă usturoasă

cei bătrâni și mai ales pe stejari, fagi, tei etc. Din toate aceste ciuperci, cari uneori cresc foarte mari, se prepară *iasca*. Se întrebuințează în medicină pentru a opri curgerile de sânge, emo-ragiile mici, punându-se pe locul care sângerează mai multe felii de iască, simple sau înmuiate în perclorur de fier îndoit cu apă și apoi se leagă. E un mijloc bun de a opri sângele din răni și e la îndemâna tuturor. — *Iasca fumătorilor*, fiartă în apă cu nitru (salitră), sau cu clorat de potasă și s'o uscați la aer) este bună și la cei cari au *astmă*, cari, dacă respiră fumul ce iese din această iască aprinsă, se ușurează foarte mult.

Iasomie sălbatică (*Iasminum fructicans*, fam. oleaceelor-iasminoideelor). — Se întrebuințează scoarța de rădăcină care este bună în contra frigurilor și a nevralgiilor. Se dă sub formă de praf 5 până la 20 sau 40 ctgr. tinctură 10—50 picături, pilule, de câte 5 ctgr. una, 2 până la 4 pe zi.

Iaurt. — V. *Lapte*.

Ibogaină. — Alcaloid extras din *Tubernanthus Iboga*, fam. apocinaceelor). — *Cloridratură de ibogaină* lucrează ca excitant al nutrițiunii, tonicardiac, în-tocmai ca *cola* și *coca*. Se dă în neurastenie, în slăbiciuni nervoase și musculare, în gripă, în convalescența boalelor infecțioase. *Doză*: 2—3 ctgr. în pilule.

Ichthalbină, albuminat de ichtiol. — Antiseptic intestinal. *Doză*: 50 ctgr. până la 3 gr. în buline.

Ichtiol. — Product al unor stânci bituminoase descoperite în Tirol, bogate în pești fosili și din cari se scoate prin distilațiune uscată un fel de păcură, *oleiul de ichtiol*. În medicină se întrebuințează în contra boalelor de piele, în special în contra psoriazei, în contra durerilor reumatismale și în pansamentul unor răni sau ulceratii de mîtră. Se dă în alifie 10 gr. la 100 de vaselină. Pe dinăuntru se dă în capsule de câte 10 ctgr. 7—8 pe zi în contra *nevralgiei sciatică*.

Ichtiroză (gr. *ichtys*, pește). — Este o boală de piele în care epidermul se îngroașe și a cărui suprafață este uscată și aspră scâmoșindu-se în continuu sub formă de solzi mici ca tă-rățele, sau sub formă de solzi mai

mari, care uneori sunt moi, alteori tari cornoși. Acești solzi pot să fie negri sau albi ca sideful. Boala se poate întinde la tot corpul, necruțând de cât îndoiturile încheieturilor. Ichtiroza este congenitală, dar nu se ivește decât la câteva luni după naștere, întotdeauna însă înainte de 3 ani; adeseori este ereditară. *Tratament*: pe dinăuntru se va da untură de pește, sirop de iodur de fier, arsenic, chinchină, iar pe dinafară se vor face ungeri cu: gudron, 10 gr., vaselină 100 gr.; sau cu: oleiu cadiu 10 gr., oleiu de migdale dulci 100 gr.; etc.

Icter (gr. *ikteros*), *gălbinare*. — În unele împrejurări fierea fabricată de ficat se varsă în sânge, care o duce prin toate organele, țesăturile și în piele, din care pricină toate acestea capătă o colorațiune galbenă. Această colorațiune se vede mai întâiu la ochi, pe albul ochilor (la conjunctive), apoi la față, la gingii, pe piept și pantece și în fine la membre (mâini și picioare). Colorațiunea nu este într-o formă la toți și în toate cazurile, ci variază dela galben deschis la galben închis și uneori la galben verzui. Fierea trece în *sudoare*, din care pricină pielea este galbenă, în *ud*, care se colorează și mai iute decât pielea și *urina* este galbenă portocalie, închisă sau verzuie și pătează rufe, în *lapte*, când mama nu mai trebuie să alăpteze. Scaunele de obicei sunt albe ca mazărea bătută, din pricină că fierea, ne mai trecând în mațe, substanțele grase nu se mai pot mistui. Când scaunele încep să fie colorate este semn că fierea a început să se verse în mațe. În unele cazuri scaunele în loc să fie albe, sunt prea colorate, ceea ce arată că gălbinarea este produsă din cauză că fierea se fabrică în cătime prea mare și o parte trece în sânge. Bolnavul de gălbinare are gura amară, limba încărcată, lipsă de apetit și chiar silă de mâncare, mistuire grea. Pulsul îi bate foarte încet, de 50—40 și chiar de 30 ori pe minut în loc de 70, are mâncărime peste tot corpul, dar mai ales la mâini și la picioare, ceea ce nu-l lasă să doarmă. Cauzele icterului sunt mai multe: când fierea se produce în cantitate prea mare, cum se întâmplă în congestiunea ficatului și în icterul

zis cataral, când avem ceea ce se zice *policolie*, o parte din fiere intră în sânge și numai o parte se duce în mațe. Altă dată fierea produsă în ficat nu poate trece în mațe din cauza unei piedeci, care poate fi produsă de o pietricică (calcul) care se oprește și astupă canalul de scurgere al ei, sau piedeca poate fi produsă de inflamațiunea sau aprinderea căptușelii canalului, care, îngroșându-se îl astupă. Piedeca mai poate fi produsă de o boală de ficat, cum este : ciroza, cancerul, etc. — În gălbinaire avem două forme : una ușoară sau *icterul cataral* și alta foarte grea și periculoasă, *icterul grav*. Icterul *zis cataral* poate să provină dintr'o emoțiune, o supărare sau o spaimă mare, uneori chiar și dintr'o bucurie mare, alte ori el este produs de mâncare prea multă, sau din băuturi alcoolice, câte odată din răceală. În icterul produs de emoțiuni gălbinairea apare foarte repede, de multe ori într'un ceas și scaunele nu se decolorează, după cum se întâmplă când cterul este produs de inflamațiunea canalului coledoc (care merge dela ficat la mațe) și bolnavul are limba încărcată, durere de cap, durere de șale, lipsă de poftă de mâncare, vărsături, curgere de sânge din nas, nu poate dormi, este constipat sau are diaree bilioasă la început și numai după 3—4 zile scaunele încep a se decolora. Această formă durează 8—20 zile, altelei 6 săptămâni și chiar mai mult. Icterul cel *grav* se vede cu mult mai rar și poate să se arate ca o boală propriu zisă, dar cele mai adeseori el este produs de o boală de ficat, cum sunt : cancerul, chistul idatic, ciroza, colica epatică (piatra), sifilisul, sau de o boală care este în afară de ficat, cum sunt : colera, febra tifoidă, pneumonia. Acest icter începe cu fiori tari, cu dureri în membre și cu o stare de abatere, apoi apare gălbinairea peste tot corpul, curgeri de sânge din nas, din gingii, din stomac, din mațe, uneori din plămâni și din beșică; pe lângă acestea se mai văd și turburări nervoase, cum sunt : delir (aiurare), dispnee (respirație grea), lipsă de somn, toropeală. — *Tratament*. Tratamentul icterului *cataral* sau simplu, constă în : regim lactat. Bolnavul va lua laptele

fără smântână, pentru ca să se mistue mai ușor, putându-i adăuga 2—3 gr. de bicarbonat de sodă, sau să-l taie cu o apă minerală. I se vor da purgative (curățenii) saline repetate la fiecare 4—8 zile : sulfat de sodă 15—25 gr., sau purgative zise colagoge (cari înlesnesc eșirea fierii din ficat în mațe) cum sunt : saburul, reventul, podofilina, calomelul, cascara sagrada, evonimin, etc. Se vor da antiseptice intestinale : benzonafтол, salol, salofen, etc. Când bolnavul are *febră* i se va da : salicilat de sodă 3—6 gr. pe zi, sau salol în aceeași doză, iar dacă rinichii sunt atinși se va da chinină. Pentru *mâncărime de piele* băi calde cu 500 gr. carbonat de sodă, sau fricțiuni cu oțet aromatic, ori alifii cu mentol și acid fenic, iar pe dinăuntru bromure. Se recomandă să se facă dimineața și seara clistere cu apă rece de 75° sau 18° (cu irigatorul) iar bolnavul se va sili să ție apa în el 5—10 minute. În icterul *grav* : regim lactat, purgative, băuturi abundente, stimulente și diuretice; în caz de sifilis se va recurge la tratamentul specific mixt. — La *fară* babele vindecă gălbinairea cu lucruri galbene : păhăruț de ceară galbină, ban de aur (galbin), siminoc, lumină-rică, gălbinele, etc.

Idartroză, hidartroză (gr. *hydor*. apă, și *arthron*, încheietură, articulațiune). — Oricare încheietură cuprinde un fel de lichid vâcos învelit într'o piele fină, care îi înlesnește mișcările și care se numește *sinovie*. Când acest lichid, dintr'o împrejurare oarecare, se înmulțește și încheietura se umflă zicem că este o *idartroză*. Sunt mai multe *cauze* cari produc această boală : o lovitură, o sucitură, un mers forțat, o răceală, etc. mai cu seamă la cei limfatici, scrofuloși sau reumatici. Toate încheieturile pot fi atinse de idartroză : umărul, cotul, pumnul, gleznele, etc. dar mai mult decât toate este genunchiul, care se umflă tare așa în cât orice mișcare este cu neputință sau se face cu mare greutate. Uneori bolnavul are și dureri. Pielea nu este roșie, ci numai întinsă. Această boală ține mult, căci lichidul dispăre cu mare greutate; uneori idartroza poate să se transforme în altă boală cu mult mai gravă, în *tumora albă*, la persoanele scrofuloase. — *Tra-*

tament. Repaus complet, la pat, cu piciorul întins, având vârful mai ridicat. Se va unge articulația cu tinctură de iod și pe deasupra se va pune un strat gros de vată apoi cu o fașă se va face un bandaj (o legătură potrivit de strâns) și ținând piciorul în nemișcare completă. După 2—4 zile se va face masaj în fiecare zi câte 10—15 minute. Când idartroza este de natură reumatică se va da salicilat de sodiu 4—6 gr. pe zi, apoi, după câteva zile, se va face un masaj metodic și se va unge încheietura cu : iod 30 centigrame, iodur de potasiu 5 gr., vaselină 50 gr. Dacă lichidul nu dispăre și stă pe loc, sau se înmulțește, producând dureri, vom face o *puncție* (o împănătură) și vom deșerta tot lichidul cu o seringă. În cazurile rebele se face o operațiune mai mare : *artrotomia* (deschiderea încheieturii) urmată de o spălătură antiseptică (acid fenic 5%).

Idatidă, hidatidă (grec. *hydatis*, dela *hydor*, apă). — Se numește astfel o tumoră chistică, adică formată dintr'un înveliș care înconjură un lichid având drept caracter special de a conține tenii numite *echinococi*. Chistul *idatic* se dezvoltă în cavități seroase și în țesutul diferitelor organe : plămân, inimă, splină, rinichi, creier, ochi, oase, etc. dar mai ales în *ficat*.

Idiosinerasie (gr. *idios*, propriu, *sin* cu, și *crasis*, amestec, *temperament*). — O dispozițiune în virtutea căreia fiecare om este atins, într'un mod propriu lui, de către agenții exteriori (fiziologici sau patologici). Astfel sunt unele persoane cari nu pot suferi cutare medicament (chinină, antipirină, iodure, bromure, etc.), sau cutare mâncare fără ca să nu le facă rău, altele cărora cutare medicament nu le face nici o lucrare.

Idiotie, neghiobie, tâmpeală. — O stare în care facultățile intelectuale nu s'au manifestat nici odată, sau au fost oprite în dezvoltarea lor încă din primii ani ai vieții. Cauzele idiotiei sunt mai multe : idrocefalia, microcefalia, meningita, mixedemul (absența sau atrofia glandei tiroide). Ereditatea sau moștenirea are mare influență asupra acestei infirmități (alcoolismul la părinți, epilepsia, alienația mintală, sifilisul, consangvinitatea). Mai con-

tribue la dezvoltarea idiotiei căderile asupra capului, boalele infecțioase cum sunt : febra tifoidă, febrele eruptive (pojar, scarlatină). Mai la toți idiotii se văd unele defecte fizice, adică o conformațiune rea a capului, implantarea vițioasă a dinților, paralizii parțiale, picioare strâmbe, iar simțurile lor funcționează rău și se dezvoltă la ei instincte cu atât mai grosolane, cu cât inteligența lor este mai tâmpită, astfel ei mănâncă ori ce li se dă de mâncare, bun sau rău, cu aceeași poftă, cu aceeași lăcomie, de asemenea mirosurile nu-i impresionează ori cât de urite ar fi, etc. Copilul idiot nu merge, nu vorbește, nu aude, nu doarme cu alții, el tipă fără nici un rost, cu toate acestea nu se poate determina înainte de doi ani, în mod exact, gradul boalei. Tratamentul constă în educațiune fizică și morală.

Idrocefal, hydrocephalie (gre. *hydor*, apă și *kephalé*, cap), *apă la cap*. — Prin acest nume se înțelege o îngrămădire de apă în pelițele (membranele) creierilor. Această boală poate să fie din naștere, *congenitală*, sau poate să se ivească mai târziu, după ce s'a închis definitiv cavitatea craniană. Ea se observă în general la copiii născuți din părinți bătrâni, alcoolici, sifilitici, epileptici, etc. sau în familia cărora se observă boale de creieri cronice. Uneori această boală complică *cretinismul*. Câte odată nu se poate găsi cauza, căci s'au văzut copii idrocefali născuți înainte, sau după alți copii foarte sănătoși. *Dropica la cap* ivită mai târziu, *câștigată*, spre a se deosebi de cea *congenitală*, este, cele mai adeseori, de origine tuberculoză (ofticoasă), o formă a *meningitei* tuberculoase cronice, sau poate fi datorită altor cauze, o tumoră cerebrală, care îngreuiază circulațiunea dinăuntru creierilor, sau o boală de rinichi, etc. — *Semnele* acestei boale în forma *congenitală* sunt : mărimea și diformațiunea capului, adică a craniului, căci fața rămâne mică, inteligența micșorată sau nulă, mișcări marginite, apetit mare, spazme (convulsii) dese, iar la urmă copilul are țipete speciale (idrencefalice). Uneori copilul moare în scurtă vreme, alteori poate trăi până la 12—15 ani. Tratamentul acestei forme constă la în-

ceput în fricțiuni mercuriale, continuă 3 săptămâni și iodur de potasiu 1—2 gr. pe zi, sau sirop Gibert, o lingură în apă. Dacă nu isbutim, se va face compresie asupra capului cu şuvițe de talion, sau cu o scufă elastică, după ce mai întâiu s'a deșertat o parte din lichid printr'o puncție, făcută cu toate precauțiunile antisepice. Această puncție se poate repeta din când în când după trebuință. S'au încercat și injecțiunile iodate. — Semnele boalei, când ea a fost câștigată mai târziu, sunt: la început excitațiune (delir, convulsii, contracțiuni), apoi depresiune (comă, asfixie). Tratamentul constă în tratament antisifilic, puncții lombare, sau craniene.

Idrocel, hidrocel (dela grec. *hydor*, apă și *kélé*, tumoră). — Tumoră formată de îngrămădirea în punga testiculului, sau în învelișurile cordonului spermatic, a unei cantități oarecare de lichid sau serozitate albuminoasă, uneori colorată puțin de sânge, câte odată de consistență sirupoasă. Scrotul, în partea umflată, are forma unei pere cu baza în jos, iar pielea este întinsă, netedă. Idrocelul nu este dureros, dar el supără prin volumul și greutatea lui, cari se măresc din ce în ce mai mult dacă nu se face operația numită *cura radicală*, care se vindecă repede și este preferabilă *puncțiunii*, adică deșertării lichidului cu ajutorul unui trocar și urmată uneori de injecțiune iodată.

Idrofobie, hidrofbie (gr. *hydor* apă și *phobos*, temere, frică). — V. *Turbare*.

Idrogen sulfurat. — V. Sulfidric-acid.

Idrolat, hidrolat (gr. *hydor*, apă). — Apă încărcată cu principii volatile prin distilație. La prepararea ei vaporii de apă trec prin alambic străbătând un strat de plante ale căror substanțe active le iau cu sine, d. ex. idrolat de mentă, de melisă, de teiu, de valeriană, etc.

Idromel, hidromel (gr. *hydor*, apă și *meli*, miere). — Băutură făcută cu miere (100 la 1000 apă). Este îndulcitoare și laxativă.

Idropericard, hidropericard. — Apă la inimă, adică în cămașa inimii numită *pericard* (vezi acest cuvânt).

Idropizie, hidropizie (dela grec. *hydor*, apă și finală *ops*, care arată colecțiune, reunire, adunare la un loc), *dropică*,

boală de apă. — Când într'o parte a corpului se îngrămădește o cantitate de lichid (de apă), zicem că este o *idropizie*. Acel lichid este partea apoasă a sângelui numită *serozitate*, care se poate îngrămădi fie într'o cavitate oarecare, în piept (*idrotorax*), în pericard sau cămașa inimii (*idropericard*), în creeri (*idrocefal*) și în pânțele (*ascită*), fie într'o articulație (*idartroză*), fie în țesutul celular care unește sau desparte organele între ele (*edem* și *anazarcă*). Când zicem numai *idropizie*, sau *dropică*, se înțelege de obicei îngrămădirea de apă în pânțele, adică în acea cavitate mare care este mărginită de toate părțile de o pieleț sau membrană seroasă numită *peritoneu*. Mai întotdeauna această umflătură de pânțele se însoțește de buhăiala feței sau de umflătura gleznelor de oarece și în aceste părți se adună apă ca și în pânțele. — În dropică cel mai vădit semn este mărirea pântecelui. Pielea pântecelui este întinsă, fără sbârcituri (netedă). Respirațiunea se face cu greutate înima bate neregulat, mistuirea se face cu anevoință, udul este roșu și puțin, gingiile și buzele sunt palide, bolnavul se oboșește la cel mai mic lucru și toate le face în silă. — *Cauzele* dropiceii sunt multe: de obicei idropizia nu este o boală de sine stătătoare, ci mai totdeauna ea este un semn al altei boale, când se și numește *secundară*, spre deosebire de aceea care provine sub influența *frigului*, sau fără o pricină vădită, când se zice *primitivă*. Idropizia secundară poate să fie produsă de o boală de ficat, de inimă, de splină, de rinichi, de pancreas, de mezent. În toate aceste boale dropica este produsă de turburări *mechanice* cari împiedecă circulația sângelui și atunci partea apoasă a sângelui iese afară din vase și se revarsă în cavități și în țesături. Idropizia se mai observă la sfârșitul unor boale, cum sunt: cancerul, oftica și paludismul. Cantitatea de apă care se poate aduna în pânțele ajunge uneori până la 12—20 litri și chiar 30. Când dropica este de sine stătătoare se poate vindeca ușor, când însă este produsă de vr'o boală, ea nu se vindecă decât odată cu acea boală, dar fiindcă cele mai multe din acele boale nu se pot vindeca și dro-

pica va avea aceeași soartă. *Tratament.* Rar se întâmplă ca apa din dropică să dispară dela sine, prin urmare trebuie s'o alungăm din corp prin diferite medicamente. Mai întâiu vom da *curățenii* (purgative) dese și încă din cele mai tari : tinctura de jalapa, uleiul de croton, saburul, scamonea, sena etc. Apoi vom da medicamente cari fac ud mult, *diuretice*, cum sunt : scila (ceapa de mare), digitala, nitru, ceaiul de pir, de cozi de cireșe, diuretină, teobromină etc. dar mai cu seamă vom da *lapte*, până la 2 litri pe zi, care este cel mai bun diuretic și în același timp hrănește și bolnavul. Pe lângă acestea, vom da și medicamente cari produc nădușeală multă, *sudorifice*. (pilocarpină, ienupăr, salsapariță (salce), etc.— Când apa nu dispăre și ajunge în cantitate prea mare, se va face *paracenteza* abdominală (vezi *Ascită*).— La *tară* babele vindecă boala de apă cu boz, cocostărc, coada mănzului, degetariță, ienupere, mutătoare, părul ciutei pătrunjel, sudoarea calului, talpa găștii, urzică.

Idroterapie, hidroterapie (dela grec. *hydor*, apă, *therapia*, tratament), *cură cu apă rece*. — Unul din cele mai bune mijloace naturale pentru vindecarea boalelor este *idroterapia*, adică cura cu apă rece. — Modurile de aplicațiune ale apei reci pe suprafața corpului sunt multe ; cele mai de căpetenie sunt descrise la articolele : *afuziune, băi (băi reci) dușuri și spălare (abluțiune)*. Aci vom arăta principiile generale și efectele igienice ale idroterapiei. *Fricțiunile cu cearșaf ud* se fac aruncând pe spatete bolnavului un cearșaf destul de lung și de lat pentru a-l înveli, după ce mai întâiu a fost înmuiat în apă rece și stors potrivit, cu care el își freacă pieptul în timp ce băiașul îi freacă gâtul, spatete, pulpele și toată partea dinapoi a corpului. Apoi în locul cearșafului ud se pune un cearșaf uscat, sau un halat de flanelă cu care se freacă din nou. Acest metod este ușor și se poate face și acasă ; el este excitant și întăritor (tonic) când cearșaful este mai bine stors și frecăturile se fac mai tare. Micșorează excitația sistemului nervos și este calmant când cearșaful este mai ud și fricțiunile se fac mai domol. *Spălăturile cu apă rece*

au același efect ca și cearșaful ud aplicat pe o parte sau peste tot corpul, scăzând temperatura corpului în diferite boale febrile (febra tifoidă), mai ales dacă se repetă mai de multe ori în cursul zilei. *Impachetarea umedă* se face întinzând pe un pat o plapomă de lână pe care se desfășoară un cearșaf înmuiat și stors, apoi bolnavul culcat în acest pat, se învește mai întâiu cu cearșaful, apoi cu plapoma peste tot, rămânându-i numai fața liberă ; după o jumătate de oră bolnavul se îmbracă în rufărie. — Apa rece, ajungând în atingere cu corpul, produce la început strângerea vaselor iuind curentul sangvin, apoi lărgirea vaselor cu încetinirea acestui curent. La începutul unui duș mișcările respiratoare devin mai iuți, apoi mai încete, mai largi și mai adânci. Excitația produsă de frig asupra nervilor senzitivi dela suprafața corpului lucrează asupra măduvei, care la rândul ei propagă această excitație asupra nervilor motori. Idroterapia întefeste (stimulează) și regulează inervația, circulația, nutriția și obișnuind pe om să reacționeze sub acțiunea apei reci, îl obișnuiește a reacționa în contra frigului. — Idroterapia este bună la toate vârstele și la amândouă sexele, cu condițiune numai ca să fie bine administrată. O baie rece sau un duș se vor face pe nemâncate. Durata unei cufundări, sau a unui duș, trebuie să fie scurtă și în totdeauna urmată de fricțiuni, masaj sau exerciții corporale. Până la etatea de 7—8 ani este bine ca în loc de duș să se facă spălături reci și fricțiuni ; mai târziu se pot întrebuința și dușuri după indicațiunile date de constituție și de temperament. La persoanele cu temperament sangvin, cu constituție puternică sunt mai bune băile, sudațiunile, afuziunile și spălăturile decât dușurile reci, cari convin mai bine celor limfatici, gușoșilor și reumaticilor, însă cu băgare de seamă când bolnavii sunt nevropați. Idroterapia caldă se potrivește la femei, mai cu seamă la cele nervoase, iar dușurile reci trebuie să se dea numai în anumite cazuri bine hotărâte și cu multă precauțiune. Dacă organismul s'a obișnuit cu dușurile, ele pot să-i aducă mult folos. Idroterapia poate fi periculoasă în boalele

de inimă, în boalele de piept și în unele boale de piele, precum și la oamenii supuși la congestiuni și emoragii (curgeri de sânge). La limfatici, la scrofuloși, a căror rezistență este mare și cari nu sunt nervoși mai de loc, la anemici, idroterapia este foarte bună și trebuie aplicată fără șovăire. Nervoșii trebuiesc obișnuiți încetul cu încetul cu apa rece și numai după aceea să li se aplice idroterapia mai cu energie. Tratatamentul este bine să se înceapă primăvara sau toamna și să se continue și iarna, pentru ca sub influența frigului exterior și a excitațiunii produse de idroterapie să ne reparăm forțele și să activăm funcțiunile. Idroterapia trebuie făcută pe cât se poate într'un stabiliment special și sub direcțiunea unui doctor; iar dacă aceasta nu se poate vom mări tratamentul numai la spălături (loțiuni), la afuziuni reci, la fricțiuni cu cearșaf ud. Tratatamentul, odată început, trebuie urmat mult timp; decât un tratament rău condus și des întrerupt, mai bine lipsă.

Idrotorax, hidrotorax, (dela grec. *hydro*, apă, și *thorax*, piept), *apă la plămâni*. — Ingrămădire de apă în cămașa plămânilor (în pleură) dintr'o parte sau din ambele părți. Apa seamănă cu serul sângelui. Se observă în boalele de inimă, în boalele de rinichi, în boalele cachectice (vezi *Pleurizie*).

Ienupăr, archiș, cetină, inibahar, iuniper, jneapăr (*Juniperus communis*, fam. coniferelor). — Arbust întotdeauna verde care crește prin pădurile stâncoase și pășunile pietroase din regiunea muntoasă. În medicină se întrebuințează fructele (boabele), lemnul, frunzele vârfurile. Lemnul este sudorific, frunzele și vârfurile sunt purgative (curățenii), fructele sunt diuretice (fac ud mult) și stomachice. Fructele, fiind diuretice, se întrebuințează în dropică (idropizie) sub formă de tizănă (băutură), din 4—8 gr. la care se mai adaogă și nitru, 500 gr. apă, sau puse într'un vin oarecare la 1—2 gr. (vin diuretic). Se mai dă sub formă de extract 2—5 gr., ulei volatil, 2—6 picături. Pe dinafară se întrebuințează boabele pentru a face fumigațiuni (fumuri) în contra durerilor reu-

matice ale încheeturilor. O mână din aceste boabe zdrobite și fierte, într'o oacă de apă, fac un ceaiu foarte bun pentru dropică (boală de apă) bându-se 5—6 păhăruțe pe zi, sau se iau boabe de ienupăr, rădăcină de pătrunjel și rădăcină de urzică în câține de o potrivă, se fierb în apă până scade pe jumătate, se strecoară și se bea de mai multe ori pe zi câte o ceașcă pentru dropică, scurgeri și pentru ca să meargă udul. Se mai face un decoct (fiertură) tare de boabe, se amestecă cu jumătate lapte, și se bea. Cu alifie de ienupăr se freacă ușor părțile umflate de dropică, pe pânțele și picioare. Cu boabele se mai afumă prin casă, pentru a depărta mirosul urît și a îndepărta boalele molipsitoare.

Iepure (lat. *lepus*). — Carnea iepurelui este hrănitore, moale și dulce la gust, când iepurele este tânăr și trăește prin vie, pe coline și pe câmpuri, tare și aspră când iepurele este bătrân și trăește prin văi umede. În aceste cazuri carnea trebuie lăsată să se înmoaie (să se fezeze) și să se gătească cu sosuri sau sub formă de marinată. Ciorba de iepure, iepurele împănă, iepurele rece cu măsline, sunt mâncările cele mai obișnuite. Dar nu toată lumea poate să mănânce iepure; cei ce sufăr de boale de piele (eczemă, etc.), cei cu stomacul slab și iritabil să mănânce mai puțin și rar, sau de loc.

Iepure de casă, de mosc. — La noi nu se mănâncă acest soi de iepure și este păcat, căci acest animal rozător se sporește foarte mult, se crește foarte ușor și economic, și carnea lui constituie o hrană sănătoasă și ușor de mistuit.

Igienă, igienă (dela grec. *hygieia*, sănătate). — Cunoștința exactă a organismului omenesc și a fenomenelor cari se produc în lumea exterioară și pot să aibă o influență asupra lui este temelia igienei, care are de scop de a păstra și a întări sănătatea. Igiena caută să ajungă la acest scop prin două căi diferite: *științifică și practică*. Igiena științifică caută ceea ce este și ceea ce poate fi stricător sănătății, ea se silește să stabilească condițiunile cele mai prielnice pentru ca omul să înainteze, să prospere, iar cea practică are de scop să dea mijloacele și să

prescrie regulile pentru a oculi primejdiile cari amenință sănătatea omului și a face organismul cât se poate mai rezistent. Reunirea tuturor năzuințelor și silințelor acestora formează ceea ce se numește *igienă*. Igiena cuprinde în primul loc igiena *publică*, adică totalitatea măsurilor igienice luate de o comunitate de oameni pentru folosul și binele obștesc, căci omul singuratic n'are întotdeauna putința de a se apăra de boale, sau de a realiza condițiunile cele mai favorabile dezvoltării corpului său. Omul poate foarte bine să poarte îmbrăcăminte care să-l pună la adăpost de vremuri rele, să se hrănească cât trebuie și cât se poate de bine, etc., dar el, cu mijloacele lui singuratic, nu poate împiedeca aerul pe care-l respiră să fie murdar, infectat, ca apa pe care o bea și cu care își prepară mâncarea să fie murdară, infectată de vecinul său. Toate acestea se țin de datoria autorității publice. Înainte de toate omul trebuie să aibă un organism sănătos și cunoștința acestui fapt l'a pus pe cale să ocolească tot ceea ce poate fi stricător corpului său și să caute tot ceea ce poate înlesni dezvoltarea normală și păstrarea acestui corp. Aceste silințe, bine înțelese, au fost întotdeauna în legătură cu cunoștința ce o avea despre organismul omenesc și despre ceea ce-i poate fi stricător. — Igiena a devenit știință numai din minutul în care științele naturale și mai cu seamă botanica chimia și fizica s'au dezvoltat în deajuns, după ce fiziologia a început să răspândească cunoștințe mai exacte asupra funcțiunii organismului omenesc. Pasteur și Koch cu cercetările lor clasice, au făcut mare serviciu omenirii, dându-ne cunoștințe exacte despre *microbi*, despre aceste vietăți foarte mici cari sunt cei mai cumpliți dușmani ai omului și cari joacă un rol așa de mare în lupta pentru trai. Pentru ca omul să poată lupta cu succes, ceea ce este scopul igienei, trebuia ca el să cunoască pe cât se poate mai bine microbii patogeni, sau producători de boale și, mulțumită metodelor bacteriologice perfecționate de Pasteur, progreselor botanice și perfecționării microscopelor, am ajuns să cunoaștem agenții epidemiilor celor mai înfrico-

șate și a boalelor celor mai răspândite, dându-ne seama de natura lor. Prin aceasta s'a pus temelie trainică acelei părți a igienei care se ocupă cu apărarea de boalele infecțioase, cari omoară aproape jumătate din omenire. Importanța igienei publice și *private* a crescut în timpii din urmă foarte mult și numeroase cercetări statistice ne arată că progresele îndeplinite cu privire la apa de băut și la curățenia orașelor au dat rezultate minunate, micșorând mortalitatea și paralel cu aceasta morbiditatea, adică numărul oamenilor bolnavi. Mulțumită igienei atât individul slab, care dispune de mai multe mijloace de luptă pentru existență, cât și individul voinic, care este păzit de boalele epidemice și infecțioase, pot să ajungă la adânci bătrânețe. — Pentru înleznierea studiului, ea se împarte în igienă *generală*, *specială* și *publică*. Cea generală studiază raporturile omului sănătos cu agenții, sub influența cărora trebuie să trăiască oricare ar fi condițiunile lui de trai; Igiena specială pune în legătură aceste cunoștințe cu *starea* cu *sexul* cu *modul de viață* cu oarecare părți ale corpului. Igiena publică are de scop asigurarea sănătății populațiunilor în totalitatea lor, prin luarea de măsuri proprii, pentru a preîntâmpina întinderea epidemiilor și a supraveghea fraudele cari pot face periculoase substanțele alimentare și altele.

Igrasie. — V. Umiditate.

Igromă, higromă (gr. *hygros*, umed, și terminațiunea *oma* care înseamnă tumoră, umflătură). — Se numește astfel aprinderea sau inflamațiunea punților mucoase, sau seroase, cari se află pe sub piele în anumite locuri în cari pielea se mișcă asupra părții tari și aceste punți înleznesc alunecarea sau mișcarea pielei (de exemplu: la umăr, la cot, la genunchi, la glezne, etc.). Această inflamațiune este *acută* sau *cronică*. Cea *acută* se produce printr'o lovitură sau frecare; ea se arată mai ales la cei ce sufăr de gută sau de reumatism. Se arată sub forma unei tumori sau umflături de mărime variabilă, dela aceea a unei alune până la aceea a unei nuci sau portocale. Este dureroasă și fluctuantă, pielea este roșie; câteodată bolnavul are febră.

Boala se poate sfârși în câteva zile, sau se poate transforma în abces (să facă puroiu). Tratatment: odihnă, ungeri cu tinctură de iod, compresii, cataplasme sau cărpe cu apă de plumb, pansament umed (Priessnitz), vezicătoare sau puncte de foc, iar dacă a făcut puroiu se va deschide. Igroma *cronică*, se vede mai ales la cot și la genunchi, adeseori la rădăcina degetului mare dela picior. Cauza acestei forme sunt frecările repetate. Și aici avem o tumoră rotundă, la început nedureroasă, moale sau tare, care se dezvoltă încet, pe nesimțite. Ea poate rămâne mult timp pe loc dar se poate inflama și să formeze puroiu. Tratatment: la început se pot pune vezicători, puncte de foc, mai târziu se va deșerta punga și se va injecta tinctură de iod sau se va spăla punga cu acid fenic (5%), aplicându-se un bandaj compresiv, dar mai practic este să se *extirpe* tumora.

Igrometrie, *higrometrie* (gr. *hygros*, umed, și *metron*, măsură). — Partea fizice care se ocupă cu măsurarea cantității de aburi de apă cuprinși în aerul atmosferic. Această măsurare se face cu un instrument numit *igrometru*.

Ileotifus. — V. *Tifoidă* (Febră).

Luminat. — V. *Lumină*.

Iluziune (lat. *illusio*, dela *illudere*, a se juca, a-și bate joc de), *nălucire*. — Interpretare falsă a unei percepțiuni, cele mai adeseori a vederii, care este produsă de o stare anormală, de o excitațiune trecătoare, sau de o adevărată boală a părții creierului care primește impresiunea. Iluziunea este un simptom al unor boale de creier la copii. Iluziunea se deosebește de *halucinație* care este tot o nălucire, prin aceea că în halucinație totul vine dela individ, nu este obiect exterior, pe câtă vreme iluziunea este o senzațiune dată de un obiect real, însă denaturată printr-o aberațiune (rătăcire) proprie individului.

Imaginație (lat. *imaginatio*, grec. *phantasia*), *închipuire*. — Darul de a-și închipui oarecare lucru în mintea sa, sau de a reproduce un lucru văzut, auzit sau simțit; în cazul dintâiu imaginația este *creatoare* (imaginația propriu zisă), iar în cazul al doilea ea este *reproducătoare* (memoria senzațiunilor).

Imaginația creatoare este însușirea de căpetenie a poetului, a romancierului, a artistului, a muzicantului. Creațiunile imaginației nu sunt nici odată creațiuni absolute, ci numai combinațiuni nouă de elemente vechi, senzațiuni sau idei. În medicină *imaginațiunile* sunt ideile false, *alucinațiunile* și *iluziunile*. Mulți oameni au boală de imaginațiune, boală închipuită, adică au *ipocondrie*.

Imbalsamare (lat. *balsamatio*). — Păstrarea artificială a cadavrelor se face prin ajutorul îmbalsamării. Acest nume vine de acolo că în timpurile vechi îmbalsamarea se făcea cu substanțe balsamice. Organele cuprinse în cavități (cap, piept, pânțece) se scoteau, iar cavitățile se spălau cu lichide aromatice, apoi se umpleau cu *miră* (suc gumi-rășinos ce se scotea din trunchiul arborelui *balsamodendron myrrhae*, fam. amirideelor, care crește în Arabia și Etiopia) și alte substanțe aromatice prefăcute în praf; după aceea corpul se punea pentru mai mult timp într-o soluțiune de carbonat de sodă, apoi se scotea, se usca și i-se da un lustru oarecare, sau se cufunda în păcură (catran) și în cele din urmă se înfășa în niște feși gumate (Herodot.). La alte popoare îmbalsamarea se mărginea numai la uscarea cadavruului și înveluirea lui cu feși înmuiate în lichide aglutinative (cleioase) și balsamice. Astăzi îmbalsamarea se face injectând în arterele pieptului, pânțecului și creierului soluțiuni concentrate de sulfat de alumina, de clorur de aluminiu, de sulfat de zinc, de clorur de zinc, de iposulfid de sodă, de formol. Nu-i permis să se facă îmbalsamarea cu soluțiuni arsenicale. Imbalsamarea nu se poate face decât după 24 de ceasuri dela declararea morții la Primărie, înștiințându-se despre aceasta și poliția.

Imbecilitate (lat. *imbecillitas*), *nerozie*, *prostie*. — Un grad mai mic de *idiotie*.

Imbrăcămintă. — V. *Veșminte*.

Iminei. — V. *Incăltăminte*.

Iminentă (lat. *imminere*, a fi aproape de, a amenința), *iminență morbidă*, *amenințare de boală*. — Starea organismului care nu este boala, ci care pregătește boala, predispoziția la ea și-i

este antemergătoare, sau chiar primul grad al ei.

Imitație (lat. *imitatio*). — Imitația este însușirea de a face ce ai văzut pe altul făcând. Când două persoane trăiesc împreună, sau se văd foarte des, ajung cu timpul să aibă aceleași sentimente, aceleași pasiuni, cari conduc adeseori la îndeplinirea de fapte analoage, așa că imitația morală se transformă în imitație fizică. Lucrul acesta însă n'are importanță când acele persoane sunt amândouă sănătoase la minte, însă se schimbă când una din ele este atinsă de alienație mintală, de nebunie și cealaltă este de fel cam nervoasă și de un caracter mai slab, atunci această persoană poate să reproducă actele cele mai rele săvârșite de persoana nebună. Sunt multe *boale* cari se pot produce prin imitație, mai cu seamă la copii, la femei și la bărbatul impresionabil. Lucrul acesta se vede în ateliere, biserici, mănăstiri, pensionate, spitale de femei și de copii. Boalele cari se pot reproduce prin imitație sunt mai cu seamă isteria, coreea, epilepsia și diferitele ticuri. Pentru aceasta trebuie să se dea mare atențiune, mai ales în internatele de fete și când una din eleve este atinsă de vreo criză, sau de atac de nervi, să fie depărtată în așa mod ca să n'o vadă celelalte colege.

Inmoiere de creeri, ramolisment cerebral. — Această boală se arată de obicei la bătrânețe, după ce a trecut omul de 50 de ani. Adeseori înmoierea creerilor se arată ca o complicație a unei boale de inimă, care a fost produsă de un reumatism de încheieturi. Această înmoiere a substanței cerebrale precum și turburarea funcțiunii ei provine din aceea că la oamenii bătrâni și la cei ce au suferit de reumatism, arterele cari duc sângele la creeri sunt bolnave și nu duc destul sânge așa că creerul nu se hrănește în deajuns și începe să se moaie. Înmoierea de creeri se poate ivi în mod repede, sau cu încetul. În cazul din urmă boala se declară brusc, printr'o pierdere subită a cunoștinții, a mișcării și a senzibilității, întocmai ca într'un atac de apoplexie care însoțește emoragia cerebrală. La sfârșitul atacului bolnavul are o jumătate a corpului

paralizată, graiul pierdut și nu poate vorbi la înțeles chiar și atunci când i-a revenit inteligența, el este *afazic*. În aceste cazuri vom da bolnavului aceleași îngrijiri ca și la *apoplexie*, ferindu-ne de a-i lua sânge. Când înmoierea creerilor este *cronică*, adică se face încetul cu încetul, fără atac, bolnavul începe a avea o durere de cap stăruitoare, fixată într'un punct oarecare, către care își duce mâna neconștient, apoi el are furnicăături, amorțeli, o greutate și uneori crampe în membre, mai cu seamă la picioare; el este trist și în neputință de a munci. Mai târziu începe a i-se slăbi o mână și un picior, cari după câțva timp se paralizază. Afară de aceasta inteligența îi scade, iar cunoștința și-o păstrează întru câțva; memoria, judecata, precum și însușirea de a judeca, de a urmări o idee și de a lua o inițiativă sunt cu totul pierdute; bolnavul a ajuns în mintea copiilor. Înmoierea creerilor este un semn rău în toate cazurile și ea sfârșește prin moarte mai curând sau mai târziu, repede în cazurile de atac fără ca bolnavul să-și mai vie în fire, târziu, după luni, sau după mai mulți ani în cazurile cronice. *Tratamentul.* Se va trata boala care produce înmoierea creerilor (*boala de inimă, arterioscleroza, sifilisul*). Când înmoierea provine dintr'o astupare a unei artere (*tromboză, embolie* sau o *arterită* cronică) ne vom abține dela oricare tratament care slăbește, cum este luarea de sânge din vână, punerea de lipitori, vezicători, purgative tari. Vom opri bolnavul să bea vin, licoruri, tutun, fl vom opri dela munca cu creerii precum și dela orice excese, vom prescrie o hrană întăritoare, medicamente tonice, traiul la țară în plin aer, vom combate constipația vom face fricțiuni și vom da bolnavului cele mai bune îngrijiri. În cazurile de emiplegie vom prescrie electricitate, masaj.

Imobilizație (dela lat. *in*, negativ și *movere*, a mișca), *nemișcare*. — Când un os s'a rupt, după ce am potrivit capetele osului, punem membrul sau cea parte a corpului în care este osul rupt într'un aparat oarecare, pentru ca să ținem totul în nemișcare până se fierbe osul la loc, până se face *calusul*, până se vindecă. Imobilizarea

nu se întrebuințează ca mijloc de vindecare numai în fracturi (rupturi de oase), ci și în multe boale de încheieturi: entorză (sucitură), idartroză, artrită (cu deosebire cea tuberculoasă), etc., precum și în multe cazuri de răniri (plăgi) și de inflamații. Imobilizația se face cu ajutorul unor aparate, bandaje, gutiere (v. aceste cuvinte).

Impaciență (lat. *impatientia*), *nerăbdare*. — Sunt mulți oameni foarte nervoși, cari nu se pot stăpâni și veșnic sunt cuprinși de nerăbdare. Când un om, până aci liniștit, este cuprins de odată de nerăbdare, atunci aceasta este un semn că se petrece vreo turburare în interiorul lui și prin urmare trebuie căutată pricina acelei nerăbdări. Mai ales când vedem un copil, care de felul lui e liniștit, că e cuprins de nerăbdare, atunci putem să ne gândim că-i iese un dinte, ori că are limbrici, sau că-l paște altă boală mai gravă: spasme, meningită, sau vr'o febră eruptivă (pojar, scarlatină etc.), și să-l tratăm în consecință. La oamenii mari de asemenea nerăbdarea poate să fie vr'un semn de boală de piept, de inimă sau de ficat. În toate aceste cazuri se va trata boala care este cauza nerăbdării.

Impărăteasă, brei, cucurbețea, mutătoare, țidă de pământ (*Bryonia alba*, fam. cucurbitaceelor). — Principiul activ al acestei plante este *brionina*. În medicină se întrebuințează rădăcina ca purgativ. Se dă: 1 până la 2 gr. în pilule, alcoolatură 2—4 gr. pe zi, brionina 1—2 ctgr. — În popor se întrebuințează rădăcina ca emostatic și pentru durere de cap. În Banat, când cineva zace de lingoare, i-se pun sub spinare vițe de *Impărăteasă* cu fructe cu tot să zacă pe ele, iar *Impărăteasa* scoasă proaspătă se tae felii și se pune pe tălpile picioarelor. Rădăcina rasă și amestecată cu untură răncedă se întrebuințează pentru a vindeca chelia.

Impărăteasa-buruienilor. — V. *Mătrăgună*.

Impărătuș. — V. *Omușor*.

Impetigo (dela lat. *impetus*, furie, repeziciune, silnice), *dartră crustoasă, coji de lapte*. — Boală de piele care se arată prin niște pete roșii ce se acopăr de beșicuțe mici, cari, după 4—5 zile,

se rup și curge din ele un fel de apă, care în atingere cu aerul se îngroașe și se prefacă în niște coji sau cruste gălbui. Aceste coji cad și lasă în locul lor o pată roșie, lucitoare, care zămuiește și pe care se formează din nou alte coji. Apa din beșicuțe, dacă este dusă pe alte părți ale corpului, formează acolo aceeași erupție, aceeași boală, din care pricină această boală se vindecă greu și ține săptămâni și



Fig. 217.—Impetigo al feței

luni întregi. Când se vindecă, nu lasă semne. Boala aceasta se însoțește de mâncărimi, uneori foarte mari, cari silesc bolnavul să se scarpine și să-și întindă singur boala. Impetigo se ivește de obicei la cap, rar se întâmplă ca bolnavul să aibă febră, indispoziție, fiori și turburări digestive. Se arată mai cu seamă la cei limfatici. *Tratament*: pe dinăuntru, untură de pește, sirop iodotanic, sirop de iodur de fier, arsenic. Pe dinafară cataplasme de in, comprese sau cârpe ude (prisniț), ca să cadă cojile, apoi spălături cu apă boricată și ungeri cu alifii antiseptice și astringente: tanin 2 gr., calomel 1 gr., glicereu de amidon 30 gr.; sau: precipitat alb și oxid de zinc, câte 2 gr., vaselină 30 gr., de 2 ori pe zi.

Impletrirea vinelor (a arterelor). — V. *Aterom*.

Impotență (lat. *impotentia*), *neputință*. — Se numește astfel imposibilitatea pentru bărbat, sau pentru femeie, de a îndeplini actul generator, de a avea raport sexual. La bărbat neputința poate să provină din lipsă de sperină (sămânță), ea însăși produsă de atrofia, sau de un vițiu de funcționare a testiculelor; bărbatul este atunci steril sau *sterp*. Neputința lui mai poate să vie și numai dintr'un vițiu de conformație. De asemenea și femeia poate fi neputincioasă printr'un vițiu de conformație, fără ca să fie stearpă, deci neputința și sterpiciunea

nu sunt același lucru. Neputința rezultă adeseori dintr'o boală nervoasă, din excese, onanism, sau dintr'o boală cronică (ataxie locomotrice, diabet etc.). *Tratamentul* cel mai bun al neputinței, atunci când nu există nici o leziune organică, constă în a da reconstituante, tonice, hidroterapie, electricitate și dintre medicamente: vanilia, scorțișoara, preparatele de cantaride (foarte primejdioase) și preparatele de fosfor: acid ipofosforic diluat 10—30 picături în apă, de 3 ori pe zi, în momentul mâncărilor, sau acid fosforic diluat 10—40 picături în apă la masă. Se mai dă fosfur de zinc, 60 ctgr., extract de nucă vomică 1 gr. 30 ctgr. pentru 100 pilule, din cari se vor lua 3 pe zi, câte unul după mâncare, sau sulfat de strichnină 20 ctgr., acid ipofosforic diluat 120 gr., din care se iau câte 10 picături în apă de 3 ori pe zi, măbind doza cu câte o picătură pe zi până la 25 picături. (V. și *Yohimbina* și opoterapia testiculară). Pentru a stimula la femeie apetitul sexual se recomandă formula: extract de cannabis indica, extract de nuca vomică, câte 2 gr. din fiecare, extract apos de aloes 60 ctgr., să se facă pilule No. 100 și să se ia 3 pilule pe zi. În caz când impotența rezultă dintr'o conformație vicioasă se va face operație. — La *țară* babele vindecă neputința cu năpărcă, coada mânzului (*equisetum arvense*) pochinic (*asarum europaeum*), poroinic (*orchis morio*), scaiu voinicesc (*dipsacus silvestris*).

Impresionabilitate (lat. *impressio*, format din *in*, în și *premere*, a strânge). — Acest cuvânt așa de lung și de greu de pronunțat vine dela cuvântul *impresiune*, prin care în medicină se înțelege efectul produs de către un obiect exterior, care influențează sau lucrează asupra simțurilor noastre (auz, gust, miros, pipăit, văz), sau efectul produs asupra inimii și minții noastre printr'o emoțiune morală vie, printr'o noutate neașteptată sau prin citirea unei cărți. Este efect, sau această impresionabilitate, nu este într'o formă asupra tuturor, căci unii sunt din firea lor mai *impresionabili* decât alții, mai ales cei cu temperament nervos. Impresionabilitatea (căreia nu-i putem da un nume adevărat românesc) pe

deoparte predispune la boale nervoase precum și la boale de inimă, iar pe de altă parte ea este mărită prin aceste boale, așa că poate să devie în același timp și cauză și efect. Pentru a face pe cineva mai puțin impresionabil trebuie să-i întărim nervii. Vom recomanda o hrană întăritoare, hidroterapie, gimnastică sistematică și potrivită după om, exerciții și plimbări în aer liber, vom da *tonice*.

Imunitate (lat. *immunitas*, scutire), *imunitate morbidă*, *scutire de boală*. — Insușirea unui om de a nu primi o boală de care sufără alții. Imunitatea poate să fie din *naștere*, să ție de pildă de *idiosincrazie* de rasă, sau *câștigată* prin obișnuită sau prin faptul că omul a mai suferit odată de aceea boală (pojar, scarlatină, sifilis, vărsat, etc.), sau printr'un mijloc de pază direct (vaccinație). — Caută și la *Microbi*.

In (lat. *linum*). — În medicină se dă sămânța de in ca *laxativ* (pentru a înlezni scaunele): o lingură de grăunțe de in puse într'un păhăruț de apă simplă și lăsată acolo 10 minute, după care se beau cu apă cu tot seara la culcare. Când constipația este mai mare se pot lua de 2 ori pe zi câte o lingură de semințe, una la masa dela amiază și cealaltă la masa de seară. La copii și chiar la oamenii mari se mai poate da infuziunea (ceaiul) de in sălbatec, din 12 gr. la 120 gr. apă. Pe *dinafară* inul se întrebuințează ca *emolient* sub formă de *făină*, cu care se prepară *cataplazmele*, dar trebuie să întrebuințăm numai făină proaspătă, adecă făcută de curând, căci dacă se învechește ea se înăcrește și irită pielea producând erupțiuni.

Inăbușire. — V. *Sufocațiune*.

Inanție (lat. *inanitio*, dela *inanire*, a goli, a deșerta) *sfârșenie*. — Starea organismului produsă de lipsa totală de hrană și care cu timpul aduce moartea. Omul moare mai încet prin foame decât prin lipsa de aer sau de oxigen, de oarece pentru câțva timp continuă a se hrăni din carnea și grăsimea sa proprie (autofagie), până ce se isprăvesc și acestea. Inaniția poate să rezulte și dintr'o febră (tifoidă etc.), sau dintr'o boală nervoasă (isterie). Când suntem *pe nemâncate* suntem mai primitori de boale molipsitoare, de aceea

este bine ca să nu eșim din casă dimineța niciodată până ce nu am luat ceva hrană. — V. și *Abținență*.

Inapetență. (lat. *inappetentia*), *lipsă de apetit, lipsă de poftă de mâncare*. — V. *Anorexie, Apetit și Aperitive*.

Încălțăminte. — O încălțăminte bună trebuie să apere piciorul în contra frigului, a umezelei și a loviturilor. Să nu uităm că trebuie să avem încălțăminte potrivită după picioare, iar nu picioare după capriciile modei și ale cismarului. Este foarte greșită ideea de a lua măsura piciorului ținându-l ridicat în aer, căci încălțăminte trebuie să fie purtată de picior când calcă pe pământ. Prin urmare trebuie să cerem ca măsura să fie luată cu băgare de seamă pe piciorul desculț și în odihnă. Măsura trebuie luată pentru fiecare picior în parte, căci nu se potrivește întocmai piciorul drept cu cel stâng. Încălțămintele trebuiesc potrivite după mărimea picioarelor. Ele nu trebuie să fie prea scurte, nici prea strâmte, pentru ca să nu ne supere la mers, să nu ne facă să schiopăm, să nu ne facă hătături, sau să ne înfunde unghiile în carne, nici să nu ne schilodească degetele, dar nu trebuie să fie nici prea largi, ca să joace piciorul în ele, căci în acest caz pot produce rosături, cari sunt foarte dureroase și uneori primejdioase. Încălțămintele cele mai bune sunt cele cu vârfurile late și rotunjite la colțuri, în cari degetele stau comod. Talpa trebuie să fie destul de groasă pentru ca să ne apere de frig, de umezeală și de lovituri mai ales când avem de umblat mult și când suntem ocupați cu lucru înafară de casă. Tocurile sau călcăiele trebuie să fie late, bine așezate și nu înalte, dar nici prea joase ca să nu ne supere la încheietura piciorului când umblăm. Tocurile înalte, subțiri, sunt o nenorocire pentru mers, putând da naștere la scrintiri și suciri de picioare foarte primejdioase. Pielea încălțăminte, căputa, trebuie să fie mlădioasă și mai subțire pentru ca să se dea după picior fără să-l rănească, dar destul de tare pentru ca să-l apere de influențele exterioare. Încălțămintele făcute din stofă înlesnesc mersul, dar nu ne apără de frig și de umezeală; ele sunt bune numai pentru cei prea simțitori

și cari stau în casă. Încălțămintele de lac și cele de cauciuc nu sunt bune, căci ele sunt impermeabile și țin picioarele prea reci iarna și prea calde vara. Încălțămintele căptușite pe dinăuntru nu țin cald decât când sunt nouă, căci dacă se învechesc căptușala se îndeasă, se bate și nu mai țin cald, așa că lâna, flanela, sau vata trebuiesc schimbate des; este mai bine pentru cei ce sufăr de frig la picioare să-și pună în încălțăminte tălpi mobile de păslă, de plută, sau de paie. — Ghetele sunt mai bune decât pantofii, căci îmbracă bine piciorul și glesnele; cizmele sunt mai bune numai în anumite împrejurări, când merge omul la vânatoare, sau are mult de umblat prin noroaie și ploi, când îl apără de umezeală și răceală. Opinca este o încălțăminte ușoară și călduroasă, când se aplică pe ciorapi sau obiele bune și potrivite anotimpului. Ea este destul de durabilă și costă cu mult mai puțin decât botinele și cizmele, se încălță și descălță cu ușurință, se acomodează mai bine după forma piciorului, așa că umbletul se face cu multă ușurință. Dar, opinca nu acopere partea de sus a piciorului și nu-l fereste de umezeală, ea este rea pentru noroiu, când acesta trece peste marginile ei. Este bine ca omul, când vine acasă, să se descălțe de ghetă sau cizme și să ia papucii sau pantofii, căci piciorul se odihnește mai bine și se aerisește.

Încălzit. — Corpul omului are căldura sa proprie, numită *căldura animală*, produsă prin arderile cari se petrec în organismul său. Oamenii sănătoși și bine nutriți produc mai multă căldură decât cei slabi, cei maturi mai multă decât copiii și bătrânii. Aerul rece ia o parte din căldura corpului nostru și când aerul nu este prea rece este de ajuns să ne îmbrăcăm și să ne hrănim bine pentru ca pierderea căldurii noastre să nu fie prea mare și vătămătoare sănătății. În timpul iernii însă trebuie să recurgem la căldura artificială pentru ca sănătatea noastră să nu sufere, să nu se strice, căci lipsa căldurii artificiale sau insuficiența ei, produce o slăbire tot așa de mare ca și lipsa de hrană. De aceea trebuie ca locuințele noastre să fie în timpul iernii bine încălzite, tot așa și

școalele, spitalele, căzărmiile, închisorile, teatrele, etc. pentru ca să nu se vatăme sănătatea locuitorilor. Aparatele bune pentru încălzirea *artificială* trebuie să întrunească următoarele însușiri : să nu strice aerul camerilor sau odăilor locuite, prin produsele arderii, sau prin particulele materialului de ars, să nu lase înăuntrul locuințelor aerul care și-a pierdut oxigenul prin ardere, ci să-l scoată prin coș, să dea locuinței destulă căldură, arzând tot materialul de ardere precum și produsele distilațiunii acestui material, să nu producă repede căldură prea mare și să nu răcească curând, în fine, să fie potrivit de mari după mărimea locuințelor. *Căldura artificială* se produce prin arderea carbonului din materialele de ardere, cum sunt : lemnele, cărbunii, turba, stuful, etc. cari, luând oxigenul din aer, se preface în acid carbonic și apă. Dar fiindcă arderea nu se face mai niciodată pe deplin, aceste materiale mai produc și alte substanțe, cum sunt : oxid de carbon, carbur de hidrogen, acid acetic, creozot, particule de cărbuni nearși și dacă ardem cărbuni de pământ mai produc și sulfur de hidrogen și acid sulfuros. Aparatele cele bune nu lasă ca acele produse ale arderii să se împărtășească aerului din locuințe, pe câtă vreme aparatele rele expun pe locuitori ca să respire acele gaze primejdioase, ceea ce poate să-i îmbolnăvească rău. *Oxidul de cărbune* este unul din gazele cele mai otrăvicioase. Inchiderea sobelor prin capac înainte de a se fi ars toate lemnele, sau tot materialul de ardere din ele, dă loc de asemenea la încărcarea aerului din locuință cu oxid de cărbune, din care pricină nu trebuie nici odată să se pună capacul la sobă, afară numai când avem capac găurit în mai multe locuri. — *Căminul* țărânului român duce afară din casă numai o parte din fum și o parte din oxidul de cărbune, pe câtă vreme cealaltă parte se comunică aerului din casă. Tot astfel lucrează și *sobe*le rău făcute, sau crăpate precum și coșurile rău așezate, cari lasă să intre o parte din fum, cu o parte din oxidul de cărbune. Același lucru îl face și punerea capacului la sobă înainte de vreme. Când fumul iese prin coș el ia cu sine o parte

mare din căldura produsă de ardere. Căminul are neajunsul că arde mult material și produce puțină căldură, dar în schimb *ventilează* bine aerul din locuință. Prin cămin se pierd cam 5 din 6 părți de căldură. Sobe de fier și de tuci nu sunt bune pentru locuințe și pentru spitale din pricină că ele se încălzesc prea repede și se răcesc foarte iute. Afară de aceasta aerul din casă, care mai întotdeauna este încărcată cu pulberi organice, vine în atingere cu fierul înroșit al sobei care arde acele materii organice și produsul acestei arderi îl respiră cei ce locuiesc în casă. Astfel se explică și mirosul cel urît pe care îl dau sobele de fier când sunt bine încălzite. Sobe de fier mai au încă un neajuns mare, căci ele, încălzind aerul prea repede, aburii de apă ce-i are el nu mai sunt îndeajuns pentru a-l satura la o temperatură mare, așa că aerul ia apa care-i mai trebuie dela obiectele din casă, dela pereți și mobile, dela suprafața corpului și dela plămâni. Astfel se explică uscăciunea de gât pe care o simțim când trăim în odăi încălzite cu sobe de fier, lucru care se poate ocoli întru câtva dacă punem pe sobă un vas cu apă în permanență, așa că aburii cari ies din acea apă mai umezesc puțin aerul din odaie. Cu tot cusurul lor, sobele de fier însă sunt mai bune pentru oamenii săraci, fiind mai economice, trebuie numai să se aibă în vedere că la început focul să fie mai mic, ca să nu se încălzească soba prea repede și să nu se pună lemne multe de odată, ci mai puține. Pentru a scăpa de aceste neajunsuri precum și de acele mai sus pomenite s'au inventat diferite sisteme de sobe de fier, unele mai bune decât altele, fără însă să fi ajuns la perfecțiune, dar cari sunt prea scumpe. Cele mai bune sobe sunt acele din *faianță* (pământ ars smălțuit) și pentru cei săraci acele din *căramidă*. Aceste sobe nu usucă aerul, nu se răcesc așa iute. *Ventilația*, sau primenirea aerului, din locuință, în timpul iernii, se face și prin sobe, căci focul ce se face în sobă încălzește aerul din coș, iar aerul acesta, devenind astfel mai ușor, se urcă în sus și trage după sine aerul din odaie, care la rândul său atrage

aerul de afară prin crăpăturile dela ferestre și dela uși, așa că prin modul acesta aerul din case se primește neconținut în timpul cât arde focul în sobă. Puterea ventilatoare a sobelor se deosebește după modul de construcție și după mărimea lor, ea poate fi dela 40 până la 100 metri cubi într'un ceas. Sobeile oarbe, adică acele a căror ușă nu se află în odaie, ne lipsesc de acest puternic mijloc de ventilație. — Stabilimentele publice se servesc astăzi pentru încălzit de *calorifere*, cari încălzesc casele prin *apă caldă* sau prin *aburi de apă*, cari merg prin țevi în toată casa; aceste calorifere pot produce uneori explozii și prin urmare pot fi primejdioase. De altfel caloriferele nu se recomandă pentru locuințele particulare fiind prea costisitoare și stricarea lor împiedică încălzirea clădirii, în tot timpul reparației. Caloriferele cu aer încălzit au un mare avantaj înlesnind ventilațiunea sistematică. Incălzirea prin arderea *gazului de iluminat* nu se poate face decât în orașele unde se fabrică acest gaz și unde se găsesc și aparate speciale pentru această încălzire.

Încărunțire. — V. *Canție* și *Păr*.

Înceietură (Înțepenire de). — V. *Anchiloză*.

Înceieturi. — V. *Articulațiuni*.

Închipuire. — V. *Alucinațiune* și *Imaginațiune*.

Încinerățiune (dela lat. *cinis*, cenușe), *arderea* sau *cremațiunea cadavrelor*. — Operațiune care constă în a arde un corp pentru a obține sub formă de *cenușe* părțile fixe, minerale, pe cari le conține. Nimicirea repede a cadavrelor prin ardere are foarte multe avantaje din punct de vedere igienic asupra *înmormântării*, în care putreziciunea se face foarte încet prin ajutorul microbilor *saprofizi*. Din punctul de vedere al medicinei legale, arderea are inconvenientul că nu s'ar mai putea descoperi numeroasele cazuri de otrăviri sau alte morți forțate.

Înciziune (dela lat. *in*, în, și *caedere*, tăiere). — Tăierea metodică a părților moi (piele, mușchi, vine etc.) cu ajutorul unui cuțit sau a unui bisturiu, unei foarfeci, unui galvanocauter, pentru a face operațiune de puroiu (abces), un furnicel, un antrax (serpengea).

Inciziunea se face întotdeauna de doctor și prin urmare nu e trebuință să arătăm aci cum trebuie făcută. Este mai bine ca o colecție de puroiu să se deschidă prin inciziune (de către doctor) decât să se deschidă singură, de oarece se scurtează durerile și semnul care rămne este cu mult mai mic.

Incompatibilitate (dela lat. *in*, negațiune, *cum*, cu, și *patir*, a suferit), *nepotrivire*. — S'a crezut că sunt unele boale cari nu pot atinge pe om când el suferă de alte boale, adică o boală nu poate exista în organism în acelaș timp cu alta. — Incompatibilitate însă poate exista între două medicamente, cari lucrează în senz contrar, s'au că date amândouă în acelaș timp s'ar combina și ar produce un nou medicament otrăvitor, cum ar fi de exemplu calomelul cu iodurele, etc., și prin urmare nu trebuie date niciodată în acelaș timp.

Incontinență (dela lat. *in*, negativ, și *continere*, a conține, a reține). — Când omul iese cu udul și are scaune fără voia lui, sau fără știrea lui, se zice că suferă de *incontinența urinii* sau *incontinența materiilor fecale*. Sunt cazuri în cari omul poate suferi de amândouă aceste incontinențe în acelaș timp. — Cauza cea mai frecventă a incontinențelor nu este datorită la o boală a organelor cari servesc la închidere, ci la o boală a sistemului nervos, mai cu seamă a celui central, care produce *paralizia sfincterelor* (a mușchilor circulari cari se găsesc la gâtul beșicii și la șezut) cari se împotrivesc la eșirea udului din beșică și a materiilor fecale din șezut, cum se întâmplă în epilepsie, sincopă (leșin), apoplexie cerebrală, paralizie generală, alienație mentală, sau în febrele grave, în deosebi în febra tifoidă. Incontinența se poate produce și printr'o leziune anatomică, organică, ce se împotrivesc la închiderea sfincterelor. Astfel la șezut se poate ivi incontinența materiilor fecale în urma unei operațiuni de fistulă anală, sau a unui boale cum este cancerul, etc.; tot așa și la beșică în urma unei operațiuni, a trecerii unei pietre mari prin gât, a unui cancer, a unei tumori a prostatei, etc. Se înțelege că tratamentul incontinențelor produse de boale constă în tratamentul

acelor boale și prin urmare nu e trebuință să mai înzistăm asupra lui aci.

Inerucișat. — V. *Strabism*.

Incubațiune (lat. *incubatio* dela *in*, în, pe, și *cubare*, culcare). — Timpul sau perioada care trece din minutul în care a intrat sămânța boalei (virus, microbi) în corp și până la ivirea primelor semne ale ei. Această perioadă de incubațiune poate varia dela câteva ceasuri (scarlatină până la mai multe săptămâni (turbare). În timpul acestei perioade microbii (vezi acest cuvânt) se înmulțesc din ce în ce mai mult și când au ajuns la un număr oarecare, la care organismul nu mai poate rezista, boala izbucnește.

Incuire. — V. *Constipație*.

Incuietură. — V. *Constipație*.

Incurabil (lat. *incurabilis*, dela *in*, negațiune, și *curare*, a îngriji a trata); *care nu se poate vindeca.* — V. *Boale*.

Inercătură de mâțe. — V. *Intestin (ocluziune intestinală)*.

Indigestie nemistuire, aplecate, ciu-murluială. — Prin cuvântul *indigestie* se înțelege o turburare repede și tre cătoare în actul mistuirii. Sunt mai multe pricini cari pot da naștere la această boală și anume: când cineva mănâncă prea mult, sau când mâncarea este rău pregătită, ori este decalitate rea. Indigestia se ivește adeseori la oamenii slabi, sculați după o boală lungă și grea, la copii, la oamenii cari mănâncă prea iute și nemestecat bine, sau cari îndată după masă au plecat cu trăsura sau au dansat cu stomacul plin, la cei cari răcesc în timpul mesei, sau îndată după mâncare, sau cari au luat băuturi, gheață, ori au mâncat prea multă înghețată. Este de multe ori produsă de cărnurile sărate, de mâncările grase, de grăsime, de peștii învechiți, stricați, când ele nu au fost bine fierse, de pepeni, de castraveți, salată, ouă răcoapte unele feluri de prăjituri, etc. Nu este bine ca omul să mănânce prea iute, prea lacom. Bețivilor li se strică foarte des stomacul, ei au de obicei mistuirea grea. — *Semnele indigestiunii* sunt mai multe: ea se arată de obicei la câteva ceasuri după mâncare; omul se simte rău, are limba albă și încărcată, greutate și arsură la lingurea, greață și icnituri acre și

puturoase, însoțite de o durere de cap și de un rău general; în cele din urmă îl apucă vărsăturile, dând afară mai toate materiile din stomac, adeseori este cuprins și de urdinare în același timp. Nemistuirea este primejdioasă la oamenii slăbiți de vr'o boală, căci îi poate întoarce boala; la copii și la oamenii supărați sau cari sufăr de boală de inimă. — *Tratament.* Cel bolnav să caute să verse luând un pahar de apă caldută, sau gâdilindu-și fundul gurii cu o pană sau cu degetul, sau să ia mai întâiu *ipeca*, 1 gr. omul mare, 30 până la 50 ctgr. copiii și apoi să bea apă caldă pentru ca să înlesnească vărsăturile. Când omul a vărsat dela sine să-i dăm un ceaiu de teiu, de mușețel, de izmă, de melisă, ori de foi de portocale, vom da un *purgativ* (sulfat de sodă, oleu de ricin, calomel, scamonee) etc. Se mai pot pune la lingurea cataplazme calde de făină de in, sau muștar. În timp de 24 de ore omul se va hrăni numai cu lapte dulce fără smântână, lapte bătut, zeamă de carne fără grăsime. Dacă scaunele miroase rău se vor da anti-septice intestinale (benzonaftol, salol, betol, cărbune de tei, ichtalbină, 1—2 gr. în buline). Câteva zile dearându-l bolnavul va ține dietă aspră: supă, lapte dulce, lapte bătut, câte un ou moale, prea puțină carne (mușchi) friptă pe jumătate și câte puțin vin în apă.

Indispoziție. — Este o turburare ușoară și trecătoare a sănătății, sau o turburare întâmplătoare și vremelnică a unei sau mai multor funcțiuni. Indispoziția nu este o adevărată boală, care se deosebește prin semne vădite și de durată mai lungă. O indispoziție ține de obicei 1—2 zile, cel mult trei, și când trece de acest termen trebuie să ne gândim la o boală serioasă, care este pe cale de a se arăta și prin urmare să chemăm doctorul ca să ne scoată din încercătură. Cel mai bun sfat ce putem da cetitorului este că ori de câte ori este indispus să-și întrerupă pentru moment ocupațiile, să se odihnească, să ia o curățenie și să țină oarecare dietă, mâncând numai lapte și lucruri ușoare.

Indopare. — V. *Gavaș*.

Inecăciune. — V. *Sufocațiune*.

Inecăciune de piept. — V. *Esuflare*.

Inecare, submersiune (lat. *submersio*).

Când se înecă omul se pot întâmpla trei lucruri : sau se sbate în apă până la *asfixie* completă, sau cade în *sin-copă* (leșin) ceea ce nu-i oprește îndată mișcările respiratoare, sau este izbit de emoragie, sau de congestie cerebrală (revărsare sau îngrămădire de sânge la creeri) și poate să moară mai înainte ca asfixia să fie completă. În orice caz, îndată ce înecatul a fost scos din apă datori suntem să facem totul pentru a-l readuce la viață. Pentru aceasta vom începe a-l desbrăca repede de haine tăindu-le, apoi îl vom *culca pe spate*, întorcându-l puțin pe partea dreaptă și puțin aplecat, pentru ca să poată să curgă lichidele mucoase din gât (din *trachee*); vom *curăți gura* de mucozitățile și de nisipul din ea cu degetul, vom căuta să mai verse o parte din apa cuprinsă în stomac, înfundându-i degetul arătător în gură pentru a-i provoca vărsături. Nu-l vom spânzura niciodată cu picioarele în sus, după cum se obișnuiește. Vom căuta să-l *încălzim* cât se poate mai iute, plimbând pe toate părțile corpului cărămizi încălzite sau sticle umplute cu apă fierbinte, îl vom fricționa cu flanelă caldă uscată sau înmuiată în liniment amoniacal, îl vom freca cu putere pe șira spinării și pe tot spatele, precum și pe membre; în regiunea inimii, pe pânzele însă vom freca mai încet, mai cu cruțare. Se vor freca cu peria, încet și mult timp, palmele și tălpile; se va pune sub nasul înecatului o sticlă plină de oțet sau cu amoniac, vom face compresiuni (apăsări) în mod alternativ pe piept și pe partea de jos a pântecelui, pentru a stabili și a menține ventilațiunea plămânilor, continuând această *respirațiune artificială* timp de una sau două ore fără a ne opri un moment. La trebuință vom recurge la insuflație de aer în plămâni, făcută încet și cu ajutorul unui tub de gumă lung de 16—18 cm. Vom prefera însă *tracțiunile ritmice ale limbii*, prinzând limba și trăgând-o înapoi cu putere, la intervale regulate, așa ca să fie 15 până la 16 tracțiuni pe minut. Se va continua cu aceste trac-

țiuni în mod ritmic timp de una, două, trei și chiar patru ore, chiar și în cazul când înecatul a stat în apă o jumătate sau o oră întreagă. — *Îngrijirile cari se vor da înecatului după ce și-a venit în fire* : îl vom culca în pat și-l vom lăsa să se odihnească câțva timp. Dacă în timpul somnului fața bolnavului din palidă ce era devine roșie prea tare; dacă, după ce s'a deșteptat bolnavul, cade într-o stare de somnolență, i se va pune muștar între spete, la părțile dinăuntru ale coapselor și la pulpe.

Inele. — Uneori se întâmplă ca degetele cari poartă inele să se umfle din cauza unei răniri, sau căldurii, sau când se ivește vr'un sugiu. În acest caz trebuie să căutăm repede să se desumfle degetul, pentru ca să putem scoate inelul. Pentru aceasta punem mâna în apă rece în timp de câteva minute având grija ca să reînnoim apa pe măsura în care se încălzește; mâna se desumflă astfel repede și inelul iese singur din deget. Acest mijloc isbutește întotdeauna când îl întrebuițăm dela început, mai târziu însă va trebui să se taie inelul cu o pilă. În timpul nopții e bine să nu dormim cu inelele, căci degetele la căldură se umflă. De asemenea trebuie scoase inelele când umblăm cu alifie mercurială, căci mercurul înălbăște aurul.

Infecțioase (dela lat. *infectio*, care vine dela *inficere*, a strica); *boale infecțioase*. — Aceste boale sunt produse prin îngrădirea într'un spațiu restrâns a unei mase de materii organice eliminate și vătămătoare (căzărmi, tabere, spitale, închisori, vapoare, etc.). Infecțiunea nu lucrează decât numai în sfera focarului astfel creat. Boalele infecțioase cele mai de căpetenie sunt febra tifoidă (lingoarea), tifosul, ciuma, colera; ele au drept origine *microbii* (vezi acest cuvânt).

Infecțiune intestinală. — V. *Microbi*.

Infecțiune paludiană. — V. *Paludism*.

Infecțiune puerperală. — V. *Puerperală* (Febră).

Infecțiune purulentă. — V. *Pioemie*.

Inflamație (lat. *inflammatio*, dela *flamma*, flacăra), *aprindere*, *obrinteală*, *obrintire*. — Este o stare bolnăvicioasă constituită printr'un aflus, sau îngrămădire, de sânge în vasele capilare ale

INFL

unei regiuni sau părți a corpului, cu toate urmările sale: căldură, exudație de ser sangvin, roșeață, umflare și durere. Când inflamația este *externă*, pe dinafară, ea se poate cunoaște ușor după semnele principale ale ei: căldură, roșeață, umflare și durere, la cari se mai adaugă și alte simptome generale, cum sunt: sete, lipsă de poftă de mâncare, turburări în mistuire, durere de cap, lipsă de somn, delir (aiurare), greutate la respirație și grăbirea pulsului, care bate cu mult mai des decât în stare de sănătate. Orice inflamațiune externă, pe lângă semnele locale, are și semne generale, mai mult sau mai puțin pronunțate. Când inflamația este *internă*, pe dinăuntru, cum se întâmplă în: meningită, pneumonie, gastrită (aprinderea stomacului) etc., nu se poate vedea, nu se poate pipăi și se cunoaște prin semnele generale (căldură, sete, inapetență, etc.) și prin semnele *speciale* ale fiecărei boale pe care singur doctorul le știe și le pricepe. — *Cauzele* inflamației sunt foarte multe, astfel avem: frecările repetate la îndoiturile naturale ale pielei, la copii și la persoanele grase (la subțioară, la cot, la stinghie, sub genunchi), loviturile, strivirile, tăieturile, înțepăturile, arsurile; introducerea sub piele sau în sânge a unui virus, a unei otrăviri, a unor microbi, etc. Sunt cauze cari provoacă o inflamațiune profundă: un organ poate să se aprindă prin lucrare prea mare, prea obositoare, cum este gâtul la cântareți și oratori, printr'o excitație des repetată cum este stomacul la bețivi și mâncăcioși, sau prin acțiunea frigului, care dă naștere la guturaiu, tusă, pneumonie, pleurezie etc. — *Tratamentul* inflamațiunii variază după cauzele ei și după organul care s'a aprins. Sunt unele reguli generale cari trebuiesc ținute în seamă în toate cazurile și anume: *șederea în pat* ori de câte ori inflamația este mare, *întinsă și însoțită* de simptome generale mai pronunțate, *odihna organului bolnav*, *hrana sau alimentația* să fie ușoară și formată mai ales din lichide. — *Topicele*, adică medicamentele cari se aplică pe dinafară și pe locul inflammat, variază după împrejurări, astfel sunt: ghiața și apa

INFL

rece sub formă de cârpe sau comprese, cari sunt foarte bune, aplicate fiind în mod prelungit și continuu; când aceasta nu se poate face și când durerile sunt prea tari și dacă este amenințare de gangrenă vom pune cataplazme calde, emoliente stropite cu laudan, sau alte oblojeli domolitoare.

Infirmierie. — Localul unde sunt îngrijiți bolnavi. În școli și în căzărmi sunt destinate anumite camere, unde se așează bolnavii a căror suferință este mică și trecătoare. Dacă presupunem o boală mai serioasă, care ar cere îngrijiri mai mari, sau operații, bolnavii sunt trimiși la spital. În timp de epidemii se înființează infirmerii și în satele contaminate și în aceste case se așează bolnavii ca să nu mai vină în atingere cu cei sănătoși, cărora le-ar putea da boala.

Infirmier, infirmieră, sanitar. — Este astfel numit cel care îngrijește de bolnavi. În spitale sunt anumiți oameni (bărbați și femei) cari stau tot timpul între bolnavi dându-le îngrijirile pe cari le-a poruncit medicul. Acești ajutoratori ai medicului sunt pregătiți în școli speciale pentru acest scop. — *Infirmierii militari*, sau sanitari, sunt întrebuințați, în timp de război, la spitalele sau posturile de ajutor din apropierea frontului, pentru a îngriji de răniții căzuți în luptă și aduși la acele posturi de către brancardieri, pe tărzi sau sprijiniți. În timp de război serviciul de infirmier îl fac și femeile, dar la spitalele din depărtarea frontului de luptă. Pentru acest scop societatea „Crucea Roșie” pregătește în fiecare an un număr mare de membre, cărora li se dau învățături din timp cum trebuie să îngrijească de răniți și de bolnavi.

Infloreală. — V. *Mucezeală*.

Influență, gripă. — Influența este o boală epidemică ce isbește fără deosebire un număr mare de oameni, mari și mici, al cărei mod de întindere este foarte neregulat și al cărei început coincide cele mai adeseori cu schimbările de temperatură, deși nici o condițiune atmosferică nu o poate explica. Această boală epidemică, contagioasă, este produsă de un *microb* descoperit în anul 1892, care se cunoaște sub numele de *cocco-bacilul* lui Pfeiffer și

care are forma unui bețișor foarte scurt, foarte fin, aproape tot așa de lung cât și de gros, rotund la capete, câte odată asociați câte doi (diplobacili), imobil. Singur sau asociat cu alți microbi, el se găsește în mare număr în salivă și în scuipat, este aerob și se colorează bine cu fucsina fenicată diluată. Microbul influenței, care de altfel nu se găsește decât numai în această boală, poate să se întovărăsească cu o sumedenie de alți microbi, din care pricină nu este nici o altă boală în care infecțiunile secundare (complicațiunile) să fie așa de numeroase, așa de variate și să joace un rol așa de mare, ca în influență. Microbul gripei se poate asocia cu streptococul, stafilococul, pneumococul, etc. dintre cari cel mai răutăcios și mai neastâmpărat este *streptococul*, care, fiind în tovărășie cu microbul influenței, capătă o putere (o virulență) din cele mai mari, producând amândoi o infecțiune generală (septicemie) sau diferite infecțiuni locale (pleurale, pulmonare, meningeene, etc.). Perioada ei de *incubație* (încuibare) nu trece niciodată peste 24 ore și *începutul* este brusc, dintr'odată și aproape pe neașteptate, cu dureri în tot corpul, mai ales la mâni și picioare, cu ochii lăcrămânzi, nasul infundat, strănutări repetate, limba albă sau gălbuie, gâtul uscat, greutate la înghițit, uneori dureri de gât, tusă uscată, obositoare, chintoasă, cu greutate la respirat, sete, lipsă de poftă de mâncare, vărsături, alteori diaree, are febră care variază dela 38 și jumătate până la 41 grade. Deși la început boala se pare a fi foarte gravă, ea se vindecă mai întotdeauna după 8—10 zile, prin sudori abundente, având însă o convalescență înceată și bolnavul își recapătă puterile cam târziu. Pe lângă această formă care se poate numi *comună*, influența are și alte forme, dintre cari unele foarte grave: *toracică*, *nervooasă*, *gastro-intestinală*, *emoragică*, *otită*. — *Tratament*: Influența *ușoară* se vindecă singură, pe câtă vreme cea *gravă* de multe ori cere un tratament foarte lung și variat, iar când se vindecă lasă pe bolnav într'o stare de slăbiciune mare, expus la tot felul de molipsiri. Fiindcă nu putem ști dela început, chiar în

formele ușoare, ce poate aduce o influență, este bine s'o combatem cu energie chiar din prima zi. *Profilaxia individuală* se poate aplica cu oarecare succes. În timp de epidemie, dacă se ivește unul sau mai multe cazuri într'o comunitate (școale, internate, cazărmi, etc.), se recomandă să se *izoleze* îndată bolnavii și la trebuință să se închidă școalele, să se golească stabilimentul. În familie să se izoleze bolnavul și să se dezinfecteze camera sau casa, cu aburi de esențe antiseptice (timol, eucaliptol, etc.), să se măture cu cărpe înmuiate în sublimat coroziv (1 la 1000), după ce a trecut boala să se dezinfecteze odaia și tot apartamentul cu *formol*, iar rufăria să se treacă prin *etuvă*. Acest microb este foarte ușor distrus de soare, de aceea, de multe ori, este suficient să lăsăm ferestrele și ușile deschise mai multe zile și să așezăm rufăria la soare și obținem o bună dezinfecție. Omul sănătos să se ferească de cei gripați, să evite orice exces, oboselile, răcelile, ceața, sălile de spectacol (teatrele etc.), și orice loc de întrunire. Fiindcă microbul influenței pătrunde de obicei prin căile respiratoare, vom pulveriza în casă esențe antiseptice și vom face o antisepsie amănunțită a nasului și gurii, vom pune în nas de 2 ori pe zi ulei de vaselină mentolată (cu 5 la 100). — Vom recurge dela început la *regim de lapte*, la *purgative și diuretice* (curățenii și medicamente cari fac ud mult). Indată ce omul s'a îmbolnăvit să ia 1 gr. de sulfat sau cloridrat de *chinină* și 1 gr. de *aspirină*. Se înțelege dela sine că bolnavul va sta în casă, într'o cameră potrivit de încălzită. Pe lângă lapte va putea bea băuturi calde și sudorifice (ceaiu de nalbă, și de alte flori pectorale), ceaiu rusesc, cafea. Va face gargară cu permanganat de potasiu 1 la 1000 sau cu apă oxigenată. Pentru a combate căldura (febra) se mai poate da bolnavului antipirină, antifebrină, aspirină, fenacetină, mai multe zile dea rândul, toate acestea potrivite după etatea bolnavului. Se mai recomandă la început *băi calde*, cari ar scurta durata boalei. Când căldura este foarte mare și stăruitoare se pot face băi de 30' sau chiar de 25'. Pentru tusa se

dă aconit, codeină, iosciam, bromoform, etc., iar pe piept se vor aplica muștare, ventuze, ungeri cu tinctură de iod, iar când flegma iese cu greutate se va da clorhidrat de amoniac, pulberea lui Dower, ipeca, scila. Dacă scuipatul este prea abundent se vor prescrie balsamice, terpină, terpinol, acidul benzoic etc. În cazurile de complicațiuni tratamentul variază după felul lor.

Infirmitate (lat. *infirmitas*, dela *infirmus*, bolnav). — Un orb, un surd, un idiot, un schiop, un ciung, toți aceștia nu sunt bolnavi, ci *infirmi*, adică sufăr de o *infirmitate*, de o *neputință*, sunt niște *nevoiași* sau *schilози*. Infirmitățile pot fi din naștere, adică *congenitale*, sau pot proveni dintr'un *accident* sau *boală*. Nu toate infirmitățile sunt *incurabile*. Dacă medicina nu poate vindeca un idiot, chirurgia însă poate însdreveni pe mulți schilози și infirmi: un copil cu picioare strâmbe din naștere poate, prin operație, să umble ca tot omul, un orb din pricina perdelelor (cataracte) poate să vadă, etc.

Infuziune (lat. *infusio*, dela *infundere* a turna, a vărsa pe), *ceaiu*. — O infuziune se face turnând apă fierbinte peste o substanță vegetală pentru a-i extrage principiile active și lăsând apoi să se răcească, sau se mai poate face ceaiul aruncând această substanță în apa care fierbe, luând repede vasul de pe foc și acoperindu-l bine. Această operație se numește *infuziune* sau *ceaiu*, spre deosebire de *decoctiune* sau *fierțură* în care substanța vegetală se fierbe în apă timp mai îndelungat. Infuziunea sau ceaiul este *mai slab*, sau *mai tare*, după cum și planta a stat în contact cu apa timp mai puțin sau mai mult; câteva minute ajung pentru flori și frunze, ceva mai mult pentru rădăcini. Ceaiul se prepară mai bine în vase de porțelan sau de pământ, decât în vase de metal cari se răcesc prea iute, când este nevoie ca substanța vegetală să fie în contact mai lung cu apa. Se face infuziune din *flori*, din *frunze* sau *foi*, din *rădăcini*. Se mai face ceaiu din muguri de brad, din capete de mac, din lămâie, din coaje de chin-china, din sămânța de in, etc.

Inghețată. — V. *Gheață*.

Înghițire. — V. *Deglutițiune*.

Înghițură. — Prin acest cuvânt se înțelege câtimea de apă, sau de oricare alt lichid, câtă se poate înghiți dintr'odată. Dar această măsură nu este tocmai bună când este vorba de medicamente, căci gâtul nu se lărgeste în timpul înghițirii la toți oamenii de o potrivă. Prin urmare când vom da medicamente de băut le vom da cu lingura. sau cu lingurița, ori în picături, lăsând înghițiturile pentru limonade, pentru apa înroșită cu vin, sau pentru alte băuturi nevătămătoare.

Îngreunare. — V. *Sarcină*.

Îngropare. — V. *Inhumare*.

Îngvinală (Regiunea, Indoitura). — V. *Stinghie*.

Inhalație (lat. *inhalatio*, dela *inhalare*, a însufla, a sufla înăuntru). — Acest cuvânt însemnează a trage prin



Fig. 218. — Cum se face inhalația (cu capul acoperit de cearșaf)

gură aer simplu, aer comprimat, aer încărcat cu aburi medicamentoși, care pătrunzând până la plămâni lucrează asupra gâtului, gâtulejului (laringelui) și bronhiilor, sau asupra organismului întreg după ce au pătruns în sânge prin absorpțiune. Prin inhalațiune pătrunde cloroformul, sau eterul în corpul omului și-l adoarme ca să nu simtă durere în timpul operației. Tot prin inhalațiune pătrund și lucrează aburii de eter, amoniac, oțet, când apropiem sticla cu aceste medicamente de nasul bolnavului amenințat de sfârșeală, leșin, asfixie. Se mai fac inhalațiuni cu aburi de ape minerale în boalele de gât și de laringe, când aburii pătrund sub formă de praf sau pulbere, din care pricină această operațiune se chiamă *pulverizațiune*. Inhalațiunile se

întrebuințează foarte mult în boalele de piept: brochită, astmă, emfizem (năduf), oftică, etc., când se fac sau cu aer comprimat, cu oxigen, sau cu aer încărcat cu substanțe aromatice și antiseptice, cum sunt: esențe de brad, principiile active ale gudronului, etc., cari pătrund în plămâni sub presiunea obținută și regulată cu ajutorul unor aparate speciale (clopote pneumatice, cabine speciale, etc.), sau stând în niște odăi, sau camere a căror aer este saturat cu aburii unei ape minerale, sau cu alți aburi medicamentoși. Pentru inhalatiunile simple cari se pot face oricând în casă este un aparat mic numit *inhalator*, care se află de vânzare în toate farmaciile și care se manipulează foarte ușor. În lipsă de acest aparat mai putem face inhalație și numai cu ajutorul unei pâlnii, cu care acoperim ibricul, sau vasul în care fierbe în clopote apa cu substanța medicamentoasă pusă în ea (infuziune de eucalipt, etc.) și ținând țeava pâlniei în gură tragem toți aburii cari ies din ibric în plămâni.

Inhumare (dela lat. *in*, în și *humus*, pământ), *îngropare*, *înmormântare*.—Punerea în pământ a unui cadavru, a unui om sau animal mort. Nici o înmormântare nu poate să se facă fără autorizația ofițerului stării civile, care, după lege, trebuie să se ducă în persoană pentru a constata moartea. De fapt această vizită este făcută de doctorul orașului. Se citează înmormântări grăbite, făcute în stare de moarte aparentă și în cari omul s'a deșteptat în groapă, murind pentru a doua oară în torturi grozave. Astăzi aceste cazuri nu se mai pot întâmpla, mulțumită măsurilor de control ce s'au luat.

Inibahar, inipahar, iniper.—V. *Ienupăr*.

Înimă.—V. *Cord*.

Injectie (lat. *injectio*, dela *inijcere*, a arunca înăuntru).—Acțiunea de a injecta, de a introduce un lichid cu ajutorul unui instrument găușit într-o cavitate a corpului, fie naturală, fie accidentală, cu un scop de vedere, terapeutic. Instrumentul cu care se face injectiunea este o *siringă* de metal. Când vrem să introducem o cantitate mare de lichid se întrebuițează o *pară* de cauciuc sau un *irigator*. Li-

chidul care se injectează este foarte variabil: apă curată, rece sau caldută, cum se face când încercăm să curățim urechia, sau nasul de materiile îngrămadite acolo, o decoctiune sau fierătură de plante emoliente, de ulei de migdale dulci sau de mușătel, de laudan, etc., când voim să potolim o durere. Cu soluțiunea antiseptică, sau dezinfectantă, de acid fenic, de alcool simplu sau camforat diluat în apă, etc., preîntâmpinăm putreziciunile care se fac în adâncimea unei răni.—Tinctura de iod, sau alt lichid excitant, se injectează în fistule pentru a grăbi închiderea lor etc. Injecțiunile făcute prin șezut în mațe se chiamă *clizme*. În fine mai sunt injecțiunile cari se fac cu substanțe medicamentoase sub piele, numite injecțiuni *ipodermice* sau *subcutanate*, sau în vine (intravenoase) și cari se fac numai de doctor.

Inmormântare.—V. *Inhumare*.

Innotare, natațiune (lat. *nataŭio*).—Se numește astfel știința de a se ține deasupra apei și de a se mișca. Innotarea este unul din cele mai bune exerciții fizice, care pune în joc în mod armonios toți mușchii corpului; ea este o gimnastică respiratoare minunată. Greutatea specifică a corpului este astfel încât corpul în stare de nemișcare (inertie) cade la fund, pe câtă vreme făcând inspirațiuni profunde aerul conținut în piept este de ajuns ca să-l ție la suprafața apei, iar prin mișcări regulate ale membrelor corpul poate să se mențină deasupra și să înainteze într-o direcțiune voită. Pentru această înaintare mâinile duse înainte sunt readuse cu putere pe laturi și înapoi așa încât ele să isbească apa ca niște vâsle, iar picioarele, îndoit tare (călcăile atingând șezutul) sunt întinse cu putere așa încât tălpile să lovească apa. Corpul este în acest mod împins înainte prin rezistența apei, întocmai după cum luntrea este mânată de vâsle. Această mișcare, întru cât privește membrele posterioare, poate fi comparată cu săritul (saltul), cu deosebire că la înnotat se pierde multă putere din cauză că apa cedează la apăsare, adică nu prezintă un punct de sprijin rezistent. Mișcările de înnotare pot să se facă omul fiind culcat pe pânțe sau pe spate. În

amândouă cazurile, în loc de a mișca în același timp amândouă mâinile, omul poate să nu-și întindă decât numai o mână care să alterneze cu cealaltă și mișcarea înaintea a mâinii s'o facă scotând-o din apă (așa încât să evite pierderea de putere care rezultă din rezistența apei), cufundând-o apoi întocmai cum se face cu vâsla. Innotarea este un exercițiu foarte bun, care ajută mult acțiunea întăritoare a băilor reci, făcute în apă dulce sau în apă de mare, și care are aceleași indicațiuni și contraindicațiuni, ca și ele. Pentru acestea ar fi bine ca toată lumea să învețe a înnota, începând din copilărie.

Inoculație (lat. *inoculatio*, dela *inoculare*, a altoi, a altui format din *in*, în, și *oculus* ochiu), *altoire*, *ultuire*. — Operațiune care constă în a introduce în corpul unui om sănătos un principiu sau un virus luat dela un bolnav de boală contagioasă, principiu capabil de a produce acea boală. Această inoculațiune se poate face dintr-o parte a corpului în altă parte la același individ, și care se chiamă *autoinoculațiune*, de exemplu un șancăr moale al cărui puroiu a fost luat dintr'un loc și dus în alt loc, unde a produs aceeași rană dela un animal la un om (vaccin), dela om la om (boale venerice, sifilis). Inoculațiunea se operează prin contact sau atingere cu o sgărietură ne băgată în seamă a epidermului, adică a stratului superficial al pielei (șancăr moale, sifilis), cu o sgărietură făcută inadins (vaccinațiune), sau printr'o mușcătură (turbare, mușcătură) de viperă).

Insensibilitate (dela lat. *in*, negațiune, și *sensibilitas*, simțire). Pierdere, sau lipsa senzațiunilor speciale sau generale. — V. *Anestezie*.

Insolație (lat. *insolatio*, dela *in*, în, și *sol*, soare), *soare sec*, *soarele în cap*, *bătaie de soare*, *bătaie la cap*. — Prin cuvântul *insolație*, sau *soare sec*, se înțelege totalitatea efectelor produse prin acțiunea razelor solare asupra corpului, sau numai asupra unei părți a corpului, în deosebi asupra capului. Acțiunea soarelui și a căldurii poate produce asupra corpului nostru efecte variate, Prin expunerea unei părți la soare timp mai îndelungat se produce

un fel de *arsură* asupra pielei, caracterizată prin *roșeață*, prin *usturime*, prin ridicarea, pleznirea și *căderea* epidermului (a părții superficiale a pielei), avem într'un cuvânt ceea ce se chiamă *eritem solar* (*pârleală*). Când pielea, a fost supusă la soare timp îndelungat se pot ivi pe lângă semnele de mai sus și niște beșici, mai mult sau mai puțin mari, pline de apă, cum se întâmplă și în celelalte arsuri. Căldura soarelui asupra capului produce durere de cap care poate să te țină mai multe zile, însoțită uneori de greață și vărsături. Pielea feței este arsă, pârlită, roșie, uneori se umflă și ustură. În cazurile mai grave avem toate semnele *congestiunii cerebrale* (îngrădării sângelui la cap) și anume: o sete arzătoare, o moleșală, o simțire de strângere la stomac (la lingurea), o trebuință deasă de a face urina, slăbiciune în picioare, apoi durere de cap și de piept; vederea se turbură așa încât ni se pare că toate lucrurile au aceeași culoare. Respirația devine greoaie și foarte deasă, simțim că ne sfârșim sau că ne pierdem cu totul. Apoi, se ivește spumă în gură, fața se congestionează, vasele pielei încep a se vedea și ne apropiem de *asfixie*. O altă formă de *soare sec*, care se vede des, este aceea în care omul cade la pământ ca trăsnet, câte odată în mijlocul vorbei, fără cunoștință și dacă nu este repede ajutat și scos din această stare, cade în *comă*, adică un fel de somn letargic, de amorțire adâncă cu pierderea inteligenței, simțirii și mișcării și care după câteva ceasuri se sfârșește prin moarte. Uneori înainte de a muri bolnavul are delir și convulsii. *Durata* insolației este variabilă: în cazurile ușoare 2—3 zile, în cele grave urmate de vindecare, ceea ce se întâmplă de altfel foarte rar, 8—12 zile și în aceste cazuri vindecarea se arată prin scăderea temperaturii, prin sudori abundente prin regularea pulsului și revenirea inteligenței. Unii din cei cari se vindecă rămân mult timp foarte slabi, greoi la muncă și cu durere de cap la căldura cea mai mică; vederea și auzul scad. — La insolație contribuie mult și îmbrăcămintea nepotrivită. Marșurile militare în coloane strânse, fuga, alergarea și toate sfor-

țările, corturile și barăcile strâmte și neventilate, alcoolismul și abuzul de băuturi reci sunt tot atâtea cauze ale acestei boale. — *Tratament*: să ne îmbrăcăm potrivit căldurii, adică cu haine subțiri și largi, mai ales la gât; în cap pălărie de paie ușoară sau pălării albe englezești cari lasă ca să circule aerul în jurul capului. Să bem apă mai multă și alte băuturi tonice fără ca să fie excitante (cafea și ceaiul cu multă apă fără coniac sau rom). Să nu fim constipați, luând curățenie ori de câte ori n'avem esire afară. Soldații să meargă în marșuri împraștiați și să se odihnească des, stând în picioare sau șezând, nici odată culcați, pământul fiind mai cald decât aerul. În cap să poarte chipiuri de pânză, să bea apă des și dacă apa este prea rece să bea câte puțin odată. *Tratamentul insolațiunii* variază după cazuri. În cazurile *ușoare*: să se depărteze bolnavul din fața soarelui, să se ducă la umbră, apoi să se desbrace și să li se toarne apă rece pe cap și pe față, punându-i în permanență cărpe reci sau gheață la cap. Să i se dea o cafea neagră rece, sau injecțiuni sub piele cu *cafeină* și *eter* în mod alternativ. Când bolnavul și-a venit în fire să i-se dea pe dinăuntru eter, licoarea lui Hoffmann și licoarea amoniacală anizată, într-o poțiune. În cazurile cu *convulsii*: muștare la ceafă, pe piept, la picioare și mâni, lăsare de sânge (lipitori la ceafă și tâmpile), clismă purgativă, ghiață la cap, să nu se dea opiu, nici cloral. În caz de *asfixie*: respirație artificială, tracțiuni ritmale asupra limbii, înhalțiuni de oxigen.

Insomnie (lat. *in*, negațiune și *somnus*, somn), *lipsă de somn*. — V. *somn*.

Inspirație (dela lat. *in*, în, și *spirare*, a sufla). — Intrarea aerului în plămâni. Este primul timp al *respirațiunii*.

Instalație (lat. *in*, în, și *stilla*, picătură). — A turna un lichid picătură cu picătură, ceace se face cu așa numitul *instilator*.

Instilator. — V. *Picături*.

Insuflație (lat. *in*, în și *sufflare*, a sufla). — A sufla un gaz, abur, sau un praf într-o cavitate sau pe un organ oarecare al corpului. Praful se suflă cu ajutorul unei țevi, d. ex. alun

(piatră acră), tanin, calomel, sulfat de zinc, fie în ochi (*colir uscat*), fie în gât pentru gâlci, etc. Insuflațiunile de aer în plămâni se fac în cazuri de asfixie, precum și la noii-născuți, cari n'au putere să respire; se face insuflațiunea aplicând gura asupra gurii copilului și suflând cu putere.

Insulina. — Este un medicament preparat din *pancreas* (v. acest cuvânt) și care, injectat în corpul omului, influențează în bine arderea glicozei în organism. Pentru aceste proprietăți se întrebuințează azi cu mult succes în combaterea boalei numită *diabet* (boală de zahăr).

Insurătoare. — V. *Căsătorie*.

Intâmplinarea. — V. *Epilepsie*.

Înțepătură. — O mică plagă, produsă printr'un instrument înțepător: ace, vârf de briceag, cuie, etc. Aceste plăgi prin înțepătură fiind de obicei mici sângerează puțin, nu se inflamează decât foarte rar și se vindecă repede; pentru aceasta este de ajuns ca îndată ce s'a oprit sângele, dela sine, sau prin spălarea cu apă rece, să se aplice o bucată de leucoplast, sau puțin colodiu, pentru ca să oprească praful din aer de a se pune pe rană și vindecarea se face în 2—3 zile. Se întâmplă uneori să rămână în plagă corpul cu care a fost produsă (ac, așchie, țandără, etc.), și să producă inflamație, apoi supurațiune. Astfel se naște *sugiul* (panarițiu) dela degete. Când rana este făcută de un instrument care nu este tocmai bine ascuțit, cum este un cuiu, un dinte de furcă, etc., țesuturile sunt rupte, strivite, din care pricină se inflamează. În aceste cazuri este bine să se aplice apă de plumb rece, sau comprese muiate numai în apă simplă, rece, cari se vor reînoui adeseori, sau după ce s'a dezinfectat bine rana să se aplice un *pansement umed*.

Înțepătură. — V. *Puncție*.

Înțepături de albine, de bondar sau bărzăun, de vespe, de țânțar, de tăun sau streche și de omidă. — V. *Albine*.

Întăritare de nervi. — V. *Agasare*.

Întărcare. — Prin *întărcare* se înțelege încetarea *alăptării* unui copil, căruia i se va da o hrană mai substanțială. Întărcarea se face la o epocă ce variază după etatea copilului, după

INȚĂ

desvoltarea și starea de sănătate a lui, după numărul dinților și măselelor, după anotimp. În nici un caz înțăr-carea nu se va face înainte de 8 luni. Dacă nimic nu ne silește, vom aștepta cu înțăr-catul până ce trece anul, pu-tând merge cu alăptatul până la 15 sau 18 luni. Pentru a înțărca un copil trebuie să fie pe deplin sănătos, să n'aibă nici o suferință. Cel mai bun anotimp pentru înțăr-care este pri-măvara, sau toamna, de oarece în timpul verii, a căldurilor, copilul poate fi atins de turburări ale tubului diges-tiv prin schimbarea alimentației. În-țăr-carea prea târzie, la 2 ani, după cum obișnuiesc s'o facă țărancele noas-tre, mai mult cu gândul să nu rămână prea des însărcinate, nu este bună, căci alăptarea prea îndelungată pro-duce o stare de lăncezire și de anemie. Înțăr-carea se va face în mod gradat, progresiv, pe încetul, adecă rârind alăp-tarea la sân pe măsura în care copilul se obișnuiește cu mâncare. Pentru a-cesta vom începe după 8 luni a da copilului dimineța și seara câte pu-țină fiertură subțire, făcută tot din lapte, în care vom pune o cantitate mică de făină, trahana, tapioca, griș sau orez. Mai târziu vom îngroșa aceasta fiertură și vom mări numărul mâncărilor până ce vom ajunge la bulion simplu, sau bulion cu miez de pâine. În intervalul acestor mâncări se va da și țată. În acest timp vom supraveghia cu multă băgare de seamă funcțiunile digestive și starea gene-rală a copilului și în caz de urdinare continuă sau de slăbire ne vom grăbi a reveni la alăptarea naturală. Înțăr-carea *bruscă* nu este bună nici pentru mamă, nici pentru copil. Mama este expusă la umflarea și aprinderea să-nurilor, cari provoacă *abces* (v. *Sănuri*), iar copilul poate să aibă vărsături, urdinare și alte turburări ale tubului digestiv. Pentru ca laptele să înceteze cu totul, femeia va ține dietă câteva zile, adecă va mânca mai puțin, își va unge sânurile cu vaselină camfo-rată și le va încinge potrivit de strâns. Hrana copilului după înțăr-care va fi compusă în cea mai mare parte din lapte de vacă, simplu sau cu orez, tapioca, griș, din făină lactată, din ouă, apoi se va da supă fără grăsime,

INTE

pireuri de legume și carne tocată sau tăiată în bucățele foarte mici.

Înțepenire de încheietură (articula-ție). — V. *Anchiloză*.

Intercostală (Nevralgie). — V. *Ne-vralgie*.

Intermitentă (Febră). — V. *Paludism*

Intermitentă (lat. *intermissio*, conte-nire, precurmare, încetarea vremelnică a unui lucru și începerea lui din nou). — Intervalul sau răstimpul care separă accesele de friguri, etc., în care bol-navul se simte bine aproape ca în stare de sănătate. — *Intermitența cor-dului* și a *pulsului* este o oprire mo-mentană a inimii, datorită sau unei acțiuni nervoase (emoțiuni), sau unei boale de inimă.

Internat, pension. — Viața din in-ternate are părți bune precum și părți rele. Noi ne vom ocupa mai mult de acestea, considerate fiind din punct de vedere igienic. Părțile rele sunt: viața sedentară, lipsa de exercițiu și lipsa de aer curat. Cele mai multe internate la noi sunt instalate în case închiriate, cari n'au fost construite dela început pentru acest scop și s'au adap-tat trebuințelor prin adăugiri de clă-diri făcute după cum permite întin-derea locului și punga proprietarului, așa că aceste internate improvizate au camere mici, scunde, lipsite de lumină și de aer, cu o ventilație pri-mitivă, fără curte, fără grădină și în orașele mari înfundate și ocolite de clădiri mari tot așa de neigienice. Se înțelege că în așa împrejurări tinerile vlăstare nu se pot desvolta bine și cresc ofilite, stând tot timpul într'un aer *confinat*, în nemișcare, căci n'au unde face exercițiu, nici unde se plimba, decât eșind din timp în timp la plim-bare în oraș sau în afară de oraș. Ca-merile trebuie să fie mari și în raport cu numărul sufletelor ce le locuiesc, să fie bine luminate, aerate și cu apa-rate de ventilație cari să asigure cu-rățenia aerului, să aibă sală de gim-nastică modernă, curte mare și gră-dină cu plantațiune bogată, să nu fie construite în mijlocul orașelor, ci cât se poate la margine, sau chiar în afară de raza orașului, unde să poată avea un aer mai curat. Pentru a combate efectele vieții sedentare, elevii pe lângă exercițiile din interiorul școlii, trebuie

să fie duși la plimbare în afară de oraș, într'un loc de vegetație variată, cât se poate mai adeseori. Măncarea lasă mult de dorit și aceasta din cauza spiritului de speculă al celor interesați. S'a mai vorbit despre influențele morale, despre plictiseala ce ar cuprinde pe unii elevi în internate. Dar această obiecțiune n'are valoare, căci foarte puțini elevi nu se pot obișnui cu această viață; cei mai mulți, din contră se simțesc bine și se împacă ușor cu ea. Copiii nu trebuiesc prea mult izolați de familie, ci în sărbători trebuie să fie lăsați în sânul familiei, cei cari sunt din localitate, iar pentru ceilalți vacanțele întrețin legăturile familiare. Întru cât privește celelalte inconveniente, cari rezultă din oboseala intelectuală, din instalațiunea defectuoasă a materialului școlar etc. ne vom ocupa în alte articole (v. *Școli și oboseală*).

Intertrigo (dela lat. *inter*, între, și *terere*, a freca), *julitură* sau *jupuitură* prin frecare. — Boală care se vede acolo unde este o frecătură între două părți ale pielei, cum este de pildă la subțiori, la stinghie, la șezut, la îndoiturile gâtului, ale coapsei, sub sânuri. Ea constă sau într'o simplă roșeață a suprafețelor, mai mult sau mai puțin intensă, sau într'o adevărată ulcerare (rană) cu scurgerea unui lichid fetid, cu mâncărime în totdeauna mare. **Cauzele** sunt: grăsimea prea mare (obezitate), diabetul și multe altele. Se vede mai mult la femei și la copii la cari se produce de cele mai multe ori prin contactul prelungit cu sudoare sau urină. — **Tratament.** Curățenie mare, schimbare deasă de rufărie, spălarea pielei cu apă de frunze de nuc, sau de coaje de stejar (30—50 gr. la litru) sau apă cu piatră acră (vezi *Alun*), apoi presărare de praf sau pudră fină, formată din talc, lycopodiu și oxid de zinc sau numai talc; băi de tărațe și de amidon (scrobeală).

Intestin (lat. *intestinum*, grec. *enteron*) *maț*. — Intestinul este partea tubului digestiv, care pleacă dela stomac, cu care comunică prin *pilor* și merge până la deschizătura din jos, până la șezut, descriind în drumul său numeroase cotituri și îndoituri (vezi fig. 1). Lungimea intestinului este cam de 9

metri și jumătate, dintre care 8 metri dela început formează *intestinul subțire* (mațele subțiri), a cărui lărgime este de 2—3 cm., iar restul de 1 metru și jumătate formează *intestinul gros* (mațele groase), a cărui lărgime este de 7 cm. diametru. Intestinul este format din trei straturi sau membrane, cari începând de dinăuntru înafară sunt: una *mucoasă*, alta *musculoasă* și a treia *seroasă* (peritoneul). *Intestinul subțire* se împarte în trei porțiuni: prima care se deschide în stomac și este cea mai scurtă, se nu-




Fig. 219. — O secțiune în peretele intestinului

Sus = cum sunt pereții intestinului, văzuți cu lupa
Jos = ce se cuprinde în pătrățelul A văzut mult mărit și în secțiune.

mește *duodenum* (fiindcă are o lungime de 12 grosimi de deget). În această porțiune se deschide *canalul coledoc* prin care vine fierea dela ficat și cele două canale ale *pancreasului*. A doua porțiune este *jejunum* și a 3-a este *ileon*. Aceste două porțiuni formează o mulțime de îndoituri asupra lor însăși, așa zise *circumvoluțiuni*. Suprafața internă a intestinului subțire este foarte mult mărită, prin mai mult îndoituri (incovoituri) și mici ridicături, numite *vilozități*, cari servesc la absorbțiunea alimentelor. Membrana mucoasă a intestinului conține organe limfatice, *plăcile lui Peyer* și *foliculii închiși*, apoi glandele ciorchine și glan-

INTE

INTE

dele în forme de tub cari produc sucii intestinali, cari transformă carnea în peptone și substanțele amilacee în zahăr (glicoză). *Intestinul gros* începe printr'un fund de sac așezat în fosa iliacă dreaptă, numită *caecum* (orb) terminat el însuși printr'o parte îngustă, numită *apendice* viermicular. În *cec* se îmbucă intesinul subțire, de care este separat printr'o clapă (*valvula cecală*), care împiedică materiile alimentare de a se întoarce înapoi. Dela *cec* intestinul se continuă prin *colon*, care se duce de jos în sus (*colonul ascendent*), apoi deacurmezișul pe sub stomac (*colonul transvers*), după aceea de sus în jos (*colonul descendent*), iar în jos, în fosa iliacă stângă, se îndoieste pentru a forma *S iliac*, care se continuă prin *rect* până la *anus* (*șezut*). Membrana mucoasă a intestinului gros este netedă și cuprinde *glandele lui Lieberkühn*; trei fășii longitudinale îi dau aspectul bulbucată. Digestiunea se sfârșește aci și materiile nemistuite sunt date afară prin scaune — *Boalele intestinului*: *durerile*, sau *colicele intestinale*, diferite turburări digestive cari sfârșesc prin *constipație*, sau prin *diaree*, gaze cari se pot dezvolta atât în intestine cât și în stomac, *emoragii* cari atârână de diferite cauze: *emoroiizi*, *dizenterie*, *febra tifoidă*, etc., apoi *surpăturile*, sau *erniile*. — *Plăgile sau rănirile* intestinului sunt foarte grave, ori cu ce ar fi produse, fie cu un instrument înțepător sau tăietor, fie printr'un glonț sau mai multe gloanțe. Primejdia acestor răniri vine din sângele care curge în pânțece și din materiile cari ies din intestine și dau naștere la *peritonită* (inflamația căptușelii pântecelui), care omoară omul în câteva ceasuri. Bolnavul în pat, fără să facă cea mai mică mișcare, fără să i se dea ceva de mâncare, va lua băuturi reci, în cantitate mică și să înghită din când în când bucățele mici de gheață. — *Enterita* este inflamația sau aprinderea intestinului. Ea este *acută* și *cronică*; prin căutare bună se vindecă. *Cauzele* sunt multe: lovituri sau căderi pe pânțece, depărtări de regim, mâncare prea multă, etc. — *Semnele* enteritei sunt: *colicele* și *diareea* în formele ei cele ușoare, pe câtă vreme în cele grave mai avem

și umflarea sau balonarea pântecelui, căldură mare, durere de cap, delir, iar în forma *cronică* pe lângă acestea o slăbire care merge crescând. De multe ori se inflamează și stomacul (gastrită) și atunci avem *gastro-enterită*. Când boala se întinde la intestinul gros avem *entero-colită* și scaunele pot fi uneori cu sânge. *Tratamentul* enteritei *acute* constă în: purgative saline, preparate cu opiu, apă de calciu (de var), salicilat de bismut, iar ca regim: dietă lactată (adecă numai lapte), apă de orz, sau apă albuminoasă. *Tratamentul și regimul* enteritei *cronice* variază după forma boalei, astfel în forma cu *diaree*: lapte cu apă de var, ouă fierte moi, pireuri feculente, preparate cu opiu, salicilat de bismut; în forma *uscată* (fără *diaree*): carne crudă, bulion, friptură de vacă, pește proaspăt fiert, pireuri de legume uscate. *Nu se vor da* legume verzi, salate, fructe acre, condimente. La copii inflamația intestinului poate lua o formă foarte gravă, uneori mortală, cu semne ca și ale colerei, de unde și numele de: *enterită coleriformă*, sau *coleră infantilă*. Ca semne avem: *diaree*, vărsături, sete mare, slăbire repede, răcirea nasului, mânilor și picioarelor, puls mic, filiform, pânțele umflate, scaunele în cele din urmă apoase și verzui. *Tratamentul* constă, la început, în a da unt de ricină (1 gr. la 6 luni, 2—3 gr. la 2 ani), apoi o poțiune cu acid lactic (2 gr. la 30 gr. sirop simplu), la ceas cu linguriță, sau o poțiune cu apă de var, cu salicilat de bismut. Cel mai bun lucru este a tăia orice hrană, chiar și laptele și a da copilului numai apă sterilizată, prin mici înghițituri tot la jumătate de ceas și aceasta timp de 48 ore, după care se va reveni la lapte sterilizat, tăiat cu apă sterilizată, jumătate și jumătate. Apa simplă se poate înlocui cu apă de orez sau apă de orz. — *Cancerul intestinului* poate da naștere la mai multe complicațiuni: *peritonită*, găurirea mașului, încurcătură de mațe. — *Ocluziunea intestinală* (încurcătura de mațe) are mai multe cauze: compresiunea, sau apăsaarea făcută de o tumoră așezată în vecinătatea mașului, strangularea (sugrumarea) unei anze intestinale într'un orificiu anormal al peritoneului, sau

printr'o bridă formată de vreo inflamațiune veche, răsucirea mațului, invaginațiunea lui, adică intrarea unei părți de intestin într'o altă porțiune în urma unei îngrămădiri de materii fecale. *Semnele* acestei boale sunt: durere mare într'un punct al pântecelui, cu iradiațiuni în diferite direcții; suprimarea gazelor și materiilor fecale pe jos; vărsături alimentare, apoi bilioase și în urmă fecaloide, umflarea pântecelui, moleșală, puls mic, figura palidă, trasă, pielea rece, vocea tăiată, sete mare. Moartea vine în câteva zile. *Tratament*: operație care trebuie făcută cât se poate mai iute.

Întoarcere de boală. — V. *Recădere*.

Intoleranță (lat. *in*, negațiune și *tolerare*, a ține, a suferi, a răbda). — Neputința de a ține o mâncare sau un medicament.

Intoxicație dela lat. *in*, în, și *toxicum*, otravă). — V. *Otrăvire*.

Intremare. — V. *Convalescență*.

Intubațiune. — V. *Crup*.

Inulină. — V. *Iarbă mare*, *Brustur*.

Invaginațiune (lat. *in*, în, și *vagina*, teacă). — Intrarea sau pătrunderea unei părți de maț în altă parte, întocmai ca un deget de mână, a cărui extremitate liberă s'a infundat spre baza lui (v. *Intestin*, *ocluziune intestinală*).

Inversiune (lat. *in*, în, și *vertere*, a întoarce). — Se zice de organele cari nu-și ocupă pozițiunea lor normală, cari nu sunt la locul lor obișnuit, ci sunt așezate în sens opus (inima la dreapta, ficatul la stânga, splina la dreapta).

Iod (lat. *iodium*, grec. *iodes*, violet). — Iodul este un corp solid, de culoare cenușie închisă, cu miros foarte caracteristic și un gust iute. Se prezintă sub formă de lamele subțiri, frângăcioase, cu luciu metalic. Iodul se găsește în apele de mare, în mai multe plante cari cresc pe țărmul mărilor și intră în compozițiunea mai multor ape minerale. El se prepară din cenușa plantelor marine, din cari se extrag, prin apă, sărurile solubile. După aceea se decantează, se evaporează și se lasă să cristalizeze, apoi se tratează cu acid sulfuric concentrat, pentru a depărta bioxidul de sulf, se amestecă cu oxid de mangan și în cele din urmă, se

pune într'o retortă unde se distilează. Cristalele de iod se topesc la $+107^0$ și fierb la $+175^0$. Iodul se volatilizează fără reziduu, răspândind vapori violeti. Se întrebuințează foarte mult în medicină, într'o mulțime de forme și de preparate. Iodul se dă pe dinăuntru în contra *scrofulelor*, iar pe dinafară lucrează ca iritant, rezolutiv și revulziv. El nu se împacă cu amidonul, alcaloidele, alcalii și carbonat alcaline, săruri metalice, cu tanin și substanțele cari au tanin. Iodul se topește foarte puțin în apă și foarte ușor în alcool. Dacă topim 10 gr. de iod în 120 gr. de alcool de 90^0 avem *tinctura de iod*, care se întrebuințează foarte mult. Pe *dinăuntru* se dă iodul în doză de 1 până la 5 ctgr., sub formă de tinctură de iod, din care 15 picături cuprind 2 ctgr. de iod, sau sub formă de sirop de hrean iodat, de sirop iodo-tanic și untură de pește, cari cuprind fiecare cam un gram de iod la un litru și prin urmare la o lingură vin cam 2 ctgr. Pe *dinafară* tinctura de iod se aplică pe piele în contra durerilor reumatice, în tusă, în contra nevralgiilor, a idartrozelor, artritelor cronice, a glandurilor dela gât, etc. *Tinctura de iod* se aplică în totdeauna pe partea dureroasă și cât se poate de aproape de organul bolnav. Preparatele iodipon, iodos Wassermann colloide Dubois și multe altele, se recomandă ca foarte bune. — *Otrăvirea* cu tinctură de iod are următoarele semne: dureri în stomac, vărsături gălbui sau albastrii, dacă vr'o substanță se găsește în stomac, diaree, amețeli. *Tratament*: se va face bolnavul să verse, i se va da amidon în apă de uruială, apă albuminoasă; contra durerii morfină.

Iodoform. — Medicament care lucrează ca anestezic, cicatrizant, dezinfectant, antisifilitic, antiscrofulos și în contra gușii. Pe *dinăuntru* se dă sub formă de: praf 10—60 ctgr., perle de eter-iodoformat și în injecțiuni sub piele. Pe *dinafară* se întrebuințează sub formă de pulbere, de alifie, de tifon iodoformat, de colodiu iodoformat.

Iodol. — Insolubil în apă, puțin solubil în alcool cald, solubil în eter, acid acetic, uleiuri grase. Lucrează ca antiseptic. Se dă în doză de 10 până la 15 ctgr., maximum un gram. pe zi,

IODO

în pilule de câte 10 ctgr. Pe dinafară sub formă de praf, alifie, globule și supozitoare.

Iodotirină. — V. *Tiroidă*.

Ioduri.—Sunt săruri cari rezultă prin combinațiunea iodului cu alte corpuri. Cele mai întrebuințate sunt: *Iodur de amidon*.—Sunt 2 varietăți, insolubil și solubil. Antiscrofulos. *Doză*: cel insolubil 1—5 gr., cel solubil 50 ctgr. până la 2 gr.—*Iodur de calciu*. In contra scrofulelor și ofitei. *Doză*: 50 ctgr. până la 1 gr.; extern: 20 ctgr. la 20 gr. vaselină. — *Iodur de fier*. Tonic, antiscrofulos. *Doză*: 10 ctgr. până la 1 gr., în pilule, sirop 20 gr. Extern: băi, injecțiuni, alifie 4 la 30. — *Iodur de fier și de chinină*. In contra frigurilor, scrofulelor și cloroanemiei. *Doză*: 10—50 ctgr. — *Iodur de plumb*. Astringent, antisudorific, antiscrofulos. *Doză*: 10—15 ctgr.; extern: alifie 4 la 30. — *Iodur de potasiu*. Antiscrofulos, antisifilitic, antireumatismal, antiastmatic, în contra arteriosclerozei, fondant rezolutiv. *Doză*: 50 ctgr. până la 10 gr., în capsule, dragee, perle de câte 10—15 ctgr.; sirop 50 ctgr. la lingură. Extern: alifie 4 la 30. — *Iodur de sodiu*. Lucrează ca iodurul de potasiu, dar fiind slab se poate da în doze mai mari.

Ipecacuana sau numai **Ipeca**.—Este rădăcina unei plante care crește în Brazilia numită *Cephaelis* din fam. rubiaceelor. Principiul activ al ei este *emetina* sau *cefelina*. Este un *vomitiv* (care provoacă vărsături) mai dulce dar mai puțin sigur decât *emeticul* (vezi acest cuvânt), însă are avantajul că ea nu sdruncină corpul așa tare, nu moleștește și nu expune la leșin și la sfârșeală ca acela. Ipeca este vomitivul cel mai bun pentru copii și pentru femei, precum și pentru adulții slăbiți. Se dă în indigestiuni (nemisturi) pentru a deșerta stomacul, se mai dă și când voim să curățim pieptul de flegmă, ușurând expectorația la bolnavii atinși de bronchită. Pentru a provoca vărsături vom da ipeca în praf, sau în sirop. La copiii mici vom da 2—3 lingurițe de sirop până la etatea de 2 ani, 2—3 lingurițe de compot până la etatea de 6 ani, dând lingurițele sau lingurile la interval de câte 5 minute și dând apoi 1—2 pahare

IPER

de apă caldă pentru a înlesni vărsăturile. Dela etatea de 5 ani în sus vom adăuga și praf de ipeca la sirop, 10—50 ctgr. după etate. La adult vom da praf: 1—1.50 gr., curată sau amestecată cu emetic 5—10 ctgr. Ipeca se mai dă și în dizenterie.

Ipercloridrie, hiperclorhidrie. — Când în stomac se produce acid cloridric în cantitate prea mare se zice că este *ipercloridrie*.

Iperestezie, hiperestezie (dela grec. *hyper*, prea mare, și *aisthesis*, simțire). Exagerarea sensibilității care se deosebește de *durere* prin aceea că ea nu se arată în mod spontan ca aceasta, ci numai prin atingere, frecare sau excitare a pielii, a unor mucoase sau a unor organe. Iperestezia se observă în boalele nervoase: isterie, nervoze, nevrite, în boalele măduvei spinării, în unele boale de piele (eczemă, etc.), în intoxicațiuni.

Ipermetropie (dela grec. *hyper*, peste *metron*, măsură și *ops*, ochiu). — Se



Fig. 220. — Ochiu ipermetrop

a = imaginea se formează înapoia retinei
b = după corecția cu lentilă imaginea se formează pe retină.

numește astfel o stare a ochiului în care razele de lumină, care vin dela un obiect, nu formează imaginea pe retină, cum ar trebui să fie normal, ci înapoia ei, după cum se vede pe figura alăturată. Se înțelege că un asemenea ochiu vede obiectele neclare și cu cât sunt mai apropiate de el cu atât se văd mai rău. Ochiul se forțează mult să vadă lucrurile apropiate și pentru acest motiv se produce uneori o mare oboseală a mușchilor ciliar, dinăuntru ochiului, o *astenopie acomodativă*, care dă bolnavului amețeli, dureri de cap și de ochi și uneori chiar vărsături. Astenopia acomodativă este complicația cea mai de temut a ipermetropiei, dar nu este singura; ochiul ipermetrop fiind silit să fixeze prea mult obiectele apropiate devine șasiu, *strabice*, iată deci o altă complicație.— Ochiul ipermetrop sunt mici, joacă cu

ușurință în orbită și sunt lucitori; de cele mai multe ori ei nu s'au dezvoltat complet, ci au rămas mai mici decât trebuia să devină normal. Ipermetropii văd mai slab la apropiere. Singurul *tratament* este să dăm bolnavului ochelari cu lentile biconvexe. Ochelarii trebuie luați după ce pacientul a fost examinat de un medic specialist, nu cumpărați la întâmplare. Ei trebuie purtați toată vremea la lucru și luați cât mai din vreme, ca să nu se producă complicațiile amintite mai sus.

Ipertrofia prostatei. — V. *Prostată*.

Ipertrofie (dela grec. *hyper*, prea multă, și *trophé*, nutrițiune). — Creșterea prea mare atât ca volum cât și ca greutate a unui organ sau a unei părți din organ (ficat, inimă, splină, etc.). Această boală atinge foarte des inima. *Ipertrofia inimii* constă în creșterea volumului și greutății acestui organ și în îngrășarea pereților lui. *Cauzele* acestei boale sunt: eforturi mari și repetate din partea bolnavului, palpitațiunile produse de o boală cronică a inimii, o boală de plămâni (năduf, etc.) care împiedică circulația sângelui și silește inima să lupte din greu pentru a împinge sângele, palpitațiunile nervoase, abuzul de tutun, de alcoolice. *Semnele* ipertrofiei de inimă sunt: bătăi mai puternice, mai jos și mai la stânga, pulsul este mai forte, opresiune sau apăsare în piept, dureri de cap, etc. *Ipertrofia inimii* nu este totdeauna gravă, nici incurabilă. Când este produsă de abuzuri n'avem decât să ne ferim de ele, să nu bem cafea, ceaiu și alcoolice și atunci se poate vindeca. Dacă este produsă de vreo boală de inimă, vom trata acea boală printr'un regim apropiat și leacuri potrivite (v. *Coră*).

Ipnotic. — Medicament care aduce somnul când nu putem dormi.

Ipnatism, hipnotism (dela grec. *hypnos*, somn). — Dacă ne așezăm în fața unei persoane nervoase, impresionabilă și îi ținem deasupra ochilor, cam la o depărtare de 15 până la 20 de ctm. un obiect oarecare strălucitor, un globuleț de aur, o cheie sau un briceguț nou, spunându-i să-și țină privirea ținută asupra obiectului și mintea încordată asupra ideii acelui obiect, după câteva minute acea persoană

adoarme cu atât mai iute cu cât ea este mai nervoasă și cu cât imaginațiunea ei este mai ușor de isbit. Acest somn provocat în mod artificial se numește *ipnotism* și el se seamănă mai mult cu somnul *lunaticilor* (somniaambulismul) decât cu somnul obișnuit. Sub numele de *somniaambulism* se înțelege starea acelor oameni cari în timpul somnului, dormind, săvârșesc diferite fapte cu cari de altfel sunt obișnuți: vorbesc, lucrează, umblă și fac diferite mișcări despre cari nu-și mai aduc aminte după ce se deșteaptă. Această stare nu este la drept vorbind o boală, ci un grad mai înalt al visurilor obișnuite, în cari cuvântul și fapta urmează idea. Oamenii *ipnotizați* întocmai ca și oamenii lunatici sunt în stare să răspundă la întrebările ce li se pun, să se miște, să umble, etc., când primesc porunca *aceluia* și numai a *aceluia* care i-a adormit. Ipnatismul este dar un *somniaambulism* artificial, sau mai bine zis provocat. — Să vedem acum cari sunt *arătările*, sau *manifestățiunile* ipnotismului. Fenomenele cari caracterizează ipnotismul sunt afară de somn, diferite turburări ale mișcării, ale simțirii și ale facultăților intelectuale. Operatorul câștigă asupra celui ipnotizat o influență, o putere așa de mare încât îi înlocuște voința lui prin a sa în timpul somnului artificial, așa că n'are decât să-i dea o poruncă pentru ca el s'o îndeplinească. Putința de a face pe adormit să gândească, să vorbească și să lucreze după voia adormitorului, se numește *sugestiune*. Cel dintâiu și cel mai des fenomen ipnotic este *catalepsia*, un fel de turburare a mișcării care constă în aceea că mâna sau piciorul, dacă se ridică încet, rămân în pozițiunea ce le-am dat și că după câteva secunde se întepenesc și stau în aceeași poziție, oricât de supărătoare ar fi ea în timpul de deșteptăciune, fără ca persoana adormită să simtă cea mai mică oboseală și pentru un timp foarte lung. Această stare se numește *catalepsie ipnotică* spre a se deosebi de *catalepsia* care se arată în alte împrejurări. Turburările *simțirii* sunt tot așa de însemnate. Mai întâiu avem *nesimțirea* durerii întinsă peste tot corpul sau mărginită numai la un

membru, nesimțire mai mult sau mai puțin desăvârșită după persoane și de care s'au încercat să profite chirurgii în operații, dar fără să reușească pe deplin. De cele mai multe ori avem o mărire sau o *exaltație a simțurilor*, sau numai a unui simț. Simțirea căldurii sau frigului este așa de dezvoltată încât, dacă apropiem mâna de spatele persoanei ipnotizate, ea se apleacă înainte și se plânge de căldura pe care o simte; tot astfel se întâmplă și cu un lucru rece pus la aceeași depărtare. Auzul este așa de mărit încât vorba și sgomotul trăsurilor le face rău celor ipnotizați; bătaile ceasornicului le aud la o distanță de 8—10 metri. Mirosul câștigă o fineță și o putere așa de mare ca la dobitoacele cele mai bine dotate cu acest simț. Cele mai ciudate fenomene însă sunt în legătură cu *mărirea sau exaltația simțului muscular*, simț prin ajutorul căruia toate mișcările noastre voluntare sunt măsurate și care fiind exaltat, poate de multe ori să înlocuiască vederea. S'au văzut persoane cari scrieau foarte corect punându-li-se o carte groasă între față și hârtia de scris, unele puneau așa în ac fiind tot în aceeași pozițiune, mergeau dintr'o odaie în alta cu ochi legați, toate acestea fără nici o altă călăuză decât numai rezistența aerului și preciziunea mișcărilor călăuzite prin simțul muscular. Trebuie de altfel să admitem că memoria de loc, sau mai bine zis obișnuința, contribuie în mare parte la această precizie a mișcărilor, cari nu au devenit până la un punct oarecare automate: așa pianistul cântă noaptea fără să facă greșeli tot așa își fac și lunaticii plimbările lor de noapte. Toate aceste fenomene nu se arată în aceeași măsură la toate persoanele; multe sunt cu totul refractare la somnul provocat, nu pot fi adormite, copiii și persoanele tinere și mai cu seamă femeile nervoase sunt cu deosebire predispune la ipnotism. În total sunt 15 până 18 persoane dintr'o sută cari se pot adormi, de unde se poate conchide că trebuie să existe o predispoziție specială a sistemului nervos, o impresionabilitate particulară a creierului, stare pe care ipnotismul o mărește în așa măsură în cât ideea suge-

rată creierului se impune cu o forță mai mult sau mai puțin mare și determină actul corespunzător *fără participarea voinții*. Multe fenomene ale ipnotismului nu se pot explica. Știm cum să le provocăm, dar nu cunoaștem cauza intimă a lor. Astfel se știe foarte puțin despre natura relațiilor cari se stabilesc între adormitor și adormit, despre motivul care face ca voința unuia să fie înimicită prin aceea a celuilalt, dar este foarte sigur că trebuie să-l căutăm într-o stare particulară a creierului și prin urmare o cunoștință exactă a anatomiei și a funcțiunilor acestui organ, în stare normală, este neapărat trebuincioasă celui care își propune o explicare. Nu trebuie să dăm crezământ șarlatanilor cari își dau părerile lor fără nici o bază științifică.—Pentru a termina vom vorbi în câteva cuvinte despre *aplicațiunile medicale* ale ipnotismului. Nesimțirea la durere pe care o provoacă ipnotismul a făcut pe mulți să spere că ar putea înlocui cloroformul în săvârșirea operațiunilor chirurgicale, dar puținele rezultate fericite, în fața numeroaselor nesuccese, au făcut ca să se renunțe la acest mijloc, ceea ce altminterlea se explică prin numărul relativ mic al persoanelor cari se pot adormi. Aplicațiunea ipnotismului la boalele nervoase, a durerilor nevralgice sau reumatismale, trebuie deosemenea privită cu rezerve. Ipnosmul domolește un acces prin somnul ce-l procură, dar foarte rar se întâmplă să aducă o vindecare durabilă asupra unui temperament nervos; el lucrează întocmai ca o emoțiune morală, vie, izbind mai cu seamă imaginația. Efectele lui sunt repezi și trecătoare. Nu trebuie să se piardă din vedere că somnambulismul provocat își are primejdiile lui fizice și morale: el lasă în urma lui o oboseală generală și o excitațiune cerebrală cari nu sunt fără inconveniente morale, căci ele duc câteodată pe cei adormiți la mărturisiri cu totul intime ceea ce nu e convenabil a le provoca. Dacă el este provocat de persoane cinstite și de bună credință, lucrul nu este grav, în caz contrar lucrul poate deveni foarte serios. Ipnosmul, desbrăcat de prejudecățile populare susținute cu în-

grijire de șarlatani, este o chestiune foarte interesantă și vrednică de a atrage atențiunea, dar mai trebuiesc făcute cercetări științifice, pentru ca să i-se dea o explicare satisfăcătoare și pentru ca el să fie primit între mijloacele proprii de a vindeca.

Ipocloridrie, hipoclorhidrie. — Când în stomac se produce acid cloridric în cantitate prea mică se zice că este *ipocloridrie*.

Ipocondrie, hipochondrie (dela grec. *hypo*, sub, și *chondrós*, cartilaj, sgârciu). Ipocondria în formele ei cele mai grave este o nălucire, adecă un fel de *ne-bunie* produsă prin anemie cerebrală și atunci se confundă cu *melancolia*; nebunii ipocondriaci sunt întotdeauna atinși de leziuni serioase, cari fac să se considere atunci ipocondria ca un semn, sau un simptom al unei boale de creeri hotărâte (melancolie sau lipemanie, paralizie generală, etc.). Noi nu ne vom ocupa de acești nebuni, ci numai de ipocondriacii nevropați, adecă de cei ce sufăr de nervi și cari nu fac altceva decât își măresc, își exagerează suferințele reale pe cari le încearcă. — Bărbații sunt mai mult supuși decât femeile la această boală. Ipocondria se arată mai cu seamă la vârsta de 30—40 de ani, la oamenii din societate, la cei cari au suferit moralicește, la cei cari sunt atinși de boale de ficat, de inimă, de boale ale organelor urinare și genitale, etc. Ipocondriacii sunt întotdeauna îngrijați și neliniștiți, ei se observă cu băgare de seamă, își studiază cu deamănuntul organele și funcțiunile lor. Pentru ei orice lucru este o pricină de turburare și de neliniște. Indată ce simțesc ceva nou în corpul lor, indată ce li se deșteaptă atențiunea prin citirea unei cărți de medicină, sau a unui articol de ziar, ei se cred atinși de acea boală despre care au cetit și caută cu atențiune dacă au toate semnele acelei boale și în curând se conving că le au. De altfel o ocupațiune grabnică sau o influență morală neprevăzută îi distrage cu înleznire și face că îneteze starea anormală în care trăesc de obicei, apoi, indată ce cad pe gânduri, revin la aceeași stare. În general fizionomia lor este mai mult sau mai puțin turburată, au un aer nenorocit și preo-

cupat, uneori au aparența unei sănătăți perfecte și cu toate acestea ei se plâng neconținut. Dacă-i examinăm nu găsim nici o leziune organică, toate organele sunt sănătoase. Ipocondria nu este mortală, dară chinuște viața celor ce sunt atinși de ea, cari mereu se plâng de dureri de stomac, de spasme de bătăi de inimă (palpitațiuni), de bătăi de pânțe și de svâcnituri în cap, de amețeli, de sfârșeli, de furnicături prin diferite părți ale corpului și de alte multe suferințe. — **Tratament.** Ipocondria fiind o boală nervoasă, care se ivește la oamenii nervoși iritabili (supărăcioși), sleiți prin lucru prea mult cu mintea, prin supărări și griji mari și multe, tratamentul ei nu trebuie să constee în medicamente multe, el fiind mai mult un tratament moral. Trebuie mai întâi ca doctorul să inspire bolnavului o încredere oarbă, ca el să-i impuie o regulă de traiu potrivit cu boala lui, să-i prescrie exerciții și distracții: plimbări dese în aer liber, călărie, plimbări cu trăsură, călătoriile cu drumul de fier, călătorii repezi și cu dislocări dese, cari să-l distreze în continuu prin varietatea tablourilor ce i-se înfățișează, nelăsându-i timp să stea pe gânduri. Dacă nu poate face călătorii să-i recomande ocupație continuă, să lucreze, să citească, să scrie, în fine să fie veșnic ocupat, căci leneșii sunt cei ce sufăr mai mult de ipocondrie. Idroterapia este foarte bună sub toate formele ei, cu deosebire dușuri reci în fiecare dimineață și pe toată suprafața corpului. Medicamente se vor da cât de puține, din când în când câte un calmant pentru dureri, câte o curățenie pentru ca stomacul să funcționeze regulat, hrană bună, mesele regulate la ore fixe, și atâta tot. — La *fară* ipocondria se numește *căpială*, *nălucire* și *năuceală*, iar cel atins de această boală oftează, se usucă pe picioare, are frică și nu poate eși noaptea din casă; i se pare că-l strigă morții, i se arată întru pați cerând să li se caute de cele religioase, să li se facă pomeni.

Ipocondru, hipochondru (gr. *hypo*, sub, și *chondrós*, cartilaj, sgârciu). — Regiunea pântecelui așezată sub coaste, deoparte și cealaltă a epigastriului (lingurelei). În ipocondrul drept se află

ficatul, iar în acel stâng partea cea largă a stomacului, splina și îndoitura mațului gros sau a colonului (v. *Abdomen*).

Ipodermic, hipodermic (dela grec. *hypo*, sub, și *derma*, piele). — Metoda injecțiunilor ipodermice, sau *subcutanate* constă în introducerea sub piele prin ajutorul unei seringi a unei soluțiuni active, cum ar fi o soluțiune de morfină, de cafeină, etc. Se mai pot injecta și altfel de soluțiuni sau lichide microbicide (omoritoare de microbi: ser antidifteric, ser antistreptococic, etc.) sau un lichid reconstituant (ser artificial), cari se fac cu siringa Record, iar acestea din urmă cu un aparat special cu care se pot injecta 500 gr. până la 1 litru odată. Injecțiunile se pot face la pânțele, la piept, la coapse, braț, etc.

Ipogastru, hipogastru (dela grec. *hypo*, sub, și *gaster*, stomac). — Partea de jos a pântecului, unde se află beșica.

Ipopion, hipopion (dela grec. *hypo*, sub, și *pyon*, puroiu). — Colecțiune sau adunare de materie asemănătoare cu puroiul, în camera de dinainte a ochiului (v. *Ochiu*).

Irean. — V. *Hrean*.

Iridectomie (dela grec. *iris*, și *ektomé*, tăierea unei părți din ceva). — Această operație constă în a tăia o parte din iris, pentru a face o pupilă artificială, prin care să pătrundă razele de lumină în fundul ochiului, pentru a vindeca un *glaucom*, sau pentru a înlezni *extracția cataractei*, adică scoaterea perdelei (v. *Cataractă*).

Irigațiune (dela lat. *irrigare*, a stropi, a uda). — Un mijloc de vindecare care constă în a face să curgă pe o parte rănită, pe o rană, ori a introduce într-o cavitate naturală apă rece sau un lichid medicamentos. Irigațiunea poate să dureze câțva timp, să fie intermitentă sau să fie continuă și se face cu ajutorul unui sifon sau a unui aparat special (al lui Duplay, etc.) sau cu un irigator. Se recomandă irigațiunile continue în emoragii, în fracturi complicate de plăgi, în plăgi prin smulgere, în boalele de mitră, etc., iar cele intermitente în boalele de ochiu, de nas, de urechie, de gât, de beșică, etc.

Irigator (dela lat. *irrigare*, a uda, a stropi). — Instrument cu ajutorul că-

ruia se aruncă apa, sau un lichid medicamentos în nas, în gură, sau în vagin, ori în rect (șezut), lichide cari servesc pentru a face spălătură în acele părți, sau clizmă. Irigatorul, ori care ar fi întrebuințarea lui, trebuie ținut în stare de curățenie foarte mare și la adăpost de praf și de murdărie. El este făcut dintr'un vas de sticlă sau de metal smălțuit, care se termină jos cu un tub de care se prinde un maț de cauciuc. La capătul liber al acestui maț se pune o canulă sau un tub mic.

Iris. — V. *Ochiu*.

Irită. — V. *Ochiu*.

Iritante, iritație (dela lat. *irritatio*, întârâtare). — Starea de *iritație* a unui organ este un început de *inflamație* sau de aprindere a lui.

Când un organ este iritat, fie vorba de piele, de ochi, etc. este dureros, roșu, cald și uneori umflat, prin îngrămădire de sânge în el. Deosebirea dar între iritație și inflamație este numai că în aceasta semnele mai sus înșirate sunt mai pronunțate, sunt în grad mai mare și se însoțesc de febră și de alte simptome generale. — Se numesc *iritante* medicamentele cari fac ca o parte a corpului să fie pentru moment mai simțitoare și mai roșie decât în starea obișnuită, fără însă ca ele să producă inflamație. Iritantele se confundă adeseori cu *excitantele*; un medicament care nu este decât *excitant* pentru un om, sau un organ, devine *iritant* (supărător) pentru un alt om sau pentru un alt organ. Deosebirea de lucrare atârână și dela durata contactului aceluia medicament cu corpul; astfel amoniacul, dacă este numai plimbat pe sub nasul unui bolnav, este excitant prin vaporii lui, dacă este ținut aproape sub nas și nemișcat, vaporii lui vor produce la început iritație, iar mai la urmă inflamație. Tot astfel și electricitatea: aplicată cu prudență produce o excitație folositoare, iar aplicată mai mult decât trebuie o iritație. — Iritantele din punct de vedere *medical* sunt bune și trebuincioase. Colirul cu sulfat de zinc este foarte bun în inflamațiile simple de ochi, nitratul de argint în conjunctivita granuloasă, sau în amigdalite, ori angine, precum și insuflațiunile cu tanin, sau cu piatră acră,

sunt bune, căci produc o iritație artificială care înlocuiește o inflamație. Tot așa când ungem o încheietură dureroasă și inflamată cu tinctură de iod, sau când punem pe piept un muștar în cazurile de bronchită, etc. se provoacă o iritațiune vindecătoare. Din punctul de vedere igienic, iritantele trebuiesc ocolite, fiindcă ele prin aplicare mai îndelungată și repetată pot produce inflamațiunea organelor asupra cărora se aplică; astfel sunt: condimentele iuți, luate în măsură mare (piper, muștar, ardeiu, usturoiu, etc.), precum și băuturile tari și alcoolice cu timpul irită și inflamează stomacul și mâțele, producând gastrită și enterită. Tutunul irită gâtul și plămânii, dând aștere la laringită (răgușeală) și bronchită; unsoarele, pomadele, cold-cremurile, cari nu sunt proaspete, precum și unele pudre făcute cu substanțe saline sau metalice, irită și cu timpul inflamează pielea dând naștere la diferite boale.

Iritare de nervi. — V. *Agasare*.

Isacen (fabrica elvețiană Roche). — Este un praf alb, cristalin, inodor și insipid. Nu se disolvă în apă. Lucrează asupra colonului și este indicat în constipații acute și cronice mai ales la copii, femei însărcinate și la suferinzi de rinichi. Nu produce colici, nu are nici o contraindicație. E pus în comerț sub formă de granule; se dă 1—6 granule după caz (1—3 granule pentru copii).

Îsurie (dela grec. *ischēin*, a opri, a reține, și *uron*, ud). — Greutatea sau neputința de a urina, oprirea udului, sau retențiunea urinii (vezi *Urină*).

Ismă, *ismă bună*, *ismă de leac*, *mentă*, *mintă piperigă* (*Mentha piperita*, fam. labiatelor). — Plantă erbacee, originară din apusul Europei și din America de nord, care se cultivă mult prin grădini și se adună în lunile Iulie și August, iar vârfurile înflorite cu frunze cu tot, se usucă repede la umbră și se păstrează în saci de pânză. Din vârfurile înflorite și din flori se scoate prin distilațiune o *esență* cu miros aromatic, cu gust arzător, puțin solubilă în apă și caustică în stare curată. Esența de mentă conține *mentol*, în proporțiune de 37—72 la 100, etc.

ruri metilice, mentonă. Menta stimulează stomacul, ajută mistuirea, alungă gazele intestinale, grăbește circulația sângelui; ea se întrebuințează ca stomachic, stimulent general, în contra spasmelor. Se dă sub formă de ceai (infuziune) din 10 la 1000, idrolat 20—100 gr., alcoolat 2—10 gr., spirt, ulei volatil 2—10 picături, sirop 20—100 gr., pastile după voie. — La țară isma se întrebuințează foarte mult. Se pune ismă proaspătă în sticle cu rachiu, pe care îl colorează în verde, constituind vestitul *rachiu de ismă*, care se bea în contra durerilor de stomac, de mâte (colici). Pentru colicele infantile (*mătricea* la copii) se dă ceaiul de ismă, iar dacă durerile sunt prea mari se pune pe pânțece câte o cataplasmă caldă făcută cu ismă și leuștean. Ceaiul se dă și pentru urdinare simplă și urdinare cu sânge. Pentru durere de dinți se țin în gură rădăcină de ismă pisată cu rachiu. Pentru ciumurleală, cu greață, se freacă pe corp cu ismă pisată și oțet, punându-se apoi la lingurea. Pentru orbalț se unge cu miere și se presară cu praf de frunză de mentă uscată.

Isop (*Hyssopus officinalis*, fam. labiatelor). — Arbust frumos, odorant, originar din regiunea mediteraneană și din Asia centrală, care se cultivă adeseori ca plantă ornamentală. În medicină se întrebuințează vârfurile înflorite, sub formă de ceai (infuziune), 5—10 gr. la 1 litru de apă, în tusă învechită (bronchită cronică) și în astmă. Se mai dă ca sudorific în reumatism și la începutul febrei eruptive (pojar, scarlatină, etc.) pentru ca să iese bine. Isopul mai ușurează mistuirea (stomachic) și dă afară gazele intestinale (carminativ). El mai lucrează și ca aromatic, antispasmodic, emenagog și stimulent. — La țară babele îl dau sub formă de ceai în tusă și în alte boale de plămâni.

Istericale. — V. *Atac* (de nervi).

Isterie, *histerie* (gr. *hystera*, mitra), *atac de nervi*, *istericale*. — Isteria este o boală nervoasă, din marea clasă a *nevrozelor*, care se vede de obicei la femei și foarte rar la bărbați. Cei predispuși la isterie încă din copilărie se deosebesc prin aceea că sunt foarte impresionabili, au dureri dese de cap,

bătăi de inimă (palpitațiuni), sufocațiuni și un apetit foarte ciudat. Caracterul istericilor constă în: exagerare, minciună, dorință neclintită de a ocupa publicul cu persoana lor, fățărnicie, turburări neurastenice. — *Cauzele* isteriei sunt: anemia, ereditatea, emoțiunile morale vii, supărările, otrăvirile prin alcool, plumb, mercur, boale infecțioase (frigurile palustre, pneumonia, reumatismul), boalele de mitră, sarcina. — *Semnele*: În isteria *convulsivă*, slabă, sau *mica isterie*, avem în primul rând, *atacul isteric*, care este precedat de căscături, de indispoziție, de plâns sau de râs fără motiv. Atacul se anunță prin *aură*, care este un fel de înștiințare ce constă într-o *durere* ce pleacă dela un *ovar* (*ovarie*), adecă din partea dreaptă sau stângă a jumătății de jos a pântecelui. Durerea se urcă la lingurea și de aci pe piept în sus până la gât ca un *nod*, care te strânge de gât și te înecă, însoțindu-se de turburări ale vederii și auzului. Atunci începe atacul: *căderea* corpului, care nu se face pe jos sau pe loc ca în epilepsie, ci pe un pat, o canapea sau un scaun, căci bolnavul are timp de a-și alege locul unde cade, *vociferățiuni* și congestiunea feței, *mișcări convulsive* foarte mari (svârcoliri, strâmbături, îndoituri, mișcări din șolduri, închinăciuni) precedate câte odată de spasme sau contracturi, *pierdere a cunoștinții*, mai mult sau mai puțin completă. După câțva timp, care variază dela câteva minute până la câteva ceasuri, după cum atacul este unic sau se succede mai multe atacuri, urmează odihna, fața exprimă frică sau mânie, apoi bolnavul plânge din adânc, urinează. Isteria *convulsivă*, *forte*, sau *marea isterie*, ori isteria așa zisă *epileptiformă*. Aci avem întâi *aura* descrisă la forma precedentă, apoi o fază *epileptiformă* de 3 până la 4 minute, cu contracturi, convulziuni urmate de o stare de moleșală, o fază de *contorsiuni*, sucituri, (svârcoliri, schimonosituri), corpul luând diferite pozițiuni anormale, în formă de arc de cerc în care femeia fiind cu fața în sus se sprijinește numai pe cap și pe picioare, etc., o fază de *ali-tudini pasionale* sub influența diferitelor halucinațiuni (năluciri) și în fine

o fază de *viziuni înspăimântătoare*, în cari bolnava vede animale periculoase (șerpi, etc.). Bolnavul poate să cadă în *sincopă* (leșin), în *letargie*, sau în *catalepsie*. Această formă poate să dureze mai multe săptămâni, în cari atacurile se repetă la intervale mai mult sau mai puțin apropiate. Este cu mult mai rară decât forma precedentă. — Isteria *neconvulsivă* are foarte multe forme pe cari le vom descrie pe scurt. Forma *paralitică* este caracterizată prin aceea că *paralizia* apare în mod spontan, sau în urma unui atac convulsiv, de odată sau gradat și atinge o jumătate de corp, stânga sau dreapta sau jumătatea de jos, lăsând de obicei fața neatinsă. Uneori paralizia se localizează numai la un membru (*braț*). Această paralizie fiind provocată printr-o emoție sau o lovitură, dispare după câțva timp pentru a se ivi din nou în unele cazuri. Forma *anestezică* este caracterizată prin nesimțire (insensibilitate) la pipăit, durere, sau la căldură, care poate fi totală cu paliditate și răcirea pielii și cu *parezii*. Forma *iperestezică* se distinge prin dureri foarte variabile, junghieri prin cap, dureri pe șira spinării, migrenă, nevralgii intercostale, angină de piept. La unii bolnavi sunt zone sau *plăci isterogene*, în cari sensibilitatea este foarte mare și mai crește încă la începutul atacurilor. În forma *afonică* sau *afazică* bolnavul își pierde pentru un timp oarecare vocea. Forma cu *tremurături* constă în aceea că bolnavul este cuprins de tremurături generalizate sau parțiale, adecă într-o jumătate de corp sau numai într'un membru, cari tremurături sunt foarte variabile ca intensitate și ca ritm. În forma cu *contracturi* avem într'un mușchiu, sau într'un membru, sau într-o jumătate a corpului (dreaptă, stângă, sau inferioară) niște contracțiuni permanente și dureroase. Aceste contracțiuni pot de altfel să apară și să dispară în mod brusc. Contractura mușchilor gâtului dă *torticolis*, aceea a ochiului *strabism*. Forma cu *turburări de nutrițiune* este caracterizată prin căderea părului, a unghiilor, prin vântăi, sudori de sânge, învinețirea mâinilor și umflarea lor, precum și a brațelor, a picioarelor, atrofia (secarea)

muşchilor. În fine mai sunt formele așa zise *viscerale*, în cari turburările pot să fie localizate în aparatul *respirator* (tusă, scuipare de sânge, înecăciune, căscături, sughițuri, etc.). În aparatul *digestiv* (schimbarea, sau perversiunea gustului, vărsături alimentare, sau de sânge, constipație, gazuri intestinale, lipsă de poftă de mâncare, dureri de stomac), în aparatul *urinar* (urinare prea multă, oprirea udului), în organele *simțurilor* (micșorarea sau pierderea vederii, vedere scurtă, sau miopie, strabism, necunoașterea colorilor, turburări ale auzului, ale gustului), în organele *matern* (dureri de sânuri, oprirea regulilor sau dureri în timpul lor). — *Tratamentul general*: Copiii neastâmpărați, nervoși și cu inteligență ciudată, predispuși la isterie, li se va întări corpul prin exerciții, gimnastică, hidroterapie, sedere la țară; vor fi opriți să meargă la spectacole, la teatre, nici nu vor ceti cărți înspăimântătoare sau de amor pasionat, pentru ca să nu li se excite simțurile și imaginațiunea. Mai târziu copiii se vor da în internate pentru ca să-și primească instrucțiunea în comun, deși aceasta are și inconveniente. La fetele tinere, în momentul când le va veni menstruația, se vor lua oarecari precauțiuni, iar ajungând la etatea de 18 ani să se mărite dacă sunt numai predispuse la isterie, dacă însă au prezentat deja atacuri, atunci căsătoria se va amâna până când vor fi vindecate. Bărbații isterici nu se vor căsători, căci le-ar produce mari turburări. Se va evita șederea pe malul mării, precum și băile de mare. *Tratamentul psihic* constă în a depărta bolnavul de locul unde s'a înbolnăvit, adecă se va *izola* și în deosebi de persoanele isterice. Se

va evita spaima, emoțiunile, se va încredința bolnavul de vindecarea boalei lui și de eficacitatea mijloacelor întrebuintate pentru a-l vindeca. *Tratamentul extern* va consta în electroterapie (electricitate statică), hidroterapie sub formă de dușuri reci de 12—18° de o durată de 20—40 secunde și terminând printr'o aruncătură de apă caldă asupra picioarelor și o fricțiune energetică. Dacă bolnavul este prea sensibil se vor face dușuri scoțiene, afuziuni, cearșeaf ud și jumătăți de băi, fără să li se se lovească zonele isterogene. *Tratamentul simptomatic* constă în a da *antinervine* (valerianat de amoniac, bromure alcaline și de camfor), *antispazmodice* (mușetel, camfor, cloroform, eter, mosc, exalgina, fenacetina, etc.), *ipnotice* (opiu, morfină), *electroterapie*, *metaloterapie*, *ipnotism* la mare nevoie. *Tratamentul atacului*: se va așeza bolnavul pe o saltea pusă jos, se va stropi față cu apă rece, i-se va da să bea mult, se vor face inhalațiuni cu eter.

Isterectomie (gr. *hystéra*, mitră, și *ektomê*, exciziune, tăiere).—V. *Mitră*. (*Cancerul mitrei*).

Istoveală, *istovire*. — V. *oboseală*.

Izolare. — Măsură ce se ia în cazurile de boale *molipsitoare* și prin care se despărțesc oamenii sănătoși de cei bolnavi pentru ca ei să nu se îmbolnăvească. Izolarea se mai face și în alte împrejurări, atunci când tratarea unui bolnav nu se poate face stând într'un loc cu mai mulți inși. — Pentru a preveni o *epidemie* cel mai bun mijloc este *izolarea*, căci ea împiedecă propagarea sau întinderea boalei, oprind circulațiunea *microbilor* dela bolnav la cei sănătoși. În spitale izolarea se face mai cu înleznire în pavilioane speciale.

J

Jaborandi (*Polycarpus pinnatus*, fam. rutaceelor). — Arbust care crește în Brazilia. În medicină se întrebuintează foile și tulpina Principiul activ se numește *pilocarpină*. Lucrează ca sudorific și sialogog, adecă produce multă sudoare și salivație (bale). Se dă sub formă de: extract alcoolic 25—75 cen-

tigrame, extract apos 50 ctgr. până la 1 gr. 25 ctgr., extract fluid 60 ctgr. până la 6 grame, sirop 1—4 linguri pe zi, infuziune din 2—4 gr. la 200 tinctură (1 gr. la 5) 5—15 grame. — *Pilocarpină*. Foarte toxică. Puternic sudorific și sialogog, miotic. Se dă 5 mgr. până la 3 ctgr. pe zi în injecțiuni.

pe sub piele. In boalele de ochi se dă sub formă de colir (pilocarpină 10 ctgr., apă distilată 10 gr.; câte 2—3 picături în ochi de 2—3 ori pe zi în glaucom). In căderea părului se dă sub formă de spălături (pilocarpină 50 ctgr., tinctură de Colonia 200 gr.), sau de alifie (cloridrat de pilocarpină 2 gr., cloridrat de chinină 4 gr., sulf precipitat 10 gr., balsam peruvian 20 gr., măduvă de bou 80 gr.). *Otrăvirea* cu *jaborandi* sau cu *pilocarpină* are ca semne: micșorarea pupilelor, salivă mare (bale multe), sudoare foarte multă, vărsături, oboseală, moleșală. *Tratamentul*: injecțiune sub piele cu un miligram de sulfat de atropină, care oprește îndată toate simptomele, sau 1,50 gr., de tinctură de beladonă, dată prin gură, vindecă tot așa de iute, apoi tanin, apă albuminoasă, emetic, etc.

Jăgăraiu. — V. *Piroză*.

Jalapa. — Se numește astfel rădăcina plantei *exogonium jalapa*, din fam. convolvulaceelor, care crește în Mexico. Rădăcina de jalapa are ca principiu activ o rezină (*convolvulină* și *jalapină*), care lucrează ca purgativ drastic, producând câte odată greață, vărsături și dureri prin intestine, din care cauză nu se dă în inflamațiunile de stomac și de intestine și rar la copii. Se dă sub formă de: pișcoturi (având fiecare 10 centigrame) extract 25 centigrame până la 1 gram, infuziune din 5 la 100, praf 1—4 gr., rezină 20—50 centigrame, tinctură de jalapa compusă sau *rachiu nemțesc* 5—30 gr.

Jale, jaleș, salbie, salvie de grădină (*Salvia officinalis*, fam. labiatelor). —

Plantă odorantă originară din sudul Europei, care se cultivă adeseori prin grădini. In medicină se întrebuințează vârfurile înflorite, cari lucrează ca stimulent tonic. Se dă sub formă de ceaiu (infuziune), 5 la 1000, infuziune concentrată din 50 la 1000. — La *fară* se clătesc în gură cu decoct pentru studenți, se fac scăldători la copii slăbiți, iar pe gălci la gât și în alte locuri se pune jale pisată și amestecată cu unt.



Fig. 221. — Salvie de grădină

Jaretiere, calțavete. — Pentru ca ciorapii să nu cadă este obiceiul ca să se lege cu ață, șiret, panglică sau cu așa numitele *calțavete* ori pe franțuzește *jaretiere*. Legătura făcută deasupra pulpei, sau a genunchiului, pentru a ține ciorapii, are marele cusur de a strânge carnea și vinele, împiedcând astfel circulațiunea sângelui prin vine, cari se umflă și cu timpul formează boala cunoscută sub numele de *varice*. Pentru a înlătura această boală trebuie ca legătura, sau calțaveta, să fie făcută dintr'un țesut mlădios și elastic, să nu aibă cataramă și să nu strângă tare piciorul. Mai bine să se înlocuiască acestea cu așa zisele *jartele*, cari sunt niște fâșii elastice, cari se fixează pe deoparte de corset prin pense, iar pe altă parte de ciorapi. La bărbați se fixează în sus de încingătoarea pantalonilor.

Jitia. — Comună în județul Râmnicu-Sărat, la o depărtare de 43 kilometri de orașul Râmnicu Sărat. Se găsește un izvor cu apă cloro-sodică-sulfurată, conținând: bromur de magneziu și clorur de sodiu, etc. Apele nu sunt captate și nu sunt întrebuințate.

Jneapăn. — V. *Ienupăr*.

Jolne. — V. *Ganglion* și *Scrofulă*.

Jucării primejdioase. — Este obiceiul ca copiilor să li se dea tot felul de jucării, dintre cari multe, mai cu seamă cele mai eftine, sunt văpsite cu colorii de anilină, cari cuprind o bună câtime de acid arsenios (șoricioaică). Pentru aceasta nu trebuie să lăsăm ca copiii să-și sugă jucăriile, iar după ce s'au jucat cu ele să-i spălăm, sau să-i punem să-și spele mâinile mai ales înainte de a mânca.

Jucăriile cele mai bune sunt cele de gumă sau de cauciuc, cari nu pot să rănească pe copii cari s'ar lovi din greșeală și se pot spăla cu ușurință, fie cu apă și săpun, fie cu alcool.

Julep (lat *julapium*, *julepus*). — Este o băutură, sau poțiune, care are însușiri îndulcitoare, domolitoare, potolitoare, care se face cu un sirop oarecare dizolvat în apă simplă într'o apă de flori, sau într'un ceaiu (infuziune) de plante emoliente (cari înmoaie) sau într'o emulsiune (un fel de lapte, cum ar fi cel de migdale, de cânepă, etc.).

Julepurile se iau seara la culcare și se beau dintr'odată, sau pe încetul ca un ceaiu rusesc. Cele mai întrebuintate julepuri sunt : julep *calmant*, făcut din : apă de teiu 120 gr., sirop de flori de portocale 20 gr., sirop de opiu 10 gr.; — julep *gumos* : apă obicinuită 100 gr., apă de flori de portocale 10 gr., gumă arabică pulverizată 10 gr., sirop de gumă 30 gr.; — julep *pectoral* sau de piept : ceaiu de specii pectorale 100 gr., gumă arabică 2 gr., sirop de mac alb 30 gr.; — julep *răcoritor* : apă de cireșe negre 250 gr., sirop de smeură 30 gr., acid tartric 2 grame.

Julitură. — V. *Excoriațiune* și *Intertrigo*.

Juneță, junie. — V. *Adolescență* și *Pubertate*.

Junghiu, durere de piept. — Prin cuvântul *junghiu* se înțelege o durere localizată într'un punct oarecare a pieptului. De obicei durerea se află într'un spațiu intercostal, într'un punct sau

în mai multe puncte. Durerea nu este la fel de mare, uneori abia se simte, alteori este foarte mare, câte odată este de nesuferit, încât omul abia își poate trage sufletul. Ea este întotdeauna mărită prin mișcare, printr'o respirație adâncă, prin tusă și mai ales prin pipăire. În cazurile cele mai ușoare junghiul este fără febră și fără tusă. În aceste cazuri avem o *pleurodinie*, sau *nevralgie intercostală*, adică o durere a nervilor celor mici cari serpuiesc printre coaste, produsă de obicei prin răceală și umezeală. În cazurile mai grave junghiul este precedat sau însoțit de fiori, de fierbințeală de sete mare, de lipsă de apetit, de opresiune (apăsare pe piept) foarte mare, de tusă și atunci trebuie să ne gândim la alte boale cu mult mai serioase la *pleurezie*, la *pneumonie* la *oftică*. *Tratamentul* : v. *Pleurodinie* și *plămân* (*Pleurezie*, *Pneumonie*).

Jupuială. — V. *Pelagră*.

Jupuitură. — V. *Excoriațiune* și *Intertrigo*.

K

Kakke. — V. *Beriberi*.

Kefir. — *Chefir*.

Kelotomie. — V. *Chelotomie* și *Ernie*.

Keratită. — V. *Ochiu* (*Cheratitis*).

Kermes mineral. — V. *Antimoniu*.

Kineziterapie. — V. *Chineziterapie*.

Kirsch. — V. *Chirș*.

Kist. — V. *Chist*.

Kleptomanie. — V. *Cleptomanie*.

Kola. — V. *Cola*.

Kumis. — V. *Cumis*.

Kuso. — V. *Cuso*.

L

Lăcrămăre. — V. *Epifora*.

Lacrimală (Fistulă). — V. *Lacrimi*.

Lacrimi (lat. *lacryma*, grec. *dacry*). —

Lacrimile nu sunt date numai pentru ca omul să-și arate supărarea, suferința și uneori chiar bucuria; slujba lor este de a uda neconținut ochiul pentru ca el să se poată mișca cu înleznire în toate părțile și fără cari el s'ar usca și vederea s'ar pierde. Lacrămile sunt produse de *glanda lacrimală*, care este așezată în partea din afară a ochiului, și ele sunt vărsate fără încetare la partea dinăuntru a celor două pleoape, între ele și globul ocular, întinzându-se pe toată suprafața ochiului. După ce au udat ochiul

o parte din lacrimi se evaporează, iar partea cea mai mare, ajungând la unghiul dinăuntru a ochiului, sunt supte de *conductele lacrimale* și duse în nas, unde se amestecă cu muci. În stare normală lacrimile se produc și-și îndeplinesc slujba fără să băgăm de seamă, dar câte odată ele se produc în cantitate mai mare decât trebuie, și atunci, neputând merge toate în nas, o mare parte curg pe față și astfel *plângem*. Lucrul acesta se întâmplă și când ochiul este iritat de praf, de vânt, de lumină prea vie, când conjunctiva este aprinsă (inflamată), când omul are guturaiu și inflamațiunea se întinde din nas până la canalele prin cari curg

LACT

LACU

lacrimile. În toate aceste cazuri lacrimile fiind în mare cantitate o bună parte din ele curg pe obraz și atunci avem *lăcrămare*. Tratamentul lăcrămării este acela al boalei care o produce: guturaiu, conjunctivită, etc. Se întâmplă uneori că lacrimile sunt în cantitate normală și cu toate acestea ele curg pe obraz. În acest caz lăcrămarea provine din faptul că conduc-




Fig. 222. — Glandele lacrimale

tele cari duc lacrimile în nas sunt astupate, iar ele se adună în *sacul lacrimal*, pe care îl inflamează și care, supurând, se deschide dând loc la *fistulă lacrimală*. Contra acesteia trebuie să ne adresăm unui doctor priceput care, printr'o operație, va da din nou curs lacrimilor în nas (v. *Ochiu*).

Lactat (Regim). — V. *Lapte*.

Lactat de fier. — V. *Fier*.

Lactic (Acid). — Medicament care înleznește mistuirea și se dă cu mult succes în diarea (urdinarea) verde a copiilor. *Doză*: 2—4 gr. pe zi într'o poțiune sau limonadă (acid lactic 2 gr., apă 100 gr., să se dea la fiecare oră câte o linguriță). Pe *dinafară* se întrebuințează în gargară, în aplicațiuni în contra peladei, pe jumătate cu apă sau alcool, în atingeri pe limbă sau în gât pentru ulcerăriuni tuberculoase (oftică).

Lactofenină (*Fenolactină*). — Este un fel de *fenacetină* în care acidul acetic s'a înlocuit cu acidul lactic. Lucrează ca analgezic, antipiretic și ipnotic (în contra durerii, a căldurii și produce somn). *Doză*: 60 ctgr. până la 1 gr. în buline.

Lactofosfat de calciu. — V. *Calce*.

Lactol *Lactonaftol*, *Lactat de fenol*. — Antiseptic intestinal, care lucrează ca și benzonaftolul. *Doză*: 50 ctgr. până la 2 gr. în buline.

Lactoză. — Zahăr de lapte. Este unul din cele mai bune diuretice. *Doză*: 30—100 gr. pe zi. Se topește 30—50 gr. în apă, iar pentru a-i da un gust mai plăcut se poate adăuga puțină zeamă de lămâie, sau nițică șampanie. La adulți se pun 100 gr. de lactoză într'un litru de apă și bolnavul va bea în timp de 24 ore 2 litri.

Lactucarium (dela *lactuca*, lăptucă). Suc lăptos care se scoate din *Lactuca altissima*, prin incisiuni făcute în tulpină. În momentul scurgerii sucul este alb, apoi, uscându-se la soare, ia o culoare închisă, un gust amar, un miros neplăcut ce se aseamănă cu al opiuului. *Siropul de lactucarium*, numit și siropul lui *Aubergier*, domolește tusa în doză de 3—4 linguri pe zi, iar pentru copii 3—4 lingurițe. Această lucrare calmantă se datorește în mare parte și micei cantități de opiu pe care o conține acest sirop.

Lacul-Sărat. — Stațiune balneară în județul Brăila, la o depărtare de 5 km. de orașul Brăila și la 3 km. de Dunăre. Stațiune reputată pentru băile de nomol. Ea este proprietatea statului. Clima temperată: în timpul verii temperatura variază între 20—26°. Stațiunea este așezată într'un câmp deschis, încunjurat de o vegetațiune bogată. Lacul are o lungime de 2—2½ Km. și o lărgime de 300—400 metri; Alimentația cu apă a lacului se face din izvoarele subterane, prin ploii și zăpadă. Densitatea apei variază după variațiunile atmosferice, temperatura ei de asemenea după adâncimea lacului, iar a nomolului este de 12—27°. Vânturile ajută la evaporarea apei, mărind astfel densitatea ei, iar în părțile unde apa e mică nomolul este acoperit la suprafață de o coajă de soare, de culoare cenușie cărămizie. Culoarea apei la suprafață este verzeu și pe alocuri cărămizie-neagră. Nomolul este negru-cenușiu, moale untos; el se compune dintr'o parte minerală, una vegetală și una animală. Apele lacului sărat sunt cloruro-sodice-iodurate-fieruginoase. Apa și nomolul se bucură de proprietăți

insecticide. Pe *dinăuntru* se întrebui-
țează numai apa din *fântâna minerală*,
apă purgativă dar greu de digerat
pentru care trebuie luată în doze mici
de 30—100 gr. pe zi. Este bună în lim-
fatism, atonie intestinală, scrofuloză,
anemie. Atât apa cât și nomolul își
găsește întrebuințarea în băi reci sau
calde. Acțiunea apelor este *excitantă*,
alterantă (capabilă de a favoriza schim-
burile nutritive), *rezolutivă* (stimulând
toate funcțiunile), *tonică*, *reconstitu-
antă*, *emenagogă* și *sedativă* remarcabilă.
Se recomandă la bărbați în boalele
reumatismale, *afecțiunile traumatiche*,
scrofuloză, *tuberculoză*, *afecțiunile ner-
voase* (sciatică și alte nevralgii, emi-
plegii, diferite boale de *piele*. La femei :
în *anemie*, *menoragie* *metroragie me-
trită*. La copii în *debilitate generală*,
limfatism, *scrofuloză*, *rachitism*. Nu este
bun în stările acute, tumori maligne,
oftică, astmă, boalele de inimă, de ri-
nichi, gastro-enterită, lupus ipertrofic.

Lămâie, alămâie. — Este fructul ar-
borelui *Citrus limonum* din fam. ruta-
ceelor, care crește în India, Ceilan și
se cultivă ca plantă ornamentală pen-
tru florile sale frumoase și mirositoare
(Mai—Iulie). Lămâile sunt prea acre
(acide) pentru a putea fi mâncate
în natură, dar ele se întrebuințează
mult în bucătărie și în farmacie. *Esența*
de lămâie se întrebuințează pentru a
aromatiza unele pomade și intră în



Fig. 223.—Lămâi

mai ales *limonada citrică*, sau *ordî-
nară* (v. *Limonade*). În medicină se
întrebuințează pentru acțiunea anti-
septică, astringentă, răcoritoare. Zeama
de lămâie este bună contra *scorbutului*,
contra oricărei boli provenite din lipsa
de vitamine din corp, când se pot da
2—3 lămâi pe zi, stoarse și amestecate
cu zahăr și apă.—La *țară* zeama de

coaje de lămâie fiartă se bea de durere
de stomac. Pentru *gâlbănare* se taie
feliuțe de lămâie, se presară cu sineală
și se mănâncă una în ziua întâiu pe
nemâncate, două în ziua a doua, trei
în ziua a treia, până la nouă în ziua a
noua, apoi se scade cu câte una în fie-
care zi până ajunge iar la una.

Lămâioară, cimbru, lămâiță (*Thy-
mus vulgaris*, fam. labiatelor). — Ar-



Fig. 224.—Lămâioară

bust mic, origi-
nar din regiu-
nea meditera-
niană care se
cultivă pe la
noi ca plantă
aromatică pen-
tru trebuințe
culinare. Această plantă „herba-thymi”
se întrebuințează în medicină ca amară,
astringentă, tonică și stimulentă. Din
această plantă se scoate acidul timic,
sau *timolul*.

Laminaria. — Se numește astfel ră-
dăcina unei specii de alge marine, *lami-
naria digitata*, care se găsește în abon-
dență în mările Europei și Americii
de Nord. Această rădăcină, îmbibân-
du-se de un lichid oarecare, se umflă
foarte mult și pentru aceasta se între-
buințează ca și *spongia preparată*, pen-
tru a lărgi traiecte fistuloase și diferite
orificii, în special pentru a dilata colul
mitrei, când medicul face raclaj.

Lamium album. — V. *Sugel alb*.

Lămpi. — V. *Lumină*.

Lână. — V. *Veșminte*.

Lâncezeală (lat. *languor*). — Prin a-
cest cuvânt se înțelege o stare de aba-
tere generală, de toropeală, un fel de
oboseală sufletească și trupească. Sta-
rea de lâncezeală face parte din acele
stări vagi, nehotărâte, rău definite,
ale sistemului nervos, cari, fiind dato-
rite unor influențe morale, nu pot să
treacă, nu se pot vindeca decât prin
remedii morale. Despre stomac slăbit
care își îndeplinește cu greutate slujba,
se zice că este într-o stare de lânce-
zeală și așa se poate zice despre toate
organele cari sunt leneșe, dintr-o pri-
cină sau alta, în funcțiunile lor.

Lanolină. — Corp gras care se scoate
din usucul lăunii de oaie. Servește la
prepararea multor alifii, întocmai ca
și *vaselina*. Lanolina *boricată* conține
10 gr. de acid boric la 100; lanolina

LANT

fenicată 5 la 100; lanolina salicilată 2 la 100; lanolina idrargică cuprinde 50 la 100 mercur.

Lanțetă (lat. *scalpellum*). — Un instrument mic de chirurgie, compus dintr'o lamă de oțel, de formă alungită și din plăsele, cari astăzi se fac tot din metal. Lanțeta are mai multe forme după felul întrebuințării: pentru lăsat sânge din vână pentru operațiile asupra ochiului, pentru vaccinat sau pentru a deschide o colecțiune de puroiu.

Lăpădătură. — V. *Abort*.

Laparotomie (dela grec. *lapara* flank. deșert, pânțece, și *tome*, tăiere). — Se numește astfel operațiunea care constă în deschiderea pântecelui pentru a lucra asupra organelor cuprinse în el. Ea se face în multe împrejurări: pentru încurcătura de mațe, pentru răni-rile stomacului și mațelor, pentru a scoate un corp străin din stomac, pentru a scoate mitra (isterectomie), pentru a scoate un copil în cazul când mama nu poate să nască, din cauza bazinului prea strâmt, sau pentru a scoate un ovar (ovariotomie), etc —

Lapte (lat. *lac*, grec. *gala*). — Cea dintâi hrană a omului după ce se naște este *laptele*, căci el cuprinde substanțe de nutrițiune de calorificațiune și sărurile trebuincioase organismului; mușchii (carnea) se dezvoltă din *caseina* laptelui, căldura animală din untul și zahărul (lactoza) lui și tăria oaselor din sărurile, cuprinse în laptele matern. Dela o vârstă oarecare, atât la om cât și la animale, laptele nu mai îndestulește organismul și trebuie un alt regim, compus din substanțe mai bogate în elemente de nutrițiune spre a forma un aliment mai puternic. Sunt însă multe împrejurări de boală în cari omul este ținut să se hrănească numai cu lapte după cum vom vedea mai la vale. — Laptele este un lichid opac, alb, alb-gălbui sau alb-albăstrui, mai greu decât apa cu care de altfel se amestecă foarte ușor, cu gust dulce și zaharat. Este




Fig. 225
Lactometru

LAPT

un aliment complet, întocmai ca și *oul*, cuprinzând toate trei felurile de materii trebuincioase întreținerii vieții adevă: materii animale sau azotate cari sunt *caseina* și *albumina*, o materie grasă *untul*, o materie dulce *lactoza* (zahărul de lapte). Aceste materii împreună cu apa și diferite săruri, variază în proporțiune după proveniența laptelui: femeie, capră, măgăriță, iapă, vacă, oaie. Laptele de *femeie* este mai bogat în albumină și zahăr și mai sărac în grăsime. Cam tot așa este și laptele de *măgăriță*. Laptele de *iapă* are mai mult zahăr din care pricină fermentează mai cu înlesnire și dă o băutură acrișoară și alcoolică, cunoscută sub numele de *cumis* și care dă bune rezultate în boalele de stomac, în oftică și în toate boalele în cari omul slăbește mult. Laptele de *vacă* este din contră bogat în caseină, în unt și săruri și sărac în zahăr. Laptele de *capră* și cel de *oaie* este mai gros și mai gălbui decât cel de vacă. — Abondența și



Fig. 226
Thermo-lactometru

a = măsurarea densității laptelui
b = măsurarea temperaturii

calitatea laptelui variază după hrană și după alte împrejurări; astfel, o femeie, care se hrănește bine are lapte mai bun și mai bogat în caseină și unt, în vreme ce un regim vegetarian are efect contrar. O vacă hrănită cu nutreț uscat, sau verde, are lapte mai bun decât când se hrănește cu turte de semințe uleioase, cu reziduri din distilerii, dela fabricile de zahăr, de bere, și laptele este și mai bun dela o vacă ce trăiește la țară, pășunează, sau paște în aer liber, în libertate. De altfel chiar laptele dela aceeași vacă variază după cum este muls la început ori la sfârșit, sau după cum este muls seara (când este mai gras) ori dimineața (când este mai subțire). — *Coloarea* laptelui se datorește unor *globule sferice* cari se văd numai cu microscopul și sunt compuse din materii grase. Numărul acestor globule se mărește printr'o hrană abondență și prin repaus. Dacă lăsăm laptele în voia lui el se deosebește mai întâi în două părți dintre

cari una deasupra care este *smântâna*, apoi mai târziu laptele se coagulează, adecă se *închiagă*, deosebindu-se în trei părți : una deasupra albă, opacă, moale, cu un gust plăcut, care este *smântâna*, partea grasă a laptelui din care se face *untul*, a doua sau partea mijlocie, care este ceva mai albă, fără gust, care cuprinde partea azotată a laptelui, numită *cazeină* (brânză albă sau caș) și a treia care este partea lichidă galbenă verzue, transparentă, cu gust acrișor, *serul*, sau *zărul* laptelui, el se compune din apă, din zahăr (lactoză), din materii albuminoide, din acid lactic și din săruri. — *Falsificațiunile* laptelui sunt de multe feluri, cele mai dese însă constau în *luarea smântânei*, *adăugirea de apă* și *îngroșarea cu făină*, etc. Punerea apei în lapte se cunoaște prin ajutorul unui *lacto-densimetru*, (grad de lapte), care, pus în lapte, ne arată după cum se cufundă mai mult sau mai puțin dacă s'a pus apă și câtă apă s'a pus. Un alt aparat și mai bun este *thermo-lactometru*, care nu mai are nevoie ca laptele să aibă temperatură de 15° ca celelalte pentru a ne arăta densitatea adevărată. Acest *thermo-lactometru*, este un aerometru combinat cu termometru și întrebuițarea lui este foarte simplă : îl introducem în vasul cu lapte și ne uităm dacă coloana termometrică corespunde cu punctul de scufundare a instrumentului și în caz afirmativ, laptele are densitatea normală. Luarea smântânii sau *smântânirea* laptelui se constată prin *cremommetru*. Un lapte bun trebuie să aibă între 10—16 diviziuni, sau grade, de smântână. Un lapte cu 8 grade este foarte sărac și arată că a fost smântănit sau că animalul este slab și rău hrănit. Luarea smântânii și punerea de apă sunt falsificări cari trebuiesc cu orice preț oprite, căci ele lipsesc laptele de o parte din substanțele lui hrănitore. Punerea de apă, mai ales când apa nu este curată, este foarte primejdioasă căci poate da naștere la diaree, dizenterie, febră tifoidă, etc. *Îngroșarea* laptelui cu *scrobeală* se face cu scop de a ascunde adaugirea de apă care subțiază laptele. Această îngroșarea se poate cu ușurință constata turnând în lapte o picătură de iod, care întâlnindu-se cu scobeala colo-

rează laptele în albastru. — *Alterațiunile, fermentațiunile, microbii laptelui și boalele cari se pot transmite prin lapte*. Microbii găesc în lapte un bun teren, căci se înmulțesc foarte repede. Dovadă despre aceasta este că la 2 ceasuri după mulgere se găesc pe centimetru cub 9 mii de microbi, iar după 10 ceasuri 100 de mii și după 26 ceasuri 5 milioane. Microbii cari se găesc în lapte sunt de mai multe feluri. Laptele după câtva timp dela mulgere se corăsește și aceasta din pricină că a căzut în el din aer un microb, numit *bacillus lacticus*, care, înmulțindu-se, descompune zahărul din lapte și dă acid lactic, iar acidul lactic închiagă caseina laptelui, mai ales în timpul verii, deoarece căldura ajută înmulțirea microbilor. Fierbând laptele se împiedcă pentru câtva timp această fermentațiune, fiindcă prin fierbere se omoară microbii. *Fermentațiunea alcoolică* ne dă mult vestitul *chefir*, care este o băutură acrișoară, puțin alcoolică, fabricată din lapte prin ajutorul grăunțelor de chefir, cari sunt formate dintr'o mulțime de microbi, cari dau naștere la această fermentațiune folositoare. Microbii *patogeni*, sau producători de boale, au origine foarte variată ; unii vin în lapte de pe mâinile celor cari au muls vaca (scarlatina, vărsatul, etc.), alții provin de pe ugerul vacii murdărit, (febra tifoidă etc.), iar alții cad din aer în lapte (difteria, oftica, etc.). Alți microbi patogeni pot proveni chiar dela animalul care dă laptele, bolnav de oftică, sau de febră aftoasă. Laptele dela o vacă cu febră aftoasă ne poate produce o boală de gură cunoscută sub numele de *afte* (arșiță, beșicuțe) și diaree, iar laptele dela vaci cu dalac ne poate da dalac la intestine. Pentru a preveni toate acestea trebuie ca în totdeauna să se fiarbă laptele în clocote timp de mai multe minute, pentru ca să moară toți microbii patogeni. Hrănirea vacilor cu borhot și cu sfecle putrezite face ca laptele să dea copiilor boala numită *gastroenterită*, care este foarte periculoasă. Sunt unele medicamente cari pot trece în laptele mamei, doicii și să producă diferite accidente copilului, și prin urmare trebuie să ținem seamă de aceasta. — *In-*

trebuințările laptelui în stare de sănătate. La copil laptele constituie în primul an al vieții hrana exclusivă, iar în lunile următoare baza alimentației. Cel mai bun lapte pentru copil este al mamei sau al doicii, care trebuie întotdeauna preferat celorlalte mijloace (vezi *Alăptare*). Pentru adult laptele nu este de ajuns, căci organismul lui cere alimente mai substanțiale, mai hrănitore, pentru ca să-i repare pierderile încercate prin muncă. Prin urmare adultul se va hrăni mai mult cu alte alimente, dar poate zilnic să ia și o cantitate oarecare de lapte sub diferite forme de preparațiuni. Laptele băut îndată ce a fost muls este mai bun decât laptele fiert. Fierberea este bună din alt punct de vedere, foarte important pentru sănătate și anume prin fierbere se omoară microbii patogeni sau producători de boală, de aceea este bine ca întotdeauna să bem laptele fiert, care este mai ușor de mistuit când se bea rece, decât când este cald, mai cu seamă pentru cei ce suferă de stomac. — *Intrebuințările laptelui la bolnavi: regim lactat.* Sunt multe boale în cari omul nu se poate hrăni decât numai cu lapte, urmând *regim lactat*, sau *dietă lactată*. Laptele trebuie luat în 24 ore: 2 până la 4 litri. Pentru a schimba gustul laptelui fiert, care nu place unor bolnavi, se poate modifica punându-i sare, sau zahăr, sau lămâie, vanilie, cafea, ceaiu, chirș. Pentru ca laptele să nu lase în gură un gust rău, duhoare rea de lapte, este bine ca omul să-și clătească întotdeauna gura după ce a băut lapte cu apă ca să nu-i rămână lapte printre dinți și măsele. Când laptele produce diaree se poate pune în el puțină apă de var, iar când produce constipație i se poate pune o apă minerală laxativă, puțină mană, sau să se facă clizme. Regimul lactat se recomandă în *boalele tubului digestiv*. Laptele produce unor persoane constipație, altora diaree.

Lapte de pasăre. — Este o băutură care se prepară astfel: se bat două gălbenușuri de ouă cu zahăr pisat, sau cu miere și cu câteva picături de apă de flori de portocale, de viorele, de trandafiri, ori de care s'ar găsi, apoi se toarnă un păhar de apă caldă, sau de lapte cald și se amestecă repede,

dând s'o bea bolnavul. și adăogând, dacă vrem să fie. *aromatic*: 50 grame de rom și 50 grame de sirop de tolu (foarte bun în tusă).

Lapte de migdale. — V. *Amigdale* și *Emulsione*.

Lapte purgativ. — O curățenie pentru copii, bună și plăcută, preparată astfel: se pune în 200 gr. lapte cald 10 sau 60 gr. de *mană* (după vârstă) și se dă să se bea dintr'odată dimineața pe nemâncate.

Lapte virginal. — Se numește astfel un cosmetic care se întrebuințează pentru ca pielea feței să-și păstreze frăgezimea și se prepară astfel: se toarnă în 400 gr. de apă de sulfină (melilotus officinalis), sau în apă de trandafiri, sau în lapte de migdale, 10 gr. de tinctură de smirnă (benzoe), picătură cu picătură. Nu trebuie însă să pierdem din vedere că acest cosmetic, dacă se întrebuințează prea des, usucă și strică pielea.

Laptele cânelui, buruiană măgărească, aior, alior, laptele cucului, Euphorbia helioscopia (fam. euforbiaceelor). — Plantă ierbacee care crește prin locuri cultivate printre sămănături și pe marginea câmpurilor, pe la garduri. În medicină nu se întrebuințează. — La țară se rupe planta și cu laptele ce curge se ung negii, pecinginea și unghiile stricate. Sămânța și planta întreagă se mai întrebuințează ca vomitiv (ca să facă să verse), în contra frigurilor (febrifug). Se mai fac și haturi din laptele stors din plantă îngroșat cu făină de grâu, cari lucrează ca purgativ (curățenie).



Fig. 227.
Laptele cânelui

Lăptucă, lăptucă, marul, salată (Lactuca sativa sau capitata, fam. compozitelor). — Această plantă erbacee se cultivă mult prin grădini ca plantă culinară și se mănâncă sub formă de salată, crudă, sau opărită, ușor de mistuit și răcoritoare. Frunzele de lăptuci fierte în apă dau un lichid care înmoaie pielea și se întrebuințează cald sau calduț, la spălăturile de dimineața pe față și pe mâini, mai ales în unele boale de piele. *Apă de lăptuci*,

care se prepară pisând tulpina într'un mojar cu apă distilată la un foc dulce, se întrebuintează într'un mare număr de poțiuni calmante. Extractul de lăptuci (thridace) se dă în doză de 20 ctgr. până la 2 grame, siropul de lăptuci (thridace) 30—50 gr. *lactucarium* 10—50 ctgr., siropul de *lactucarium* opiaceu 30—50 gr.

Lărgirea stomacului. — V. *Stomac*.

Laringe (lat. *larynx*), *beregată, gâtlej, răsuflătoare*. — Laringele este organul vocii și al respirațiunii și este așezat în partea de sus și de dinainte a gâtului, imediat sub rădăcina, sau baza limbii. Prin laringe trece aerul care se duce la plămâni, așa că el este primul organ al respirațiunii. În laringe se află *coardele vocale* cu ajutorul cărora omul vorbește de aceea în boalele laringelui mai întotdeauna este răgușit, sau cu vocea schimbată. Laringele s'ar putea semăna cu o cutie deschisă în sus și în jos, a cărei părți sunt formați de două cartilaje (sgârciuri) suprapuse: cel deasupra, numit *cartilagiul tiroid*, se arată sub piele la bărbat sub forma unei ridicături ascuțite, cunoscută sub numele de *mărul lui Adam*, iar cel de jos este cu mult mai mic și abia se poate simți cu degetele, numit *cartilagiul cricoid*. Al treilea cartilagiu, numit *epiglota*, este un fel de capac pus deasupra cartilagiului tiroid și care capac se lasă în jos și astupă laringele când înghițim sau bem, așa că mâncarea și băutura nu pot pătrunde în el; când numai o picătură de apă pătrunde în laringe, omul se înecă și trebuie să tușească de mai multe ori pentru ca să scape de înecăciune. Înăuntrul laringelui, cam pe la mijlocul lui, se află *coardele vocale* în număr de patru: cele *superioare* circumscriu un orificiu și cele *inferioare* de asemenea un orificiu numit *glotă*. Între cele două coarde vocale din aceeași parte se află un orificiu eliptic, care formează intrarea *ventriculului* corespunzător, o cavitate laterală mai mult sau mai puțin dezvoltată. La nivelul *glotei* se produce vocea printr'un mecanism în care coardele vocale vibrează în contact cu aerul (v. *Voce*). Mucoasa, sau căptușeala dinăuntru a laringelui, este continuarea acelei din gură din fundul

gurii și din trachee. Ea este foarte simțitoare la cea mai mică iritațiune (corp străin, aer rece) care îndată provoacă tuse. — **Boalele laringelui:** *Laringita acută simplă* este produsă de o răceală la gât, la picioare, prin respirarea unui aer rece și umed, sau a unor aburi și pulberi iritante. Vocea se schimbă, devine închisă, răgușită, fără durere și atâta tot. Respirațiunea se face cu greutate și bolnavul are durere la înghițit. Dacă ne uităm în fundul gurii, apăsând limba cu o coadă de lingură, vedem o roșeață vie. Tratamentul constă în odihnă, în pază de frig, în băi la picioare cu muștar dimineața și seara, gargară cu ceaiu de nalbă, sau cu decoct (fiertură) de orz cu miere de trandafiri; să se pună în jurul gâtului cârpe înmuiate în apă foarte caldă, acoperite cu vată și cu gutapercă. *Laringita cronică* se arată cu răgușeală și greutate în respirație. Cauzele sunt: oboseala, excesele de băuturi, tutunul, artrirismul, laringitele acute repetate. Tratamentul la început este întocmai ca acela al laringitei acute, iar dacă boala nu trece trebuie chemat un doctor specialist. *Laringita tuberculoasă sau oftica în gât* este cea mai gravă și este caracterizată prin dezvoltarea în laringe de tuberculi și ulcerăriuni. În cele din urmă oftica se întinde și la plămâni. Această boală sfârșește întotdeauna cu moarte, căci leacul până acum nu i s'a găsit. *Crupul* este o laringită acută *difterică*, despre care am vorbit la articolul *crup*. În laringe se pot dezvolta mai multe feluri de tumori, dintre cari mai principale sunt: *polipii* și *cancerul*. Toate aceste tumori la început au aceleași semne ca și laringitele, adică schimbarea vocii, răgușeală, greutatea la înghițit, mai cu seamă a lichidelor și mai târziu greutate crescândă în respirație. Tumoriile acestea se arată pe încetul, în mod progresiv, fără febră și fără durere la început. Polipii nu dispar decât prin operație și se pot vindeca fără să lase urme, pe câtă vreme cancerul, chiar dacă s'a operat bine, ceea ce este foarte greu, se ivește din nou. Examenul laringelui se face cu un aparat numit *laringoscop*.

Laringită. — Inflamațiunea laringelui,

Laringită striduloasă, crup fals. — Este o *laringită acută*, adică o inflamațiune a laringelui, însoțită de înecăciune, care se observă la copiii mai mici de șase ani. *Semnele* acestei boale sunt următoarele: în mijlocul nopții copilul se deșteaptă cu o tusă răgușită, deasă, puternică și sgomotoasă; respirațiunea este întretăiată și gâfăindă cu un fel de șueretură în minutul inspirației. Vocea este regușită între accesele de opresiune în timpul cărora ea este foarte slabă, însă mai puțin stânsă decât în *crup*. Criza de opresiune, care se însoțește de fierbințeală mare și de congestiunea feții (îngrămădire de sânge la față), poate să dureze o jumătate de ceas până la trei ceasuri, după care revine liniștea înțetului cu înțetul și cu ea somnul și, dacă tusa se reproduce, ea este mai umedă. În fundul gurii nu se vede nici o urmă de angină. În timpul zilei vocea este aproape normală și numai tusa este răgușită. Accesul se poate repeta mai multe nopți dearândul, însă din ce în ce mai slab și zilele sunt bune. Această laringită, numită și *crup fals*, se deosebește de *crupul adevărat* (vezi *Crup*) prin aceea că ea vine mai repede și cu furie mai mare, starea ei se modifică mult în timpul zilei și tusa nu este stinsă între accese. *Cauza* este răceala. *Tratamentul* constă în aplicare de *revulsive* la gât, adică: muștare, tinctură de iod, comprese sau cărpe înmuiate în apă foarte caldă, băi la picioare foarte calde și cu muștar, apoi să se învelescă bine picioarele în flanele. Să se dea o poțiune calmantă și expectorantă: bromur de sodiu 1 gr., sirop de cloral 20 gr., sirop de tolu 30 gr.; să se dea în timpul nopții lapte cald. În cazuri de *asfixie* amenințătoare se vor face *tracțiuni ritmate* asupra limbii, tubajul laringelui sau tracheotomia.

Laringoseop (gr. *laringx* și *skopein* a privi). — Astfel se numește instrumentul cu ajutorul căruia se examinează laringele de către medici.

Lăsare de sânge venesectiune (lat. *venae sectio*), *flevoto mie* (grec. *phlebotomia*). — Lăsarea de sânge se face sau din *vine* și atunci se numește lăsare de sânge *generală*, sau din *capilare* prin punere de lipitori, ventuze

sau păhare tăiate și atunci se zice lăsare de sânge *locală*. *Lăsarea de sânge generală*, sau de *venesectiune* (flevotomie), se face de obicei prin tăierea unei vine dela *îndoitura cotului* (la braț), iar când din diferite împrejurări nu se poate face aci se va face la *picioar*. La braț se face la una din vinele îndoiturii cotului, adică pe fața dinainte a brațului ținând mâna cu palma în sus. Pentru această operațiune avem trebuință de două feși, o soluțiune antiseptică, pentru spălat locul, un vas de primit sângele, un mic instrument tăietor, *lanțeta*, un stilet, o pensă de disecțiune și o pereche de foarfeci. Bolnavul va sta culcat în pat ca să nu-i vină leșin; se înțeapă una din vinele umflate cu vârful lanțetei, sângele începe a țâșni cu putere și neîntrerupt, în formă de arc, având o culoare neagră și se primește într'un vas ca să se vadă bine cantitatea cât curge. După ce a curs sângele hotărît se astupă tăietura cu vârful degetului, se desface legătura de sus și sângele se oprește. Lăsarea de sânge dela *picioar* se face în același mod din *vena safenă internă*, care trece pe dinaintea gleznei dinăuntru, pe deasupra, sau chiar înapoia gleznei. — Lăsarea de sânge se face mai ușor înfigând un ac de seringă, găurit, într'o vână și trăgând cu seringă atâta sânge cât vrem, sau lăsându-l să curgă prin ac; se face foarte rar și numai în anumite cazuri foarte grave: congestiune cerebrală (îngrămădire de sânge la cap), pleotoră (sânge prea mult), pneumonie (aprindere de plămâni) la oamenii sângeroși, congestiune pulmonară (îngrămădire de sânge la plămâni), meningită, etc.

Lăsnicior, buruiănă de dalac, vișă evreilor, zărnă (*Solanum Dulcamara*, fam. solanaceelor). — Plantă cu florile violetă și cu fructele boabe, roșii la coacere, cari sunt *veninoase*. Crește prin tufișuri și prin păduri umede, pe lângă pâraie, râuri, pe stânci și ziduri vechi. În medicină se întrebuințează tulpina pentru principiul său activ *solanina*, care lucrează ca diuretic, depurativ, sudorific (diaforetic) și calmant. Se dă sub formă de extract 2—4 gr., sirop 20—100 gr., infuzie (ceaiu) din 20 la 1000. — La *fară* frunze

se pune la buba rea, iar zeama din fructe în contra uimelor învechite.

Latrină (lat. *latrina* dela *latere*, a fi ascuns), *budă*, *privată*, *retiradă*.—Latrinele trebuie să fie astfel construite, încât să împiedece gazele cu miros urât, cum sunt amoniacul și hidrogenul sulfurat, conținute în haznale precum și germenii din materiile fecale, să se răspândească în coridoare și în camere, cu atât mai mult cu cât acești germeni pot să producă diferite boale (febra tifoidă dizenteria, colera și altele). O latrină trebuie să fie astfel construită încât aerul și lumina să pătrundă în ea cu îmbelșugare; lumina fiindcă ea omoară microbii și înlesnește curățenia latrinei, aerul fiindcă el atrage gazele și microbii afară în fața soarelui. Pentru aceasta o latrină trebuie să aibă o fereastră mare, care să dea în curte și să fie neconținut deschisă. Păreții latrinei să fie astfel construiți încât să se poată curăți des și cu înlesnire; să fie tenacuiți cu ipsos și ulei, ca să se poată spăla, sau cu marmură, ori sticlă groasă verzuie, ori porțelan. Scaunul trebuie să fie smălțuit, lustruit sau ceruit. Lighienășul să fie de porțelan sau faianță, cu un capac la fund care să-l astupe bine și să stea în totdeauna închis, sau mai bine lighenașul să comunice cu hasnaua printr'o gaură cu supapă. Cel mai bun sistem este acela în care deschiderea supapei aduce în mod automat în lighenaș un curent de apă, care îl spală, apă care vine dintr'un cazan așezat în apropiere. Aceasta este ceea ce se chiamă pe englezește: *Water-closet* (*water*, apă, *closet*, cabinet). Prin acest mijloc latrina se poate ține în permanență curată și fără miros. Mai este un sistem de *water-closet* de faianță cu sifonul sau *obturatorul idraulic* din el însuși: lighienășul este pus în comunicație printr'o țevă de metal cu un cazan așezat la o înălțime de 2 metri. Manevrarea cazanului se face când vrem să spălăm lighenașul, trăgând de un lanț, care mișcă o pârghie prin ajutorul căreia se destupă gaura din fundul cazanului și apa curge cu putere prin țevă până în lighenaș. Afară de aceasta latrina trebuie dezinfectată din când în când cu un lichid dezinfectant

cum este clorurul de calciu, acidul fenic și mai cu seamă sulfatul de fier (*calaican verde*), care este un dezinfectant puternic, punându-se o jumătate de chilogram la un litru de apă și apoi se va turna în lighenaș și de acolo va merge în hasna. În orașele mari care sunt canalizate și au apă îndestulătoare latrinele se deșartă de-a dreptul în canale și atunci nu mai este trebuință de *hasnale*. Latrina trebuie să facă parte din corpul casei, la care să te duci printr'un coridor închis, să fie încălzită pentru ca să nu răcească omul.—La *fară* lucrul se reduce și la mai puțin. *Săteanul român* n'are latrină.

Laudan sau **Laudanum**.—Nume dat mai multor medicamente cari au de bază *opiu* (vezi acest cuvânt), și în special tincturei alcoolice de opiu. Sunt două feluri de laudan: unul numit *laudanul lui Rousseau*, și altul *laudanul lui Sydenham*, care este o plămădeală (macerațiune) de opiu în vin de Malaga, în care se pune șofran, scorțișoară și cuișoare. Cel dintâiu este cu mult mai bogat în opiu decât cel din urmă. Când zicem numai *laudan*, se înțelege acela al lui *Sydenham*, adică cel mai slab și care se întrebuintează pe *dinafară* foarte des, fără nici o primejdie și la orice etate; cu el se stropesc cataplazmele pentru a le face mai calmante: 5, 10, 20, 30 picături după etate și după mărirea cataplazmei. El se mai pune în diferite oblojeli sau fricțiuni sau linimente, în diferite gargare, colire, injecțiuni, etc. Pe *dinăuntru* laudanul nu se dă la copiii mai mici de un an, iar dela un an în sus se va da 1—5 picături după cazuri și după etate. La oamenii adulți se dau 10—30 picături pe zi, pe gură sau prin clizme. Laudanul este foarte bun în durerile de stomac și de mae (colici), în diaeree, etc. Trebuie însă întotdeauna dat cu băgare de seamă.

Laur.—V. *Ciumăfaie*.

Laur-Ceras.—Astfel se numesc foile arbustului *Prunus Lauro-cerasus* din fam. amigdaleelor, care crește pe lângă Trebizonda, fiind introdus în Europa în secolul XVI. Aceste foi sunt otrăvicioase din cauză că conțin *acid cianidric*. Ele lucrează ca sedativ, calmant,

în contra mâncărimii, în contra cancerului. Dintre preparate, cea mai întrebuințată este *apa de laur-ceras*, care se obține prin distilarea foilor cu apă liberă de var : ea se dă în doză de 5—20 gr. la adulți de 1—5 gr. la copii. Uleiul volatil 1—2 picături, siropul 10—40 gr. Pe dinafară se întrebuințează infuziunea de foi din 20 gr. la 1000.

Laxativ (dela lat. *laxare*, a slăbi, a muia). — Se numește astfel orice substanță care produce scaun pe încetul fără durere, fără ca să irite măte, făcând ca scaunele să fie mai lichide și mai numeroase. Sunt și unele alimente cari. au efect laxativ, adică ușurează scaunele : Medicamente și alimente laxative : cascara, mana, glicerina, untdelemnul, strugurii, pepenii verzi, uleiul de migdale dulci, smochinele, zeama de prune, toate compozițiile sau chisălițele, grăsimile, mierea.

Leac. — V. *Medicament*.

Leagăn, — Patul copilului de țâță se numește *leagăn*. Copilul trebuie să doarmă noaptea în leagăn, iar nu în pat cu mamă-sa, sau cu doica, pentru că ar putea să-l înăbușe sau să-l strivească în timpul somnului, iar ziua copilul poate dormi pe un pat neocupat, sau pe o canapea, sau puțin timp și în brațe. Leagănul poate fi de lemn simplu, sau de nuc, de fier sau de orice altă substanță. Lucrul de căpetenie însă este ca el să fie deschis, expus la aer și la lumină. Să nu fie încunjurat de perdele, cari ar mărgini aerul și ar împiedeca respirația. Afară de aceea perdelele ar fi un depozit de praf și un bun adăpost de microbi foarte stricăcioși sănătății. Pentru a nu obosi ochii copilului, leagănul trebuie să fie așezat astfel ca lumina să nu vină nici din față, nici de o parte, ci de asupra și dinapoia capului, deci leagănul să fie îndreptat cu capul copilului spre fereastră. Așternutul întreg trebuie spălat și uscat îndată ce se murdărește. — Prin legănare adormim copilul mai iute, însă nu trebuie să-l legănăm într'una și în orice timp, după cum fac unele doici ca să nu-i dea țâță, ori alte îngrijiri cari le-ar supăra în odihna lor. Cei săraci întrebuințează în loc de leagăn o covățică, sau o albiuță. Foarte puține țărance culcă copilul în pat, de oarece e păcat, zic

ele, ca un înger curat să doarmă într'un pat necurat. Românele, după ce au scăldat copilul, l'au înfășat și i-au dat țâță, îl culcă în leagăn și încep a-l legăna și a-l adormi prin cântece dulci și duioase.

Lecitină r. *lekithos*, gălbinaș de cu). — M. icament tonic și reconstituant extras din gălbinașul de ou și din creeri de animale. Lecitina conține *acid glicerofosforic*, *acide grase* și *colină*. Se întrebuințează mult în oftică în doză de 20—30 ctgr., în pilule sau în injecțiuni sub piele. Se dă și în diabet, precum și în alte boale însoțite de slăbiciune mare și repede.

Legănat. — V. *Leagăn*.

Legături. — V. *Bandaje*.

Legume (lat. *legumen*, dela *legere*, a aduna, a culege), *verdețuri*, *zarzavat*. — Se numesc legume unele vegetale sau părți din vegetale cari se mănâncă. Sunt puține vegetale cari se mănâncă întregi, cum ar fi de exemplu ciupercile ; cele mai multe ne dau pentru mâncare numai unele părți, astfel : spanacul, măcrișul, pătrușelul, mărărarul, etc. ne dau frunzele ; conopida, florile ; varza, mugurii, mazerea, linte, fasolea, bobul, semințele ; cartofii, tuberculele ; ceapa, bulbul ; morcovii, napii, rădăcinele. — Legumele conțin : materii ternare : *amilul* materii cvaternare : *legumina* ; apoi săruri, celuloză și apă. — După felul compozițiunii, legumele se împart în *erbacee* și *amilacee*, sau feculente. — *Legumele erbacee*, numite și *apoase*, fiindcă conțin multă apă, sunt de trei feluri : *azotate*, *saline*, *acide*. Dintre toate acestea cele mai hrănitoare, dar nu în măsură așa de mare ca legumele feculente, sunt cele *azotate*, adică *ciupercile*, *conopida*, *spanacul*, *varza*, fiindcă ele conțin o cantitate oarecare de azot, deși foarte puțin (abia 10 kgr. de ciuperci conțin atâta azot cât un kgr. de carne). Legumele saline și acide nu sunt mai de loc hrănitoare, fiindcă ele se compun în cea mai mare parte din apă și din țesătura celulară (celuloză), care nu se mistue. Apa variază între 80 până la 96% (mazărea verde, fasolea verde, spanacul și castraveții cari au cea mai multă apă). Pe lângă apă și celuloză legumele *saline* conțin săruri, (fosfat de potasă, de sodă, de calciu de magneziu,

oxid de fier și magneziu, clorur de sodiu și de potasiu), iar cele *acide* conțin acizi în cantități mari (acid citric, malic și oxalic). Legumele erbacee se mănâncă în totdeauna proaspete, adică verzi, unele crude sub formă de salată (lăptuci, cicoare, etc.), altele așa cum se găsesc (ridichi etc.), sau se mănâncă fierte în apă (sparanghel, spanac, țelină, etc.), sau prăjite (țâța caprei, barba caprei), sau sub formă de supă de legume sau ciorbă; cele mai bune sunt legumele fierte și servite sub formă de *pireu* (spanac, cicoare etc.), sau însoțite de un sos alb (anghinare, spanac etc.), supele sau ciorbele de legume sunt sănătoase și răcoritoare, mai ales dacă legumele sunt zdrobite și bine fierte. Legumele erbacee sunt foarte puțin hrănitoare, cu tot adausul de unt, sau de untdelemn, ori alte grăsimi, așa de puțin hrănitoare încât ele nu sunt în stare să întreprină forțele, — *Legumele amilacee*, sau *feculente*, sunt mai bogate în substanțe azotate și prin urmare cu mult mai hrănitoare decât cele erbacee. Cele mai principale sunt: bobul, fasolea lintea, mazărea, cartoful, etc. Semințele leguminoaselor sunt foarte bogate în fier, având de două ori mai mult fier decât carnea, mai cu seamă lintea. Substanțele azotate intră în proporție de 25% (fasolea, lintea), de 24% (bobul) de 23% (mazărea) și de 2% (cartoful), așa că cel mai sărac decât toate este cartoful, deși se mănâncă în măsură mai mare. Legumele feculente, gătite cu grăsimi sunt aproape tot așa de hrănitoare ca și carnea, cu mult mai hrănitoare fiind gătite cu carne. Poporul nostru mănâncă feculente în cantitate mare, dar nenorocirea însă că le mănâncă numai fierte, fără grăsimi și fără carne. Aceste legume mai au cusurul că se mistue cam greu și prin urmare trebuie să aibă stomacul sănătos. Ele nu sunt tocmai bune pentru stomacurile slabe și pentru convalescenți.

Legumină, cazeină vegetală. — Substanță alimentară azotată conținută în semințele leguminoaselor (fasole, linte, mazăre, etc.). Compozițiunea ei seamănă mult cu a cazeinii. Se poate panifica, sau prepara cu pesmeți, buni în tratamentul diabetului și al dispepsiei.

Lemn amar. — V. *Cuasia*.

Lemn cânesc. — V. *Tulichină*.

Lemn dulce, reglisă (*Glycyrrhiza glabra*, fam. leguminoaselor). — Plantă erbacee care crește prin șesuri și se cultivă pentru trebuințe medicinale. Rădăcina ei este închisă pe dinafară și galbenă pe dinăuntru. Are un gust dulce, plăcut, puțin acru și se întrebuințează în medicină sub numele de *radix liquiritiae*. Principiul activ al ei este *glicirizina*. Rădăcina de lemn dulce lucrează ca îndulcitor, potolitor, bechic. Se întrebuințează pentru a îndulci ceaiurile, iar praful la prepararea pilulelor. Se dă *pe dinăuntru* sub formă de ceaiu (infuziune) din 15—60 la 1000, praf 5—20 gr., pastă neagră, suc îngroșat după voie.

Lemn galbin. — V. *Drăcilă*.

Lemnușcă. — V. *Răchișan*.

Lentină. — Praf cristalin alb, care se înroșește sub acțiunea aerului. Se recomandă în contra *diareei*, provenită din turburări digestive acute, produse de alimente rele sau stricate. *Doză*: la copiii mici 1 ctgr., odată sau de mai multe ori pe zi, sub formă de praf; la adulți câte 10 ctgr. de 3 ori pe zi, în buline.

Lepră (*lêpra*, dela *lêpros*, solzos, cojos). — Este o boală cronică produsă prin intrarea și înmulțirea în corp a unui microb specific, numit *bacillus leprae*, sau *bacilul lui Hansen*, care se aseamănă cu al officei. În vechime lepra bântuia cu furie mare Europa centrală, Asia și Africa (în veacurile V—XVI). Astăzi se mai găsec leproși și în Europa, dar focarele mari de contagiune ale leprei se găsesc în Indo-China, China, Japonia, Antile, Brazilia, Noua-Caledonie. În *Norvegia* lepra a diminuat dela 1856, când existau 2885 cazuri, la 90 cazuri rămase încă în 1928. În *Islanda* se găsesc 50 de cazuri, în *Filanda* 40, în *Suedia* 20—30 leproși. În *Germania* se găsesc leproși în Prusia de est. Totalitatea cazurilor de lepră în lumea întreagă se calculează la 2 milioane, dintre care 300.000 în *India*. În *Japonia* ar fi cam 16.000 (dela 17.000 câte erau în 1907). În *România* avem un spital de izolare pentru leproși, la Tichilești, Jud. Tulcea. Să vedem acum cari sunt *semnele* acestei boale. Lepra are *trei* forme: *tu-*

berculoasă, anestezică și mixtă. Semnele dela începutul boalei și cari sunt comune tuturor formelor sunt: *febra*, care vine sub formă de accese, a căror intensitate variază. Uneori e ușoară și trecătoare, alteori căldura ajunge până la 40—41°. Alt semn este un fel de toropeală, de abatere fizică și morală. Apoi anemie, tendință spre somn, turburări digestive, dureri pe șira spinării, dureri reumatismale, guturailu (coriză) însoțit de curgeri de sânge din nas (epistaxă). În mucozitățile nasului se găsește microbul boalei, așa că prin examinarea la microscop a acestor mucozități putem cunoaște boala chiar dela începutul ei. Se mai observă diferite turburări senzitive (simțire de deget mort, anestezie sau amorțire), sudori mari, etc. După un timp mai mult sau mai puțin îndelungat lepra începe a se arăta sub una din cele trei forme ale ei, pe cari le vom descrie pe rând, după cum urmează.

Forma tuberculoasă, numită și *tegu-mentară* sau *lionină*. În această formă se ivesc pete mai mult sau mai puțin rotunde, livide, vinoase sau cenușii, înlocuite după câțva timp (mai multe luni sau mai mulți ani) prin niște *ridicături* emisferice sau turtite, de mărimea unei alice până la acea a unei alune, *ridicături* numite *tubercule* și cari sunt tari, roșietice, cenușii sau negrii, cari se pot rezorbi lăsând în urma lor depresiuni sau ulcerăriuni. Ulcerăriunile sau rănila sunt uneori foarte adânci și dau naștere la mutilăriuni și diformăriuni. Tuberculele se ivesc de preferință la față, apoi copleşesc membrele, iar mânila și picioarele se îngroașe ca în elefantiază (vezi acest cuvânt). Tuberculele se pot ivi și pe diferite mucoase, la ochi, pe limba, în gâtlee, etc. Tuberculele se mai numesc și *leprome*. De obicei leziunile acestei forme merg crescând, agravându-se. Ulcerăriunile se adâncesc din ce în ce mai mult, bolnavul începe a slăbi din cauza supurațiunii și a durerilor, cari nu-i mai dau timp de odihnă și-l împiedecă să doarmă și astfel ajunge într-o stare de cachexie completă, până ce se stânge. *Forma anestezică* sau *nervooasă* este caracterizată prin pete ce se aseamănă cu petele formeî precedente, dar cari se

întind în mod progresiv decolorându-se la mijloc. Ele se însoțesc la început de iperestezia apoi de anestezia părților atinse. Pielea și mușchii se atrofiază, mânila se diformează și capătă forma de ghiară, unghiile și dinții cad și ulcerăriunile provoacă mutilăriuni diferite și întinse. Paralizați prin atrofia musculară, mutilați, sleiți prin supurațiuni, orbi, exhalând un miros de mort, nepăsători față de tot ce-i înconjură, bolnavii mor în cele din urmă în marasm, complicat câte odată de crize tetaniforme. *Forma mixtă*, sau *completă* este o combinațiune a celor două forme de mai sus. Boala poate să înceapă cu forma tuberculoasă și să sfârșească cu cea anestezică, sau poate începe cu aceasta și să sfârșească cu cea dintâiu, sau lepra este de la început mixtă, adecă leziunile tuberculoase să evolueze paralel cu leziunile nervoase. — *Durata* boalei variază în forma tuberculoasă dela 8 până la 10 ani, în cea anestezică dela 15 la 18 ani. S'au observat cazuri cari au durat 20 până la 27 ani și la noi în țară un bolnav a suferit 69 ani. — *Tratament*. Pe dinăuntru se recomandă *uleiul de Chaulmoogra* (Gynocardia odorată), dat în ceaiu cald, în ceaiu de mentă sau în capsule. Dacă bolnavul nu-l poate lua pe gură se va da în injecțiuni sub piele. Se mai poate da *ginocardatul de sodă*, s'a mai dat ichtiolul și acidul pirogalic, antipirină, aconitină. Pentru tubercule se dă iodurul de potasiu. Incercările făcute cu *seroterapia* până acum n'au reușit, așa că lepra își așteaptă încă leacul. Tot ce putem face mai bun este *profilaxia*. Lepra fiind o boală contagioasă, bolnavul de lepră este o primejdie pentru cei din jurul lui. Pentru a micșora acest pericol trebuie o curățenie mare, rănila să se panseze și să se țină bine închise, să se dezinfecteze hainele, să se fiarbă, sau să se nimicească rufăria. Dar cel mai bun lucru este ca bolnavul să se izoleze într'un spital (leprozerie), așa ca el să nu mai fie în atingere cu nimeni.

Leprică. — V. *Pelagră*.

Leșin. — V. *Sincopă*.

Letargie (gr. *lêthe*, uitare și *argia*, lenevie, amorțire). — Somn adânc în care un bolnav rămâne cufundat mai

multe ceasuri, sau mai multe zile, fără să dea vr'un semn de viață. Cu toate acestea inima-i bate, ceace deosebește letargia de sincopă (leșin), respirațiunea se face foarte încet, fără să înceteze ca în asfixie. Ochiul sunt închiși, simțirea nimicită, nemișcare desăvârșită, dacă însă îi strigăm tare la urechie, atrăgându-i atențiunea asupra vreunui lucru, bolnavul își deschide puțin ochii, mormăie câteva cuvinte, de multe ori fără înțeles și nu la întrebare, apoi adoarme din nou. Această stare se vede rar și numai la isterici, ceace explică de ce se vede mai des la femei. Letargia este o turburare nervoasă compatibilă cu viața și chiar cu sănătatea, cu condiție însă ca în timpul ei, bolnavul să fie îngrijit și hrănit. Rar se întâmplă ca letargia să se confunde cu moartea (vezi *Moarte*).

Leucemie (gr. *leukos*, alb și *haima*, sânge). — Sinonim cu *leucitemie*.

Leucocite (gr. *leukos*, alb și *kytos*, cavitate, celulă, globul). — Se numesc astfel globulele albe ale sângelui, cari joacă rolul cel mai mare în nutrițiunea țesuturilor și în lupta cu microbii.

Leucocitemie (gre. *leukos*, alb, *kytos*, celulă, globul și *haima*, sânge). — Boală generală caracterizată prin înmulțirea progresivă și permanentă a globulelor albe ale sângelui și mărirea de volum fie a splinei, fie a ganglionilor limfatici, sau altor organe bogate în țesut adenoid. Leucocitemia este una din formele diatezei limfogene.

Leucocitoză (gr. *leukos*, alb și *kytos*, celulă, globul). — Înmulțirea anormală, însă trecătoare, a globulelor albe ale sângelui. Se observă după masă, în timpul sarcinii, după o curățenie, în urma emoragiilor, în unele febre, etc. Dar această înmulțire a numărului globulelor albe este în totdeauna mai mică și nu de același caracter ca în leucocitemie.

Leucom. — V. *Ochiu*.

Leucoree (gr. *leukos*, alb și *rhein*, a curge), *curgere albă*; *poala albă*. — Sunt multe femei cari au o curgere alburie, mai mult sau mai puțin groasă, căreia i se zice *leucoree*, sau *poală albă*. Se vede la fetele tinere slabe, clorotice, limfatice, supuse unui traiu rău,

sărăcăcios, unui regim debilitant. Leucoreea este mai mult sau mai puțin abundantă și provine dintr'o iritațiune locală, care la femeile sănătoase și viguroase, nu determină de obicei nici o scurgere. Poala albă se observă înainte și după regule (menstruație), în urma unei oboseli, în urma excitațiilor genezice, în timpul sarcinii, după o lăpădătură sau după naștere, etc. La femeile tinere cari n'au regule se vede în fiecare lună, pe timpul regulelor, o curgere albă. La unele femei s'a observat că abuzul de cafea, ceaiu și chiar de lapte produce leucoreea. Leucoreea se mai observă în boalele vulvei, ale vaginului și ale mitei (metrită, deviațiuni, corp fibros, cancer), sau ale anexelor uterine, adică ale trompelor. Dacă poala albă nu este în cantitate mare și se arată numai în timpul regulelor, sau în timpul sarcinei, nu trebuie să ne ocupăm de ea. Dacă ea se prelungește mai multe zile după regule sau se ivește la o femeie care nu mai are regule, atunci trebuie să se vadă de unde vine curgerea, din vulvă, din vagin sau din mitră. Mai greu este pentru fetele tinere, cari nu spun nimic, sau se jenează să spună despre această curgere chiar și mamei lor, iar mamele din nepricepere sau neglijență nu se ocupă de astfel de lucruri. — *Tratament*. Leucoreea acută (proaspătă) trebuie tratată cu cea mai mare îngrijire pentru ca să nu treacă în stare cronică (învechită). Tratamentul general constă în preparate fieruginoase, tonice, arsenicale, băi alcaline, fricțiuni pe piele, hidroterapie, ședere la aer, la soare. Tratamentul local constă în spălături, în băi de șezut, clizme emoliente *injecțiuni* astringente și antiseptice cu decoct de foi de nuc (60 gr. la 1000 gr. apă), în care se mai poate pune și puțin tanin (2 gr.), cu piatră acră, cu sulfat de zinc, cu ipermanganat de potasă, cu acid boric simplu sau amestecat cu piatră acră ori cu tanin, acid fenic, sublimat coroziv (25—50 ctgr. la 1 litru), cu lisol (1 lingură la 2 litri). Pe dinafară să se pună o pudră de talc. Dacă cu toate aceste leucoreea nu trece atunci de sigur este vorba [despre vreo boală care trebuie tratată de medic. — La țară babei tratează poala albă

cu corobatecă, gherghină, lăcrămioare, mure, sulcină.

Leventică, *levand*, (*Lavandula officinalis* sau *vera*, fam. labiatelor). — Plantă mică cu flori albastre plăcut mirositoare originar din sudul Europei, se cultivă și pe la noi (Iunie—August). Spicele florifere (flores *lavandulae*) se întrebuințează în medicină ca antispasmodice, stimulente și tonice, dar mai mult se întrebuințează în parfumerie. Pe *dinăuntru* se dă tinctura compusă, 10—30 gr. Pe *dinafară* se dă esența de lavandă sau uleiul de aspic, în fricțiuni în contra paraliziiilor și împreună cu esența de lămâioară și de rosmarin intră în prepararea băilor aromatice.

Leziune (lat. *laesio*, dela *laedere*, a răni). — Orice schimbare materială care se poate vedea, ivită în timpul vieții în una din părțile corpului, schimbare bolnăvicioasă a organelor, fie în structura lor, fie în raportul lor cu organele vecine. Se zice leziuni organice, chimice, mecanice, traumatice, etc., nici odată însă nu se zice leziuni de circulațiune, etc., de oarece aceste expresiuni sunt vicioase, întru cât ele confundă materia și proprietățile ei, organismul și actele lui.

Libanol. — Esență. scoasă din arborile *Cedrus atlantica*. Se recomandă în boalele căilor urinare ca și santalul și celelalte balsamice (blenoragie, cistită) și în boalele de plămâni (tusă veche, oftică) sub formă de capsule gelatinoase în doză de 3 grame pe zi.

Licetol. — Combinațiunea piperazinei cu acidul tartric. Disolvant energic al acidului uric, gust plăcut. Se recomandă în diateza urică. Doză: 2—4 gr. pe zi în 2 rânduri, dimineața și sara. Se poate asocia cu teobromină.

Lichen. — O boală de piele caracterizată printr'o erupțiune de ridicături (papule) mici, tari, late, roșietice, grupate sau împrăștiate, cari produc o mâncărime destul de mare. Se ivesc mai cu seamă la antebrate, la pumni (pe fața dinainte), la gât, la fața anterioară și externă a ghionatelor (gambelor), la coapse, mai rar la față și celelalte părți ale corpului. *Tratament*. Pe *dinăuntru* se recomandă preparatele cu arsenic (licoarea Fowler, etc.), iar pe *dinafară* spălături cu oțet, sau

cu sublimat coroziv, băi prelungite cu scrobeală, plastore mercurial de Vigo.

Lienterie (gr. *leios*, alunecos și *enteron*, intestin, maț). — Un fel de diaree în care materiile date afară prin șezut cuprind mâncare nemistuită pe deplin așa încât s'ar părea că mâncarea numai alunecă prin mațe fără să poată fi mistuită.

Ligament (lat. *ligare*, a lega). — Se numește astfel o fâșie de țesut fibros, alb, foarte tare și care nu se prea poate întinde. Ligamentele slujesc ca mijloace de unire pentru încheieturi (*ligamente articulare*) și pentru unele părți de oase, sau de cartilaje, ori sgârțieri sau ca mijloace de susținere pentru unele organe sau viscere (ligamentele beșicii, ale ficatului, mitrei, etc.).

Ligatură, *legătură* (lat. *ligare*, a lega). Când legăm un neg, sau o tumoră, ori o parte a corpului, sau un organ, cu ață de mătăsă sau de in, ori cu catgut, sau cu un fir de argint, zicem că facem o *ligatură*. Cel mai bun mijloc pentru a opri o curgere de sânge (emoragie) este de a lega artera, sau vâna din care curge sângele. Se înțelege că această operațiune așa de delicată și care cere cunoștințe sigure și îndemânare nu poate fi făcută decât numai de un doctor. Dar ceace poate să facă ori și cine și de multe ori trebuie să facă, este *legătura* unui membru, mână, picior, deget) pentru a opri sângele să curgă, până ce vine doctorul, sau pentru a opri ca veninul sau otrava să nu se ducă în tot corpul când omul a fost mușcat de vreun șarpe veninos, sau câne turbat. Pentru aceasta se ia o batistă, un șervet, o cârpă, să se aplice deasupra răni, dar nu peste măsură de tare. În același timp, dacă poate să-și ardă rana, dacă are curaj, cu un fier roșu. Legătura în masă se poate face ușor când este vorba de membre, mână sau picior, dar din nenorocire ea nu se poate aplica și la trunchiul.

Lighian (*basin*, șold. — V. *Basin*).

Ligozină. — Ligozinat de chinină. Praf amorf, galben portocaliu, puțin solubil în apă. Bun antiseptic. Se întrebuințează sub formă de praf, alifie, în tratamentul fânirilor).

Limbă (lat. *lingua*). — Limba este organul de căpetenie al gusului, dar

ea mai servește și pentru a suge și a bea, jucând rolul unui piston mobil care face vidul în gură. Ea ajută la mâncarea și înghițirea alimentelor, ținându-le între dinți și măsele pentru ca să fie sdrobite, apoi aplicându-le cu putere asupra ceriului gurii, unde sunt apăstate, frământate și aruncându-le în cele din urmă spre înghițitoare, mulțumită mușchilor ei puternici, cari, strângându-se, îi ridică vârful în sus și-i îndoiesc marginile astfel ca să formeze un canal care duce bolul alimentar înapoi. Limba este formată din mai mulți mușchi care fac ca limba să se miște în toate felurile, să se lungască, să se scurteze, să se îndoească, purtând vârful prin toate părțile gurii. Este îngustă și subțire înainte la vârf groasă și lată înapoi, la rădăcină având




Fig. 228. — Gura

forma unui oval. Fața de sus numită și *dosul* limbei, este liberă, iar fața de jos a ei este prinsă de podeaua gurii printr'un *frâu* sau *ață*. Când acest frâu este prea lung, adică se întinde până la vârf, el împiedică mișcările limbii și prin urmare împiedică suptul, înghițirea și vorbirea (peltic).—Starea limbii se deosebește la omul sănătos de cea a omului bolnav. În stare de sănătate limba are o culoare roșiatică, o suprafață aproape netedă, cu o mulțime de ridicături foarte mici, dintre cari unele sunt *papile*, organe ale gustului, iar altele mici glande. Ea este întotdeauna umedă fiind udată de *salivă*. În stare de boală limba își schimbă înfățișarea : în boalele de stomac ea pare acoperită cu un strat

mai mult sau mai puțin gros, a cărui culoare variază dela alb-cenușiu până la galben-închis. Starea aceasta a limbii se chiamă *saburală* și arată că stomacul este sdruncinat în slujba lui. În starea *bilioasă*, stratul de pe limbă este curat galben, ceea ce arată că și ficatul este atins. Vom da în aceste cazuri purgative. În febra tifoidă, în vărsatul negru, în pneumoniile bătrânilor, limba este acoperită de un strat negru ca funinginea, de *fuliginozități* (dela lat. *fuligo*, funingină). Aceste fuliginozități nu acopăr numai limba, ci și gingiile și buzele. În aceste cazuri limba mai este *roșie înflăcărată*, este semn de începutul unei febre grave, sau a unei inflamațiuni, cum se întâmplă în scarlatină, când limba este roșie ca smeura, sau ca în variolă, când este roșie peste tot, sau ca în febra tifoidă, când este roșie la vârf și pe margini, iar la mijloc este gălbuie sau cenușie. Din acestea se vede foarte bine câtă însemnătate are starea limbii, atât în stare de sănătate cât și în stare de boală. Este de ajuns să vedem limba cuiva pentru ca să ghicim dacă este sănătos sau bolnav. —Ca toate organele limba își are *boalele ei*. Adescori pe vârful ei vedem niște beșicuțe sau un fel de arșiță, sau niște pete albi ca smântâna (v. *Afte. Mărgăritărel*) ; alteori limba este umflată peste tot, inflamată și atunci avem ceea ce se numește *glosită* care se poate ivi în urma unei răniri, a unei arsuri adânci prin înghițirea unui lichid arzător (vitriol, amoniac, esență de oțet, etc.) și în aceste cazuri se recomandă gargare emoliente. Limba poate fi *tăiată* printr'un instrument tăietor, sau poate fi apucată între dinți și tăiată printr'o lovitură sau cădere asupra bărbiei, sau într'un acces de epilepsie (boala copiilor), sau mâncând. La limbă se pot ivi diferite *tumori*, în deosebi cancerul care trebuie operat cât se poate mai din vreme dacă vroom să scăpăm bolnavul dela moarte.

Limba mielului, arățel, boranță, otrățel (*Borrage of ficinalis*, fam. boraginaceelor). — Plantă erbacee, originară din regiunea mediterană, care se cultivă și la noi. Frunzele și florile ei au o lucrare recoroitoare sudorifică (fac nădușală) și diuretică (fac ud mult) ;

frunzele se pot mânca. Ceaiul din flori și frunze (30—60 gr. la un litru de apă), stimulează funcțiunile pielii și provoacă nădușeală, pentru care se recomandă în febrele eruptive, mai ales în pojar ca să iese mai repede. Trebuie luat cald și în cantitate mare. În farmacie se mai dă sub formă de: extract 1 până la 4 gr., idrolat 30—150 gr., sirop 10—50 gr., suc 50—100 gr.



Fig. 229. — Limba mielului

Limbar. — Când frâul limbii este prea desvoltat și se întinde până la vârful ei, ținându-l prins, sau fixat de podeaua gurii, din care pricină limba nu se poate mișca liber și copilul nu poate prinde bine sfârcul țâței ca să sugă, nici nu poate înghiți bine, nici nu poate vorbi cu înlesnire când va fi mare, atunci în popor, se zice că acel copil are *limbar*, sau *ață la limbă*. Această atât trebuie tăiată cât se poate mai din vreme. Tăierea se va face cu foarfeci bune, curate și cari să nu aibă vârfurile ascuțite; sângele se oprește repede dela sine, afară de cazul când din greșeală, sau neștiință, s'a tăiat prea adânc. Cel ce face această mică operație să aibă mare grijă să nu taie decât numai partea subțire a frâului dela vârful limbii.

Limbrici. — V. *Viermi intestinali*.

Limfadenie (lat. *lympa*, limfă și grec. *aden*, glandă). — V. *Limfogenă*.

Limfangită (lat. *lympa*, limfă și grec. *ageion*, vas și terminația *itis*, inflamațiune). — Este aprinderea sau inflamațiunea vaselor și ganglionilor limfatici. Ea este produsă de o sgârietură superficială neîngrijită, care se infectează, mai cu seamă la degetele mânilor și picioarelor. Limfangita se arată prin dungi roșietice cari pleacă dela sgârietură; împreunându-se, formează plăci (pete mari) ale căror margini sunt puțin ridicate asupra pielii. Aceste dungi sfârșesc pe de altă parte în ganglionii limfatici, cari se inflamează și ei și devin dureroși (*adenită*). În dreptul

limfangitei bolnavul simte o arsură și uneori are căldură: membrul este cam umflat. Uneori limfangita se vindecă de grabă alteori însă ea face puroiu. **Tratament.** Pentru a preveni limfangita trebuie îngrijită cu cea mai mare băgare de seamă orice rană, orice sgârietură ori cât de mică ar fi, făcând un pansament antiseptic. După ce s'a ivit boala se va ține membrul ridicat pentru a înlesni circulația, se vor aplica pe părțile inflaminate cârpe înmuiate într-o soluțiune *fenicată* (2%), sau cu sublimat coroziv (1 la 1000), acoperită de gutapercă, iar când a făcut puroiu se va deschide, se va drenea și se vor face băi antiseptice. **Limfatice** (Vase). — Canale prin cari curge limfa (v. *Cord*).

Limfatism (dela *lympa*, limfă). — V. *Temperament limfatic*.

Limfogenă (Diateză), dela lat. *lympa*, limfă și grec. *genesis*, producțiune. — Prin diateză limfogenă se înțelege o totalitate de alterațiuni (stricățiuni) ale organelor limfatice, produse printr-o dezvoltare exagerată a țesutului ganglionilor limfatici, a splinii, a măduvii oaselor și prin ivirea anormală a unui țesut analog în ficat, rinichi, seroase (limfadenie). Aceste alterațiuni pot să se producă în mod izolat, dar cele mai adeseori coincid cu o înmulțire considerabilă a globulelor albe ale sângelui (*leucemie*), care poate de altfel să existe și singură. La un bolnav cu leucemie proporțiunea globulelor albe, care de obicei este de 1 la 500 sau la 1000 de globule roșii, poate să se ridice la 1 pentru 20, pentru 10 și chiar pentru 3. Diateza limfogenă are un început încet, pe neașteptate în seamă, prin slăbiciune și paloare cari merg crescând, prin înecăciune în piept (gâfăire) și prin slăbire; ganglionii limfatici se măresc pe rând și formează ghinduri mari ca alunele, sau nucile, de fiecare parte a gâtului, (când sunt prinși ganglionii gâtului), producând apăsarea tracheei și prin urmare o respirațiune și înghițire anevoioasă și umflătura feței și a brațelor cu jenă în mișcările brațelor și gambelor (ganglionii subțioarii și a stîngii). Acești ganglionii umflați n'au aplicare spre supurațiune. După o durată mai mult sau mai puțin lungă,

(1—2 ani) se produc emoragii multiple (vărsături de sânge, urinare cu sânge, emoragie în creieri), apoi o diaree aproape continuă : umflătura se întinde peste tot, cachexie și moarte. — *Intre cauzele* predispunătoare avem : sărăcia, supărările, boale grele (sifilis, febra tifoidă, friguri palustre, alcoolism), sarcini repetate ; mai des la sexul masculin și în etatea mijlocie *Tratament* : s'au dat preparatele fieruginoase, arsenicale și iodul fără mare succes.

Limonade.—Băuturi răcoritoare cari se prepară cu suc de lămâie, apă și zahăr, sau cu diferite acide. Limonada de lămâie se prepară în 2 moduri, cu apă rece, sau cu apă fierbinte : în primul caz este de ajuns să stoarcem o lămâie tăiată în două într'o jumătate de litru de apă și să punem zahăr cât voim să fie de dulce ; în cazul al doilea se curăță o lămâie de coaje, se scot semințele, se taie felii și se toarnă peste ele o jumătate de litru de apă fierbinte. Este bine să se frece coaja de lămâie cu zahărul care se pune în limonadă, pentru a-i da acesteia un gust mai plăcut. Această limonadă este mai puțin acră decât cea făcută cu apă rece și este mai sănătoasă. — *Limonada gazoasă se prepară* din 2 pachete cu prafuri : unul cu 2 gr. acid citric și 50 gr. de zahăr, care se toarnă într'un litru de apă, apoi se toarnă pachetul al doilea cu 2 gr. de bicarbonat de sodă. Această limonadă se mai prepară din apă de Seltz, în care se pune sirop de lămâie, sau sirop de coacăze, de cireșe, de smeură. — *Limonada vinoasă* este limonada obișnuită cu lămâie, în care se pun 250 gr. vin la un litru, vin roșu, alb vechiu. — În general limonadele sunt băuturi plăcute, răcoritoare, pe cari le pot bea oamenii sănătoși pe căldurile mari, însă cu condițiune ca să nu le bea în cantitate mare, nici prea reci, nici cu ghiață. Pentru bolnavi ele sunt tot așa de bune, mai ales limonada vinoasă, care este tonică în același timp și micșorează căldura. Nu este bună însă pentru cei ce sufar de stomac, de gastralgie, căci le mărește durerea prin aciditatea lor ; de asemenea și cei bolnavi de dispepsie se vor păzi de limonade, mai ales de cele gazoase. — *Limonada purgativă*, care se prepară cu citrat de

magnezie, 30—60 gr. la 120 gr. apă și 50 gr. sirop de zahăr, sau de smeură, ea este foarte bună și se ia cu ușurință.

Lingoare. — V. *Tifoidă* (Febră).

Lingură. — Unele medicamente lichide se dau sub formă de picături și acestea sunt medicamente mai tari, otrăvicioase dacă se dau în doză mare. Cele mai multe însă, adică cele mai slabe, se dau cu *lingura*, din când în când câte una. Aceasta este o măsură pe care o are fiecare în casă. *Lingura de masă* cuprinde cam 15 gr. de lichid. La copiii mici se dau cu *lingurița* de cafea, sau de dulceață, care cuprinde cam 5 gr. ; apoi altele se dau cu *lingura mijlocie*, sau de *compot*, care cuprinde 10 gr. Astfel fiind trebuie să se observe cu băgare de seamă *cu ce fel de lingură* a prescris doctorul să se ia un medicament precum și *timpu* la care să se ia ; ca să nu se facă greșeli de multe ori primejdioase pentru cel bolnav.

Lingurea (*Cochlearia officinalis*, fam. cruciferelor). — Plantă erbacee originară din nordul Europei, cultivată ca plantă medicinală. Se întrebuințează frunzele, vârfurile înflorite, semințele. Lucrează ca antiscorbutic și stimulent. Se dă în scorbut, în scrofuloză, catarele de plămâni, idropizie și în boalele învechite de piele. Se dă sub formă de : ceaiu 20—50 la 1000, sirop 20—60 gr., alcoolat 10—30 gr., extract 2—5 gr. tinctură 10—30 gr., vin 30—100 gr.

Liniment (lat. *linire*, a unge). — Medicament care se întrebuințează pe dinafară, pentru a face ungeri, fricțiuni pe piele. E compus dintr'un ulei, sau dintr'un corp uleios la care se mai adaugă o substanță calmantă, tonică, iritantă, etc., după efectul pe care voim să-l obținem. Un liniment se aplică pe piele sau cu mâna, sau cu o cârpă înmuiată în el. Uneori este de ajuns numai să ungem pielea, alteori trebuie să frecăm pentru ca medicamentul să intre în piele și câte odată să facem trăsături tari cât poate răbda bolnavul. De obicei un liniment se prepară atunci când se întrebuințează. Cele mai întrebuințate sunt următoarele : linimentul *calmant*, bun pentru dureri și nevralgii, care se prepară din : balsam tranchil 25 gr., laudan, cloroform, câte 6 gr. din fiecare, sau : balsam

LINI

fioraventi 40 gr., cloroform 5 gr., laudan 4 gr. — Linimentul *oleo-calcăr*, bun pentru legarea arsurilor se compune din: ulei de migdale dulci 100 gr., apă de var 900 gr., la care se mai poate adăuga, când durerile sunt prea mari și laudan, socotit 2 gr. la 200 gr. de liniment. — Linimentul *amoniacal*, sau *volatil*, foarte bun în contra durerilor reumatice se compune din: amoniac lichid 10 gr., ulei de migdale dulci 90 gr. El stimulează pielea, o înroșește și poate chiar să scoată și beșici ca o vezicătoare, dacă îl ținem mai mult în atingere cu pielea. — Linimentul *camforat*, compus din 1—4 gr. camfor și 32 gr. ulei de migdale e tot așa de bun ca și cel de mai sus. Linimentul *sulfurat* al lui *Vleminsky*, pentru vindecarea răiei, e compus din: floare de pucioasă 100 gr., calce vie (var nestâns) 200 gr., apă 1000 gr.

Liniment albuminos. — V. *Albumină*.

Liniștitoare (Medicamente). — V. *Cal mante*.

Linte (*Lens esculenta*, fam. leguminoaselor). — Plantă erbacee, originară din regiunea mediteranină, se cultivă mult pentru trebuințele culinare. Lintea este tipul legumelor feculente, având 25% substanțe azotate și fiind mai bogată în fier decât carnea. Ea are însă același cusur ca și celelalte feculente, de a se mistui greu. Pentru ca să se mistuie mai ușor trebuie curățită de coji și sdrobită sub formă de făină. Pentru popor lintea constituie o bună hrană, însă nu trebuie mâncată în cantitate mare.

Lip, im, zoioșie. — La suprafața pielii iese un fel de seu și sudoare, cari amestecându-se cu praful din haine și din aer formează un strat murdar, *zoios*, care se numește *lip* sau *im*. Lipul se formează mai cu seamă în părțile descoperite ale corpului, pe pielea capului coate, mâni, genunchi și picioare. Lipul nu este sănătos, căci oprește funcțiunile pielii, mai ales când este întins pe tot corpul; irită părțile încrețite ale pielii și la îndoituri, înlesnește înmulțirea păduchilor; la cap dă naștere la căderea părului și la diferite boale de piele. Dintre meseriași cei mai supuși la această necurătenie sunt tăbăcarii, zidarii, brutarii, fierarii, etc., din pricina prafului în care trăiesc.

LIP

Lipan. — V. *Brustur* și *Lumânare*.

Lipemanie (grec. *lype*, tristeță și *mania*, nebunie) sau *melancolie* (*delir depressiv*). — V. *Alienație mentală*.

Lipitori. — Lipitoarea este un vierme din clasa Anelidelor, familia hirudinelor. Are corpul lungăreț, format dintr-o mulțime de inele. Capetele lipitoarii au câte un disc; unul este mai subțire și acolo se află gura cu trei fălci mici cartilaginoase, rotunzite și cu dinți foarte mărunți, cari taie pielea ca să sugă sângele. *Lipitoarea oficială* (*Hirudo officinalis*), are pântecele gălbui, fără nici o pată, pe margini cu o dungă neagră, pe spate cu șase dungi ruginii pestrițate cu puncte negre ro-




Fig. 230. — Lipitoare

a = ventuza bucală; b = stomacul; c = intestine; d = ventuza anală.

1 = o fălcă mărită; 2 = cele 3 fălci ale ventuzei bucale; 3 = întâia fază a mușcăturei; 4-5-6 = a 2-a, 3-a, 4-a fază a mușcăturei.

tunde. *Lipitoarea cenusie* sau *medicinală* (*Hirudo medicinalis*), este cea mai mică, cu pântecele verde închis, pe spate cu șase dungi ruginii pestrițate, cu pete negre în trei colțuri. *Lipitoarea neagră* sau *de cal*, are dinți puternici cari rup carnea așa că rana produsă de ea se vindecă mai greu; pântecele ei este negru fără pete, iar spatele este măsliniu fără dungi. Lipitorile sunt mai ușor de întrebuințat decât lăsarea de sânge prin tăierea unei vine și se aplică pe părțile inflamate și dureroase: Se iau atâtea câte voim să aplicăm și le punem într'un păhar curat, iar partea locului se spală bine cu săpun

și apă caldă (în părțile păroase se rade părul); se șterge cu o cârpă curată, apoi aplicăm paharul cu gura în jos și lipitorile încep a se prinde. Lipitorile se pot aplica și una câte una cu un păhăruț mic. Lipitorile sug până ce se umflă, când cad singure; dacă însă vre una nu vrea să se desprindă o presărăm cu cenușe, sau cu sare și atunci cade numai decăt. Nu este bine să desprindem lipitorile trăgând de ele căci li se rup dinții și rămân în piele. După căderea lipitorilor sângele se oprește sau se lasă să mai curgă după porunca doctorului. Oprirea sângelui se face și dela sine, prin închiegarea lui. Când însă nu se oprește singur vom apăsa câtva timp cu un tampon de vată muiată în spirt pe mușcătură și apoi se leagă strâns cu o fașe. Dacă nici așa nu se oprește sângele, se vor arde mușcăturile cu piatra iadului, sau cu vârful unui cuțit înroșit în foc, sau vom prinde mărginile mușcăturii cu o pensă, le vom pătrunde cu un ac trecut prin flăcări și apoi vom lega pe sub ac cu un fir de ață. Mușcătura lipitoarii este în trei colțuri, regulată se învinețește împrejur, iar după trei zile se vindecă.

Lipitură, smeul. — Această boală este cunoscută numai la țară, unde poporul crede că este produsă de *smeu*, sau de *sburător*. Lipitura provine din *dragoste*, sau din *frică*. În acest din urmă caz, bolnavul are tot felul de arătări, de vedenii, tipă în somn și se sbate. Când lipitura este provenită din dragoste bolnavul visează noaptea,



Fig. 231. — Lipom

se simte foarte obosit, galben și tras la față. Această boală după credința poporului este foarte primejdioasă, mai ales pentru femei, cari, dacă au copii mici se întâmplă să-i omoare în timpul somnului.

Lipom (grec. *lipos*, grăsime). — Tumora, sau umflătură, formată din grăsime, care poate ajunge uneori până la mărimea unui corp de om, sau și mai mare. Lipomul se poate arăta pe diferite părți ale corpului; el nu produce




Fig. 232. — Lipom extras

durere decât când este foarte mare și apasă organele vecine. Lipomul se numără între tumorile de bună natură, căci el nu atacă sângele și dacă s'a operat bine nu se mai face din nou. El nu se poate vindeca, decât prin operație.

Lipotimie (grec. *lepein* a lipsi, și *thymos*, inimă, suflet), *sfârșeală*, a se pierde. — Este o stare de slăbiciune care vine dintr'o dată, printr'o scădere repede a bătăilor inimii, stare care poate să se termine prin leșin (sincopă). Vine deodată cu amețală de vâjiituri de urechi, de întunecime de ochi, de o simțire de goliciune în cap apoi devii palid pielea ți se acopere de sudori reci, simți un frig peste tot corpul, te apasă ceva pe stomac, apoi greață și vărsături și în cele din urmă ți se întunecă mintea, te-ai sfârșit cu totul, cunoștința însă n'ai pierdut-o cu totul. *Cauzele* sunt multe: o emoțiune mare, spaimă, mânie, bucurie, unele mirosuri tari, sau post prelungit (din sărăcie sau din habotnicie), o pierdere mare de sânge. *Tratament*: cel dintâiu lucru este să culcăm bolnavul în pat drept, cu capul tot așa de jos ca și corpul, să-l desbrăcăm să-i desfacem orice legătură, orice încingătoare să-i dăm aer curat, să miroase oțet, apă de Colonia eter.

Lipova. — Între locurile binecuvântate pentru vindecarea boalelor și întremarea sănătății zdruncinate, în mândra și bogata noastră țară sunt și băile dela Lipova din Banat. Așezate într'o încântătoare poziție între dealuri, unul acoperit de vii livezi și pășuni, iar celalt de admirabile culturi de grâu și porumb, cu o vale ce se orientează sud-est-nord-vest lipsită completamente de curenți și veșnic însorită, este una dintre cele mai liniștite dintre stații-

nile balneare de la noi. Parcul cu o pădure seculară de arbori în întindere de câteva zeci de jugăre și aranjamentul, cu admirabile alei de tranșafiri de tot soiul, oferă vizitatorului o dulce răcoare, parfumată cu miros de flori de tei. Apa lecuitoare a izvoarelor minerale se folosește încă dela 1550 deci din sec. al XVI, când povestesc documentele, că tratamentul se administra de călugării franciscani din partea locului, care mai pe urmă au zidit în sec. XVIII și vestita mănăstire dela Radna cu hramul sfintei Marii. Apa carboniferuginoasă a izvoarelor este indicată cu deosebire în bolile de femei și pentru suferinzii de inimă. Valoarea necontestată a acestor ape le face să atragă din an în an mai mulți suferinzi. Viața este efină, dat fiind bogăția regiunii în toate. O bibliotecă cu cărți streine și românești stă la dispoziția publicului. Băile sunt la depărtare de un sfert de oră de gara Radna pe linia Arad—București, zece minute de orașelul Lipova de pe malul bătrânului Mureș și drumul se poate face cu tramvaiul, trăsura și automobilul societății și cele particulare. Se fac excursii la Arad zilnic cu trenul dela Radna, într'o jumătate de oră, sau cu tramvaiul de patru ori pe zi. Deasemenea la Timișoara într'o oră și jumătate cu automobilul printr'o admirabilă și bogată regiune cu frumoase sate svăbești și românești.

Lipsă de sânge. — V. *Anemie* și la *Cloroză*.

Lipsă de somn, insomnie. — V. *Somn*.

Litargă, smalt, oxid de plumb topit. — V. *Plumb*.

Litiază. — V. *Gravela*.

Litină, oxid de litiu. — Medicament care se întrebuințează în *gută* și în *gravela urică* (nisip). Preparațiunile cele mai de căpetenie sunt: *benzoat de litină*, care se dă în doză de 20 ctgr. până la 2 gr. pe zi, în buline sau prafuri; — *bromur de litină* 20 ctgr. până la 1 gr. în sirop; — *borat de litină* 25—50 ctgr.; — *carbonat de litină* 10—50 ctgr. în buline, sau în granule efervescente, sau în prafuri luate în apă de Seltz — *glicero-fosfat de litină* 20 ctgr până la 1 gr. în soluțiune, sau în buline.

Litontritic. — Medicament care se

zice că ar avea însușirea de a topi pietricelele și pietrele din organism, în special cele din căile urinare (rinichi și beșică).

Lizidină. — Disolvant al acidului uric. Se dă în contra gutei. *Doză*: 1—5 gr. în 24 ceasuri, în soluțiune în apă de Seltz.

Lizoform. — Lichid limpede gălbui, cu miros de formol. Antiseptic puternic; soluțiune apoasă de 1—5 la 100 pentru spălarea mânilor, este un dezodorizant energic dat în spălături pentru tratamentul sudorilor fetide.

Lizol. — Product complex, obținut prin saponificarea unui amestec de ulei de gudron de cărbune de pământ (care conține mai ales creziloli), de grăsime și de rezină printr'un alcali. Lichid brun, cu miros de crezilol. Dezinfecțant și antiseptic, în soluțiune de 2—5 la 100.

Locuință. — Locul de construit trebuie să fie un teren uscat și pietros, ferindu-ne de terenurile cari conțin multe materii organice, precum sunt terenurile nivelate prin umplerea gropilor cu gunoarie. Să ne ferim de terenurile argiloase, cari rețin apa; aceste evaporându-se, umplu de umezeală aerul care pătrunde în casă. Să ne ferim de terenurile joase, mlăștinoase și umede, iar la trebuință să stabilim un sistem de canalizare sub casă și împrejurul ei pentru ca să asigurăm uscarea pământului. — Trebuie ca terenul pe care se construiește să se usuce prin canalizare, iar la trebuință casa să se ridice pe o pătură impermeabilă de ciment, ori de asphalt, să se așeze transversal la picioarele zidurilor niște straturi impermeabile de: ciment, asphalt, cărămizi vitrificate și găurite, etc., să se așeze casa pe pivnițe boltite, să nu se tencuiască până nu va fi bine uscată de roșu. Subsolurile nu sunt bune pentru locuit în permanență, ele vor putea servi pentru sufragerie, bucătărie, băi, etc., și nu vor avea nici odată mai puțin de un metru deasupra nivelului stradei, nici nu vor fi orientate spre nord. Mansardele de asemenea nu sunt bune de locuit din cauză că iarna sunt prea friguroase și vara prea cald. — Alegerea materialelor de construcțiune va trebui să se facă după cerințele igienei, iar nici

odată după necesitățile economice. *Orientația* casei atârână de clima și de vânturile localității.

Lohii (gr. *locheia*, naștere). — Scurgere de sânge, sau de materii mucopurulente, cari curg din părțile genitale după naștere timp de câteva zile. La început este sânge roșu. mai mult sau mai puțin închis, câteodată amestecat cu chiaguri, apoi puțin câte puțin lichidul devine, alb roșietic, amestecat cu flocoane, când capătă un miros special. După *lohiile roșii* vin *lohiile seroase*, mai palide, lăptoase, cari țin câteva zile și au un miros mai pronunțat. La unele femei lohiile roșii durează 2—3 zile, iar lohiile albe 8—10 zile. La altele lohiile roșii țin mult timp și după ce au încetat odată pot să reapară către a 20-a zi dela naștere; de asemenea și lohiile albe pot să dureze mai mult. În general femeile cari alăptează au lohii mai puține. Când lohiile miroasă urît trebuie să ne gândim la o complicație gravă (septicemie) și îndată trebuie chemat un doctor.

Longevitate (lat. *longaevilas*, dela *longus* lung și *aevum*, etate). — Durata vieții peste termenul obicinuit (v. *Viață*).

Lordoză (gr. *lordos*, aplecat, înclinat, îndoit). — Îndoitura șirii spinării înapoi (v. *Columna vertebrală*).

Loretină. — Este un derivat al chinolinei. Se întrebuințează ca și aristolul în pansamentul rănilor, plăgilor de tot soiul, fiind un bun antiseptic fără să fie toxică. Se aplică singură, curată, sau amestecată cu magnezie calcinată, pulverizându-se rănilor și traiețele fistuloase, sau sub formă de soluțiune din 2—5 la 100, înlocuind acidul fenic.

Loțiune (lat. *lotio*, dela grec. *louein*, a spăla), *spălate*. — Cuvântul *loțiune* ca și cel de *abluțiune* înseamnă o operațiune care constă în a spăla cu un lichid o parte sau totalitatea corpului. Cu toate acestea s'a admis că prin cuvântul *abluțiune* să se înțeleagă spălăturile făcute cu scop igienic, spălături de curățenie, pe câtă vreme *loțiunea* este o spălare făcută cu scop terapeutic, adică de a vindeca. Loțiunile se pot face cu mâna, sau cu un

șervet înmuiat într'un lichid, pe o parte sau peste tot corpul. Ele se fac în cursul unei boale și se pot face cu *apă simplă*, în special cu *apă rece*, curată sau amestecată cu puțin oțet sau spirt, când voim să micșorăm căldura prea mare a corpului (febra tifoidă, scarlatina, pojar, etc.), sau pentru efectul tonic (întăritor) al apei rece la cei ce sufăr de anemie, cloroză, scrofule, rachitism, etc. Dar de multe ori loțiunile se fac cu un ceaiu (infuziune) care este calmant, tonic, stimulent, etc., după efectul pe care îl dorim. Astfel avem: loțiune *emolientă* făcută din rădăcină de nalbă mare, flori de nalbă, semințe de in, tărâte, scrobeală, fierte în apă, unt de lemn sau de migdale dulci; — loțiune *calmantă* făcută din flori de teiu, foi de lăptuci sau de mătrăgună, capete de mac, fierte în apă, sau: extract de hiosciam (măslăriță) (10 gr., glicerină 50 gr., apă 450 gr. — Loțiunea *tonică* e făcută din coaje de china, din lemn de gențiană, fierte în apă, alcool, vin roșu; — loțiunea *astrigentă* făcută din coaje de stejar, nucă galică (gogoși de ristic), flori de trandafiri, etc.; — loțiune *excitantă și rezolutivă* (amoniacală camforată): amoniac 6 gr., alcool camforat 1 gr., clorur de sodiu 5 gr., apă 100 gr. — loțiune în contra *mâncărimei*: carbonat de potasă 1 gr., apă distilată de laur-ceras 20 gr.; — loțiune *antiparazitară*: sublimat coroziv 20 ctgr., apă de Colonia 10 gr., apă 120 gr.; — loțiune în contra *petelor de pe obraz*: borat de sodă 10 gr., biclorur de mercur 50 ctgr., alcool de lavandă 30 gr. și apă 120 gr.; — loțiune contra *căderii părului*: apă de Colonia 200 gr., glicerină 25 gr., tinctură de cantaridă 10 gr., nitrat de pilocarpină 50 ctgr.

Lovire. — V. *Contuziune*.

Luciu. — V. *Pin*.

Lumănare, *coada mielului*, *lipan*, *pur* (*Verbascum phlomoides*, fam. scrofulariaceelor). — Plantă ierbacee care crește prin colinele deșerte și pe câmpii nisipoase, prin locuri pustii, prin văile râurilor (Iulie—August). Florile acestei plante se întrebuințează în medicină ca pectorale și calmante în contra tusei și a guturaiului. — La *țară* se dă ceaiul de flori, cald, când cade gutu-

LUMA

LUMI

raiul la piept. Plămădită cu rachiu de drojdii se dă la gălbinare și friguri, fiartă cu lapte se bea pentru nădușeală, ceaiul de rădăcină pentru durere de stomac. In unele sate se ține această plantă în casă cu credința că fug păduchii de lemn (ploșnițele).

Lumânărică, coada lupului, coada vacii, (*Verbascum Thapsus*, fam. scrofulariaceelor). — Planta erbacee care crește prin locuri uscate, petrișuri și coaste, pe marginea pădurilor și prin poieni. In medicină se întrebuințează frunzele și florile, cari calmează tusa și ajută scoaterea fleșmei; afară de aceasta provacă transpirația (nădușeala), din care cauză se dă la guturaiu, durere de gât, de piept. Din flori se face *ceaiu* (20 la 1000). Pe dinafară se fac cataplasme de frunze, cari se aplică pe piept și pe orice umflătură dureroasă.

Lumbago. — (lat. *lumbi*, șale), *durere de șale*. — O boală care vine repede, pe neașteptate, în urma unei răceli (curent de aer), unei ridicări sau sforțări violente, unei mișcări repezi sau prelungite de sucire, sau de îndoire a corpului, unui mers prelungit, unei oboseli prea mari, alteori fără nici o pricină vădită. Durerea nu se micșorează decât stând culcat, în nemișcare. De altfel la șale nu se vede nici o umflătură, nici o roșeață. — *Tratament.* Lumbagul se vindecă și singur în 8—10 zile, dar este mai bine să-i scurtăm durata punând pe șale vreo 10—20 ventuze uscate, sau câte-va lipitori (dacă omul e sângeros), sau muștare; apoi fricțiuni cu linimente calmante, cu cloroform, cu uleiul de mușetel camforat, cu uleiul de terbențină cu care se stropește o cârpă sau o flanelă ce se pune pe șale și se ține acolo cât poate răbda omul. Se mai



Fig. 233
Lumânărea



Fig. 234
Lumânărică

poate unge partea dureroasă cu: acid salicilic, lanolină, uleiul de terbențină, câte 10 gr. din fiecare; vaselină, 80 gr., sau fricțiuni cu: cloroform 10 gr., uleiul de hiosciam, uleiul camforat, câte 25 gr., balsam tranchil 30 gr. In cazuri mai grave se pot pune ventuze cu sânge și când durerile sunt foarte mari se poate face o injecțiune sub piele cu morfină. Pe dinăuntru se va da: antipirină (3 gr.) exalgină, bromidrat de chinină cu fenacetină, salicilat de sodă (4—6 gr.), salipirină, aspirină, piramidon. — La *țară* durerea de șale se vindecă cu boz, crucea pământului, sulvină, tătâneasă, varză.

Lumești (Boale). — V. *Blenoragie, Șancăr și Sifilis.*

Lumină (lat. *lumen, lux*; grec. *phos*). *Iluminatul* este de două feluri: artificial, când lumina este dată prin arderea materiilor grase, a uleiurilor minerale și vegetale, a gazului aerian prin electricitate etc. — *Iluminatul natural.* Cea mai bună și cea mai sănătoasă lumină este aceea pe care ne-o dă soarele, trebuincioasă pe de o parte pentru a putea vedea, iar pe de altă parte pentru traiul nostru, tot așa de folositoare ca și aerul, ca și căldura. Oamenii cari lucrează în mine în timpul zilei, sunt galbeni la față, ca plantele pe cari le ținem în pivniță, la întunec. Astfel fiind o poruncă mare a igienii este de a lăsa să intre în casă cât se poate mai multă lumină solară, făcând ferestre mari, multe și bine expuse, pe cari le vom deschide adeseori întocmai ca și pentru primenirea aerului (v. *Aerisire*). Dacă însă razele de lumină sunt prea calde, după cum se întâmplă în timpul verii, atunci ne vom servi de perdele, mai bune decât obloanele, de oarece ele micșorează lumina și o mai îndulcesc, pe câtă vreme acestea o opresc de tot. In camerele unde se lucrează, se cetește și se scrie, precum și în școale iluminatul trebuie să vie din partea stângă a omului (v. *Școale*). In camerele în cari nu se lucrează (camera de culcare, salon, camera de mâncare) este indiferent din care parte vine lumina, principalul este numai ca lumina să pătrundă în abundență; tot așa și pentru camerele bolnavilor, cari trebuie să aibă lumină solară directă și pre-

lungită, cu condițiune însă ca să nu obosească ochii, nici să turbure odihna bolnavului. În atelier este bine ca lumina să pătrundă pe sus, pentru ca ea să fie deopotrivă în toate părțile, să fie abundentă și să nu fie împiedecată de raze cari ar veni în sens contrar. — *Iluminatul artificial* se face în mai multe feluri. Lumânările de sparmantet, de *stearină* sunt cele mai bune, căci nu se înmoaie și nu curg, iar fitilul lor se arde complet, lumina lor nu licărește așa mult, nu ne face fum așa de mult ca lumânările de seu. Dintre *uleiurile vegetale* cele mai întrebuințate sunt de cel de *mucă*, de *rapiță*, *untul de lemn*, cari servesc astăzi numai pentru candelă. Dintre uleiurile *minerale* cel mai întrebuințat este *petrolul*, care conține principii volatile cari se aprind lezne și la căldură mică. Petrolul *rectificat* nu emite vapori sub 35° și dacă se aprinde la o temperatură mai mică decât aceasta înseamnă că el nu este curat și este *periculos*. Petrolul se arde în lămpi cu fitil, cari astăzi au ajuns la perfecțiune, dând lumină bună. *Gazul aerian* se întrebuințează mai mult decât toate celelalte; mulțumită *sitelor Auer*, lumina de gaz este foarte frumoasă, liniștită, constantă, semănând cu cea de electricitate. Dar dintre toate sistemele de iluminat, cel mai igienic este iluminatul cu *electricitate*, care ne dă o lumină intensă, fixă, fără să dea căldură, fără primejdie de explozie sau de incendiu. Astfel fiind lumina de electricitate este cea mai practică atât pentru strade, pentru sălile de spectacol. Condițiunea principală a unui bun iluminat artificial este ca lumina să fie cât se poate de albă și de fixă și să producă pe cât se poate mai puțină căldură; lumina să vină la ochi fără ca aceștia să vadă de unde vine și pentru aceasta se recomandă să avem un *abajur* sau *cozoroc*, care să concentreze razele luminoase asupra cărții sau obiectului la care ne uităm. — *Acțiunea luminii asupra microbilor*. Lumina soarelui omoară, în măsură mare, mai ales microbii din aer și din apă, însă cu condițiune ca să lucreze de-a dreptul asupra lor. Când expunem obiectele de pat la soare toți microbii cari se găsesc în stratele superficiale

mor, de aceea unul dintre cele mai bune dezinfectante este lumina soarelui. Sunt multe boale care astăzi se tratează cu bun succes prin ajutorul luminii. Un doctor din Copenhaga, Finsen, a isbutit să suprimă din lumina solară, sau din lumina electrică cu arc, razele calorifice cari ard țesăturile (raze ultra-roșii, roșii, portocalii și galbene) și să păstreze numai razele chimice. Astfel sunt utilizate numai radiațiunile albastre sau violete, omorătoare de microbi. Pentru a face permeabile la lumină țesăturile vii cari sunt prea puțin sau de loc permeabile, trebuie să alungăm sângele din ele prin compresii. Acțiunea asupra pielii nu se vede îndată, ci numai după 6—10 ceasuri mai târziu, când se produce o roșeață, o umflare (tumefacțiune), adică reacțiunile unei inflamațiuni ușoare și fără durere. Uneori se produce o scurgere seroasă, în totdeauna fără puroiu. Roșeața persistă mult timp după tratament (15—30 de zile). Acțiunea luminii poate fi purtată asupra corpului gol întreg, sau numai asupra unei părți. Doctorul Finsen a întrebuințat lumina în boala de nas numită *lupus*; alți doctori au întrebuințat-o și în alte boale de piele (acnee, cancer, peladă), în reumatism, în nevralgia sciatică, în ticurile dure-roase, în nevralgii, în lumbago, nervi, obezitate și, în mod general, în toate boalele prin încetinirea nutrițiunii. — *Intrebuințarea luminii albe*. Pentru aceasta se fac niște lăzi cari au pe pereții lor lămpi cu incandescență a căror acțiune este mărită cu oglinzi reflectoare. Cu ajutorul unei astfel de lăzi poți face o baie locală de abur uscat, în care acțiunea luminii se adaugă la aceea a căldurii; bolnavul începe să asude pe la 45°. — *Intrebuințarea luminii roșii*. Dacă lăsăm să treacă lumina soarelui prin sticlă roșie, în loc de sticlă ordinară și aceste raze să cadă asupra beșicuteilor de vărsat (variolă) se împiedecă supurațiunea lor; tot astfel se vindecă eczema, etc. Lumina roșie este *excitantă* și a dat bune succese în tratamentul formelor melancolice ale nebuniei, bolnavul fiind ținut într-o cameră cu perdele roșii și ai cărei pereți sunt vopsiți tot cu roșu. Lumina *albastră* și cea *verde* au lucrare

calmantă și dau bune rezultate în forma maniacă a nebuniei.

Lumânări de ceară. — V. *Illuminat*.

Luminiță. — V. *Ochiu*.

Lunatic. — V. *Ipnotism*.

Lungoare. — V. *Tifoidă* (Febră).

Lupulină. — *Hameiu*.

Lupus. — Este o boală de piele care se arată de obicei la față. Cel *vulgar*, sau *tuberculos*, se produce de cătră microbul ofteiei și este inoculabil. Părțile atinse de obicei sunt nasul, obrazii, apoi gambele și picioarele, dar el poate ataca și alte părți ale corpului. Această varietate de lupus constă în niște ridicături de mărimea unui bob de meu sau a unei gămlii de ac, de culoare arămie, cari se îngrămădesc mai multe la un loc constituind niște plăci de formă și mărime variabilă, apoi ele



Fig. 235. — Lupus al nasului

se întind din ce în ce mai mult și se ulcerază (sparg), iar pierderea de substanță care rezultă se acopere cu coji (cruste) gălbui închise, uneori supurează puțin, sau de loc, alte ori fac puroiu mult. Mersul acestei boale este foarte încet, afară de unele cazuri în care boala merge repede, distrugând pielea, mușchii, sgârșciurile și oasele și atunci se zice *lupus vorace* (rozător). Se ivește foarte de timpuriu, la 5—6 ani și foarte rar după 30 de ani. Durata poate fi de mai mulți ani. Vindecarea lasă urme adânci. *Tratamentul local* constă în cura cu *lumină* și în special cu razele chimice (albastre sau violete), cu razele lui Roentgen, sau în cauterizațiuni electrice ori chimice. *Tratamentul general* este cel al variației care urmează. — *Lupus eritematos* apare pe nas și pe umerii obrazilor sub formă de pete, ridicate puțin deasupra nivelului pielii, cari au formă și mărime variabile, iar culoarea lor este roșietică și dispare sub apăsarea degetului. Aceste pete se întind pe la margini, cari sunt de culoare roșie vie, iar la centru se deprimă și iau aspect de cicatrice. Acest lupus este de na-

tură scrofulo-tuberculoasă. *Tratamentul general* constă în untură de pește, preparate fieruginoase și arsenicale, iodoform, etc., iar *tratamentul local* în săpun de gudron, plastore mercurial, scarificațiuni și cură de *lumină*, precum și în multe alte mijloace pe cari le are medicul la îndemână.

Lurbăn. — V. *Dașin*.

Luxație (lat. *luxatio*, dela *luxare*, a scrinti), *scrintire*. — Orice dislocare, sau sărire din loc a unui os, din încheietura lui obișnuită, se numește *luxațiune* sau *scrintire*, spre deosebire



Fig. 236. — Luxația umărului prin ruptura ligamentelor lui

de acele lovituri adânci ale încheieturilor, sau de suciturile membrelor cari produc umflătură și durere în dreptul unei articulații, dar în cari osul sau oasele își păstrează locul sau poziția lor normală, și unde avem numai o sdrobire mai mult sau mai puțin mare a părților moi, sau ruptura unor ligamente și vinișoare. Luxațiunile pot fi *traumatice*, cari se produc repede într'o articulațiune sănătoasă în urma unei violențe externe (lovitură, căzătură, etc.), *spontane*, patologice sau *consecutive*, cari se produc pe încetul și sunt rezultatul unor boale de încheieturi,

congenitale, cari există la naștere.— *Cauzele luxațiunilor traumatice*, sunt o cădere sau o lovitură puternică, ce se face pe încheietura care s'a scrintit, ori ceva mai departe. Scrintirile se văd mai adeseori la bătrâni, la cari legăturile încheieturilor sunt mai slabe; ele se văd mai des la bărbați, cari sunt mai expuși decât femeile la căderi și la lovituri, mai des în timpul ier-



Fig. 237.
Luxația umărului

nii când omul alunecă mai cu înlesnire și mai des la persoanele cari au mai suferit deja de scrintire sau de alte boale artificiale. — Luxațiunile pot fi complete când capătul osului este cu totul eșit din cuibul său sau pot fi incomplete, când capătul osului este numai în parte eșit din locul lui. În amândouă cazurile avem ca *semne*: o durere vie în articulația scrintită, care nu permite bolnavului să facă nici o mișcare, căci cea mai mică mișcare mărește sau provoacă durerea; apoi încheietura luxată se umflă. Aceste două semne însă pot fi și în cazurile de fractură (ruptură de os), cu deosebire că în acest caz dacă mișcăm osul simțim o scârțăitură produsă de capetele rupte ale osului, ceea ce în luxațiune nu se simte, apoi în scrintire capătul osului sărit se simte prin pipăire în apropierea încheieturii scrintite, capăt care este neted și rotund, pe câtă vreme în fractură ca-



Fig. 238. — Luxația degetului mare

pătul osului este aspru și cu tăndări. Încheietura scrintită este diformată, adică nu-și mai are forma normală; membrul are o atitudine specială și poate fi mai lung sau mai scurt; mișcările active ale articulațiunii sunt imposibile. — O luxațiune trebuie redusă, adică osul trebuie pus la locul lui, cât se poate mai iute și cu atât reușim a o face mai cu înlesnire cu cât operăm mai degrabă. Dacă scrintirea se învechiește, capătul osului sărit își face o nouă încheietură cu osul cu care este în atingere și în acest caz reducerea nu se poate face decât sub cloroform și printr'o operațiune mai mult sau mai puțin complicată.

Tratamentul. Indată ce bolnavul și-a scrintit o încheietură să-i ținem membrul în nemișcare punând pe loc cârpe sau comprese înmuiate în apă rece. Scopul ori cărei reduceri de luxațiune este de a trage capătul osului din noua lui poziție și de a-l împinge la vechiul său loc. Pentru aceasta trebuie să se facă întinderea sau extensia membrului luxat, ținând trunchiul în nemișcare, apoi când capătul osului scrintit a ajuns în dreptul încheieturei, să se împingă la locul său. Unele reduceri nu se pot face din pricina durerilor decât numai adormind bolnavul cu cloroform, care mai are avantajul de a suprima constracțiunile instinctive ale mușchilor din a căror pricină osul sărit nu se poate mișca din loc.

Lysarthrol. — Este un preparat compus din uroformină și benzoat de litină, ambele cu o bună acțiune antiseptică, în special asupra căilor urinare. Se dă în cazurile de gută, migrene, colici nefretice, calcul al vezicii, reumatism și altele. Se prezintă sub formă de granule, pe cari, punându-le în apă, fac efervescentă. Se dă câte o linguriță, într'un sfert de pahar cu apă, de 3—4 ori pe zi, înaintea meselor, timp de 2—3 săptămâni, după cari se face o pauză de 10 zile și se dă din nou.

M

M. — Această literă se pune într'o ordonanță medicală ca prescurtare a cuvântului latin *misce*, care însemnează *amestecă*.

Mac, somnișor (*Papaver somniferum*, fam. papaveraceelor). — Plantă erbacee care se cultivă pe scară întinsă pentru producțiunea opiumului în India, Persia,

China, Turcia, America și mai puțin în Europa. La noi se cultivă prin grădini mai mult cu scop de a-i întrebuința fructele sale, numite căpățâni de mac, decât pentru florile sale frumoase. Din căpățânile necoapte se scoate prin tăieturi *aŃionul*, sau *opiul*, medicament foarte prețios. Frunzele macului sunt narcotice (produc somn), florile sunt calmante și narcotice, semințele, bogate în ulei, se întrebuințează uneori și în bucătărie, mai ales pentru prăjituri. — Uneori ceaiul de căpățâni de mac se dă de băut copiilor cari nu pot dormi și sunt neliniștiți, obiceiul foarte primejdios.

Mac roșu, mac de câmp, (Papaver Rhoeas, fam. papaveraceelor). — Plantă erbacee narcotică, ale cărei flori de culoare roșie aprinsă se cunosc în popor sub numele de *paparoane*, sau *papărune*. Crește prin locuri nisipoase cultivate sau pustii. În medicină se întrebuințează florile, sub formă de *ceaiu de paparoane*, care calmează tusa, din care cauză aceste flori se mai amestecă și cu alte specii zise *pectorale*; lucrează și ca sudorific (produce nădușeală) din care pricină în popor se dă la pojar și scarlatină, pentru ca erupția să iasă mai curând.

Macaroane. — Pastă alimentară făcută din făină de grâu curată sau de orez și turnată în formă de cilindri (țevi). Se mănâncă fierte în apă, supă, sau lapte, uneori cu cașcaval răzuit (parmezan). Ele sunt foarte hrănitoare și ușor de mistuit. Cei supuși la îngrășare (obezitate) să se păzească de ele.

Maceratiune (lat. *maceratio*), *plămădeală*. — Dacă punem o substanță vegetală într'un lichid rece: apă, alcool, eter, vin, oțet, lăsând-o acolo un timp mai îndelungat, se face o maceratiune, adică lichidul se încarcă cu principiile active ale acelei substanțe. Astfel se prepară vinul de chinchina plămădind coaja de chină mai întâiu în alcool sau în rom, apoi în vin; tot așa vinul de cassia amară, de grăunțe de in, etc. De maceratiune ne servim numai în cazurile când lichidul se strică sau se volatilizează prin căldură, cum este eterul, spirtul, vinul. Când însă lichidul nu suferă nimic prin căldură, cum este apa, atunci este de preferat să fierbem substanțele medicamentoase în ea,

să facem adică o *infuziune* (ceaiu), sau o *decoctiune* (fierătură), operațiuni prin cari apa se încarcă cu o cantitate mai mare de principii active.

Macheadon. — V. *Pătrunjel*.

Măcieș. — V. *Trandafiri*.

Măcriș, (Rumex acetosa, fam. poligonaceelor). — Măcrișul are un gust acru plăcut din care pricină se întrebuințează mult la mâncare, ca și spanacul, dar el fiind prea bogat în *acid oxalic* nu trebuie să-l mănânce cei ce fac nisip roșu (acid uric) în urină, sau gutosii, nici cari sufăr de dis-



Fig. 239. — Măcriș

pepsie (mistuire grea). În medicină se întrebuințează rădăcina și planta proaspătă pentru principiul ei activ, care este oxalatul de potasă. El lucrează ca răcoritor, diuretic (face ud mult) și laxativ (face eșire afară) când este luat în cantitate mare. Se dă sub formă de infuziune (ceaiu) din 10 la 1000. — La *țară* se dă fiertura de frunze în contra fierbințelii la friguri ca răcoritor, iar în contra gălbănării se bea măcriș și șofran, făcut în rachiu de drojdii.

Macrocefalie (gr. *makros*, mare, și *kephalé* cap). — Copiii cari se nasc cu capul peste măsură de mare se numesc *macrocefali*. Aceștia însă nu trebuie confundați cu așa zișii *idrocefali* cari au apă la creeri în câtime mai mare, decât trebuie. La macrocefali este creierul mărit de volum și macrocefalia nu este o monstruozitate, ci numai o anomalie care se pare că predispune la rachitism și la boale de creeri.

Mădreață. — V. *Pat*.

Măduvă de bou. — Grăsime solidă conținută în cavitatea oaselor. Ea servește la prepararea diferitelor pomezi, cozmectice.

Măduva roșie a oaselor. — Fiind dovedit că globulele roșii ale sângelui se formează în măduva roșie, unii doctori s'au gândit să dea această măduvă la bolnavii cari sufăr de anemie pseudoleucemică, infantilă, rachitism. Pentru aceasta se întrebuințează măduva roșie scoasă din oasele trunchiului, cari

conțin câte 10 ctgr. de pulbere uscată ; doza 2—4 pe zi.

Măduva spinării. — Este partea centrului nervos cerebro-spinal care se află în canalul șirii spinării. Ea este un fel de frânghie albă pe dinafară, cenușie pe dinăuntru, rotundă, cilindrică, cu două umflături pronunțate : una în partea de sus a spatelui, din care pleacă nervii brațului și mâinii și cealaltă în partea de jos din care ies nervii cari se duc la coapsă, gambă și picior. Măduva spinării se continuă pe de o parte cu creerii, iar pe de altă parte cu toți nervii corpului, așa




Fig. 240. — O secțiune în măduvă

a = rădăcinile posterioare ; b = cordonul lateral ; c = cordonul anterior ; d = rădăcinile anterioare ale nervilor ; e = șanțul median anterior.

că prin ea trec toate impresiunile de căldură, de frig, de atingere, de gădilire, de înțepare, etc., încercate de nervii periferici, pentru a se duce la creer, care le simte și le apreciază, apoi tot prin ea trec poruncile pe cari creerul le trimite nervilor periferici, când el comandă pronunțarea unui cuvânt, o mișcare, un pas înainte, etc., așa că măduva spinării este un *loc de trecere*. Dar afară de aceasta, măduva este și un *post central*, de oarece ea are puterea de a primi oarecari impresiuni venite dela extremitățile corpului și de a comanda imediat mișcările convenite, fără ca aceste impresiuni să fi fost simțite de creer, fără ca noi să avem

cunoștință de ele. Sunt fenomenele reflexe. — *Rănirile și boalele măduvii spinării.* Dacă măduva este rănită, tăiată sau ruptă la partea de sus, omul poate muri la minut, ceea ce se întâmplă mai ales când măduva este atinsă în dreptul cefei, la așa zisul *nod vital*, care prezidă la respirațiune și la circulațiunea sângelui, indispensabile existenței. Când rănirea măduvii este mai jos, în dreptul spatelui sau a rinichilor, omul de asemenea poate muri, însă nu așa iute, dar cele mai adeseori el se alege cu o paralizie provenită din întreruperea comunicațiunilor dintre creeri și nervi cari se duc la mem-




Fig. 241. — Secțiune în maduvă

v = rădăcini anterioare ; b = cordonul posterior ; c = cordonul exterior ; d = ganglioni ; e = mănunchiul lui Goll ; f = șanțul median ; g = rădăcini posterioare ale nervilor.

bre sau cari vin dela ele, lucru care se vede de obicei în *fracturile* (rupturile) șirii spinării. — *Boalele măduvii* sunt multe. Intre acestea este una care se vede mai adeseori, numită *tabes dorsal*, sau *ataxie locomotrice*, pe care cetitorul o poate ceti la cuvântul *Ataxie*. Altă boală gravă este *atrofia musculară progresivă*, sau *topirea mușchilor*. Incepe prin mușchii însărcinați cu apropierea degetului mare dela mână cu celelalte degete în care caz nu mai putem prinde sau ridica un condeiu sau o pană ; apoi atrofia se întinde la ceilalți mușchi dela palmă, care ia forma de ghiară și mai târziu seamănă cu o mână de schelet îmbrăcat în piele. Cu timpul

atrofia se întinde la mușchii antebră-
țului, brațului, trunchiului și la urmă
la mușchii înghițirii și respirațiunii.
Această cumplită boală poate dura
dela 2 până la 12 ani, iar cauzele ei
sunt necunoscute deși se învoacă moște-
nirea și oboselile provenite din excese.
Ca *tratament* se recomandă curenții
electrici faradici. — *Boala lui Frie-*

dreich, care începe înainte de etatea
de 14 ani, în familii
în cari mai mulți
membri au suferit
de această boală
(moștenire) și la ac-
eeasi vârstă. Copilul
umblă cu greutate,
cu pași greoi, nere-
gulați, cu picioarele
depărtate, poticnind;
stă cu mare anevo-
ință în picioare de
oarece se ciatină ca
un om beat. — *Aprin-*
deredă sau inflamați-
nea membranelor, nu-
mită *meningita rachi-*
diană, se observă mai
ales la cei ce sufăr
de șira spinării (boala
sau morbul lui Pott),
de escare la sacru
(osul crucii); ea are
2 forme: forma *acută*
în care bolnavul are
dureri dealungul șirii
spinării, dureri sub
formă de incingătoare
și dureri în membre;
crampe contracturi
cari îndoiesc trun-
chiul (*opistotonos*);
oprirea udului și a
materiilor fecale; mai
târziu durerile dispar
și se înlocuiesc prin
paralizia incom-
pletă a membrilor; udul și materiile
fecale ies în neștire. În forma *cronică*
sunt aceleași semne, însă boala merge
cu mult mai încet. *Tratamentul* constă
în revulzive, calomel, etc., și boala
se poate vindeca printr'o căutare po-
trivită. — *Aprinderea, sau inflamați-*
nea măduvii, numită *mielită difuză*, are
și ea 2 forme. Forma *acută* se observă
în boalele infecțioase, în sifilis, în of-
tica șirii (morbul lui Pott), sau pro-



Fig. 242. — Măduva
spinării

a = nervii rachidieni cervicali;
b = nervii rachidieni dorsali;
c = nervii rachidieni lombari;
d = nervul sacral;
e = nervul coccidian.
1 = protuberanța
2 = nervii cranieni
3 = dura mater
4 = conul torsionat al
5 = durei mater.

vine din răceală. Ea se arată prin
fiori, febră (căldură), dureri, furnică-
turi, crampe în pulpe, simțire neplă-
cută când se atinge șira spinării, pa-
ralizie și amorteire în picioare, oprirea,
apoi neținerea udului și a materiilor
fecale, gangrenă la boase, la osul crucii
și la glezne. Bolnavul poate să moară
în câteva zile de *apoplexie* sau în
comă, dar el se poate și vindeca mai
ales când are forma sifilitică, mulțu-
mită unui tratament intens și revul-
zivelor. Forma *cronică* are aceleași
semne, cari merg însă mai încet. — *Pa-*
ralizia spinală atrofică a copilăriei sau
paralizia infantilă se ivește de obicei
la copii dela etatea de un an până
la 3 ani ivindu-se uneori și la cei mai
mărișori; este produsă de un microb
necunoscut încă și care pătrunde în
corp prin nas și gură. Este conta-
gioasă și în epidemiile mari mortali-
tatea este destul de mare. Se arată
prin febră care ține dela câteva cea-
suri până la câteva zile, spazme, diaree,
dureri dealungul șirii spinării, contrac-
țiuni în unii mușchi. În perioada a
doua se arată paralizia la amândouă
picioarele, la un picior sau la o mână,
la gât, trunchiu. După câteva luni
paralizia dispăre din cei mai mulți
mușchi, localizându-se definitiv numai
la unii, de obicei la picior și anume
la întinzătorii degetelor, altele la muș-
chii unei mâni, la umăr, la braț, la
spate. În perioada a treia, mușchii pa-
ralizați se atrofiază, tot așa și oasele
de desuptul lor, cari nu mai cresc cât
trebuie, din care pricină bolnavul schioa-
păță, sau nu poate să umble decât
târându-și picioarele, iar acțiunea muș-
chilor cari au rămas sănătoși produc
diformațiuni (picior strâmb). *Trata-*
mentul constă în injecțiuni cu ser la
început, aplicarea razelor X, electrici-
tatea faradică în perioada a treia,
masaj, băi sărate. — *Paralizia spinală*
la adulți în forma *acută* are aceleași
semne ca și la copii, dar creșterea fiind
aci săvârșită, diformățiunile sunt rare
și puțin pronunțate. În forma *subacută*
paralizia și atrofia încep prin mem-
brele inferioare, apoi se întind la toți
mușchii corpului, afară de cei dela
față, dar după câteva săptămâni ele
dispar fără să lase urme; vindecarea
este de regulă. Preventiv și la copii

și la adulți se vor pune, în timp de epidemii, picături de mentol (0.10 ctgr. la 10 gr. oleu de vaselină) în nas, se va clăti gura cu orice dezinfectant și se vor evita aglomerațiile.—*Scleroza în plăci* în perioada primă se arată prin turburări în vorbire, tremuratura mânilor, greutatea crescând în mers în urma slăbirii mușchilor. În această perioadă boala poate să se întrerupă prin timpuri de sănătate de mai multe luni. În perioada a doua picioarele se înțepenesc (contracturi), genunchii nu se mai pot îndoi și bolnavul nu poate să-și ducă picioarele înainte decât ridicând în mod alternativ de fiecare parte șoldul și trunchiul : vârful piciorului neputând fi bine ridicat freacă pământul în timpul mersului. Câte odată bolnavul merge clătănându-se și îndată ce se ridică îl cuprinde o tremurare generală. Această tremurare se vede mai des la membrul superior însă numai cu prilejul mișcărilor voite. Adeseori se produce *nistagmus* (oscilațiuni sau mișcări repezi involuntare ale ochilor) și vederea este micșorată. În perioada a treia avem slăbire progresivă, diaree; inteligența scade repede și vorba se încurcă din ce în ce mai mult (cachexie). Această boală se poate vindeca. Moartea se produce printr'o complicațiune din partea plămânilor, prin paralizie generală sau printr'o emoragie la creeri. De obicei scleroza în plăci este produsă de o boală infecțioasă.—*Siringo-mielia* delă grec. *syrix*, canal, și *myelos*, măduvă), numită și *boala lui Morvan* are următoarele semne : pierderea senzibilității superficiale și profunde având sediul obișnuit la membrele de jos și putând fi localizată numai la acestea. Această anestezie (nesimțire) se observă numai cu privire la frig, la căldură, la durere, cu păstrarea senzibilității la contact (la atingere), atrofia sau topirea mușchilor dela mâni, antebrațe, câte odată dela membrele de jos, contractura unor regiuni sau incoordonatiune în mișcări, umflătura extremităților, escare, panariții (sugii) cu repetițiune și cu pierderea falangei, scolioză dorso-lombară (strâmbarea în lături a șirii spinării). Mai târziu respirațiunea poate să devie mai grea, vederea să se turbure și să se ivească palpațiuni (bătăi

de inimă). Această boală nu se vindecă.

Magdanos. — V. *Pătrunjel*.

Măgheran, măghiran (*Origanum majorana*, fam. labiatelor). — Plantă erbacee plăcut mirositoare, originară din Africa, ce se cultivă prin grădini, prin florării și prin case (Iunie—August).



Fig. 243.—Măgheran

Vârfurile înflorite conțin un ulei esențial mirositor și se întrebuințează ca strănutătoare (sub formă de praf care se trage pe nas), ca stimulente, tonice și amare (în ceaiu de 10 la 1000).—

La țară babele dau ceaiul de măgheran, cu zeamă de lămâie, pentru oprirea regulelor ; femeile cari nu vrea să facă copii fierb trei crenguțe de măgheran cu o bucatică de săpun ordinar și fac spălături dup ce au avut relațiune cu bărbatul.

Magnet. — Mulțumită însușirii de a atrage corpiii metalici, magnetii slujesc pentru a scoate din interiorul ochiului, sau dintr'o rană, bucatelele de fier cari au pătruns acolo din întâmplare, cum se petrece la fierari, potcovari și alți lucrători cu acest metal încălzit până la roșu. Magnetii se mai întrebuințează ca izvor de electricitate în aparatele *magneto-electrice* și *magneto-faradice* (v. *Electricitate*). S'au încercat magnetii în tratarea unor boale, aplicându-i numai pe piele, obținându-se oarecare rezultate bune în unele dureri nevralgice (*nevralgii*) cari s'au calmat, în unele boale nervoase cum este *isteria*, în care a reapărut senzibilitatea pierdută sau micșorată.

Magneto-electrică (Mașină). — V. *Electroterapie*.

Magnezie. — Substanță puțin alcalină, care se găsește în natură în cantitate foarte mare formând *spuma de mare* ; un corp cenușiu, poros și foarte ușor, din care se fac vestitele pipe. Sunt mai multe feluri de magnezie cari se întrebuințează în medicină. Intre acestea avem : *magnezia calcinată*

(oxid de magnezie, magnezie engleză), un praf alb foarte ușor, dulce la pipăit, fără miros, fără gust, aproape insolubilă în apă; ea se dă în *acrimile de stomac*, în doză de 50 ctgr. până la 2 gr. la adulți, în momentul mâncării, în apă; se mai dă ca *laxativ* (pentru curățenie) în doză de 25—40 ctgr., la copii, apoi de 1—2 gr. și de 4—12 gr., după etate, pusă într-o băutură acidulată, cum ar fi limonada ordinară, sau siropul de coacăze. Ea este foarte bună în contra otrăvirilor cu acid arsenios (șoricioaică), în doză foarte mare, 25—30 gr. La copii se poate da magnezia aceasta și în lapte cu zahăr, sau se mai prepară pentru ei ciocolată cu magnezie sau granule cu zahăr.—Magnezia combinată cu acidul carbonic ne dă *carbonatul de magnezie*, care se dă în doză de 1—10 gr. ca absorbant și ca antiacid.—În combinație cu acidul citric avem *citratul de magnezie*, care este un purgativ plăcut și se dă în doză de 30—60 gr., într-o sută gr., apă, la care se adaugă 40 gr., sirop de smeură, sau sirop de cireșe, sau sirop simplu. Aceasta este vestita limonadă purgativă numită *limonada lui Rogé*. Se mai prepară această limonadă foarte plăcută din: acid citric 30 gr., carbonat de magnezie 18 gr., sirop de cireșe 30 gr., apă 120 gr.—Cu acidul sulfuric avem un alt purgativ: *sulfat de magnezie*, cunoscut sub numele de *sare amară*, care se dă în doză de 30—60 gr., într'un păhar mare de apă, de luat dimineață. Această curățenie este foarte eficientă și prin urmare o poate lua și cel mai sărac, dar ea este foarte amară și cam irită stomacul și intestinele; pentru a o face mai plăcută se poate da în formula; sulfat de magnezie 30 gr., esență de mentă 2 picături, apă 60 gr.—În combinație cu acidul tartric avem *tartratul de magnezie* care se dă în aceleași doze ca și citratul.

Maiă. — V. *Brânză și Fermentațiune*.

Maiu. — V. *Ficat*.

Malachie. — V. *Onanism*.

Maladie. — V. *Boală*.

Mălaiu. — V. *Porumb*.

Malaria. — V. *Paludism*.

Malnaș. — Stațiune balneo-climatică situată pe linia ferată Brașov—

Mercurea Ciucului. Are un nămol fieruginos, pentru băi și ape cari conțin săruri de calciu, de litiu, sodiu, magneziiu etc. Apa se vinde în comerț în sticle, sub numele de apă de Malnaș. E recomandabilă bolnavilor de anemie, cloroză, litiază, cistită, reumatism, în bolile de femei, etc.

Malt. — Orez, (încolțit și uscat, astfel cum se întrebuințează la fabricarea berii. Încolțirea maltului determină producțiunea unui principiu particular, *diastaza*, ferment solubil care are însușirea de a schimba amidonul în zahăr. Maltul ușurează mistuirea alimentelor feculente. El se dă sub formă de malt pulverizat, 2—4 gr., de sirop de malt, de bere de malt.

Maltină. — Are aceleași proprietăți, însă este mai activă decât *maltul*, al cărui principiu activ este ea. Se prezintă sub formă de praf amorf, de culoare alb-gălbui, sau de lamele translucide, în parte solubilă, în apă, insolubilă în alcool; ea transformă amidonul în *dextrină* și în *maltoză*. Se dă la interior în doză de 10 până la 50 ctgr. se poate asocia cu *pepsina* și cu *pancreatina*.

Mama săcării. — V. *Săcară cornută*.

Mamaia. — Plajă la Marea Neagră la o depărtare mică de *Constanța*. Este una dintre cele mai frumoase plaje pe care le avem în țară. Întinsă pe o mare distanță, acoperită de un nisip fin, adăpostită de vânturi, această plajă este menită să devină una dintre cele mai importante din Europa. Azi este puțin vizitată pentru că nu sunt destule hoteluri și restaurante, publicul fiind silit să locuiască în *Constanța* și să vină cu trenul în toată ziua. Marea este foarte liniștită în această regiune și mică, în cât se pot face băi de mare fără nici un pericol.

Mămăligă. — V. *Alimente și Porum.*

Mamele. — V. *Sânuri*.

Mană. — Se numește astfel sucul care se scurge de la sine, sau prin tăieturi din coaja *frasinului de munte* numit și *mojdrean* (*Fraxinus ornus*, fam. oleaceelor), arbore care crește pe coline, prin locurile stâncoase din pădurile munților. Mana este un purgativ ușor, bun mai cu seamă pentru copii. Principiul activ al ei este *manita*. Ea se dă în doză de 15—30 gr.

la copii, de 30—50 gr. la adulți, în lapte sau în apă îndulcită cu puțin zahăr; sirop de mână 10—30 gr. *Manita* se dă în doză de 10—20 gr.

Mână (lat. *manus*). — Membrul superior se compune din braț, antebraț și mână (vezi fig. 14). Aceasta se unește cu antebrațul prin încheietura *pumnului*. Mâna se împarte în trei regiuni: una așezată la partea dinapoi, convexă peste tot, numită *dosul mâinii*, alta așezată înaintea care este adâncită la mijloc numită *palma mâinii*, a cărei piele prezintă mai multe îndoituri în dreapta în diferite direcțiuni și cari îndoituri formează baza așa zisei *chiro-manții* (meșteșugul de a ghici după forma și lungimea acestor îndoituri firea și viitorul omului). A treia regiune



Fig. 244. — Mușchii mâinei

care termină mâna este formată din cinci *degete* și anume: degetul mare arătătorul, mijlociu, inelarul (din cauză că de obicei în acest deget se poartă veriga), degetul cel mic. Degetele pot prezenta o mulțime de abateri dela această regulă; așa de pildă sunt oameni cari au unul sau două degete, în loc de 5 sau 6—7 degete (fig. 245) sau altelei numărul este cel normal, dar degetele sunt unite între ele, fenomen care poartă numele de *sindactilie* (fig. 246). Mâna este formată de o mulțime de oase mici, Mulțumită acestor oscioare așa de multe și mușchilor, degetele și mâna

pot face mișcări foarte variate și în toate înțelesurile pentru a ne împlini toate trebuințele. Pielea mâinii are în ea o mulțime de umflături nervoase, foarte simțitoare, numite *papile*, cari ne dau toate senzațiunile de contact, de tărie, de temperatură, etc., pe cari corpurile din jur ni le pot da. Cu mâna prindem toate lucrurile, ne servim de ea după trebuință; cu ea pipăim. Din toate acestea se poate vedea ce mare importanță are mâna și cât de mult trebuie s'o îngrijim, ca s'o avem întotdeauna în bună stare. — *Boalele mânilor* sunt multe, mai ales că ele sunt foarte expuse la înțepături și lovituri, precum și la frecături și zgârieturi, cari sunt tot atâtea prilejuri de infecțiune. Din această cauză *inflamațiunile* degetelor și mânilor se văd așa de des. La degete avem mai cu seamă boala cunoscută sub numele de *sugiu* (panarițiu), care este foarte dureros și de multe ori are urmări rele. *Furunculele* sau *furunculele* se văd iarăși foarte des. Inflamațiunile mâinii propriu zise se termină cele mai adeseori prin *abcese*, cari nu sunt așa de grave când ele ocupă dosul mâinii; nu tot astfel este cu acelea ce se ivesc în palmă, cari sunt foarte dureroase, mai ales când sunt adânci; mâna și degetele se umflă foarte tare, inflamațiunea se poate întinde la pumn și chiar la antebraț, dând naștere la *scurte* (adenite în subțiori); uneori inflamațiunea poate sfârși prin *gangrenă*. Pentru a preîntâmpina toate acestea, pentru a micșora durerile și pentru a opri facerea de puroiu trebuie ca îndată ce se ivesc primele semne de inflamațiune să ținem mâna în odihnă completă, s'o punem într'un colțar legat pe după gât, dând mâinii o po-



Fig. 245.-Mână cu 7 degete

Fig. 246. Sindactilie



gână. Pentru a preîntâmpina toate acestea, pentru a micșora durerile și pentru a opri facerea de puroiu trebuie ca îndată ce se ivesc primele semne de inflamațiune să ținem mâna în odihnă completă, s'o punem într'un colțar legat pe după gât, dând mâinii o po-

zițiune bună, ținând-o mai ridicată decât cotul; apoi se vor face băi locale de mai multe ori pe zi, de câte 15—30 minute punând mâna în apă caldă simplă, sau în apă în care s'a fiert rădăcină de nalbă mare, de flori de nalbă mică, de teiu, de soc, etc. Intre băi se vor aplica pe mână cataplasme de făină de în sau de feculă de cartofi, cu cari vom înveli mâna de toate părțile, stropind cataplasmele cu laudan (1 linguriță pentru o cataplazmă) și schimbându-le la fiecare ceas, sau mai bine aplicând un pansament umed. (Prisnitz), cârpe înmuiate în soluțiune de sublimat corosiv, de acid fenic, de acid boric, etc., și stoarse bine, apoi pe deasupra lor punând o gutapercă și fașe. În orice caz însă este bine ca bolnavul din vreme să se arate la un doctor, care în-



Fig. 247.—Mână văzută la roentgen

dată ce va vedea că mâna a copt, adecă are puroi, va face o tăietură și va deșerta puroiul făcând un pansament potrivit. Nu este bine să lăsăm ca mâna să spargă singură, căci se face prea mult puroi, care se întinde în toate părțile și poate ataca și oasele, apoi mâna după vindecare va rămâne țeapănă și sgârcită așa că nu va mai putea fi de nici un folos. — Muncitorii câmpului, cari sapă mult și din greu, fac adeseori *beșiciși bătă-turi* în palme (vezi *Bătă-turi* și *Flic-tene*), cari se pot inflama și să dea naștere la abcese. Afară de acestea, mâna este supusă la *înțepături*, la *tăieturi*, cari fiind făcute cu un cuțit sau instrument murdar sau infectat, pot da naștere la inflamațiuni foarte grave, după cum am arătat mai sus, pentru aceasta orice rănire făcută la mână, oricât de ușoară ar fi ea, trebuie spălată îndată cu o soluțiune antiseptică de acid fenic, sau de sublimat coroziv, etc., și legată bine și regulat în fiecare zi până la vindecare. Mai grave însă decât toate sunt rănirile produse prin *spargerea unci puști* în

mână, sau ori care armă de foc, sau prin apucarea mâinii sau a unei părți din ea într'o *mașină* oarecare, într'un fereastrău sau o roată dințată, sau prin spargerea unei sticle și pătrunderea bucăților în carne, etc. În toate aceste cazuri pot rezulta stricăciuni mai mult sau mai puțin mari: strivirea părților moi, ruptura și sdrobirea oaselor, ruperea arterelor și vânelor, ruperea nervilor și a tendoanelor, stricăciuni cari pot aduce pierderea totală a unui deget, a mai multor degete sau chiar a mâinii întregi. — Mânile mai sunt expuse la fel de fel de *arsuri*, cari trebuie și ele bine îngrijite și când sunt arse toate degetele, trebuiesc pansate separat fiecare deget, iar nu împreună ca să nu se lipească între ele și să nu se lipească de palmă când și aceasta este arsă. — În urma unor boale nervoase (isteria, etc.) mâna poate să ia forme ciudate, atitudini vițioase și permanente, cari se vindecă cu multă greutate și de multe ori rămân așa pentru toată viața.

Mâna jidovului. — V. *Smeură*.

Mănătărei. — V. *Ciuperca*.

Mâncă. — V. *Doică*.

Mâncare, mâncări. — V. *Alimente și Mese*.

Mâncări crude. — V. *Crude* (Mâncări)

Mâncărime, prurit. — Un fel de simțire deosebită care se aseamănă cu gâdilatul și care se arată pe piele și nesilește să ne scărpinăm. Rănila și plăgile cari merg spre bine produc mâncărime, ceea ce este un semn că ele se vindecă. Mâncărimea sau pruritul poate fi de mai multe feluri: *generalizat*, adecă pe tot corpul, cum se întâmplă la bătrâni, prurit *senil*, la cei ce sufer de *artrism*, *albuminurie*, *diabet*; — *localizat*, adecă mărginit numai la o parte a corpului: prurit *genital* mărginit la organele genitale, adecă la scrot, perineu, la vârful membrului viril (la bărbați) și atunci de multe ori este un semn al diabetului, sau la buzele mari (la femei) și atunci poate fi produs de leucoree (poală albă); prurit *anal* (la șezut), cum se întâmplă la trânji, gută, diabet, prurit *nazal* (la nări) cum se vede în artrism. Mâncărimea însoțește multe boale de piele: eczema, blânda, etc. sau râia. În cele mai multe cazuri însă omul

are mâncărime de piele fără să se vadă ceva pe ea, cum se întâmplă la bătrâni, diabetici, artritici, etc. Mâncărimea variază foarte mult: ea poate fi ușoară și trecătoare, sau tare și tenace, mai ales seara și în timpul nopții, împiedecând bolnavul să doarmă și silindu-l să se scarpine până ce dă sângele. — *Tratament.* Pentru a liniști mâncărimea se recomandă să se facă mai de mult ori pe zi spălături cu spirt simplu sau camforat amestecat cu multă apă (1 parte la 3 părți), cu lapte de migdale curat, sau amestecat cu pucioasă, băi calde de tărâțe, de scroveală, băi alcaline. Printre spălături sau băi se pun pe piele diferite prafuri: talc, bismut. Se mai poate unge pielea cu o soluțiune de gelatină în apă, care liniștește mâncărimea repede (blândă) bube dulci, sau cu albuș de ou bătut cu care se unge partea bolnavă cu degetul, lăsându-l să se usuce și să formeze un strat subțire, sau cu vaselină boricată mai ales când pielea este întinsă ca în brâncă (erizipel) sau cu colodiu. Se mai întrebuințează soluțiuni de cloral idrat, de sublimat coroziv. *Regim:* să nu se ia băuturi alcoolice, nici cafea, nici ceaiu, să nu se mănânce raci sau alte crustacee, nici vânat, nici mezeluri, nici pește; este foarte bun laptele. *Tratament intern* general: alcaline, arsenic, valeriană salicilat de sodă. Se va da purgativ, benzonaftol, câte 2 gr., pe zi, regim lactat absolut. Pentru *mâncărimea care o au femeile* la intrarea organelor genitale se recomandă băile de tărâțe, spălături cu sublimat coroziv și aplicațiuni de vată înmuiată în sublimat.

Mangal. — V. *Incălzit.*

Mangalia. — Stațiune climaterică și balneară lângă Marea Neagră în Dobrogea. În partea sud-vestică este lacul Mangalia, la o depărtare de un kilometru de oraș, a cărui lungime este de 9 Km. și care este despărțit de mare de o limbă de pământ lată de 15 metri. Lângă oraș, sunt izvoarele mezotermale sulfuroase alcaline, clorosodice-iodurate. Orașelul Mangalia este la depărtare de 5 ore de Constanța; el a fost întemeiat de Argonauți, iar acum 2—300 de ani Genovezii făceau comerț mare cu orientul, pentru care au făcut acolo un port pe o întindere

mai mare de un Km., care a fost stricat în răzbiul dela 1825—27. În Mangalia și azi se mai admiră numeroase ruine din lucruri de artă, vechi.

Manganate. — V. *Manganee.*

Manganee. — Sunt mai multe varietăți de preparațiuni cari conțin manganee: *carbonatul*, *iodurul* și *peroxidul* de manganee, cari se întrebuințează ca tonice (întăritoare) în locul fierului, în doză de 10—50 ctgr. *Parmanganatul de potasă*, foarte bun dezinfecant, antiseptic, întrebuințat pe dinăuntru în doză de 10—20 ctgr., pentru 1000 de apă, iar pe dinafară în loțiuni, injecțiuni, în soluțiune de 1 la 500 sau 1 la 1000.

Manie (lat. și grec. *mania*, furie), *toană.* — În medicină se înțelege prin cuvântul manie un fel de nebunie care constă într-o idee falsă, singură și unică, sau cel puțin predominantă: mania de a fura, de a da foc, de a bea, de a omorî, de sinucidere, de persecuțiune, etc., toate aceste manii se mai numesc și *monomanii*, sau *delir parțial* (vezi *Alienațiune mentală* și *Delir*). Când se zice numai cuvântul *manie*, fără nici o specificare, medicii alieniști înțeleg o formă specială de nebunie care se deosebește de celelalte forme de alienațiune mentală prin starea de exaltațiune generală a ideilor, a sentimentelor și a actelor, care formează simptomul său principal. Astfel mania se manifestă prin dezordinea facultăților intelectuale, prin zarva ideilor și a sentimentelor, prin agitațiune continuă fără ca să ajungă însă până la furie; exaltațiunea este generală, în loc să aibă ca punct de plecare o idee singuratică, cum este în monomanie; cele mai adeseori gândurile sunt vesele, fizionomia are o înfățișare tâmpită dar veselă, în același timp, iar nu întunecată sau sălbăteacă; aceasta este o stare cu totul contrarie, de aceea care se vede în *melancolie*.

Manufăr. — V. *Nufăr.*

Mănuși. — Întrebuințarea mănușilor are de scop de a apăra mâinile de degerături în timpurile reci, de crăpături, de necurățenie, de infecțiuni și de alte accidente neplăcute și uneori chiar dureroase. În timpul verii și în toate locurile unde este cald se vor purta

MĂR

MARE

mănuși de ață de mătăasă și de piele; iarna se vor purta mănuși împletite de lână (tricotate), sau de piele căptușite cu lână, sau cu blană. Nu este bine ca mănușile să fie strâmte, ca să nu strângă mâna prea tare și să împiedice astfel circulația sângelui; astfel pe timpurile reci ne-ar expune și mai mult la frig.

Măr (*Pirus molus*, fam. rozaceelor). — Arbore fructifer prețios, originar din Caucas și Altai, care se cultivă mult pe la noi pentru fructele sale gustoase. Merele se împart în două feluri: *mere acre* (coricove, mere de vin, mere pădurețe), cari servesc la prepararea mustului, sau vinului de mere (vezi *Cidru*) și cari nu se pot mânca, *mere dulci* sau *comestibile*, din cari prin cultură s'au obținut varietăți și subvarietăți numeroase. Merele se mănâncă crude, coapte, în compoturi, în dulceturi; ele sunt bune, răcoritoare, gustoase și se mistuie ușor. Merele nu sunt așa de dulci și sunt ceva mai acide decât perele din care pricină ele produc la unii *acrimi de stomac*; și acestora li se recomandă să mănânce merele numai coapte, sau mai bine în compoturi, în cari, din pricina zahărului, sunt mai puțin acre. La țară se dau merele dulci coapte pentru *tusă*, iar merele pădurețe se fierb, zeama lor se îngroașe cu țărățe de grâu, se întinde pe o cârpă și se pune pe pânțele la cei ce sufăr. Bubele *dulci* și bubele de *cel-perit* se oblojesc cu fiertură (decoct) de crenguțe de măr dulce.

Mărăcine. — V. Țapă.

Mărar (*Anethum graveolens*, fam. umbeliferelor). — Plantă erbacee aromatică; originară din regiunea mediterană, cultivată pentru trebuințele bucătăriei. Planta întreagă, mai ales frunzele și fructele se întrebuințează ca aromatice; babele dau ceaiul de mărar amestecat cu sulfina pentru guturai cu tusă; sămânța pisată o dau la copii pentru limbrici. În medicină se întrebuințează fructele, frunzele, vârfurile; proprietăți: stimulent, stomachic. Se dă: ulei esențial 25 ctgr. până la 1 gr. în poțiune; praf 1—2 gr. în ceaiu; pe dinafară: spălături și cataplasme.

Mărăraș, chimion de apă, măraru

bălților, petrunjelul broaștelor (*Oenanthe phellandrium* sau *Phellandrium aquatica*, fam. umbeliferelor). — Plantă erbacee de apă care crește prin mlăștini, bălți sau lacuri (Iunie—August). În medicină se întrebuințează fructul care lucrează ca narcotic, diuretic, febrifug. Se dă sub formă de praf,



1—3 gr.

Mare (lat. mare).

Fig. 248. — Mărăraș (chimion)

— Suprafața pământului este acoperită de apă pe o întindere de trei pătrimi. Apa de mare conține, pentru 1000 părți de apă dulce, cam 26 gr. de clorur de sodium (sare), 5 gr. de sulfat de magnezie (sare amară, care-i dă gustul amar), de clorur de magnezie, de carbonat de calce și o slabă cantitate de compuși fieruginoși, bromurați și iodurați. Cantitatea totală de săruri este cam de 35 gr. Serviciile igienice pe cari ni-le dă marea nu sunt numai acelea date prin apa și băile sale, ci și acele date prin aerul său. — Este de netăgăduit că *aerul de mare* are o influență binefăcătoare asupra sănătății noastre, nu atât prin compozițiunea sa chimică, care nu prea se deosebește de aceea a *aerului atmosferic* ci mai mult prin faptul că el nu este stricat prin diferitele emanațiuni ale omului, ale animalelor, ale fabricelor, etc. Aerul de mare este curat, fără microbi, fără miazme, ceea ce îl face să fie bun pentru sănătate, tonic și întăritor cuprinzând particule de sare și ozon are o acțiune favorabilă asupra respirațiunii și a digestiunii, să țină circulația și mărește apetitul, fiind foarte bun pentru copiii scrofuloși, rachitici, infirmi, pentru persoanele anemice și obosite. — *Apa de mare* fiind sărată nu se poate bea decât după ce a fost distilată (vezi *Apă*). Bogăția în sare a apei, temperatura ei aproape constantă de 18—25°, precum și loviturile continue ale valurilor fac ca *băile de mare* să lucreze asupra corpului omenesc în mod tonic (întăritor) și excitant. Intrând în apă primul efect pe care îl simte omul este o impresiune de frig.

abia simțită de cei sănătoși și viguroși, dar care poate merge până la sufocațiune la cei slabi și bolnăvicioși. După această simțire de frig omul se simte bine și mulțumit; în primele zile simțim un fel de moleșală și durere de cap, până ne obișnuim. Pentru ca băile de mare să fie de folos trebuie observate oarecari *reguli*. Trebuie să avem un costum special pentru băi, care să fie de preferință de lână și destul de larg pentru ca să nu ne împiedice mișcările și pentru ca să-l putem desbrăca cu ușurință la eșire. Femeile își vor acoperi capul cu căciuliță de cauciuc, sau de pânză cerată, pentru ca să nu-și ude părul. Când soarele este arzător este bine ca bărbații și femeile să-și acopere capul cu o pălărie de paie. Cele mai potrivite ceasuri de baie sunt dela 10 până la 12 și dela 3 până la 5 ceasuri după amiază, nu îndată după mâncare. Baia va dura dela 5 până la 10 minute, când o facem pentru întărire, când o facem pentru calmare ea va dura 20 minute. În țările călduroase, tropicale, ea va putea dura o jumătate de oră și chiar o oră. Să nu stăm în baie după ce am simțit un fior, căci este primejdios să ne apuce fiorul al doilea în apă. Ajungând într-o stațiune de mare este bine să nu ne începem băile decât după 3 zile, pentru ca să ne obișnuim mai întâi cu aerul de mare; în acel timp se pot face băi calde de apă de mare. În timpul băii trebuie să ne mișcăm într'una, să înnotăm, sau să ne jucăm sărind, aplicându-ne și ridicându-ne alternativ. Copiii trebuiesc obișnuiți încetul cu încetul cu marea stând puțin în apă și fiind în continuă mișcare. La eșirea din apă omul se va înveli într'un halat de lână, apoi intrând în cabină se va desbrăca repede de costumul de baie și după ce s'a șters bine se va îmbrăca repede, apoi se va plimba. Cu aceste precauțiuni baia de mare întrebuințată din punct de vedere *igienic*, pentru a stimula și întări organismul, este bună pentru oricare persoană sănătoasă și este cu mult mai bună decât baia rece de râu (gârlă), de apă curgătoare. Ca mijloc de *tratament* baia de mare se recomandă mai cu seamă la copiii limfatici sau scrofuloși, sau numai

slabi de constituțiune, la fetele și femeile tinere, cari sufăr de cloroză, sau cloroanemie, la oamenii adulți slăbiți de muncă excesivă, de griji, de plăceri, sau de vreo boală anterioară. Baia de mare *nu este bună* pentru cei nervoși, iritabili; pentru cei atinși de boale de plămâni, de boalele de inimă, de anevrism; pentru bătrâni și copii mai mici de 7 ani. Să vedem acum cari sunt *accidentele* produse de baia de mare. Nu este bine să stăm prea mult timp în apă, căci putem să răcim, să căpătăm *crampe* (sgarciuri) și *leșin* (sincopă); alteori băile de mare produc *durere de cap* sau *turburări digestive* (diaree, vărsături), ceea ce se poate evita dacă la început vom face băi foarte scurte. La femei se mai pot ivi și turburări la *regule* (period), cari pot să vie prea iute, sau să întârzie sau să nu vină de loc; aceste turburări sunt trecătoare. — Apa de mare se mai poate întrebuința sub formă de *duș*, când avem trebuință de a face idroterapie, producând o excitațiune mai mare a pielii, o roșeață mai pronunțată și o revenire a căldurii mai grabnică și mai ușoară decât apa dulce; după duș pielea este mai impresionabilă la aerul exterior. În aceste condițiuni dușurile cu apă de mare sunt mai bine suportate și mai mult timp (5 minute) decât cele cu apă dulce. *Băile calde* cu apă de mare sunt cu atât mai excitante cu cât temperatura este mai ridicată, așa că durata lor trebuie să fie scurtată după numărul gradelor: la 35° va fi de 20 minute; iar la 33° de 30 minute. Pe malul mării se fac *sanatorii* unde se tratează cu deosebit succes copiii atinși de anemie, de scrofule, de oftică de oase și de încheieturi, de rachitism; pentru a obține bune rezultate în aceste sanatorii este trebuință de o ședere prelungită și neîntreruptă (1—3) ani), de a merge la mare îndată ce s'a ivit boala. Și la noi sunt câteva sanatorii pe litoralul mării, unde sunt îngrijiți acești bolnavi.

Mare (Boală, sau rău de). — V. *Răul de Mare*.

Maretină. — Este un derivat al metilacetatinidei care se prezintă sub formă de cristale albe, fără gust, insolubile în apă rece, topindu-se foarte

ușor în apă caldă și alcool. Urina se colorează galben sub influența ei și reduce licoarea lui Fehling. Lucrează ca antipiretic (taie căldura) producând nădușeală (sudoare), fără să aibă acțiune asupra sângelui. Se dă 25—50 ctgr. în buline.

Margarină. — Este un fel de unt artificial, care se scoate din grăsimea de vacă și care se întrebuințează la gătirea bucatelor. Margarina este mai ieftină decât untul natural și poate fi întrebuințată în cantitate mai mică fiindcă ea reține mai puțină apă și se râncezește mai încet, dar ea nu are gust așa de bun. Astăzi margarina se falsifică mult. Untul se topește la 36° și margarina la 27°.

Mărgăritărel, cerceuși, clopoșele, gorgițe, lăcrămioare, sufletele (*Convallaria maialis*, fam. liliaceelor). — Plantă mică erbacee care crește prin pădurile umbroase, adeseori cultivată pentru florile sale frumoase mirositoare. Se întrebuințează fructele și rădăcinile, conținând ca principiu activ: *convallamarina*, solubilă în alcool și apă, *convallarina*, amară, cristalină, aproape insolubilă în apă. Lucrează ca tonic cardiac și se dă în cazurile de bătăi neregulate ale inimii. Se dă sub formă de infuziune (ceaiu), 10—20 la 1000 (provoacă turburări digestive); pulbere 2—10 gr. în buline; extract apos 1—4 gr. în pilule; extract fluid 2—5 gr.; tinctură 10—30 picături. *Convallamarina* se dă 5—10 ctgr. în hapiuri, buline, soluțiune alcoolizată. — La țară se tămăduiește poala albă cu ceaiu de mărgăritărel; cu el se fac băi la copii anemici și slabi; cu floarea se prepară o apă pentru obraz, cu care dacă se spală cineva se face alb ca laptele.

Mărgăritărel, acrum, mughet, plesniță. — Este o boală de gură (*stomatită*) produsă de un fel de ciupercă numită *oldium albicans*, *saccharomices albicans*, sau *syringospora Robinii*. Această boală bine cunoscută în popor se arată mai ales la copiii slabi, rău hrăniți sau hrăniți cu biberonul; câte odată la oamenii adulți slăbiți de diferite boale, cancer, oftică, la bătrânii slabi sau atinși de infecțiunea urinoasă; uneori în boalele acute (pneumonie, febră tifoidă, cistită). Ea este contagioasă între indivizii slăbiți. — La în-

ceputul boalei gura pe dinăuntru este roșie, caldă și uscată, ceea ce provoacă o sete vie: puțină febră, neliniște, poftă de mâncare mică. Apoi se ivesc în diferite locuri, înapoia buzelor, pe vârful limbii, pe cerul gurii, pe căptușeala obrazilor, mici bubulițe albe, cari se înmulțesc, se împreună mai multe la un loc și formează niște plăci (pete) subțiri și neregulate. Aceste pete seamănă cu chiagul de lapte. Când aceste plăci sunt puțin numeroase și nu se întind, boala nu este gravă și trece ușor, căci ele se deslipesesc, se reproduc de câteva ori și după vreo două săptămâni încetează de a se mai face, iar inflamațiunea a dispărut. Nu tot așa se întâmplă când plăcile sunt foarte numeroase, căci atunci un strat gros și smântănos acopere toată gura și se îngroașe din ce în ce mai mult, apoi acest strat se îngălbenesc și se întinde la gât și poate merge până la esofag, stomac și măte. În acest caz bolnavul nu mai poate mânca, slăbește și moare de inaniție. — Când mărgăritărelul nu ține de o stare generală rea el se vindecă ușor și repede. Nu tot așa se întâmplă când el se arată la copiii slabi (atrepsici), aflați în condițiuni rele igienice, atinși deja de vârsături și diaree, sau când se arată la adulții atinși de vreo boală gravă (febra tifoidă, oftică, diabet, cancer), sau la bătrâni în cursul acestor boale, atunci mughetul este un semn rău, este înștiințarea morții. — *Tratament.* Pentru a preveni ivirea acestei boale la copii, trebuie să fie ținuti curați și bine hrăniți; dacă se alăptează cu biberonul acesta trebuie spălat și curățit foarte bine, ori de câte ori ne servim de el. Odată boala ivită vom atinge părțile bolnave de 5—6 ori pe zi cu un pumătuf înmuiat în miere de trandafiri (mel rosat) 30 gr., borax 4 gr.; sau în sirop de mure 20 gr., borax 4 gr.; sau în glicerină 30 gr., bicarbonat de sodă 5 gr.; sau în apă distilată 60 gr.; sulfat de zinc 2 gr.; sau în apă distilată 100 gr., clorur de zinc 1 gr.; sau se vor face atingeri cu sublimat corosiv (1 la 1000). Nu se va da nici o băutură acidulată, cum sunt limonada, siropul de coacăze, de smeură, nici zeamă de lămâie, nici lucruri dulci, miere sau sirop. — La

țară babele dau pentru acrum sânge de nouă frați, țipirig, și zahăr de ghiată, toate pisate la un loc, în părți egale, din cari se suflă câte puțin în gâtul bolnavului; se mai tratează cu rută și cu sâneală.

Marienbad (Germania). — Oraș mic situat la o înălțime de 644 metri cu ape reci (7.5—11.5 grade), bogate în acid carbonic, puțin fieruginoase, de compozițiune variabilă, bicarbonatate-calcice magneziene, clorurate-sulfaratesodice, bicarbonatate mixte cu predominarea unora sau altora din aceste grupări. Se mai află *nomol mineral* sulfat-alkalin-teros-fieruginos. Apele se întrebuințează sub formă de băutură, de băi, de duș; nomolul sub formă de băi. Acțiune: tonică, reconstituantă, laxativă, diuretică, înlesnind secrețiunea bilei și provocând regulele. Se recomandă în obezitate (grăsime), în boalele cronice ale tubului digestiv și anexelor sale (mai ales când ficatul este umflat), în cloroanemie, în turburările regulelor, în reumatism și în nevralgiile rebele.

Marila. — Stațiune climaterică în Banat, aproape de Oravița. Clima e dulce, nu sunt vânturi, în cât e foarte potrivită pentru tuberculoși. Imprejurimile sunt bogate, așa că se găsește o alimentație bună și variată. Are și o bună instalație de hidroterapie. Se recomandă anemicilor, convalescenților tuberculoșilor.

Măritiș. — V. Căsătorie.

Marmeladă. — V. Peltea.

Marole, *maroli*, *marule*. — V. Lăptuci.

Mărul lui Adam. — V. Laringe.

Măruntae. — V. Intestine.

Masaj (gr. *massein*, a frământa), *tras trăsături*. — Masajul, făcut cu mâna, sau cu vreun instrument, constituie astăzi unul din mijloacele des întrebuințate în medicină, ca tratament ajutător într'o mulțime de boale. Masajul este o operațiune care constă în a freca, trage și frământa cu mâinile o parte sau întreg corpul, cu scopul de a iuți circulațiunea sângelui sau a desmorti nervii din acea parte. Masajul făcut cu mâinile se numește *manual*, spre a să deosebi de cel făcut cu diferite instrumente, sau aparate, numit masaj *instrumental*. În timpurile mai vechi masajul se practica mai mult

în popor, la țară, de către anume femei pricepute și numai de puțin timp el a fost primit în știință, studiat cu băgare de seamă și sistematizat pentru diferite boale de mușchi, de încheieturi, în cazurile de fracturi ale oaselor, precum și în unele boale de pânțece, de nervi. Pentru ca cineva să poată face un masaj cum trebuie, *sistematic*, se cere ca să aibă oarecari cunoștințe de anatomie și de fiziologie, să cunoască omul cel puțin pe deasupra. Masajul trebuie făcut încet, domol, cu ușurință, numai odată pe zi în timp de 5—10 minute și nici odată mai mult de 30 zile. Cel ce face masajul, *masorul*, trebuie să aibă libere mișcările mâinilor și brațelor. Va spăla mâinile cu săpun și apă caldă, având unghiile întotdeauna tăiate și curate. Este bine să spele cu săpun și apă partea pe care va face masajul și dacă ea este păroasă s'o radă, pentru ca să nu se irite pielea prin frecături, dând naștere la inflamații foliculare, sau la furnicele. Locul se va unge cu unt-de-lemn, ulei de migdale, sau cu vaselină, ori se va presăra cu praf de talc, în lipsă cu făină; toate acestea pentru ca mâna celui ce face trăsăturile să alunece cu înlesnire. — Practica masajului cuprinde mai multe operațiuni, cari se deosebesc prin forma, prin durata și prin forța lor. Aceste operațiuni sunt:

1. *Frecăturile* sau *fricțiunile superficiale*, cari se fac plimbând palma mâinii încetșor pe partea bolnavă, în direcțiunea circulațiunii sângelui venos, adică mergând dela periferie spre centru, sau de jos în sus, pentru ca vinele și vasele limfatice ale pielii să se poată deșerta. După cinci minute de frecare ușoară partea bolnavă nu mai este așa de simțitoare și fricțiunile se pot face mai tare, mai cu putere, încă alte cinci minute. Fricțiunile acestea se pot face în unele cazuri numai cu vârfurile degetelor mari, sau ale tuturor degetelor.
2. *Frecăturile* sau *fricțiunile prin apăsare* se fac apăsând locul bolnav. Aceste fricțiuni prin apăsare se fac în lungul membrilor, sau în lungul spetelor și ele lucrează asupra părților adânci. Ele se fac cu podul mâinii când bolnavul este bogat în mușchi, cărnos, și când se fac pe suprafețe mari, cum ar fi la brațe, coapse sau gambe; cu

pulpa degetelor mari când voim să pătrundem printre tendoanele mușchilor, sau să apăsăm pe drumul unui nerv; cu vârful degetelor când sunt puțini mușchi și multe tendoane (vine) cum este și la pumni și la glezne. Aceste frecături prin apăsare se fac în totdeauna de jos în sus pentru a împăștia revărsările de sânge și alte lichide bolnăvicioase din țesuturile adânci, în vine și în vasele limfatice. Apăsarea se mai poate face și cu pumnii strânși (*trăsătură de pieptene*) și care este bună pentru stomac și măte. 3. *Frământarea* este un fel de masaj în care se apucă cu mâna părțile cărnoase și se frământă; alteori se *pișcă* mușchii cu degetele. Frământarea se face mai cu seamă pe părțile cărnoase, cum sunt ceafa, brațele, fesele și coapsele. Ea se mai poate face apucând cărnurile între degetul mare și celelalte degete strângându-le și ridicându-le în sus, sau apucând cu amândouă degetele cele mari, fiecare tendon muscular și frământându-l potrivit, pentru ca să se risipească unele revărsări în țesături sau articulații. Frământarea se recomandă în umflăturile ganglionilor (ghindurilor), în boalele de încheieturi și în durerile de mușchi. 4. *Tocarea mușchilor* se face cu mâinile întinse și cu marginile dinăuntru ale lor dealungul unui membru sau al corpului. Tocarea se face pe locurile cărnoase și pe spate cu destulă putere până ce pielea se înroșește; ea este bună în durerile nevralgice ale pielei și mușchilor. 5. *Mișcările active și pasive* ale încheieturilor slăbite, sau înțepenite, se fac de obicei în reumatismele învechite, sau în aprinderile (inflamațiunile) cronice. Când aceste mișcări se fac de către însuși bolnavul, după povața doctorului se numesc *active*, iar când le face însuși doctorul, sau masorul, se numesc *pasive*. Ele constau în mișcări de îndoire și de întindere ale articulațiunilor bolnave; mișcările se pot face și în *lături*, adică în dreapta și în stânga, pentru ca încheietura să-și capete pe deplin toate mișcările. — Aceste feluri de masaj se pot face fiecare în parte, sau reunite între ele, după trebuință; se poate începe cu frecăturile simple, urmate de cele cu apăsare și să sfârșească că frământarea și chiar cu mișcările

active ori pasive. Uneori după frecare se face tocarea sau bătaia mușchilor după cum cere boala. — *Boalele* în cari se recomandă masajul sunt multe: *reumatismul* învechit, durerea de șale (*lumbago*), durerea mușchilor gâtului precum și în *torticolis* (gât strâmb). În aceste cazuri este bine ca după masaj bolnavul să facă mișcări din cap aplecându-se înainte, înapoi și în lături. În durerile de mușchi dela mâni și dela picioare sunt foarte bune frecăturile și apăsările metodice. În *atrofia* (topirea) mușchilor prin apăsare, frământare și bătaie se va, readeștepta puterea în firicelele nervoase, se va mări circulația sângelui și prin urmare



Fig. 249. — Masaj

nutrirea mușchilor. Intre boalele de *nervi* avem nevralgia *sciatică*, în care masajul se va începe cu frecături, apoi cu apăsări făcute cu putere de jos în sus asupra nervului, putându-se combina și cu frământarea, cari toate vor amorți durerea. Masajul *general*, adică făcut pe tot corpul, este bun în reumatismele învechite de mușchi și de încheieturi, în *gută*, *noduri articulare*, în *diabet anemie*, *cloroză*. Masajul *instrumental* el se face cu *aparate mecanice* întocmite astfel ca să dea bolnavului mișcări active și pasive de care are trebuință sau pentru a înlocui un masaj manual obositor, prin

aparate speciale de masaj *vibrator*, *trepidațiuni*, etc. Masajul *electric* se face prin ajutorul unor electrozi, cari au forma instrumentelor de masaj prin cari se face să treacă un curent electric, faradic sau sinusoidal. Electrozii sunt înmuiți în apă sărată; unul din ei se ține nemișcat într-o regiune oarecare a corpului, pe câtă vreme celalt se plimbă pe regiunea ce trebuie să fie electrizată și masată în același timp. Prin acest procedeu nu se poate obține decât o singură formă de masaj, anume *fricțiunea*, care este urmată de *contractiunea musculară* la închiderea și



Fig. 250. — Cum se face masajul

deschiderea curentului. Masajul *electric* este bun în boalele mușchilor: *atrofii*, *paralizii*, *lumbago* (durere de șale), sau acolo unde se cere o activare a circulației sângelui: *anemie*, *debilitate* de constituțiune, sau în *constipație*, *lenevie intestinală*, *obezitate*, etc. Masajul *vibrator* se face cu electromotoare de diferite forțe și dimensiuni, prevăzute cu un tub metalic flexibil, la extremitatea căruia se adaptează instrumentul care servește la facerea masajului. După felul instrumentului se pot obține toate formele masajului: circular, fricțiune, vibrațiune, tapotment, etc.

Măsălarită, măsălar, nebunariță, su-nătoare, (*Hyoscyamus niger*, fam. solanaceelor). — Plantă erbacee care crește prin locuri cultivate și necultivate, pe lângă drumuri, pe lângă case, dărâmături, garduri, prin câmpuri și grâne. Această plantă are un miros greu și este foarte veninoasă. Principiul activ al ei este *hiosciamina* și *hioscina*. În medicină se întrebuințează frunzele, rădăcina și semințele. Se dă pe *dinăuntru* sub formă de: alcoolatură 1—4 gr.; extract apos 16—20 ctgr.; extract

alcoolic de semințe, 5—20 ctgr.; ceaiu (infuziune) din 1 la 100; praf (pulbere) 20—50 ctgr.; sirop 20—60 gr.; tinctură eterată 1—4 gr. Pe *dinafară* balsam tranchil; decoct 50 la 1000; ulei de hiosciam; unguent populeu. — Acțiunea măsălaritei este *narcotică* întocmai ca a mătăgunei (beladona). — **Hiosciamina**: 2—10 miligrame din cea lichidă, iar din cea cristalizată numai 0,50—2 miligrame; în granule și în injecțiuni sub piele. — **Hioscina**, sau **scopolamina**: 0,50—3 miligrame, lucrează ca midriatic și ipnotic. — **Otrăvirea** cu măsălarită are ca semne: excitațiune mare, puls plin, fața roșie, amețeli, lipsă de putere în mușchii, pupilele dilatate, vederea dublă, greață, vărsături; în doză mare: aiurare, vorbă fără rost, tâmpeală, nesimțire, comă. **Tratament**: spălarea stomacului și mecamente pentru vărsat: ipeca, apomorfina; — stimulente: alcool, eter, amoniac, căfea tare și caldă, muștare la pulpe, sticle cu apă caldă la picioare, injecțiuni sub piele cu nitrat de pilocarpină, sau 7 gr de tinctură de jaborandi, pe gură sau pe șezut (în clizmă); respirațiune artificială în timp de 2 ore. — **La țară** măsălarită este întrebuințată la durerea de măsă, de unde vine și numele ei. Fiertura caldă de măsălarită se ține în gură la măsă, apoi se varsă și se clătește gura cu apă curată și puțin rachiu; tot pentru durere de măsă se mai fac aburi și fumuri cu semințe și frunze uscate; rădăcina pisată bine, mustoasă, se pune pe măsăua bolnavă. Frunzele se mai pun la abcese și buboae ca să potolească durerile. Cu zeamă de măsălarită fiartă amestecată cu ulei se spală rana produsă de mușcătură de șarpe. Pe unele locuri se fac la copii băi de măsălarită când n'au somn.

Măsele. — V. *Dinți*.

Mașină de cusut. — Dacă cineva lucrează prea mult cu mașina are dureri (crampe) în pulpe și în copase, apoi după câțva timp turburări în organele din partea de jos a pântecelui. Pentru a evita acestea, multe femei au mașini de cusut cari se mișcă cu mâna, dar și acestea dau aproape aceleași neplăceri căci crampele și durerile în loc de a fi în picioare femeia le simte în mâna dreaptă, iar mâna stângă,

lucrând singură la ac, se obosește și ea mai mult. Pentru ca lucrătoarele să nu simtă în așa mare grad aceste neplăceri, vor face exerciții treptat, vor face deci un antrenament.

Măslad. — Fructele otrăvitoare ale unei plante lemnoase, lungă, subțire și agățătoare, numită *Cocculus suberosus* din fam. menispermaceelor, cu flori albe, frunze mari lucitoare. Aceste fructe sunt roșii, rotunjoare, de mărimea unor alune mici; ele conțin o substanță foarte otrăvitoare, numită *Picrotoxină*, în sămburele lor, iar în pericarp conțin un alcaloid: *menispermīna*. Măsladul amestecat cu miez de pâine se întrebuințează pentru a ameiți și a omori peștii. Acești pești sunt primejdioși dacă se mănâncă și prin urmare trebuie oprit acest fel de pescuit.

Maslin, masin, oliv (*Olea europaea*, fam. oleaceelor). — Arbore în totdeauna verde, originar din regiunea mediterană, care se cultivă foarte mult în părțile calde ale pământului. Fructele numite *masline*, sunt comestibile. Din ele se scoate *untdelemnul* care se întrebuințează la mâncare și în medicină. În medicină se întrebuințează afară de untdelemnul și frunzele și coaja maslinului, cari au proprietăți febrifuge (în contra frigurilor). Untdelemnul lucrează ca laxativ, în doză de 30—60 gr. dat pe dinăuntru, sau în clizme. Se mai recomandă în contra pietricelelor de ficat (litiază biliară, colici de ficat), în doză de 100—200 gr. până la 400 gr. — Untdelemnul *sterilizat* se obține spălându-l de mai multe ori cu alcool de 90° până când acesta nu se mai colorează, apoi se separă untdelemnul de alcool, se încălzește la 120° și se filtrează. În colicile de ficat se poate da ca mai lezne de luat untdelemnul *aromatizat* după formula: Untdelemn 150—400 gr., coniac 15 gr., gălbinaș de ou 2, mentol 50 ctgr.; să se bea dimineața în 2 rânduri, la intervale de o jumătate de ceas.

Mastic, sacăz. — Suc rășinos, care se scurge din tăieturile făcute pe trunchiul și ramurile arbustului *Pistacia lentiscus* din fam. terebintaceelor. Sunt două feluri de mastic: în lacrimi și în masă (comun). Masticul este tonic (întăritor), astringent, bun în contra dia-

reei (urdinării) copiilor, în ceaiu. Se dă și în incontinența urinii (când cineva nu poate ține udul). Dentiștii îl întrebuințează în prepararea cimentului pentru plombat dinții și măselele. *Doză*: 2—8 gr. pe zi.

Masticățiune (lat. *masticare*, a mesteca, a rumega, a molfăi), *mestecare*. — Se numește astfel lucrarea de a mesteca, de a sdrobi mâncarea în gură cu ajutorul limbii și a buzelor, cari împing și opresc mâncarea între dinți și măsele, cari o taie, o rup și o sdrobesc. Masticățiunea este întâiul act al digestiunii (mistuirii) și ea pe lângă măcinarea mâncărilor mai are încă o lucrare, aceea de a mări secrețiunea glandelor salivare, a *salivei* (balelor), care este un lichid ce are însușirea de a transforma substanțele amilacee (făinoasele) în zahăr. Afară de aceasta saliva înleznește alunecarea mâncării în fundul gurii.

Mastită (grec. *mastos*, mamelă, *țâtă*, și *itis*, inflamațiune). — Aprinderea mamelor (v. *Sănuri*).

Mastoidă (gr. *mastós*, *țâtă*, și *eidos*, formă). — Ridicătura osului temporal care se simte înapoia urechii se numește *apofiza mastoidă*.

Mastoidită. — Inflamația (aprinde-mastoidi (v. *Ureche*).

Masturbațiune. — V. *Onanism*.

Măsurî și Cântăriri. — Substanțele *lichide* se dau bolnavilor cu lingurițe, linguri, păhare, etc. Pentru aceasta este bine ca să știm fiecare din acestea cât cântărește, câtă greutate care variază dela o substanță la alta. (*Conținutul* unei lingurițe de cafea cântărește 3 gr. când este plină cu alcool de 60° sau cu *uleiu*, 4 gr. cu *apă*, 5 gr. cu *sirop*; o lingură de compot cântărește 9, 12, 16 gr.; o lingură de supă 12, 16, 20 gr. Un pahar de țuică conține 30 gr. de *apă*, un pahar de vin 100 gr. și un pahar de apă conține 160 gr. Pentru substanțele *solide* avem: o apucătură de flori, sau de frunze cântărește 2 gr., un pumn de făină 100 gr. Ca greutate în loc de ponderi ne putem servi de monede.

Maț. — V. *Intestin*.

Mătăcină, măfăcină, măfăciune. — V. *Roiuță*.

Matcă. — V. *Mitră*.

Mațe (Incurcătură de). — V. *Intestin* (*Ocluziune intestinală*).

Materii fecale. — V. *Fecale*.

Maternitate. — *Casă de nașteri*, sau spital special pentru îngrijirea femeilor cari nasc ori au născut și în care le-huzele sunt îngrijite după toate regulele de *asepsie* și *antisepsie* date de știință.

Matico. — Așa se numesc foile arborelui *Piper angustifolium*, din familia piperaceelor, care crește în Bolivia și Peru. Aceste foi au un gust aromatic, amar, cu miros de mentă : au o rezină (*maticină*), tanin, un ulei esențial și un acid cristalin (a. artantic). Lucrează ca astringent, emostatic și în contra blenoragiei. Se dă sub formă de ceaiu din 10 la 1000, uleiului esențial 25 ctgr. până la 1 gr. ; tinctură 4—10 gr. ; extract 5—10 ctgr. în pilule sau sirop. Extern : injecțiuni apă distilată.

Mătrăgună, belladonă, cireașa lupului, doamna-codrului, doamnă-mare, iarba-codrului, împărăteasă, mătrăgiune, nădrăgulă (*Atropa Belladonna*, fam. solanaceelor). — Plantă ierbacee care crește prin păduri, dumbrave și codri, locuri umbroase, dosnice. Planta întreagă și mai cu seamă fructele ei sunt foarte veninoase. Cele mai multe otrăviri se întâmplă la copii, cari sunt amăgiți de frumusețea fructelor ce sunt de mărimea cireșelor sălbatice și de o culoare roșie-închisă, cu un gust dulce ; 3 până la 10 din aceste fructe sunt de ajuns să omoare un copil. Oamenii mari cari le cunosc și le știu puterea se feresc de ele. Principiul activ al mătrăgunii este *atropina*. Proprietăți : *narcotică*, calmează tusa, mai ales tusa măgărească, astma, și diferite dureri, nevralgii, dureri reumatice ; *relaxează sfincterele*, din cari pricină se dă în contra constipației, lărgeste pupila, ca *antinervos* se dă la incontinența urinii la isterie, coree, epilepsie. *Modul de întrebuințare* : praf de rădăcină, 2—10 ctgr. ; praf de frunze 5—20 ctgr. ; sirop 10—20 gr. ; tinctură alcoolică, sau eterată 5—30 picături ; extract apos 2—15 ctgr. ; extract alcoolic de sămânță 1—10 ctgr. — Pe dinăfară : uleiul de belladonă, cât vreoști ; în fricțiuni, pomadă beladonată după voie ; plastore, în supozitoare, 2—5 ctgr de extract. La țară, babele fac cata-

plasme din frunze și le pun pe abcese. Cei ce au friguri după ce o sapă sau o rup, se leagă cu mătrăgună la cap. Dacă cineva are durere de măsele și se umflă tare la fălci (abubă), ia o frunză de mătrăgună, o unge cu unsoare de găscă și o lipește de umflătură ; ea este tot așa de bună și la alte umflături, la *sugel*. Se mai face cu ea de dragoste și de urit, când e pentru *dragoste*, se duce fata în pădure, o rupe cântând și o poartă cu sine ; când e de *urit*, o rupe plângând și o dă flăcăului căruia îi face de urit ca s'o poarte fără să știe. Se mai dă mătrăguna în băutură, când are cineva ne-caz pe un altul ca să-l înnebunească. — *Atropina* este principiul activ, alcaloidul belladonei. Ea este un medicament antispasmodic, antinevralgic, antireumatismal, calmant, lărgeste pupila. Se dă pe *dinăuntru* $\frac{1}{2}$ până la 2 mgr. în băuturi, sirop, pilule, granule. Pe *din afară* : colir 1 gr. la 100 ; în pomadă contra nevralgiilor faciale : atropină 10 ctgr., veratrină 5 ctgr., balsam nerval 15 gr., să se ungă de 3 ori pe zi. *Sulfat de atropină*. Aceleași proprietăți și același mod de întrebuințare ca la atropină. — *Otrăvirea* se face prin fructele mătrăgunii, cari seamănă cu cireșile, după cum am arătat mai sus și cu preparatele de belladonă și de atropină, având următoarele semne : căldură și uscăciune în gură și în gât, sete arzătoare, greutate la înghițit, fața roșie, ochii tulburați și scânteietori, vederea turbure din cauza *lărgirii pupilelor*, cari sunt nesimțitoare la lumină, vedere dublă (diplopie), neastâmpăr mare, aiurare sgomotoasă, apoi moleșală, micșorarea puterii musculare, mersul clătinat și nesigur ; pielea uscată și ueori cu pete roșii ca în scarlatină. *Tratament* : deșertăm stomacul de otrăva care este în el, prin urmare vom face ca bolnavul să verse, dându-i : emetic, ipeca, gâdilindu-i o-mușorul ; se va face spălarea stomacului dacă avem cu ce. Se vor da stimulente : alcool, eter, amoniac, acetat de amoniac. Se dă cafea neagră și ceaiu în cantitate mare și repetată, care neutralizează acțiunea belladonei ; cafeaua și ceaiul să fie foarte calde. Muștare la pulpe, sticle pline cu apă fierbinte la picioare, sau baie generală

cu muștar. Injecțiuni pe sub piele cu pilocarpină, sau ceaiu de jaborandi pe gură, sau în clistire. Respirație artificială, timp de 2 ore, dacă este de trebuință (vezi *Asfixie*). Urina se va scoate cu sonda.

Mătreață. — Un fel de praf alb format din fărâmaturi de epiderm, cari se desfac de pe pielea capului, dela sine, sau prin scărpănare. Mătreața se curăță mai bine cu o perie aspră decât cu un pieptene cu dinții subțiri, care irită pielea capului și înmulțește mătreața. Pentru vindecarea mătreații cetitorul să caute la cuvintele *Păr* și *Pitiriază*.

Mătrice, matrinchină. — V. *Colici*.

Maxilar (dela lat *maxilla*, falcă). — Tot ce ține de falcă se chiamă *maxilar*: oase, artere, vine *maxilare*, nervi *maxilari*. (vezi *Falcă*).

Mazăre *Pisum sativum*, (fam. leguminoaselor). — Plantă erbacee, originară din regiunea mediteraneană, care se cultivă pentru trebuințele bucătăriei. *Mazărea verde* cu păstăile crude și fine este una din cele mai sănătoase legumi; gătită cu zahăr, sau cu sare, sau numai simplă, este foarte bună pentru stomac, pe câtă vreme gătită cu carne și cu grăsime ea este mai grea de mistuit. *Mazărea uscată*, sau boabele de mazăre, sunt mai greu de mistuit, din care cauză se recomandă să se mănânce numai sub formă de *mazără bătută*, curățită de pielețele boabelor, pentru ca să nu producă greutate de stomac și gaze.

Măzărliche. — V. *Viermi intestinali* (*Tenia*).

Mecanoterapie (grec. *mechané*, mașină, și *therapevein*, a îngriji, a vindeca). Se numește astfel tratamentul boalelor cu ajutorul mijloacelor mecanice. La articolul *mesaj* am arătat că sunt 2 feluri de masaj: unul care se face cu mâinile (manual) și altul care se face cu *aparate mecanice*, întocmite astfel ca să dea bolnavului mișcări active și pasive, nlocuind masajul manual care este obositor. Aceste mișcări făcute cu diferite aparate mecanice, cari silesc bolnavul să le execute în anumite doze, potrivit cu boala lui, constituie ceea ce se numește în medicină *mecanoterapie*, sau *mecanica articulară*, care nu este o metodă a parte ci numai o aplicațiune

de aparate mecanice la gimnastica medicală (vezi *Gimnastică* și *Masai*). Aceste aparate mecanice se compun din niște pârgșii gradate, diferit articulate după trebuințe, dealungul cărora se pot fixa contra-greutăți la distanțe variabile eela axa de sprijin. Rezistența pe care trebuie s'o împingă bolnavul variază în proporțiune cu lungimea brațului pârgșiei; munca și cheltuiala de forță pot fi atunci dozate în mod matematic. Direcțiunea pârgșiiilor și modul lor de aplicațiune determină forma mișcării, a cărei întindere este regulată de însăși mișcarea brațului pârgșiei care se poate limita de mai înainte după voință. Bolnavul se așează înaintea mașinii în picioare, șezând sau culcat, după cazuri, așa că mișcările sale să fie localizate în mod riguros în grupul de mușchi sau în încheietura bolnavă. Pentru mișcările active bolnavul pune singur în mișcare aparatul cu o manivelă sau o pedală. Pentru mișcările pasive mașinele sunt puse în mișcare cu ajutorul motoarelor. Diferitele practice de masaj (fricțiuni, frământare, bătaie, vibrațiuni, etc.) sunt produse prin tamponare căptușite, puse în mișcare iarăși prin motoare. În fine, unele mașini vindecă strâmbările (deviațiunile) șirii spinării (vezi *Columină vertebrală*), fie prin atitudinea în aparate de suspensiune, fie prin combinațiunea acestor aparate cu mașini cari provoacă mișcări active (aparate cu frângșii și scripete). Mecanoterapia se recomandă cu bun succes în boalele cronice ale mușchilor, mai cu seamă în anchiloză (înțepenirea articulară), scolioză (strâmbarea șirii spinării), artratism, gută, obezitate.

Meconiu (dela grec. *mekónion*, suc de mac). — Materie viscoasă, neagră verzue, care se adină în intestinul fetului la sfârșitul vieții intra-uterine și care este dată afară în puțin timp după naștere. Uneori meconiul poate fi dat afară și înainte de naștere, când copilul vine cu șezutul înainte. Meconiul se numește astfel fiindcă seamănă la culoare și la consistență cu suc de mac; el este constituit din fiere (bilă) amestecată cu secrețiuni intestinale (epitelii și exudațiuni ale mucoasei). Cantitatea lui variază între 20 și 120 grame.

Medic (lat. *medicus*, dela *mederi*, a îngriji; *doctor*, *doftor*, *dohtor*. — Cel mai însemnat rol în viața socială modernă îl are *medicul*, sau după cum îi zice poporul român de pretutindenea *doftorul*, căci el este chemat să păstreze sănătatea și să vindece boalele semenilor săi. Pentru a putea îndeplini o misiune așa de măreață medicul trebuie să facă studii serioase de *anatomie* și *fiziologie*, adică să cunoască bine *omul sănătos*; să studieze cu deamănuntul *raporturile omului cu mediul*, adică cu tot ceea ce îl înconjură; apoi bine înarmat cu astfel de cunoștințe temeinice să observe și să pătrundă cu mintea toate turburările economiei (organismului), adică să studieze *patologia* (boalele) și în același timp mijloacele proprii pentru vindecare (*terapeutică*), adică *leacurile* sau medicamentele. Imbogățit cu această *serie de cunoștințe*, studentul unei facultăți de medicină obține titlu de *doctor* și dreptul de a practica medicina, adică de a fi *medic*. La noi în țară nu este în obicei ca *advocații* și toți cei cari au titlul academic de doctor să și-l pună înaintea numelui, după cum fac nemții, de pildă, ci uzează de acest titlu numai *doctorii în medicină*. Iată pentru ce noi în această carte, scrisă pe înțelesul și pentru folosul tuturor, ne-am servit întotdeauna cuvântul de doctor în loc de cel de medic și i-am dat chiar numele de *doctorul de casă*. — Am spus la începutul acestui articol că doctorul ocupă în societate un loc cu totul special, ceea ce face ca profesiunea lui să se deosebească cu totul de toate celelalte profesii. Din această pricină atât datoriile cât și drepturile lui sunt regulate în mod juridic prin codul civil. Între medic și client sunt însă și îndatoriri reciproce, neprevăzute de lege, cari trebuiesc luate în seamă de către amândoi în interesul comun. Legea morală și conștiința obligă pe doctor să dea ajutor semenilor săi, în caz de boală, dar nu poate să fie nici o lege care să-l silească la aceasta, sau să-i poruncească să-și subordoneze voința la capriciul ori și cui, căci dreptul de a practica medicina îl are prin diploma sa. pe care a obținut-o cu multe studii costisitoare, lungi și primejdioase. Studentul în medicină este

expus în tot momentul să-și piardă viața prin disecțiile, autopsiile, spitalele, infecțiunile la cari este expus zilnic, fără ca societatea să-i dea vreun ajutor, iar odată ajuns doctor, el intră în lupta vieții cu riscul și pericolele sale. Apoi, trebuie să muncească și să sufere mult, fără nici un alt privilegiu, căci el trebuie să-și îndeplinească datoriile de cetățean, să-și plătească contribuțiunile directe și indirecte, chiria, etc., ca oricare om fără ca societatea să-i dea ceva și fără ca prin lege să aibă vreo scutire. De aceea doctorul este în drept să ceară dela clientul lui să-i dea considerațiunea cuvenită și în același timp deplina sa încredere. Până mai acum câțiva ani cele mai multe familii își aveau *doctorul de casă*, care îngrijea de toți și supraveghia sănătatea copiilor dela naștere până ce erau mari și până ce, la rândul lor, întemeiau și ei alte familii. Și era bine așa, căci pe cât de ușor îi este doctorului și cu câtă siguranță tratează el boalele într-o familie în care cunoștea temperamentul și constituția părinților, precum și pe copii dela începutul existenței lor; în astfel de împrejurări el nu este numai doctorul ci și amicul familiei. Astăzi lucrurile s'au schimbat: fiecare își schimbă doctorul după capriciu. Sfătuim pe cetătorii noștri să nu-și schimbe doctorul fără vreun motiv real; să-și aleagă doctorul în care au mai mare încredere și odată ales să-l păstreze cât se poate mai mult și chiar pentru totdeauna. În fața bolnavului să i-se dea medicului toate lămuririle pe cari le cere, precum și pe acele cari îi pot fi de trebuință, iar bolnavul să fie supus și să se lase a fi examinat pe deplin, urmându-i cu sfințenie toate prescripțiunile, să nu-i ascundă nimic, căci doctorul este ca un *duhovnic* și legea îl obligă să păstreze *secretul*, așa zis *medical*, sau *profesional*, după cum trebuie să facă și preotul. Afară de aceasta doctorul este obligat de morală ca și de lege să țină secretul nu numai despre ceea ce i s'a spus, ci și despre ceea ce a văzut, a auzit sau a înțeles cu prilejul funcțiunii sale medicale. Prin urmare bolnavul trebuie să aibă toată încrederea în doctorul lui, să-i arate totul fiind sigur că aceasta o

face în interesul lui propriu.—Oricare doctor, la sfârșitul boalei, trebuie să-și primească *onorariul* și aceasta chiar și în cazurile nenorocite, când bolnavul s'a pierdut, mai ales că în aceste cazuri el a nunciat mai mult decât în cazurile cu sfârșit bun. În boalele grave medicul are o muncă înzecită și în tot momentul, până și noaptea, este preocupat de clientul lui; câte ceasuri stă el pironit cu ochii în carte, căutând și răscolind toată biblioteca și frământându-și mintea pentru ca să afle ceea ce este bun, ceea ce este în stare să-i scape bolnavul dela moarte! Astfel fiind, atât morala cât și legea obligă pe client să plătească doctorului *onorariul cuvenit*, după *puterea* lui și *în raport* cu munca desfășurată de acesta, ținând seama de situația medicului, de importanța serviciului dat, de timpul petrecut la patul bolnavului, cât și de situația materială a bolnavului. Un doctor este *responsabil* în fața legii de orice neglijență, nebagare de seamă, imprudență, neîndemănare, care ar fi produs moartea bolnavului. Din această cauză profesiunea medicală este cea mai grea, căci oboselile speciale precum și contagiunea fac ca medicii să aibă viața cea mai scurtă și medicii mor, aproape trei părți din patru, mai înainte de cincizeci de ani!

Medicament (lat. *medicamentum*, grec *pharmakon*), *doctorie*, *leac*, *remediu*.—Se numește medicament orice substanță, simplă sau compusă, care se ia pe dinăuntru, sau se aplică pe dinafară pentru a vindeca o boală. După modul de întrebuințare medicamentele se împart în *interne* și *externe* și farmacistul este obligat ca pe cele externe să pună etichetă scrisă pe hârtie roșie ca să nu se facă vreo greșală. Medicamentele se mai împart în *magistrale* și *oficinale*. Cele magistrale se prepară de farmacist în momentul trebuincios, după formula dată de doctor, pe câtă vreme cele oficinale sunt medicamente preparate de mai înainte. Afară de această deosebire trebuie să mai știm că cele dintâiu (pilule, poțiuni, prafuri, etc.) nu se pot lua decât după prescripțiunile medicului și când zice el, căci numai el are dreptul de a prescrie substanțe foarte active sau otrăvicioase,

iar bolnavul și cei ce-l îngrijesc trebuie să fie cu băgare de seamă ca să nu se ia mai mult decât doza prescrisă (vezi *Doză*), pe câtă vreme medicamentele oficinale (siropuri, paste, limonade, etc.) pot fi luate după voe fără nici o primejdie.—Sunt foarte multe medicamente și *modul lor de lucrare* precum și *indicațiunile* sunt foarte variabile, așa că dacă cutare medicament este bun pentru un bolnav de cutare boală, el poate să fie rău pentru un altul, bolnav de aceeași boală, ceea ce provine din pricină că constituția unuia nu se potrivește cu aceea a celui alt, deosebire pe care numai doctorul e în stare s'o cunoască. Prin urmare este foarte greșit acela care va lua un medicament sub cuvânt că cutăru bolnav i-a făcut bine, fără ca mai întâiu să întrebe pe doctor.—*Modul de întrebuințare* a medicamentelor variază foarte mult: unele se dau prin gură, altele prin șezut (clizme), prin fricțiuni (ungeri), inhalățiuni și în injecțiuni sub piele (subcutanate, ipodermice) cu ajutorul unui ac găurit pus în capătul unei tulumbițe (siringă); apoi vine introducerea medicamentelor prin gură și stomac, prin șezut (clizme), prin băi, fricțiuni și ungeri.

Medicină (lat. *medicina*, *ars medica*). Medicina are de scop de a păstra sănătatea și de a vindeca boalele. Ea face în fiecare zi progrese mari, mulțumită mijloacelor cari se pun la îndemâna profesorilor cari o predau și a înleznilor făcute studenților pentru a o învăța. Mai ales în veacul din urmă medicina a ajuns în măsură de a prelungi viața omenească. În antichitate medicina era cât se poate de săracă și ea se exercita mai mult în temple, până la *Ipocrate* (născut în anul 460 înainte de Christos), care a *constituit-o* prin rezultatele observațiunii și experienței sale, scoțând-o de sub jugul speculațiunilor filosofice și punând-o sub acel al *observațiunii*, care examinează, compară și judecă așa încât să se întemeieze o *experiență raționată*. După *Ipocrate* cel mai vestit medic a fost *Galien* (născut la 128 î. d. Ch.), spirit ingenios, care a pătruns cu mintea aproape toate părțile medicinii. În evul mediu medicii se mulțumeau să comenteze autorii vechi, greci și

arabi. În epoca *Renasterii* medicina a devenit anatomică, clinică și experimentală; ea se învață la patul bolnavului, la autopsie și pe animale. Astăzi experimentațiunea a luat o importanță foarte mare și medicina se învață în laboratoare și la patul bolnavului în măsură egală. — Medicina este o *știință* sau o *artă*? Ea nu este numai o știință constituită, ci năzuiește să devie: ea este și artă întru cât are de scop de a face ca cunoștințele câștigate să isbutească la un rezultat practic, fie că aceste cunoștințe provin din știința propriu zisă, fie că ele sunt luate din empirism. Medicina nu va fi o știință decât atunci când va atinge gradul de precizie, de siguranță deplină cum este chimia și fizica, și ceea ce se chiamă artă va fi atunci o știință aplicată. Medicina se împarte în diferite ramuri: *anatomie* și *fiziologie*, *patologie*, *terapeutică*, *igienă*, ea se sprijină pe unele științe zise accesorii, sau complimentare: *botanică*, *chimie*, *fizică*, *zoologie*. Medicina intervine în legile, actele, moravurile, sentimentele noastre și dacă nu trebuie să fie cunoscută în amănuntele ei de oamenii culti, nu-i mai puțin adevărat că ea cuprinde un număr de cunoștințe pe cari toți trebuie să le știe, oricare ar fi profesiunea sau condițiunea lor socială.

Mefitism (lat. *mephitis*, miros respingător) *putoare*. — Stricarea aerului prin prezența gazelor rele pentru respirație, deși neotrăvitoare prin ele însuși, cum este de pildă acidul carbonic, prin prezența aburilor sau gazelor iritante (clor, brom, etc.), prin existența compuşilor otrăvitori (oxid de cărbune, diferite miazme provenite din mlaștini, hazăne, latrine, etc.).

Megalocefalie (gr. *megas*, mare, și *kephale*, cap.). — Mărime anormală a capului, provenită din creșterea de volum a creierului, produsă de proliferarea nevroglii, sau provenită din înmulțirea lichidului encefalian, cum se vede la *idrocefal*.

Megalomanie (gr. *megas*, mare, și *mania*, nebunie). — Mania sau delirul de mărime (vezi *Delir*).

Megalosplenie (gr. *megas*, mare și *splen*, splină). — Creșterea peste măsură a splinei (v. *Paludism*).

Melancolie (grec. *melas*, negru, și *chole* bilă, fiere), *lipemanie*. — În vorba de toate zilele cuvântul melancolie însemnează o stare de lăncezeală, de reverie, de gândire adâncă nelămurită (meditațiune vagă) cu idei de milă, de dragoste. Când zicem despre cineva că este melancolic înțelegem că se află într'o stare de tristețe și de toropeală, iar nici de cum că ar fi nebun. Pentru noi, doctorii, melancolia este o formă de *nebunie*, în care predomină tristețea și frica. Starea de tristețe poate să se întindă la toate facultățile și manifestațiunile intelectuale și atunci avem *melancolia generală*, în care bolnavii sunt într'o stare de abatere, de toropeală completă, calmi și apatici (liniștiți și nepăsători) în așa măsură, încât toate funcțiunile minții sunt nimicite, sau cel puțin suspendate (interupte). Melancolia poate fi numai *parțială*, produsă prin halucinațiuni și iluziuni ale unuiu sau mai multor simțuri, așa că judecata este *dreaptă* pentru lucrurile în cari ea nu este influențată de nici o halucinațiune și *rădăcită* pentru celelalte lucruri. Halucinațiunile se rapoartă uneori numai asupra corpului și atunci avem un grad extrem de *ipocondrie* (*nebunie ipocondriacă*); alte ori senzațiunile bolnăvicioase vin din afară, cum sunt halucinațiunile vederii, ale auzului, cari fac pe bolnav să se creadă victima unor influențe exterioare ascunse (oculte) și misterioase (tainice) pe cari numai el le cunoaște și cari îl chinuesc. Forma aceasta este cea mai grea de cunoscut și de tratat, față de care numai un medic specialist poate să se pronunțe. — **Tratament**. Se va pune bolnavul într'un loc liniștit, departe de sgomot și de mișcare; pentru aceasta este bine să fie dus din locuința lui obișnuită, să fie izolat de toți ai săi; nu este bine să fie dus în călătorie. Bolnavul atins de melancolie subacută, adică în grad mai mic, să fie instalat într'un stabiliment de *idroterapie* cu condițiune însă ca să aibă acolo o viață liniștită și nu să fie dus într'o casă de *nebuni* decât numai dacă este atins de melancolie *agitată*, cu delir, sau cu tampoală. Când starea de melancolie este compatibilă cu o activitate oarecare, trebuie să-i facem o ocupațiune, să-i

dăm de lucru, pentru ca să-l scoatem din gândirile lui triste, să-l punem să se plimbe în aer curat, să muncească în grădină, la câmp, să facă gimnastică moderată și rațională, dar să nu-l lăsăm să se ostenească, muncind prea mult și de multe ori pe zi să-l punem la odihnă, mai ales după mâncare. Vom da o *alimentațiune* (hrănă) *abondentă și substanțială*, dând *stimulente* (ceaiu, cafea, vin în doze mici); vom da *tonice* (chinchină, fier, arsenic, peptone). Dacă bolnavul nu vrea să mănânce vom recurge la hrănirea *forțată* prin mijlocul sondei. Se va combate *constipațiunea* dând laxative, purgative repetate și clizme; apoi dezinfectante intestinale (salol, benzonaftol, betol, etc.). Se va stimula nutrițiunea generală care lăncezește și se va activa circulațiunea pielii prin *idroterapie* (dușuri calde, sau cearșafuri înmuiate și stoarse), sau se vor face fricțiuni uscate, masaj, sau băi cu muștar, electricitate statică sau faradică. Intra *insomniei* se vor da bromurele, cloralul, trionalul, sulfonalul, veronalul, etc., iar pentru a combate orice semn de exaltațiune nervoasă se va da *opiu* sub formă de extract, în pilule sau în săpunase de câte 3—5 ctgr. sau *morfina* în injecțiuni sub piele (de $\frac{1}{2}$ sau un ctgr. una, de 2—3 ori pe zi).

Melanemie (grec. *melas*, negru, și *haima*, sânge). — O stare a sângelui în care el este negru în artere și în capilare întocmai cum este în vine. Se mai înțelege prin numele de melanemie și o stare a pielii în care ea are o culoare care variază dela cenușiu până la galben închis (negriu). Sângele cuprinde între altele niște granule de ematozină, negre, galbene pămâtoase, sau roșii gălbui.

Melanom (gr. *melas*, negru, și terminațiunea *om*, care înseamnă tumoră). — Tumoră sau umflătură neagră a pielii, care este de rea natură și care se mai numește și *cancer melanici*.

Melanurie (gr. *melas*, negru, și *ouros*, urină, ud). — Când udul omului este negru se zice că el are melanurie. Colorațiunea neagră se observă când urina este încărcată cu indigotină sau indican. În otrăvirea cu acid fenic udul de asemenea este negru.

Melenă (gr. *melas*, negru). — Emo-

ragie intestinală; sângele care este negru se deșeartă prin șezut, singur, sau amestecat cu materii fecale, Pentru tratament caută la *Emoragie* și *Ematemeză*.

Membre. — Omul are patru membre: două în partea de sus a corpului, numite membre *superioare* sau *toracice*, cari se unesc cu pieptul sau toracele prin *umeri* și două în partea de jos a trunchiului, numite *inferioare* sau *abdominale*, cari se încheie cu trunchiul prin *șolduri*. Membrele de sus pun pe om în raport cu obiectele din afară, pe cari le ating, le pipăie, le prind, le mută din loc în loc, le duc la gură, etc., iar cele de jos susține greutatea corpului, când omul stă în picioare, și îl transportă dintr'un loc în altul în diferite moduri de mișcare: mers, fugă, etc. Când dintr'o întâmplare oarecare omul își pierde un membru, el poate să-l înlocuiască cu un alt membru *artificial*, construit în așa mod încât el poate să îndeplinească întrucâtva slujba membrului pierdut.

Memorie (lat. *memoria*, grec. *mneme*), *aducere aminte, ținere de minte*. — Memoria este una din facultățile fundamentale ale inteligenței și constă în rechemarea sau repetarea ideilor și a noțiunilor de obiecte, cari deja produse odată sau de mai multe ori, au loc în mod independent de obiectul și de senzațiunea specială care le-a determinat, ca și cum acest obiect ar fi de față. Părțile creierului cari au însușirea de a reproduce astfel de acte de mai înainte îndeplinite nu sunt altele decât acelea cari joacă rolul de centru de percepțiune și de elaborări intelectuale. Memoria este ca și judecata un atribut care aparține în propriu intelectului, însă ea n'are nici *aparat propriu*, nici caracterele unei *funcțiuni*. Acest atribut este puțința de a repeta în absența intervențiunii simțurilor un act al gândirii a cărui îndeplinire a avut deja loc. — Turburările memoriei se văd adeseori în unele boale. Memoria se poate întuneca pentru a nu reveni decât încetul cu încetul în boalele acute susceptibile de a slăbi, sau turbura, facultățile intelectuale, cum este febra tifoidă, etc. (*amnezie*); uneori din contră, memoria câștigă o activitate deosebită și

bolnăvicioasă (ipermnezie), cum se vede mai ales la nebuni. Pierderea memoriei se vede de obicei în boalele de creeri, în neurastenie, în otrăvirile cu alcool și tutun.

Meniantină. — V. *Trifoiste*.

Menière (Boala lui). — V. *Ureche*.

Meninge (grec. *ménigx*, membrană, peliță). — Astfel se numesc cele trei membrane (*duramater*, *arachnoida* și *piamater*), cari învelesc creerii și măduva spinării (v. *Creer*).

Meningită (grec. *meningitis*, dela *ménigx*, membrană, peliță, și terminațiunea *itis*, care însemnează inflamațiune, aprindere), *aprinderea cămășii creerului*. — Meningita constă în aprinderea pelițelor cari învelesc creerul. Se cunosc 3 forme mai obișnuite ale boalei: *simplă*, *tuberculoasă* și *epidemică*. 1. *Meningita simplă*. Această formă se observă mai mult la copii și poate fi produsă de o cădere pe cap, de insolățiune (soare sec), de prezența viermilor intestinali (limbrici), de o boală de urechi, de influență, pneumonie, erizipel, febră tifoidă febre eruptive, (pojar, scarlatină), reumatism, sifilis, abuzul de băuturi alcoolice. Meningita începe în mod brusc și de obicei prin *febră* (căldură), care este precedată de *fiori* (temperatura poate fi de 39—40° și mai mult), apoi se ivește *durerea de cap*, care este foarte mare și constantă (neîntreruptă). Ea se simte mai mult la frunte și este așa de puternică încât bolnavului i-se pare că-i crapă capul. Durerea vine sub formă de svăcnituri, cari silesc bolnavul să țipe și să geamă, rămânând nemișcat în pat, ferindu-se de lumină, nesuferind sgomotul și evitând să răspundă la întrebări. Ochii bolnavului sunt roșii și uneori are dureri în orbite și țiuțuri de urechi. Alt semn al acestei boale este *delirul*, care se arată prin vorbe neînțelese, prin țipete, prin halucinațiuni, prin dorința de a sări din pat. Fălcile sunt încheștate și dinții scrâșnesc, iar bolnavul nu poate să bea și trebuie să-i introducem cu multă greutate băuturile în gură. Bolnavul mai are *vărsături* repetate, *constipație*, *înțepenirea gâtului*, cu *capul dat pe spate*, *strabism*. Aceste semne trebuie să fie unite pentru ca să putem afirma că avem a face cu o *meningită* și se văd

în *perioada întâiu* a boalei, *perioadă* numită de *excitațiune*, care poate să dureze dela 4 până la 15 zile. După aceasta vine *perioada a doua*, zisă de *depresiune* și care durează câteva zile în cari bolnavul cade într'o stare de somnolență, de nepăsare, de toropeală (abatere); febra scade și pulsul bate mai încet decât în stare normală. Pân-tecele este scufundat (scobit) ca o luntre, respirațiunea neregulată, fața când roșie, când palidă; *convulsii* generalizate, sau mărginite la față, *înțepenirea* (contractura) gâtului, a fălcilor. După câteva zile bolnavul intră în *perioada a treia*, zisă *paralitică*, în care membrele sunt ca și paralizate, nu se mai mișcă, nu simțesc; pulsul rămâne mic și rar, iar febra crește din nou, pân-tecele se balonează, bolnavul își pierde cunoștința și moare, cam pe la a 21-a zi, încet, pe nesimțite, sau după ce a avut câteva spasme. Aceasta este forma obișnuită a meningitei simple, dar ea poate dura și mai puțin; uneori bolnavul moare după 5—6 zile dela începutul boalei, alte ori, în forma numită *fulgerătoare*, el poate înceta din viață în 24 de ceasuri, cu febră mare, spazme și durere cumplită de cap. — 2. *Meningita tuberculoasă* este inflamațiunea membranelor creerului (*arachnoida* și *piamater*), în urma prezenței unor *granulațiuni* (grăuncioare) asemănătoare cu acelea cari se văd în plămâni celor atinși de *oftică* și este datorită aceleiași cauze, adică înmulțirii bacilor lui Koch. Adeseori oftica dela plămâni, oase, sau intestine se însoțește de meningită. Această formă de meningită se ivește mai mult la etatea de 2—7 ani, dar se poate ivi și la adulți. În meningita tuberculoasă *perioada* dela început poate dura dela câteva zile până la 2 luni și începe prin tristeță, schimbarea caracterului, slăbire, din când în când accese de friguri, ghinduri (ganglioni) la gât, la subțiori, la stângii, după care apoi încep toate semnele descrise în forma simplă. 3. *Meningita epidemică* se arată sub forma de epidemii și este foarte periculoasă prin modul lesnicios de contaminare. Microbul se găsește în gură, în gât și în nas și se ia dela cel atins de boală prin obiectele cu

care vine în contact. Semnele boalei sunt aceleași ca la celelalte forme de meningită, cu deosebire că boala durează mai puțin, pacientul moare uneori după câteva zile numai. Mortalitatea este mare în această epidemie și contaminarea se face ușor, în cât este foarte periculoasă. — *Tratament*. Bolnavul trebuie scutit de sgomot și de orice cauză de excitațiune; regim *lactat*, beșică cu ghiață pe cap în permanență, se pot da *purgative* (*calomel*, *scamonee*, *tinctură de jalapa*), ori clisme și *iodurul de potasiu*, 2—4 gr. pe zi. În contra căldurii se va da *antipirină*, *chinină*, *piramidon*. În contra agitațiunii, insomniei, a delirului, se recomandă *bromurele*, *cloralul*, *opiul*, *băile calde* (25—30°). O poțiune bună este următoarea: bromur de potasiu 2 gr., iodur de potasiu 1 gr., tinctură de valeriană 20 picături, sirop de coji de portocale 40 gr., apă distilată 100 gr.; se va da la fiecare ceas câte o lingură de compot. În timpul mai nou s'au recomandat *băile calde* de 38—40°, timp de 10—25 minute, pentru delir, febră, durere de cap și contracturi; apoi *puncțiunea lombară*, făcută la 2—5 zile odată și extrăgându-se câte 10—70 gr. lichid cefalorachidian, pentru a micșora hipertensiunea intracraniană. Unii recomandă ca puncțiunea lombară să fie urmată de *injecțiuni* în canalul șirii spinării de *colargol*, *electargol*. Se mai recomandă *injecțiunile cu ser artificial* și mai ales cu *ser antimeningococic*. Când este bănuială că *sifilisul* este cauza boalei, imediat se va institui un tratament energic mixt: *injecțiuni cu biiodur de mercur*, sau *fricțiuni mercuriale* în *neosalvarsan* și *bismut*. Tratamentul meningitei tuberculoase va fi acelaș ca la meningita simplă, dar se vor mai administra clizme cu *creozol*, se vor face *injecțiuni cu gaiacol*, *fosfotal*, *iodoform*.

Meningită rachidiană. — Caută la *Măduva spinării*.

Meningism. — Este o stare de boală care se sfârșește prin vindecare. Intre cauzele cari produc această stare se numără: o indigestie, eșirea dinților, viermii intestinali (limbriți), otrăvirea cu alcool, corpi străini în urechie sau în alt loc. Se mai observă în cursul, sau în coalescența unor boale in-

fecțioase: influență, pneumonie, enterită, febră tifoidă, etc. Semnele acestei stări sunt acele ale *meningitei*, de care se deosebește cu greu, mai ales la început. *Tratamentul*: purgative clizme, chinină și medicamente în contra viermilor intestinali, când aceștia sunt cauza.

Meningo-encefalită. — Aprinderea sau inflamațiunea acută a creierului și a învelișelor lui (meninge). Se observă în răniri și ca complicațiune în febrele



Fig. 251. — Meningo-encefalocel

grave. Semnele de căpetenie sunt: toropeală, somnolență, durere de cap, slăbiciune musculară, spazme trecătoare cu amorteire în membre, frica de lumină. Alteori în loc de toropeală se vede o excitațiune febrilă, cu greață și vărsături. Mersul boalei este repede; febra devine mare și se însoțește de



Fig. 252. — Meningocel

aiurare (delir), de spazme, apoi de paralizii și în cele din urmă moarte. Se vindecă foarte rar.

Meningo-encefalocel. — Este o boală foarte rară, care constă în eșirea pielei care învelește creierul, *dura-mater*, printre oasele frontal și etmoid. Uneori iese și substanța cerebrală, alteori nu.

De cele mai multe ori se arată chiar dela nașterea copilului. Iși are sediul în unghiul intern al orbitei, este de o mărime variabilă dela o alună până la aceea a unui ou de găină. *Tratamentul* este : operația.

Menopauză (gr. *mên*, lună și *pausis*, încetare). — Incetarea regulelor, sau a periodului (v. *Menstruație*).

Menoragie. — V. *Menstruație*.

Menstruație (lat. *menstrua*, dela *men-sis*, lună), *regule*, *period*, *soroc*, lună. — Femeile au o scurgere de sânge în fiecare lună, prin vulvă, care începe dela 12—16 ani (*pubertate*) și durează până la vârsta de 50—60 ani (*menopauză*). Această scurgere poartă numirile de mai sus, cari toate sunt în raport cu regularitatea cu care ea vine la fiecare lună odată : lună care poate fi de 25 până la 30 de zile. Cu cât menstruația se face mai regulat cu atât femeia este mai sănătoasă, din care pricină trebuie să se supravegheze în deaproape *periodul*, ținând seamă de cele mai mici abateri, luând cele mai mari precauțiuni când începe a se ivi, în tot timpul cât durează și când încetează, când femeia este iertată (*menopauză*). Din acest punct de vedere am putea împărți etatea femeiei în trei părți : înainte, în timpul și după menstruație. *Cauza* sau mai bine zis punctul de plecare al regulelor este ruptura la nivelul ovarului a unei vezicule, care conține un ovul (*ousor*), iar căptușala (mucoasa) mitrei este congestionată, adică plină de sânge și capilarele ei plesnesc lăsând să curgă sânge, care se amestecă cu un lichid mucos secretat de glandele mitrei. Congestiunea (îngrămădirea de sânge) se face în toate organele materne, chiar și în sânuri, ceea ce face ca femeia să simtă un fel de greutate, de tensiune, de căldură în șale, în lighean, în stin-ghii, iar la sânuri o umflare. În timpul periodului unele femei n'au poftă de mâncare, sau au un apetit capricios, altele au urdinare și încercări de pal-pitațiuni (bătaie de inimă); fața este colorată în mod inegal, ochii la început sunt vioi apoi obosiți, cea mai mică efortare le obosește, nu pot munci, caracterul lor este iritabil, sunt foarte impresionabile, adeseori au nevralgii (dureri în diferite părți ale cor-

pului). Cantitatea de sânge ce se pierde la fiecare period este variabilă, dela femeie la femeie și la aceeași femeie variază după etate; în termen mijlociu se poate socoti cantitatea sângelui cam la 150 până la 200 gr. uneori ea poate fi numai de câteva gr., alteori de 500 până la 600 gr. Această cantitate variază și după hrană, după muncă și după climate; ea este mai mare la persoanele hrănite bine, la cele cari muncesc din greu și în țările calde este de culoare roșie închisă, cam viscos; durata unui period este de 4 până la 8 zile. — Sunt unele persoane cari n'au *regule*, ceea ce se întâmplă în cazurile de imperforațiunea hime-nului, sau de o oprire de dezvoltare a mitrei. În cazul dintăiu trebuie să se facă o mică operație, adică să se găurească membrana imenului, în cazul al doilea boala nu se poate vindeca. — *Inceputul menstruației*. Venirea regulelor (v. *Pubertate*) se însoțește de creșterea sânilor, de eșierea părului la subțiori și la partea de jos a pântecelui, uneori și de turburări nervoase. De asemenea se modifică și caracterul și vocea. La cele mai multe fete menstruația se stabilește în mod regulat chiar dela început, la altele însă ea apare câva timp la două-trei luni odată; cele dintăiu regule pot fi foarte dureroase. — Se întâmplă câte odată că *periodul nu vine pe unde trebuie* și femeia are *emoragie* din nas, din piept (scuipă sânge), din stomac (varsă sânge), din mațe (curgere de sânge prin șezut), din beșică (urinare cu sânge); în cazuri foarte rare s'a observat curgerea de sânge din sfârcurile sânilor. — *Menstruația anevoioasă și dureroasă* sau *dismenoree* (gr. *dys*, cu greutate, *men*, lună și *rheo*, curg). Sunt mai multe cazuri cari pot face ca periodul să vină cu mare greutate și cu durere. Între acestea se numără cloro-anemia, singură sau asociată cu o stare nervoasă pronunțată (*isterie*), congestiunea mitrei, inflamațiunea cronică a mitrei (*metrită*), asociată sau nu cu îndoirea (*flexiunea*) gâtului mitrei asupra corpului ei, mai cu seamă când această îndoire este înainte (*anteflexiune*). În cazurile de *dismenoree* femeia simte jos o căldură, o greutate, are mâncărime la trup, dureri în partea

MENS

de jos a pântecelui, care este umflat, durerea se duce până în stîngii, în coapse, în șale și uneori până în sânuri. Aceste suferințe se pot ivi cu câteva zile înaintea regulii și uneori durează în tot timpul ei, altelei încetează îndată după ce s'a ivit sângele. Afară de acestea, femeia poate fi palidă sau roșie la față, să aibă greață și chiar vărsături, să-i vie să iese des cu udul și cu scaunele; ea este într'o stare de nervozitate mare, supărăcioasă și gata să plângă în orice moment. Sângele poate să curgă picătură cu picătură, apoi să se oprească, cum să întâmplă în metrita zisă pseudo-membranoasă, în care căptușala mitrei se scămășează, se curăță și merge de astupă gura mitrei ca un dop și oprește sângele de a mai curge; altelei sângele curge în cantitate mare, uneori sub formă de chiaguri. Dismenoreea durează la unele fete până se mărită și încep să facă copii; când se iveau după căsătorie ea este produsă de o metrită. *Tratamentul* variază după cauză. Când femeia suferă înainte de a începe sângele să curgă i-se vor da medicamente cari să înlesnească curgerea lui (*emmenagoge*) cum sunt: apiol, apiolină, tinctură de viburnum prunifolium (câte 10 picături de 5—6 ori pe zi), cu câte 2—3 zile înainte; când s'a ivit regulile și ele sunt tot dureroase se vor pune cataplasme calde pe pânțe, săpunașe cu extract de opiu și cu extract de beladonă, sau clizme cu laudan (10—15 picături) sau cu antipirină. În intervalul regulilor se va face un tratament general: fier, arsenic (pentru anemie), hidroterapie pentru nervozism), alcaline (la artrism), iar în cazurile în cari gâtul mitrei este strîmt, sau strîmb, se va face dilatarea (lărgirea) și îndreptarea lui: în cazurile de metrită cronică membranoasă se va face *răzuirea* cavității mitrei. — *Menoragia* însemnează curgerea de sânge în cantitate peste măsură de mare, în timpul menstruației. Ea se deosebește de *metroragie* prin aceea că în aceasta curgerea de sânge din mitră se face, în intervalul regulilor. Menoragia se observă la femeile cari suferă de cloro-anemie, de polipi ai mitrei, de fibrom și alte tumori ale mitrei, sau când menstruația a în-

MENS

târziat să vină mai multe luni, ori când se apropie vârsta critică, adică menopauza. În cazurile de menoragie, cel mai bun lucru este ca femeia să stea liniștită în pat, pe spate, cu capul mai jos și cu pânțele puțin acoperit, și la mare trebuință i se vor face și injecțiuni vaginale cu apă fierbinte de 45°. — *Intârzierea menstruației* sau *oprirea bruscă* a ei se cheamă *amenoree* (gr. *a*, fără, *men*, lună, și *rheo*, curg). Ea poate fi produsă de o emoțiune vie, de răceală (punerea picioarelor sau a mânilor în apă rece, băuturi cu gheață), de oboseală (dans, umblet mult, raport sexual în momentul menstruației), de cloroanemie, de oftică, de supărări mari, de schimbarea vieții și a regimului, de convalescența boalelor lungi. În amenoree femeia are călduri la obraz, amețeli, dureri de cap, vâjăituri de urechi, uneori curgere de sânge din nas, sau scui-pare de sânge, turburări nervoase și digestive, dureri în șale, etc. *Tratament*. În caz de cloroanemie se va da fier, arsenic, băi de picioare cu muștar, injecțiuni vaginale calde și băi de șezut calde de 30°. Se va da șofran, sabină, absint, rută, artemisia. În caz de emoțiuni violente, de răceală, se va da apiol, ceaiu de șofran, purgative, băi de picioare cu muștar. În caz de obezitate (persoanele prea grase) se va prescrie un regim potrivit și se va face *curățirea* mitrei urmată de injecțiuni iodate în epoca presupusă a regulilor. În toate cazurile de turburări ale menstruației trebuie consultat doctorul, care va avea datoria să descopere cauzele cari produc aceste turburări. De multe ori operația de îndreptare a poziției rele a uterului, sau administrarea prin injecții, sau sub altă formă a extractului de ovar, a foliculinei, aduc vindecarea, sau ameliorarea turburărilor supărătoare. Femeile să nu uite că menstruația este foarte diferită, dela una la alta, în ceea ce privește timpul venirii, cantitatea de sânge pierdut, ușurința cu care este suportată această stare și, fără să neglijeze orice abatere dela regula generală, să nu se înspăimânte totuși când aud că la unele din prietene, sau rude, lucrurile se petrec altfel. Timpul sarcinei și alăptării, când

menstruația se oprește, este un timp de reparație al tuturor necazurilor femeii, de aceea să nu se uite că cele ce se feresc să rămână însărcinate au cu mult mai multe necazuri în viață decât semenele lor cari au avut mai mulți copii și deci mai mulți ani de odihnă a uterului și ovarelor. Să nu se uite că, deși au destul de muncit aceste organe în timpul sarcinei, turburările sunt mai ușor de suportat de cât acelea pe care le au în fiecare lună, în timpul menstruației. — *Oprirea definitivă* a menstruației se numește *menopauză*, iar la țară se zice că *femeia este iertată*. Aceasta se întâmplă cam pela 50 de ani, uneori chiar la 40—45 ani, alteori poate veni tocmai la 60 ani; la femeile cari n'au făcut copii, sau la cari le-a venit regulile prea timpuriu menopauza se arată mai iute. Menopauza nu vine în mod brusc, ea se anunță adeseori prin neregularitate la venirea periodului, sau în cantitatea sângelui, care poate fi foarte mică, sau dimpotrivă foarte mare și un period să se prelungească până la celalt. *Semnele* menopauzei sunt: căldură în față, zăpăceală, vâjiituri de urechi, greutate în pânțe, acrimi la stomac, mistuire înecat, respirațiune grea: caracterul devine trist și neliniștit, moleșală în tot corpul mai ales când femeia începe a se îngreșă, călduri pe spate, la cap (congestiuni cerebrale).

Mentagră (lat. *mentum*, menton, bărbie, și grec. *agra*, închisoare). — Un fel de *chelie* cunoscută sub numele de *ținea tonsurans*, care se ivește în barbă. (vezi *Tinea*).

Mentha piperata. — V. *Ismă*.

Mentol. — Se prezintă sub formă de cristale prismatice, transparente, cu miros și cu gust de ismă (mentă); puțin solubil în apă și glicerină, foarte solubil în alcool, eter, cloroform, uleiul de vaselină. Mentolul se scoate mai cu seamă din *mentha arvensis* și *crispa*. Este foarte bun în contra durerilor (*neuralgiilor*), în contra greții și a vârsăturilor, în contra spazmelor, a mâncărimii de piele, a durerii de dinți și de măsele, a durerii de cap (*migrenei*). Se dă pe *dinăuntru* 10—60 ctgr. în emulsiune, sau în puțină alcoolizată. Pe *din afară* sub diferite forme: praf (pentru tras pe nas); alifie (1—10 gr.

la 100); creioane; ulei mentolat (1—20 la 100), pentru pus în nas, în ureche, în gât pentru a amorți locul; aburi, încălzind mentol curat, sau turnând în apă fierbinte mentol în soluțiune alcoolică; soluțiune eterată (10 la 100) sau alcoolică (1—10 la 100); mentol *camforat* (lichid ce se obține amestecând o parte mentol și 2 părți camfor).

Mercur, argini viu, idrargir (*Hydrargyrum*). — Este singurul metal care este lichid la temperatură ordinară; el are culoarea argintului, luciul strălucitor metalic; fără gust și fără miros; încălzit se volatilizează, dar emite vapori chiar la temperatură obișnuită; greutatea specifică 13.59; supus la o temperatură de 40° C. se solidifică în octaedri; fierbe la +350° C. răspundind vapori incolori. Mercurul este puțin răspândit în natură. De obicei se găsește combinat cu *sulful* (pucioasa) sub numele de *cinabar*. Mercurul nu se topește nici în apă, nici în alcool. În medicină se întrebuințează mercurul foarte mult, în diferite preparate și în diferite moduri, ca *specific* al *sifilisului*, fiind un *bactericid special* al *treponemului sifilitic*, în toate perioadele infecțiunii; în *aplicațiuni locale* el este un *parazitocid energic* (pediculi pubieni sau păduchi lați, oxiuri, sau viermușorii șezutului); antiflogistic combatând inflamațiunile (flegmon, orchită meningită, peritonită, reumatism articular acut, etc.). Pe *dinăuntru* mercurul se dă 5—10 ctgr. în *pilule*, sau sub formă de *praf cenușiu* (mercur strâns cu ajutorul cretei pulverizate), în *injecțiuni intramusculare* sub formă de *ulei cenușiu*. Pe *din afară* se întrebuințează sub formă de alifie, sau unguent mercurial *cinereu* (1 parte mercur la 6 p. axongie, sau untură de porc), unguent mercurial dublu, sau *napolitan* (cantitate egală de mercur și axongie), în doză de 1—5 gr.; *ulei cenușiu* (huile grise), 40 la 100 de mercur; *emplastru* de Vigo. — La țară poporul are credința că argintul viu este atotputernic în contra tuturor boalelor. Purtat la gât depărtează farmeciile și vrăjile, din el se face o alifie cu untură de porc proaspătă, cu care se vindecă *răia*. — *Preparatele mercuriale* întrebuințate în medicină sunt următoarele: 1. *Mercur coloidal* sau *Hygrol*,

obținut prin dializă, sau electroliză, dintr'o soluțiune de azotat mercuric. Pe *dinăuntru* în soluțiune apoasă de 12 la 100, sau sub formă de pilule de câte 1 ctgr., una pe zi timp de o lună. 2. *Benzoat de mercur* se dă în injecțiuni sub piele, 1—2 ctgr. 3. *Cacodilat de mercur*, în injecțiuni intramusculare, 2—3 ctgr. pe zi. 4. *Biclorur de mercur*, sau *sublimat coroziv*; (să *ricică*) medicament antiseptic, dezinfectant, cauterizant, antisifilitic. Doză: 1—ctgr. pentru odată, 1—5 ctgr. pentru o zi în injecțiuni intramusculare, sau în soluțiunea Van Swieten, (1 la 1000) 1—2 linguri pe zi. Pe *dinafară* în soluțiuni și injecțiuni (până la 2 la 1000); 20 gr. pentru o baie; *vaselină* 1 la 1000; *bumbac* și *tifon* 1 la 1000. 5. *Protoclorur de mercur* sau *calomel* (vezi acest cuvânt). 6. *Cianur de mercur*, foarte toxic; reputat altădată ca cel mai puternic antisifilitic: se dă în injecțiuni intravenoase, (rar intramusculare) 1—2 ctgr. 7. *Protiodur de mercur*, 1—10 ctgr. în injecțiuni subcutanate, sau în pilule; *extern* 50 ctgr. până la 1 gram în alifie. 8. *Biiodur de mercur* (iodur roșu) 5—15 miligrame în pilule, sau sub formă de *sirup Gibert*, care conține la o lingură 5 mgr. de biiodur de mercur și 1 gr. de iodur de potasiu; în injecțiuni intramusculare (2—3 ctgr. în soluțiune oleioasă sau apoasă); la copii, 1—2 mgr. Pe *dinafară* în soluțiuni antiseptice 1 la 4000; alifie 1 la 100. 9. *Oxid galben de mercur* sau *oxid mercuric* sub formă de *precipitat galben* (obținut pe cale umedă); bun în blefarite ciliare, cheratite, eczeme rebele, sub formă de unguent 2—3 la 100. 10. *Oxid roșu de mercur* sau *oxid mercuric* sub formă de *precipitat roșu* (obținut pe cale uscată); întrebuințat pe din afară pentru blefarite, cheratite ulcerose, eczemă, sub forma de unguent 1—10 la 100. 11. *Enesol* sau *salicilarsinat de mercur*; injecțiuni intramusculare de 2 ctgr. în fiecare zi, până la 20—25 zile. Prin enesol pe lângă acțiunea specifică a mercurului se obține și acțiunea reconstituantă a arsenicului. 12. *Salicilat de mercur*; în pilule (5—10 ctgr.) sau în injecțiuni intramusculare (5—8 ctgr., la 8 zile una, sau 1—2 ctgr. zilnic).

Otrăvirea acută prin mercur sau sărurile sale, de obicei prin sublimat, are următoarele semne: toate părțile gurii sunt umflate și albul, gust metalic, senzațiune de strângere în gât, dureri de stomac, vărsături sangvinolente, diaree cu frișoare de sânge, respirațiune grea, convulsii, sincopă (leșin). Primele îngrijiri constau în a face să verse bolnavul gâdilindu-i omulor sau dându-i ipeca, apomorfina; apoi să-i dăm apă albuminoasă în mare cantitate (5 albușuri de ou pentru 2 păhare de apă); stimulente. *Otrăvirea înceată*, prin mercur se numește *idrigirism*, care se observă la lucrătorii cari scot mercurul, la toți meseriașii cari umblă cu mercur, sau cu sărurile lui cum sunt cei ce fac oglinzi, barometre, pălărierii, cei ce auresc etc. Această otrăvire are 2 forme: *acută* și *cronică*. În cea *acută* avem ca semne: inflamațiunea gurii caracterizată printr'o durere la maselele din fund, din partea pe care bolnavul doarme de obicei, gust metalic, alenă urită, greutate la mâncare, gingiile umflate, moi, ulcerate, sângerează ușor; dinții se clatină; salivă multă; palpațiuni, respirațiune grea, lipsă de poftă de mâncare, insomnie, paliditate la față, diaree, stare de toropeală (abatere). În forma *cronică* avem, pe lângă turburările de mai sus, niște tremurături în membrele superioare, apoi în picioare, cap și limbă, producându-se mai cu seamă când bolnavul face mișcări. *Tratamentul* preventiv constă în îngrijiri de curățenie, băi, îngrijirea deosebită a gurii, iar tratamentul curativ în clorat de potasă, 6—8 gr. pe zi în 150 gr. apă, iodur de potasiu, hidroterapie, electricitate.

Mere (Vin de). — V. *Cidru*.

Mere de pământ. — V. *Cartofi*.

Mericism (lat. *merycismus*, grec. *meryrkismos*), *rumegare*. — Se numește mericism obiceiul bolnăvicios pe care îl au unele persoane de a readuce, după câteva minute, un sfert de oră, sau chiar o jumătate de oră după masă, mâncarea în gură, fie pentru ca s'o amestece și apoi s'o înghită din nou, sau pentru a o arunca afară. Mericismul *simplu*, congenital și aproape inconștient, în totdeauna urmat de înghițirea din nou a mâncării, care și

păstrează gustul, nu este primejdios. Mericismul *patologic*, care ține de o stare dispeptică sau nevropatică (isterie, neurastenii) și în care mâncarea este adusă în gură mai mult sau mai puțin stricată (descompusă) și apoi este aruncată afară, constituie un *tic* neliniștitor care produce slăbire repede. Mericismul nu se vindecă decât prin *psihoterapie*.

Mers. — V. *Umblet*.

Mese, Mâncări. — Toate funcțiunile organismului nostru se execută cu cea mai mare regularitate și este foarte nesănătos lucru ca să încercăm a strica această orânduială. Omul trebuie să se obișnuiască a mânca la ceasuri hotărâte și după cum trebuința corpului o cere. Regula la mâncare datează din cele mai vechi timpuri, poate chiar dela începutul omenirii. Iată cum ar trebui să-și reguleze mesele fiecare *adult*. Dimineața, cam pe la 7 ceasuri, să aibă *dejunul*, care să se compună din mâncare puțină și ușor de mistuit, de exemplu: o cafea cu lapte cu un corn, sau pâine simplă cu unt, sau mermeladă, ori pâine prăjită, sau un ceaiu cu lapte, sau lapte cu ciocolată; rău fac toți acei cari se mulțumesc numai cu o cafea neagră, sau numai cu o dulceață și un păhar de apă rece. La ora 12, la amiază, să aibă *prânzul*, care să se compună din mâncări mai multe și mai nutritive: o supă, un fel de mâncare, o friptură, brânză și fructe cu toate accesoriile lor, căci la amiazi, stomacul este aproape gol și poate primi o cantitate mai mare de alimente, iar munca de după amiază îl ajută ca să mistuie. Între ceasurile 7 și 8 seara să aibă *cina*, care se va compune din unul sau două feluri de mâncare, ceea ce este de ajuns pentru ca stomacul, după ce a mistuit, să stea liniștit până în dimineața viitoare. Pentru *copii* până la etatea de 14 ani, mai ales pentru cei ce au stomac foarte bun, se poate să li se mai dea o masă, o *gustare*, după amiază pela ora 4, care va consta într-o bucată de pâine, un corn simplu, sau cu puțin unt proaspăt, sau o cafea cu lapte. Odată mesele fixate în acest mod, trebuie respectate, să nu se facă nici o abatere dela orele hotărâte decât în cazuri de forță majoră, căci

numai astfel vom avea un stomac sănătos și o bună mistuire. Omul sănătos va mânca ceea ce îi place și cât crede că-i este destul până se satură, variind mâncarea pe cât poate, după gust și după poftă și după felul de muncă pe care o face; să nu mănânce însă nici odată mai mult decât îi trebuie; să se mulțumească mai mult cu mâncări simple prin natura și preparățiunea lor, să varieze mâncarea pe cât poate, nu numai dela o masă la alta, ci chiar la aceeași masă să caute să mănânce 2—3 feluri, căci este mai sănătos astfel decât să mănânce numai dintr'un singur fel, ceea ce ar obosi stomacul și ar lăncezi gustul. Omul sănătos n'are trebuință de *aperitive*. Supa dela prânz se poate înlocui cu *mezeluri*, șuncă, sardele, icre, unt proaspăt, măslina, sau cu ouă gătită sub diferite forme. Supa, sau ciorba, poate să fie începutul cinii. Din când în când este bine ca omul să mai înlocuiască mâncarea de *dulce* cu mâncarea de *post*, ceea ce este foarte igienic și în același timp putem împăca și cerințele bisericii, însă vom face aceasta numai când stomacul și sănătatea ne dau voie. În fine trebuie să ne hrănim cu băgare de seamă și cu regulă dacă vom să mistuim bine, să n'avem greutate și dureri de stomac, iar când mistuirea se face greu vom putea recurge la medicamentele zise *stomachice*, pe cari le vom lua îndată după mâncare. Oamenii *bolnavi* și *convalescenți*. vor consulta și vor asculta de poveștile unui doctor, care le va prescrie mâncările cu aceeași socoteală deosebită cu care prescrie și medicamentele.

Meseril. — V. *Profesiuni*.

Meși. — V. *Încălțăminte*.

Mesotan sau *ericină*. Eter metiloximetilic al acidului salicilic, din care conține 75 p. 1000. Lichid oleaginos, gălbui, cu miros plăcut. Potolitor de dureri (analgezic local), ca și salicitatul de metil, 5—25 gr. pe zi în badijonări (ungeri), curat sau amestecat cu cantitate egală de ulei; este uneori iritant.

Mesteacăn (*Betula verrucosa*, fam. betulaceelor). — Arbore cu coaja albă, care crește prin păduri, în regiunea muntoasă de jos împreună cu brazilii.

Scoarța care este rășinoasă se dă contra frigurilor și ca diuretic în dropică. Frunzele de asemenea se dau ca diuretic, în ceaiu sau fiertură, 15 gr. la un litru apă.

Mestecare. — V. *Masticatiune*.

Metacarp (gr. *metá*, după, și *karpós*, pumn). — Scheletul părții de mijloc a mâinii (palmă) format de cinci oase numite *metacarpieni*. Cel dintâiu metacarpian, care corespunde la degetul mare, este mobil. Fața anterioară a metacarpului este găușită, scobită (concavă), iar fața dinapoi boltită (convexă). Metacarpul corespunde înainte la mușchii podului palmii, iar înapoi la tendoanele mușchilor întinzători ai degetelor; în spațiile *intermetacarpine* sunt așezați, *mușchii interosoși*. (V. *Mână*).

Metastază (grc. *metastasis*, schimbare de loc). — Când o boală își schimbă locul fără a-și schimba natura. Așa de exemplu avem *metastaza oreioanelor*, în care inflamațiunea se duce dela glanda parotidă, din dosul fălcilor, la testiculii (orchită), sau la ovare (ovarită), sau *metastază canceroasă*, când cancerul de la un organ se mută la altul îndepărtat.

Metatars (gr. *meta*, după și *tarsós*, tars). — Se numește astfel partea de mijloc a scheletului piciorului, care se compune dintr'un șir de cinci oase (metatarsiani), alungite de dinapoi înainte și așezate în mod paralel sub formă de grătar, având o față superioară boltită (convexă) aplecată în afară și o față inferioară găușită (concavă) formând *secul* piciorului (vezi *Picior*).

Meteorism (dela grec. *meteoros*, ridicat). — Umflătura sau dilatațiunea pântecelui prin gaze (vezi *intestinale*).

Metil (Clorur de). — Gaz incolor, cu miros eterat special, care la o temperatură de 15° trece instantaneu dela stare lichidă în stare de vapori producând o răcire (refrigerațiune) foarte mare. Se întrebuințează numai *pe dina-*



Fig. 253.
Mestecăc

fară, ca analgezic local în diferite nevralgii (sciatică, facială, dentară, intercostală), în reumatism muscular (lumbago, torticollis), etc., precum și în mici operațiuni ca anestezic local, fiind însă inferior clorurului de etil. — *Salicilat de metil* (v. *Salicilic, acid*.) *Violet de metil* (v. *Piocinine*)

Metilacetanilidă — V. *Exalgină*.

Metilal, dimetilal de metilen. — Lichid incolor, foarte mobil, cu miros de clorform și de eter acetic. Ipnotic care nu irită și al cărui efect ține 4—5 ceasuri. Se dă în contra insomniei la morfinomani, la alcoolici, la dementi (tâmpiți), analgezic local. Doză 1—5 gr. ca ipnotic în poțiune, în sirop; iar *pe dinafară* în liniment (30 la 100 ulei de migdale dulci), sau în alifie (5 la 30 vaselină și 3 ceară).

Metilarsinat de sodă. — V. *Arenal*.

Metilarsinat disodic. — V. *Arenal*.

Metilen (Albastru de). — V. *Albastru de metilen*.

Metralgie (gr. *métrā*, mitră și *algos*, durere). — Durere de *mitră* (vezi acest cuvânt).

Metrică (gr. *métrā*, mitră și *termi-națiunea itis*, care însemnează inflamațiune, aprindere). Așa se numește inflamațiunea mitrei (v. *Mitră*).

Metrorație (dela grec. *metra*, mitră și *rhegnyein*, a eși cu putere), *emoragie uterină*. — Curgere de sânge din mitră, care se produce de obicei în urma facerii, sau cu prilejul unei lepădături (avort), sau în timpul sarcinii când placenta (casa copilului) este rău prinsă, adeseori emoragia se ivește și în afară de sarcină. În acest caz ea poate să se ivească în același timp cu regulele (sorocul) și atunci se chiamă *menoragie*, sau în timp nehotărît și atunci avem *metroragie* propriu zisă, când atârnă de o boală de mitră mai mult sau mai puțin gravă. *Tratamentul* constă în repaus orizontal, săcară cornută, ergotină, ergotinină, extract de hamamelis virginica, hydrastis canadensis; injecțiuni calde de 45°—50°, tamponament și în cazuri de pierdere mare de sânge se vor face în același timp injecțiuni sub piele de ser artificial.

Mezenter (gr. *mesos*, mijloc și *enteron*, intestin, mat). — V. *Peritoneu*.

Miasmă (gr. *miainein*, a murdări, a

mânji). — Miasmele sunt emanațiuni cari ies din corpurile vegetale și animale, se răspândesc în aer, putând fi transportate la oarecari depărtări și producând la cei ce le absorb diferite boale. Miasmele sunt de două feluri: *telurice* și *putride*, cari provin din descompunerea materiilor animale. Cele dintâiu sunt constituite din substanțe organice, cărora se datorește acțiunea stricătoare a unei atmosfere mlăștinoasă, pe câtă vreme miasmele putride lucrează mai mult prin gazele deletere. Miasmele orașelor mari constau asemenea dintr'o materie organică, dar la care se adaugă o mare cantitate de acid carbonic; experiența a dovedit că aceste miasme sunt stricătoare chiar și atunci când se separă acest acid, pe măsura în care el se produce.

Microbi. — Sunt așa de mici în cât ochiul omului nu-i poate zări decât prin ajutorul microscopului. Acești microbi sunt așa de năprasnici încât unii pot doborî la pământ, prin numărul și otrava, lor chiar și pe un uriaș în câteva zile, în câteva ceasuri. Cel care a descoperit această lume nevăzută, a fost *marele Pasteur*. Mulți înaintea lui au întrevăzut ființa acestor *microorganisme*, dar nici unul până la el nu și-a dat seamă de rostul lor în



Fig. 254.—Streptococul

producerea fermentațiunilor, a putreziciunilor și a boalelor. Mulțumită lui microbii au fost considerați nu ca *efect*, ci drept *cauză* a acestor alterațiuni și tratați ca atare, punând astfel temelia *doctrinii microbiene* de astăzi, aruncând o lumină nouă asupra cauzelor boalelor și prin urmare a modului de a ne feri de ele. Această doctrină a revoluționat igiena, a transformat din temelie medicina, care a ajuns să învingă diferite boale cumplite. Astăzi toți învățații sunt de acord în a pune microbii la începutul regnului vegetal, formând o ramură din familia algelor. *Structura microbilor.* Cu privire la *forma* lor, microbii pre-

zintă trei varietăți de căpetenie: *forma rotundă*, *micrococi* sau *coci*, a căror celule sunt izolate sau reunite câte două, *diplococi* (*diploos*, dublu, *coccus*, sămânță), cum sunt microbii pneumoniei, ai blenoragiei, etc. sau câte 4, *tetrageni*, sau mai multe în formă de șireag *streptococi* (*streptos*, întortochiat), cum este microbul brânzii, sau în grupuri sub formă de strugur, *stafilococi* (*staphylé*, ciorchină de struguri), cum este microbul din puroiu (abces), *forma cilindrică*, ca niște bețișoare, *bacili* (difterie, oftică) sau mai lungi formând *filamente*, firicele (dalac); unii n'au forma regulat cilindrică, ci sunt mai groși la un capăt, având o umflătură ca o măciucă, sau mai groși la mijloc ca un fuor; *forma spirală*,




Fig. 255. — Pneumococul

a = în sputa unui bolnav de pneumonie
b = în cultură

ca un tir-bușon, *spirobacterii* (febra recurentă și sifilis); uneori spirala e foarte scurtă și strâmbă ca o virgulă, *vibriion* (coleră), sau mai lungă și îndoită de mai multe ori asupra ei însăși, *spirilă*. *Coloarea* microbilor variază: roșie ca sângele, portocalie, galbenă, verde, albastră, violetă, etc., dar sunt mulți microbi incolori, unii sunt fosforescenți (luminează la întuneric). Nimic nu poate fi mai simplu decât *structura* microbilor: o celulă compusă dintr'un înveliș, dintr'o peliță (membrană) și o substanță prorooplasmatică de obicei incoloră, care cuprinde câte odată niște picături

foarte fine uleioase sau granulațiuni refringente. Unii microbi sunt *imobili*, alții au *mișcări repezi* și foarte variabile: produse de niște *cili vrbrațili*, foarte fini cu cari sunt prevăzuți cei mai mulți microbi (febra tifoidă). Unii microbi deși n'au cili se pot mișca mulțumită contracțiunii substanței protoplasmatică, din cari sunt formați. Intru cât privește *mărimea*, microbii se găsesc la marginea extremă a fiintelor microscopice, mărimea lor este de una sau două miimi de milimetru, sau chiar numai de o jumătate de miime de milimetru. Ne putem închipui câte milioane de microbi trebuie să fie adunați la un loc pentru ca să formeze o colonie, care să se poată vedea cu ochiul liber. *Înmulțirea* microbilor se face prin *spori* sau prin *sciziparitate* (împărțire). Sporii se transformă în microbi când se găsesc un mediu favorabil; ei sunt mai rezistenți decât microbii la căldură, frig, uscăciune, antiseptice și trăesc mai mult (25 de ani și mai mult). Prin sciziparitate înmulțirea se face în modul următor: microbul se împarte în 2, apoi fiecare parte în alte 2 și așa mai departe din jumătate în jumătate de ceas, așa că în scurt timp un singur microb poate produce o cantitate colosală (47 trilioane în 3 zile). Unii microbi se înmulțesc și prin spori și prin sciziparitate. Pentru *respirațiune* microbii au trebuință de oxigen, pe care îl iau unii din aer sau din apă așa cum îl găsesc, din care cauză acești microbi se zic *aerobi*, iar alții iau oxigenul din substanțele pe cari trăiesc și le descompun, din care pricină se numesc *anaerobi* (microbii *fermentațiunii* și ai *putrefacțiunii*). Microbii, ca toate vegetalele lipsite de *clorofilă*, trebuie să se *hrănească* absorbind principiile nutritive din mediul în care trăiesc prin membrana lor. Lor le trebuie, ca și animalelor superioare, elemente capabile de a se descompune în *apă*, *azot*, *cărbune*, *oxigen*. *Apa* le este trebuincioasă căci uscăciunea le oprește reproducția, mișcările, viața activă, fără însă a-i omori, de oarece, îndată ce umezeala îi favorizează, viața latentă apare. *Azotul* și *cărbunele* sunt elementele cele mai importante din substanțele organice

în cari vegetează microbii. Microbii producători de boale (*patogeni*) cer medii complexe și foarte bogate. *Serul sângelui* este elementul cel mai esențial. — *Originea și localizațiunea microbilor*. Pretutindenii se găsesc microbi: în aer, în apă, pe pământ și în pământ. *Aerul* este plin de microbi, al căror număr variază după împrejurări: după cum aerul este liber, sau închis în camere, după mulțimea locuitorilor, după altitudine, după starea de uscăciune și de umezeală, după starea de liniște și de mișcare a aerului. Cu cât ne urcăm mai sus și cu cât de depărtăm mai mult de coaste (pe mare), cu atât dăm de un aer mai curat, iar la 2000 metri nu mai sunt microbi de loc. Norocul e că o parte din microbi pier la *lumina soarelui* și la *uscăciune*, iar din cei rămași numai puțini sunt producători de boale, (*patogeni*). Din aer se poate lua *pneumonia*, *influența*, *difteria*, *tusa convulsivă*, *pojarul*, *variola*, *scarlatina*, *colera*, *dizenteria*, *febra tifoidă* și *tuberculoza*.



Fig. 256. — Microbul febrei tifoidae

Dintre toate acestea contagiozitatea *oŃicei* (tuberculoză) este mai gravă. Un ofticos dă afară prin scuipat mai multe *milioane* pe zi de microbi virulenți. Acest scuipat dacă se usucă se prăfuește, se ridică în aer, de unde este introdus în plămâni. Un singur microb ajuns la plămâni începe a se înmulți, *dacă îi convine terenul* (dacă-i place) și produce alți mulți microbi, cari, dați afară cu scuipatul, se reintorc în aer de unde fac alte victime. Până la găsirea unui leac în contra *tuberculozei* trebuie să se ia măsuri aspre în contra *scuipatului*. În America s'a luat dispozițiunea în foarte multe orașe ca nimeni să nu mai scuipe pe stradă și fiecare cetățean este obligat ca să poarte în buzunar o scuipătoare, iar scuipatul să fie nimicit prin ardere. Pe suprafața *pământului*, precum și în straturile superficiale ale lui, se găsesc o mulțime de microbi. Într'un

centimetru cub de pământ, luat dela suprafață, s'au găsit mai multe *sute de mii*. Acest număr scade cu cât mergem mai adânc, așa că la 5 metri pământul e complet lipsit de microbi. Din fericire cei mai mulți microbi nu sunt primejdioși. Praful care se ridică de pe suprafața pământului, fiind plin de microbi, umple aerul pe care îl respirăm și astfel ne putem îmbolnăvi. Intr'un gram de praf adunat de pe mobilele unei odăi s'au găsit peste *două milioane* de microbi. Microbii pământului nu se răspândesc numai în aer, ci și în *ape*, în cari sunt duși de *ploi*, cari spală pământul, ducându-i în *pâraie* și *râuri*. *Ploaia* și *zăpada* curăță aerul de microbi. Multe boale se transmit prin *apele de băut*. Este dovedit că un râu, murdărit în continuu de necurătenii unui oraș mare, duce în apele lui putreziciunile cele mai variate și microbii virulenți ai diferitelor boale. In apele de băut




Fig. 257.—Tripansomul în sânge la boala somnului

trăesc și se dezvoltă un mare număr de microbi producători de boale. Numai în apa de izvor, luată chiar din punctul de unde isvorește, nu se află microbi. Nu este de ajuns ca o apă să fie limpede pentru ca să credem că n'are microbi: în apa cea limpede s'au găsit până la 60.000 într'un centimetru cub. Îndată ce apa pleacă din punctul de unde izvorește se încarcă cu microbi, pe care îi ia din aer și de pe suprafața pământului. De aceea este bine ca orice apă de băut să fie *sterilizată* prin fierbere și trecută prin filtru. Praful din aer depune microbi pe *toate obiectele*, în toate locurile și în toate colțurile. Banii trec prin atâtea mâni murdare, prin atâtea mâni de bolnavi, încât nu e de mirare dacă ei sunt plini de microbi, de multe ori patogeni. Pe filele cărților învechite, prăfuite, pe icoane, în aiasmă chiar, s'au găsit microbi de oftică și difterie. În înghețata care se vinde pe stradă, în praful de pe struguri sunt microbi patogeni. Pe corpul nostru și în inte-

riorul lui, mai ales în cavitățile lui, (nas, gură, tub digestiv, etc.) se află numeroși microbi, chiar și atunci când suntem sănătoși. Pe piele se depun o sumedenie de microbi, sub unghii de asemenea se află foarte mulți microbi și dacă ne sgâriem prin scărpinare introducem microbi patogeni. Gura omului este un mediu minunat de cultură pentru microbi, cari găsesc în ea căldură, umezeală, întunec și hrană. În gură, chiar când omul este sănătos, se află o multime de microbi de diferite specii, unii din ei n'au nici o importanță, alții însă prin putreziciunile ce produc dau naștere unui miros greu și alții precipită sărurile de calciu din salivă formează piatra de pe dinți și măsele, iar alții strică dentura (carie dentară). Nasul e plin de microbi; dintre cari cei mai răi sunt ai brâncii, difteriei și ofticiei. În plămâni aerul intră în mare parte curățat de microbi, cari se opresc în nas, din care pricină este bine să respirăm cu gura închisă, pentru ca aerul să se filtreze prin nas. În stomac nu sunt microbi din cauza sucului gastric, în schimb însă în mațe se găsește o cantitate colosală (400 de miliarde). Constipația ajută la înmulțirea microbilor. Dintre toți microbii din intestine vrednici de pomenit sunt *coli-bacilii*, cari de obicei sunt inofensivi dar într'un moment dat prin diferite împrejurări, pot căpăta o virulență foarte mare dând naștere la diaree, apendicită, peritonită, etc. Bacilul febrei tifoide se dezvoltă în intestine și de acolo *toxinele* (otrăvurile) lui se răspândesc în tot corpul. — *Modul de producțiune al boalelor*. Microbii dau naștere la boale atât prin acțiunea lor proprie cât și mai ales prin secrețiunile, sau mai bine zis excrețiunile lor, cari sunt niște lichide pe cari le aruncă afară întocmai după cum și omul dă afară urina. Dintre aceste secrețiuni cele mai importante pentru noi sunt *otrăvurile* numite *ptomaine* și *toxine*. *Ptomainele* sunt produse de microbi cari dau naștere *putrefacțiunilor* (putreziciunilor). In toate substanțele intrate în putrefacțiune, în carnea ținută prea multă vreme, *jezandată* (vezi *Fazan*), în peștele vechiu și stricat, microbii produc ptomaine foarte

otrăvitoare, așa că, dacă mâncăm asemenea substanțe, ne îmbolnăvim, prezentând diferite semne de otrăvire, cari pot produce moartea. Dacă nu sunt date afară, cum se întâmplă în *constipație*, o parte din ptomaïne intră în sânge și produc o *autointoxicație*, adevărată otrăvire cu tot cortegiul simptomelor ei. *Toxinele*, sau mai bine zis *toxalbuminele*, sunt otrăvurile cele mai puternice, mai cumplite decât otrăvurile minerale și vegetale, decât chiar și veninul șerpilor. Drept exemplu vom cita microbul *anginei difterice*: două *sutimi dintr'un miligram* la un purcel de India (cobaiu) îl omoară. Toxina microbului *tetanului* e și mai cumplită: două *zecimi dintr'un miligram* omoară un om. Toți microbii producători de boale secretă astfel de toxine și numai prin aceste toxine ne infectăm, din care pricină *boalele microbiene* se mai numesc și *boale infectioase*. Infecțiunea nu este decât o otrăvire a organismului prin toxinele microbilor. Prin urmare nu trebuie ca microbii să intre în sânge pentru a ne omorî, ei pot sta într'o parte a corpului, cum e la angina difterică pe *amigdale*, la febra tifoidă în *mațe*, unde produc toxine, cari apoi fiind absorbite în sânge ne otrăvesc și ne omoară. Este de ajuns ca să injectăm unui animal numai toxine, fără microbi, pentru ca să-i comunicăm boala. Sunt cazuri în cari mai multe feluri de microbi lucrează în același timp sau se urmează; astfel un prim grup face spărtura prin care vin alte grupuri de microbi, cari se găsesc prin apropiere (*infecțiunea secundară*) și atunci zicem că avem a face cu o *asociație microbială*. Această asociație agravează boala; astfel avem anghina difterică despre care se știe că, atunci când are numai microbii săi proprii, nu este așa de gravă ca în cazul când mai vin streptococii, sau stafilococii să-și adauge și acțiunea lor la cea a microbului special; atunci ea este aproape întotdeauna mortală. — *Circumstanțe favorabile acțiunii microbilor*, *climatul aglomerația, etatea, sexul, frigul, răceala, nemâncarea, osteneala, depresiunea morală, emoțiunile*, înleznesc desvoltarea microbilor prin slăbirea organismului; de asemenea *lipsa de lumină, de aer,*

de exercițiu, apoi diferite intoxicațiuni (*alcoolismul*) cari micșorează activitatea celulelor corpului, diferite boale cari alterează sângele, ca a *diabetul* în care zahărul mărește vitalitatea microbilor, diferite *răniri* cari deschid microbilor atâtea porți de intrare în corp. — *Circumstanțe defavorabile microbilor*, cari provoacă nimicirea, sau slăbirea lor, sunt multe: *Temperatura prea mare*, căci este știut că maximul de căldură pe care o suportă microbii este în general de 60 până la 65 grade; spori în însă pot rezista până la 140°. prin urmare vom căuta să obținem în etuvele de dezinfecțiune o temperatură mai mare. La *frig* microbii rezistă foarte bine, până la 200 grade sub zero. Cu toate acestea îi putem omorî prin alternanțe de frig mare și de căldură mare. Microbiu nu iubesc *lumina*; razele albastre și violete îi omoară. Cel mai mare dușman al lor este *soarele* din lunile Iunie și Iulie, care-i omoară și în apă până la o adâncime de 2 metri. *Oxigenul* micșorează virulența microbilor și oxigenul aerului nimicește cu înlesnire microbii anaerobi. La o *altitudine* de 300 metri deasupra nivelului mării microbii nu pot trăi. Corpul nostru este apărat în contra microbilor de căptușeala de dinăfară și de dinăuntru, adică de *piele și mucoase*. Microbiu intră în organism de obicei prin tubul digestiv, uneori prin plămâni, alteori prin piele sau prin organele genitale; dar în tot locul ei dau de *cili vibratili* cari se silesc să-i arunce afară, *celulele epiteliale*, cari îi opresc de a intra și diferite *lichide bactericide*, cari îi nimicesc, cum sunt: saliva, sucurile stomacului, pancreasului, mațelor, bila, alcalii și acidele cuprinse în materiile intestinale, sudoarea, muci din nas, scurgerea de mucus din mitră. În mațe sunt substanțe vătămătoare pentru microbi (acizi, leucomaine, fenoli). Sângele de asemenea nu este un mediu favorabil microbilor; ficatul îi distruge; rinichii îi dau afară prin urină. Cea mai bună apărare a organismului în contra microbilor este așa zisa *fașocitoză*; *leucocitele fașocite*, cari sunt dotate de mare mobilitate și îndată ce ele simțesc prezența microbilor se îndreaptă repede și în mare număr către acei

loc, îi înconjură și îi mănâncă cu ajutorul sucurilor digestive particulare pe cari le secretă în acest scop, din această cauză li s'a dat numele de celule mănâncăcioase (*fagocite*). Aceste fagocite sunt răspândite pretutindenea în sânge, în organe, mai cu seamă în ficat, în ganglionii limfatici; ele străbat vasele capilare (*diapedeză*) pentru a pătrunde în țesăturile cotoprite de microbii. Fagocitoza se exercită în mod permanent, mărindu-se în timp de boală; când microbii sunt slăbiți în mijloacele lor de apărare (*atenuați*, după cum zicea marele Pasteur), atunci leucocitele îi nimicesc din ce în ce mai cu ușurință și omul scapă teafăr; dacă însă fagocitele slăbesc, se strică, se topesc, atunci microbul este învingător. Calea prin care pătrund microbii în corp are deasemenea mare influență asupra slăbirii lor și a triumfului leucocitelor. Dovada despre aceasta este *vaccinul* și procedeul întrebuițat mai înainte *inoculațiunea variolei* (vărsatului). Fagocitele neavând să lucreze decât asupra unui număr relativ mic de microbi, înainte ca aceștia să fi ajuns în medii favorabile înmulțirii lor, îi nimicesc mai ușor. Dealtfel la nivelul punctului vaccinat se găsește un număr însutit mai mare decât acela care se află în același punct la un individ nevaccinat. Pe când, din contră, microbii sunt aduși de sânge într'un organism slăbit, cum este acela a unui făt, înmulțirea se face pe scară întinsă, de unde rezultă și gravitatea variolei, sau a sifilisului la feți. — *Receptivitate și imunitate*. Am văzut cum microbii se găsesc pretutindeni, cum din toate părțile suntem încunjuțați de acești vrăjmași cumpliți și nevăzuți unii avându-și domiciliu obișnuit chiar în corpul nostru. Cei mai mulți oameni sunt *refractari* la boală, nu sunt în stare s'o primească, se găsesc în stare de *imunitate*, pe câtă vreme unii sunt gata de a primi boala, intrunind condițiunile prielnice dezvoltării microbilor, aceștia sunt în stare de *receptivitate*. Imprejurările de cari atârnă aceste două stări sunt mai multe. Mai întâiu, acele cari țin de specie și de rasă, apoi acele de familie și de individ. Unele boale sunt proprii numai *speciei umane* (colera, frigurile

galbene); *rasa neagră* nu suferă de frigurile galbene și de paludism; unele familii sunt predispușe la cutare boale refractare pentru altele. Această diferență atârnă de *variațiunile individuale în compozițiunea lichidelor organismului și de variațiunile în gradul de vitalitate a leucocitelor*. Nu tot astfel este compus organismul unui *anemic* ca și al unui *sănătos*, al *copilului* ca al *bătrânului*, al celui *scrofulos* ca al celui al unui copil plin de viață. În lichidele acestora sunt oarecari deosebiri, mici pentru chimiști, mari însă pentru microbi și încă așa de mari în cât ele vor face din organismul unuia un *teren favorabil* microbilor, teren primitiv *receptiv*, iar din organismul altuia un teren *defavorabil* dezvoltării lor, teren *refractor*, *imun*. *Vitalitatea globulelor albe* (leucocite, fagocite) are de asemenea mare rol; dacă leucocitele sunt numeroase, sănătoase, puternice, microbii nu vor putea să se stabilească în organism și omul va fi *imun* și, din contră, dacă ele vor fi mai puține, slabe, fără vitalitate, microbii vor ataca cu ușurință corpul și omul va fi în stare de *receptibilitate*. *Imunitatea*, care apără pe om de unele boale infecțioase poate fi *naturală* sau *dobândită*. Sunt oameni cari, fără să facă nimic, din firea lor sunt *imuni*, neprimind cutare sau cutare boală microbiană (*imunitate naturală*). Mulți pot *dobândi* starea de imunitate prin mai multe împrejurări sau mijloace, așa este: *zăcerea anterioară* de o boală, care ne face pe viitor imuni față de acea boală (scarlatina, pojarul, vărsatul, tusa convulsivă etc.) Medicina poate da imunitate prin *vaccinări* și prin *inoculări* cu *culturi atenuate* (slăbite) de microbi, prin *injecțiuni* cu *toxine microbiene* (numite *antitoxine*), sau cu *ser dela animale imunizate* (*seroterapie*) cum se face pentru angina difterică cu serul lui Behring-Roux. Intre principalele arme de luptă în contra microbilor și ca mijloace de apărare, afară de *imunizare*, mai avem *dezinfecțarea* sau *sterilizarea* și *izolarea* riguroasă a cazurilor de boale infecțioase, sau *molipsitoare*.

Microcefalie (gr. *mikrós*, mic și *kephalé*, cap). — Micșorare în volumul creierului (cap mic). Când creierul nu cân

tărește mai mult decât 900 gr. se zice că este microcefalie, ceea ce este un semn al idiotismului (v. *Deformări*).

Microcidină. — Amestec de naftolat de sodă (75 la sută) și de produse rău definite ale oxidațiunii naftolului (25 la 100). Pulbere amorfă, albă, solubilă în apă. Antiseptic mai energic decât fenolul, mai puțin toxic și nu arde; bun în antisepsia mitrei și a cavității pleurale. Se întrebuințează pe dinafară în soluțiuni apoase, 3—5 la 1000, pentru pansarea rănilor, spălături în mitră etc., și în alifie.

Micrococi. — V. *Microbi*.

Microorganisme. — V. *Microbi*.

Microscop (gr. *mikrós*, mic și *skopein*, a observa). — Se numește astfel un instrument cu care, dacă privim obiectele mici are însușirea de a ni le arăta mai mari decât sunt. Un microscop se compune din două părți: una optică și cealaltă mecanică. Partea optică este fundamentală formată din lentile; cu cât această parte este mai perfectă cu atât microscopul este mai bun.

Micsandre sălbatică (*Erysimum of ficinalis*, fam. cruciferelor). — Plantă erbacee cu frunzele acoperite cu peri, cu flori galbene și cari au un miros plăcut; crește prin locuri pietroase, prin stânci în regiunea alpină și subalpină. Se întrebuințează frunzele și planta înflorită contra tusei pe care o calmează și contra scorbutului, sub formă de ceaiu 10 la 1000, și sub formă de sirop 30—60 gr. pe zi.

Micșunea, panseluțe de câmp, tămăioară, toporași (*Viola tricolor*, fam. violaceelor). — Plantă erbacee care crește pe câmpuri sterile, prin livezi și locuri de iarbă, cultivată și ca plantă ornamentală. În medicină se întrebuințează florile și planta înflorită ca depurativ (curățător de sânge), în contra scrofulelor, iar în doză mare ca purgativ și chiar vomitiv, sub formă de infuziune (ceaiu) din 10 la 1000 și de sirop 30—120 gr. — La țară se spală copiii cu bube dulci cu ceaiu de micșunea, iar ceaiul de floare se dă pentru tusă; rădăcina de micșunea se dă copiilor mici s'o roadă ca să le iese dinții.

Micșunea, micșunele. — V. *Viorea*.

Micțiune (lat. *mictio*, grec. *ouresis*). Actul mecanic prin care udul (urina)

din beșică este dat afară prin canalul uretrei. Pentru turburările micțiunii caută la *Urină*.

Midii (*Mytilus*). — Midiile, ca toți moluștii, pot da naștere la blândă sau urticarie, care este foarte supărătoare; toți cei ce sufăr de bube dulci, sau alte boale de piele, să nu le mănânce. Midiile mai pot produce otrăviri în urma absorbțiunii unei toxine (otrăvi) elaborată în ficatul lor, *mitilotoxină*, mai cu seamă când ele se mănâncă în lunile Maiu—Septembrie. Această otrăvire se arată prin mai multe semne: turburări din partea stomacului și mâțelor, blândă cu umflarea limbii, gât-lejului și pleoapelor, câte odată cu oprirea udului și dropică. Aceste semne de obicei dispar după câțva timp, dar s'a văzut cazuri în cari ele s'au terminat prin moarte. Ca tratament se recomandă ca să facem bolnavul să verse, gâdilindu-i omușorul, sau dându-i vreun vomitiv (ipeca, etc.). Pentru a preveni otrăvirea cu midii se recomandă să se pună în apa în care fierb ele 2—4 gr. de carbonat de sodă, sau 3—4 linguri de sodă pentru un litru de apă.

Midriază (grec. *mydriasis*). — Paralizia irisului cu lărgirea și cu imobilitatea pupilei. Ea este câte odată din naștere (congenitală), alte ori este un semn al unei nevroze; cele mai adeseori este datorită întrebuințării *beladonei* (mătrăgunei), din care pricină acest medicament se cheamă *midriatic*, adică lărgeste lumina ochiului (pupula). Medicamente cari măresc pupila mai sunt: cocaina, homatropina, atropina, etc.

Midrol. — Praf alb solubil în apă, întrebuințat ca midriatic (pentru a lărgi pupila), în soluțiune de la 5 la 100.

Miel. — V. *Oaie*.

Mielită (dela grec. *myelos*, măduvă, și terminațiunea *itis*, care însemnează inflamațiune). — Aprinderea măduvii (v. *Măduva spinării*).

Miere (lat. *mel*, grec. *meli*). — Product zaharat al albinei (*Apis mellifera*, fam. imenopterelor). — Cuprinde 70—75 la 100 dintr'un amestec de glicoză și levuloză, manită, ceară, materii colorante, mirositoare și gumoase, acizi vegetali, fermenți. Mierea se întrebuințează ca aliment, fiind hrănitoare

ca toate alimentele zaharate, dar ea strică dinții și gingiile; ea se mistuie greu, mai ales de către cei ce sufăr de dispepsie, de acrimi de stomac. În medicină mierea se întrebuințează ca emolient, răcoritor și în doză mare ca laxativ (40—60 gr.). Servește la îndulcirea ceaiurilor, la prepararea diferitelor *melite*. Pe cale rectală se dă în clizme (30—60 gr. la 400 apă), sau în supozitoare (săpunase) 3—5 gr.—La țară poporul nostru are credință că mierea este bună pentru orice bubă, fiindcă ea este adunată de către albine de pe tot soiul de flori. O foiță de floare de crin unsă cu miere este bună pentru tăieturi și beșica cea rea; sămânța de mac amestecată cu miere este bună la surpătură; pânda de paianjen cu miere vindecă mușcătura de paianjen, umflăturile și beșica cea rea; cu apa în care s'au spălat fagurii, după ce s'au scurs mierea din ei, se fac oblojeli pentru orice boală, precum și pentru durerea de gură. Pentru putere se dă lehzurilor miere rumenită în tigaie cu nițel rachiu de drojdii și alune pisate; iar convalescenților pentru întremare grabnică li se dă să bea dimineața câte un păhăruț, jumătate cu untdelemn și jumătate cu miere, bine bătute la un loc. Mierea fiartă în cloceți, curățită de spumă după ce se ia dela foc, se amestecă cu hrean ras pe răzătoare și se dă la ofticoși, câte 3 lingurițe pe fiecare zi.

Miere rozată (lat. *mel rosatum*), *miere de trandafiri*, *miericică*. — Se prepară astfel: se iau *petale de trandafiri roșii* uscate, 100 gr., se macerează (plămădesc) 24 ceasuri cu apă 600 gr., se strecoară, se stoarce și lichidul obținut se evaporează până la consistență sirupoașă; reziduiul se amestecă cu 5 părți alcool concentrat, se filtrează și filtratul se fierbe cu *miere depurată* 1000 gr., apoi se evaporează la un foc moderat până la o greutate de 1000 grame.

Miericică. — V. *Miere rozată*.

Migdale. — V. *Amigdale*.

Migrenă (lat. *hemicrania*, dela grec. *hēmisys*, jumătate și *kranion*, craniu), *emicranie* sau *hemicranie*. — Durere de cap, mărginită numai la o jumătate sau la o parte de cap. Adeseori ni se întâmplă să ne culcăm sănătoși, să

dormim bine ca de obicei și dimineața să ne deșteptăm cu durere de cap, mărginită la început numai într-o parte, mai cu seamă la stânga și care ocupă de obicei fruntea deasupra sprâncenei și tâmpla, dar care poate pe urmă să se întindă și de partea cealaltă, fără ca să fie aci așa de mare cum este în partea din care a început. Durerea este mai întâiu adâncă și greoaie, apoi din ce în ce crește și se apropie de piele, așa că de multe ori chiar și rădăcina părului este dureroasă; de unde la început durerea nu era decât un fel de greutate la cap, în curând se schimbă în niște svâcnituri din ce în ce mai dureroase, cu apăsare pe frunte și asupra tâmpelor, pare că ar veni cineva și ne-ar strânge capul cât se poate de tare cu amândouă mâinile, ca să-l sdrobească; afară de aceasta suntem cuprinși de un fel de tâmpeală, de toropeală, care ne trage la somn și această stare nu este întreruptă decât numai de svâcniturile mai sus pomenite; ne ferim de sgomot și de lumină; cea mai mică mișcare ne face rău; ne vine mai bine să stăm culcați, să dormim. În cele din urmă, dar nu întotdeauna, suntem cuprinși de greață și de vărsături, cari la început sunt compuse din băuturile ce am înghițit, din mâncare și mai pe urmă din venin (fiere, bilă). Când au încetat vărsăturile se pare că durerea s'a mai micșorat, începem să ne liniștim și, după ce am și dormit bine, ne sculăm iarăși sănătoși cum am fost mai înainte. Iată cum este de obicei migrena, adevărata migrenă, dar la mulți ea se arată în deosebite feluri: pe unii îi doare numai capul și au puțină greață, fără ca să-și întrerupă ocupațiile, alții sufăr în mod îngrozitor ca și când cine știe de ce boală cumplită ar fi cuprinși; s'ar putea zice că fiecare își are migrena lui. Dacă nu poate fi migrenă fără durere de cap, nu orice durere de cap este migrenă. Am spus deja la început că sunt multe feluri de dureri de cap, cari nu trebuie confundate cu migrena. Durerea migrenei se cunoaște prin aceea că ea vine din când în când, începe de obicei dimineața, când ne deșteptăm și merge crescând până la amiază, pentru a se sfârși

MIGR

odată cu seara. Migrena ne lasă întotdeauna noaptea mai liniștită, dacă nu bună de tot. Ori cât de mare ar fi, nu ne pune viața în primejdie și dela o durere până la cealaltă suntem pe deplin sănătoși. *Cauzele migreiei sunt multe* : ea se moștenește dela părinți, este rară în copilărie și la bătrânețe, se arată de obicei dela 15 ani până la 40 de ani, mai ales la femei decât la bărbați; se vede mai cu seamă la persoanele nervoase, cari sufer de stomac, de dispepsie (nemistuire), la cei cu reumatisme, la guțoși, la cei anemici la cei cu boale de piele, la cei ce duc o viață sedentară. La toți aceștia, cari sunt în acest mod predispuși la boală, cea mai mică abatere dela legile igienii, cea mai mică schimbare în obic. iurile vieții, nemân-carea la timp, nedormirea la ceasurile obișnuite, o bucurie, o supărare, pot să producă migrena. Tot astfel și lumina, sau căldura prea mare, mirosurile prea tari, munca prea încordată cu mintea, veghierile prelungite, lipsa de somn, mncarea prea grea și altele. — *Tratament.* Se recomandă multe medicamente : *antipirină*, în doză de 2 grame, luată în 2 rânduri, la interval de un ceas, într'o jumătate de pahar de apă minerală, sau în apă simplă, aromatizată sau nu. Unii bolnavi nu sunt ușurați decât luând 3—4 gr.; pentru ca stomacul s'o suporte mai bine se poate lua antipirina asociată cu *bicarbonat de sodă*. În loc de antipirină se poate lua : *piramidon* (50 ctgr. până la 1 gram), *fenacetină* (50 ctgr. până la 1 gr. în buline de câte 25 ctgr.), *acetamilidă* (2—4 buline de 2—3 ori pe zi), sulfatul, cloridrul sau bromidrul de *chinină* (25 ctgr. până la 1 gr.). Mulți doctori asociază în diferite proporțiuni antipirina, piramidonul, fenacetina cu cafeina, chinina etc. Se mai recomandă extractul de *câneapă de India* (cannabis indica) în hapuri de câte 15 mgr., *salicilatul de sodă* (4—6 gr. în 4 rânduri), *salofenul*, (2—4 gr.), *nitratul de aconitină* cristalizat (un sfert de mgr. în 2 rânduri). *Bromurele* pot aduce mari servicii celor ce sufer de migrenă, dându-se în doze crescânde de 2-3 gr.; În timpul din urmă s'a mai recomandat mult *migrenina* și *alonatul*, un

MIAZ

bun medicament în asemenea împrejurări. Se dă în pastile (2—3 pe zi). La femei se face tratamentul boalelor de ovar sau uter de care sufer.

Migrenină. — Este un produs special dat în contra *migreiei* și este compusă din : analgezină 4 gr. 60 ctgr. cafeină 45 ctgr., acid citric 5 ctgr. împărțit în 10 buline, din cari se va lua la fiecare ceas câte unul (până la 4).

Miază (gr. *myia*, muscă). — Se numește astfel o boală produsă de larvele *Dipterelor* (muștelor). Aceste larve, sau viermi, se introduc în cavitățile naturale, în urechi, nas, gură, etc., dând naștere la accidente inflamatorii și în aceste cazuri avem *miază externă*, spre deosebire de *miază internă*, produsă prin străbaterea larvelor în stomac și intestine, dând naștere la turburări grave : greață, vărsături, dureri de stomac violente, cari răspund în spate, colici intestinale uneori febră (fierbințeală) cu delir (aiurare). S'au observat cazuri de miază internă cu simptome cerebrale întocmai ca și cele produse de limbrici și de oxiuri (viermușori la șezut). Din cercetările făcute rezultă că poporul român cunoaște această boală și pe aceste larve numește *bondrești*, *careți*, *viermi*, *germi*. Musca atacă pe om numai în zilele calde de vară, pe câmp și în timpul somnului; ea este atrasă de mirosul oamenilor, cari trăesc la un loc cu diferite animale de casă, de mirosul rănilor al curgerilor de urechi (otite supurate), al durerilor de dinți și măsele (carii dentare), etc. Musca își depune ouăle pe acele locuri bolnave și larvele (viermii) eșind din ouă își caută hrană, mâncând tot ce le cade în cale, fie chiar aponevroze sau oase; pielea, chiar sănătoasă fiind, este atacată cu mare furie găurind-o și pătrunzând în țesutul celular își croesc tuneluri pe sub piele și prin mușchi; în urechi și în nas pot produce stricăciuni mari cari pot primejdui chiar viața. Muștele își pun ouăle pe substanțele alimentare (carne, lapte, brânză, unt, zarzavat) sau pe suprafața apelor stătătoare, cari fiind introduse în stomac duc cu ele și ouăle muștelor, iar larvele cari ies din acele ouă sunt date afară cu materiile fecale iar altele rămân pe loc dând naștere la turburări

grave, după cum am arătat mai sus.— Ca *tratament* pentru miază externă se recomandă îndepărtarea larvelor din răni, din cavitățile nasului, din urechi, cu spălături făcute cu *apă cloroformată*, *lapte cu cloroform*, *lapte cu ulei de ter-bentină*, *acid fenic*, *sublimat coroziv* în soluțiuni slabe.

Militar. — V. *Soldat*.

Milot. — V. *Sovârv*.

Minătară, minătări. — V. *Ciuperici*. (*Mănătârcile*).

Minerale (Ape). — V. *Ape minerale*.

Miniu. — V. *Plumb*.

Mintă, minată piperigă. — V. *Ismă*.

Mintă turcească. — V. *Roiniță*.

Miocardită (gr. *mys*, mușchiu, *kardia*, inimă, și *itis*, inflamațiune). — Aprinderea sau inflamațiunea țesutului muscular al inimii (v. *Coră*).

Miom (gr. *mys*, mușchiu, și terminațiunea *om*, care însemnează umflătură, tumoră). — Tumoră formată de fibre musculare. Se observă mai cu seamă la mîtră.

Miopie (dela grec. *myein*, a clipi, și *ops*, ochiu), *ponivoșie*, *vedere scurtă*). — Sunt unii oameni cari nu văd deslușit lucrurile depărtate și sunt siliți să le




Fig. 258.

a = imaginea, la ochiul miop, se formează înaintea retinei; b = după corecția cu lentilă imaginea se formează pe retină.

apropie de ochi, sau să se apropie de ele, dar dacă pun ochelari îndată le văd cum trebuie. Acești oameni se chiamă *miopi*, adică scurt-văzători, sau cu vederea scurtă, *ponivoși*. Ochiul miop este ceva mai lung decât ochiul normal, care vede mai bine și din această pricină imaginea obiectului pe care îl privește se formează *înaintea* retinei (vezi fig. a), în loc să se formeze chiar pe *retină* (membrana din fundul ochiului pe care trebuie să se formeze imaginile când vederea este bună, corectă). Miopia este de trei feluri: *ușoară*, *mișlocie*, *tare* (forte), când bolnavul nu vede decât la o depărtare foarte mică. Miopia poate să fie din naștere (*congenitală*) și să pro-

vină dintr'o boală organică a ochiului, o alterațiune în structura membranelor lui și în acest caz ea nu se poate vindeca și poate să meargă crescând până aproape de orbire. De obicei miopia este câștigată și se ivește la copiii și adolescenții cari urmează la școală și învață în rele condițiuni, mai ales la acei cari sunt predispuși, adică născuți din părinți miopi și cari au luat răul obicei de a ține cartea și caietele prea aproape de ochi. Să combatem din vreme acest obicei, arătând copiilor urmările rele ce-i așteaptă, și făcând ca iluminatul să fie bun, mobilierul școlii bine așezat, cărțile de cetit bine tipărite și metoda de a scrie să fie astfel în cât elevul să păstreze o ținută bună (v. *Școale*). Odată miopia ivită, ea se îndreaptă cu ajutorul sticlelor concave (v. *Ochelari*). Școlarii atinși de miopie ușoară se vor servi de acești ochelari numai când privesc în fundul școlii, la catedră, la tablă, la hărți și tablouri (ei pot ceti și scrie de aproape cu ochii liberi). Când miopia este mai înaintată trebuie să se poarte în continuu ochelari pentru vederea apropiată și pentru depărtare. Prin aceste mijloace se poate opri creșterea miopiei; de altfel un grad ușor de miopie prezintă pentru omul de studiu un avantaj, permițându-i să citească fără ochelari la o vârstă înaintată, atunci când printr'o lege naturală el este amenințat de *presbiție*. Miopul va începe cu ochelarii cei mai slabi, schimbându-i numai după ce a fost examinat de un medic specialist.

Miozită. — V. *Mușchi*.

Miră. — Este un suc gumi-rezinos ce iese din trunchiul arborelui *Balsamodendron Myrrhae*, din fam. amiridelor, care crește în Arabia și Etiopia. În medicină se întrebuințează ca excitant, tonic, emenagog. Se dă pe *dinăuntru* sub formă de praf, 50 centigr. până la 4 gr.; tinctură 2—8 gr. Pe *dinafară* sub formă de praf; tinctură, în colutoriu; intră în compozițiunea balsamului Fioravanti.

Miresme. — V. *Odorat* și *Odori*.

Miringită (Inflamațiunea timpanului. V. *Ureche*).

Mirodenil. — V. *Condimente*.

Miros, Mirosuri. — V. *Odorat* și *Odori*.

Mirosină. — V. *Muștar*.

MIRT

Mirt. — (*Myrtus communis*, fam. mirtaceelor). — Arbust frumos, în totdeauna verde, mirositor; originar din Europa de miazăzi, cultivat adesea și pe la noi ca arbust ornamental, în florării și prin case (Iunie—Iulie). Florile albe și frumos mirositoare ale mirtului sunt simbolul castității. Din foile acestui arbust se scoate prin destilațiune, un ulei esențial numit *mirtol*.

Mirtol. — Ulei esențial analog cu eucaliptolul, extras prin distilațiune din foile arbustului *Myrtus communis* din fam. mirtaceelor (vezi *Mirt*). Lichid gălbui, insolubil în apă, solubil în alcool, bun antiseptic al căilor respiratoare și urinare. Se dă în tusa cu miros urât, în gangrena plămânului, în cistită (aprinderea beșicii udului), în doză de 30 ctgr. până la 1 gr. în buline.

Mișcare. — V. *Exercițiu*, *Călărie*, *Danț*, *Fugă*, *Gimnastică*. *Innotare*, *Scrimă*, *Umblet* și *Vâslit*.

Mistreț, porc sălbatic. — Carnea de mistreț se deosebește de a porcului de casă prin aceea că nu este așa de grasă și are un gust special. Pentru mâncare nu este bună decât carnea de mistreț tânăr, pe care de altfel nu o pot mistui decât stomacurile sănătoase și tari. Carnea de mistreț bătrân este foarte tare și nu trebuie mâncată. Mai trebuie să avem griji ca animalul să nu fie bolnav de trichină.

Mistuire. — V. *Digestiune*.

Mistuire grea. — V. *Dispepsie*.

Misur. — V. *Porumb*.

Mitarcă petroasă. — V. *Ciuperci* (Mănățarcile).

Mitră (lat. *uterus*, grec. *hystera* și *metra*), *matcă*, *sgău*, *uter*. — Este organul în care oușorul (ovulul) fecundat se dezvoltă sub nume de *embrion* până la sfârșitul lunii a doua a *sarcinii*, iar de atunci înainte până la naștere sub nume de *făt*. Ea se află în micul lighian, de desubtul intestinului subțire; lungimea ei este de 7—8 ctm. lărgimea de 5 cm. și grosimea de 2—3 cm. Are forma unei pere cu baza în sus și care este *corpul* mitrei. Seamănă cu un *con* turtit de dinainte și dinapoi a cărui bază privește în sus, iar unghiurile (colțurile) lui de sus sunt formate de deschizătura *trompelor*. Trompele sunt niște canale (țevi) cari sunt în legătură cu *ovarele*. Partea de jos a mitrei, care

MITR

este mult mai îngustă și cilindrică se numește *gât* (*col*) și privește în jos făcând o ridicătură mică, cât un vâri de deget, în *vagin*. Această ridicătură adică *gâtul* mitrei; are un orificiu (*gura mitrei*) prin care curg *regulele* (sorocul, periodul). Mitra este formată de o căptușală (*mucoasă*) și de un *strai*



Fig. 259.—Organele genitale femești
a—ovarul; b—pavilionul trompei; c—corpul trompei;
d—uterul; e—vaginul.

muscular; ea este ținută în loc prin mai multe legături (*ligamentele*) cari îi dau voe să se întindă, să se umfle, în timpul sarcinii și să-și schime întru câțva direcțiunea sub influența lărgirii beșicii, care se află înaintea ei și a *rectului* (șezutului) care este înapoia ei. După




Fig. 260.—Secțiune longitudinală, făcută prin bazinul de femeie

1 = uter; 2 = bășica udului; 3 = uretra;
4 = vaginul; 5 = rectul; 6 = vulva.

naștere mitra scade repede și ia mărirea obișnuită. — *Boalele mitrei* sunt de patru feluri: *căderea*, sau *scoborârea* mitrei, *strâmbarea* (deviațiunea) ei, *aprinderea* și *tumorile* ei (rac, fibrom). — I. *Căderea*, sau *scoborârea mitrei*, are drept cauze *ruptura* completă, sau incompletă, a ei, în urma facerii, având

ca urmare o slăbire a părților vaginului, apoi sarcinile repetate în răstimpuri scurte, scularea din pat prea repede după facere, metritele (inflamațiunile mitrei) învechite, bătrânețea care micșorează tăria părților vaginului, obiceiul de a ține udul până



Fig. 261. — Secțiune generală a basinelui femeii (puțin oblic).

1=bășica udului; 2=uterul; 3=trompa;
4=ovarul; 5=gâtul uterului; 6=rectum;
7=clitôrisul; 8-9=buzele mici și mari;
10-11=osele bazinului; 12=ureterul.
a=grăsime; b=muschiul anusului;
c=muschiul vaginului.

se umflă mult beșica. Multă vreme nu se bagă în seamă căderea mitrei până ce mitra a căzut jos de tot și amenință să iasă afară din trup. Pentru a preîntâmpina această infirmitate, care se vede mai ales la țară și unde se chiamă




Fig. 262. — Schema organelor genitale feminine. (A = din față; B = profil)

A a=buzele mari; b=buzele mici; c=himenul și orificiul vaginal; d=vaginul e=uterul; f=trompa; g=ovar.
B: a=bășica udului; b=uterul; c=gâtul uterului; d=vaginul; e=canalul bășicii udului; f=tesuturile mucoasei.

și surpătură sau boșorogea, trebuie ca femeia după ce a născut să stea în pat cel puțin 2 săptămâni, ceea ce la noi nu se face, căci țărâna noastră în cele mai multe cazuri se scoală din pat a doua zi și face mămăligă. Se

mai recomandă ca femeia să umble încinsă câtva timp după ce a părăsit patul. Odată boala ivită se recomandă purtarea unor inele de cauciuc și aparate numite *pesare*, dar cel mai bun lucru este ca să se facă o *operație*, care constă în strâmtorarea vaginului și restaurarea perineului. — 2. *Strâmbările, sau deviațiunile mitrei*, sunt constituite printr'o *îndoire* în sens invers a celor două părți ale mitrei, *gâtul* și *corpul*. Aceste îndoituri pot să se producă în mai multe direcțiuni, înainte sau înapoi: *anteflexiune* și *retroversiune*. Aceste strâmbări sunt produse de scularea prea timpurie din pat după facere, atunci când mitra încă n'a scăzut la mărimea ei obișnuită, de sarcini multe în răstimpuri scurte, constipație (încuietură) prelungită. Unele femei au mitra strâmbă fără să aibă vreo suferință, alte femei au dureri în șale, greutate în partea de jos a pântecelui cu trăsături prin stingii, oboseală la mers și când stau mult în picioare, o durere la regule, cari țin mai mult ca de obicei, turburări nervoase, amețeli, durere de cap (migrenă), nevralgie sau dureri de dinți, de măsele, etc., turburări din partea tubului digestiv, apoi metrite, dismenoree și sterilitate (nu face copii). Pentru a preîntâmpina aceste strâmbări de mitră trebuie ca femeia să poartă din vreme cingătoare de pânză specială și *pesare*, dar și aci cel mai bun lucru este ca ea să fie *operată*. — 3. *Metrita* este aprinderea sau inflamațiunea mitrei și este de 2 feluri: *acută*, sau *cronică* (învechită). *Metrita acută* are mai multe *cauze*: introducerea în mitră a *microbilor* cari se găsesc în stare normală în vagin, sau în gâtul mitrei, sau a *microbilor* veniți din afară; scularea prea iute din pat după facere, oprirea repede a regulelor (a periodului) în urma unei răceli, infecțiunea septică după facere, întinderea la mitră a inflamațiunii vaginului (vaginita). În *semnele* metritei acute avem: o indispoziție generală, cu sau fără fiori, simțirea unei greutăți în pânză, care este foarte simțitor la pipăire, dureri în șale, stinghii și coapse, arsuri în vagin (în trup) cu trebuință deasă de a face udul (de a urina) și de a eși cu scaunul; după câteva zile o scurgeră

din vagin, sub forma unui lichid vâscos, gros, la început albui, apoi gălbui, câte odată roșietic (sanghinolent). Metrita acută se vindecă într'o lună până la 6 săptămâni, iar dacă nu se vindecă în acest timp ea trece în stare cronică. Uneori metrita se poate complica de peritonită. *Tratamentul* constă în odihnă la pat, cataplasme calde pe pânțe, simple sau stropite cu câteva picături de laudan. Se mai aplică, în loc de oblojei, sau cataplasme, pe pânțe un Priessnitz, care se face astfel: se ia un prosop îndoit, se moaie în apă rece, se stoarce bine și se pune pe jumătatea pântecelui din jos de buric, apoi se acopere cu o flanelă și pe deasupra cu o gutapercă sau o pânză (tafta) impermeabilă. În vagin se fac injecțiuni calde și prelungite cu un irigator mare, temperatura apei fiind de 45—50 grade, spălăturile se fac cu 4—10 litri de



Fig. 263.—Femeie gravidă

apă, de 2 sau de 3 ori pe zi. *Metrita cronică (învechită)* urmează câte odată metritei acute, însă cele mai adeseori ea este cronică dintr' odată și se poate ivi în toate perioadele vieții femeiești, dar mai cu seamă între 20 și 40 ani. *Între cauzele* predispozitoare avem: slăbirea organismului, constituții slabă, cloranemia, scrofuloza, oftica, alăptarea prelungită, hrana rea și puțină, lipsa de aer și de mișcare. Afară de aceste cauze generale mai sunt și altele locale sarcinile și pierderile dese, scularea din pat timpurie după facere, deviațiunile mitrei, vaginita). *Cauzele determinante* sunt aceleași pe cari le-am arătat la metrita acută, iar *semne locale*: scurgere albă mai mult sau mai puțin abundentă, periodul neregulat, pierderi de sânge (metroragii) din când în când, uneori însoțite de dureri mai mult sau mai puțin mari, constipație. Se poate complica de inflamațiunea trompelor și ovarelor. *Tratamentul gene-*

ral trebuie să fie reconstituant și să varieze după starea constituțiunii fiecărei bolnave, iar *tratamentul local* constă în imobilizarea pântecelui cu o cingătoare, bolnava să stea în pat. — 4. *Fibronul mitrei* este o tumoră care se ivește adeseori la femeile între 30 și 45 ani, de obicei înăuntrul mitrei, câte odată însă în afară, în pânțe. Între *semnele* fibromului avem: scurgere sau poală albă, uneori scurgere roșietică, alteori adevărate emoragii, repetate din ce în ce mai des, greutate în pânțe, oprirea udului, constipație, dureri în șale prin apăsarea tumorii. Tumora se simte cu mâna în partea de jos a pântecelui și uneori poate ajunge până la mărimea unui cap de om. *Tratamentul* constă în operație, care reușește cu atât mai bine cu cât se face mai din vreme. — 5. *Cancerul, sau racul mitrei*, se arată de obicei la femeile înaintate în vârstă și are ca *semne*: scurgeri de sânge (emoragii), scurgere de materie urâtă și cu miros greu și pătrunzător, dureri cumplite. *Tratamentul* și aci constă numai în operație, care nu reușește decât numai dacă se face la începutul boalei. Operația aceasta se chiamă *isterectomie*, adică tăierea și scoaterea mitrei cu totul. În asemenea cazuri trebuie întruvințat și tratamentul cu razele Roentgen și cu radiu, cari dau rezultate multumitoare de multe ori, dacă sunt aplicate la vreme.

Mixedem (dela grec. *myxa*, mucozitate și *oidema*, edem), *cachexie pachidermică*. — Această boală se vede din fericire foarte rar și este o cachexie specială provenită din lipsa corpului tiroid. Mixedemul poate fi din naștere (*mixedem congenital*, idiotie mixedematoasă), sau poate fi câștigat (*mixedem spontan* al adulților sau *mixedem operator* provenit în urma unei operații de gușă, *tiroidectomie*). *Semnele* acestei boale sunt: piele groasă, tare, uscată, aspră, gălbue; epidermul se scâmoșează în lamele (în sofizișori). Fața este lărgită, buhăită, palidă, nasul gros și turtit, pleoapele umflate, buza de jos atârână, mâinile vânteții, picioarele diformate, sămănând cu acelea ale unui pachiderm; dinții și părul cad, inteligența slabă ca la cretinism (vezi acest cuvânt). *Trata-*

ment : regim alimentar care să se compună din lăpturi, legume, carne fiartă, ouă, pește de ape dulci, fiert. Nu se va da : bulion, carne friptă, vânat, crustacee, brânză învechită, băuturi alcoolice. Ca medicament se va da

în praf sau tăblițe (de câte 30 centigrame una, 15 până la 20 pe zi, aceste medicamente însă se dau numai după recomandăția medicului.

Mixtură. — Amestec de medicamente lichide, așa de tare încât nu se poate




Fig. 264. — Glandele și secrețiunile lor în corpul feminin.

b=glanda hipofiză ; c=glanda tiroidă ; d=timus ; e=pancreas ; f=suprarenala ; g=ovar ; h=uter.

glandă tiroidă proaspătă de berbec, 2—3 grame pe zi, fie în bucățele zdrobite, cu pâine, sau puse în supă ori în lapte; se va urma 4, 5, 7 zile, apoi repaus de 4—5 zile, după care se va urma iar 4, 5, 7 zile și așa mai departe. Se mai dă *tiroidină* (vezi acest cuvânt)

lua decât sub formă de *picături*, sau pe o bucată de zahăr, sau într'un păhăruț cu apă sau alt lichid. Sunt mai multe feluri : *mixtură antigastralgică* (în contra durerilor de stomac) compusă din tinctură de foi de aconit, de beladonă și elixir paregoric, din fiecare

câte 5 gr., tinctură de colombo 10 gr.; din care se vor lua 5—10 picături înainte de mâncare; — *mixtură antinevralgică* (în contra durerilor de nervi), care se întrebuițează în fricțiuni pe gingii în doză de câteva picături: tinctură de foi de aconit 4 gr., tinctură de coca 2 gr., cloroform 1 gram.

Mizantropie (dela grec. *misos*, ură și *anthropos*, om). — O formă de *melancolie* (v. acest cuvânt).

Mlaștină (lat. *palus*), *smârc*, *baltă*, *mocirlă*. — Se formează în general pe un pământ argilos, puțin permeabil și nefavorabil curgerii apelor, așa că acestea rămân la suprafață și îl acoperă în mod incomplet. Aceste ape stătătoare, măloase, cu miros și gust greșos, nu sunt bune de băut (vezi *Apă potabilă*), dar ele alimentează o vegetație specială și înleznesc creșterea multor plante acvatice, cari se putrezesc iute sub influența aerului și a căldurii, dând naștere la gaze stricătoare, la miazme fetide și la diferiți germini de boală. Apele stătătoare, mlaștinele, smârcurile, etc., servesc ca loc de depozit ouălor țânțarilor, apoi cu ajutorul căldurii ouăle se dezvoltă, dau larve din cari ies țânțarii adulți, fără cari nu poate exista paludism. Condițiunile favorabile dezvoltării țânțarilor anofeli (apele stătătoare și căldura) se găsesc în multe părți ale globului pământesc, din care pricină și paludismul este așa de răspândit.

Moare. — V. *Varză*.

Moarte (lat. *mors*). — Prin moarte se înțelege încetarea definitivă a tuturor actelor a căror totalitate caracterizează viața corpurilor organizate. Uneori moartea este *naturală*, atunci când ea provine dintr'o slăbiciune înceată și progresivă a tuturor funcțiunilor, în urma uzurei tuturor organelor, după cum se întâmplă la adânci bătrânețe. Cele mai adeseori însă moartea este *accidentală*, rezultând dintr'o boală acută sau cronică, venită la orice vârstă și avem moarte *prin boală*, sau ea provine dintr'o *violență exterioară*, dintr'o *rănire* oarecare și atunci moartea se chiamă *violentă*. De obicei încetarea vieții este precedată de simptome grave cari constituie *agonia* adică lupta dintre viață și moarte. Uneori însă ea vine

pe neașteptate, fără vr'un semn vădit de mai înainte și atunci zicem că moartea este *subită*. Această moarte provine adeseori dintr'o *apoplexie fulgerătoare* (săgetătură), dintr'o *emoragie internă*, dintr'o *ruptură de anevrism* sau de *inimă*, dintr'o *angină de piept*, etc. — Să vedem *semnele morții*, sau mai bine zis *semnele* cari deosebesc *moartea reală* de *moartea aparentă*, pentru că se poate întâmpla ca cineva să ni se pară mort, pe câtă vreme el nu este decât leșinat și se citează multe cazuri în cari au fost îngropați astfel de morți, cari după câțva timp au înviat în groapă pentru a muri de-a binele în cele mai cumplite suferințe. Moartea aparentă (îndolnică) se întâmplă câte odată în urma asfixiei, leșinului, isteriei, apoplexiei, beției, fulgerăturii, înghețării, a unei lovituri puternice care sguodie creerul. Timpul exact cât ține o moarte aparentă nu se poate hotărî, căci totul atarnă de etatea omului și de cauzele morții. Ceeace se știe este că deșteptarea vine mai curând în cazurile de leșin și de sguodirea creerului în urma unei lovituri; ea vine mai târziu la persoanele isterice, la înghețați (30—40 de ceasuri și mai mult). *Semnele sigure*, neîndoioase, ale morții *reale* sunt: 1. *Aspectul general*: fața palidă, galbenă, gura întredeschisă sau căscată, falca de jos căzută, ochii deschiși și înțepeniți drept înainte, pupilele lărgite, corneea fără transparentă (ochii nu mai sunt sticloși), tâmplile infundate, corpul rece, respirația și bătăile inimii încetate. Când falca de jos este înțeleștată și se deschide gura cu putere, ea rămâne atârnată în jos. 2. *Încetarea respirațiunii* este un semn de moarte, dar fiindcă în cazurile de moarte aparentă respirațiunea este așa de slabă în cât nu o putem determina trebuie să întrebuițăm *procedul limbii*, adică să tragem limba afară cu putere și în mod ritmic, timp de ½ oră, precum și *respirațiunea artificială* și dacă nu se arată nici un semn de deșteptare atunci moartea este sigură. Lipsa respirațiunii se mai poate dovedi punând înaintea nasului și a gurii o oglindă și dacă ea rămâne curată, nu se acoperă cu ceață, nu se aburește atunci omul este mort. 3. *Lipsa bătăilor inimii*

și a pulsului sunt semne de moarte, dar sunt cazuri în cari circulațiunea sângelui este așa de slabă încât nu se simt nici bătăile inimii, nici pulsul (leșin, isterie, înghețare). 4. Dacă *legăm strâns cu o sfoară deasupra pumnului* și colorarea pielii dela mână nu se schimbă și vinele nu se umflă, atunci acesta este un semn sigur de moarte. 5. *Scăderea temperaturii* până la 23 grade este un semn sigur de moarte. 6. *Înțepenirea sau rigiditatea* cadavruului începe cu falca de jos, de unde se întinde până la picioare și ea dispare în aceeași ordine. Ea se ivește câteodată imediat după moarte) cum se întâmplă în tetan, în otrăvirea cu strichnină; aproape imediat, cum se întâmplă la cei morți prin trăsnet, insolatie, frig sau căldură mare (-10^0 sau $+45^0$); dar de obicei ea apare numai după câteva ore (cel puțin 4) și uneori chiar și după 16 ceasuri; durata ei este cam de 40 ore la copii și de 60—80 la adult. Înțepeneala dela persoanele înghețate ocupă tot corpul, pe câtă vreme a morții interesează numai mușchii. 7. Un semn sigur al morții adevărate este când o *injecție cu un gram de amoniac făcută sub piele* dă o pată negricioasă; pata neagră se arată în primele cinci ceasuri, înaintea tuturor celorlalte semne sigure de moarte. Injecția cu amoniac, făcută la o persoană a cărei viață nu s'a stins cu totul, dar care numai pare a fi moartă, produce o pată roșie ca vinul, 8. *Arsurile* pe un cadavru nu fac beșici, nici nu înroșesc locul, ci pielea se părlește și dacă se rade cu degetul, grăsimea de deșupt se găsește albă. În caz de moarte aparentă arsurile pe piele făcute cu ceară roșie, sau cu flacăra unei lumânări ținută foarte aproape, produc o beșică plină cu lichid seros (un fel de apă) și un cerc roșu împrejurul beșicii, care roșeață se întinde și sub arsură. 9. *Ventruza tăiată* (scarificată) pusă în regiunea epigastrică (la lingurea) îndată după moarte nu sângerează de loc, pe când la o persoană cu moarte aparentă ea scoate sânge. 10. *Inmoierea globului ocular cu turburarea corneei* (ochii nu mai sunt sticloși) este un semn sigur, dar el întârzie mult de a se arăta, dacă stă cadavruul la frig. 11. *Putrefacțiunea* (putrezirea) este cel mai sigur semn.

Ea se arată printr'o colorațiune verzuie pe pânțele în deșerturi (fosile iliace și flancuri); în timpul verii ea se observă cam între 8—16 ceasuri; iarna se face mai târziu, dar rar se întâmplă ca să întârzie mai mult de 24 ore. 12. *Pete roșii vinete* (lividități cadaverice), cari sunt formate de eșirea sângelui din vase sub piele în părțile declive și anume la spate la persoanele culcate, la picioare la cei spânzurați. Aceste pete se produc cam la 5 ore după moarte și prin locul lor, arată poziția corpului în momentul morții.—Dintre toate aceste semne trei sunt cele mai sigure fără de cari nu putem declara pe nimenia mort și anume: *înțepenirea sau rigiditatea cadaverică, inmoierea globului ocular cu turburarea corneei și începutul putrezirii.*

Mocirlă. — V. Mlaștină.

Modălcă, broască, chist sebaceu. — O tumoră, sau umflătură care se dezvoltă sub piele, între piele și carne, sau os, care cuprinde o materie grasă, albă sau gălbuie, având consistența seului



Fig. 265. — Modălcă (chist sebaceu).

A—păr cu glandă sebacee: normală = b și hipertrofiată = c.
B—modălcă la frunte;
C—modălcă tăiată în două

sau a mierii. Aceste modălci se pot dezvolta în toate părțile corpului, dar de obicei se văd sub pielea capului, la frunte, mai rar la față, la umeri; ele sunt produse prin hipertrofia sau creșterea glandelor sebacee, alipite de un fir de păr. Aceste tumori sunt rotunde sau turtite și cresc cu încetul, putând ajunge până la mărimea unei nuci, sau portocale; ele sunt uneori tari, rezistente, alteori moi, ca și când ar conține un lichid; mai mult sau mai puțin mobile sub piele; pielea este întinsă și subțire, ele nu sunt dureroase, nici periculoase; dacă se sparg se scurge conținutul dar după ce s'a închid el se reface la loc; când sunt prea mari ele sunt supărătoare și pot provoca durere de cap. *Tratamentul* constă în operație.

Modălcă. — V. Caută la Ganglion.

Mojdrean. — V. Caută la Mân.

Mol, mărîn. — Se numește astfel o massă cărnoasă care se produce în mîtră în urma fecundațiunii. Sunt trei feluri : 1. *Mol embrionar* când oul s'a oprit în desvoltarea sa și se termină de obicei prin abort (lăpădătură), către a treia sau a patra lună. Resturile embrionului se găsesc înotând în apa conținută într'o pungă formată de caducă, corion și amnios. 2. *Mol cărnos*, care rezultă din desvoltarea molului embrionar prin șederea lui în mîtră și ale cărui membrane iau o consistență și o grosime foarte mare, în urma unei nutrițiuni exagerate. Volumul său variază dela mărimea unui ou până la aceea a unui făt la termen. Țăsătura lui este filamentoasă și seamănă cu aceea a placentei. El este expulzat cam pe la a cincea sau a șasea lună. Uneori se găsesc în interiorul lui rămășițele unui făt închistat. 3. *Mol idatic* sau *vezicular* care constă într'o serie de vezicule (beșicuțe reunite în formă de ciorchină, cari vezicule sunt de diferite mărimi și sunt pline de un lichid limpede fără urme de echinococi. In acest fel de mol fătul a fost rezorbit și vilozitățile corionului s'au ipertrofiat pentru a constitui veziculele. Molul vezicular este dat afară dela a patra până la a șasea lună, în mai multe rînduri și în bucăți (prin lambouri) ceea ce expune femeia la emoragii mari și la rezorptiuni putride, cari produc moartea. *Tratament* : înainte de expulzare se vor combate emoragiile prin tamponament vaginal, iar dacă emoragiile se repetă prea des se va practica *facerea provocată*.

Molari. — V. *Dinți*.

Moleșire. — V. *Toroșeală*.

Moleți. — Țăranii noștri cred că copiii, cari au nasul uscat, fără muci, și se freacă mereu la el, sunt bolnavi de moleți. Boala ar fi cauzată de deochiu și se vindecă numai cu descântece.

Medicina nu cunoaște o asemenea boală, semnele ei fiind, în general, semnele tuturor boalelor însoțite de temperatură.

Molimă. — V. *Epidemie*.

Molipsire. — V. *Contagiune*.

Molipsitoare (Boale). — V. *Contagioase* (Boale).

Moloachă. — V. *Roiniță*.

Molotru. — V. *Molură* și *Sulfină*.

Molură, anison, chimen dulce, fenicul, molotru, săcărea, săcărea de grădină (*Foeniculum officinale*, fam. umbeliferelor). Plantă erbacee, foarte aromatică cu florile galbene și fructele lunguete și aromatice, care se cultivă pentru uzul economic. In medicină se întrebuințează frunzele, fructele și rădăcina, cari au proprietatea de a fi aperitive, carminative, diuretice, emenagoge și stomachice. Se dă sub formă de : ceaiu (infuziune) din 10 gr. la 1000 gr.; idrolat. 25—50 gr.; ulei volatil 1—10 picături. Pe dinafară se întrebuințează frunzele sub formă de cataplasme; uleiul volatil în pomadă (alifie). — La *șară* fiertura (decoctul) de sămînțe se dă la copiii de țată pentru mătrice. Din cauza mirosului aromatic se pune în rachi.

Momiță. — V. *Ganglion*.

Monesia (*Chrysophyllum glycyphleum*, fam. sapotaceelor). — se întrebuințează florile și frunzele, cari conțin acid tanic și un principiu activ *monezină*. Lucrează ca astringent. stomachic ; se dă în contra diareei, a emoptiziei, a metroragiei, în contra ulcerelor cutanate, a trînjilor și a crăpăturilor dela șezut. Pe *dinăuntru* se dă extract 50 ctgr. până la 4 gr., monezina 3 ctgr.; siropul conține 50 ctgr. la o lingură. Pe *dinafară* : extractul, în praf, în alifie.

Monoclu (grec. *mónos*, singur, și lat. *oculuz*, ochiu). — O lentilă de ochelari, purtată la un ochiu.

Ea strică vederea, produce *strabism*, când amândoi ochii sunt slabi, căci ochiul care poartă monoclu nu se mai forțează pentru a vedea bine, pe câtă vreme celalt este silit s'o facă, astfel că ochii nu se mai acordează în mișcările lor. In acest caz bine e ca omul să poarte ochelari cu sticle de forță egală. Când amândoi ochii sunt slabi în mod neegal, atunci se vor întrebuința ochelari ale căror sticle vor avea puterea diferită (v. *Ochelari*). Monoclu se va purta numai în două împrejurări : când un ochiu este foarte bun și celălalt are trebuință de o sticlă care să-i mărească vederea și atunci când unul din ochi este cu totul pierdut și celălalt are nevoie de sticlă potrivită ; dar și în asemenea cazuri e bine să se poarte ochelari, nu monoclu.

Monomanie. — V. *Manie*.

Monoplegie (dela grec. *monos*, singur, și *plessein*, a lovi). — Paralizie mărginită la un singur membru.

Monotal. — Eterul gaiacolului, fără să aibă acțiunea caustică a acestuia. Analgezic. Se întrebuințează pe dinafară, aplicându-l pe piele, în diferite dureri nevralgice, în junghiu, în durerile nervoase ale neurastenicilor, etc. Doză : 2—4 gr. pe zi, curat, în uşoare fricțiuni sau în ungeri, odată sau de două ori.

Monstru (dela lat. *monstrare*, a arăta). Animal care prezintă o constituțiune neobișnuită în totalitatea părților sale, sau numai în unele dintre ele. În cea mai mare parte monștri se datoresc unor cauze fizice exterioare cari lucrează asupra dezvoltării unui ovul după fecundațiune, cum ar fi de exemplu o anomalie în lichidul amniotic care încunjură oul. În unele cazuri se invoacă drept cauză ereditatea. Monștrii se produc sau printr'o oprire în dezvoltare, care poate fi complectă, printr'o anomalie a nervilor sau vaselor, sau o aderență între embrion și învelișele lui. Monștrii se mai pot produce prin fuziunea unor organé cari de obicei sunt deosebite.

Mont. — V. *Ciont.*

Monteoru. — V. *Sărata-Monteoru.*

Moral (lat. *moralis, ethicus*). — Toată lumea știe ce influență mare are moralul asupra fizicului; un om istovit de nenorociri este cu mult mai predispus la boale, cari sunt mai grave la el. Intre mijloacele de vindecare avem și așa zisul *tratament moral*, care se aplică cu bun succes la bolnavii cari se cred mai bolnavi decât sunt în realitate, bolnavi cari își observă cu deosebită atențiune cele mai mici turburări ale organelor, cum ar fi : răcirea picioarelor, sudoarea, o palpitațiune ușoară, sau chiar unele semne cari există în stare normală, cum ar fi bătaile inimii, schimbarea obișnuită a temperaturii în timpul zilei. *Tratamentul moral* constă în aceste cazuri în a arăta bolnavului că toate acestea se observă și la ceilalți oameni cari sunt în jurul lui, în a-i schimba cursul ideilor prin conversațiuni și cetire, a-i da speranță de vindecare sigură și complectă, etc.

Morb. — V. *Boală.*

Morb perforant. — Această boală constă într'o rană sau mai bine zis un ulcer, care se arată în talpă în dreptul încheieturilor degetelor cu talpa; uneori se poate ivi și la călcâiu și de deșutul degetelor. Este produsă prin apăsarea pielei între oasele piciorului și talpa unei încălțăminte rău făcute, din care pricină se formează mai întâiu o bătătură, iar sub aceasta o pungă plină cu apă. În unele cazuri boala se pare că începe prin inflamațiunea oaselor. Boala se arată prin îngroșarea pielei, un fel de bătătură, care coace, face materie și sparge formând un ulcer rotund înconjurat de un cerc gros de piele; ulcerul merge crescând și adâncindu-se până la oase, cari la rândul lor se atacă și ele (osteită, carie și necroză). *Tratament.* Odihnă, injecțiuni iritante, operație, adică curățirea și ridicarea părților bolnave.

Morbiditate (dela lat. *morbus*, boală). Prin acest cuvânt se înțelege manifestățiunea, rezultatul total al condițiunilor cari expun pe un individ, sau o colecțiune de indivizi, la boală și cari se deosebesc de *aptitudine* sau de *predispozițiune personală*. Morbiditatea studiată în populațiunea militară, în spitale, în închisori, în stabilimente industriale, în zonele climatologice, în diferite regiuni ale pământului, ne dă prețioase deslușiri cu privire la influența etăților, a sexelor, a mediului igienic, a climatului, a raselor, etc., asupra condițiunilor de aptitudine în a contracta boalele.

Morbili. — V. *Pojar.*

Morbul lui Pott, sau *tuberculoză vertebrală*. — V. *Cocoașă și Columna vertebrală.*

Morcov (*Daucus Carota*, fam. umbeliferelor). — Plantă erbacee cu rădăcina groasă și cărnoasă, roșie sau galbenă și dulce. Se cultivă mult prin grădini ca plantă culinară, fiind o legumă foarte bună (Iunie—Septembrie). În medicină nu se întrebuințează. — La *șară* se pune morcovul copt și sfărânat la bube dulci; crud și ras pe răzătoare se pune la rănile cu viermi; dulceață de morcov ras se dă la tusa măgărească.

Morcov sălbatic, *rușinea feței* (*Daucus Carota Sylvestris*, fam. umbelifere-lor). — Plantă erbacee cu rădăcina în

forma fusului, care crește prin fânete, poieni, câmpii și pe marginea drumurilor. Sămânțele de morcov sălbatic sunt diuretice și carminative.

Morfină, — Alcaloid principal al *opiului*. Analgezic puternic, bun pentru orice durere, acută sau cronică, pe care o potolește repede. În doze mici morfina calmează tusa și oprește diareea. Ca ipnotic ea nu lucrează decât ca analgezic, în contra insomniei dureroase. Ea se mai dă pentru a combate unele efecte toxice ale cafeinei, atropinei, chininei. Nu este bună în bronchita difuză, care amenință cu asfixie, arterioscleroză, debilitate senilă, etc., și la copiii mici. Se dă pe *dinăuntru* și în injecțiuni sub piele 1—5 ctgr. pe zi. — **Acetatul de morfină** : 1—5 ctgr. (neuzitat). **Bromidratul de morfină** : 5 mgr. până la 1 ctgr. **Cloridratul de morfină** : 1—5 ctgr. **Sulfatul de morfină** : 5 mgr. până la 3 ctgr. **Otrăvirea cu morfină** are următoarele semne : la început excitațiune psihică plăcută cu mărirea activității fizice și grăbirea bătăilor inimii ; apoi uscăciunea gurii, sete mare, durere de cap, moleșeală, simțire de greutate în membre, neputință de a se mișca, somnolență și micșorarea sensibilității ; după acestea vine o stare de somn profund, din care nu mai putem deștepta bolnavul în același timp pierderea reflexelor, ochii pe jumătate închiși, pupilele foarte contractate, falca de jos căzută, pielea rece și vâscoasă. Viața nu se mai arată decât numai prin dănuirea circulațiunii și a respirațiunii : respirațiunea este înceată, greoaie, neregulată și stertoroasă ; pulsul slab, mic, abia se simte, pulsul și respirațiunea încetează și moartea vine în colaps. **Tratament**. Dacă otrava a fost luată prin gură se vor da medicamente de vărsat (vomitive) cum sunt : ipeca, apomorfina, se va face spălarea stomacului. Dacă morfina a fost absorbită prin injecțiuni sub piele acest tratament nu mai are loc. Se va ține bolnavul în sus, se va lovi cu o cârpă udă, i se va vorbi în continuu, ca să nu adoarmă, aplicațiuni de electricitate pe membre, amoniac sub nas, clizmă de jumătate de litru de cafea tare și caldă, sau injecțiuni sub piele cu cafeină. Când începe să slăbească

respirațiunea se va face o injecțiune cu un miligram de sulfat de atropină, repetată după un sfert de ceas dacă e trebuință. Dacă n'avem atropină se va face o injecțiune sub piele cu 1 gr. 75 de tinctură de beladonă și respirațiune artificială. Se va face o injecție cu 20 cmc. dintr'o soluție 5% de permanganat de potasiu. (Pentru *otrăvirea cronică* v. *Morfinism*).

Morfinism. — Otrăvirea cronică cu *morfină* se observă la toți fumătorii de *opiu*, precum și la unii bolnavi cari abuzează de morfină prin injecțiuni sub cutanate. Sub influența acestui abuz se ivesc repede : slăbirea considerabilă a memoriei și a facultăților intelectuale, cu amețeli aproape constante, durere de cap, dureri nevralgice variate. amorțirea (anestezia) pielii, uneori chiar paralizie localizată la o mână, la un picior. Când se încetează în mod brusc cu întrebuintarea morfinei agitațiunea devine foarte mare și adeseori se observă accese cari seamănă cu acele dela *delirium tremens*. Prin urmare trebuie să se înceteze întrebuintarea morfinei *în mod progresiv, încet*. Pentru a ocoli morfinismul și *morfinomania* este bine ca numai doctorul să facă aceste injecțiuni.

Morfinomanie. — Nevroză determinată de abuzul administrării preparatelor de morfină și mai cu seamă de întrebuintarea injecțiunilor sub piele. Prima injecție aduce o euforie — impresia că te simți bine — asemănătoare cu cea produsă de opiu. Durerea, dacă există, dispare imediat. O moleșeală cuprinde picioarele, apoi întreg trupul. Grijele și ideile triste se duc. Ai impresia că ai devenit mai inteligent, că forțele intelectuale îți sunt mai vii ; moleșeala fizică te face să stai în nemîșcare. Ideile îți vin fără efortare și se îmbină cu planuri minunate de lucru, meditezi ca un savant. E o fericire în repaos, o fericire contemplativă. Aseseori timpul îți pare că se micșorează, că într'o clipă trăești o existență. Imaginațiunea este exaltată, dar conștiința de ea însăși. Astfel se prezintă perioada de inițiere euforică, luna de miere a morfinomanului. A doua perioadă e de ezitare : unii caută să scape, alții renunță complet, dar cei mai mulți trec deadreptul în pe-

rioada a II-a, morfinomania propriu zisă. Atenția și memoria îți slăbesc, nu-ți mai vezi de meserie, întreg gândul îți este la morfină, nu te dai în lături dela nimic ca să ți-o procuri: furi, faci escrocherii, omori, de ești femeie te prostituezi primului venit care îți dă morfina. Îți dai seama de propria-ți vină, dar n'o poți opri, căci voința ți-e slăbită. Nu vrei să mai știi nici de prieteni, nici de propria-ți familie, simțul moral ți-e anesteziat. Inima și forța musculară îți slăbesc; acuitatea vizuală ți-e diminuată. Visele devin urâte, coșmaruri. Morfinomanul întrebuințează seringă să-și facă înțepătura pe stradă, sub masă, în dosul pianului, în closet, oriunde și ori de câte ori cere nevoia. Ultima perioadă e cachexia, grozava slăbire scheletică, cu vărsături și diaree, cu demență și moarte. (După Dr. Rețezanu).

Morun (*Gadus morrhua*). — Un pește care aduce mari foloase omenirii. Morunul se află în mare cantitate în mările de nord ale Europei și ale Americii, se mai află în Marea Neagră și cea Caspică. Trăiește la mari adâncimi și nu se apropie de coaste decât când leapădă icrele, când se pescuiește cu înleznire și în mare măsură. Ca hrană (aliment) carnea de morun este nutritivă și se mistuie cu înlesnire când este proaspătă. Carnea de morun, conservată, sărată, nu este așa de plăcută la gust ca cea proaspătă și se mistue mai greu, din care cauză este bine ca cei ce sufăr de boale de stomac, de dispepsie, să se păzească de ea. Dar cel mai mare bine ce-l aduce omenirii morunul este prin untura de pește care se scoate din ficatul lui, despre care se vorbește în articolul *uleiul* (la *uleiuri medicinale*) și care pentru copii este foarte trebuincioasă. La țară pielea de morun se pune pentru a scoate os de șarpe. În Dobrogea lipovenii dau la copii să bea lapți de morun pisat în contra tusei și ca să scuie flegma. Pentru oftică se mănâncă 40 de zile ficat de morun, fript pe grătar.

Morună. — V. *Mușetel*.

Morvă. — V. *Răpciugă*.

Mosc. — Se numește astfel un produs de secreție al unei glande de pe pânțelele animalului *Moschus mos-*

chiferus, mamifer rumegător, care locuiește în părțile centrale ale Asiei, mai cu seamă în Tibet. Moscul de Tibet vine în mici beșici uscate, cari sunt însăși glandele secretoare, de formă eliptică și de mărimea unui ou de porumbel. Pe dinăuntru glanda este căptușită de o membrană mucoasă cu o mulțime de cute, printre cari se află produsul de secrețiune. Acest produs este o substanță unctuoasă, gumoasă, moale sau cam solidificată, roșietică negricioasă și când beșica este mai uscată se observă în ea niște puncte rezinoase lucitoare de culoare galbenă; mirosul său propriu este tare, greu și pătrunzător; gustul este aromatic, amar. Moscul lucrează ca stimulent difuzibil, antispasmodic puternic. Se dă în natură 5 cgr. până la 1 gr. în pilule sau în poțiuni; mosc pulverizat în clizme; tinctură (1/10), 10 până la 50 picături în poțiuni; în injecțiuni sub piele: tinctură de mosc 1 gr.; apă distilată 44 gr.; 2—3 cmc. în 24 ore.

Mucezeală (lat. *mucedo*), înfloreală. —

Pe suprafața substanțelor organice, de origine animală sau vegetală, când ele încep a se strica, a fermenta (a fierbe, a se dospî), sau a se descompune (a putrezi), se ivesc niște bureți foarte mici, cari constituie ceea ce se chiamă *mucezeală*, sau *înfloreală*. Cele mai multe din substanțele cu cari ne hrănim se mucezesă când sunt preparate de mai mult timp, mai cu seamă când stau la umezeală; astfel *pânea* care în unele părți, mai ales la țară, se prepară numai odată la săptămână, carnații, cartaboșii, șunca afumată, brânzeturile, dulcețurile, pastele, fructele crude, coapte sau uscate, etc. Aceste mîncări mucezite pot să producă, dacă le mîncăm, greață, vărsături, colici, diaree, ceea ce ar putea să ne facă să credem că ne-am otrăvit cu ceva, dar toate acestea dispar repede. Să fim cu băgare de seamă și să nu mîncăm partea mucezeită, curățind-o cu cuțitul.

Muci. — V. *Răpciugă*.

Mucilagiu (dela lat. *mucus*). — Medicament lichid sau semilichid, viscos, a cărui consistență este datorită gumei, sau altor substanțe analoage, ținute în soluțiune, sau în suspensiune în apă. Cele mai bogate în mu-

cigaiu sunt : sămânța de in, rădăcina de nalbă, mușchiul de Islanda, florile de lumânărică, fructele pectorale (cormale, gutui, smochine, etc.). Mucilagiile se prepară astfel : se pun 30 gr. din sămânță de in, de gutui, rădăcină de nalbă, etc. în 150 gr. de apă caldută, care se agită din când în când în timp de 6 ceasuri și apoi se strecoară, sau se pisează 30 gr. de gumă arabică într-o piuliță de marmură cu tot atâta apă. Mucilagiile se întrebuințează în clizme, loțiuni, fomentațiuni (oblojeli), în tizane, ca emoliente.

Mughet. — Caută la Mărgăritărel.

Mure. — Sunt fructele unui arbore numit *mur*, *rug de mure*, sau *amură* (*Rubus fruticosus*, fam. rozaceelor), care crește prin păduri și tufișuri, prin locuri necultivate și pietroase și prin poieni (Iunie-Iulie). Sucul fructelor este acidulat și astringent. Siropul de mure se întrebuințează pentru a îndulci băuturile răcoritoare și gargarismele. — La țară ceaiul de rug de mure se bea pentru poală albă. Vița de mure, de bostan, castraveți și holeră (xantium) se fierb toate la un loc și se face baie pentru bolnavii de coleră.

Muriatic (Acid). — V. *Cloridric (Acid)*.

Mușățăl. — V. *Mușețel*.

Muscă. — Insectă dipteră, adică cu două aripi, cunoscută de toată lumea. Este bine să ne păzim de muștele cari zboară prin apropiere de abatorii, de măcelării, de tăbăcării, de mortăciuni, căci pot să sugă sânge otrăvit de dalac și să-l depună sub pielea omului prin înțepătură (v. *Pustula malignă*). — La țară poporul cunoaște toate soiurile de muște câte sunt pe la noi și excrementele muștei de casă (*musca domestica*) le întrebuințează ca *diuretic* (pentru a face ud mult, pentru care se spală geamurile și farfuriile murdărite de muște și apa aceea o beau; musca de cal (*gastrophilus equi*) arsa și pisată se bea cu apă pentru friguri.

Muscarină. — V. *Ciuperca*.

Mușcatu dracului (*Scabiosa Columbaria*, fam. compozitelor). — Plantă erbacee care crește pe colinele și fânețele din munți (Iunie—August). Se întrebuințează rădăcina pentru taninul care îl conține, din cauza căreia lucrează

ca astringent. Se dă sub formă de ceaiu 20 la 100. — La țară se fac cu el scăldături la copiii nou născuți.

Mușcătură (lat. *morsus*). — Plăgă contuză făcută prin mușcătură de om sau de animale. Plăgile cele mai grave sunt cele făcute de cal, apoi cele de om, de câne, etc. Mușcăturile sunt *simple* când animalul n'a depus în cărnuri nici un fel de otravă. Gravitatea mușcăturilor atârnă dela întinderea și adâncimea plăgilor, cari sunt câte odată foarte mari, iar cărnurile sunt zdrobite și rupte. Plăgile prin mușcătură se pot complica prin accidente inflamatorii și mai cu seamă de flegmoane. *Tratatamentul* mușcăturilor este același ca la toate plăgile contuze : spălare și dezinfectare cu diferite soluțiuni antiseptice (acid fenic, sublimat corosiv, etc.), pansament umed la început, uscat pe urmă și repaus. Când însă mușcăturile sunt complicate cu depunerea unei otrăvi în rană, cum se întâmplă în mușcăturile de vipere sau de animale turbate, atunci tratamentul trebuie să fie mai energic și grabnic (vezi *Turbare* și *Vipere*).

Mușchi. — Mușchii formează *carnea* corpului. Ei sunt groși la mijloc, care este *corpul* lor și se subțiază spre capete unde fibrele lor încetează de a mai fi, pentru ca să se termine printr'un țesut alb ca sideful, care se numește *tendon*. Fiecare mușchiu are două tendoane și fiecare din acestea se prinde de un os diferit ; când partea de mijloc a unui mușchiu se strânge (se contractă), se scurtează, cele două capete ale lui se apropie între ele, așa încât capătul care se prinde de osul cel mai mobil îl apropie pe acesta de osul celalt și în modul acesta se îndeplinesc toate mișcările noastre. Toate părțile corpului sunt prevăzute cu mușchi, al căror rol în viața noastră este foarte mare, căci cu ajutorul lor prindem lucrurile, umblăm, ne mișcăm și ne punem în legătură cu tot ceea ce ne înconjură. Mulțumită obișnuinței, cele mai multe din mișcările noastre sunt în aparență înconștiente, deși mușchii sunt supuși voinții noastre. Cu cât un mușchiu lucrează mai mult cu atât crește și devine mai puternic ceea ce este în folosul nostru. Un om voinic se cunoaște prin puterea sau forța lui

MUȘC

musculară, pe care o dezvoltă *exercițiul* sub toate formele lui (*călărit, danș, fugă, gimnastică, scrimă, umblet*); un exercițiu prea violent și de lungă durată produce *oboseală*. — *Boalele* mușchilor sunt multe: *contuziunile* sau *loviturile*, produse prin cădere sau prin loviri, sunt urmate de infiltrațiuni de sânge prin ruperea fibrelor; durere adâncă, mare, cu înțepenirea mușchiului, iar dacă ruptura este mai mare se fac umflături prin îngrămădire de sânge. Ca *tratament* se recomandă odihnă în pat, masaj; când durerile sunt




Fig. 266. — Mușchii superficiali dela partea anterioară a corpului.

mari morfină. *Plăgile* sau *rănirile*, când tăietura se face în lungime și nu la adâncime mare, se vindecă ușor; când tăietura se face în curmeziș, depărtarea buzelor plăgii este mai mare și vindecarea se face cu mult mai încet și trebuie să dăm membrului o poziție favorabilă apropierii fibrelor între ele sau le coasem. *Miozita*, sau *inflamațiunea mușchilor*, poate fi produsă de o înțepătură, de o tăietură, o lovitură,

MUȘC

sau poate fi produsă în cursul, sau în urma unei boale generale (febră tifoidă, infecțiune purulentă, oftică, etc.). *Semnele* miozitei sunt: durere, umflătură tare și dureroasă a părții bolnave, care se poate înmoaia prin supurațiune, formând un *abcès*, febră de obicei ușoară. Ca *tratament* se recomandă repaus, iar pentru supurație vezi cuvântul *Plăgi*. *Atrofia* sau topirea mușchilor se produce ori de câte ori un mușchiu stă în nemișcare, în nelucrare, cum se întâmplă când se pune membrul într'un aparat special pentru a



Fig. 267. — Mușchii superficiali ai feței posterioare a corpului.

vindeca o ruptură de os. Această atrofie musculară mai poate fi și un semn al boalelor măduvii spinării. — Intre boalele de mușchi mai aven *paralizia*, *reumatismul* și *torticolis* (vezi aceste cuvinte).

Mușchiu de vacă. — Este carnea care se află dealungul spinării, în adâncime, în regiunea rinichilor. Această carne este fragedă, lipsită de grăsime și foarte hrănitoare, bună mai ales pentru cei slabi și convalescenți. Carnea crudă care se dă bolnavilor se prepară din mușchiu.

MUȘC

Mușchi creți, de munte (*Lichen islandicus* sau *Cetraria islandica*, fam. lichinelor). — Cresc pe pământ, în locurile uscate din regiunile nordice și prin munți. Acest lichen conține o substanță hrănitore numită *lichenină* (amidonul de lichen), o substanță amară numită *cetrarină*, etc., substanțe cari fac ca el să fie întrebuințat în medicină în boale de piept, în contra frigurilor și ca tonic. În tusa și în răgușeală este foarte bun fiindcă potolește înțepăturile și răcăiturile din fundul gâtului cari provoacă tusa. Pentru aceasta se prepară un fel se tizănă în modul următor: se fierbe mai întâiu în apă pentru ca să iese amărăciunea, apoi se spală în altă apă și se fierbe din nou timp de un ceas; această fiertură se poate bea curată sau cu lapte (pe jumătate). Lichenul fiert numai odată este amar și fiertura se dă în contra frigurilor și ca tonic (pentru putere), dar produce și curățenie în acelaș timp.

Mușetel, camomilă, moruna, romăniță. (*Matricaria Chamomilla*, fam. com. pozitelor). — Plantă erbacee care crește prin locuri virane, necultivate, pârlouge dărâmaturi, ogrăzi, grădini pe lângă drumuri. — Florile sunt foarte aromatice și au un miros plăcut. Principiul activ este un ulei volatil. Proprietățile ei sunt: stomachică, carminativă (face vânturi), nervină și antispasmodică. *Ceaiul* de mușetel, îndulcit potrivit și luat cald după mâncare ușurează mistuirea și face vânturi, domolește durerile de stomac și de mae (colicile intestinale, mătricea). Acest ceai face să asude omul și prin urmare taie fierbințeala și este bun în cazurile de constipație provenită din lenevia mațelor. *Extractul* se dă 25—50 ctgr. *uleiul volatil* 1—10 picături; *idrolatu* 25—100 gr.; *praful* 1—8 gr.; la ceai se pun *flori* 5 gr. la 1000 apă. Pe *dinafară* se întrebuințează *uleiul de mușetel* în fricțiuni contra durerilor reumatice, în lovături și scrintituri, iar pentru a-i mări puterea liniștitoare se poate pune și praf de camfor și atunci avem *uleiul de mușetel camforat*. — În *popor* ceaiul de floare de mușetel se dă lehuzelelor să bea trei zile, după ce au născut, ca să se curețe pe dinăuntru; deasemenea se dă și copiilor nou-născuți.

MUȘT

Floarea fiartă în vin se bea pentru *treapăd* (urdinare); amestecată cu sare se pune în săculețe și servește drept cataplasma caldă și uscată pentru *durere de măsele*, durere de urechi și nevralgii. Pentru *durere de gât* se face gargară cu ceaiu de mușetel.

Muștar. — Sunt mai multe plante din familia cruciferelor cari poartă numele de muștar. Noi ne vom ocupa aci numai de două: 1. *Muștar alb*, numit *rafiță albă*, *rafiță de muștar* (*Sinapis alba* sau *Brassica albă*), crește prin sămănături, uneori este cultivat pentru semințele sale din cari de prepară muștarul de bucătărie. Grăunțele sale, rotunde, netede, cuprind o cantitate mică de mironat de potasă, de *mirosină* și stimulează intestinul combătând constipația obișnuită (laxativ). Pentru acest sfârșit se ia în doză de 1 până la 2 linguri pline, dimineată pe nemâncate sau după masă bândn-se cu apă; lucrul acesta se poate repeta mai multe zile dearându-l însă fără să se mărească doza pentru ca să nu irite și să inflameze intestinul. 2. *Muștar negru*, numit și *muștar de câmp* (*Sinapis nigra* sau *Brassica nigra*), care crește prin locuri cultivate, prin sămănături, pe marginea drumului, adeseori cultivat ca plantă medicinală. Grăunțele acestui muștar, sferice sau ovoid, de culoare închisă, cuprind un ulei gras, un ferment solubil, *mirosină* și mironat de potasă (*sinigrină*). În prezența apei, mironatul de potasă se desdoiește, mulțumită fermentului solubil, pentru a degaja *esența de muștar*, din care poate se descompune în sulf (pucioasă) și cianur de alil. *Făina de muștar*, pentru ca să dezvolte *esența* sus numită trebuie preparată cu apă rece sau caldută, iar nici odată cu apă mai caldă de 50°. nici cu alcool, cu oțet sau alt acid, cari nimicesc fermentul și împiedecă degajarea *esenței de muștar*, lucru important de știut pentru prepararea *sinapismelor*. Un *sinapism* este un fel de *cataplasmă* formată din făină de muștar și apă, care se întrebuințează ca *revulziv*, adică pentru a excita pielea în caz de sfârșeală, de leșin, de lipsă de respirație, dureri nevralgice, etc. și pentru a trage sângele spre picioare în cazuri de durere de cap, de

congestie sau de apoplexie cerebrală, de durere de gât, etc.; în primul caz muștarul se aplică pe piept, pe punctul dureros, la pulpe, iar în al doilea caz se pune la tălpi, la pulpe sau pe coapse. Un muștar se ține pe loc 5—15 minute, nici odată mai mult, pentru ca să nu provoace arsuri și răniri ale pielii. În unele cazuri se întrebuințează catapalzne de făină de muștar (*cataplasme sinapizate*). *Hârtia de muștar* (papier Rigollot) este foarte cunoscută la noi pentru tăria ei; este de ajuns să muim această hârtie în apă timp de câteva secunde și s'o aplicăm pe locul dureros, de unde o scoatem îndată ce începe să usture pielea. Când voim să tragem sângele în jos vom recomanda *băi de muștar* la picioare, punând cam un pumn de făină la o baie (20—30 gr. la un litru de apă). Baia întreagă se face cu 1000 gr. de făină de muștar pentru adult și cu 200 gr. pentru copil. Cei ce au picioarele întotdeauna reci pot să-și pună praf de muștar în ciorapi pentru ca să li se încălzească. — *Muștar de masă* (de mâncare) se prepară din grăunțele de muștar negru, cari se pisează și se înmoaie în apă și în oțet, aromatizându-l cu diferite plante. El este un condiment excitant, care provoacă în stomac o simțire de căldură și o mărire a puterii de mistuire, pentru care se mănâncă cu mâncări grele de mistuit. Luat prea des și în cantitate mare irită și inflamează stomacul și prin urmare nu trebuie să abuzăm niciodată de el. — La *fară* poporul întrebuințează muștarul la *junghiu* sub formă de cataplazmă; la *brâncă* pune muștar alb pisat mărunț și amestecat cu lapte dulce; pentru *pornirea regulelor* se fac băi de picioare cu muștar; pentru *treapă* se bea dimineața și seara rădăcină de muștar fiartă în vin.

Muște de Milan. — V. *Vezicători*.

Muște volante (sburătoare). — Când privim câteva minute un obiect foarte luminat, soarele, o lumină electrică, se întâmplă ca să treacă pe dinaintea ochilor: pete, firicele, umbre ușoare, puncte strălucitoare, cari se mișcă după cum ne mișcăm ochii. Aceste vedenii sunt produse prin niște cor-

pusculi foarte fini cari zboară în corpul sticlos al ochiului. Ele se observă rar în stare de sănătate; de cele mai multe ori atârnă de o congestiune în fundul ochiului. Uneori ele sunt patologice și în aceste cazuri trebuie să se combată congestiunile coroidiene, bolnavul să poarte ochelari închiși; miopiile mari dau adeseori această complicație, care este semnul că miopia progresează, se agravează. În tot cazul este bine, când lucrul se repetă mai des, ca omul să se adreseze la un doctor specialist în boale de ochi, ca să fie examinat la fundul ochiului.

Mut (lat. *mutus*). — Se numește astfel omul care nu poate vorbi. Nepuința de a vorbi se vede la unii copii atinși de viții de conformațiune, sau de o oprire de dezvoltare; ea se poate ivi întâmplător în unele boale de creier, sau la persoanele atinse de isterie, sau de alienație mentală. De obicei se zice *mut* copilul care nu poate vorbi din naștere; în acest caz el se naște *surd* și din pricina aceasta nu poate învăța să vorbească pentru că nu aude cuvintele (v. *Surdi-Mutitate* și *Surzănie*).

Muzică (lat. *musica*, grec. *mousiké*). — Muzica are o mare influență asupra persoanelor, mai cu seamă asupra celor cărora le place. Ea lucrează ca un calmant în diferite boale nervoase, cum este migrena și unele turburări ale neurasteniei. Somnul atât la copiii mici de leagăn cât și la unii oameni mari, este produs prin repetarea sunetelor monotone sub formă de cântec, sau cu un instrument oarecare (pian sau violoncel), așa că de multe ori prin acest mijloc se poate vindeca o insomnie rebelă. Muzica se mai întrebuințează în ipocondrie și în alte cazuri de nebulie, uneori ca un calmant, alte ori ca un excitant. Dar, dacă muzica își are partea bună, ea poate să fie rea în unele cazuri, când se face abuz de ea, putând da naștere la turburări de nervi. (Berlioz, Malibran și Mozart erau cuprinși de convulsii când ascultau unele simfonii).

Myristica fragrans sau **Moschata**. — V. *Frunzișoară* și *Nucșoară*.

N

Năbădăi. — V. *Epilepsie*.

Nădrăgi. — V. *Pantaloni*.

Nădrăgulă. — V. *Mătrăgună*.

Năduf. — V. *Emfizem pulmonar* și *Opresiune*.

Nădușeală. — V. *Sudoare*.

Naftalan. — Corp gras scos din naftale de Caucas; uleios, negru, foarte gros, insolubil în apă, glicerină și alcool ordinar, solubil în eter, alcool amilic, cloroform și în uleiuri. Se întrebuințează în boale de piele (eczemă, psoriază, sicoză); bun în reumatismul acut și cronic, în emoroizi. Se dă sub formă de soluțiune uleioasă (unt de lemn) 2 la 100; pomadă (vaselină) 5—10 la 100; supozitoare 25 la 100 părți unt de cacao; el mai servește ca excipient pentru substanțe medicamentoase.

Naftalină. — Lamele incolore, strălucitoare, cu miros pătrunzător și neplăcut, gust acru și arzător, se scoate din gudronul de cărbune de pământ. Nu se topește în apă, se topește cu înleznire în alcool, cloroform, eter, uleiuri grase, acid acetic și cloridric. Se dă ca dezinfectant în boale de intestine, ca expectorant, iar pe din afară în psoriază. Pe *dinăuntru* se dă în doză de 20 ctgr. până la 5 gr., iar pe *dinafară* în pomadă (alifie) 2 la 30.

Naftol. — Sunt două feluri de naftol: A și B. Naftolul A se prezintă sub formă de ace strălucitoare, incolore, cu miros ușor de acid fenic, se topește la 90° și fierbe la 279°. În apă rece nu se topește mai de loc; se topește ușor în alcool, eter, cloroform și benzină. El este mai mult antiseptic și mai puțin toxic decât naftolul B, care se prezintă sub formă de lamele cristaline, albe ca sideful, cu gust acru și înțepător, se topește la 123° și fierbe la 280°. Naftolul acesta se dă ca antiseptic intestinal în febra tifoidă, în dizenteria cronică, întocmai ca și naftolul A. Pe *dinafară*, ca topic, se întrebuințează *apa naftolată* în chirurgie și în obstetrică: în soluțiune alcoolică (1 la 200) se dă în prurit, în seboarea pielii capului; în alifie (10 la 100) în râie, eczemă, psoriază, acnee, etc. — Pe *dinăuntru* se dă în doză de 1 gram și jumătate până la 3 gr. pe

zi (mai cu seamă în asociație cu salicilat de bismut, magnezie, bromidrat de chinină, revent, scorțișoară); la copii 10—20 ctgr. pentru fiecare an. Pe *dinafară* în soluțiune în alcool (de 60°) de 5—30 la 1000.

Naftol (Benzoat de). — V. *Benzo-naftol*.

Naftol (Salicilat de). — V. *Betol*.

Naftolat de bismut. — Praf cenușiu închis, numit și *Orfol*, care lucrează ca antiseptic intestinal și se dă în doză de 75 ctgr. până la 1 gr. și jumătate la copii; 1 gr. 50 ctgr. până la 2 gr. la adulți; în buline sau într'o poțiune (în suspensie); bun în infecțiunile intestinale, în diaree, în enterita ofticoșilor, în febra tifoidă.

Naftolat de sodă. — V. *Microcidină*.

Năglugă. — V. *Emfizem pulmonar*.

Năjit. — V. *Urechie*.

Nalbă, colăceii babei, mălagă (*Malva sylvestris*, fam. malvaceelor). — Plantă erbacee care crește pe câmp, pe drumuri, pe lângă locuințe și garduri. În medicină se întrebuințează foile și florile, cari se culeg în Iunie și se usucă pentru a se păstra. Nalba are însușirea de a fi emolientă din pricina mucilagiului pe care îl conține în abundență. Din flori se face un ceaiu (infuziune 10 la 1000) îndulcit cu zahăr sau candel, care este bun pentru guturaiu cu tusă, pentru răgușeală (laringită). Foile se întrebuințează mai cu seamă pe *dinafară*, sub formă de oblojeli, cataplasme, spălături, clizme, colite, etc., bune pentru a potoli o iritațiune sau o inflamațiune (aprindere) a unei părți a corpului. — La *țară* babele fac decoct (fiertură) din rădăcini, frunze și flori de nalbă și îl dau pentru tusă și durere de piept, iar pentru răgușeală se face gargară cu el. La orice bubă ca să spargă se pune lapte fiert cu rădăcină; la gălci se pune nalbă fiartă cu țărâte de grâu.

Nalbă mare, nalbă albă (*Athaea officinalis*, fam. malvaceelor). — Plantă erbacee care crește prin locuri umede, pe pe malul râurilor, prin lunci, zăvoaie (Iulie—August). Se întrebuințează florile, frunzele și rădăcina, adică planta întreagă, care se culege când florile au ajuns la deplină dezvoltare. Foile și

florile se usucă deosebit; rădăcinele se scot, se spală de pământ, se taie bucățele, se usucă, se păstrează la loc uscat, ferite de umezeală ca să nu mucezească. Rădăcina cuprinde o materie gumoasă din care pricină se întrebuintează ca emolientă, domolitoare; tot așa florile și frunzele, însă în măsură mai mică. Ceaiul de nalbă este bun pentru tuse, pentru dureri de stomac (colici); fiertura de rădăcină amestecată cu miere este bună pentru răgușeală (laringită); în contra diareei (urdinării) la copii se dă fiertură de rădăcină, rece, câte 3—4 ceșculițe pe zi. Se mai dă sub formă de sirop 30 la 1000; tablete de câte 100 centigrame una. Pe dinafară cu fiertură de nalbă se fac cataplasme de in, se spală rănilile, se pun oblojei, se face gargară; se mai fac abureli în cazuri de durere de urechi.

Nălucire.—V. *Alucinațiune*, *Iluziune* și *Ipocondrie*.

Nămăești.—Localitate climaterică de vilegiatură lângă Câmpulung. Sat frumos așezat la o înălțime de 600 metri deasupra nivelului Mării Negre. Clima dulce.

Nană.—V. *Ciuperca* (Ciupercă de gunoiu).

Năpărcă.—V. *Viperă*.

Napelină.—Alcaloid scos din *Aconitum napellus* (vezi *Aconit*). Are aceleași însușiri ca *aconitina* (vezi acest cuvânt) însă este mai puțin tare; are acțiune ipnotică destul de mare. Se dă în injecțiuni subcutanate în doză de 5—20 mgr. pe zi și numai la adulți (2 miligr. pentru o injecțiune).

Napi, broaște (*Brassica napus*, fam. cruciferelor).—Plantă potageră a cărei rădăcină este cărnosă, groasă, în formă de fus și are un gust dulce din cauza zahărului pe care îl are. La noi se cultivă ca plantă alimentară. Napul fraged și bine copt se mistuie ușor; când este bătrân și ațos cade greu la stomac.—La țară se întrebuintează napii și ca doctorie, astfel se dă fiertură de napi pentru tuse, iar pe dinafară se fac oblojei (cataplasme) pentru potolirea durerilor.

Naramze.—*Portocal*.

Narceină.—V. *Opiu*.

Narcissus pseudo-narcissus.—V. *Zarnacadea*.

Narcotie (grec. *narkotikos*, dela *narke*, ațipire, adormire, amortire).—Medicament care are însușirea de a amorți, de a produce *somn* cum este: beladona (mătrăguna), iosciam (mă-sălarița), opiu (afion), etc. Dintre toate cel mai întrebuintat este *opiu*, adecă sucul scos din capetele *macului* alb care se dă sau în natură, sau sub formă de *laudan*, de *morfină*, *dionină*, *eroină*, *narceină*. Medicamentele narcotice sunt și *calmante*, căci potolesc durerea, având o acțiune directă asupra durerii fie prin aplicațiuni asupra locului dureros de oblojei sau fricțiuni, făcute cu decoctiune (fiertură) de foi de beladonă, sau de iosciam, sau de capete de mac; fie prin luarea pe dinăuntru a acestor medicamente. Unele substanțe narcotice sunt foarte otrăvitoare (toxice), din care pricină trebuie să fim cu mare băgare de seamă ori de câte ori ne servim de ele. Intre narcotice se mai numără acidul cianhidric, cianurul de potasiu, cianurul de zinc, datura stramonium (ciumăfaia), lauroceras, nicotina, seronina, mărărașul (*phellandrium aquaticum*), etc.

Narcoză (dela grec. *narkosis*, ațipire, amăgire, amortire).—Somn produs de medicamente.

Nări.—V. *Nas*.

Nas (lat. *nasus*).—Este *organul mirosului* și începutul *aparaturii respirator*. Nasul, are în totdeauna forma unei piramide, a cărei vârf este în sus răspunzând la partea mijlocie a frunții și care se numește *rădăcina nasului*; cele două fețe laterale ale ei sunt *aripele nasului*, iar baza ei are două găuri (orificii) numite *nări*, cari sunt un fel de *tindă* pentru cele două cavități numite *gropile* sau *fosole nazale*. Intrarea nărilor este căptușită cu o prelungire a pielei, acoperită cu păr gros și destul de lung care împiedecă praful de a intra în nas. *Gropile* sau *fosole nazale* sunt așezate deasupra ceriului gurii și de desuptul bolții craniului. Părțile laterale ale foselor au fiecare câte trei ridicături osoase, îndoite pe margini și așezate una asupra alteia, (*cornete*); spațiurile cari le separă se numesc *meate*: în meatul de jos se află gaura canalului nazal, pe unde vin lacrimile; în meatul dela

mijloc sunt găurile sinusurilor maxilar și frontal (cavități osoase cari măresc întinderea foselor nazale); Nasul este căptușit pe dinăuntru de *mucoasa pituitară*, care este acoperită de cili vibratili și secretează un fel de lichid care omoară microbii. Nasul are artere și vine numeroase, iar nervul *olfactiv* (al mirosului) se împarte în treimea de sus a foselor nazale (*regiunea olfactivă*), iar treimea mijlocie și cea de jos (*regiunea respiratoare*) primesc ramuri din nervul trigemen. Înapoia fosele nazale comunică cu fundul gâtului așa că mâncarea și băuturile în loc să meargă în jos, ar putea să pătrundă în nas, dacă n'ar fi *omuşorul* (*împărătusul*) și *vălu* *palatului*, cari să închidă intrarea dinapoia nasului în momentul înghițirii. Când se întâmplă că omuşorul nu închide bine această intrare, fie din cauză că înghițim prea iute fie că în momentul acela ne năpădește răsul; o parte din mâncare, sau din băutură, ne vine pe nas, dându-ne o simțire foarte neplăcută. Cavitățile care se găsesc înapoia foselor nazale, numită *nazofaringiană*, are forma unei răspântii; pe fețele laterale ale acestei cavități se află de fiecare parte orificiul *trompei lui Eustachie*, prin cari comunică cu urechia mijlocie; bolta acestei cavități este foarte oblică de sus în jos către fața posterioară și poartă amigdala faringiană, care, dacă crește prea mult, se transformă în tumoare *adenoidă*. Mirosul se face cu ajutorul *mucoasei pituitare* din partea de sus a nasului, care este foarte bogată în rămurile de ale nervului *olfactiv*, pe cari le impresionează particulele mirositoare. Când avem guturaiu, căptușeala nasului fiind inflamată se acopere de mucozități cari acopăr firicelele nervoase și nu le mai lasă să vie în atingere cu particulele mirositoare, din care cauză nu mai avem miros cât timp ține guturaiul. Prin nas aerul de afară se duce în plămâni, așa că pentru a respira n'avem trebuință de a ține gura deschisă. De altfel nici nu este bine să respirăm prin gură, de oarece aerul în trecerea lui prin nas se încălzește și se curăță în mare parte de praful pe care îl conține, pe câtă vreme dacă respirăm prin gură aerul rece, venind în atingere cu

gâtul, laringele și bronchiile, poate da naștere la durere de gât (angină), la răgușeală (laringită) și la tusă (bronchită). Prin urmare vom recomanda tuturor ca să nu stea cu gura deschisă când umblă pe afară și mai cu seamă pe timp de iarnă. — *Boalele nasului*. Nasul fiind partea cea mai eșită a feții este supus la *lovituri* (*contuziuni*). Loviturile nasului ca și *înțepăturile* și *tăieturile* (plăgile) lui se vindecă ușor de obicei sunt urmate de o curgere mare de sânge. Plăgile se vor spăla și dezinfecta cu soluțiuni de acid boric, de acid fenic sau de sublimat coroziv și se vor acoperi de comprese înmuiate în apă rece simplă, sau amestecată cu alcool, sau cu oțet, sau se vor pansa cu praf de xeroform sau dermatol; dacă plăgile sunt pe dinăuntru nasului atunci ne vom mulțumi a trage pe nas de mai multe ori în cursul zilei din soluțiunile mai suspomenite. — *Aerul* care trece prin nas de obicei nu răsună când vorbim, dar în caz de amigdalite (gâlci), de angină, de coriză (guturaiu), el dă vocii un timbru particular și atunci *sforăim, vorbim pe nas*. Omul mai *vorbește pe nas* când o nare este strâmtată fie printr'o deviație a păretului despărțitor spre stânga sau spre dreapta, fie că a crescut o tumoră carnoasă cunoscută sub numele de *polip*. În acest caz bolnavul pare a fi în continuu cu guturaiu, îi vine să-și sufle mereu nasul fără să se desfund, din nas curge un lichid gros, verzuiu și cu miros urât, adeseori are curgere de sânge din nas, i se pare că poartă în nas un dop, care îl supără din ce în ce mai mult, mai ales pe timpul umed, când polipul se umflă; bolnavul este silit să respire prin gură. Polipii sunt de 2 feluri: *mucoși* și *fibroși* (nazofaringieni). Cei mucoși sunt mai ușor de operat și de vindecat, pe câtă vreme cei fibroși se însoțesc de dureri, de curgeri dese de sânge, cresc foarte repede comprimând și distrugând organele vecine. — O boală foarte urâtă și respingătoare a nasului este *rinita atrofică*, sau *ozena* (*ozaina*: putoare); constă într'o inflamațiune cronică (învechită) a foselor nazale cu lărgirea lor și formarea de coji galbene verzui foarte puturoase. Cauzele onenei sunt: scrofulule, ereditatea, coriza cronică

simplă, sifilisului; ea apare cam la etatea de 10—20 de ani sub influența pulberilor iritante. Din nas se scurge uneori o materie groasă, ca puroiul și în cantitate mare, alteori în loc de această materie ies din nas numai cojile, cari dau un miros așa de greu încât nu te poți apropia de bolnav. Între complicațiunile ozenei este *inflamațiunea sinurilor*, adică a cavităților așezate în afară de fosele nazale, *conjunctivita* și *otita*. *Tratamentul* ozenei este *general* și *local*. El trebuie făcut de doctor, singurul care este în măsură să aplice și să vadă rezultatul diferitelor medicamente. — Pe nas se mai ivesc diferite *ulcere* (răni), unele de natură *sifilitică*, altele de natură *scrofuloasă* (vezi *Lupus*) și altele de natură *canceroasă*, cari mănâncă nasul până îl distrug cu totul. Pentru aceasta trebuie din vreme să se facă un tratament general apropiat, căci mai târziu va trebui să se pună sau un *nas artificial* sau să se facă un altul din pielea bolnavului luată din vecinătate sau dela o mână (*ri-noplastie*).

Nas (Curgere de sânge din). — V. *Epistaxă*.

Nas de bețiv. — *Acnee*.

Nas roșu. — Sunt multe persoane la cari se înroșește nasul la frig și la vânt. Pentru a face nasul mai puțin simțitor la schimbările de temperatură se recomandă ca să se aplice asupra lui, în fiecare zi și de mai multe ori, un burete înmuiat în apă cât se poate de caldă apoi să se stoarcă cu îngrijire timp cam de 20 secunde. Dacă pielea nasului este cu grăsimi se poate pune în apă puțin borax (3 la 100). După ce s'a luat buretele se aplică pe nas întotdeauna pudră de orez.

Năsălle. — V. *Targă*.

Născătoare. — V. *Vagin*.

Naștere. — V. *Facere*.

Năsturel, *bobâlnic*, *brâncuță*, *creniță*, *ereson*, (*Nasturtium officinale*, fam. cruciferelor). — Plantă mică erbacee care crește pe lângă pârae, isvoare și mlăștini. Ea conține fier, iod, azot, din care pricină se întrebuințează ca depurativ (curățător de sânge), în contra scorbutului, ca stomachic. Se recomandă la copii limfatici, scrofuloși, la gușați, la cei ce au mâncărime de piele,

cu sau fără roșeață, la cei ce sufăr de gingii. Se mănâncă salată, din care cauză se cultivă mult. Se prepară un sirop care este foarte bun în scorbut.



Fig. 268. — Năsturel

Natațiune. — V. *Innotare*.

Năuceală. — V. *Ipocondrie*.

Năucie, *stupoare*. — Este o stare nervoasă greu de descris și care se deosebește dela om la om, este un fel de amețeală. Alteori această stare coincide cu unele boale mai mult sau mai puțin grave: epilepsie, isterie, anemie, cloroză, migrenă; câte odată ea este premergătoare congestiunii, sau apoplexiei cerebrale (la creier), sau imoierii creierului; uneori ea însoțește dispepsia (mistuirea grea); alteori provine din abuzul de băuturi alcoolice și de tutun, sau când cineva pentru întâia oară se dedă la aceste lucruri. Când această stare rezultă dintr'o cauză momentană, de ocazie (danț, călătorie, urcare, etc.) nu este gravă; când ea anunță vreo boală sau rezultă dintr'o boală, atunci gravitatea ei depinde de acea boală, care trebuie tratată cu atențiune. Când cineva se găsește în această stare, în acces, va sta în odihnă completă, în tăcere, într'o cameră nu prea luminată și în poziție orizontală (culcat pe spate).

Năut, *nohot*, *nout*, *țeațire* (*Cicer arietinum* fam. leguminoaselor). — Plantă erbacee care se cultivă pentru trebuințele bucătăriei (Iunie—Iulie); semințele ei se mănâncă. În unele părți aceste semințe se prăjesc și servesc la facerea unei băuturi, care în casele sărace ține loc de cafea.

Năvalnic. — Caută la *Ferigă* și *Valeriană*.

Néalgyi. — Este un calmant care se dă în migrenă, nevralgiile intercostale,

sciatică, dureri menstruale, insomnii din cauza durerilor, etc. Se prezintă sub formă de comprimate, din care se pot lua 4—8 pe zi, după caz, înainte, în timpul și după masă.

Neamțu.—Regiunea Neamțului este una dintre regiunile cele mai pitorești din țară și cea mai bogată în localități de vilegiatură : Piatra-Neamțu, Târgu-Neamțu, Mănăstirile Neamțu, Agapia și Văratu, Schitul Durău, apoi stațiunile balneare Băltătești și Oglinzi. Toate aceste frumoase stațiuni climaterice sunt împrejmuite de munți și păduri, de văi și râuri, de numeroase sate de munte cu casele lor de lemn, albe și drăguțe, de alte mănăstiri și schituri, cari dau acestei regiuni un farmec și o bogăție de priveliști uimitoare. În munții Neamțului stau ascunse amintiri glorioase de ale neamului românesc. Aci se găsește vestita *cetate a Neamțului*, ridicată de Ștefan cel Mare, aci sunt Războienii, pe aci curge Bistrița Moldovei, minunata apă pe care o admiră toți străinii, aci își ridică coamele mărețe Ceahlăul, unul din cei mai înalți munți ai Carpaților, aci sunt cele mai multe și mai frumoase mănăstiri și schituri din țară, așezate în pozițiuni minunate. — În acest loc vom vorbi numai despre *Târgul Neamțu* și despre celelalte să se caute la locul lor după alfabet. *Neamțu*, este un orașel așezat lângă râul Neamțului, la poalele dealului Pleșul. Orașul este pitoresc și cu o climă de munte constantă și uscată. În mijlocul orașului se află o grădină publică frumoasă. Pentru vizitatori are mai multe hoteluri, restaurante, vile și locuințe confortabile. Această stațiune climaterică este foarte mult vizitată în timpul verii. În jurul orașului sunt multe fabrici de țesături, de olărie, de brânzeturi, de uleiuri vegetale, de tăbăcărie, etc.; viața este plăcută și efțină. Lângă oraș se află băile *Oglinzi* (vezi acest nume) și ruinele *Cetății Neamțului*. În oraș se închiriează trăsuri, care cu boi sau cai pentru excursiuni la : Băile *Oglinzi*, Mănăstirile *Neamțu*, *Agapia* și *Văratu*, Băile *Băltătești*, etc. — *Mănăstirea Neamțu* este una din cele mai vechi și mai importante mănăstiri ale țării, din punct de vedere istoric și cultural; în ea slujesc peste 400 călu-

gări. Mănăstirea e formată dintr-o mare incintă compusă din chilii cu 2 etaje, în care se intră printr-o poartă de zidărie groasă deasupra căreia se înalță o clopotniță măreață. În curtea mănăstirii e biserica *Inălțarea*, cu un turn înalt, biserică mare, frumoasă și bogată în artă, în lucruri scumpe și cu o icoană făcătoare de minuni. În jurul mănăstirii sunt numeroase căsuțe curate, proprietăți ale călugărilor, mai toate cu grădini. La 200 m., în spre răsărit se află ospiciul de alienați administrat de Epitropia Sf. Spiridon din Iași. Spre sudvest, cale de o ½ oră, e schitul *Vovedenia* într-o pozițiune pitorească, iar la un kilometru spre sat sunt izvoarele dela *puturosul* cu ape sulfuroase bune pentru băi. Clima Mănăstirii Neamțu este plăcută. Pădurile de brazi din jur fac ca aerul să fie curat și ozonizat.

Neartroză (dela grec. *neos*, nou, și *arthron*, încheietură). — se numește astfel o articulațiune sau încheietură falsă care se formează în locul unde se ating două oase în mod normal în urma unei dezlocări devenită permanentă (a unei scrintiri sau luxații ireductibile), sau în urma suprimării unei porțiuni de os printr-o operație.

Nebunariță. — V. *Măsălarită*.

Nebunie. — V. *Alienație mentală*.

Necroză (gr. *nekros*, mort). — Se numește astfel mortificațiunea țesutului osos. Necroza este sfârșitul unor boale ale oaselor (*osteită*, *periostită*, etc.), iar nici de cum o boală specială. Stratele superficiale necrozate ale unui os pot fi date afară sub formă de mici bucățele (*secvestre parcelare*), numite în popor *colți de lup*, sau într'un alt mod neobservat, pe nesimțite (*exfoliațiune*). Se știe că orice os este hrănit printr-o rețea proprie de vase și prin vase venite din periost (cămașa osului) și din măduvă, astfel cauzele necrozei sunt : leziunile periostului (ruptură, sdrobire, un abces subperiostite cronice, diateze sau toxice, etc.); boalele măduvii (*osteomielită*, etc.); diferitele alterațiuni ale țesutului osos (lovituri, arsuri, fracturi, osteite, oftică). Necroza mai poate fi ca urmare a scrofulozei, ofticeii și sfilisului, când aceste boale atacă vreun os. Necroza se ivește la falca de jos la cei ce lucrează cu fosfor (necroză fos-

forată). — **Tratamentul**; când osul necrozat este adânc, fix și încunjurat de os sănătos, trebuie să lăsăm lucrurile la natură, care sub formă de puroiu îl va da afară încetul cu încetul; iar când osul mort este deslipit de osul sănătos, când este liber, atunci cel mai bun lucru este să facem o tăietură largă în carne, până dăm de el și să-l scoatem, scăpând astfel bolnavul mai iute de supărătoarele *fistule* cari fac mereu puroiu și îl slăbesc foarte mult.

Nefrectomie. — V. *Rinichiul*.

Nefritice (Colici). — V. *Rinichiul*.

Nefrită (dela grec. *nephros*, rinichiul, și terminațiunea *itis*, care însemnează inflamațiune). — Aprinderea sau inflamațiunea rinichilor (vezi *Rinichiul*).

Nefropexie. — V. *Rinichiul*.

Negelarită. — V. *Rostopască*.

Neghlobie. — V. *Idiofie*.

Negli, negei (lat. *verruca*). — Sunt niște creștături mici cari se formează în piele prin dezvoltarea exagerată a unei părți a *epidermului*. Negii au o culoare albuie, sunt rotunzi, uneori mai tari, alteori mai moi și având diferite mărimi, dela aceea a unui bob de mei până la aceea a unui ban de 50. Se arată de obicei pe mâni și pe picioare, pe față și gât. Cei dela mâni

și picioare sunt de culoare cenușie, tari și cresc uneori foarte mult. La față negii sunt mai mici, cu suprafața despicată, inegală, formată de mici ridicături îm-



Fig. 269—Neg

plântate pe o singură bază. Negii nu sunt supărători decât când sunt prea mari sau când se inflamează; în tot cazul sunt neplăcuți la vedere. **Tratamentul** constă în ardere cu acid azotic (apă tare), cu acid sulfuric (vitriol), sau cu acid cronic, din cari se pune pe fiecare câte o picătură după ce mai întâiu s'a uns pielea din jur cu nițică vaselină pentru ca să nu se ardă; aceste aplicări se pot face mai de multe ori, tot la 3—4 zile odată, până ce negii au căzut; uneori, când sunt prea mari, la mâni și la picioare, se pot arde cu fierul roșu, iar trata-

mentul cel mai recomandabil este arderea lor prin electricitate (diatermie), sau prin radiu. La față, când sunt mulți negi mărunți, se recomandă să se aplice asupra lor bucățele de flanelă acoperite cu un strat de săpun negru, lăsându-se pe loc până ce pielea devine roșie și sbârcită, 24—48 ore; după care se ridică săpunul negru, fără însă ca să se spele, nici să se șteargă negii, cari vor cădea după opt zile.

Nejelmică. — V. *Silnic*.

Neliniste. — V. *Agitațiune*.

Nemistuire. — V. *Indigestiune*.

Nemțșori, măraru câmpului, nemțșori de câmp, pîntenaș, toporași, (Delphinium consolida, fam. ranunculaceelor). — Plantă erbacee care crește prin semănături și pe marginea drumurilor. Această plantă amară s'a întrebuințat în medicină ca diuretic, în gută, nisip, dropică și în boalele de rinichi și de beșică, iar tinctura alcoolică în contra astmei și dispneei (respirație grea) de natură nervoasă. — La țară ceaiul făcut din flori și din frunze se întrebuințează la spălarea mușcăturii de șarpe și se bea în contra durerii de pânțece; în unele părți ale țării femeile sterpe îl beau pentru ca să facă copii.

Neoarșicol. — V. *Arenal*.

Neodihnă. — V. *Agitațiune*.

Neputință. — V. *Impotență*.

Nerodire. — V. *Sterilitate*.

Nerozle. — V. *Imbecilitate*.

Nerprun, pașachină, salbă moale, verigar (Rhamnus cathartica, fam. ramnaceelor). — Arbust care crește prin păduri, lunci, tufișuri. În medicină se

întrebuințează fructele și rădăcina ca purgativ. Sucul de fructe servește la prepararea cu părți egale de zahăr a *siropului de nerprun*, care se dă în doză de 30—60 gr. De obicei acest sirop se dă cu tinctură de jalapa compusă pentru a o îndulci; în dropica renală sau



Fig. 270. Nerprun

cardiacă, în uremie. — La țară se fac băi copiilor bolnavi de *socote* și anume: dimineața copilul se scaldă în fundul casei, la amiază în mijloc și seara la

NERV

ușă; fructele se dau ca curățenie și în contra dropiceii.

Nerv (la *nervus*, grec. *neuron*). — Nervii se arată sub formă de fire, mai mult sau mai puțin groase, de culoare albă, compuse din firicele (filamente), în formă de tuburi sau fibre, reunite printr'un înveliș comun. Prin ajutorul nervilor se transmit simțirile (senzațiunile) și mișcările. Sistemul nervos s'ar putea compara foarte bine cu un mare *aparat telegrafic*, care are două oficii centrale, la cari sosesc și din cari pleacă telegramele. Aceste oficii centrale sunt *creerul și măduva spinării*



Fig. 271.

1=măduva spinării; 2=bulbul; 3=protuberanța; 4=cerebelul; 5=creierul mare; 6=peretele extern al foselor nazale.

(V. fig. 271). Din aceste oficii pleacă firele telegrafice, *nervii*, cari prin pozițiunea lor s'ar putea mai bine asemăna cu cablurile submarine, fiindcă fiecare nerv se compune din mai multe firicele (V. fig. 272), gata în tot momentul de a se înlocui unele pe altele când trebuința va cere. Nervii la plecarea lor din centru sunt mai groși, apoi ei se împart și se subîmpart în ramuri din ce în ce mai subțiri, terminându-se în adâncimea sau la suprafața tuturor organelor. Părul, sgarciurile (cartilagele) și unghiile n'au nervi. Toate părțile corpului, sunt în comunicațiune astfel directă și continuă cu creierul și cu măduva spinării. O impresiune de dinafară de arsură,

NERV

de gădilire, de pipăire, de miros, de sgomot, de lumină, etc., isbește nervii cari se sfârșesc în piele, în nas, în urechi, în ochi. Această impresiune îndată este transmisă foarte repede prin nervi la măduva spinării, apoi la creier când o și simțim. Când creierul voește ca membrele noastre să facă



Fig. 272. — Celula nervoasă cu terminațiile lungi, în formă de fire.

vreo mișcare el le trimite poruncă tot prin nervi trecând însă mai întâi prin măduva spinării, cu o iuțeală tot așa de mare încât nu ne putem da seamă de ea. Cele mai adeseori și executarea mișcării este urmarea directă și imediată a impresiunii primite: astfel îndată ce ochiul simte vântul pleoapele se închid pentru a opri praful. Această mișcare, la aparență instinctivă, depinde și ea de voință, căci la rigoare am putea ține ochii deschiși, așa că aci avem transformarea instantanee a senzațiunii în poruncă de mișcare și în această împrejurare creierul joacă rolul instrumentelor așa zise *comutatoare* din



Fig. 273. — Secțiune într'un nerv, unde se pot vedea fasciculele legate între ele printr'un înveliș izolator (partea neagră)

aparatele electrice, cari schimbă direcția curentului după voința operatorului. Adeseori aceiași nervi transmit senzațiunile venite dela periferie și duc poruncile date dela centru. Unii din nervi însă sunt mai mult destinați pentru a transmite senzațiunile, din

care pricină se numesc *nervi senzitivi*, pe câtă vreme alții sunt însărcinați mai mult cu transmiterea poruncilor și se numesc *nervi motori*, iar cei cari împlinesc amândouă rolurile se chiamă *nervi mixti*. Afară de acestea, sistemul nervos împlinește și alte roluri despre cari nu ne dăm seamă și pe cari nu le putem influența de loc, așa de exemplu el face să bată inima punând în mișcare sângele, face să se strângă stomacul și mâțele pentru a grăbi mistuirea, face să treacă fierea din



Fig. 274. — Sistemul nervos.

ficat în mațe, urina din rinichi în beșică, etc., tot atâtea fenomene cari se petrec fără știința noastră și sunt sub dependența sistemului nervos, dar creerul nu ia parte la ele, ci numai măduva spinării, din care pricină nu ne dăm seamă de ele nefiind sub voința noastră. — Din punctul de vedere al provenienței, nervii sunt de 3 feluri : 1. *Nervi cranieni*, cari pleacă din cap și sunt în număr de 12 perechi, dintre cari 4 destinați la organele simțurilor

(vedere, auz, miros, gust) ; 5 sunt motori (3 pentru mușchii ochiului, 1 pentru mușchii limbii și 1 pentru mușchii feței) ; iar 3 au și fibre senzitive și fibre motrice, adică sunt mixti, și a-nume : *pneumogastricul* (esofag, stomac, plămâni inimă), *spinalul* (laringe) și *trigemenul* (ochi, falca de sus și falca de jos). 2. *Nervi rachidieni*, cari pleacă din șira spinării, eșind din fiecare parte a măduvii 31 de nervi, cari imediat se împart fiecare în 2 ramuri : una anterioară, mai mare, care se duce spre organele din piept și din pânțece, iar cealaltă spre spate. Fiecare nerv se reunește cu cel așezat deasupra și cu cel dedesupt prin niște firisoare cari constituie un *plex* (rețea) din care se desfac nervii regiunilor, astfel avem : *plexul cervical* (pielea și mușchii capului gâtului), *plexul brachial* (pielea și mușchii membrului superior), *plexul lombar* (piele și mușchii lighianului și a unei părți a membrului inferior), *plexul sacral* (restul pielii și a mușchilor membrului inferior). 3. *Nervi simpatici*, cari pleacă din ganglionii marelui simpatic și după ce se unesc cu ramurile pneumogastricului formează *plexurile cardiac, pulmonar, solar*, cari se împart între vasele sanguine, inimă, plămâni, organele digestive, rinichi și beșică și regulează acțiunea acestor organe. *Boalele nervilor*. Nervii pot fi congestionați când se găsesc în apropierea unui focar inflamator sau când sunt iritați deadreptul ; ei pot să se aprindă, să se inflameze (*nevrită*) în mod spontan sau în urma tăieturilor, a rupturilor, a loviturilor, a compresiunilor produse asupra lor de diferite tumori. Adeseori se văd boale de nervi fără nici o leziune apreciabilă ; iar semnele acestor boale constau în niște turburări de sensibilitate (*îperestezie, anestezie*) și turburări de mișcare (*paralizii*). *Atrofia* sau topirea nervilor se vede mai cu seamă în urma tăeturilor nervoase accidentale, sau făcute de doctori, sau în urma compresiunilor făcute pe traiectul lor de vreo tumoră sau altă cauză ; ea se mai observă și în unele boale ale sistemului nervos central, sau chiar în urma destrucțiunii organelor sau a țesuturilor în cari se duc nervii. *Atrofia nervoasă* se caracterizează prin para-

NERV

lizia complectă a mușchilor la cari se duc nervii atrofiați, prin anestezia țesăturilor pe cari ei le inervează adeseori printr'o atrofie musculară cu mers repede. Atrofia se combate provocând regenerarea nervoasă prin toate mijloacele cari înleznesc funcționarea organelor sau țesăturilor cari primesc nervii. — *Compresiunea* nervilor poate fi lentă (înceată) și datorită creșterii progresive a unui ganglion (*adenită*) din vecinătate, unui anevrism, unui os (*exostoză*), dislocării unui organ vecin, cum ar fi cea a unei vertebre în morbul lui Pott, etc.; ea poate fi *acută* și provocată printr'o pozițiune rea în timpul somnului (capul pe braț, subsoara apăsată pe un lemn), sau prin dislocarea unui os luxat scrintit). *Conluziunea* (lovitura) unui nerv se datorește cele mai adeseori unei scrintiri, unei căderi sau lovituri. În amândouă cazurile, când acțiunea este violentă, omul simte o durere foarte mare, uneori furnicătură, crampe, o simțire de căldură; pielea la început este foarte simțitoare, apoi se amortește și mușchii se paralizează. Pierderea senzibilității și neputința de a se servi de membru au o durată variabilă. Ca *tratament* se recomandă odihnă, depărtarea cauzei care face compresiunea, iar în contuziuni comprese cu apă rece sau apă de plumb și când este teama de atrofie electroterapia. — *Inflamațiunea nervilor* sau *nevrita* este acută sau cronică. Nevrita *acută* provine dintr'o rănire, ruptură, scrintire, arsură, degerătură, o boală din vecinătate (morbul lui Pott, pleurezie, periostită, etc.), o boală infecțioasă (febra tifoidă, difterie), din frig, umezeală, reumatism, gură și sifilis. *Semnele* acestei nevrite sunt la început o durere vie pe traiectul nervului, care este tare și umflat, roșeața pielii; după un timp oarecare apar turburări de nutriție (herpes, pemfigus, ulcerăriuni, căderea sau îngroșarea părului și unghiilor, atrofie musculară). Durerea pe traiectul nervului poate dura și după ce pielea și-a pierdut sensibilitatea (anestezie dureroasă); mușchii se paralizează și se atrofiază. Nevrita *cronică* are aceleași cauze, însă ea se desvoltă mai încet. *Tratamentul*: odihna părții bolnave, injecțiuni cu morfină; combaterea cauzelor.

NEV

Nervi (Atac de). — V. *Atac*.

Nervi (Boală de). — V. *Neurastenie* și *Nevroză*.

Nervi (Durere de). — V. *Neuralgie*.

Nervi (Intărâtare de). — V. *Agasare*.

Nervin. — Medicament care calmează sau potolește nervii.

Nervozism. — V. *Neurastenie*.

Nesimțire. — V. *Analgezie* și *Anestezie*.

Neorodină. — Cristale incolore, puțin solubile în apă rece. Lucrează ca anti-termic, analgezic și antineuralgic (scade căldura și potolește durerile). Doză: 1—3 gr. pe zi, în buline sau prafuri de câte jumătate gram. Trebuie supravegheată lucrarea ei asupra căldurii, care scade repede și produce nădușeală multă și cianoză.

Nev (lat. *naevus*), *alunică*, *aluniță*, *alunelă*. — Prin cuvântul *nev* se înțelege o diformațiune din naștere și permanentă a unei regiuni mărginite a pielii, produsă sau printr'o îngrămădire de materie colorantă: *nev pigmentar*, sau printr'o dezvoltare prea mare a țesutului vascular: *nev vascular*. 1. *Nevul pigmentar* se prezintă sub 2 forme: *plană* și *ridicăată*. În forma *plană* avem niște *pete* de diferite mărimi, dela cea a unui bob de grâu până la cea a unei piese de 5 lei, de culoare galbenă, cenușie sau neagră, de formă rotundă, eliptică sau neregulată; acoperite sau nu de păr; ele pot fi mai multe și împrăștiate fără nici un rost pe față, pe gât, pe dosul mânilor și pe celelalte părți ale corpului. În forma *ridicăată* (*nev verucos* sau *ipertrofic*) avem niște ridicături de diferite forme, de diferite mărimi, de culoare roșietică mai mult sau mai puțin închisă sau neagră, acoperite de păr negru. Ca tratament se recomandă în forma pigmentară arderile cu acid fenic curat, sau cu galvano-cauterul, iar în forma a doua răzuirea sau tăierea urmată de ardere cu galvanocauterul. — 2. *Nevul vascular* numit și *angiom*, *tumoră erectilă*, are iarăși 2 forme: *plană* și *ridicăată*. În forma *plană* avem niște pete roșii, sau violete, de diferite mărimi și forme, regulate sau neregulate, provenite după credința poporului în diferite emoțiuni încercate de mamă în timpul sarcinii. Ele se află de obicei la față, la ceafă, la gât, pe spate.

În forma *ridicată* avem niște ridicături sau tumori mici, unele rotunde, altele de altă formă, de diferite mărimi, de culoare roșie sau negricioasă; ele sângerează cu înleznire. Ca *tratament* se recomandă compresiune, scarificațiuni liniare dar repetate, ardere cu substanțe chimice sau cu termocauterul, ori cu galvanocauterul, electroliză, crioterapia (arderea cu zăpadă carbonică).

Nevralgie (dela grec. *neuron*, nerv, și *algos* durere), *durere de nervi*. — Boală caracterizată printr'o durere vie pe traiectul unui nerv, care vine prin accese și cam în același ceas în timpul zilei, la intervale aproape fixe. Durerea poate ține un sfert de oră până la un ceas, uneori însă poate fi continuă și slabă, mărindu-se din când în când sub formă de svâcnituri, de înțepături, de fulgerături. Durerea vine dela sine, în mod spontan, dar se mărește la cea mai mică atingere sau apăsare în dreptul părții dureroase. În răniri, în inflamațiuni, în cancer precum și într'o mulțime de boale pot fi dureri destul de vii, chiar foarte tari, dar acele dureri sunt difuze, împrăștiate, întinzându-se pe o suprafață hotărâtă și putând fi înțepite printr'o apăsare făcută în orice punct al acelei suprafețe, ele sunt fără svâcnituri, pe câtă vreme *durerea nevralgică* se întinde numai într'o singură direcțiune care corespunde cu drumul nervului bolnav, se înțește printr'o apăsare făcută în anumite puncte și se însoțește întotdeauna de svâcnituri. *Cauzele nevralgiei* sunt multe. Între cele *generale* avem: anemia (lipsa de sânge), guta, paludismul, reumatismul, sifilisul; iar între cele *locale* se numără: răceala, apăsarea pe nerv prin congestiune, sau o tumoră vecină, ori vr'o altă boală a țesuturilor vecine (carie dentară). Mai sunt nevralgii produse printr'o acțiune reflexă, adică la distanță, cum se întâmplă atunci când cineva are viermi intestinali (panglică, limbrici). Toate părțile corpului, fie superficiale fie profunde, pot fi atinse de nevralgii, căci toate au nervi, dar nevralgiile cele cari se văd mai des sunt: nevralgia feței, nevralgia intercostală, sciatică. (Vezi *Față*, *Junghiu*, *Sciatică*). *Tratamentul*. O nevralgie mai întotdeauna este foarte greu de com-

bătut, cu atât mai mult cu cât nu este de ajuns să potolim numai durerea dar să facem ca ea să nu mai revină. O nevralgie se potolește aplicând pe partea dureroasă un *muștar*, lăsat pe loc 5—10 minute; după un sfert de ceas se poate face pe acelaș loc o fricțiune cu o bucată de flanelă înmuiată într'un liniment compus din *balsam tranchil*, sau unt de migdale dulci (30 gr), din cloroform și din laudan (din fiecare câte 5—10 gr.); fricțiunile se vor repeta din 2 în 2 ore, iar în intervale se lasă pe loc flanela înmuiată în liniment; muștarul se poate aplica de 2—3 ori pe zi, iar linimentul se poate înlocui cu ulei de mușetel camforat, cu ulei de terbenină, etc. Dacă durerea nu se potolește cu aceste mijloace se poate aplica o *vezicătoare* volantă, timp de 5—6 ceasuri, punând pe acelaș loc după ce s'a ridicat vezicătoarea un centigram de morfină. Când durerea este foarte mare și bolnavul nu mai poate răbda vom face o injecțiune sub piele cu *morfină*. Se mai recomandă pulverizațiune pe partea dureroasă, cu lichide refrigerente, cum sunt: *clorul de etil*, sau de *metil*, cu *eter*, *puncte de foc* sau dungi de foc, *faradizațiunea* pielei cu un pământ electric. Dintre unsoarele și fricțiunile întrebuițate în nevralgii cele mai bune sunt: *balsamul Opodeldoch*, diferite linimente compuse din laudan și cloroform în asociație cu ulei de măsălarită (*iosciam*); *gaiacol* cu *glicerină*, sau cu *salicilat de metil*, care de asemenea se întrebuițează și singur. Pe *dinduntru* se dau o mulțime de medicamente *analgezice*, dintre cari cele mai bune sunt: *antipirina* 1—5 gr.; *piramidonul* 30 centigrame până la 1 gr. *fenacetina* 50 centigrame până la 2 gr.; *aspirina* 50 centigrame până la 3 gr.; *bromidratul* și *valerianatul de chinină* (date cu 6 ceasuri înainte de crize), *ipnal* 1—2 gr.; *salicilat de sodiu* 2—6 gr.; *tinctură de colchic* 26—40 picături; *opiu* și *beladonă* (1 centigram de extract, de 2—5 ori pe zi), etc. Dintre *agenții fizici* se întrebuițează *masajul*, simplu sau vibrator; *idroterapia* sub formă de duș cald sau scoțian, duș de aburi, băi de pucioasă sau cu terbenină; *electroterapia* (faradizațiune, scânteii franclinice, curenți de mare

NEUR

frecvență și tensiune, băi statice). Ca tratament *chirurgical*, în nevralgiile rebele, se recomandă : *alungirea* nervului bolnav, *tăierea* lui (*nevrotomie*), *rezecțiunea* nervului pe o întindere oarecare (*neurectomie*). Nu este de ajuns să combatem nevralgia, ci trebuie să facem ca ea să nu mai revie, pentru care lucru trebuie să combatem cauza : *anemia* cu fieruginoase și tonice, *reumatismul* cu salicilat de sodă, *paludismul* cu chinină, arsenic, *guta* cu colchic, *sifilisul* cu mercur și iod, *diabetul* cu regim, insulină, *isteria*, *neurastenia*, sau *epilepsia* cu bromure, valeriană, hidroterapie, sugestiune, etc.

Neurastenia (dela grec. *neuron*, nerv, și *asthenia*, slăbire), *nervozism*, *nevropatie*, *slăire nervoasă*, *boală de nervi*.— Cel care a descris mai întâiu neurastenia a fost americanul Beard (1869—1880), dar aceasta nu însemnează că mai înainte de el n'ar fi fost oameni neurastenici, din potrivă au fost destui cari suferau de tot felul de boale nervoase, cunoscute sub diferite nume, dintre cari cele mai multe țin astăzi de neurastenie, botezată astfel de Beard. Neurastenia este o *nevroză* (vezi acest cuvânt) caracterizată printr'o slăbire a forței nervoase. Această slăbire nervoasă se arată adeseori prin alternative de depresiune (moleșală) și de excitațiune (afățare, întărătare), de unde vine și numele de *slăbiciune iritabilă* ce i s'a dat. Neurastenia interesează întreg sistemul nervos, dar cele mai adeseori stăpânește cutare sau cutare parte din el, de unde provin și multele forme sub care se arată această boală și care variază dela un om la altul. Neurastenia este mai ales o boală a etății adulte, dar sunt și forme precoce cari se arată în preajma juneții (pubertății), la tinerii cu creștere repede, al căror sistem nervos este foarte fraged și cedează la cea mai mică isbire. Această boală se vede mai des la bărbați decât la femei. Poate fi produsă de orice cauză congenitală, (din naștere) sau câștigată, constituțională sau accidentală, care este în stare să tulbure în mod adânc nutrițiunea organismului în general și cea a sistemului nervos în particular. Ereditatea nevro-artritică este de ajuns s'o producă (neurastenie constituțio-

NEUR

nală); alteleori însă ea numai prepară terenul și boala nu se ivește decât cu prilejul unei cauze accidentale, cum ar fi : surmenajul (oboseală prea mare), cu deosebire surmenajul moral produs de abuzul de plăceri, de supărări, decepțiuni (amăgiri); intoxicațiunile sau otrăvirile cu alcool (spirt), tutun, morfină, sulfurd de carbon, mercur, plumb, cocaină, etc.; boalele infecțioase; sifilis, frigurile palustre, influența, febra tifoidă; traumatismele sau loviturile; boalele tubului digestiv și mai ales boalele organelor genito-urinare; boalele organice ale sistemului nervos, etc. În unele cazuri se pare că ereditatea n'ar avea nici un rol (neurastenie accidentală), cu toate acestea neurastenia *constituțională* este varietatea cea mai de seamă, cea care se vede mai adeseori și de multe ori chiar neurastenia așa zisă *câștigată* nu este altceva decât o întetire (întărătare) a neurasteniei constituționale, care a fost neobservată.— **Semnele** acestei boale sunt multe și foarte variate după cum vom vedea îndată. În mod general putem reduce pe toți neurastenicii la două tipuri de căpetenie, între cari se găsesc o mulțime de tipuri intermediare. Unii sunt palizi, slabi, deprimați, cu capul aplecat cu privirea pierdută, iar la întrebări răspund scurt, încet și cu oarecare îndoială nehotărâtă; ei seamănă cu *melancolicii*. În opoziție cu acest tip vezi pe un altul care are înfățișarea unui om foarte sănătos, gras, voinic, roșu la față, cu vocea bărbătească, plin de viață, viori în mișcări, dar îndată ce-l întrebi de sănătate începe a-ți povesti despre indispozițiile și suferințele lui, descriind o mulțime de dureri și de simțiri supărătoare cari îl chinuesc și cari nu se potrivesc de loc cu înfățișarea lui cea bună. El, în loc să-ți inspire milă, te face să râzi și să-l crezi un bolnav închipuit. Mai mult decât atât, el are credința că nimeni nu este așa de bolnav ca el, nimeni n'are suferințele lui, așa de multe și de variate încât, ca să nu le uite, și le însemnează pe hârtie pentru ca să le poată spune doctorului pe toate. Acestea sunt cele două tipuri de neurastenici. Mai toți au durere de cap care se simte de obicei în amândouă tâmplile, alteleori în

ceafă; bolnavul simte un fel de greutate și de strângere a capului (ca și cum ar purta un coif), alte ori el are o simțire de ceva gol. Durerea poate fi continuă, însă variază în intensitate în timpul zilei; ea începe dimineața, se micșorează în timpul mesei pentru a se mări din nou la o jumătate de ceas după mâncare, spre înserate iarăși este mai mică, se întărește după mâncare pentru a dispărea în timpul nopții. Orice muncă cu creierul mărește durerea, iar când ea ajunge la culme pielea capului este simțitoare la cea mai mică atingere; la unii le troznește ceafa când mișcă din cap. Altă suferință este *durerea de șira spinării (rachialgie)*, care se arată sub formă de greutate și de apăsare, mai cu seamă în dreptul gâtului, în șale și în dreptul osului crucii (sacru); uneori ea se însoțește de slăbiciune și amorțeală în picioare, de o simțire prea mare a pielii (*iperestezie*). Mulți se plâng că nu pot dormi, că au *insomnie* sau că au somnul agitat (neliniștit); după ce se culcă și adorm, se deșteaptă îndată, mai întotdeauna la același ceas și în tot restul nopții se tot succesc și răsucesc în pat, chinuți de o mulțime de simțiri neplăcute, de înțepături, de amorțeală, de svăcnituri, etc., cu capul buimăcit de tot felul de idei și de aduceri aminte. Câte odată, spre dimineață, obosiți, ațipesc, apoi se scoală sdrobiți de oboseală; mai mult de cât erau la culcare. Sunt unii neurastenici cari simt trebuința de a dormi după mâncare, dar după ce s'au culcat nu pot adormi cu nici un preț, iar dacă adorm au visuri rele, supărătoare, după cari se deșteaptă repede și cu neliniște. De obicei bolnavii de neurastenie sunt mai molesiți dimineața după ce se scoală, înainte de dejun, decât seara. Unii dorm relativ bine toată noaptea și chiar în timpul zilei câte un ceas două, dar aceasta nu-i odihnește, ei se simt tot obosiți și plictisiți. O suferință tot așa de supărătoare este *amețeala*, care vine de obicei sub formă de accese, însoțită uneori de turburări digestive. De multe ori amețelile se arată printr'o simțire de goliste în cap cu slăbiciune în picioare, cu ceață pe ochi, cu pete negre sau muște sburătoare în câmpul

vizual. Uneori bolnavii au o simțire de înălțare și de scoborâre pe pământ, alteori se clatină ca în stare de beție, fără însă să cadă. Ceeace îi mai chinuște pe neurastenici este o *slăbiciune de nervi și de mușchi (astenție nervo-musculară)*, care se arată sub forma unei oboseli permanente și de neînving, pe care o simțesc bolnavii de cum se deșteaptă și care, când este în grad mai mare, îi împiedecă de a-și vedea de afaceri; ei se forțează, se silesc să muncească, dar nu sunt în stare s'o facă mai mult timp căci îndată se ostenesc. Pentru cel mai mic lucru, care în stare normală se execută cu cea mai mare înleznire și în mod automatic, ei trebuie să-și impună o voință tare pentru a-l face, așa că mulți bolnavi renunță la orice muncă, la orice mișcare și stau toată ziua la tolanii pe o canapea. Această slăbiciune nu merge însă până la paralizie și în timpul mâncării ea scade; de multe ori ea se mărginește numai la un grup de mușchi. Unii bolnavi mai au *crampe, contracturi funcționale* (crampele scriitorilor), *tremurături* în membrele superioare (în mâni), iar *reflexele* sunt mai adeseori micșorate decât mărite. Un rol important în suferințele neurasteniceilor îl au și *turburările din partea tubului digestiv*, cari adeseori se ivesc chiar dela începutul boalei. Aceste turburări sunt foarte variabile și cea mai de competenție este *dispepsia* (mistuire grea, anevoioasă). În forma *ușoară* starea generală a bolnavului nu prea este atinsă; apetitul se păstrează, deși în mod inegal. Mâncarea produce o ușurare momentană de aceea unii bolnavi își fac obiceiul de a mânca ceva și pe la mijlocul nopții. Când însă neurastenicul mănâncă ceva mai mult simte greutate la cap, amorțeală, greutate la stomac, care se umflă, răgăituri, toate acestea ivindu-se cam la o jumătate de oră după mâncare. Scaunul mai nici odată nu este regulat: bolnavul când are *diaree*, când este *constipat*, dar mai adeseori este constipat și atunci materiile sunt tari, acoperite uneori cu spumă sau false membrane albicioase; uneori el are *dureri prin mafe*, pânțele tras și dureros la pipăire. Durerile se duc câte odată spre beșică, organele genitale, nervii

sciatici. In formele *grave* ale dispepsiei turburările de nutrițiune sunt mai mari și bolnavul, deși mănâncă mult, slăbește repede și foarte mult. Sufărînta neurastenicilor nu se mărginește numai la acestea, căci ei mai au și *turburări din partea aparatului circulator* și cu deosebire din partea inimii-care bate adeseori foarte repede și aceste *palpitațiuni* le are bolnavul mai cu seamă în timpul mistuirii; ele pot dura luni întregi, ceea ce îl deprimă și îl slăbesc mult. *Presiunea arterială* de obicei este slabă, dar se poate modifica în tot momentul și sub influența cea mai mică. Ea se mărește sub influența emoțiunilor și în timpul mîncării. *Turburările din partea organelor genito-urinare* se ivesc adeseori și chinuesc mult bolnavul: bărbatul are poluțiuni nocturne, raporturi sexuale incomplete, cu ejaculațiuni prea repezi; femeia suferă de mitră, care i se pare că se umflă; urinarea se face des și uneori cu greutate. *Organele simțurilor* prezintă diferite turburări: lăcrimare, dureri de ochi, vederea uneori împăinjenită, câmpul vizual câte odată micșorat, mai ales când bolnavul are și ameteți; urechile vâjje și șueră. *Senzibilitatea generală* este și ea modificată: iperestezie, dureri cu tip nevralgic, svâcnituri cari seamănă cu durerile fulgerătoare, amorțeli prin membre. Unii bolnavi au dureri dăinuitoare, uneori localizate în organele din pînătece sau într'un alt punct al corpului (în limbă, la noadă, etc.) dureri cari nu se schimbă prin apăsare și cari nu atîrnă de vreo alterațiune a nervilor și țesăturilor; durerile locale se arată mai ales la cap, la gât, la noadă, la beșica udului (la bărbați), la mitră (la femei), la stomac, la mațe, Unii bolnavi sunt foarte răi de căldură, alții sufar de frig și la orice schimbare atmosferică. La toate aceste semne ale neurasteniei se mai adaugă o stare specială de *neliniște* provocată prin *frică*, sau mai bine zis prin diferite frici (*jobii*): frică de singurătate sau din contră frică de mulțime, de spațiurile mari goale (*agorafobie*), sau de spațiurile închise (*claustrofobie*), de accidente, de trăsnet, dar mai cu seamă *frica de boale*. Această frică este produsă de grija prea mare ce și-o poartă bolnavul

lui însuși, analizându-și toate funcțiunile, temându-se de cea mai mică schimbare ce s'ar produce în acele funcțiuni și în cele din urmă pierzându-și orice încredere în sănătatea lui, în puterea, în inteligența și în afecțiunile lui, fiind incapabil de a-și mai vedea de afaceri și de interesele cele mai mari, cari de altfel îl preocupă cu mult mai puțin decât limba lui încărcată, stomacul greoi, sau vreo durere simplă de ceafă sau de tâmplă. El nu se mai gîndește decât numai la ființa lui și nu vrea să știe nimic de lume. Această preocupare constantă și stare de neliniște pot merge până la extrem; s'au văzut neurastenici rătăcitori (mai cu seamă ovrei), cari, trăind cum pot, călătoresc în lumea întreagă și consultând pe toți doctorii învățați. Cu toate aceste neurastenicul nu este un ipocondriac, el nu se crede bolnav dar îi este frică de a nu se îmbolnăvi; el nu este sigur dacă e cu adevărat bolnav și tocmai despre aceasta caută să se asigure. Din neliniștea și neglijența în care trăiește neurastenicul rezultă *depresiunea morală*, care se arată mai des prin micșorarea voinții, de unde provine nehotărârea lui, printr'o micșorare a atențiunii, de unde vine neputința de a se apuca de o muncă intelectuală și prin scăderea memoriei. Mulți din neurastenici se emoționează foarte ușor și foarte des. Caracterul lor se schimbă; unii caută singurătatea, alții sunt supărăcioși și au crize de mînie, de furie, fără nici un motiv dar cari sunt de scurtă durată. Neurastenia *accidentală*, adică cea câștigată, se vindecă după câteva luni, pe cîtă vreme cea *constituțională* este foarte îndărătnică la tratament și vindecarea nu se face în mod complet, așa că boala se iesește din nou și aceasta se repetă la infinit, vindecările nefiind decât numai niște simple remisiuni. Boala este cu atît mai gravă cu cît bolnavul are o moștenire bolnăvicioasă mai bogată. — *Tratament*. Neurastenia n'are până acum nici un tratament specific. Se va ține seamă de cauzele boalei, de natura și de intensitatea simptomelor, apoi va reglementa igiena bolnavului, iar la medicamente se va recurge cît se poate mai puțin. *Neurastenia constitu-*

țională implică o predispozițiune ereditară asupra căreia nu poate lucra în copilărie decât numai o educație rațională și profilactică. Dacă neurastenia provine dintr'un surmenaj intelectual vom recomanda un *repaus* (odihnă) atât intelectual cât și moral. Când cauza boalei sunt *supărările și decepțiunile* vom depărta bolnavul de mediul în care trăiește și pentru distracție îi vom recomanda călătoriile. Când neurastenia însoțește o stare de *dispepsie* sau alte turburări din partea tubului digestiv, ne vom ocupa de stomac și de mâncare. Alte ori ea este o *autointoxicațiune* de origine intestinală, epatică (colemie), suprarenală sau tiroidiană, lucruri de cari iarăși trebuie să ținem seamă; tot astfel și când ea provine dintr'o boală de mîtră, din sifilis, sau dintr'o intoxicațiune cronică (alcoolism, cafeinism, saturnism, morfinomanie) vom institui un tratament special. *Tratamentul general* al neurasteniei trebuie să fie mai ales *igienic*. Neurastenicul va fi depărtat de preocupățiunile profesiei lui și de grijile familiare; el va fi instalat într'o localitate de țară, plăcută și așezată, dacă se poate, la o înălțime de 600—800 metri deasupra nivelului mării, nici odată însă pe malul mării, care nu le convine de loc la bolnavii excitabili. Uneori se impune *izolarea* bolnavului într'o casă de sănătate sub paza directă a medicului, cu oprirea oricărei vizite și a oricărei corespondențe, mai cu seamă pentru femei și pentru morfinomani, sau alcoolici. Un mijloc de tratament este *repausul*, fizic sau moral, după cum este și cauza boalei. *Starea în pat în continuu* este bună la începutul neurasteniei și în formele grave, timp de 2—3 săptămâni, dar nu mai mult, căci i-ar face rău bolnavului. Această odihnă dela începutul boalei se recomandă bolnavului pentru a-l face mai apt pentru tratamentul de antrenare pe care va trebui să-l urmeze exact după arătările doctorului, care li va prescrie cu deamănuntul, ceas cu ceas, ce are să facă (ocupațiunile), mesele și plimbările. După un repaus absolut (făcut dacă se poate în aer liber) bolnavul se va obișnui din nou cu mișcarea făcând gimnastică suedeză, prin întrebuințarea de aparate

cu tracțiune elastică, făcând masaj și plimbări regulate și din ce în ce mai prelungite fără să ajungă până la oboseală. După mîncarea dela amezai bolnavul va face o odihnă (siestă). Călătoriile sunt bune, făcute însă fără oboseală. O mare atențiune merită *hrana* (alimentațiunea), care trebuie să fie substanțială și variată; bolnavul va mânca de 4—5 ori pe zi, însă nu mult odată. Se va opri ceaiul, cafeaua, tutunul, iar la masă se va bea puțin vin sau bere. Pentru cei dispeptici (cu mistuirea grea) se va recomanda mai mult regimul vegetarian. În tratamentul neurasteniei locul de căpetenie îl ocupă *idroterapia* și anume: la început se va face *duș* cu apă caldă de 33—37°, plimbat de sus în jos, de amîndouă părțile șirii spinării, evitînd orice lovitură; pentru calmare dușul va ține 4 până la 8 minute. Va începe pe șira spinării, apoi pe partea dinainte a corpului, sfîrșind prin membrele inferioare, după care se va șterge încet corpul întreg. Acest duș se va repeta de 2 ori pe zi, până la calmarea stării nervoase; numai atunci este permis să se combată slăbiciunea de nervi, încălzind apa în timpul dușului cu 1 sau 2 grade pentru a o răci apoi gradat; la orice reacțiune trebuie să se opună apa caldă și numai încetul cu încetul vom ajunge să terminăm dușul aruncînd apă rece. Când predomină sleirea din partea creierului nu vom face duș la cap; la turburări din partea inimii vom face un duș ușor pe regiunea ei. Pentru turburările din partea stomacului și mătelor vom face duș cât se poate de ușor, iar pentru turburările genito-urinare se recomandă duș în partea de jos a pîntecelui, sau în regiunea perineului, asociat cu duș temperat, sau cu baie de șezut. Apa rece, sub formă de duș mobil cu aruncătură frîntă de 15 până la 30 secunde, nu se recomandă decât numai după ce a dispărut orice excitație. Pentru nevralgii se vor face dușuri de aburi. Cura de idroterapie trebuie să dureze 2—3 luni. În lipsă de dușuri ne putem mulțumi cu înveliri în cearșafuri înmuiate în apă rece, cu sau fără fricțiuni, sau la nevoie mare cu *afuziuni* (vezi acest cuvînt) reci. Aceste aplicațiuni se vor face mai mult dimineața,

la scolare, după câteva exerciții (cu un aparat cu tracțiune elastică) și ele vor fi urmate după primul dejun de o plimbare pe jos. Intru cât privește *electricitatea*, ea poate să aibă un rol ajutător în tratamentul neurasteniei, mai mult sugestiv. Se întrebuințează mai cu seamă *francinizațiunea* sub formă de bae statică, de suflare sau de fricțiuni electrice; asupra atoniei intestinale lucrează cu bun succes *galvanizațiunea* intensivă, iar aplicațiunile *curenților de mare frecvență* pe patul condensator sunt foarte întăritoare. Pentru neurastenia spinală este bună *faradizațiunea* generalizată. Pentru neurastenici este mai bună o stațiune de munte decât o stațiune de mare prea frecventată. — *Tratatul cu medicamente* trebuie să fie foarte restrâns, căci bolnavii de neurastenie nu prea se împacă cu doctoriile și prin urmare nu trebuie nici odată să abuzăm de ele. Starea de *anemie* se va combate cu *fier* (protoxalat 2 buline pe zi de câte 15—20 ctgr.), (*ferroconstans* este un bun preparat de fier), cu *arenal* (5 ctgr. pe zi), cu injecțiuni de *cacodilat de sodiu*. Pentru *slăbiciunea generală* se va da *cola*, *glicerofosfatele de calciu* (50 ctgr. până la 1 gr. pe zi.) Un bun preparat de calciu este *calcigenolul* iradiat. Se mai recomandă ca întăritor de nervi *lecitina* (10—50 centigrame) în hapuri, sau în soluțiune uleioasă pentru injecțiuni sub piele, apoi nuca vomică, sulfatul de stricnină, cari sunt și aperitive în același timp. Pentru *durerea de șira spinării* (*rachialgie*) se recomandă odihnă, duș cald și scoțian, aplicat pe partea dureroasă. Pentru a combate *insomnia* (lipsa de somn) vom da băi calde de 20—40 minute și de 36—38°, cearșafuri reci de 10°, înfășurare rece peste pânțele în timp de 10—20 minute, cari sunt mai bune decât sulfonalul, veronalul, hedonalul, hipnalul, tironalul, bromida, paraldehydă, a căror întrebuințare se va face rar, în mică doză și la mare trebuință; nu se va da niciodată *opiu* sau *morfină*. Dacă *amețelile* nu încetează prin tratamentul general se poate da în contra lor nuca vomică, arseniatul de stricnină, trinitrina. Se va recomanda odihna în pat într-o cameră tăcută șampanie frapată,

(în contra vărsăturilor), calomelul, seacă cornută, idrastis, hamamelis. Pentru *palpitațiuni* sunt bune comprese reci pe inimă, sau suflare electrică pe aceeași regiune, baia statică, valeriana, valerianatul de amoniac, etc. *Constipațiunea* va fi combătută cu masaj abdominal, comprese reci pe pânțele, galvanizațiune intensivă, cari sunt mai bune decât cascara, sămânța de in, stricnina, clistirele etc. *Neurastenia genitală* se va combate cu sugestione (contra impotenței), băi reci de șezut, galvanizațiuni sau faradizațiuni ferindu-ne de medicamentele afrodisiace.

Nevrom (dela grec *neuron*, nerv, și *terminațiunea om*, care înseamnă tumoră) — Tumoră desvoltată în țesutul unui nerv, care este foarte dureroasă și nu se vindecă decât prin operație.

Nevropatie. — V. la *Neurastenic*.

Nevroză (gr. *neurosis*). — Sub numele de *nevroze* se înțeleg niște stări bolnăvicioase cari se produc fără să se poată constata vreo leziune organică ce lasă în urma lor numai turburări trecătoare în organe și în funcțiunile lor, cari atârnă de o turburare a sistemului nervos și prin urmare dau naștere la schimbări din partea inteligenței, mișcării sau senzibilității, a căror gravitate și durată variază foarte mult. Caracterele unei nevroze sunt: *apirexia* (lipsă de căldură), care, deși nu este constantă predomină în nevroze; *mobilitatea simptomelor* (variabilitatea suferințelor), cari se arată în mod succesiv din partea diferitelor organe, sau funcțiuni și cari foarte rar rămân localizate într'un singur organ sau țesut. Nevrozele se arată mai cu seamă la persoanele slabe, debile; ele se văd mai des la femei și sunt câte odată ereditare. Nevrozele pot fi provocate de muncă intelectuală prea mare, de emoțiuni morale vii, de stricarea sângelui etc.; ele de obicei se vindecă, dar pot dura foarte mult timp. Nevrozele sunt de 3 feluri: 1. *Nevroze ale senzibilității* generale în cari intră *nevralgiile* (vezi *Nevralgie*) și nevrozele pielii (*dermalgie*), ale viscerelor (*gastralgie*, *enteralgie*, *cistalgie*, etc.), ale unor nervi speciali (*migrenă*, *amețeală*, *angină de piept*, etc.), precum și *anesteziile* (pielii, mușchilor,

nerilor). 2. *Nevroze ale motilității* (mişcării), între cari avem : *convulsiunile*, *crampele*, *spazmele*, *tremurăturile*, *palpitațiunile*, unele *paralizii*. *Nevroze complexe*, cum sunt : *catalepsia*, *coreia*, *epilepsia*, *isteria*. Cetitorul va căuta la aceste cuvinte pentru a vedea semnele și tratamentul nevrozelor.

Nicotină. — V. *Tutun*.

Nictalopie (dela gr. *nyx*, noapte, și *ops*, ochiu). — Boală în care cineva nu vede bine lucrurile decât la o lumină slabă sau în timpul nopții. Ea provine dintr'o mare sensibilitate a retinei. Se mai observă când cineva are albeață (pete pe corneie), cataractă începătoare (perdea), în otrăvirile cu alcool și cu tutun. *Tratamentul* variază după cauză; ochelari fumurii, gălbui la nervoși; operație în cazurile de albeață și de cataractă.

Nimfomanie (dela gr. *nymfe*, nimfă, și *mania*, manie). — Sub acest nume se înțelege dorința irezistibilă și nesăturată pentru actul venerian, care provine dintr'o perversiune morală, sau dintr'o boală de mitră (mai ales în etatea critică), alteori însă ea ține, ca și *satiriază*, de o adevărată nebunie impulsivă, care de cele mai multe ori însemnează începutul *paraliziei generale*. Nimfomania, care provine dintr'o boală de mitră, sau din vreo intoxicațiune oarecare, se vindecă repede, pe câtă vreme *mania erotică*, ce vine, la unii alienați ține până la bătrânețe. *Tratamentul* constă în igienă morală și întrebuințarea medicamentelor antispazmodice și în idroterapie. Relațiunile sexuale normale și complete, când sunt cumpătate, vindecă uneori nimfomania. În cazurile de alienațiune mintală bolnavul trebuie izolat într'un azil special.

Nisip. — V. *Gravelă*.

Nistagm (dela gr. *nystagmos*, oscilațiune, mișcare de legănare sau clătinare). — Această boală constă într'o mișcare de oscilațiune a ochilor, însoțită sau nu de clipirea pleoapelor, oscilațiuni ce se pot produce în toate direcțiunile; ele pot fi orizontale, verticale, sau pot consta în niște mișcări de rotațiune sau de circumducțiune. Amândoi ochii sunt mai în totdeauna agitați în același timp, mai ales în nistagmul orizontal; alteori nistagmul

nu este de o potrivă în amândoi ochii. Câte odată nistagmul nu este continuu, ci numai în unele momente mai cu seamă când ochii privesc în sus. El se mărește prin emoțiuni, prin privire fixă, prin atențiune și se micșorează sau poate chiar să dispară prin odihnă, prin distracțiuni. De multe ori nistagmul coincide cu o micșorare a vederii. *Cauzele* acestei boale sunt diferite boale ale creierului și măduvii spinării: meningita, fractura craniului, ataxia locomotrice, scleroza, etc. Uneori nistagmul se ivește chiar dela naștere. Alteori se însoțește de alte boale de ochi: albinism, miopie, perdea (cataractă), retinită. El se mai vede la cei ce lucrează în mine, când provine dintr'un iluminat rău, sau dintr'o intoxicațiune. *Tratamentul* constă în ochelari, gimnastică oculară, scoaterea cataractei, încetarea lucrului în mine, etc.

Nitarcă nitarcă roșie. — Caută la *Ciuperca* (Mănățârcile).

Nitrat de argint. — V. la *Argent*.

Nitrate, nitric (Acid), **nitru**. — Este știut că aerul atmosferic se compune dintr'o parte de *oxigen* și patru părți de *azot*, care intră în compoziția tuturor substanțelor animale și vegetale. Azotul combinându-se cu oxigenul formează *acidul azotic*, sau *acidul nitric*, care este un lichid fără culoare, foarte arzător și exală vapori albi cu un miros neplăcut și sufocant. Acidul nitric *pur* (curat) este o otravă foarte puternică; el arde și inflamează părțile cu cari vine în atingere. În medicină nu se întrebuințează decât pe *dinafară* pentru a distruge negii, sau pentru a atinge rănilor urâte. În caz de *otrăvire* cu acid azotic se va da magnezie diluată în apă în mare cantitate, în același timp cu lapte și apă albinoasă. Acidul nitric subțiat cu apă se dă ca băutură răcoritoare și diuretică, sub formă de *limonadă nitrică* (vezi *Limonade*). — Combinat acidul azotic cu alte corpuri dă *săruri*, cari se numesc *azotate* sau *nitrate*, dintre cari cele mai întrebuințate sunt; *azotatul* sau *nitratul de argint*, care, topit și turnat, formează creioane, cunoscute sub numele de *piatra iadului*, cu care se ard rănilor și plăgile cari nu se vindecă iute, tăieturile cari sânge-

rează, băătăurile, negii, etc. Nitratul de argint se mai întrebuințează în boalele de ochi sub formă de *colir* (10 centrigame la 10 gr. apă), în dizenterie (urdinare cu sânge) sub formă de pilule, în poțiune, în clistir. — *Sub-nitratul de bismut* (vezi *Bismut*). — *Azotatul sau nitratul de potasă* cunoscut sub numele de *nitru*, sare de *nitru*, *salpetru*. Această sare albă, fără miros, cu gust proaspăt, înțepător și puțin amar, care e baza prafului de pușcă, se întrebuințează în medicină ca *diuretic* (face ud mult), în doză de 1—4 gr, într'o poțiune de gramine (pir), de hameiu, de cozi de cireșe, etc.

Nitroglicerină. — Caută la *Trinitrină*.

Nodurar. — V. la *Răculeț*.

Nomă (gr. *nome*, dela *nochein*, a roade). — Gangrena guri de origine microbiană, care se poate vedea la orice vârstă, dar mai cu seamă la copiii de 2—5 ani și mai întotdeauna în urma, sau în cursul unei boale generale (difterie, febră tifoidă, pojar, scarlatină, scorbut). Noma începe prin o beșicuță plină cu un lichid roșietic și înconjurată de un cearcăn violaceu, care se arată pe căptușeala obrazului, mai ales a celui din stânga. Beșicuța se sparge și în locul ei rămâne o rană (ulcerațiune) cenușie, care se întinde repede în suprafață și în adâncime, dând un miros foarte urât. Uneori boala se oprește aci, dar cele mai adeseori rană se înegrește, se întinde și se ivește pe pielea obrazului. Din gură curge o salivă (bale) sângeroasă, puturoasă și în cantitate mare. Apoi cea mai mare parte din obraz cade rămânând o spărtură mare în față. Bolnavul are căldură mare, diaree, prostrăție, slăbiciune. Gangrena se poate produce în același timp în plămâni, în gâtlee, stomac, la picioare și la mâini. *Tratament.* Spălături abundente cu o soluțiune de acid boric (4 la 100); arsuri cu termocauterul sau galvanocauterul, iar pe dinăuntru medicamente tonice, reconstituante, alcool și injecții cu ser antigangrenos.

Nomol (Băi. de). — V. la *Băi*

Nostalgie (dela gr. *nostos*, reîntoarce, și *algos*, suferință), *dorul de căminul părintesc, dorul de casă*. — Se numește astfel o *tristețe* nebiruită pro-

dusă prin depărtarea dela locul natal, dela căminul părintesc; tristețe însoțită de o dorință de a te întoarce acasă la care nu te poți împotrivi. Nostalgia se vede mai adeseori în ju-nețe și mai cu seamă la bărbați; ea se ivește de obicei la cei blânzi, simțitori și cu un temperament nervos; oamenii cu puțină instrucțiune și țărani sunt cei mai aplecați spre această boală. Soldații și marinarii sunt foarte adeseori atinși și în armată s'au văzut adevărate epidemii de nostalgie; tratarea rea și lipsurile au o influență mare în producerea acestei suferințe. Nostalgia nu este propriu zis o boală; ea este mai mult o turburare psihică (sufletească) care poate în formele grave să dea naștere la o depresie morală și fizică foarte mare, însoțindu-se de turburări grave de nutrițiune și să se termine prin moarte. — *Semnele* nostalgiei sunt cam următoarele: cel atins de ea începe prin a fi trist, tăcut, morocănos, neliniștit; el este cuprins din când în când de moleșală, de slăbiciune, vorbește mereu de părinți, de frați, de casă, de sat ca de un loc fermecător, apoi cade pe gânduri. După câțva timp el începe să suspine și să plângă fără voie, se ofilește, nu mai are poftă de mâncare, mistue cu greutate, are urdinare; apoi capul îl doare într'una, somnul îi este neliniștit și are visuri cari îi reamintesc viața de acasă; respirația îi este scurtă, pielea uscată, pulsul slab și încet, are căldură seara, puterile îi părăsesc, slăbește repede și mintea i se tâmpește. În cele din urmă toate aceste suferințe se măresc și bolnavul nu mai poate dormi de loc, aiurează, cade într'o stare de toropeală, are urdinare, călduri mari, slăbește văzând cu ochii din pricina lipsei de poftă de mâncare și a turburărilor digestive. Toate aceste suferințe sfârșesc prin moarte, care de altfel poate veni și mai degrabă prin vreo complicație oarecare, cum ar fi o aprindere de plămâni (pneumonie), o boală de inimă, o febră tifoidă, sau chiar o oftică, dacă nu cumva bolnavul și-a scurtat singur zilele omorându-se. — *Mersul* nostalgiei este foarte variabil, uneori ea are un mers foarte repede (nostalgie cerebrală supra acută), de cele

mai multe ori însă ea are o durată mai lungă și poate chiar să dispară înainte de a se ivi vreo stricare serioasă a funcțiunilor organice. Nostalgia confirmată este ușor de cunoscut, dar ea poate să se ivească pe încetul și să nu fie băgată în seamă la început. La cei ce simulează (fătăresc) nostalgia nu se vede slăbirea cea mare, nici turburările digestive. *Tratamentul prevenitor* constă într'o educațiune morală serioasă a copilului, în arătarea unui interes binevoitor tinerilor cari și-au părăsit casa părintească, în distracțiuni și exerciții musculare. Odată boala declarată cel mai bun mijloc de a o vindeca este de a trimite bolnavul la căminul părintesc, iar până atunci se va întreține puterea suferindului printr'o hrană bună, prin preparate tonice, întăritoare (fier, chinină, etc.); se va deștepta pofta de mâncare și se va ușura mistuirea prin preparate amare; se va combate lipsa de somn și aiurarea prin preparate de opiu, cloral, sulfonal, trional, veronal, etc.; iar pentru întărirea sistemului nervos se va recomanda idroterapia.

Nou-născut (lat. *infans*), *copii de păta*. — Copilul venind în lume se mai



Fig. 275.—Cum ducem copilul la bae

ține încă de mamă câteva minute prin *cordonul ombilical* (buric) și prin *placenta*, cunoscute de lume sub numele de *casa copilului*. În această placenta

mai este o câtime mare de sânge care aparține corpului copilului, din care pricină nu este bine ca îndată după naștere să se lege și să se taie buricul, căci prin aceasta copilul ar pierde cam 90 grame de sânge aflat în casă. Această pierdere de sânge este foarte mare pentru copilul nou-născut, în-tocmai cum ar fi pentru un adult o pierdere de sânge de 1700 grame. Trebuiește dar ca legarea și tăierea buricului să nu se facă până când vâna care ține încă legat copilul de casa lui nu se turtește prin trecerea sângelui în corpul copilului. Legarea buricului se face cam la 2—3 degete dela punctul în care se fixează de pântecel copilului, cu un fir gros de ață ceruită, strâns cât se poate de bine, apoi mai sus cu un deget se aplică altă legătură tot astfel și între aceste două legături se taie buricul cu ajutorul foarfecilor. Foarfecile și ața care se întrebuințează la moșit trebuie să fie fierte în apă, în clocot, cel puțin o jumătate de oră; mâinile ni-le vom spăla cu apă și săpun, apoi le vom ține afundate câteva minute într'un lighian, sau castron, cu spirt curat, sau cu sublimat corosiv 1/1000. Buricul astfel tăiat se înfășoară în cârpe fine, înmuiate în puțin undelelemn sau de migdale dulci, sau unse cu vaselină boricată (toate sterilizate), primenind aceste cârpe în fiecare zi până ce cade buricul, ceea ce se întâmplă cam între a 5-a și a 7-l zi. Dacă cumva ața n'a fost destul de strânsă și a curs câteva picături de sânge vom aplica o altă legătură mai bună. După ce a căzut buricul se pansează rana cu vată și vaselină boricată până ce se vindecă. Cordonul ombilical legat și tăiat, ne vom încredința despre conformațiunea membrilor, despre starea orificiilor naturale și apoi vom proceda la prima toaletă a copilului. Aci este locul să atragem atențiunea asupra unui lucru foarte important. Adeseori se întâmplă că copilul când se naște să aibă *capul alungit*, ținut ca o căpățână de zahăr, iar moașa, fie că se crede prea iscusită, fie că este silită de mamă în dorința ei prea mare de a avea un copil mai frumos decât toată lumea se grăbește a-i rotunji capul în mâini, în tocmai cum s'ar juca cu o minge.

Acest lucru este foarte primejdios și trebuie ocolit cu orice preț, căci capul copilului nu va rămânea astfel, ci încetul cu încetul își va reveni în mod natural la starea normală. *Toaleta primă* constă în a curăți corpul nou-născutului de grăsimea de pe piele fricționându-l foarte ușor cu untdelemn, sau cu un gălbenuș de ou, apoi scufundându-l câteva minute într'o baie caldă, spălându-l foarte ușor cu nițel săpun, după care îl ștergem cu o cârpă curată și moale sau cu o flanelă, încălzită de mai înainte. — Înainte de a merge mai departe cetitorul nu se va supăra dacă îi vom vorbi ceva despre scăldătoarea nou-născutului, cum se face ea în casele *țaranilor noștri*, așa după cum o descrie regretatul



Fig. 276. — Copilul este introdus în baie

membru al *Academiei Române*, *†* părintele S. Fl. Marian, în scrierea sa *Nașterea la Români*. Oala în care se fierbe apa trebuie să fie nouă, pentru că precum sună oala cea nouă, așa și copilul nou-născut să aibă o voce curată, pătrunzătoare și plăcută. *Apa* să fie caldă, iar nu ferbinte, nici clocotită pentru ca copilul să nu devie desfrânat și viața lui să nu fie neliniștită, cum este apa când fierbe în clocote. În apa de baie se pune o rămurică de busuioc, bani de argint, o floare de bujor, lemnul Domnului, fagur de miere, nițică pâine și zahăr, un ou, puțin lapte dulce și o lecuță de aghiasmă. Toate aceste pentru ca copilul să fie: *scump ca argintul, dulce ca mierea, bun ca pâinea, sănătos ca*

oul, rumen ca bujorul, atrăgător ca busuiocul și alb ca laptele, și așa mai departe. După ce a spălat copilul, moașa îl trage puțin de nas ca să nu fie turtit sau borcănos, apoi îl măsoară în cruciș, adesea îi aduce genunchiul drept până aproape de cotul stâng și genunchiul stâng până aproape de cotul drept. Aceasta pentru că copilul, fiind scrântit sau soldit să se îndrepte. — Odată baia făcută copilul trebuie îmbrăcat, sau mai bine zis înfășat. *Înfășarea*, nu este bine să se facă așa cum se face de obicei la noi, unde copilul înfășat seamănă cu un cartaboș, neputându-și mișca mâinile și picioarele. Scopul înfășării nefiind altul decât acela de a pune copilul la adăpost de răceală, este bine ca ea să nu se facă strâns, pentru ca pieptul să se poată umfla și desumfla liber, iar picioarele să se poată îndoi și întinde



Fig. 277. — Cum finem copilul în baie

cu înleznire. *Imbrăcămintea* se compune dintr'o scufiță de pânză pentru cap; pentru piept o cămăsuță și un peptăraș deschis înapoi; pentru pân-tece și pentru picioare două bucăți de pânză (*scutece*) și pe deasupra o pătură subțire de flanelă sau de lână, cari toată trebuie să fie destul de lungi pentru ca să se poată îndoi peste picioare și să ajungă până la subțiori unde se fixează. În Anglia este un obicei mai bun: acolo nu se înfașe copilul, ci din primele zile îl îmbracă cu niște pantalonași deschiși înainte și înapoi, iar pe deasupra cu o rochiță lungă de lână, destul de largă ca să nu-i strângă pieptul; în cap nu pun nimic. În acest mod copilul se desvoltă în voia lui. — Să vedem acum

țărâncă noastră cu ce și cum înfașe copilul? Obiectele de cari se servește ea sunt : pe cap îi pune o scufie pentru ca să-i ție cald și să arate mai frumos. Această scufiță are pe partea dinainte o cordeluță roșie, sau un bănuț, pentru ca oamenii și mai ales femeile rele de ochi să nu-l *deochie*, (vezi *Deochiu*). Pentru corp întrebuințează cârpe (scutece), o fașe sau un brâu, apoi cei bogați și câte o plăpămioară. Unele moașe după ce l'au înfașat în obiectele mai sus arătate și astfel ca fașa să formeze o cruce la piept și alta la spate, anume ca să



Fig. 278. — Copilul este scos din bae

nu se poată apropia *duhurile cele necurate* de dânsul și după ce l'au îmbrobodit cam strâns cu tulpănașul ca să nu capete cap mare, bolocănos, ci mic, rotund și frumos, îi fac cruce cu degetele pe față și apoi îl duc la fereastră ca să vadă lumea și acolo îl închină *ursitelor*. În același timp îi pune degetul drept pe bărbie, crezând că făcând aceasta, s'ar face în mijlocul bărbiei o *gropiță*, care, când crește copilul mare mai ales dacă e fetiță, îi șade bine. Apoi îi pune degetele cele mari dela amândouă mâinile pe amândoi obrazi pentru același scop, adică să capete câte o *gropiță* în fiecare obraz. După aceasta îl arată mamei, care, sărutându-l, îi face urare să fie drag la toată lumea, sănătos, voios, norocos, frumos, dăragăstos, învățat,

bogat, om de treabă și luat în seamă (Marian). — Copilul îmbrăcat se pune în leagăn, care este patul lui (vezi *Leagăn*). În timp de iarnă este bine să punem în jurul lui câteva sticle umplute cu apă caldă. Copilul poate fi pus la sân după câteva ceasuri dela naștere (vezi *Alăptare*); iar până atunci i se pot da câteva lingurițe de apă îndulcită cu zahăr, călduță. Una din condițiunile de căpetenie ce se cer pentru binele și prosperitatea copilului este o *curățenie* deosebită. Ori de câte ori copilul a murdărit rufăria trebuie să i-o schimbăm. Copilul nu trebuie să fie numai șters, ci spălat cu un burete înmuiat în apă călduță. Prin acest mijloc vom menține în toată întregimea ei funcționarea pielii, iar pe de altă parte vom preveni opăriturile (spuzelile) și celelalte boale de piele cari se pot ivi din această pricină. *Băile* se vor face în fiecare zi; căldura apei va fi între 25—30°, iar durata băiei va fi de 5 minute. Capul micului copil cere o băgare de seamă deosebită. El nu va fi spălat numai cu restul corpului, ci este bine ca să fie din când în când fricționat cu o cârpă sau cu o perie moale, pentru ca să se ridice *coșile*, mătreața și grăsimea de pe el. Nu trebuie să uităm că în timpul băiei camera trebuie să fie încălzită, temperatura ei să fie în termen mijlociu de 20°, și aceasta pentru ca să nu răcească. — Terminând vom spune câteva cuvinte și despre *asfixia* noilor-născuți. Copilul la naștere se pare că este mort : la unii pielea și limba sunt vinete (*asfixie vânătă* sau *albastră*), la alții ele sunt palide (*asfixie albă*) și la toți corpul este amortit, bătăile inimii foarte slabe, așa de slabe încât nu se pot simți, respirația tot astfel. În aceste cazuri trebuie să intervenim repede ca să nu moară copiii și anume : trebuie să le desfundăm căile aeriene (respiratoare) cu degetul, gădilind nasul cu o pană de gâscă sau de găină, să facem trageri ritmate asupra limbii (vezi *Asfixie*) în timp ce altă persoană bicuiește copilul, îl fricționează (îl freacă) cu cârpe calde și îl pune într-o baie de muștar. Dacă cu acestea copilul nu revine i se va face *insuflațiunea*, lipind gura de gura copilului și suflând tare în ea sau făcând aceasta

cu un insuflator special. Celor ce se interesează mai de aproape de îngrijirile noului născut le recomandăm cărțile : „*A.B.C-ul îngrijirii copilului mic*” de *Dr. Axente Iancu* și „*Cum să ne creștem copiii*” de *Dr. I. Glăvan*.

Novaspirină. — Pulbere albă, fără miros cu gust puțin acidulat insolubilă în apă. Lucrează ca și aspirina însă nu este așa obositoare pentru stomac și nu produce transpirație așa mare. Se dă în boalele de răceală, în influență, reumatism de încheieturi, reumatism gutos, icter cataral cu umflarea ficatului, coree, dureri nevralgice, durere de cap, etc. *Doză* : 3—4 gr. pe zi zi pentru adulți ; la cei mai mari 30—50 centigrame, la cei de 12 ani și mai mari 1 gr.

Novocaină. — Cristale albe, solubile într-o parte de apă și 30 părți de alcool : soluțiuni aproape neutre, prea puțin iritante, cari nu se alterează prin sterilizare ; puțin toxică, mai puțin toxică decât cocaina și stovaina. Analgezic local întrebuințat pentru a obține rachi-anestezia, analgezia superficială, în operațiunile pentru cari nu trebuie o narcoză generală : deschideri de abcese, furnicele, sugiu, extirpări de mici tumori, etc. Ea are o acțiune analgezică energică dar fugace, care însă se poate prelungi prin adăugirea *adrenalină*. Se obține în acest caz o acțiune anestezică energică și de o durată mai mare decât aceea produsă de cocaină. Se întrebuințează sub formă de soluțiuni 0.50—20 la 100 în injecțiuni sub piele, în instalațiuni, în badijonări. În arta dentară soluțiuni de 2 la 100 (1—5) grame cu adăugire de 2—5 picături dintr-o soluțiune de *adrenalină* de 1 la 100).

Novaci. — Localitate de vilegiatură în munții Gorjului. Sat mare cu vite numeroase ; pozițiune pitorească, din care cauză este mult frecventată. Altitudinea de 680 metri.

Nubil, Nubilitate (dela lat. *nubere*, a se căsători). — Când cineva este destoinic de a se căsători se zice că este *nubil*. Un băiat este *nubil* la etatea de 24—26 ani și o fată la vârsta de 18—22 ani.

Nuc (*Juglans regia*, fam. *Juglandaceelor*). — Arbore mare și trumos, originar din Persia, se cultivă la noi pe

scară foarte întinsă. Fructele lui *nucile*, sunt bune de mâncat și dau prin stoarcere un oleu : *untul de nucă*, ce se întrebuințează la gătirea mâncărilor de post, plăcut la gust, dar se rânzește ușor și produce arsuri la stomac. În medicină se întrebuințează frunzele de nuc și învelișul cărnos fructelor verzi, cu mult *tanin*. Frunzele sunt astringente, tonice antiscrofuloase ; coaja de nuc se dă în contra gâlbînării, a boalelor de piele, a dălacului, (pustulei maligne) ; învelișul cărnos al fructelor verzi se recomandă în contra scrofulelor și rachitismul, lucrează și ca stomachic. Pe *dinăuntru* se dă sub formă de ceaiu făcut din frunze sau din învelișul cărnos al fructelor verzi, din 20 la 1000, sau sub formă de extract, 2—4 gr. ; ca stomachic și antiscrofulos. Pe *din afară* se întrebuințează sub formă de decoct (fiertură) din 50 la 1000 în spălături vaginale pentru poală albă (leucoree) și pierderi de sânge ; untul de nucă intră în preparațiunea unor alifii. — *Nucile proaspete* sunt sănătoase și plăcute la gust, dar cei ce sufăr de mistuire grea și de durere de stomac să se cam ferească de ele ; *nucile vechi* sunt grele pentru toată lumea. — La țară se fac scaldători de frunze și coaje verde la copiii slabi și scrofuloși. Cu coaja verde de nucă fiartă, străcurată și adăugându-se zahăr în cantitate îndoită se face un sirop bun care se dă cu lingurița de trei ori pe zi la copii scrofuloși. Cu frunzile fierde și calde se înfășoară pânțele femeilor, cari nu pot face *casa* în timpul nașterii. Pentru durere de măsele se fierbe coaja de rădăcină de nuc și se ține zeama în gură. Coaja se întrebuințează în contra *răci*. *Pecingenia* se vindecă dacă se unge cu must din coajă de nucă verde. Aceste se păstrează într-o sticlă cu rachi și se dă în contra *frigurilor de 3 zile* ; un păhăruț de rachi cu o seară înainte de friguri.

Nuca vomică, turta lupului (*Strychnos nux vomica*). — Arbore care crește în India prin locurile aride și nisipoase. Se întrebuințează semințele și coaja. Medicament foarte otrăvicios. Nuca vomică conține două principii active : *stricnina* și *brucina*. Se dă în tratamentul paraliziiilor fără leziune or-

ganică și în durerile de stomac (gastralgii cronice). Ea se întrebuițează sub formă de : pulbere, 5—25 centigr. ; extract alcoolic, 2—8 centigrame ; tinctură, 15—85 picături pe zi. — *Brucina* nu se uzitează. — *Stricnina* este *extrem de toxică* ; medicament tetanic, se dă în paraliziile fără leziune organică și ca excitant al stomacului. Pe *dinăuntru* se dă în doză de 1 până la 10 miligrame ; în granule de un miligram fiecare, 1—10 pe zi. Pe *dinafară* în colir, 10 centigrame la 10 gr. apă. Dintre sărurile de stricnină avem ; *arseniatul de stricnină*, *azotatul sau nitratul de stricnină* și *sulfatul de stricnină*, care se întrebuițează mai mult și lucrează ca tonic amar, regulator al funcțiunilor măduvii spinării. Sulfatul fiind foarte solubil lucrează mai repede decât stricnina. El se dă pe *dinăuntru* în doză de 1—10 miligrame în granule de câte un mgr. ; în sirop, socotit 5 mgr. pentru o lingură ; în injecțiuni sub piele, în doză de jumătate de miligram până la 2 mlgr. pentru • injecțiune ; una sau două injecțiuni pe zi. — *Otrăvirea cu nuca vomică* și *stricnină* are următoarele semne : fața palidă, descompusă, fălcile încleștate tare, respirațiunea regulată ; corpul este cuprins de *mișcări convulsive*, se îndoiește înapoi în timp ce brațele, întepene, se încrucișează asupra pieptului și membrele inferioare se întepenesesc cu putere. După o pierdere de cunoștință aproape absolută, convulsiunile reîncep și sfârșesc prin moarte. În timpul acestor suferințe inteligența se păstrează. Rigiditatea cadaverică apare repede și poate ține două luni.

Tratament. Când ne găsim în fața unei astfel de otrăviri cel dintâi lucru ce trebuie să facem este să desțărăm otrava din stomac dând medicamente vomitive, sau făcând o injecțiune cu apomorfina, sau spălând stomacul dacă se poate, apoi vom da un purgativ uleios. Efectele otrăvirii le vom combate prin *respirație artificială*, *inhalățiuni de cloroform* și mai ales prin *cloral* (injectat în vine sau dat prin clizme) în doze masive. Contra-otrava stricninei este *curara*, care se dă în injecțiuni sub piele, dar ea nu lucrează decât în doze periculoase prin ele înșiși.

Nucșoară, nucușoară.—Semințele aromatice ale arborelui *Myristica fragrans* sau *Myristica moschata*, originar din insulele Moluce ; este cultivat mult în țările tropicale, pentru semințele și coaja lor cărnosă numită *frunzișoară*. Nucșoara se întrebuițează ca condiment și în medicină. Principiul activ este un ulei gras aromatic (*unt de nucșoară*). Ea lucrează ca tonic, excitant aromatic. Se dă pe *dinăuntru* sub formă de praf, 50 centigrame până la 4 gr. ; tinctură ($\frac{1}{10}$), 1—2 gr. în poțiuni ; esență, 5-10 picături. Pe *dinafară* untul de nucșoară servește la facerea pomezilor, alifiilor ; face parte din balsamul Nerval și din linimentul Rosen.

Nufăr.—Sunt 2 feluri de nufăr : *alb* și *galben*. *Nufărul alb* (*Nymphaea alba*, se mai numește *plămună albă*, *plută*, *tidvă de apă*, și este o plantă erbacee aquatică frumoasă care crește



Fig. 279. — Nufăr alb

și pe la noi prin apele stătătoare sau, lin curgătoare, uneori cultivată (Iunie-August). *Nufărul galben*, (*Nymphaea luteum*), numită și *mănușăr*, *plămună galbenă*, *plută* și *plută galbenă*, este tot • plantă de apă și se deosebește de prima prin culoarea galbenă a florilor. Amândouă aceste plante au aceeași însușiri ; rădăcina lor conține pe lângă o feculă alimentară și puțin tanin,



Fig. 280. — Nufăr

acid galic și rezină, cari le dau proprietăți astringente, tonice și stimulente, din care pricină se întrebuițează în leucoree (poală albă), bleonoragie (sculament), dizenterie, și pe *dinafară* în rănile cari sângerează și sunt fără viață. Afară de rădăcină se

mai întrebuințează și florile sub formă de ceaiu 10 la 1000, sau sub formă de sirop, din care se dă 50—100 gr. pe zi. — La țară se întrebuințează ră-

dăcina și florile de nufăr galben în contra vătămurii, iar șerbetul de floare în contra ofitei.

Nutrimet.— V. *Alimente*.

Oaie (lat. *ovis*). — Carnea de oaie, de berbec, este hrănitoare, se mistue ușor și e plăcută la gust, bună pentru stomacurile delicate, cari nu pot mistui bine carnea de vacă. Părțile cele mai bune sunt costițele și ciosvărta (jigot), cari se mănâncă sub formă de friptură, pe câtă vreme celelalte părți se prepară sub formă de tocană sau, de iahnie. Carnea de oaie, sau de berbec, este mai bună de mâncat când animalul este de 2—3 ani. Oile din Dobrogea, cari se hrănesc cu iarbă sărată, au carnea cea mai gustoasă. Carnea de miel (între 2—6 luni) este plăcută la gust, dar este mai puțin hrănitoare și se mistue mai greu din cauza gelatinei.

Obezitate (dela lat. *obesus*, gras), *boală de grăsime*. — Această boală constă în îngrămădirea de grăsime în cantitate exagerată și dezvoltarea ei în toate părțile corpului, chiar și în acelea unde de obicei nu există grăsime. Dacă un om adult, având o statură de 1 m. 70 centimetri, cântărește 67 kgr. el este gras potrivit și nu se poate zice că suferă de obezitate decât numai în cazul când ar ajunge la o greutate cel puțin de 90 kgr.; dacă el cântărește mai puțin de 67 kgr. se zice că este slab. Prin urmare este bine ca să ne menținem la această *bună-stare*; să nu căutăm nici să prea slăbim, nici să ne prea îngrășăm dacă voim să fim sănătoși. Obezitatea slujește înfățișarea omului și are o înrăurire rea asupra sănătății. Grăsimea îngrămădită în mușchiu face ca ei să se contracteze, cu anevoință, din care pricină mersul și mișcările se fac cu greutate. Inima, care este un mușchiu, fiind încărcată cu grăsime, bate încet, slab și neregulat, așa că circulația sângelui se face rău, iar respirația se face cu greutate și omul simte un fel de apăsare pe piept și uneori are chiar accese de sufocație. Sunt trei tipuri de obezitate și anume:

mare, mijlocie și mică. În *obezitatea mare* încărcarea de grăsime este generalizată în tot corpul sub piele, în mușchi și în organele interne (inimă, ficat, etc.). Un om bolnav în acest grad și fiind în vârstă de 35—45 ani cântărește dela 120 până la 150 kgr. se citează bolnavi cari au cântărit 240 și chiar 320 kgr. Infățișarea acestor bolnavi este înspăimântătoare: fața le este ca luna plină, obrații fără nici o încrețitură; ochii sunt ascunși de grăsimea de sus și cea de jos, deși pleoapele nu sunt grase, bărbia îndoită sau întreită și ceafa groasă ca o pânișoară. Părțile membrelor sunt despărțite între ele numai prin mici șanțulețe liniare; țâțele mari cad ca niște săculețe de grăsime până pe pantece, care la rândul lui se arată sub forma unui șorț de grăsime, fără ca să se mai vadă buricul și uneori ascunzând organele genitale, cari pe lângă acestea sunt acoperite și de grăsimea coapselor. Acești bolnavi cu timpul devin neputincioși, ne mai putându-se scula fără ajutor, nici să șadă după ce s'au culcat. Ei nu mai pot mânca la masă, nu pot să urineze, nici să meargă la scaun fără ajutorul altora și în cele din urmă, ajung să fie mișcați în pat cu cearșaful. Au respirația foarte grea se înecă, fața anemiată sau, din contră, vultooasă, cianozată, inteligența amortită, somn mult; ei sunt condamnați la o *moarte subită* sau la o *moarte progresivă* prin încetarea inimii de a mai bate, prin încetarea funcționării ficatului și rinichilor. La acești bolnavi obezitatea începe în adolescență și merge progresiv până la etatea adultă; ei câștigă în fiecare an 5—10 kgr. și mor înainte de 40 de ani. În *obezitatea mijlocie* un om de statură de 1 m. 70 ajunge până la 105 kgr.; mișcările sunt mai puțin jenate și turburările funcționale mai mici. În *obezitatea mică* un om de aceeași statură ajunge până la 91

kgr. — Intre *cauzele* acestei urâcioase boale se numără *ereditatea* și în acest caz ea se arată din vreme din tinerețe; ea atinge de o potrivă amândouă sexele și recunoaște drept cauză predispunătoare diateza artritică și unele turburări ale glandelor cu secreție internă; ea este determinată în prima linie de viață liniștită și sedentară, de o hrană prea bogată, compusă mai cu seamă din grăsimi, feculente și hidrocarbure, de abuzul de băuturi alcoolice și de apă. Astfel ea se vede mai des la bogați, la funcționarii de birou și la toți cei ce duc o viață puțin activă și cari mănâncă mult; ea nu se vede la țărani, la muncitori, la soldați, decât foarte rar. — *Tratamentul* obezității constă în regim, mișcări și exerciții și în medicamente. În primul rând este *regimul alimentar*; hrana trebuie redusă și luată cu măsură la fiecare masă, cel puțin până ne obișnuim a o cântări din ochi. Se va micșora puțin câte puțin proporția albuminoidelor, cu o cincime, materiile grase, pe jumătate, la început feculentele și mâncările zaharate; apoi se vor suprima și se vor înlocui prin legumi verzi. Să nu se bea nimic la sfârșitul mâncării, când se va lua puțin ceaiu cald, slab și fără zahăr, nici odată între mese; pâine foarte puțină (100—150 gr. pe zi). Se vor suprima supele, ciorbele, sosurile, condimentele, feculentele bogate (fasolea, mazărea, lintea), prăjiturile, lichiorurile, berea, rachiul, țuica, vinul. Pătlașelele roșii coapte încet (trei sferturi de ceas) fără grăsimi, fără unt și fără apă, ci numai cu sare, piper, usturoiu și pătrunjel, constituie un fel de mâncare plăcută și bună pentru obezi. Dintre fructe sunt bune: fragile, cireșile, coacăzele, portocalele, însă toate fără zahăr. Unora li se prescrie un regim numai de ouă și de lapte, care prin monotonia lui micșorează apetitul. După vindecare se va îmbunătăți regimul, iar cantitatea pâinii nu va trece peste 250 gr. pe zi. Ca *mijloace ajutătoare* avem mai cu seamă mișcări și exerciții. *Masaajul general*, *masaajul vibrator* metodic, *gimnastica suedeză*, mișcărilor active ale membrilor, apoi ale trunchiului, gradate prin aparate a căror rezistență este măsu-

rată prin contra greutatea (*mecanole-rapie*); toate acestea sunt bune pentru *obezii impotenți*, iar pentru ceilalți mersul pe jos, pe loc drept, sau pe urcușuri, este de ajuns cu condițiune ca să nu se obosească și să se facă gradat. Se mai recomandă *scrima*, *bicicleta*, *vânătoarea*. Șederea în pat se va mărgini la 7 ceasuri pe noapte. *Idroterapia* poate aduce servicii sub formă de *duș rece* (după o sudațiune moderată), de *duș scoțian*, de *masaj sub apă* (în timpul verii). Unii recomandă *băile calde* sau *băile de nisip*, cari activează schimburile în organism. *Electroterapia* se întrebuințează sub formă de: *duș* sau *baie statică* (15—20 minute, la 2 zile, la obezii neurastenici); de *curenți de mare frecvență* (25—30 minute, de 3 ori pe săptămână, la obezii artritici și gu-toși); sau sub formă de mari *băi idro-electrice* (de 20—30—40 minute cu curenți galvanici de 100—200 m. a.). *Medicamentele* întrebuințate în obezitate sunt: *purgativele*, cari trebuiesc date în mod sistematic, mai cu seamă *purgativele saline*: fie acasă, fie la vr'o stațiune termală. Este bine să nu se ia purgative decât la unele intervale, pentru ca să nu slăbească prea mult stomacul și intestinele. Pentru constipația obișnuită simplă este bine să se dea *laxative* și să se facă *masaj abdominal*. Medicament propriu pentru a slăbi nu este. S'a dat iodurul de potasiu sau de sodiu, în doze mici, mult timp continuate (50—75 ctgr. pe zi), mai ales la obezii arterio-scleroși. *Thyroidina* trebuie dată cu multă bagară de seamă, căci ea expune la accidente de multe ori grave (durere de cap, amețeli, slăbiciune, bătăi neregulate de inimă).

Obiceiu, deprindere. — Este o vorbă adevărată că *obiceiu* este a doua natură. În adevăr, dacă faci un lucru oarecare, fie el bun sau rău și dacă acest lucru îl repeți adeseori, ajungi în cele din urmă, de capetei o destoinicie de a repeta același lucru, căminimeni altul din jurul tău nu o poate face astfel; dar ceea ce e mai ciudat este că ajungi să repeți acel lucru fără voia ta, cu rost sau fără rost, și că nu te mai poți stăpâni de a nu-l repeta, ceea ce înseamnă că acest

obiceiu de a face mereu același lucru s'a prefăcut în a doua natură. Să ne lămurim prin câteva exemple: ai început să fumezi, te-ai obișnuit cu fumatul, mai încearcă acum de a te lăsa! Toată lumea știe cât de greu este să te lași de tutun; dar nu numai atât, lăsarea de tutun dintr'odată pentru moment îți face rău, te indispoze, te pune pe gânduri, îți îngreunează mintea și pentru câțiva timp nu-ți poți vedea de afaceri decât cu mare anevoință. De aceea cel mai bun lucru este ca să te lași de tutun încetul cu încetul, până ajungi să scapi definitiv de această buruiănă otrăvitoare. Te-ai obișnuit să bei băuturi alcoolice? ei bine, încearcă de te lași și vei vedea cât de greu îți vine. Și aci ca și la tutun lăsarea nu se poate face dintr'odată; un bețiv cărui i-ai tăia băutura de tot s'ar simți foarte rău, sau dacă ar cădea bolnav și n'ar ține seamă de obiceiul său și nu i-ai da să bea câte puțin din ceea ce obișnuit să bea l'ar nenoroci, l'ar omorî. Omul n'are numai obiceiuri rele, de cări ar trebui să se ferească și dacă le-a căpătat să caute să se desfacă de ele din vreme, dar el are și obiceiuri bune cari trebuiesc păstrate. Astfel de obiceiuri bune sunt: a se culca și a se scula în fiecare zi la aceleași ceasuri, a face zilnic un exercițiu oarecare, a se plimba în fiecare zi pentru a respira aer curat, a mânca la ceasuri hotărâte și cam tot în aceeași măsură, nu odată prea puțin și altă dată prea mult, a avea scaun regulat, etc. Obiceiurile rele sunt foarte vătămătoare pentru sănătate; să ne ferim de ele, sau, dacă le-am luat, să căutăm a ne desface cât se poate mai iute de ele. Părinții sunt datori să-și observe copiii și să nu-i lase, încă decând sunt mici, ca să ia vreun obicei rău, căci mai ușor este de a-i împiedeca să se obișnuiască cu ceva decât de a-i scăpa de vreun obicei rău. Intrebuințarea continuă a unui medicament îi slăbește lucrarea asupra organismului și dacă vrem să mai lucreze trebuie să-l dăm în doză mai mare, după cum se întâmplă cu opiu. Pegula este deci să nu continuăm a lua prea mult timp același medicament, căci în cele din urmă

ajunge de nu mai are nici un efect. Dar această regulă nu se potrivește la toate medicamentele, cum sunt unele cari luate mereu se îngrămădesc în corp, prin faptul că ele nu se elimină (nu ies afară) din organism în aceeași măsură și îngrămădindu-se produc otrăvire, cum se întâmplă cu digitala, mercurul, bismutul în injecții, etc.

Obiele sau *oghiele*. — Sunt niște căpe cu cari se învelesc picioarele când se încălță cu cisme, ghete sau opinci. Ele înlocuiesc, ciorapii la oamenii săraci. Se fac din pânză ordinară și din lână, după timp. Ele trebuie să fie câte se poate de curate; primenite foarte des, aproape zilnic, de aceea este bine ca omul să aibă cel puțin două rânduri de obiele, așa că într'oză poartă pe unele, iar pe celelalte le spală și usucă. Obielele trebuiesc înfășurate în jurul picioarelor cu regulă și fără multe încrețituri, cari pot produce frecături și bătăături.

Obligeană, *calm*, *spetează*, *spetează pestriță*, *trestie mirositoare* (*Acorus calamus*). — Plantă erbacee, originară din India; crește pe marginile bălților, lacurilor și râurilor din Europa, unde a fost cultivată și a devenit aproape spontană (Iunie—Iulie). Rizomul ei are un miros aromatic plăcut, un gust amar, proprietăți datorite unei esențe, principiu activ numit *acorină*, care face să fie întrebuințat în medicină ca stomatic, tonic și stimulent contra catarelor cronice și a dispepsiei. În industrie se întrebuințează pentru aromatizarea prăjiturilor și a unor lichioruri. *Doză*: sub formă de *praf* 1—4 gr.; ca *ceai*, 20 în 1000; *sirop* 25—100 gr.



Fig. 281
Obligană

Oblojeii. — V. *Cataplasme* și *Fomentațiuni*.

Obnubilație (dela latin. *obnubilatus*, învelit de un nor). — Prin acest cuvânt se înțelege o stare în care bolnavul se simte învelit ca de un nor. Această stare se deosebește de *vertij*, în care bolnavul crede că vede lucru-

rile întoarse. Obnubilația este simptomul dela început al sincopei (leșinului) și precedează adeseori moartea; ea poate să rezulte din diferite boale de creer.

Oboseală, osteneală.—Corpul nostru are trebuință de odihnă după fiecare muncă, odihnă cu atât mai mare cu cât și munca a fost mai încordată. Tot astfel și organele au o alternativă de activitate și de odihnă, pe cari trebuie să le îndeplinească în măsură potrivită în fiecare zi. Dacă lucrarea sau exercițiul au ținut prea mult timp, organul care este în joc se simte rău și slujba lui nu se mai face cu aceeași putere ca la început, sau încetează. Această stare se numește *oboseală* și nu are alt leac decât *repausul*, sau *odihna*. Când lucrăm cu *mintea*, cetind sau scriind, după un timp oarecare simțim o greutate la cap, *creerul* s'a ostentit și dacă continuăm a lucra mai departe ne expunem la turburări intelectuale grave. Prin urmare ca să ocolim toate acestea avem neapărată trebuință în totdeauna de o odihnă mai mult sau mai puțin mare, după cum a fost și activitatea creerului. *Stomacul* nostru fiind supus la o lucrare prea mare și des repetată se ostenește și nu mai poate mistui bine mâncarea, sau nu o mai poate mistui de loc, de unde rezultă că nu trebuie să mâncăm prea des, nici prea mult odată. Când lucrăm cu *mușchii* mult timp simțim oboseală generală, de oarece contractând mereu mușchii mânilor și ai picioarelor, aceștia își uzează propria lor substanță, iar creerul, care mereu își trimite poruncile prin nervi la mușchi, se obosește și el la timpul său. Nu trebuie să pierdem din vedere că tot așa de mult ne obosim stând pe loc mai mult timp și în aceeași poziție ca și cum am umbla sau am munci, căci pentru ca să stăm pe loc, nemișcați trebuie să ținem contractați mușchii tot așa ca și ori care sfortare. Obosindu-se mușchii începem să tremurăm și să avem dureri (crampe) în ei, iar dacă lucrul acesta se repetă prea de multe ori ne slăbește și ne face să fim mai simțitori la căldură și la frig și să ne îmbolnăvim mai ușor. Pentru a preveni oboseala cu toate urmările ei

omul are neapărată trebuință de odihnă. Nu este de ajuns însă numai de odihna adusă de *somnul* din timpul nopții, dar trebuie ca și în timpul zilei omul să se mai odihnească din când în când. Ceasurile de mâncare sunt bune pentru odihna creerului și a mușchilor, dar afară de acestea omul tot mai are trebuință de a-și lua câteva minute de odihnă din când în când, întrerupându-și lucrul. Dacă omul are nevoie de odihnă nu urmează ca să nu lucreze de loc, căci și odihna continuă este tot așa de vătămătoare. Cel ce este chemat, prin felul ocupațiunii sale, a sta pe scaun mai multe ceasuri pe zi, are trebuință din când în când să-și mai desmortească picioarele, schimbându-și locul sau făcând câțiva pași prin casă, iar după ce a eșit dela slujbă să nu intre numai decât acasă, ci să pornească la drum, să facă o plimbare mai lungă și la aer curat, ceea ce pentru el constituie o adevărată și bine înțeleasă odihnă.

Obraz (lat. gena). — Părțile laterale ale feței se numesc obraji; pielea lor este fină, subțire, acoperită de păr la bărbați, iar sub ea se găsește un strat de grăsime cu atât mai gros, cu cât omul e mai gras. Mușchii obrazilor, prin mișcările lor, dau fizionomiei diferite expresii. Pe partea dinăuntru a obrazilor se află un canal, al lui *Stenon*, prin care se scurge lichidul din cea mai mare glandă salivară, *parotida*. Rănirile obrazilor lasă semne urâte în urma lor, ca și arsurile, sau abcesele. Când cineva suferă de icter (gălbănare), pielea obrazilor e galbenă, când e anemic este palidă, ca paiul. Brânca (erizipelul) se arată adeseori la față, pornind, de obicei, dela nas. În paralizia feței, care de obicei se arată în jumătatea ei, încrețiturile pielei de partea paralizată sunt șterse, mușchii nu se mai pot strânge și figura, de partea aceasta, rămâne fără nici o expresie.

Obrinteală, obrintire. — V. Inflamație.

Obsesiune (dela lat. *obsidio*, a împresura, fig. a sta de capul cuiva, a lua în stăpânire).—Starea unei persoane, care se crede chinuită de un spirit necurat, de demon (vezi *Manie*).

Obstetrică (lat. *ars obstetrica*). — Par-

tea medicinei care se ocupă cu *facerile* sau *nașterile* (vezi *Facere* și *Sarcină*).

Obstrucțiune (dela lat. *obstruere*, a astupa). — Oprirea curgerii materiilor lichide sau solide prin canalele organismului prin vreo piedecă oarecare. Astăzi termenul de *obstrucțiune* se întrebuințează numai pentru a arăta oprirea materiilor fecale în intestine, fie prin o compresie produsă de vreo tumoră, fie prin sucirea mățului asupra lui însuși, fie prin altă cauză. În aceste cazuri de obicei zicem că avem a face cu *obstrucțiune intestinală*, sau *ocluziune intestinală*, sau în limba poporului *încurcătură de mâțe* (vezi *Intestin*).

Occipital (lat. *occipitalis*, dela *occiput*, ceafă). Osul cefii.

Ochelari. — Se numesc astfel sticlele (lentile) cari se pun înaintea ochilor pentru a îndrepta unele neajunsuri ale vederii. Sticlele sunt transparente, convexe, sau concave, după cum este și defectul vederii. Ochelarii numiți *conservatori* au sticlele plane și sunt colorate cenușiu (fumuriu) sau albastru. Defectele vederii cele mai de căpetenie sunt *miopia* și *presbiția*. Oamenii *miopi* nu văd lucrurile decât din *apropiere*, din pricină că la ei imaginea obiectelor de dinafară se face înaintea retinei; prin urmare la aceștia trebuie să facem ca lumina să se ducă mai înapoi și pentru aceasta vom întrebuința sticle *concave*. Oamenii *presbiți* nu văd lucrurile decât din *depărtare* din pricină că imaginea obiectelor se face înapoi de retină și prin urmare aci trebuie ca lumina să treacă prin sticle *convexe*, pentru ca să aducă imaginea chiar pe retină. Ochelarii sunt numerotați în mod crescând, așa că cei mai slabi poartă număr mai mic. Pentru a alege ochelarii este bine ca suferindul să se adreseze mai întâi la un doctor de ochi (oculist) care îi va hotărî numărul pe care are să-l cumpere. Cei mai mulți însă își aleg singuri numărul care li-se pare că le vine mai bine, ceea ce este o greșeală, căci de multe ori se pot înșela în alegerea numărului și atunci ochii li-se obosesc și li-se slăbesc. Un lucru trebuie să se știe: îndată ce omul începe să nu mai vadă bine când citește sau scrie, îndată ce observă că trebuie să țină cartea mai departe ca să

vadă literile mai bine, este semn că el este presbit și imediat să-și cumpere ochelari potriviți, dacă nu vrea să-și slăbească vederea. Cel mai periculos lucru este să se încăpățâneze și să nu poarte ochelari când trebuie, de rușine ca să nu-l facă lumea bătrân. Un presbit trebuie să-și schimbe din când în când ochelarii, după cum presbiția înaintează, căci iarăși nu este bine ca să întrebuințăm ochelari prea slabi; Miopul trebuie să meargă mai încet cu schimbarea ochelarilor și să înceapă cu cei mai slabi; ochelarii prea tari îi strică. Afară de aceasta sticlele trebuie să fie destul de mari pentru ca să acopere Ochiul întreg. Ele pot avea forma ovalară, sau rotundă.

Ochelarii conservatori sunt buni ori de câteori lumina este prea vie, fie ea solară, sau artificială, sau când ochii sunt prea simțitori, după cum se întâmplă iarna când zăpada este mare, întinsă peste tot și lumina soarelui prea vie, sau la cei ce lucrează mult la lumina artificială, la cei ce sufăr de roșeața ochilor (conjunctivită), etc. În toate aceste cazuri este bine să purtăm ochelari colorați. Ochelarii conservatori trebuie să fie mari, rotunzi și să acopere bine ochii; sticlele pot fi bulbucate ca sticla de ceasornic, iar în călătorii mai ales cu automobilul deschis, sau cu trăsura, se poate adopta în jurul ochelarilor un fel de sită deasă, prin care să se oprească praful de a ajunge la ochi. — Nu este bine, sub nici un pretext, să poarte cineva ochelari dacă nu are neapărată trebuință de ei. În această privință ca și în toate omul nu trebuie să facă decât numai ceea ce este bine și de neapărată trebuință.

Ochiul (lat. *oculus*, grec. *ops* sau *ophthalmos*). — Ochiul, sau *globul ocular*, este organul *vederii* și mulțumită lui vedem tot ce este în jurul nostru, putându-ne da seamă de locul, mărimea, forma, culoarea și alte însușiri exterioare ale corpurilor. Ochiul este așezat în *orbită*, sau *cavitatea orbitală*, în care se mișcă în toate sensurile cu ajutorul mușchilor, cari se prind pe de o parte de suprafața ochiului, iar pe de altă parte de unul din oasele cari formează orbita. Forma ochiului este a unei sfere al cărei diametru este

cam de 2 centimetri și jumătate. El stă în orbită ca într'un pat, învelit de toate părțile de țesături moi și de grăsime, iar înainte este apărat de două perdele, *pleoape*, sau *clipe*, cari se închid și se deschid după voie și după trebuință. Intre *organele protectoare* avem mai întâiu *cavitatea or-*




Fig. 282. — Ochiul

1 = pupila; 2 = caruncula; 3 = corneea; 4 = iris;
5 = sclerotica; 6 = pleopa de sus

bitară formată din mai multe oase reunite. Cam spre fundul orbitei, se află o gaură (*sfero-maxilară*), prin care trec vasele și nervii. Cavitatea orbitală este cu mult mai mare decât globul ocular; spațiul liber este umplut de mușchi și de un strat gros de grăsime. Înainte ochiul este apă-



Fig. 283. — Ochiul într-o secțiune verticală

1 = sclerotica; 2 = coroida;
3 = retina; 4 = cristalinul;
5 = membrana hialoidă;
6 = corneea; 7 = irisul; 8 = corpul vitros (sticlos); 9 = nervul optic.

rat de cele 2 *pleoape*, cari se închid după trebuință, ca niște perdele. Pe marginile pleoapelor sunt *genele*, puse în rând și cari opresc praful de a intra în ochi. Pleoapele sunt căptușite pe dinăuntru de o membrană

numită *conjunctivă*. Când ochiul este obosit de lumină pleoapele se închid și el se odihnește; tot astfel și în timpul somnului ele împiedică razele luminoase și corpii străini, de a pătrunde în ochi. Pleoapa de sus are deasupra ei o boltă osoasă (*arcadă*), a cărei piele este împodobită cu *păr*, care constituie *sprânceană* și care nu servește numai la frumusețe, dar are și însărcinarea de a opri sudoarea de pe frunte ca să nu meargă în ochi. — Să vedem acum din ce se compune globul ocular. Mai întâi avem două învelișuri: *sclerotica* în afară și *coroidă* pe dinăuntru. *Sclerotica* (dela grec. *skleros*, tare) sau pe românește *albul ochiului*, constituie patru cincimi din învelișul exterior, iar cincimea anterioară este formată de *corneea* (vezi acest cuvânt). *Sclerotica* este o membrană albă ca si-deful, opacă și foarte tare, groasă de un milimetru. În partea ei dinainte este acoperită de o parte a *conjunctivei*, care căptușește față internă a pleoapelor, de unde vine să se răsfrângă asupra scleroticii. *Coroida* (dela grec. *chorion*, membrană fină, și *eidos*, asemănare) se compune din trei părți: *coroida propriu zisă*, care căp-




Fig. 284 — Fundul ochiului

1 = macula; 2 = papila optică

tusește pe dinăuntru sclerotica; ea cuprinde foarte multe vase sangvine și un pigment care-i dă culoarea neagră și are însușirea de a absorbi razele luminoase cari au impresionat *retina*, ca vederea să fie limpede; — *zona ciliară* este un fel de cerc în jurul corneei; este format din două pături: cea din afară cuprinde fibrele *mușchiului ciliar*; dintre cari unele constituie un inel în jurul *cristalinului*, iar celelalte se duc dela sclerotică la coroidă; pătura dinăuntru este formată de o serie de îndoituri cari încadrează marginile cristalinului și cari se numesc *proces ciliar*. Aceste îndoituri cuprind foarte multe vase capilare cari pot fi umflate de sânge prin acțiunea mușchiului ciliar. Rolul zonei ciliare îl vom arăta când

OCHI

vom vorbi de *cristalin*. — A treia parte a coroidei este *irisul*, un fel de perdea întinsă înaintea cristalinului și se prinde prin marginea externă la locul unde se unește corneea cu sclerotica; mijlocul irisului are o deschizătură rotundă numită *pupilă*, sau *luminiță*, al cărei diametru se schimbă sub ac-




Fig. 285. — Secțiune verticală în ochi

1 = vitros; 2 = cristalin; 3 = pupila; 4 = corneea; 5 = nervul optic; 6 = zona ciliară; 7 = sclerotica; 8 = coroida; 9 = păiura pigmentară; 10 = membrana hialoidă

țiunea fibrelor musculare ale irisului; unele din aceste fibre sunt circulare (*constrictorul pupilei*), altele au direcțiunea spițelor dela roată (*dilatatorul pupilei*). Coloarea irisului variază după cantitatea materiei colorante și după ea judecăm culoarea ochilor. Uneori nu este pigment de loc și atunci irisul pare a fi roșietic, după culoarea sângelui din vasele iriene, așa cum sunt ochii la *albiñoși*. Irisul servește pentru regularea cantității de lumină care trebuie să pătrundă în ochi, mărinđ sau micșorând pupila, care se lărgeste la întunec și se strâmtează la lumină. — Aparatul de percepțiune este *retina*, terminațiunea *nervului optic*. Acest nerv, după ce a ieșit din creier




Fig. 286. — Nervii optici

1 și 2 = globii oculari; 3 = chiazma; 4 = tuberculii optici

OCHI

și după ce s'a încrucișat cu nervul optic din partea cealaltă formând *chiazma* (fig. 286), străbate sclerotica și coroida spre interiorul globului ocular, pe care îl căptușește sub forma unei pelițe, subțiri (vezi fig. 285), numită *retină*; și partea ei cea mai simțitoare se găsește la extremitatea axei antero-posterioare a ochiului, cunoscută sub numele de *pată galbenă* (macula lutea). Această pată ocupă (fig. 284 și 287), o suprafață de un milimetru și jumătate de înălțime pe doi până la trei milimetri de lățime. Punctul de intrare a nervului optic în ochi se numește *papilă*, nesimțitoare la lumină și se află înăuntru și ceva mai jos decât pata galbenă (fig. 284). Retina are o grosime de o jumătate de milimetru înapoi și se subțiază pe măsura ce să apropie de iris. Este formată de mai multe straturi de celule și de fire nervoase suprapuse; partea cea mai apropiată de coroidă, care este formată de bețișoare și de conuri, primește razele luminoase și transmite senzațiile la creier. În dreptul gropiței centrale retina este redusă numai la celulele vi-




Fig. 287.

Secțiuni prin pata galbenă

1 = coroida; 2 = conuri; 3 = gropița centrală; 4 = fibre din nervul optic

zuale în formă de conuri, cari sunt foarte numeroase ele dau vederea clara. — Să vedem acum cari sunt *părțile transparente ale ochiului*. Acestea sunt de dinainte înapoi următoarele: *corneea*, *lichidul apos*, *cristalinul*, *lichidul sticlos* (vitros). *Corneea* (dela lat. *corneus*, *cornos*) formează partea de dinainte a învelișului exterior al ochiului, ea este transparentă și bulbu-cată și este prinsă în sclerotică în tocmai ca o sticlă de ceasornic în rama ei (v. *Corneea*). *Lichidul apos* ocupă *camera anterioară* a ochiului, între corneea, iris și cristalin; el este limpede și transparent. *Cristalinul* (dela grec. *krystalos*, cristal) este o lentilă transparentă, biconvexă, mai tare la centru și moale la periferie; el este

învelit într-o peliță numită *capsula cristaliniană*. Când *mușchiul* și *procesul ciliar* apasă marginile cristalinului convexitatea lui se mărește, adică devine mai bulbucată, ceea ce se întâmplă la vederea obiectelor apropiate; iar




Fig. 288. — Mușchii ochiului și nervul optic

- 1 = marel oblic; 2 = inelul marel oblic;
3 = dreptul intern; 4 = marel oblic; 5 = dreptul superior; 6 = dreptul extern; 7 = nervul optic;
8 = chiazma

când mușchiul și procesul ciliar se relaxează (se slăbesc) convexitatea cristalinului se micșorează, ceea ce se întâmplă la vederea lucrurilor depărtate. *Lichidul sticlos*, umple cavitatea cuprinsă între cristalin și retină; el este



Fig. 289. — Căile lacrimale (mărite)

o masă gelatinoasă transparentă închisă într-o membrană hialoidă (dela grec. *hialos*, sticlă topită). Acestea sunt părțile transparente ale ochiului, prin care trebuie să treacă razele de lumină ca să ajungă la retină. — Ochiul se mișcă în orbită cu ajutorul *mușchilor* așa ziși motori, cari sunt în număr de șase și ascultă de voință purtând ochiul în direcțiunea în care voim, sau în care este de trebuință, pentru ca să poată primi razele luminoase dela obiectul pe care vroim să-l vedem. Ochiul trebuie să fie în continuu udat, și aceasta se face de către *glanda lacrimală*, care produce *lacrimile*; ea este așezată în unghiul dinafară al ochiului în fundul de sac al *conjunctivei*, și este foarte mică, abia cântărește un gram. Ea secretează în tot timpul

lacrimile, pe cari pleoapele le întind asupra ochiului și mai ales asupra corneii, care s'ar usca dacă n'ar fi udată în continuu. O parte din lacrimi se evaporază, iar altă parte este dusă de pleoape în un-



Fig. 290. — Căile lacrimale

- 1 = punctele lacrimale;
2 = canalele lacrimale;
3 = sacul lacrimal;
4 = canalul nazal.

ghiul dinăuntru al ochiului, numit *lacul lacrimal*. În acest loc fiecare pleopă prezintă câte o mică ridicătură, *tuberculul lacrimal*, care are în mijloc o mică gaură, *punctul lacrimal*, pe unde pătrund lacrimile într-o țevă, *conductul lacrimal*, care după un mic drum oblic merge de se unește cu celălalt, pentru ca să formeze *sacul lacrimal*. Acest sac comunică cu *canalul nazal* prin care lacrimile se duc



Fig. 291. — Organele ajutătoare ale ochiului

- 1 = glanda lacrimală; 2 = tendonul unui mușchiu; 3 = pleopa superioară; 4 - 5 = mușchi ai ochiului; 6 = grăsimea cavității orbitare; 7 = micul oblic; 8 = canalul lacrimal; 9 = sacul lacrimal; 10 = canalul nazal-lacrimal; 11 = capătul canalului lacrimal; 12 = mușchiul lateral; 13 = mușchiul drept inferior; 14 = glanda pleoapei.

în nas. Punctele lacrimale fiind foarte mici lacrimile nu pot să se scurgă destul de repede atunci când omul plânge și ele se produc în cantitate foarte mare, așa că cea mai mare parte curge pe obrazi. — Ochiul se examinează pe dinăuntru cu ajutorul unui

OCHI

aparat numit *oftalmoscop* (v. acest cuvânt). — *Boalele de ochi* sunt foarte multe și unele foarte greu de vindecat, iar altele nu se vindecă de loc (incurabile). Vom face descrierea pe scurt a acestor boale dinafară înăuntru și vom începe

cu *boalele orbitei*. Oasele care formează casa globului ocular, orbitei deci, când se îmbolnăvesc are și ochiul multe de suferit. Intre boalele mai obișnuite amintim *fracturile oaselor orbitei*, *sifilisul* și *tuberculoza* (osteitele sifilitice și tuberculoase). Fracturile orbitei se văd adeseori și sunt datorite fie unei lovituri care a fost aplicată asupra ochiului, fie că pacientul a căzut și s'a lovit cu orbita de un obiect tare. Cele mai adeseori se fracturează marginea superioară a orbitei și uneori fractura se întinde înapoi, către vârful orbitei, producând rupturi ale nervului optic și ale vaselor de sânge, sau oasele se înfundă în creier și produc meningite (inflamația pielii care învelește creierul). Când lovitura s'a dat în spre jumătatea dinafară a sprâncenei, unde osul este subțire, se produc de multeori și tăeturi ale pielii, dinăuntru în afară, în tocmai ca și cum s'ar fi făcut cu un cuțit. Tuberculoza și sifilisul ating, după cum am spus, atât margina de sus a orbitei, cât și pe cea de jos, dând *osteoperiositate sifilitice*, sau *tuberculoase*, tot atât de periculoase și unele



Fig. 292. — Osteoperiostită tuberculoasă a orbitei

Fig. 193. — Osteoperiostită sifilitică a orbitei. A black and white illustration of a man's face in profile, showing a large, dark, irregular swelling on the upper part of the orbit (eye area).

Fig. 193. — Osteoperiostită sifilitică a orbitei

ca și celelalte, cele tuberculoase vindecându-se în timp mai lung decât cele sifilitice.

Boalele pleoapelor. Aci avem în locul întâiu *colobomul* sau lipsa pleoapei. Colobomul poate să fie din naștere (fig. 294) sau în timpul vieții, printr'o lovitură sau un alt accident, care a pricinuit pierderea de substanță din pleopă. Colobomul din naștere, sau congenital, poate fi total, adică să lipsească complet una sau ambele pleoape, sau să lipsească numai câte o bucată din fiecare. Colobomul este periculos când e total pentru că lasă corneele desvelite și le expune la tot felul de lovituri. Inflamațiunea pleoapelor, numită *blefarită* (dela grec. blepharon,



Fig. 294. — Colobom al pleoapelor, congenital



Fig. 295. — Colobom traumatic al pleoapei

pleopă), este de 2 feluri: *ciliară simplă* și *ulceroasă*. *Blefarita ciliară simplă* se arată la limfatici și artriciți fiind produsă de praf, de fum, când cineva lucrează mult la lumină artificială; ea se mai vede în cazurile de conjunctivită, de astuparea căilor lacrimale, de astigmatism, de hipermetropie. *Semnele* ei sunt: roșeață a

marginei pleoapelor, niște solzi ca de ceară, groși și moi, sau, din contră, solzi foarte subțiri, albul și uscați, se văd la rădăcina perilor, cari se smulg cu înlesnire. Bolnavul suferă din cauza luminii, când se găsește în fum sau în praf. Toți acești bolnavi trebuie să se ferească de lumină prea vie, de praf, și să poarte ochelari fumurii sau albaștri, să se spele cu apă caldă boricată, apoi să se ungă pe gene cu alifie făcută cu precipitat galben de mercur. *Blefarita ulcerosă* are aceleași cauze




Fig. 296. — Epilația cililor

din pustule vechi; dacă se rup aceste coji în locul lor rămân răni mici sângerânde. De sub pleoape se scurge un fel de puroiu și ele stau închise printr'un spasm violent (*blefarospasm*), iar bolnavul nu se poate uita la lumină (*fotofobie*). Dacă boala ține mult timp marginile pleoapelor se îndoiesc înăuntru (*entropion*) și periî frecă corneea și o irită (*trichiază*). Bolnavii aceștia vor face spălături cu apă boricată, spălându-și des fața și mâinile și mai cu seamă un-




Fig. 297. — Ptoza pleoapei superioare

ghiile, cari au o mulțime de microbi; nu se vor lega la ochi, ci vor purta ochelari fumurii. Vor lua untură de pește, sirop de iodur de fier, sirop iodotanic, vor face băi sărate și vor șede la țară, sau pe malul mării. La

ochi se vor spăla cu acid boric, soluțiune caldută și își vor pune între ploape alifie cu precipitat galben de mercur (1—2 gr. la 100 vaselină). Se vor înmuia cojile cu cataplasme de feculă, apoi se vor curăți cu vată înmuiată în acid boric. Când corneea este atinsă se vor pune picături de atropină (1 la 100) odată pe zi. În contra blefarospasmului se va face în primul rând *epilația* (vezi fig. 296.) genelor cari rod corneea. Apoi se va pune puțină vată la capătul unui ba-



Fig. 298. — Același bolnav, ca mai sus, după tratament

tonaș de sticlă, sau în lipsa lui a unui băț de chibrit, se va muia într'o soluție de nitrat de argint 1% și se va unge bine marginea pleoapei. Intre pleoape, pe conjunctivă, se va pune precipitat galben de mercur 2% și atropină. Tratatul mai pe larg expus al blefaritelor se poate găsi dacă se caută acest cuvânt. *Blefaroptoză*, sau *ptoză* (dela grec. *ptosis*, cădere) constă în neputința de a ridica pleoapa de sus; ea provine din paralizia, mușchiului ridicător al pleoapei, produsă




Fig. 299. — Operația chalasionului

de o rănire, de sifilis, scleroza în plăci. *Ca tratament* se va trata cauza, în caz de sifilis se vor face injecțiuni mercuriale de neosalvarsan și bismut și se va da iodur de potasiu, cele de altă origine se pot opera. *Granulomul*, numit și *chalazion* (dela grec. *chalaza*, grină) este o umflătură a pleoapei produsă prin astuparea unei glande de a lui Mei bomius. El se deosebește de *urcior* prin sediul său primitiv deasupra marginii cililor (perilor), prin dezvoltarea lui înceată, fără durere, prin forma

rotundă și prin tăria lui; pot să fie mai multe granuloame în același timp. *Tratamentul* constă în comprese umede, alifie cu precipitat galben, sau mai bine să se opereze, adică să se scoată. *Căderea genelor* se face uneori fără ca pleoapele să fie roșii, inflamate. În

aceste cazuri se va trata starea generală a bolnavului (anemie, artritis). *Lagoftalmia* (dela grec. *lagos*, iepure și *ophthalmos*, ochiu) constă în închiderea incompletă a pleoapelor și poate produce uscarea corneei și îmbolnăvirea ochiului. Cauzele acestei boale sunt: exoftalmia, ectropionul, paralizia, o pierdere mare de substanță din pleoape. Un ochiu ale cărei pleoape nu mai acopăr corneea este în pericol în orice moment, căci ea nu mai este umezită de lacrimi, iar pe



Fig. 300. — Keratită lagoftalmică

de altă parte, ne mai fiind acoperită, este în pericol de a fi lovită cu orice corp strein. În figura 300 se pot vedea corneele unei bolnave cu exoftalmie (eșirea ochilor prea mult în afară) acoperite de albeață, pentru că stând prea mult neacoperite, sau rănit. *Tratamentul* variază după cauză, iar bolnavul, în tot cazul, trebuie să umezească ochiul legat până la operație, care trebuie să se facă pe cât se poate mai de grabă, în cazurile în cari celelalte încercări de tratament au rămas zadarnice. *Ulciorul* sau *urciorul* numit și *orzișor* (lat. *hordeolum*) este un furuncul (buboiu) mic care se dezvoltă în foliculele sebacee, sau păroase, ale pleoapelor și se prezintă sub forma unei mici bubușoare roșii, care produce câte odată o inflamație vie; După câteva zile se îngălbinește (a scos cap) apoi crapă și se scurge un puroiu smântănos. La mulți se fac o sumă de urcioare, unul după altul. *Urciorul* se tratează cu comprese înmuiate în apă boricată caldă, până când se coace, apoi se taie cu bisturiul; câteva zile se va unge marginea pleoapelor cu alfia: precipitat galben 20 centigrame,

vaselină 10 gr. (dimineața și seara), iar când se repetă prea des urcioarele, se va căuta cauza și se vor da preparatele cu arsenic, untură de pește, drojdie de bere, etc. La țară se crede că urcioarele se fac când se uită cineva pe gura cheii, și se tămăduiește frigând ulciorul cu coada lingurii înfierbântată, ori cu fundul unui ulcior, ori să-l scuie un mezin, (ultimul copil născut). *Sinblefaron* (dela grec. *syn*, cu și *blepharon*, pleopă) este aderența sau lipirea completă




Fig. 301. — Cancer al pleoapei inferioare

ori incompletă a pleoapei de globul ocular; uneori această lipire se întinde până la corneea. Cauzele sunt: arsura conjunctivelor, difteria, ulcerul granulos. *Tratamentul* constă într-o operație prin care se taie aderențele. *Trichiaza* (dela grec. *thrix*, *trikos*, păr) se numește deviațiunea genelor, a perilor, cari se duc spre globul ocular și îl irită. Această deviațiune poate fi parțială sau generală; ea se vede mai des la pleoapa de jos. *Trichiaza* este produsă mai cu seamă de *blefarită* (vezi mai sus) și are acelaș tratament la început apoi se face operație tăind o parte din pielea marginii pleoapelor, după care perii se întorc în afară, sau se taie cu totul bulbii perilor. *Cancerul* pleoapelor se observă destul de des, mai ales în timpul din urmă, când această boală s'a răspândit mult. Se cunoaște ușor dacă știm semnele cu care se prezintă boala (vezi *cancer*) și (fig. 301 și 302). Singurul lui tratament este operația; care trebuie făcută foarte de timpuriu, ca să nu pătrundă și la globul ocular. De multe ori trebuie să




Fig. 302. — Cancer al pleoapelor

tăem complet pleopa atinsă de cancer și să facem alta mai târziu, când s'a vindecat, cu piele luată din altă parte a corpului. *Boalele conjunctivei.* Aprinderile sau inflamațiunile conjunctivei se numesc *conjunctivite* și



Fig. 303. — Conjunctivită granuloasă incipientă

sunt de mai multe feluri. *Conjunctivita simplă* are următoarele semne: marginea pleoapelor este roșie și umedă, fața dinăuntru a lor este înflăcărată; omul simte ca și cum ar avea nisip în ochi și are

mâncărime mare, mai ales seara, la lumină și când se deșteaptă. Este o boală produsă de microbi și poate fi molipsitoare, mai cu seamă în aceeași familie. Tratamentul ei constă în picături de sulfat de zinc (soluție 1%) și în spălături de acid boric. *Conjunctivita catarală* se arată prin îngroșarea și roșeața pleoapelor, roșeața care se întinde și pe albul ochilor. Dimineța ochii sunt lipiți, bolnavul are mâncărime, uscăciune și i se pare că are nisip în ochi. Cauza este



Fig. 304. — Conjunctivită granuloasă mai înaintată

și aci un microb, iar tratamentul constă în spălături cu apă boricată caldă (4 la 100) de 4—5 ori pe zi, picături de nitrat de argint (10 centigrame la 10 gr. apă distilată), odată pe zi, sau protargol (2 gr. la 100 gr. apă) sau și mai bine argirol 20%. *Conjunctivita granuloasă (trachom)* este gravă prin faptul că se vindecă greu și dacă nu se tratează la timp omul poate orbi. Ea este produsă de un microb necunoscut și este foarte molipsitoare. Se observă des prin cazărmi, penitenciare, internate. Ea are 2 forme: *incipientă* care este caracterizată prin existența anterioară a unei conjunctivite *purulente*, prin îngroșarea conjunctivei pleoapelor și a fundului de sac, care este roșu închis și prezintă ridică-

turi zmeurii; forma care atacă mai ales pe cei ce trăesc mulți la un loc (soldați etc.), este caracterizată prin granulațiuni (brobonele) cenușii, rotunde, pe fața internă a pleoapelor și în fundul de sac din sus. Dimi-




Fig. 305. — Aspectul unui bolnav de conjunctivită granuloasă

neța pleoapele sunt lipite, nu este durere, lăcrămare puțină și bolnavul se cam ferește de lumină (fotofobie). Toate aceste semne se agravează cu timpul, dacă bolnavul nu se duce la un medic și astfel ajunge, în scurt timp, ca granulele să acopere toate conjunctivele și să fie așa de dese

ca icrele întinse pe o farfurie. În acest timp secreția care acopere marginea pleoapelor devine purulentă și atât de abundentă în cât curge și pe obraz (fig. 305). În această fază, când secreția e foarte multă, boala este foarte pe-




Fig. 306. — Xeroză după conjunctivită granuloasă

riculoasă, pentru că această secreție, pe care bolnavul o răspândește în jurul lui prin obiectele cu care vine în atingere, conține foarte mulți microbi. Dacă boala nu se îngrijește la vreme se întinde și la corneea, dând ceea ce se cheamă panusul trachomatos și atunci încep suferințele cele mai grave ale bolnavului. Corneea, care este mai limpede ca cea mai fină

OCHI

sticlă, începe să se turbure, se ulcerază și se acopere de albeață (Keroză). Altelei glandele lacrimale, îmbolnăvinduse și ele, nu mai pot produce lacrimi, corneele, ne mai fiind umezite, devin scorbtoase și bolnavul trăește în chinuri, pentrucă conjunctivele lui sunt aspre și produc dureri, frecându-se de cornee, când clipește (fig. 306.). Boala acestea, atât de periculoasă, este răspândită în țara noastră, mai ales în Basarabia, unde mai toată populația era infectată de trachom, după războiul din 1916—19 (fig. 247). Tratamentul constă în izolarea în spital a celor bolnavi, în primul rând. Aci li se vor spăla ochii câtva timp cu apă boricată 4%, sau apă cu



Fig. 307. — Conjunctivită blenoragică

hipermanganat de potasiu $\frac{1}{2000}$. Odată pe zi se pun în ochii bolnavului picături de nitrat de argint (soluția 1%). După aceasta vine operația, care constă în ridicarea granulelor, cu o mică linguriță cu marginile tăioase. Tratamentul operator și cel de după operație trebuie făcut numai de medic, de aceea nu amintim nimic despre el. Bolnavul, care a scăpat de trachom, trebuie să-și îngrijască ochii toată viață, punându-și picături de sulfat de zinc 1%, de argirol 20%, sau de sulfat de cupru 10 centigrame, cu glicerină și apă distilată câte 5 grame din fiecare. În același timp se va feri să nu întrebuițeze ștergarul și batista altcuiva. *Conjunctivita flictenulară* se ivește la copii scrofuloși, trăiți rău, neîngrijiți,

OCHI

cu bube pe obraz, pe nas, pe urechi. Ea se arată prin niște ridicături mici roșii și ascuțite cari se ivesc pe conjunctivă și al căror vârf se deschide dând naștere la răni mici, cenușii, cari produc mult puroiu. Ea se însoțește adeseori de cheratită flictenulară (vezi mai jos). Tratamentul ei este ca și al *blefaritei* ulcerose (vezi mai sus). *Conjunctivita purulentă blenoragică* este produsă de microbul blenoragiei (sculamentului) de gonococ, dus



Fig. 308. — Conj. blenoragică la un nou născut

din uretră (canalul udului) la ochi cu degetele, cu rufăria sau prin alte mijloace. Ea se poate produce uneori la nou-născuți și la fetițele mici, prin transportul microbului. După câteva ore, până la 2—3 zile dela infecțiune, conjunctiva devine roșie, ochii nu sufăr lumina, pleoapele se umflă și dintre ele se scurge un fel de materie ca puroiul, galbenă sau verzuie, în cantitate mare, așa că curge pe obrazi. Pleoapele se umflă apoi și mai mult (fig. 307) și bolnavul are dureri mari.

Această boală dacă nu se tratează repede și bine, ulcerază corneea (fig. 309) și vederea se pierde cu totul. Pentru a se vindeca trebuie să se facă irigațiuni (spălături) prelungite călduțe, cu ipermanganat de potasă (1 la 3000) la fiecare sfert de ceas, zi și noapte, tampoane sau cârpe reci pe pleoape, cu gheață, arderi cu o soluțiune de nitrat de argint (1 la



Fig. 309. — Ulcer cornean de natură blenoragică

100), urmate de spălături cu apă pentru a spăla excesul de nitrat. Se mai întrebuințează și : protargol 1 gr., apă distilată 10 grame; din care se pune în ochi odată pe zi, sau argirol 20%. Bolnavul se va izola; i se fac injecții cu vaccin antigonococic, sau cu lapte, curățenie foarte mare, anti-sepsie riguroasă. *Conjunctivita purulentă a noilor născuți* se capătă în timpul trecerii acestora prin căile materne în timpul nașterii și foarte mulți copii rămân orbi pentru toată viața, mai ales la țară. Boala se ivește cam a 2-a până la a 5-a zi după naștere. Marginea pleoapelor este roșie și din ochi se scurge un lichid la început limpede, gălbui, apoi galben; pleoapele se umflă (fig. 308) și lichidul devine gros, galben-verzui ca puroiul și în cantitate foarte mare.

Această boală trebuie tratată foarte repede și în mod energic, dacă voim să scăpăm ochii copilului. Înainte de a se ivi puroiul se vor face spălături cu apă boricată caldă, sau soluție de hipermanganat tot la jumătate de ceas. După ce s'a ivit puroiul, pe lângă aceste spălături, se vor arde dimineata și seara pleoapele de dinăuntru cu o soluție de nitrat de argint (1



Fig. 310. — Corpi străini ai feței și ochilor

la 100), care se va neutraliza cu apă sărată, sau chiar cu apă curată, iar pe ochi se pun în permanență cârpe cu apă rece. Ca tratament preventiv se recomandă să se facă mamei spălături vaginale cu irigatorul, cu hipermanganat de potasă, înainte de naștere, cu apă boricată în timpul nașterii. Îndată după naștere, înainte chiar de a se tăia buricul copilului, i se vor șterge ochii cu vată idrofilă, pentru a-i curăți de meconiu (murdăria copilului) și de stratul de grăsime, apoi se vor spăla pleoapele cu apă boricată (4 la 100) sau în lipsă cu apă fiartă și se vor introduce între pleoape 2—3 picături de nitrat de

argint 1%, sau, la nevoie, de zeamă de lămâe. După ce s'a ivit boala într'un ochi vom căuta să nu treacă și la celalt ochi, punând pe ochiul sănătos cârpe înmuiate în apă boricată; mâinile celui ce umblă la ochi se vor spăla cu sublimat corosiv (1 la 1000).—

Corpi străini sunt o multime cari pot intra în ochi, sub formă de praf producând supărare mare; Acești corpi străini se așează de obicei în fundul de sac superior, între pleoapă și ochi, producând durere, uneori foarte mare, roșeața conjunctivei și ochiul nu poate suferi




Fig. 311. — Pterigion

lumina (fotofobie). Durerea persistă până la esirea corpului străin; uneori ea este suportabilă și corpul străin este purtat fără supărare. Pentru a găsi corpul străin trebuie întoarsă pleoapa, apoi cu un colț curat de batistă sau mai bine cu puțin bumbac înmuiat în apă boricată și stors tare, să se ri-



Fig. 312. — Atitudinea bolnavului de Kerato-conjunctivită flictenulară

dice corpul. Cei mai periculoși sunt cei ce se așează pe corneă, sau pătrund în ea, cari o pot ulceră și produce albeață, sau chiar ruptura ei completă, cu scurgerea ochiului. Scoaterea corpului strein de pe corneă e bine s'o facă numai medicul. — *Pterigion* (dela grec. *pterygion*, aripă mică) este numele ce se dă îngroșării triunghiulare a conjunctivei, de obicei în partea dinăuntru a corneei, sub forma unei pielice, care crește mereu întinzându-se asupra corneei până în dreptul pupilei (fig. 311) și uneori acoperind pupila cu totul, așa că vederea este în-

piedecată. Această boală nu se vindecă decât prin operațiune, adică tăind acea pielită, deslipind-o de corneea și aplecând-o în jos să se fixeze în fundul de sac printr'un punct de cusătură. — *Xerofthalmie* sau *xeroză* (dela grec. *xeros*, uscat, sec) va să zică uscăciunea conjunctivei, provenită în urma unei arsuri, ulceratiuni, când s'a îmbolnăvit sau s'a ridicat glanda lacrimală (fig. 300). Tratamentul constă în închiderea temporală a pleoapelor. — *Boalele sclerotice* sunt mai rare și mai puține. Noi ne vom ocupa numai de *stafilom*, care constă în dilatația scleroticii. Ei se poate ivi înainte sau înapoi. Stafilomul anterior se ivește în urma inflamațiunilor acute, sau cronice și sediul său este în apropiere de corneea; el se produce încetul și mai ales la oamenii tineri. Stafilomul posterior se observă mai cu seamă în miopia progresivă, în care caz sclerotica se slăbește și se întinde înapoi, sub presiunea mușchilor cari apasă pe globul ocular. Tratamentul este acela al cauzei. — *Boalele corneei* sunt mai importante și mai grave, ele trebuiesc tratate dela început și cu toată energia. În primul rând avem *aprinderea*, sau *inflamațiunea corneei*, numită *cheratită* (dela grec. *keras*, cornos). *Cheratita* este de mai multe feluri: *cheratita interstițială* care de multe ori este o consecință a sifilisului ereditar. Semnele ei sunt: pete cenușii pe corneea cu un cerc roșu pe margini, în urma formațiunii din nou a unor vase, cari încet cu încetul pot să copleșească dela periferie la centru întreaga corneea; dureri, lăcrimare și neputința de a se uita la lumină (fotofobie). Uneori *cheratita* se complică de inflamațiunea irisului. Tratamentul, dacă e de natură sifilitică, constă în picături fierbinți de apă pe corneea (atâta cât poate suporta bolnavul) atropină, ochelari fumurii bulbucați și injecții contra



Fig. 313. — Stafilom cornean, după ulcer flictenular

sifilisului. — *Cheratita flictenulară* se arată sub formă de niște beșicuțe cenușii, cam transparente, cari se ivesc pe corneea și cari se sparg dând naștere la ulceratiuni rotunde, puțin adânci. Aceste răni (ulceratiuni) se vindecă fără să lase urme când sunt bine îngrijite; dacă însă nu sunt căutate, ele pot să formeze o pată cenușie, apoi gălbuie și să constituie *abcesul corneei*, care în unele cazuri se poate deschide în camera anterioară a ochiului și puroiul să se adune acolo, sau să dea naștere la ernia irisului, dacă a fost ulceratiune exterioară și să lase o pată care nu se mai șterge. Uneori corneea se acoperă de mici vase sanguine și atunci avem ceea ce se chiamă *pannus*. Acești bolnavi sunt slabi mai totdeauna, galbeni la față, cu ganglionii (ghindurile) gâtului umflate; ei sunt predispuși la tuberculoză, sau au această boală de mai multă vreme, la unul din organe. Copiii dau cel mai mare număr de bolnavi și îi cunoaștem ușor pentru că ei fug de lumină, stau cu capul vârat la sânul mamei, dacă îi ține în brațe, sau în perini, dacă sunt culcați în pat (fig. 312); dacă deschidem pleoapele, ceea ce uneori e destul de greu, observăm toate semnele descrise mai sus. De cele mai multe ori boala se arată și la conjunctivă și la corneea deodată și atunci poartă numele de *kerato-conjunctivită flictenulară*. Dacă ulcerul cornean, produs de ruptura flictenei, este mare și nu se îngrijește la vreme toată corneea se întinde înainte și globul ocular ajunge între pleoape se produce deci ceea ce se cheamă *stafilom cornean*. (fig. 313). Se mai arată încă o multime de alte complicații ale acestei boli, despre cari nu mai amintim nimic întru cât tratamentul lor nu se poate face decât de medic. Tratamentul *keratitei flictenulare* constă în instilarea, odată pe zi, a 2—3 picături de nitrat de argint (soluție 1%) chiar pe corneea. După un minut se spală cu apă fiartă și răcită, sau chiar cu apă simplă. Spălăturile ochiului, despre care am amintit de mai multe ori, se fac foarte ușor cu un mic vas de sticlă nunit *undină*, (fig. 314), care are un vârful subțire pe unde curge apa în ochiu. În afară de nitrat de argint se va mai

pune odată pe zi precipitat galben de mercur 2% și câteva picături de atropină (soluție 1%). În același timp se va da bolnavilor o bună hrană, vor fi ținuti la soare vara, sau duși la mare, al cărei climat ajută mult vindecarea boalei, se va da untură de pește. *Cheratitis ulceroasă* sau *ulcerul cornean* se observă de obicei la persoanele obosite prin muncă, la cei ce sufăr de conjunctivită cu inflamațiunea căilor lacrimale. Este produsă de praf, de bucățele de pietre, de metal, etc. și de alți corpi străini. Semnele ei sunt : o arsură în dreptul ochiului, uneori cu svăcnituri ; sensibilitate la lumină, lăcrămare ; apoi roșeață în jurul corneei, care se turbură pe toată întinderea și pe care se observă o ulceratiune (rană) cenușie sau gălbuie, mai mult sau mai puțin întinsă, iar înapoi se vede o colecție de puroiu (*ipopion*) în camera anterioară a ochiului ; pleoapele sunt umflate. Ca tratament se recomandă să se pună în ochi argirol 20%, colargol 2% sau alifie cu iodoform (5 gr. la 100 de vaselină) și să se aplice comprese calde înmuiate în acea soluțiune, iar pentru ca să nu se facă aderențe se va pune în ochi picături de atropină. Când ulceratiunea este superficială se va pune alifie cu dionină 20 centigrame, vaselină 10 grame sau alifie cu iodoform (5 la 100), iar când ulceratiunea este adâncă și amenință să găurească corneea, în loc de atropină se vor pune câteva picături de : ezerină 5 centigrame, apă distilată 10 gr. repetate în fiecare zi sau tot la 2 zile, sau pilocarpină, soluție 1%. Când corneea s'a găurit se vor face spălături antiseptice, se vor pune picături cu ezerină și se va aplica un bandaj, iar când s'a format iopion se va face o puncție și se va deserta colecția. — *Cheratocon* sau *stafilom transparent* se numește dilatațiunea corneei, care se produce în tinerețe și coincide cu miopia, pentru care se recomandă ochelari speciali. — *Albeață*, *pete pe cornee* sau *leucom* (dela grec. *leukos*, alb) este o boală caracterizată prin niște pete opace albului, cari se formează pe cornee, a căror sediu, întindere și grosime variază foarte mult ; vederea este mic-

șorată. Aceste pete pot fi produse de arsuri, răniri, corpi străini, cheratite, leziuni de nutriție la sifilitici, ateromatoși, alcoolici, bătrâni. Tratamentul constă în administrarea alifiei cu dionină (2 gr. la 10 vaselină), dimineța. Când nu reușim cu acestea se va face tatuajul corneei. La *țară albeață* sau *albața* se vindecă cu untură de șarpe, cu peliță de pipotă de rață cu lapte de femeie, cu salivă de om, cu excrement de câne, de cocostărc, de furnică, cu scoică, cu piatră vânăta. *Boalele cristalinelui*. Aci avem *cataracta* pe care poporul nostru o numește *perdea*, *pohoială*, *pohăcle*, *pohoiele*. Pentru această boală cetitorul va căuta la : *cataractă*, unde am vorbit pe larg, iar aci vom spune numai că la *țară* perdeaua n'are leac, dar lapții de mântuși fac bine câte odată celor ce sufăr de această boală. Perdeaua, după credința poporului, se formează la acei ce se jură pe ochi, de unde ca tratament preventiv se dă sfatul ca nimenea să nu se jure pe ochi. — Ca boală a irisului avem *irita* adecă aprinderea sau inflamațiunea irisului. Între cauzele iritei se numără : sifilisul, diabetul, guta, reumatismul, rănirile, corpii străini. Irita are următoarele semne : roșeață în jurul corneei, iar irisul se pare a fi ca ruginit ; durerea în tot ochiul, care se întinde la frunte și la tâmplă ; lumina supără și ochiul lăcrimează îndată ce se deschide. Ca tratament se recomandă : a sta în cameră întunecoasă, sau a purta ochelari fumurii, a se face instilațiuni cu atropină (1 la 100), alifie mercurială beladonată pe frunte și tâmplă, lipitori. Tratament



Fig. 314.
Undină de sticlă

general după cauză : la sifilis tratament energetic antisifilitic (mercur și neosalvarsan), etc. — *Boalele coroidiei, ale retinei și nervului optic*. Cauzele principale : boala lui Bright (v. *Rimichiu*), diabetul și sifilisul, ataxia locomotrice alcoolizmul, tutunul, arterio-scleroza. Semnele acestor boale nu se pot constata de obicei decât cu *oftalmos-*

copul (v. acest cuvânt) de către un doctor specialist (oculist). La *coroidită* (inflamațiunea coroidiei) avem: senzațiuni luminoase (scântei, beșici, stele, etc.), musculițe volante, luminoase sau nu, dureri în frunte. La *retinită* (inflamațiunea retinei) avem micșorarea progresivă a vederii. În cazurile de *deslipirea retinei* la oamenii cu miopie mare, avem dispariția mai mult sau mai puțin bruscă și mai mult sau mai puțin absolută a vederii. Tratatamentul este acela al cauzei. — Intre *boalele diferitelor părți ale ochiului* avem *oftalmia simpatică* ce se observă rar și constă în aceleași leziuni ivite în ochiul sănătos în urma boalei celuilalt ochi; tratamentul trebuie făcut din vreme: fricțiuni mercuriale, injecțiuni mercuriale și cu neosalvarsan, lipitori, calomel, operațiune, adică scoaterea ochiului bolnav mai înainte de a se îmbolnăvi cel sănătos. *Glaucomul* (dela grec. *glaukos*, verde ca marea) sau *apa neagră*, constă într-o creștere a tensiunii intraoculare cu micșorarea vederii; dureri în frunte și tâmplă, supărare la lumină, micșorarea câmpului vizual din partea nasului. Globul ocular este tare la pipăit, ca o bilă de biliard, pupila mare și imobilă, roșeață în jurul corneei, reflex verde din partea cristalinului. Tratatament: pilocarpină și ezerină la început și mai bine operațiune. — Ochiul, deși este adăpostit de orbită și de pleoape, este supus la *lovituri* (*contuziuni*) produse cu pumnul sau cu un baston sau prin cădere; la *răniri* (*plăgi*) produse prin instrumente înțepătoare sau tăietoare, ace, spini, ghimpi, sfărmaturi de piatră, de metal etc., prin *armă de foc*, praf de pușcă, gloanțe; la *arsuri* produse prin flăcări, prin gaz de iluminat, var nestins, etc. Orice rănire a ochiului, oricât de ușoară s'ar părea, prezintă oarecare primejdie fiindcă poate fi punctul de plecare al unei inflamațiuni mai mult sau mai puțin mare. Pentru aceasta vom chema îndată doctorul, iar până la venirea lui vom pune bolnavul la odihnă în pat, aplicând asupra ochiului comprese (cârpice) înmuiate în apă caldă, sau caldă, menținute în permanență. — *Boalele aparatului lacrimal*. *Dacriocistita* (dela

grec. *dakryon*, lacrimă, și *hystis*, sac), este inflamațiunea sacului și canalului lacrimilor care se scoboară dela unghiul intern al ochiului până în nas; ea se produce la nou-născuți și la adulți. Pleoapele se lipsesc dimineața, ochiul lăcrămează în timpul zilei și dacă apăsăm sub pleopa de jos, spre nas, se scurge din punctele lacrimale puroiu gălbui. Adeseori rămâne o fistulă în urma acestei boale. Tratatament: cataplazme, spălături cu acid boric. După ce a supurat se deschide printr'o inciziune și se spală cavitatea cu apă boricată. În dacriocistita cronică se face sondajul canalului lacrimal cu sonda lui Bowman, după ce mai întâiu s'a lărgit punctul lacrimal inferior și injecțiuni modificatoare cu sulfat de zinc (1 la 200) cu nitrat de argint 1 la 100, cu protargol. În cazul când aceste încercări nu duc la nici un rezultat vom recurge la operație (v. *Dacriocistită*). — *Ochiul artificial*. Sunt cazuri în cari, fie pentru a scăpa ochiul cel sănătos, fie pentru a scăpa viața bolnavului trebuie să se scoată ochiul stricat în urma unei lovituri, ori răniri, sau atins de cancer (rac). Ochiul scos se poate înlocui cu un *ochi artificial* care este făcut din porțelan și căruia i se dă forma, mărimea și culoarea ochiului sănătos. Ochiul artificial trebuie scos în fiecare seară și ținut în apă tot timpul nopții. În zilele când bate vântul și este praf mult în aer este bine ca să se spele ochiul odată sau de două ori pe zi. Cu timpul ochiul artificial se atacă de lacrimi și își pierde luciul, devenind aspru și atunci trebuie înlocuit cu un altul nou.

Ochiul boului. — V. la *Bunghișor*.

Ocluziune (dela lat. *occludere*, a închide). — *Ocluziune intestinală*, sau *înărare de mâncă* (V. *Intestin*).

Ocnele Mari. — Stațiune balneară în județul Râmnicul-Vâlci, aproape de capitala celui județ. Este așezată pe un platou frumos, planat pe întindere mare, la o înălțime de 300 metri. Clima este constantă și plăcută, iar temperatura în timpul verii este de 22—26°; aerul este încărcat de aburi de sare din cauza emanațiunilor din lac. Sunt patru izvoare, cari alimentează lacul, în jurul căruia se află un stabiliment de băi cu mai multe

cabine. Apa este foarte concentrată, conținând aproape 250 gr. de clorur de sodiu la litru; ea mai are și sulfat fieroși. Băile dela Ocnele Mari se recomandă în contra *reumatizmelor*, *scrofulozei*, *anemiei*, în *boalele de piele* și în *boalele de mitră*. În localitate se află un hotel și restaurant, apoi locuințele târgușorului servesc de locuințe și pentru bolnavi. În fața hotelului este un parc cu plantațiuni tinere. Excursiuni frumoase prin împrejurimi.

Oculist. — Medic care se ocupă cu boalele de *ochi* (doctor de ochi; medic oculist).

Odaie de dormit. — Caută la *dormitor*.

Odihnă. — Caută la *Somn*.

Odogaci, cascarilă. — Coaja unor arbuști. *Croton cascarrilla*și *Croton eluteria* din fam. euforbiaceelor, cari cresc în Peruvia, Jamaica, Florida și insulele Bahama; are gust acru și amar, miros aromatic, mai ales când arde. Odogaciul oprește vărsăturile, ajută diareea, mai ales diareea la copii; bun pentru catarul de plămâni și pentru



Fig. 315
Odogaci

limbrici. Se dă sub formă de: praf 1—4 gr.; tinctură 4—30 grame; ceaiu. Mai este bun ca tonic, excitant și febrifug la 1000.

Odolan, odolean. — V. la *Valeriană*.

Odontalgie (gr. *odontos*, dinte și *algos*, durere. — Durere de dinți (v. *Dinți* și *Dentifrice*).

Odontologie. — Știință care se ocupă cu boalele de dinți.

Odorat și Odori, miros și mirosuri sau miresme. — Simțul mirosului, *odoratul*, este unul din cele cinci simțuri ale omului. Sediul lui este *nasul*, în partea superioară a foselor nazale, la nivelul cornetului și meatului de sus (v. *Nas*). Acolo se fac impresiunile vaporilor sau, mai bine zis ale particulelor ncpipăibile ale corpurilor mirositoare, cari vin să lucreze asupra terminațiunilor nervoase ale *nervilor olfactivi* și cari impresiuni sunt apoi transportate de acești nervi în creier,

la centri nervoși respectivi. Mirosurile se datoresc unor particule cari nu se pot vedea, cari se desfac din substanța chiar a corpului mirositor, umplu aerul pe care îl respirăm și vin astfel în atingere cu firișoarele nervoase din nas. Pentru ca aceste firișoare nervoase să fie mai impresionabile la miros trebuie ca ele să fie întreținute într-o stare de umezeală ușoară prin lichidul care scaldă interiorul nasului. Când avem *guturaiu* mirosul este scăzut, sau lipsește cu totul, din pricină că la începutul guturaiului nasul este mai uscat, iar mai târziu lichidul este în cantitate prea mare și prea gros, ceea ce împiedecă particulele mirositoare de a veni în atingere cu firișoarele nervoase. Pentru ca să mirosim mai bine trebuie să închidem gura și să tragem aerul pe nas cu mai multă putere, să facem inspirațiuni scurte și sacadate, așa că aerul cu particulele mirositoare să vie mai cu putere și să isbească nervul. Când dăm de vreun miros neplăcut și nu voim să-l simțim n'avem decât să dăm afară aerul prin nas mai cu putere, adică să facem o expirațiune forte, ca să alungăm din nas particulele mirositoare, apoi să inspirăm prin gură astupându-ne nările. Mirosul nu ni l'a dat natura numai pentru ca să mirosim parfumurile, sau să ne păzim de mirosurile urâte, ci și pentru ca să ne pună la adăpost de a nu ne îmbolnăvi mâncând vr'o mâncare stricată, împuțită de unde vine și porunca igienică *să nu mâncăm nimic ce nu miroase bine, sau ce miroase urât*. Mirosul ne apără de multe gaze otrăvitoare, între cari în primul rând este gazul sulfidric, care poate produce moartea, respirându-l în cantitate prea mare, dar care prin mirosul lui cel urât ne înștiințează de pericolul ce ne așteaptă, așa că ne putem apăra din vreme de el. Intru cât privește parfumurile trebuie să facem și aci o rezervă și anume să ne ferim de parfumurile tari, să le mirosim cât se poate de puțin, căci ele ne pot produce durere de cap, amețeli, greață și chiar leșin. E bine ca fiecare să se păzească de parfumul care nu-i convine și să nu se silească a-l întrebuința numai fiindcă acel parfum este la modă.

Oftalmie purulentă. — V. *Ochiu.* (Conjunctivită purulentă).

Oftalmie simpatcă. — V. *Ochiu.*

Oftalmoscop (dela grec. *ophthalmos*, ochiu, și *skopein*, a privi). — Se numește astfel un instrument cu ajutorul



Fig. 316. — Examinarea ochiului cu oftalmoscopul

căruia putem ilumina fundul ochiului și să-l cercetăm în toate amănuntele sale. Oftalmoscopul se compune dintr'o oglindă concavă (găurită) spoită cu argint viu, care reflectează asupra fundului ochiului (retinei) lumina unei lămpi așezate alături. Oglinda este ținută de un mâner și în mijlocul ei este o gaură de 3—4 milimetri diametru, pe dinaintea căreia poate să treacă una după alta mai multe sticle sferice. Lumina reflectată de oglindă merge de luminează fundul ochiului, care retrimite la rândul lui raze luminoase, dintre cari o parte refractată străbate gaura oglinzii și merge în ochiul observatorului, care poate în acest mod să vadă și să cerceteze cu deamănuntul retina bolnavului.

Oftică. — V. *Tuberculoză.*

Oghiele. — V. *Obiele.*

Oglinzi. — Stațiune balneară și climaterică lângă orașul Târgu-Neamțu la o depărtare de 20 minute cu trăsura. Ea este așezată pe culmea munților păduroși din vecinătatea Neamțului, pe un platou frumos înconjurat de o vegetațiune bogată de stejari și brazi; adăpostită de vânturi. Clima este dulce, temperată și constantă. Temperatura mijlocie în timpul verii este de 18°. Apele dela Oglinzi sunt sărate și ies din trei izvoare. Izvorul I are o apă turbure cu miros de hidrogen sulfurat (apă puturoasă), foarte sărată la gust, bogată în gaze (acid carbo-

nic); în atingere cu aerul se turbură și se depune un strat galben de sesquioxid de fier. Izvorul II are apă mai concentrată, sărată la gust, nu are hidrogen sulfurat. Izvorul III are o apă limpede, fără culoare, cu puțin miros de hidrogen sulfurat, foarte sărată și concentrată (apă minerală dela Oglinzi). Acest izvor este captat și servește pentru băi. În mlăștinele râulețului Hatinei, ce se scoboară din Dealul Neamțului, se află un nomol untos, negru, care conține pe lângă substanțele saline ale apei minerale și o mare cantitate de materii organice, fier și fosfați. Din apele dela Oglinzi se scoate sarea pentru băi, care se exportă în cutii de câte 2 kgr. doza pentru o baie. Băile dela Oglinzi se recomandă în scrofuloză, limfatism, reumatism, boale de piele, boalele de mitră. Stabiliment modern de băi, cu sală de inhalație și hidroterapie. Viață plăcută prin excursiunile ce se pot face prin minunatele împrejurimi (Mănăstirea Agapia, Văratec, Neamțu, etc.).

Oișea. — V. *Urzică.*

Olănești. — Stațiune balneară în județul Râmnicul-Vâlci, în vecinătatea Călimăneștilor la depărtare de 14 km. dela capitala județului și la o înălțime de 280 metri deasupra nivelului Mării Negre. Localitate pitorească înconjurată de păduri întinse, de ambele părți ale râulețului Olănești. Clima este dulce, plăcută, fără curenți. Numărul izvoarelor este de 40, iar apele sunt atermale, unele saline, altele magneziene și altele saline sulfuroase și iodurate. Apele sulfuroase se întrebuințează în băi, iar cele mai slabe pentru băut. Se recomandă în reumatism, gută, scrofuloză, boale de piele. Apele fieruginoase se beau pentru anemie, cloroză și slăbiciune generală. Apele alcaline sunt bune de băut pentru cei ce sufăr de pietricele în beșica udului și la rinichi. Nomolul se dă sub formă de cataplasme în răni și umflături reumatismale. Apele saline amare sunt bune în constipație (încuietură) dropică (boală de apă), dispepsie (mistuire grea), etc. Apele bromiodice se întrebuințează sub formă de băi în scrofuloză, reumatism, tumori (bolfe), isterie, paralizii. Impre-

jurimile sunt admirabile (Mănăstirile Cheia și Cozia, Călimănești, Valea Lotrului și Valea Oltului, Brezoiu, Voineasa, Bivolari, Șipotele, etc.).

Oleiu, oloi. — V. *Uleiu*.

Oleiu de ricin. — V. *Ricin*.

Olfacțiune (lat. *olfactio*). — Se numește astfel simțul care ne dă noțiunile relative la *mirosul* corpurilor. (V. *Odorat*)

Oliban. — V. *Tămâie*.

Oliv. — V. *Maslin*.

Oliveol. — Acidul oleic, care este principiul activ al unt-de-lemnului, cuprinde *oliveol* care se bucură de însușirea de a topi pietrele; (calculii) din ficat și este un bun dizolvant al colestereinei. Oliveolul se dă în colicele de ficat în capsule gelatinoase de câte 1 gr. 50 ctgr., două pe zi, doză suficientă pentru a suprima fără narcotic o criză de ficat. Ca doză preventivă 1 gr. 50 ctgr. pe zi, în timp de 10 zile în fiecare lună, face să nu se mai repete colicele de ficat. Este bine să se bea, cam la 2 ore după ce s'a luat oliveolul, câte un pahar mic de apă de Vichy, călduță.

Ologeală. — V. *Paralizie și Paraplegie*.

Omac. — V. la *Aconit*.

Omag, omeag. — V. la *Aconit*.

Oman. — V. la *Iarbă mare*.

Ombilic (lat. *umbilicus*), *buric*. — În momentul nașterii copilul este legat încă de mamă sa printr'un fel de frânghie, sau de tub lung, găușit, moale și flexibil, cu ajutorul căruia își ia sângele și materialele ce-i trebuie pentru existența și dezvoltarea lui, numit *cordon ombilical*. Indată după naștere moașa taie acest cordon, iar capătul care rămâne la copil, legat, cade dela sine după câteva zile și în locul lui se vede o rană mică ce se vindecă repede (v. *Nou-născuți*), lăsând în urma ei o cicatrice rotundă în formă de cerc și care se numește *buric*, sau *ombilic*. Buricul se află aproape în mijlocul pântecului și este centrul așa zisei *regiuni ombilicale* (vezi *Abdomen*). De obicei buricul este ceva mai ridicat deasupra nivelului pielei din jur, dar se întâmplă uneori că el devine mai ridicat, mai bulbucă, prin apăsarea pe care o face mațul dinăuntru asupra lui, în urma unei sfortări.

În aceste cazuri avem ceea ce se cheamă o *surpătură*, sau *ernie ombilicală*, care se prezintă sub forma unei umflături, sau tumori globuloase, nedureroasă și cu culoarea normală a pielii. Ernii buricului se reduce foarte ușor; la cea mai mică apăsare mațul intră înăuntru și pentru ca să-l ținem acolo este de ajuns să aplicăm un brâu anume făcut, cu o perinuță la mijloc, sau și mai simplu printr'un dop (tampon) de vată strâns cu o fașe lată, sau să cumpărăm un *bandaj special pentru ernie ombilicală*, care se potrivește și mai bine.

Omeopatie, homeopatie (dela grec. *homoi*os, asemenea și *pathos*, suferință). Această metodă de tratament a fost inventată de un doctor din Lipsca, numit Hahnemann, în 1796, având ca bază că *asemenea se vindecă prin asemenea*, adică dând leacuri care să producă aceleași efecte ca și efectele produse de însăși boala. Astăzi această metodă a căzut cu totul și omeopați nu mai sunt decât unii șarlatani, cari exploatează naivitatea unora, cari se influențează de vorbe goale, cum sunt toți cei săraci cu duhul.

Omiac. — V. *Aconit*.

Omidă (*Mușcăture de*). — V. *Albine*.

Omoplat (dela grec. *omos*, umăr și *plate*, suprafață lată), *scapulă*. — Omoplatul este tipul oaselor late și largi și constituie *umărul* pe de o parte cu *clavicula* (andreaua) și de de altă parte cu osul brațului (*humerus*) cu care se articulează prin *cavitatea glenoidă*. Omoplatul se poate rupe printr'o cauză directă (cădere, lovitură, glonț), iar tratamentul constă în imobilizarea membrului superior (vezi *Fractură*).

Omușor, împărătuș (lat. *uvula*, *uva*, *columella*; grec. *staphyle*). — Cerul gurii se sfârșește înapoi printr'o prelungire pe linia mijlocie ca un fel de limbuță, cunoscută sub numele de omușor. Uneori acest omușor este umflat, crescut și atunci este supărător, așa încât trebuie să tăiem o parte din el. Dacă atingem omușorul cu degetul provocăm vărsături, procedeu lesnicios, care se poate pune în practică în cazurile de otrăvire, pentru ca cel bolnav să verse îndată otrava.

ONAN

Onanism (dela evreul *Onanie*, care, pentru ca să nu aibă copii cu soția sa Thamar, își arunca sămânța pe pământ), *masturbațiune*, *malachie* și la femeie, *tribadism*, *clitoridism*. — Este un viciu care datează dela începutul omenirii și există la toate popoarele. El constă în a-și satisface plăcerea genitală singur, în mod artificial, fără a avea raport sexual. Onanismul se vede mai des în internate, cazărmi, penitenciare, din pricină că cei ce trăiesc acolo nu pot să-și satisfacă trebuința genezică în mod natural. Turburările produse de onanism în sănătatea omului sunt multe și grave, constând mai cu seamă într'o sdruncinare nervoasă, din care pricină el este mai primejdios pentru copii și pentru femei, având ca urmare o slăbire fizică, micșorarea memoriei și inteligenței, o stare de tâmpenie adâncă (la bărbați și *spermatoze*). *Tratamentul* trebuie să fie mai mult preventiv. Copiii trebuiesc supravegheați de aproape, evitând orice le-ar putea turbura imaginațiunea; mai cu seamă trebuie supravegheați copiii din internate; igienă morală potrivită. Se va prescrie copiilor nervoși dușuri reci, băi sulfuroase, bromur de potasiu (1—2 gr. seara), curățenie locală completă, hidroterapie, exercițiu, gimnastică, pat tare și nu prea cald, supravegherea cetitului. Dacă copilul are oxiuri (viermușori la șezut) se va da santonină, clizme cu apă sărată (10 la 100); dacă are fimoză se va face circumciziunea.

Onichită (dela grec. *onyx*, unghie, și terminațiunea *itis*, care însemnează inflamațiunea sau aprinderea cronică a dermului ungveal și a tegumentelor vecine. Onichita este de 3 feluri: *laterală* sau *unghie încarnată* (v. *Unghie*) *sifilitică* și *scrofuloasă*. În onichita *sifilitică* inflamațiunea este de jur împrejur unghiei și se dezvoltă încet sfârșind prin căderea acesteia; ea se tratează prin injecțiuni mercuriale, iar local cu iodoform, arderi cu perclorur de fier sau nitrat acid de mercur, etc. Onichita *scrofuloasă* se ivește la limfatici și scrofuloși; ea se tratează cu untură de pește, sirop de protoiodur de fier, iar local se pansează suprafața ulcerată cu emplastru mercurial de Vigo,

OPIU

sau smulgând unghia și arzând toate țesuturile din jurul ei.

Opăreală. — V. *Arsuri* și *eritem*.

Opinei. — V. *Incălțăminte*.

Opintire. — V. *Sfortare*.

Opistotonos (dela grec. *opisthen*, înapoi, și *tonos*, tenziune, întindere). — Contractura, sau strângerea mușchilor spatelui cari formează o boltă strâmbând corpul înapoi (v. *Tetan*).

Opiu (lat. *opium*, gr. *opion*, dela *opos*, suc), *aŃion*. — Se numește astfel sucul lăptos care se scurge prin tăieturile sau sgărieturile făcute asupra căpătinilor necoapte ale *macului somnifer* (v. *Mac*). În atingerea cu aerul sucul își pierde o parte din apă și se întărește și ia înfățișarea unei gume rezine, constituind *opiul propriu* zis. Opiul din comerț se vinde în bucăți rotunde, sau turte de diferite mărimi, învelite în foi de mac. Masa sa este solidă, grea, opacă, puțin lucioasă, cam moale la apăsare, are culoarea de cafea prăjită, (miros) neplăcut, gust iute, amar și grețos. Opiul cuprinde mai mulți alcaloizi, cari sunt principii activi ai lui: *morfina*, *narcotina*, *narceina*, *papaverina*, *codeina*, *tebaina*, *laudanina*, etc. Este un minunat *sedativ* (potolitor de durere), *ipnotic* (produsător de somn); face ca stomacul să poată suferi medicamentele tari (energice). Câte odată este excitant. Opiul se dă sub multe forme: *extract de opiu* sau *extract tebaic* 1—10 ctgr., în pilule de câte 1—5 ctgr.; *sirop de opiu* sau *sirop tebaic* (o linguriță de cafea conține 1 ctgr. de opiu); *pilule de cinoglos opiacee*, conține fiecare 2 ctgr. de extract de opiu; *sirop diacod* (o lingură de supă conține 1 ctgr. de extract de opiu); *sirop pectoral*, conține 1 ctgr. de extract la 100 gr.; *elixir paregoric*, conține 1 ctgr. de extract la o linguriță de cafea (doza 10—20 gr.); *laudan* (vezi acest cuvânt); *clizme opiacee* sau *laudanizate*, 5—20 picături de laudan; *linimente opiacee* sau *laudanizate* (liniment calmant: balsam tranchil 60 gr., clorofarm 10 gr., laudan 10 gr., sau extract de opiu 1 gr.; extract de beladonă 2 gr., glicerină 20 gr. și ulei de mușetel camforat 60 de gr. — *Morfina* (v. acest cuvânt). — *Codeina* se dă în doză de 1—5 ctgr. pentru odată și până la

15 ctgr. pe zi. Siropul de codeină conține 4 ctgr. la o lingură ($\frac{1}{2}$ până la 2 linguri pe zi); injecțiuni sub piele (1 ctgr. pentru o injecțiune, 2—4 pe zi). — *Dionina* sau *etilmorfină* are aceleași însușiri ca morfina, însă e mai ușor de administrat; bună în tusa convulsivă (măgărească); doză: 15 mgr de 3 ori pe zi, sau 30 mlgr. într-o singură doză seara, contra tusei mai cu seamă la ofticoși; la tusa convulsivă la copii $\frac{1}{2}$ miligram, dela 1 an în sus, 2—3 miligrame; în injecțiuni sub piele, 1—2 centigrame. Se mai dă și sub formă de alifie (1—2%) în bolile de ochi. — *Narceina* se dă 2—10 centigrame în pilule; cloridratul se dă în injecțiuni sub piele (2—5 ctgr. pentru o injecțiune). — *Narcil* sau *etil narceină*, se dă 5—10 ctgr. pe zi, în sirop, pastile, pilule; în injecțiuni sub piele (2—4 ctgr.). — *Papaverina* se dă în doză de 2—10 ctgr. — Toate preparatele de opiu au inconvenientul că *constipă*, cu atât mai mult cu cât bolnavul stă în pat. Din această cauză vom recurge mai rar la ele și numai din când în când și la mare trebuință, iar pentru a provoca somn vom recurge mai des la alte medicamente: cloral, sulfonal, trional, etc. Intru cât privește *otrăvirea* acută cu opiu și preparatele lui să se caute la *Morfină*, iar pentru *otrăvirea cronică* la *Morfinism* și *Morfinomanie*.

Opiomania. — Opiul se bea, se mănâncă și se fumează. Cunoscut de Arabi a trecut la Chinezii, de unde l'au luat europenii, lăsând în schimbul lui alcoolul. Dela primul fum simți forța intelectuală și fizică mărită. Grijile sunt date uitării. Ideile se îngămădesc, imaginația își ia sborul, noțiunile de spațiu și de timp dispar, simțurile se ascut, apetitul sexual crește. A doua zi ai: dureri de cap, vărsături, diaree, mișcări nesigure, idei vagi și încurcate, stare care cheamă o nouă gustare, o nouă pipă de opiu. Dar după câțiva ani atențiunea îți scade, nu mai poți lucra, îți pierzi memoria, simțul moral se atrofiază și de aceea minți, înșeli, furi; uiți datoriile față de societate și față de tine însuși. La urmă se instalează progresiv cachexia — slăbiciune grozavă, scheletică — ești un

schelet peste care s'a întins o piele. Dacă nu mori prin sincopă, sfârșești în cea mai neagră mizerie. (După Dr. Retezeanu).

Opoterapie sau Organoterapie. — Metodă nouă de tratament, care constă în întrebuințarea *sucurilor* scoase din glande, sau din țesutul unui organ, pentru a combate la om accidentele provenite, sau din absența, sau din turburarea funcțională, ori din funcționarea insuficientă, a organelor sau țesuturilor corespunzătoare, sau pentru a obține, cu privire la unele organe cari fiziologicește au cam aceeași slujbă, un rol de suplinire cum ar fi de pildă glanda tiroidă și timul. Pentru scoaterea sucurilor se întrebuințează: 1^o *organele proaspete* diluate în (bulion sau dulceată, sau se dau în buline; 2^o *organele uscate*, sau pulverizate, date în buline, sau tăblițe; 3^o *extracte glicerinate* obținute prin macerațiunea în timp de 24 ore a organelor proaspete (înbucătățite îndată după moarte) în glicerină, apoi filtrarea lor după ce li s'a adăogat 3 volume de apă fiartă; 4^o unele produse active izolate în mod artificial, cum sunt: *adrenalina*, sau *iodotirina*. De obicei se iau organe dela animale tinere, afară de extractele organelor genitale. Aceste preparate se dau de preferință pe gură, mai rar prin șezut (în clizme) și foarte rar prin injecțiuni pe sub piele, din cauză că pot da naștere la diferite accidente locale, sau generale și sunt foarte dureroase. — **Opoterapia gastrică** are ca element principal *sucul gastric proaspăt* luat dela animalul viu, căruia i se face o fistulă gastrică (*gasterină*), care se zice că lucrează foarte bine în *dispepsia* dureroasă și în *gastrită*. *Gasterina* se prepară din suc luat dela câine, iar suc luat dela porc se numește *dispeptină*, care se dă în *gastritele* cronice, în *atonia* stomacului, în *dispepsia* ofticoșilor, neurastenilor, cloroticeilor. **Opoterapia hepatică** se aplică sub mai multe forme: *extract de ficat*, *fiere* (bilă) *de bou* concentrată și pusă în capsule, *ficat proaspăt*, mai ales *ficat proaspăt de bou* tocat, din care bolnavul va lua zilnic 120 până la 200 gr. în bulion cald. Ficatul proaspăt, nefiert, se poate trece printr-o mașină de tocat carne și pe urmă se poate

unge pânea cu această pastă, căreia, dacă nu este prea plăcută la gust, i-se adaugă puțină sare. Este un prețios mijloc de a vindeca anemiile grave și în general orice debilitate. Se dă în *ciroză* (hemoragiile încetează, diureza se stabilește, ascita și edemele dispar, apetitul și bună starea reapar uneori în 8—15 zile). — *Opoterapia medulară*: *măduvă proaspătă de vițel* 100 gr. pe zi în zeamă de carne, sau *extract uscat*, 50 ctgr. până la 1 gr. pe zi în praf sau în tăblițe. Se dă în leucemia splenică, anemia infantilă pseudoleucemică, anemia pernicioasă cu reacțiune mieloidă. — *Opoterapia ovariană*: *ovare proaspete* de vacă sau de vițea, 5—10 gr.; praf de ovare uscate sau *ovarină*, 10—20 ctgr. Se dă în turburările menopauzei, amenoree, dizmenoree, etc. — *Opoterapia pancreatică*: *prancreas proaspăt*, dela oaie, tocat, 30 gr.; *pancreas uscat*, în tăblițe sau capsule; *pancreatină* (ferment solubil extras din pancreasul porcului), 50 ctgr. până la 1 gr. Se dă în diabet, în dispepsie gastro-intestinală. — *Opoterapia renală rinichi de porc* curățiți de învelișul lor, tăiați în bucăți și spălați cu apă distilată, apoi pisați într'o piuliță în 450 gr. apă sărată (7 la 1000); după ce se lasă în odihnă 4 ore se decantează, rămânând cam 400 gr., pe cari bolnavul le consumă în 24 ore, în 4 rânduri în bulion. După 10 zile de cură, odihnă de 4—5 zile. Se dă în insuficiență renală, întretinând diureza, reducând sau făcând să dispară albuminuria. Opoterapia renală trebuie asociată cu *regimul lactat* sau *lacto-vegetarian*. — *Opoterapia suprarenală*: *capsule suprarenale proaspete de oaie* (2—3 gr. pe zi); capsule în praf, 40—60 ctgr.; *extract glicerinat* în injecții sub piele. Se dă ca toni-cardiac și vazo-constrictor, acest din urmă efect se datorește mai mult *adrenalinei* (v. acest cuvânt. — *Opoterapia testiculară*: *testicul proaspăt* de taur sau de berbec, 50 ctgr. până la 1 gr.; praf în tăblițe de câte 30 ctgr. 5—10 pe zi. Se dă în senilitate, nevrazenie, impotență, tabes, oftică. — Mai sunt: *opoterapia pituitară, placentară, pulmonară, splenică, timică, tiroidiană*, pe cari ne mulțumim numai a le cita.

Opresiune. (lat. *oppressio*, apăsare), *greutate la respirare*. — Prin cuvântul *opresiune* se înțelege o stare în care omul încearcă o greutate mare în respirație, simțind în același timp ca și cum l'ar apăsa ceva pe piept, sau ca și cum i-ar strânge pieptul într'un cerc de fier. Sunt mai multe cauze cari produc opresiune: uneori sunt *boalele de plămâni* care fac ca aerul să intre cu anevoință (bronchita, pleurezie, congestiunea pulmonară, astma); alteori este o *boală de inimă* în care aceasta bate neregulat trimițând prea mult sânge deodată în plămâni. Câte odată jocul plămânilor este împiedecat printr'o dezvoltare prea mare de gaze în stomac, care se umflă tare și plămânii nu mai au loc de a se lărgi când intră aerul în ei. Are o însemnătate mare în multe boale de piept, cum este de exemplu la o pneumonie (aprindere de plămâni) sau la o pleurezie, în cari greutatea la respirație poate să țină mai multe zile. Opresiunea fiind numai un semn al altor boale, urmează că ea n'are tratament propriu, căci pentru ca ea să dispară trebuie vindecată boala care o produce.

Oprirea udului. — V. *Urină* (*Retențiunea urinii*).

Optometru (gr. *optesthe*, a vedea, și *metron*, măsură). — Aparat de fizică medicală, destinat a măsura puterea vederii distincte. Cel mai întrebuințat instrument este optometrul lui Javal.

Orăcăire. — V. *Țipete*.

Orașe. — Este mare deosebire între locuitorii dela orașe și cei dela sate, ceea ce se poate vedea după boalele de cari sufăr unii și alții. Astfel la orașe cei mai mulți locuitori mor de anemie, de febră tifoidă, de oftică, etc. boale cari provin din stricarea aerului, a apei, din sărăcie cu toate lipsurile ei, din îngrămădire de prea mulți oameni la un loc restrâns, tot atâtea împrejurări cari îi fac mai primitivi de boale și în special de boalele mai sus pomenite. Locuitorii satelor sunt mai expuși la boalele cari provin din intemperii și din stricarea solului. Cele mai multe orașe au căutat să aibă apă bună de băut și în cantitate îndestulătoare, prin aceasta au făcut de a scăzut mult numărul bolnavilor de febră tifoidă și prin urmare mortalitatea generală.

Dar nu este de ajuns ca numai administrațiunile să se îngrijească de sănătatea generală a locuitorilor, ci și aceștia trebuie să caute fiecare ca să trăiască în condițiuni cât se poate mai igienice, să aibă locuință cât se poate de bună, spațioasă, bine aerată, cu ventilațiune/sistematică, bine încălzită, să se hrănească pe cât se poate mai bine, având hrană de bună calitate și îndestulătoare.

Orătenii. — V. *Paseri de casă*.

Orb. — În România sunt o mulțime de orbi, dintre cari mulți au orbit chiar îndată după naștere în urma boalei cumplite, numită *conjunctivită*, sau *oftalmie blenoragică* și pe care o capătă copilul de la mama bolnavă de blenoragie. Această boală care este așa de cumplită în urmările ei poate fi ușor vindecată dacă se tratează la început (vezi *Ochiu* și *Nou-născuți*). Mulți au mai orbit în urma variolei (vârșatului), boală care se poate preîntâmpina prin vaccinație (ultuire). Alții orbec din cauza sifilisului, a conjunctivitei granuloasă, a bănturilor alcoolice, etc.

Orbalț. — V. *Erizipel*.

Orbire. — O persoană când nu vede este oarbă, suferă de *orbire*, care uneori poate să fie din naștere. Orbii din naștere au celelalte simțuri mult mai dezvoltate și mulțumită acestora precum și unei educațiuni speciale în institute potrivite, acești nenorociți ajung și ei să trăiască împreună cu ceilalți oameni, mai ales atunci când sunt dați de mici în acele institute. — Alteori orbirea vine la o vârstă mai mult sau mai puțin înaintată, în urma unei boale de ochi care nu se poate vindeca, sau care nu a fost căutată la timp. În aceste cazuri vederea este pierdută pentru totdeauna, afară de acele cazuri unde se mai poate face vreo operație (vezi *Amauroză*, *Ambliopie*, *Cataractă*, *Oftalmie*, *Ochiu*).

Orbită. — *Ochiu*.

Orbul găinilor. — V. *Emeralopie*.

Orchită (gr. *orchis*, testicul, și *itis*, inflamațiune). — V. *Testicul*.

Ordonanță. — Se numește astfel o prescripțiune medicală, fie că ea constă în a *ordona* unele medicamente, fie că ea are de scop de a arăta regimul.

Oreion. — V. *Urechion*.

Orez, oriz, (*Oryza sativa*, fam. gramineelor). — Plantă ierboasă aquatică, care se cultivă ca cereală în India și China cu 2800 ani înainte de era creștină. Cultura orezului se face în Asia, America, Africa în Europa prin Italia și la noi în Banat și Bărăgan. Orezul formează baza nutrimetului popoarelor asiatice, întocmai ca grâul în Europa. Ca aliment orezul este mai puțin hrănitor decât grâul și săcara, fiindcă el conține mai puține materii azotate și grase decât aceste *cereale*. El este tipul alimentelor feculente. Orezul fiert în apă, sau în lapte, sau în supă, sau preparat cu ouă, sau cu carne (*pilaful*), este un aliment plăcut la gust, ușor de mistuit. În medicină se întrebuințează mai cu seamă *apa de orez*, care se prepară fierbând 20 gr. orez într'un litru de apă, până ce a crăpat bine și adăugând 60 gr. de sirop de coacăze, sau de gutui. Este foarte bună în cazurile de diaree (urdinare) și iritațiune intestinală. *Făina de orez* este bună pentru cataplazme emoliente, mai cu seamă în boalele de piele. *Pudra de orez* este cea mai inofensivă pudră pentru obraz.

Orfol. — V. *Naftal de bismut*.

Organoterapie. — V. la *Opoterapie*.

Ortoform. — Eter metilic al acidului amidoxibenzoic. Praf cristalin, fără culoare, fără miros, puțin solubil în apă. Antiseptic și anestezic local al mucoaselor și al părților denudate (arsuri, răni, pleznituri, sgârieturi). Se aplică pulverizat, *neamestecat cu nimic*. *Pe dinăuntru* se dă ca potolitor de dureri (calmant) în cancerul (racul) și ulcerele stomacului, în durerile de cap ale sifiliticilor; 50 centigrame până la 1 gram.

Ortopedie gr. *othos*, drept și *pais*, *paidos*, picior). — Astfel se numește partea medicinei care se ocupă cu tratamentul schilodirilor (din naștere, sau dobândite), ale aparatului de mișcare, având de scop să redea părților cari constituiesc acest aparat (oasele, mușchii, încheieturile și nervii) forma și funcțiunile lor în total, sau în parte. Îndreptarea diformităților se face prin diferite *operațiuni ortopedice*, prin *îndreptări* silite cu mâinile sau cu instrumentele, prin *osteoclazie* (ruperea arti-

ficială a oaselor strâmbe sau diforme), prin aplicarea de *bandaje de gips*, prin diferitele *bandaje* și *aparate ortopedice*. La acestea se mai adaugă ca mijloace ajutătoare *masajul*, *gimnastica* și *electricitatea*. Diformitățile provin mai în-



Fig. 317. — Tratamentul ortopedic (Același copil la 2 ani după tratament)

totdeauna dintr'o alterație primitivă a unei părți din schelet sau a unei închieturi, care, printr'o dezvoltare anormală, ia o conformațiune vicioasă. Ligamentele, tendoanele și mușchii prinși de aceste oase bolnave suferă și ei și din înaintarea boalei rezultă pentru ei *scurtare*, *retracțiune*, *atrofie*, *paralizie*, etc. Afară de acestea mai contribuie la creșterea diformității mersul și greutatea corpului. Oasele din vecinătate mai ales cele lungi, capătă *curburi* de compensațiune, apoi se ivesc *luxațiuni* (scrintiri), *diformitatea* și *roaderea suprafețelor* prin cari oasele vin în atingere între ele, de unde rezultă *scurtarea* și *oprire* în creșterea oaselor, *retracțiuni* și *paralizii* de mușchi, etc. Uneori diformitățile sunt produse de poziția copiilor în școală (*scolioză*). Ortopedia trebuie să prevină aceste diformități și să le combată după ce s'au ivit; pentru aceasta ea trebuie să se facă din bună vreme și în bune condițiuni, pentru ca să combată leziunile chiar dela începutul lor și tratamentul ortopedic va fi cu atât mai simplu, mai scurt



Fig. 318
Corset ortopedic

și mai cu folos cu cât a fost început mai de timpuriu. Mulțumită ortopediei moderne se vindecă *cocosații* (v. *Columna vertebrală*), când sunt la începutul boalei, fixând șira spinării într'un aparat sau corset de ghips, aplicat dela gât și până sub șolduri, lăsând libere mișcările brațelor și picioarelor, așa că copiii pot umbla la școală, se pot juca în aer liber și la soare pentru a-și îndrepta în același timp și starea generală. Îndreptarea diformităților se face cu *mânile*, cu *instrumentele*, sau prin unele *operațiuni speciale*; iar menținerea îndreptării se câștigă prin diferite *aparate de ghips*, *bandaje* și *aparate* așa zise *ortopedice*; restituierea funcțiunilor se capătă prin *masaj*, *gimnastică*, *meconoterapie*, *idroterapie*, *electricitate* (v. aceste cuvinte).

Orz (*Hordeum vulgare* fam. Gramineelor). — Plantă erboasă care se cultivă mult pentru trebuințele economice și industriale. Din grăunțele de orz se face *maltul*, care se întrebuințează la fabricarea *berii*. Grăunțele de orz curățate de coaje constituie produsul vegetal cunoscut sub numele de *arșăcaș*, care se pune în supă. Tot din grăunțele de orz se face și *grîșul*, produs vegetal întrebuințat adeseori în bucătărie. Popoarele din țările nordice prepară *pâne* din orz, iar în țările sudice ale Europei și pe la noi orzul se întrebuințează și ca nutreț pentru cai. În medicină se întrebuințează grăunțele de orz pentru prepararea băuturilor răcoritoare și nutritoare. Făina de orz cuprinde la 100 părți : 12—14 materii albuminoide, 65—76 materii amidacee și 2—3 grăsimi. *Decocțiunea* (fiertura) de orz, simplă sau îndulcită cu miere este bună ca băutură nutritoare la mulți cari suferă de fierbințeală (febră), mai cu seamă la bolnavii atinși de angină. Ea se mai dă în loc de lapte la copii cari suferă de gastro-enterită (diaree sau urdinare cu dureri de stomac și de mâțe). Orzul fiert cu lapte dulce este bun pentru tusă. Praful de *malt* uscat se dă cu succes la cei ce suferă de dispepsie (mistuire grea), 2—4 gr., cu apă sau buline (vezi *Malt* și *Maltină*). Orzul fiert cu apă, strecurat și adăugându-se puțină piatră

acră, precum și o linguriță de miere, este o gargară bună pentru durere de gât, la gâlci, etc. — La *fară* babele dau să bea lehuzele ca să se întărească orz fiert cu vin, iar în contra tusei orz fieri cu lapte dulce. Pentru durere de gât se face gargară cu fier-tură de orz. Pentru urcior la ochi se caută un bob de orz în balebă de cal, se înțeapă cu el urciorul, apoi se pune iar în locul de unde s'a luat. În unele locuri se fac copiilor după naștere băi cu zeamă de orz.

Orzișor. — V. *Ochiu* (Ulcior).

Os (lat. *os*, grec. *ostéon*). — Oasele sunt părțile tari și rezistente a căror totalitate, sub numele de *schelet*, formează pârghiile puse în mișcare de către mușchi. *Scheletul* este format din 209 oase, împărțite astfel: 28 la cap, 4 la gât, 53 la trunchiul, 32 la fiecare membru superior și 30 la fiecare membru inferior. — Dintre toate oasele numai oscioarele auzului (v. *Ureche*) sunt pe deplin dezvoltate, în momentul nașterii, toate celelalte sunt în stare rudimentară. Oasele după naștere cresc în grosime și în lungime, dar ele sunt încă slabe, puțin rezistente, supuse la îndoiri, la rupturi, din care pricină trebuie mare supraveghiere când încep copiii mici să umble, să nu cadă, să nu se lovească. Afară de aceasta se va continua încă mult timp cu hrănirea numai cu lapte, dacă voim ca oasele să se întărească. Oasele sunt pe deplin dezvoltate cam pe la vârsta de 25—30 ani, rămânând aproape neschimbate până la 50 ani, când în preajma bătrâneții încep a-și mai pierde din mlădierea lor, a deveni mai uscate și mai ușor de rupt, de unde și sfatul ca cei bătrâni să se păzească de căzături și de lovituri. La naștere capul copilului este foarte mare în raport cu restul scheletului, constituind a patra parte, la 3 ani a cincea parte și la adult a opta parte. La cretini și la rachitici el rămâne tot mare. *Scheletul* femeii este mai fin și mai mic decât al bărbatului. Oasele sunt constituite la suprafață printr'un țesut compact și conține în interiorul lor *măduva*, o substanță moale, grăsoasă, gălbue sau roșietică, ele sunt învelite de o membrană de țesut conjunctiv, (*periost*). El are însușirea minunată de a

reproduce pe din afară țesut osos pe măsura în care acest țesut este rezorbit pe dinăuntru în dreptul măduvii. Compoziția chimică a oaselor constă în carbonat și fosfat de calciu, grăsimi și o substanță moale, elastică, ce se preface în *gelatină*, dacă se fierbe în apă. Oasele se împart în *lungi*, *scurte* și *late*. Cele *lungi* se găsesc la membre și sunt sau ca niște stâlpi cari suportă greutatea corpului (membrele inferioare, picioare), sau ca niște pârghii puse în mișcare de mușchi (membrele superioare, mâni); ele au în partea mijlocie un canal, plin de măduvă. Oasele *scurte* se găsesc la mâni și la picioare a căror slujbă cere soliditate și mobilitate. Oasele *late* formează pereții craniului și ai pieptului. *Scheletul* variază dela om la om; la unii oasele sunt mai lungi, la alții mai groase; apoi modul de viață, îmbrăcăminte, exercițiul zilnic, lucrul cu mâinile, mersul, toate acestea măresc puterea lor de rezistență precum și grosimea lor. Greutatea totală a oaselor scheletului la un om de 25—30 ani este de 3—6 kgr. Rolul oaselor este îndoit; pe de o parte de ele se prind mușchii, cari le pun în mișcare (v. *Articulațiuni* și *Mușchi*); iar pe de altă parte ele dau corpului omenesc forma și soliditatea sa. — **Boalele oaselor.** Prin cădere sau lovire oasele se pot rupe, sau pot sări din locul lor (v. *Fraktură* și *Luxație*); ele pot să se inflameze ca ori și care parte a corpului. Când inflamația se mărginește numai la cămașa osului, la *periost*, avem ceea ce se numește *periostită*; când este, mai adâncă, interesând corpul osului, avem *osteită*. Cauza acestor inflamațiuni poate fi o cădere sau o lovitură puternică asupra osului (*osteită traumatică*) sau o răceală mare, ivindu-se mai adeseori la scrofuloși, limfatici, slabi de constituțiune (*osteită scrofuloasă* sau *tuberculoasă*), la cei ce suferă de sifilis (*osteită sifilitică*). *Osteita*, oricare ar fi cauza ei, se arată printr'un punct dureros într-o parte a osului, durerea este foarte mare, mai ales noaptea și se mărește la cea mai ușoară apăsare, la cea mai mică mișcare; pielea începe a se înroși în acel punct devine lucitoare și caldă; bolnavul are fierbințeală (febră), mai

OS

OS




Fig. 319. — Scheletul omului

mult sau mai puțin mare, sete, lipsă de poftă de mâncare, uneori urdinare și vărsături. Cel dintâi lucru de făcut în asemenea cazuri este să punem bolnavul în pat, în odihnă completă,

apoi vom unge partea dureroasă cu tinctură de iod; dacă însă umflătura crește vom pune cataplasme de făină de în, simple sau stropite cu laudan, iar în acelaș timp vom chema doc-

torul, care, dacă inflamațiunea va fi dat în copt, va face o tăietură pentru ca puroiul să curgă. Pentru starea generală vom da bolnavului untură de pește, medicamente tonice și o hrană bună, pentru ca să prevenim



Fig. 320. — Osul lipsit de calciu se îndoaie (primul), cel cu calciu se sfărâmă (al doilea)

caria osului. Caria are aceleași cauze ca și inflamația simplă, descrisă mai sus; ea este însă cu mult mai gravă și mai greu de vindecat, căci osul bolnav *supurează*, se distruge încet cu încetul, iar pielea din dreptul lui se subțiază, se sparge și lasă să se scurgă un fel de materie cenușie, cu miros urât, adeseori amestecată cu bucățele de os de mărime variabilă, cari se deslipesc de os. Tratamentul este *general*, adică se vor da medicamente întăritoare și *local*, care constă în *tăieturi* și *răzuirea* părților moarte. În cazurile de *osteită sifilitică* se va face un tratament mixt: iodur de potasiu în doze mari și injecțiuni de mercur, neosalvarsan și bismut. Pentru a fi mai lămurit asupra acestor boale de oase cetitorul să citească articolele: *Carie*, *Colți de lup*, *Columna vertebrală*, *Eschile*, *Necroză* și *Secvestru*. Afară de acestea oasele mai pot fi atinse de înmuiere și de deformățiuni cunoscute sub numele de *rachitism* (vezi acest cuvânt).

Ospiciu. — Stabiliment în care se caută nebunii sau alienații (Mărcuța, Socola, etc.), incurabili (Pantelimon), copii găsiți, surdomuții, orbii (Vatra luminoasă), etc. — V. și la *Spital*.

Osteită Inflamațiunea osului. — V. Os

Osteneală. — V. *Surmenaj*.

Osteomalacie (gr. *osteon*, os și *makos*, moale) — Această boală se arată rareori și se produce prin decalcificarea, adică dispariția sărurilor de calciu din oase, ceea ce aduce cu sine înmuierea scheletului și ca rezultat final fracturi multiple și deformățiuni

osoase. Se poate cunoaște din vreme prin cantitatea foarte mare de fosfate cari se găsesc în urină. Osteomalacia se vede cu mult mai des la femei decât la bărbați și este ajutată de sarcinile repetate, de alăptare, de sărăcie și lipsă de carne în hrană. *Semnele* acestei boale sunt: dureri în șira spinării, în șolduri și la membre, dureri cari vin prin crize, apoi ele devin continue și se măresc prin mișcări și apăsare, din care pricină bolnavul stă toată ziua nemișcat. Apoi deformități cari rezultă din îndoirea oaselor, turtirea vertebrelor, din care cauză corpul se micșorează, se împuținează; fracturi (frânturi) de oase; palpațiuni (bătăi de inimă); opresiune (apăsare în piept), bolnavul slăbește repede și moare. *Tratamentul.* Se va îmbunătăți traiul, dându-se hrană bogată în fosfate și săruri minerale ușor de mistuit și de asimilat: carne, pâine, ouă, lapte, legume uscate bogate în fosfate. Se vor da preparate fieruginoase, cu fosfor, fosfate, chinină, untură de pește. Dintre preparațiunile cu fosfate se va da: fosfatul tribazic de calciu (25 ctgr. până la 1 gr. pe zi), asociat cu maltină (vezi acest cuvânt); glicerofosfat de calciu și de sodă, ipofosfit de sodă, praf de os asociat cu fluorur de calciu, untură de pește cu fosfor (15 la 100), 1—4 lingurițe pe zi. Se va recomanda *opoterapia ovariană*, sau *opoterapia tiroidiană* (V. *Opoterapie*), sau injecțiunile sub piele de *adrenalină* (dintr'o soluție de 1 la 1000 se va injecta o jumătate de gram).

Osteomielită. — Inflamațiunea măduvii oaselor.

Osteoperiostită. — V. Os.

Osul crucii. — V. *Sacrum*.

Osul coadei. — V. *Coccyx*.

Otalgie. (gr. *otos*, ureche, și *algos*, durere). — Durere de ureche (v. *Ureche*).

Otel, hotel. — Multe boale se iau din otelui, unde merge tot felul de lume, cu fel de fel de boale molipsitoare. Pentru aceasta, în toate țările s'au luat aspre măsuri ca să se desinfecțeze camerele după plecarea fiecărui călător. La noi însă din nenorocire, nu se ține seamă de aceasta și omul este în pericol de a se îmbolnăvi ori de câte ori petrece vreo noapte în otel. Dacă în orașe suntem astfel ame-

nințați, cu mult mai mult suntem în stațiunile balneare, unde se duc mulți bolnavi molipsitori. Pentru ca să se poată desinfecta mai bine camerele de otel și să fie în condițiuni igienice, trebuie ca zidurile să fie tencuite cu ipsos și vâpsite cu ulei, pentru ca ele să se poată spăla cu înlesnire; să nu fie colțuri nici unghiuri între tavan și ziduri; să nu fie decorațiuni pe tavan, nici perdele sau draperii pe la ferestre, cari trebuiesc să fie mari; să fie ventilatoare. Mobilierul cât se poate de simplu: pat de fier, scaune de lemn fără sculpturi, masă de asemenea, sau de marmoră, etc., cari să se poată spăla cu ușurință; latrine cu apă în cantitate suficientă.

Oțet (lat. *acetum*). — Oțetul este un produs al fermentațiunii acide, sau acetice a lichidelor alcoolice. Astfel, dacă punem vinul, berea, cidrul, alcoolul chiar, în vase deschise și le lăsăm la acțiunea aerului, ele încep a se înăcri, a deveni acide prin fermentațiune (v. acest cuvânt) care se petrece în sânul lor. Cel mai bun oțet pentru trebuințele culinare este *oțetul de vin*, dar se întrebuințează mai mult esența de oțet, care este periculoasă, sau oțetul de lemn, care nu este altceva decât *acidul pirolignos*. Acesta, ca și oțetul de vin, dacă este bine rectificat, poate servi la mâncare. Oțetul bun de vin trebuie să fie limpede, să aibă un gust acru și un miros plăcut. Oțetul stricat este turbure și depune pe fundul vasului un strat gros. Oțetul este un *condiment* (v. acest cuvânt) bun, folositor, care asociat la diferite mâncări, întetește pofta de mâncare și ușurează mistuirea, însă numai cu o condițiune, ca să nu se facă abuz de el. Abuzul de oțet irită stomacul, produce acreli (râgâituri acre) și în cele din urmă strică cu totul sănătatea, după cum se întâmplă cu acele fete tinere, cari în dorința de a slăbi, și aceasta în scop de cochetărie, beau oțet în cantitate mare și în cele din urmă sfârșesc prin a se ofica. De oțet trebuie să se păzească toți cei slabi de stomac, cari sufăr de dispepsie (mistuire grea), de acrimi și dureri de stomac, cari sunt predispuși la boale de piele. Pe *dinafară* oțetul se întrebuințează în fricțiuni, pe piele,

pe tâmpile, fiind un bun stimulent, sau inhalațiuni în cazuri de sfârșeală, de leșin. — *Oțetul aromatic* se face din oțetul ordinar, în care se pun specii sau plante aromatice (*trandaferi*) și cu el se spală rănilor pentru a se vindeca mai iute, sau se fac fricțiuni pe corp în caz de răceală, sau febră.

Otită. — V. *Ureche*.

Otoree. Curgere de ureche. — V. *Ureche*.

Otrățel. — V. *Limba mielului*.

Otrăvire. — Cazurile de otrăvire sunt de multe feluri, căci multe sunt și lucrurile cari au însușirea de a otrăvi, natura fiind foarte bogată în privința aceasta. Otrava poate intra în corpul nostru prin gură (tubul digestiv), prin respirație sau prin piele, când aceasta este sgâriată sau rănită. Otrăvile sunt unele *solide*, cum sunt: arsenicul (șoricioaica), bureții (ciupercile), fructele de mărăgună, măsela-rița, ciunăfaia, carnea bolnavă, macul, cocaina, etc.; altele *lichide*: acidul sulfuric (vitriolul), acidul nitric (apă tare), cloroformul, esența de oțet, etc. și altele *gazoase*: aburi de cărbune, gazul de latrine, etc. — Otrăvirea, cele mai adeseori se arată în mod subit și are un mers repede și terminație grabnică, mai ales în cazurile de sinucidere sau omucidere, în cazurile de accident, de mâncări sau băuturi otrăvite. Astfel când o persoană sănătoasă este cuprinsă deodată de dureri mari de stomac, dureri cari se măresc prin apăsare cu mâna, de greață și de vărsături, apoi de diferite turburări în respirație și circulație (grăbire sau încetinire) și în cele din urmă de turburări nervoase, cum ar fi agitație, delir, sau o stare de abatere profundă, (sfârșeală), suntem în drept a bănuî că acea persoană este otrăvită și trebuie să-i dăm tot ajutorul care se dă în astfel de cazuri. Vom căuta ca bolnavul să verse otrava care o mai are în stomac, înfundându-i un deget în gură pentru a-i gădili omușorul, până ce vine dela farmacie un vomitiv (emetic sau ipeca); apoi îi vom da un purgativ (curățenie) sau îi vom aplica un clistir (sulfat de sodă în apă), îi vom da medicamente să asude (sudorifice) și să facă urină multă (diuretice), dându-i să bea băuturi apoase.

și călduțe în abundență, după care îi vom da un medicament contra otrăvii (v. *Antidot*), afară numai de cazul când nu cunoaștem otrava luată, când se înțelege, nu putem să ne gândim la niciun antidot. — *Otrăvirea prin hrană* merită o deosebită atenție. Carnea care a început să putrezească este otrăvitoare prin substanțele chimice numite *alcaloide*, *ptomaine*, etc., cari s'au dezvoltat în ea. Din carnea putrezită de pește și de cal s'au extras substanțe otrăvitoare. Se întâmplă uneori că chiar carnea *proaspătă* a unui animal *sănătos* să cuprindă substanțe otrăvitoare, cari însă, când sunt în cantitate mică, sunt date afară de organismul omului sănătos, dar când sunt în cantitate prea mare, ele pot produce accidente grave și chiar moartea. — Otrava intrată în organism, este dată afară din corp, în primul rând prin rinichi. Când aceștia sunt sănătoși și funcționează bine, lucrul este ușor; nu tot astfel este cazul când rinichii sunt bolnavi, căci atunci otrava rămâne în cea mai mare parte a ei în corp și dă naștere la accidente grave. — Imprejurările în cari carnea *proaspătă* a unui animal poate să cuprindă substanțe otrăvitoare sunt mai multe. Așa este carnea unui animal gonit mult timp, de pildă a unui iepure împușcat în goana coailor. În acest caz iepurele îngreună dește în corpul lui multe substanțe otrăvitoare, fabricate prin arderea activă ce s'a săvârșit în corpul lui în timpul fugii. Carnea aceasta nu numai că nu este bună dar este chiar vătămătoare pentru o persoană care suferă de rinichi, cari fiind bolnavi, nu mai pot alege și da afară prin urină otrava din sânge. *Cu cât un animal a fost omorât mai repede, fără chinuri, cu atât carnea lui proaspătă este mai bună pentru hrană.* — Cărnurile conservate în cutii din cauza putreziciunii lor dau naștere adeseori la otrăviri. Cutiile cu carne, cu pește, cu raci, când au capacele umflate ne arată că conținutul lor este intrat în putrezire, dând naștere la gaze cari au umflat capacele. Salamurile, cârnații, etc., din cauza relei lor preparării, adeseori se descompun mai ales în partea lor centrală. Carnea de morun, când se strică,

ia o culoare roșie, deschisă, datorită unei ciuperci microscopice, unui mucegaiu. Același lucru se poate întâmpla cu raci, scoicile, stridiile, mi-diile, cari de multe ori sunt tot atâtea cauze de otrăviri. În corpul mi-diilor s'a găsit o substanță otrăvitoare, numită *mitilatoxină*, îngreunădă mai ales în ficat. — Imbolnăvirile din pricina mâncării rele, poporul nostru le numește *aplecate*. Turburările încep curând după înghițirea cărnii stricate, 2—3 ore după mâncare, rar după mai multe ceasuri. Uneori, foarte rar, ele se pot ivi chiar după 2—3 zile și atunci trebuie să presupunem că turburările acestea sunt datorite dezvoltării unor microbi ce se găseau în carnea înghițită și cari aveau trebuință de un timp mai lung pentru a se dezvolta. *Semnele* otrăvirii prin hrană variază după gradul de otrăvire. În forma *ușoară* avem greață, vărsături, dureri de stomac, (colici), cari încetează după câteva ore; apoi accidentele acute dispar repede, rămânând însă cu lipsă de poftă de mâncare, urdinare puturoasă, umflarea pântecelui. În forma *mijlocie*, începutul este acelaș ca mai sus, însoțindu-se și de icter (gălbinare). După ce a trecut perioada acută bolnavul rămâne cu fața palidă, trasă, fără putere, cu limba încărcată, albă, gura păstoasă, amară, constipație urmată de urdinare puturoasă, lipsă de poftă de mâncare, pulsul rar și slab, convalescența lungă. În forma gravă, otrăvirea ia dintr'odată caracterul febrei tifoide sau a colerei, terminându-se prin moarte. — *Tratamentul*: înainte de toate trebuie golit stomacul, provocând vărsături prin infundarea degetului în gură, sau mai bine dând *emetic* (câte 5 ctgr. din 5 în 5 minute, până varsă), sau ipeca, sau sulfat de cupru (20 ctgr.). Când bolnavul nu poate varsa, i se va introduce o sondă esofagiană și se va spăla stomacul; când otrava a trecut în mațe, se va da o curățenie, apoi antiseptice intestinale (salicitat de bismut, iodoform; cărbune vegetal, 2—4 lingurițe), regim de lapte. — Mai este un fel de *otrăvire* care se face pe încetul, prin doze mici repetate, în mod cronic, care s'ar putea numi mai bine *intoxicație* și care rezultă din

OU

exercitarea unei profesii nesănătoase, cum este otrăvirea înceată, produsă prin *plumb* la zugrăvi, la topitorii de litere, etc., prin *mercur* la lucrătorii ocupați cu aurirea metalelor prin alte procedee, nu prin galvanoplastie, prin *fosfor* la acei ce fabrică chibrituri. Aceste otrăviri se fac în mod progresiv, pe neștiute, ceea ce le face să fie și mai grave, putând da naștere la paralizia mușchilor trunchiului, spatelui, mâinilor, etc. Pentru tratamentul special al fiecărei intoxicațiuni, să se caute la: *Fosfor*, *Mercur*, *Plumb*.

Ou (lat. *ovum*). — Intre articolele de hrană, unul din cele mai de căpetenie este *oul*. Se mănâncă mai mult ouăle de *găină*, apoi cele de *rață*, de *gâscă*. Afară de acestea mai sunt ouăle de pește, *icrele*, cari la noi se mănâncă foarte mult. Oul de găină cântărește în termen mijlociu 60 gr. și se compune din *găoace*, (6 gr.), format din carbonat și fosfat de calciu, din *albuș* (36 gr.), o masă vâscoasă, transparentă, formată de *albumină*, materie azotată care se încheagă la căldură de 75°, din *gâlbenuș* (18 gr.), opac, moale, compus din substanțe proteice și grase, din fosfate și mai cu seamă dintr'o grăsime fosforată cu însușiri stimulente, numită *lecitină*, care se găsește în cantitate cam de 50 ctgr. într'un ou și se distruge prin fierbere. Gâlbenușul este bogat în compuși fieruginoși asimilabili, ceea ce face ca el să fie și un bun medicament tonic și reconstituant. Din acestea rezultă că oul are o valoare nutritivă foarte mare, mulțumită materiilor azotate și grase. Un ou este tot așa de hrănitor ca și 120 gr. de lapte de vacă. Pentru a cunoaște dacă un ou este *proaspăt*, avem mai multe mijloace la îndemână: punem oul în apă puțin sărată, dacă el este din acea zi cade îndată la fund, dacă este de 2 zile nu atinge tocmai fundul, dacă este de 5, sau de mai multe zile el rămâne la suprafață și găoacea lui iese cu atât mai mult afară cu cât este mai vechiu. Cântărim oul, având în vedere că un ou ordinar are 55 până la 60 gr. și dacă este mai ușor, aceasta înseamnă că este vechiu. O chestiune de mare importanță este *păstrarea ouălor*, pentru a le feri de putreziciune. Pentru

OVAR

aceasta, se recomandă ca ele să se pună îndată după ce au fost ouate într'un amestec de nisip alb, sare și cărbune, cari astupă porii coajei și aerul nu poate să pătrundă și să vină în atingere cu gâlbenușul ca să-l descompună, sau să se cufunde ouăle îndată după ce au fost ouate în lapte de var. Ori cum s'ar păstra, după 15 zile ouăle nu mai sunt bune de mâncat și cine vrea să se hrănească bine, să caute să mănânce ouă cât se poate de proaspete. Modul de preparare este foarte variat, ceea ce constituie un mare avantaj. Ouăle *crude* nu se mănâncă. Cel mai bun mod de preparare este *oul fierț moale*, pentru care oul nu trebuie să stea mai mult de două minute și jumătate în apa care fierbe în clocote. Oul fierț moale este cel mai ușor de mistuit, și foarte bun pentru copii și convalescenți. În *medicină*, ouăle se întrebuințează sub mai multe forme; astfel, *coașa de ou* pisată mărunt se dă în contra acrimilor de stomac; *albușul de ou* servește la limpezirea siropurilor și vinurilor farmaceutice și mai cu seamă la prepararea *apei albuminoase* (v. *Albumină*), iar *gâlbenușul* intră în prepararea *laptelui de pasăre*, etc. Gâlbenușul mai intră și în unele formule de clizme alimentare. — La țară, ouăle au multe întrebuințări medicale. Albușul de ou bătut cu rachiu se bea pentru *friguri*, după care apoi se umblă mult. Albușul de ou copt bine, peste care se presară piatră vântată, arșă și pisată bine, se pune în ochiul pentru *albeață*. La *arsuri* se pune ou amestecat cu unt proaspăt. La *tăieturi* se pune pielită proaspătă în care se află albușul de ou. Pentru *oprirea sângelui* din nas se trage pe nas coaje de ou arșă și pisată bine. Când cineva voește să găsească locul unde este *junghiul*, plimbă un gâlbenuș de ou cu un pahar pe corpul bolnavului și unde se sparge gâlbenușul, acolo este junghiul și în acel loc se presară tărâte de grâu. La copiii cari *tușesc*, se dă *lapte de găină*, care se face din gâlbenuș de ou bătut bine, în apă caldă, îndulcită cu zahăr.

Oușorul genunchiului. — V. *Genunchiu*.

Ovar (lat. *ovarium*, dela *ovum*, ou), *cuibarul ouălor*. — Glandele sexuale ale

femeii se numesc *ovare*, și sunt în număr de două. Ele sunt așezate în micul *liggian* de fiecare parte a *mitrei*, cu care sunt unite prin *ligamentul larg*. Forma lor este ovoidă și lungimea lor este aproape de 4 cm.; greutatea unui ovar este între 6 până la 8 gr. Pe suprafața ovarului se văd cicatrice gălbui al căror număr arată de câte ori femeia a avut regule (perioadă). *Trompele*, sau *țevile*, sunt cele două canale, așezate câte unul de fiecare parte a mitrei în grosimea ligamentelor largi. Ele sunt în raport



Fig. 321. — Chist voluminos al ovarului

cu ovarele prin niște *pavilioane largi*, iar înăuntrul se deschid în mitră, în unghiurile superioare ale ei. — *Boalele* mai de căpetenie ale ovarelor și anexelor lor sunt următoarele: *Chistul ovarului* care se prezintă ca o tumoră și care la început trece ne băgată în seamă până a ajuns la o mărime oarecare; atunci femeia

simte că are ceva în pânțe, iar când chistul este mare cât un cap de om, bolnava simte un fel de greutate, are constipație și se oprește udul, are vărsături, nevralgii și dureri în pânțe. Chistul se dezvoltă foarte încet și durează mulți ani; el constă într-o pungă plină cu un fel de apă. Tratatamentul lui este cunoscuta operațiune (deschiderea pântecelui și scoaterea ovarului bolnav. — *Ovaralgia* este *nevralgia ovarului*; se arată printr-o durere în partea de jos a pântecelui, mai deseori la stânga și care se întinde în sus spre rinichi; ea vine la intervale variabile însoțindu-se de vărsături și de turburări în regulă (la perioadă). Se observă mai des la femeile isterice. *Tratatamentul* constă în cataplasme de făină de in

și în clizme cu laudan sau supozitoare cu opiu sau cu morfină. — *Salpingita* sau *salpingo-ovarita* (dela grec. *salpinx*, trompă) este inflamațiunea trompei și a ovarului. Este produsă de blenoragie, metrite, avorturi, nașteri, oftică, etc. În forma *acută* la început avem semnele *peritonitei*; iar în forma *cronică*, ce poate urma celei acute, sau poate să se ivească chiar dela început; *semnele* sunt: durere într-o parte, sau amândouă părțile mitrei, în micul *liggian* și în stînghie, sau simțirea unei greutate către șezut. Durerile se măresc prin umblare, mișcare, sdruncinăturile trăsuri, prin statul în picioare, prin pipăire; uneori ele sunt foarte mari, încât se aseamănă cu colicele de ficat sau de rinichi. Din pricina durerilor bolnava slăbește din ce în ce, se trage la față, nu poate mânca, devine nervoasă și are febră. *Tratatamentul* constă în băi calde, pansament umed peste mijloc, cu vată înmuiată și stoarsă bine, gutapercă pe deasupra, apoi fașe; vezicători, spălături vaginale cu irigatorul de 45°. Dacă s'a făcut puroiu se va deschide colecțiunea prin vagin sau se va face (deschiderea pântecelui) și se vor scoate părțile bolnave. Ovarul are o secreție internă, de buna funcționare a căreia depinde sănătatea, echilibrul femeii. Lipsa, ori insuficiența acestei secreții poate produce semne fizice (cum este creșterea părului pe corp, a mustașilor și bărbii), sau psihice (hiperexcitabilitatea, neurastenia). Când această secreție încetează definitiv — la menopauză — toate aceste turburări pot lua un mers grav. Pentru acestea s'au pregătit preparate din ovare de vaci, cari dau femeilor suferinde un mare ajutor în infantilism (când activează funcțiunea ovarului femeii), în turburările menstruației, în menopauză, în boalele cronice ale articulațiilor și în multe altele. Preparate ca *glanduovin*, *glandubolin*, ovar sub formă de *tablete*, sunt cunoscute azi și marelui public.

Ovarină. — V. *Opoterapie* (ovariană).

Ovariectomie. — Este o operațiune care constă în scoaterea ovarelor bolnave.

Ovarită. — Inflamațiunea ovarelor.

Ovăș (*Avena sativa*, fam. gramineelor). — Se întrebuințează sămânța,

care este un medicament calmant pentru tuse; contribuie la restabilirea forțelor în convalescență; aliment foarte bun pentru copii. Ceaiul sau băutura de ovăș se face din 20 gr. la un litru de apă în care se fierbe.

Ovule. — Se numesc astfel niște globulețe în formă de ou, de mărimea unui ou de porumbel și formate din glicerină întărită prin adăogare de gelatină. Aceste ovule se introduc ca și tamponale în fundul vaginului, pentru ca să lucreze asupra gâtului mitrei. Se întrebuințează curate, sau cu diferite medicamente antiseptice, analgezice (potolitoare de dureri) sau astringente. De obicei ovulele se întrebuințează în inflamațiunile de mitră (*metrite*).

Oxigen (gr. *oxys*, acid, și *gennan*, a zămislit). — Oxigenul este un gaz fără culoare, fără miros, fără gust, solubil în apă (28 c. c. la un litru de apă la 20°), mai solubil în alcool, lichefiabil. El este foarte răspândit în corpul omenesc (liber în căile aeriene, dizolvat în plasmă, combinat în globulele roșii ale sângelui, în stare de oxiemoglobină); acțiunea lui oxidantă asupra țesăturilor produce căldură și putere. Oxigenul ajuns la plămâni, în alveole, este absorbit în cantitate mică de către serul sângelui prin dizoluțiune și în cea mai mare parte de *hematii* prin fixațiune. Această absorpțiune variază puțin cu tensiunea oxigenului și proporțiunea lui în aerul atmosferic. Oxigenul se dă în inhalațiuni la bolnavii atinși de pneumonie broncopneumonie, oftică, pentru a ușura respirațiunea, a calma dispneea. El se întrebuințează de către cei ce lucrează în mine, de cei ce se urcă pe munți înalți pentru a combate efectele rarefacțiunii aerului. Se mai dă în contra respirațiunii grele la cei ce sufer de boală de inimă, la asmatici, otrăviții cu oxid de carbon și alte gaze, la copiii născuți înainte de timp. Pentru acțiunea lui asupra funcțiunilor stomacului se dă în vărsăturile cari nu se pot opri, în răul de mare. Pentru acțiunea sa asupra nutrițiunii se dă în diabet (boală de zahăr), albuminurie, obezitate pentru a grăbi arderile. În febra tifoidă (cu cianoză) el mărește diureza și producțiunea ureei.

La înecați și la spânzurați el nu dă rezultate bune ca respirațiunea artificială și ca tragerile ritmate ale limbii. Pe *dinafară* oxigenul se întrebuințează ca antiseptic puternic. — *Inhalatiunile* se fac cu baloane de cauciuc umplute cu oxigen, care iese printr'un tub prevăzut cu un robinet. Oxigenul este respirat sau deadreptul la eșirea lui din balon și în acest caz se pune orificiul tubului în apropierea nărilor, sau a gurii deschise a bolnavului, sau după ce el a trecut printr'un vas de sticlă plin cu apă, prin care se curăță și în acest caz bolnavul trage oxigenul printr'o țevă dela capătul tubului și pe care o ține între buze. Oxigenul este inhalat curat, sau încărcat cu substanțe medicamentoase (creozot, eucaliptol, gaiacol, mentol). Dozele sunt foarte variabile după cazuri: 30—60 litri pe zi sau pe sedință. — *Apa oxigenală* este un lichid fără culoare, foarte dens, fără miros, cu gust înțepător, metalic; *curată* ea poate degaja de 475 de ori volumul său de oxigen; apa oxigenată *oficinală* nu poate degaja decât de 12 ori (pentru întrebuințare chirurgicală), sau chiar de 10 ori (întrebuințare medicală). Apa oxigenată din comerț cuprinde în totdeauna urme de acid clorhidric, nitric sau sulfuric (pentru a o păstra). Apa oxigenală degajează oxigenul său în atingere cu fibrina sângelui, pe care o încheagă sub formă de spumă groasă. Este un oxidant puternic și nu trebuie confundată cu apa încărcată cu oxigen sub presiune. Aplicată local ea albește pielea și decolorează părul: în gură ea excită și îngroașe saliva (balele); injectată în vinele animalelor provoacă o stare de somn, anestezie generalizată, încetinește contracțiunile inimii și respirațiunea. Injectată sub piele provoacă edem subcutanat. Apa oxigenată se dă pe *dinăuntru* (foarte mult diluată) ca antiseptic gastro-intestinal, ca eupeptic (care ușurează mistuirea) și în contra greții și vărsăturilor. Pe *dinafară* ea se întrebuințează ca să se oprească sângele, în curgerile de sânge din nas, din gingii, etc., ca antiseptic puternic în pansamentul rănilor atone (fără vlagă), cum sunt ulcerile cronice, la pansarea plăgilor și supurațiunilor gangrenoase (diabet) sau cu miros

urât, în spălături la inflamațiunile de gură (stomatite), angine, otite cronice, pleurezii putride, infecțiune puerperală, în clizme, în dizenterie și în cancerul șezutului, în injecțiuni, în abcesele tuberculoase. Pentrucă oxigenul din ea se poate degaja ușor și astfel rămâne fără efect, putem întrebuința preparatele: *Neol*, (lichid cu gust acrișor) și *Hiperol* (tablete, pe care le disolvăm în apă). Astfel putem avea o apă oxigenată totdeauna proaspătă, aceste preparate fiind eftine și ușor de păstrat. S'a mai întrebuințat în contra mâncării de piele, în eczemă (bube dulci),

în degerături (ca băi locale), pentru căderea părului (epilator), pentru a topi ceara din urechi, etc. *Doză*: pe dinăuntru se dă apa oxigenată de 10 volume, una până la trei linguri diluată într'o soluțiune sau în apă minerală (Vichy, Vals) alcalină: pe dinăfară apa oxigenată de 12 volume curată (emostatică) sau diluată (pe jumătate sau pe sfert) în apă curată sau alcalinizată.

Oxiuri. — V. *Viermi intestinali*.

Ozenă. — V. *Nas*.

Ozon (gr. *ozein*, a mirosi). — V. *oxigen*.

P

Pachești sau *bretele*. — V. *Pantaloni*.

Pachidermie. — V. *Elefantiază*.

Pachimeningită (dr. *pachys*, gros, *menigx*, membrană, și terminațiunea *itis*, inflamațiune). — Inflamațiunea durei-mater (una din cele trei pielețe ale creierului) însoțită de îngroșarea ei, iar mai târziu de ruperea unui vas sangvin de două formațiune producând o emoragie. *Cauzele* acestei boale sunt: o febră infecțioasă, reumatismul, o lovitură sau rănire, nebunia. Se vede mai des la copii și la bătrâni. Pachimeningita are 2 perioade. În perioada dela început, care ține mai multe luni, bolnavul are durere de cap, amețeli strâmtarea pupilei, etc. În perioada a doua, când s'a rupt un vas sangvin de nouă formațiune, dacă sângele revărsat este în cantitate mică, bolnavul are un fel de depresiune intelectuală (tâmpeală) progresivă, dacă el este în cantitate mare avem: apoplexie, comă, paralizia unei jumătăți a corpului contracturi și convulziuni în membre; moartea vine după un timp oarecare. *Tratamentul* va consta în combaterea inflamațiunii meningei: lăsări de sânge la ceafă (lipitori, ven-tuze tăiate) sau dintr'o vână dela îndoitura cotului (venesecție), revulzive (muștare), curățenii tari; iodur și bromur de potasiu, preparatele arsenicale; toate fără mare succes, boala fiind aproape întotdeauna incurabilă.

Păclă. — V. *Ceață*.

Păcură. — V. *Gudron*.

Păduche (lat. *pediculus*). — Sunt pă-

duchi pe cap, pe corp și alții în partea de jos a pântecelui, în regiunea pubiană, numiți *păduchi lași*. Boala produsă de păduchi se numește *pediculoză*, sau *ftiriază*. *Păduchii de cap* sunt niște insecte mici cenușii cu 6 picioare terminate prin cârlige și având o gură care poate mușca și suge; femelele sunt mai numeroase decât masculii și ele ouă foarte des, 60 de ouă în 6 zile și 5000 în 2 luni; ouăle lor (lindene) sunt lipite de păr. *Păduchii* aceștia pot da naștere la mai multe boale de piele (impetigo, pitiriază, prurigo). Ei produc slăbiciune și anemie prin suferințele la cari dau naștere. *Păduchii de corp* sunt mai mari, mai albi și mai iuți; se adăpostesc prin încrețiturile rufăriei, la gulerul cămășii, la cingătoare. Dau mâncărime mare care silește pe om să se scarpine mereu producând astfel iritațiunea pielii, formarea de bube, coji, pustule, furnicele, etc. Acestea și cu insomnia produsă de mâncărime strică sănătatea generală. *Păduchii lași* au corpul mai lat decât cei ai capului și nu sunt așa cenușii. Ei stau nemîșcați, înfundându-și capul adânc în pielea dela rădăcina părului de care se prind cu ghiarele lor de dinapoi și din care pricină se smulg cu anevoiță. *Păduchii* sunt capabili să transmită unele boale dela om la om, cum sunt: tifosul exantematic, febra recurentă, etc. Datorită faptului că acești paraziți se găsesc în foarte mare număr în timp de război, când omul nu-și mai poate

îngrijii corpul, am avut epidemiile îngrozitoare de tifos exantematic și febră recurentă, în războiul din 1916—19. Ele ne-au răpit tot atâția ostași câți ne-a omorât glonțul. *Tratamentul* pentru păduchii *capului* : se recomandă să se tun-



Fig. 322. — Păduchi

(1 = de cap ; 2 = lat ; 3 = de corp)

dă părul cât se poate de mic, pentru că odată cu părul să cadă și ouăle prinse de el, apoi se va unge capul cu unt de migdale dulci, cu unt de lemn, sau cu orice grăsime avem la îndemână, cari omoară păduchii asfixiindu-i ; pe urmă se spală capul cu o soluțiune de carbonat de sodă, 10 gr. la 500 gr. apă. Pentru păduchii *corpului*, se recomandă câteva băi de pucioasă, iar rufăria și hainele se vor pune la fum de pucioasă, sau se vor fierbe într'un cazan. Pentru păduchi *lași* se vor face spălături cu sublimat corosiv (1 la 500) sau se va unge locul cu ulei de terbențină, ori cu unguent cinereu (alifie neagră de păduchi). Un bun mijloc de a omorî acești paraziți și ouăle lor, este să ungem regiunile păroase cu petrol amestecat cu un ulei oarecare, pentru ca să nu irite prea mult pielea (e bine să se pună o parte ulei de floarea soarelui și 2 părți petrol). Ungerea se va face 4—5 zile consecutive și în același timp se vor fierbe și rufele ca să nu rămână ouă sau paraziți pe ele. În timpul epidemiei de tifos exantematic e bine să ne ungem tot corpul cu petrol în fiecare dimineață, când plecăm la lucru, căci paraziții nu se vor apropia de corpul nostru, să-l muște.

Păduche de lemn, ploșniță, stelniță.— Sunt niște insecte cari dau un miros urât după ce le-ai strivit ; corpul lor are forma ovalară, puțin mai îngust înainte, marginile sunt subțiri, culoarea roșie închisă, corpul este moale capul puțin pătrat cu o trompă tare și ascuțită, cu care înțepă pielea și suge

sângele. Mirosul se datorește unui lichid conținut într'o glandă. Ploșnițele ouă în luna Mai ; ouăle sunt albe și lunguețe. În timpul zilei ploșnițele stau ascunse prin crepăturile zidurilor, a paturilor, în dosul tablourilor, prin încrețiturile așternutului. Ele pot răbda de foame timp îndelungat, de aceea se găsesc și în case nelocuite de multă vreme. În timpul nopții ies din ascunzătorile lor și se duc spre omul adormit, asupra căruia se lasă și din tavan și îl sug până se satură, după care se duc iarăși la locul lor, contrar de ceea ce fac păduchii și puricii, cari rămân pe om. Înțepătura de stelniță este roșie, puțin umflată și dureroasă, din pricină că în locul înțepăturii rămâne puțină salivă din gura insectei, care este foarte iritantă. Înțepăturile acestea produc mâncărime mare, care de altfel dispare repede punând apă rece curată, sau cu puțin oțet, ori spirt. Pentru stărpirea ploșnițelor se recomandă o curățenie foarte mare,



Fig. 323
Ploșniță

să se ungă cu ulei de terbențină, sau cu o soluțiune tare de acid fenic (10 la 100) sau de sublimat cotoziv (1 la 1000), crăpăturile zidurilor, paturile, sau să se presare peste tot *praf de insecte*, care are la bază piretru (zacherlin). — La țară se întrebuințează o plantă numită *păducherniță* sau *moartea stelnițelor* (*lepidium ruderales*), care nu le omoară ci numai le amețește, așa că dimineța se pot prinde și omorî. Cel mai bun lucru însă este ca gospodina să curețe cât mai des, descoperind astfel cuiburile de ouă și distrugându-le cu apă fiartă, sau petrol, benzină, sublimat sau orice dezinfectant.

Păhare. — V. Ventuză.

Paianjeni, paingăni, păinjeni. — Paianjenii sunt de mai multe feluri : unii trăiesc prin case, șuri, garduri, pomi, unde își țes *pânza*, sau *păinjenisul*, ce le servește să prindă muște și alte insecte cu cari se hrănesc, căci ei sunt carnivori ; alții trăiesc în apă și alții în pământ. Paianjenii au un fel de venin pe care îl inoculează cu ajutorul unui cârlig cu care înțepă

și dacă pielea e fină înțepătura lor poate produce o umflătură mică și roșietică cu mâncărime, care nu este primejdioasă și se vindecă repede, fără nimic, sau cu o spălătură cu apă cu oțet sau cu apă de Colonia. Pânțelele lor cuprind niște glande cari produc un lichid gros și care în atingere cu aerul se întărește și formează un fir, ca de mătăsă, cu care țes pânza, sau casa.

Pălămida. — V. *Holeră*.

Pălăria șerpelui. — V. *Ciuperca*.

Pălărie, clop. — Omul poartă pălărie pentru a-și apăra capul, fața și ceafa de arșița soarelui, de ploaie și de vânt, pentru aceasta pălăria trebuie să fie ușoară și mlădioasă pentru ca să nu strângă capul ca un cerc. Stofa din care este făcută trebuie să fie permeabilă pentru ca să poată pătrunde aerul și nădușala să se poată evapora, usca, iar nu să stea pe loc în atingere cu părul, pe care ținându-l ud în continuu îl slăbește și-l face să cadă. Numai o pălărie care întrunește toate aceste însușiri se poate zice că este bună. Pălăria de păslă este cu mult mai bună, însă cu condiție ca să aibă margini largi și în fund și în păreți să aibă mici găurele prin cari să se facă aerisirea; ea este mlădioasă și ușoară, nu strânge capul și nu face durere de cap. Pălăria de paie, cu marginile largi, este minunată pentru vară. Este foarte folositoare în special muncitorului la câmp, căruia îi apără capul de arșița soarelui. În acest scop ar trebui ca învățătorii să îndemne copiii la la școală să lucreze pălării de pae pentru toți membrii familiei.

Palat. — V. *Cerul gurii*.

Pălitură. — V. *Contuziune*.

Palma. — V. *Mână*.

Paloare (lat. *pallor*), *paliditate*. — Cu loarea feței se schimbă, devine *palidă* din mai multe cauze: o turburare a circulațiunii (hemoragie sau pierdere de sânge, cloro-anemie, cloroză, anemie); • turburare digestivă (indigestie, inaniție din lipsă de mâncare, otrăvire prin tutun); o acțiune nervoasă (emoție, spaimă, epilepsie, isterie). *Tratamentul* constă în combaterea cauzei.

Palpațiune (lat. *palpatio*), pipăire. — Palpația este un procedeu de cercetare de care ne servim când voim să

examinăm o tumoră lichidă sau solidă, sau să atingem o suprafață tare (craniu), sau o suprafață elastică și care se poate întinde, cum ar fi regiunea pântecelui; în toate aceste cazuri, prin pipăire căpătăm cunoștințe hotărâte, precise, pe cari nu le-am putea avea prin celelalte mijloace de cercetare. Pipăind capul, ne putem da seama de diformațiunile lui, de raporturile de dezvoltare a oaselor cari intră în formarea craniului și a feței. Pipăind pieptul, ne dăm seamă de configurația sa și dezvoltarea regulată sau neregulată a pereților lui, precum și de diformațiunile șirii spinării; de diformitățile produse de boalele de inimă și de plămâni, de vibrațiunile toracice și rezonanțele vocale. Pipăind pântecul, putem să știm dacă avem de-a face cu o ascită (dropică) cu o tumoră, sau cu o sarcină; putem să cunoaștem dacă ficatul este umflat și dureros, dacă vreun rinichi este căzut, dacă bășica este plină de ud, etc. În chirurgie, pipăirea ne arată dacă vreun os este rupt, sau dacă s'a adunat puroiu în vreun loc (abces), etc. Palpația combinată cu *percuția* (ciocăniirea) și cu *ascultația* (ascultarea cu urechea lipită de corp) este unul din cele mai bune moduri de cercetare.

Palpitație (lat. *palpitatio*), *bătăi de inimă*. — Dacă punem mâna pe piept în dreptul țâței din stânga, simțim o bătaie. Această bătaie este produsă de *inimă*, care se găsește în piept sub sânul stâng și care se contractă și se dilată pentru a împinge și a primi sângele din corp. Prin această strângere și lărgire inima își schimbă volumul, forma și direcțiunea, ceea ce face ca vârful ei să se apropie de perețele pieptului lovindu-l și să se depărteze imediat, repetând același lucru ziua și noaptea, dela naștere până la moarte. Aceste lovituri alternative sunt *bătăile naturale* ale inimii, care în stare de sănătate se pot număra până la 70—80 pe minut și ele se fac așa de fin, cu putere așa de mică, încât omul nu și le simte de cât dacă pune mâna pe inimă, sau se culcă pe partea stângă. Când însă dintr'o pricină oarecare inima bate mai tare și mai iute ca de obicei, așa că bătaile le simțim fără să punem mâna, atunci zicem că

PALP

avem *palpitații* sau *bătaie de inimă*, sau *bătaie de piept*. Palpitațiile sunt caracterizate nu numai prin aceea că bătaile inimii sunt mai iuți, dar și prin aceea că ele se fac în mod neregulat și câteodată și inegal, că ele sunt mai tari ca de obicei, încât devin supărătoare pentru bolnav. Palpitațiile nu sunt continue decât foarte rar; de obicei ele vin din când în când sub formă de *accese*, cari pot dura, dela câteva minute, până la un sfert de ceas și putându-se repeta de mai multe ori în cursul unei zile. În momentul accesului puterea cu care bate inima este așa de mare, încât se vede pieptul mișcându-se în dreptul ei și dacă punem mâna pe piept, o ridică; bătaile sunt foarte apropiate între ele și așa de iuți, încât nu le putem număra. Ele sunt uneori neregulate, adică o bătaie mai slabă sau mai scurtă, urmată de mai multe bătaii egale ca durată și forță. Afară de acestea bolnavul se află în timpul accesului într-o stare de indispoziție (*se simte rău*) și are un fel de înecăciune, de strângere de piept, el este la față palid, alteori roșu. Palpitațiunile, cele mai adeseori, sunt de natură *nervoasă*, fără ca inima să fie bolnavă. Omul cel mai sănătos din lume poate să aibă palpitații când merge prea repede, când fuge, când urcă un deal, când face vreo efortare mare, sau când a băut prea mult ceaiu, cafele, sau băuturi alcoolice, sau când a fumat prea mult, ori mai mult ca de obicei. Se văd mai des la persoanele cari suferă de nervi (neurastenie), debile și mai cu seamă anemice, căci anemia este una din cele mai mari cauze ale acestor palpitații. Tratamentul lor constă în: depărtarea cauzelor, un regim alimentar apropiat după starea fiecăruia, preparate de fier și de chinchină (tonice), exercițiu în aer liber, gimnastică, idroterapie; în palpitațiile curate nervoase puțin bromur de potasiu, sau sodiu, dat în măsură potrivită, ușurează numai decât bolnavul. — Mai rele, și din fericire mai rare, sunt palpitațiile cari provin dintr-o adevărată boală de inimă. În aceste cazuri, sunt un simptom de multe ori foarte important al boalei de inimă (miocardită, o endocardită cu

PALU

insuficiență valvulară), fie o degenerescență grăsoasă a inimii, fie o boală a aortei (artera cea mai mare a inimii), etc.

Paludism, malaria, friguri palustre. Această boală este produsă prin intrarea în sângele omului a unui *parazit*, descoperit în anul 1880 de către învățatul francez *Laveran*, numit *ematozoarul*, sau *haematozoarul lui Laveran*. E numit astfel fiindcă trăiește în sânge. Se prezintă sub patru forme: 1-a, *corpi sferici* dela 1 până la 10 miimi de milimetru, cari mai târziu poartă niște firisoare cu mișcări repezi; forma a 2-a, *corpi flagelați*; a 3-a *corpi semilunari*, în formă de semilună și mai mici decât a globulelor roșii ale sângelui. Substanța lor este transparentă, incoloră, afară de partea de mijloc, unde se află granulele de pigment negru, identice cu acele din corpurile sferice; a 4-a *corpi în formă de rozetă* sau segmentați, cari corespund fazei de reproducțiune a hematozoarului. Se găsesc în sânge în număr mare, mai ales la începutul accesului de friguri. — Faptul că paludismul este *endemic* în țările mlăștinoase, cum este și țara noastră și unde se găsește *țânțari*, experiența a dovedit că se propagă cu ajutorul acestor *țânțari*. Țânțarii paludismului se numesc *anopheles*. Acești țânțari se deosebesc de obișnuitul țânțar prin aceea că, așezându-se pe zid, își țin corpul perpendicular pe acel zid, iar cei din genul *culex* îl țin aproape paralel cu zidul. Țânțarii toată ziua stau ascunși la umbră, iar seara ies în călduri pentru a se hrăni, bărbații cu nectarul florilor și sucii fructelor, iar femeile cu sângele omului, așa că toată lumea a avut ocazie să simtă cât este de supărătoare înțepătura arzătoare a acestor femeiuști de țânțari. Când femeia a fost fecundată, depune ouăle la suprafața apelor. Din fiecare ou, după două zile iese o mică *larvă*, în formă de vierme, cu capul mare, cu apendice ciliare foarte lungi și cu corpul format din articole prevăzute fiecare cu două buchete laterale de peri; cel din urmă segment are un apendice pentru respirație. Aceste larve trăiesc în bălți și se nutresc cu resturi organice, iar după puțin timp se transformă în *nimfe*,

cari trăiesc tot în apă și cari, după câțva timp, se transformă în *țânțari*. Ies din apă pentru a sbura în aer, dar se reîntorc în urmă pentru a-și depune ouăle la suprafața apei. Pentru ca o larvă să ajungă țânțar, îi trebuie timp de o lună. Dacă un țânțar a mușcat pe un om bolnav de friguri și i-a supt sânge, odată cu acel sânge a luat și *hematozoari*, în număr mai mult sau mai puțin mare; acel țânțar, mușcând un alt om sănătos, îi dă boala, îl infectează. Prin urmare *omul bolnav dă boala țânțarului, iar acesta la rândul lui o dă omului sănătos*, așa



Fig. 324. — Țânțar anofel

că țânțarul joacă rolul de mijlocitor. — Paludismul nu trece deadreptul dela om la om, ci numai prin mijlocirea țânțarului *anofel*. Nimeni nu e scutit de friguri, dar unii sunt mai expuși decât alții; negrii sunt mai rezistenți decât albi. Cauzele debilitante înlesnesc izbucnirea paludismului: oboselile, sărăcia, hrana rea și neîndestulătoare, condițiunile rele de traiu, toate ajută la îmbolnăvire. Mai expuși sunt lucrătorii de pământ, cei ce sapă și desfundă pământul, cei ce lucrează la secarea bălților, etc. Frigurile încep a se ivi cam pe la sfârșitul lui Iunie și bântuie mai cu furie în August, pentru a se sfârși în toamnă; în țările calde, tropicale, frigurile domnesc în tot timpul, ploile și vânturile înlesnesc infecțiunea. Locurile mlăștinoase, băltoase, văile mocirloase și gurile apelor mari (cum este delta Dunării), locurile păduroase și pădurile sunt cele mai bogate în friguri. — *Semne și forme*. Paludismul se arată sub multe forme, pe cari trebuie să le cunoaștem bine. Se întâmplă însă ca aceste forme variate să se combine între ele și să se prezinte tablouri complexe. Vom începe cu *febrele intermitente*, așa zisele și bine cunoscutele *friguri*, cari încetează câte un răstimp de 1—3 zile și mai mult, sunt forma cea mai

tipică și mai curată, mai ales când ematozoarul operează pentru întâia oară în sângele unui om sănătos. Dar aceste friguri adeseori vin la un om care a mai suferit de paludism și care-i poartă urmele în grad mare, la unul



Fig. 325.
Paraziții malariei
(hematozoari paluștri)

cu așa zisa *cachexie palustră* și atunci constituie o stare acută în cursul unei stări cronice. Febra intermitentă se arată sub o formă de *accese*. Accesul de friguri vine cam la aceeași oră în fiecare zi, adică la interval de 24 ceasuri și atunci avem *tipul cotidian* (zilnic), sau la interval de 48 ceasuri (a treia zi) și atunci avem *tipul terț*, sau la interval de 72 ore (a patra zi), *tipul cvart* (febră cvartă), care este cel mai rău, cel mai rebel. Accesele pot uneori să nu vină întocmai la aceeași oră, ci pot să vină cu câteva ceasuri mai iute sau mai târziu; sau frigurile pot să înceapă cu un tip, de pildă cu cel zilnic și să sfârșească cu cel terț. Dela un acces până la celalt, sănătatea pare a fi bună, dar repetându-se accesele prea mult timp, pot să producă o *anemie* adâncă. Pe lângă tipurile mai sus înșirate, mai pot fi friguri de a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a și a 9-a zi (*febră cvintană, sextană, septană, octană și nonană*), cari însă sunt cu mult mai rari. Am spus că febra intermitentă vine prin accese, dar înainte de *perioada accesului* avem câte-odată încă două perioade: una de *incubațiune*, adică aceea care începe cu momentul intrării în sânge a ematozoarului și până la ivirea boalei și care durează dela 6 până la 20 de zile; a doua, de *invazie*, care nu există întotdeauna, căci accesul poate să vie în mod brusc; când există însă, ea se arată prin fiori, indispozițiune, molașală generală, turburări digestive, dureri de cap: a treia perioadă este a *accesului*, care are aceeași formă, aceeași fizionomie, se arată în același mod, oricare ar fi tipul febrei. *Accesul* trece prin trei stări: una de *frig*, care ține

PALU

1—2 ceasuri și în care bolnavul este cuprins de un *fior* prelungit însoțit de o tremură în tot corpul, cu clăntănitul dinților și de apăsare în piept; pielea este rece, mai ales la mâini și la picioare și cu toate acestea termometrul arată până la 40°; altă fază de *căldură*, care ține iarăși 1—2 ore, în care frigul se înlocuiește cu căldură mare, pielea este uscată și arzătoare, fața roșie, setea nepotolită și altă fază de *sudoare*, care ține 2—4 ore, în care omul nădușește mult și temperatura scade încetul cu încetul, pulsul bate mai încet, splina se micșorează și bolnavul are o simțire generală de bine și adoarme. La sfârșitul accesului, temperatura este mai mică decât trebuie (*ipotermie*), dar această stare este trecătoare. De multe ori, la sfârșitul accesului bolnavul se bășică pe buze, *arșită*, la unii se ivește blândă (*urticarie*). Durata totală a accesului variază foarte mult, cea mai scurtă este de 4—8 ore, cea mai lungă poate trece peste 12 ceasuri și în acest caz, cea mai lungă fază a accesului este aceea a *căldurii*. Uneori accesul poate să țină și mai mult, dar adeseori este vorba atunci în cazul tipului cvotidian de *accese subintrante*, al doilea acces putându-se ivi mai înainte ca celdintăiu să se fi terminat. — Am spus că de obicei este numai un acces pe zi, dar sunt cazuri în cari bolnavul poate avea două accese pe zi; aceasta se întâmplă foarte rar. Alteori poate să lipsească o fază, sau întreg accesul să fie numai o încercare de acces, adică să conste numai dintr'o indispoziție generală cu puțină căldură și atunci bănuim frigurile numai prin faptul că ele vin în răstimpuri aproape egale. Mai este o particularitate care trebuie s'o însemnăm: un bolnav are friguri în fiecare zi mai multe zile de rând, apoi câteva zile este pe deplin sănătos, când se pomenește din nou că-1



Fig. 326.
Splenomegalie
paludică

PALU

scutură, însă nu în fiecare zi, ci tot la trei zile odată (febra terță), așa că acelaș bolnav poate pe rând să prezinte mai multe tipuri de febră. — *Febra continuă* nu se deosebește mult de febra *intermitentă*. Bolnavul încearcă mai întâiu un *fior*, ceva mai mic, care poate lipsi; apoi îndată îl cuprinde o durere de cap mare cu durere pe șira spinării, temperatura 40° și uneori și mai mult, pielea caldă și uscată, splina se mărește și este dureroasă, limba urâtă, încărcată, uscată la vârf, lipsă de apetit, are constipație, alteori diaree; câteodată curgeri de sânge din nas. Această stare poate să țină mai multe zile, și bolnavul să aibă agitație, insomnie, uneori aiurare, și adeseori *adinamie* (lipsă de putere), așa că toate acestea împreună cu celelalte simptome ne-ar putea face să credem că avem aface cu o febră tifoidă. Dacă bolnavul nu se caută, poate să moară. Durata acestei febre poate să fie de 7—10 zile. Dacă bolnavul se tratează, febra poate trece în 4—5 zile și bolnavul își revine la starea lui de sănătate repede; trebuie însă să nu uităm că această febră poate recidiva după câteva zile și atunci, sub forma unei febre intermitente. Febra continuă poate să se complice uneori de gălbănare întocmai ca și febra intermitentă. — *Febra pernicioasă* (*friguri rele*), este forma cea mai gravă și mai primejdioasă dintre toate. Accesul pernicios poate să vină dintr'odată, ca primă arătare a infecției, sau să fie sfârșitul unei febre intermitente sau continue. În accesele pernicioase avem uneori o exagerație a unui simptom normal al febrilor palustre obișnuite. — *Anemia și cachexia palustră* vin în general după o serie de accese, dar pot să apară chiar dela început în țările unde se află multe friguri, cum este țara noastră, nu numai



Fig. 327. — Splenomegalie paludică enormă

la adulți, ci și la copii. — *Neuralgii, nevroze și congestiuni palustre.* La unii bolnavi, cari au suferit de friguri sau și la persoane cari n'au avut friguri niciodată, se pot ivi la ceasuri regulate, ca și cum ar fi pentru accese, diferite nevralgii la față, la cap (migrenă), la stomac, la mână, la inimă, sau crize de astmă, de sughiț, tuse spasmodică, diaree sau diferite emoragii. — *Tratament.* Bolnavul cuprins de friguri trebuie tratat cât se poate mai repede, pentru a preîntâmpina accidentele cele mai grave. Specificul malariei este *chinina*, singură în stare să lupte cu accesele acute ale boalei. *Sulfatul de chinină* se întrebuințează de obicei, dar mai tare este *clorhidratul neutru de chinină*, care cuprinde 81% de chinină, pe câtă vreme sulfatul numai 50% pentru aceasta este mai bine să ne servim de clorhidrat. Pentru adult se pot da până la 3 gr. pe zi de sulfat, doză care se dă numai în cazurile grave; pentru cazurile mai ușoare, se va da 1 gr., 1½, 2 gr. (luate în 2 rânduri la interval de câte o oră). Sunt unii oameni cari nu pot lua cu nici un preț chinina, chiar și în doze mici, căci le produce blândă, vâjiituri prea mari de urechi, surzenie, orbire, emoragii ale tubului digestiv, uneori chiar hemoglobinurie. Dela etatea de 1 până la 6 ani se va da sulfatul de chinină, socotit câte 5 ctgr. de fiecare an și dacă nu poate s'o ia pe gură i se va da sub formă de supozitoare, în care caz doza se dublează. Femeile însărcinate trebuie să ia cu multă cruțare chinina și în doze mici, pentru ca să nu le provoace avort; în cazurile grave, pernicioase și ele trebuie tratate în mod energic. Chinina se dă de obicei prin gură în buline, hapuri, sau în soluție. Mai bine este în soluție, căci atunci suntem mai siguri că s'a absorbit. Cel mai bun și mai sigur metod de administrat chinina este prin *injecțiuni subcutanate, intravenoase*. În *febrele intermitente* obișnuite, fără gravitate, este de ajuns să se dea chinina prin gură. Chinina nu trebuie să se dea în momentul sau în timpul accesului, ci trebuie dată înaintea accesului cu 4—6 ore. Dacă însă nu se poate și timpul exact când începe ac-

cesul, vom da chinina în două rânduri: la sfârșitul accesului și după 5—6 ore dela sfârșit. Astfel febra s'a tăiat pentru acea zi, poate și pentru a doua zi sau mai multe zile; dar ea poate să reapară după 6—7 zile, deci vom continua a da chinina în modul următor: În ziua 1-a, a 2-a și a 3-a câte 1 gr. de cloridrat de chinină pe zi; între sfârșitul zilei a 3-a și până la a 8-a nu se va da chinină; a 8-a, a 9-a și a 10-a zi, se va da câte 80 ctgr.; dela a 10-a până la a 14-a zi, nimic; a 15-a și a 16-a zi, câte 80 ctgr.; între a 16-a și 20-a zi, nimic; a 21-a și a 22-a zi, câte 80 ctgr. de chinină. În febra intermitentă terță și cvartă este mai ușor: se va da chinina cu 5 ceasuri înaintea accesului. În *febrele continue* vom recurge la injecțiuni sub piele: 2 injecțiuni pe zi, de câte 1 gr. fiecare; după ce s'au tăiat frigurile, se va continua tratamentul cu chinină ca pentru febrele intermitente. În *febrele pernicioase*, oricare ar fi forma, vom introduce sub piele doze mari de chinină: 2 și chiar 3 injecțiuni repetate, în locuri diferite, introducând până la 3 gr. de cloridrat de chinină în 2 ore, obținând astfel de multe ori rezultate bune în 15—30 minute. Nu trebuie să ne mărginim numai la chinină în aceste forme pernicioase. Alături de chinină *neosalvarsanul*, dat în injecții, este de mare folos în combaterea paludismului. *Tratamentul convalescenței* trebuie instituit cu îngrijire în vederea anemiei și a deselor recăderi (întoarceri) și recidive (reîntoarceri). Hrana trebuie să fie bună, întăritoare; bolnavul să se odihnească. Să se dea medicamente tonice: *fier, nuca vomică, arsenic.* — *Tratament preventiv.* Să ne depărtăm de bălți, de locuri mlăștinoase, de ape, de malul mării, în timp de epidemii; să nu se iese la plimbare seara, nici dimineața în țările unde sunt friguri; Pe vremea frigurilor cei amenințați sau predispuși să ia cafea neagră și chinină în fiecare zi, câte 25 ctgr-acea de eucalipt și decoctiune de lămâie (o lămâie tăiată în bucăți și fiartă în 3 cești de apă până scade la o ceașcă). Fiindcă hematozoarul frigurilor intră în corp *prin înșepături*

de *țânțari*, trebuie să-i atacăm pe aceștia, să-i nimicim, să facem ceea ce se cheamă : *însănătoșirea localităților palustre*. Pentru acest scop se recomandă uscarea tuturor apelor stătătoare în cari se desvoltă *țânțarii*. În jurul orașelor și satelor să nu fie gropi cari să se umplă cu apă de ploaie, sau să li se facă o scurgere ; să se cultive cu îngrijire pământul, să se facă plantațiuni de eucalipt și de brad, cari dau rezultate bune înleznind uscarea solului fără să împiedece circulația aerului, nici razele soarelui. Când apele stagnante nu pot fi suprimate din cauza utilității lor, sau când scurgerea lor ar fi prea costisitoare, se vor lua măsuri pentru *micșorarea țânțarilor* și în special a larvelor lor, cari trăiesc pe suprafața apelor. Pentru acest scop se recomandă să se toarne în mai multe locuri *uleiu cu petrol*, care se întinde pe toată suprafața apei și omoară prin asfixie larvele, înăbușindu-le. — La *țară* poporul numește *friguri* toate boalele cari încep cu frig, dar mai cu seamă accesele paludismului. El deosebește friguri de 2 zile și de 3 zile. Cauzele frigurilor sunt, după el, verdețurile, dormitul la soare primăvara, mâncarea castraveților verzi, a harbuzilor (pepenilor verzi), etc. Pentru a scăpa de friguri unii se scaldă în apă rece când îi apucă fiorii ; alții beau vin mult cu pelin ; alții iau albuș de ou bătut în rachi, după care umblă mult ; alții beau zeamă de potroacă. Babele vindecă frigurile cu : broască râioasă, țestoasă, albuș de ou de găină, liliac, muscă de cal, etc.

Păltinele. — V. Coacăză.

Panarițiu, sugel, sugiu. — Aprinderea sau inflamația părților moi dela vârful degetelor, care de obicei se termină prin puroiu abundent. *Cauzele* panarițiului sunt : o lovitură, o sgărietură, o tăietură și de cele mai multe ori o înțepătură, mai ales cu un instrument murdar, cum ar fi un ac ruginit, un cuțit de bucătărie nespălat, sau o bucătică de lemn, o țeapă, etc. cu cari s'a introdus otrava (germenele septic) sub piele. Infecțiunea se poate face și mai târziu prin acea plagă (în mod secundar). Sugiul începe prin-

tr'o durere vie, continuă, la vârful degetului, și din când în când cu svâcnituri de nesuferit, apoi arsuri și înjunghieturi prin deget, cari nu lasă bolnavului nici un minut de odihnă, de somn nici vorbă. Pielea începe să se înroșească, să se învinețească, iar degetul să se umfle din ce în ce mai mult ; bolnavul are căldură, sete mare, gură rea și lipsă de poftă de mâncare. În formele grave, pe lângă aceste semne, inflamațiunea se întinde la părțile adânci, la tendoane până la os, pe cari le distruge, așa că orice mișcare a degetului este cu neputință, la cei ce sufar de diabet, sau de rinichi (albuminurie) precum și la cei slăbiți de alte boale, sugiul este foarte grav putându-se complica de gangrenă. —

Tratament. În formele ușoare, când sugiul este superficial, se recomandă băi calde antiseptice (cu acid fenic, creolină, sau cu sublimat corosiv), pansamente umede (Priesnitz), tăierea beșicei cu puroiu, iar în formele grave, panarițiu profund, se va face o tăietură (inciziune) adâncă, până la os, din vreme (a 2-a sau a 3-a zi), fără să așteptăm să se facă puroi, căci prin tăietură durerea se micșorează și umflătura scade repede. După tăiere se vor face băi calde cu apă oxigenată, urmate de pansamente umede. Dacă facem tăierea din vreme se evită complicațiunile cari sunt foarte grave. Când întreg degetul este mâncat de puroiu, tendoanele și oasele necrozate, încheieturile copleșite de puroiu, nu ne rămâne decât să tăiem degetul cu totul. — La *țară* sugiul se mai numește și *păr la deget*, care, după descripția populară, este o bubă foarte dureroasă și ține foarte mult ; Pentru vindecarea acestei boale babele pun la deget frunză de nalbă unsă cu scuiat, sau fac legătură cu ceapă albă amestecată cu tămâie pisată, busuioc și frunză de calapăr, sau pun turtă cu unt de lemn.

Pancreas. — Este o glandă alipită de intestinul subțire (duodenul), așezată înapoia stomacului. Pancreasul secretă *sucul pancreatic* care se varsă în maț și transformă materiile amidonate în zahăr, albuminoidele în peptonă și grăsimile le emulsionează, adică le

subțiază pentru a putea fi absorbite (vezi *Digestiune*).

Pancreatină. — V. *Opoterapie*.

Pânea pădurii. — V. *Ciupercei* (Râșcovi).

Pâne (lat *panis*). — Cel mai de căpetenie product alimentar al omului este pânea care se face din *făina* unor cereale, amestecată cu apă caldă, apoi lăsată să dospească și pe urmă pusă în cuptor la coacere. Pânea pregătită în acest fel este o hrană plăcută, potrivită cu stomacul nostru, care o mistuie ușor fără nici o turburare și este compusă din principii hrănitoare ca un aliment complet. Partea cea mai hrănitoare a pâinii este coaja de oarece ea are mai mult azot; o sută de părți de pâne se compun din 77½ părți de miez și numai din 22½ de coajă. Compoziția pâinii este următoarea: miezul are la 100 părți: apă 44.45; substanțe azotate 6.67; hidrocarbonate 47.34; grăsime 0.70; săruri 0.84; coaja are: apă 17.15; substanțe azotate 13; hidrocarbonate 67.46; grăsime 1.18; săruri 1.21; iar compoziția totală a pâinii este: apă 38.30; substanțe azotate (gluten și albumină) 8.10; hidrocarbonat 51.88; grăsime 0.81; săruri 0.91. Este o credință că pânea neagră este mai hrănitoare decât cea albă, ceeace nu este adevărat, căci după analiză s'a constatat că pânea albă cuprinde substanțe azotate și hidrocarbonate în cantitate mai mare decât cea neagră. Pentru ca o pâne să fie bună, trebuie să aibă următoarele însușiri: să fie bine crescută, adică să aibă ochiuri mari în toate părțile ei; să aibă un miros plăcut special al ei; miezul să fie moale și elastic, adică după ce a fost strâns între degete să-și reia forma de mai înainte, să nu fie lipicios; coaja să fie tare și galben-aurie, sonoră și lipită peste tot de miez. Pânea este rea când are un miros fad sau de mucegai, când culoarea ei este negricioasă, sau nu este deopotrivă peste tot; când miezul se turtește prin apăsare și nu se umflă din nou, fiind fără elasticitate, fără pori și se lipește, când coaja este moale, albă sau neagră, arsă și nelipită de miez. Pânea obișnuită se face cu făină de grâu fiindcă ea conține mai mult gluten, (v. acest cuvânt

și *Cereale*), care este partea cea mai hrănitoare și care face să crească mai mult aluatul. Pânea care se face din făină cernută cu sita rară și cuprinde o parte din țărâte, este și mai hrănitoare, căci țărătele conțin și ele principii hrănitoare și afară de aceasta ele ajută mistuirea pâinii și combat constipația obișnuită. Pânea caldă cade greu la stomac, fiindcă miezul este prea îndesat; pânea prea tare iarăși nu se mistuie bine deoarece coaja nu se mestecă în gură în deajuns; pânea veche nu numai că nu este bună, dar este chiar primejdioasă fiindcă se mucegăște, adică se dezvoltă în ea niște ciupercuțe otrăvicioase cari pot da naștere la diferite accidente. Dar deși pânea este foarte hrănitoare, totuși omul nu s'ar putea hrăni numai cu ea, pentru că în acest caz el ar trebui să mănânce cantități prea mari, ceeace ar obosi repede stomacul. Persoanele cari sufăr de dispepsie (mistuire grea) precum și cei cu urdinare trebuie să mănânce foarte puțină pâne; pentru toți aceștia se recomandă pânea prăjită care se mistue mai ușor. De asemenea bolnavii de obezitate (grăsime prea multă), precum și diabeticii trebuie să mănânce foarte puțină și acești din urmă numai pâne de gluten (v. *Gluten*). Cei ce sufăr de constipație obișnuită ar face bine să mănânce pâne de secară, sau pâne de țărâte, preparată în jumătate cu făină și cu țărâte. Pânea azimă (dela grec. *a*, fără, și *zyme*, drojdie) se prepară fără drojdi, din care cauză ea nu crește și n'are găurele; ea este o pâne nedospită și servește la facerea foilor de *hostie*, cu care se fac bulinele pentru a se lua medicamentele amare, cum este chinina, etc. (vezi *Azimă*).

Panglică. — V. *Viermi intestinali* (*Tenia*).

Pânișoare. — V. *Ciupercei* (Bureții de mesteacăn).

Pannus. — V. *Ochiu* (*Cherită*).

Panoftalmie. — Supurația globului ocular, datorită unui abces al vitrosului. Se observă oridecâteori se produce printr'un traumatism, pătrunderea microbilor în interiorul ochiului; acolo găsește vitrosul, un bun mediu de cultură și abcesul se produce foarte

repede. Consecința este pierderea completă a globului ocular.

Pansament. — Prin cuvântul *pansament* se înțelege *legarea unei răni*, punând asupra ei un medicament care să-i înleznească vindecarea și ocrotind-o de a veni în atingere cu aerul, de lovături, de frecături, de praf, precum și de microbii din afară. La facerea unui pansament trebuie să avem în vedere unele reguli: rânitul să fie pus pe pat și într-o cameră a cărei temperatură să fie de 16—18 grade; el va fi dezbrăcat și pus într-o poziție potrivită care să nu-l obosească; înainte de a începe pansamentul trebuie să avem tot ce ne trebuie la îndemână; toate piesele de pansament, medicamentele cari se pun pe rană, irigatorul, apă caldă, apă rece, lighian, tăvițe, etc.; mâinile să ne fie spălate, dezinfectate, iar piesele de pansament și instrumentele sterilizate; vom umbla încet, ușor și cu băgare de seamă ca să nu producem dureri bolnavului, vom îngriji ca să nu fie expus bolnavul la curenți de aer, la răceală. — Dacă bolnavul are vreun membru lovit, sau rupt, vom pune acel membru în poziția cea mai puțin dureroasă, vom înconjura membrul cu perine și perinuțe, sau cu cearșafuri ori șerveturi făcute sul pentru a-l ține în nemișcare, oprind astfel capetele osului să se poată mișca. Dacă membrul rupt trebuie mișcat din loc, pus în altă poziție, îl vom pune între două scândurele îmbrăcate în vată și pânză și le vom strânge potrivit în jurul lui cu ajutorul unui colțar sau al unei feși; dacă ruptura osului este însoțită de rană vom îngriji mai întâiu rana, ca să nu se infecteze, făcându-i un pansament antiseptic. — La desfacerea unui pansament vechiu vom umbla încet ridicând piesele pe rând și dacă sunt lipite de rană le vom uda cu o soluție caldă antiseptică, să înleznim dezlipirea lor; rana vom curăți-o cu îngrijire cu ajutorul unor tampoane muiate în soluțiuni antiseptice calde și cu pensa așa zisă de pansament, fără să frecăm rana, ci numai atingând-o ușor și apăsând foarte încet până se curăță de puroiu, de sânge, de murdării; împrejurimile răni trebuie de asemenea bine cură-

țite de toate murdăriile ce se găsesc uneori uscate sub formă de cruste, de coji, pentru care vom spăla pielea cu săpun și cu apă caldă, apoi cu o soluție antiseptică; după ce va fi bine curățită rana și împrejurimile vom aplica pansamentul cuvenit. Pansamentele sunt mai de multe feluri și anume: 1. *Pansamente aglutinative*, cari se pun când rana (înțepătura sau tăietura) este regulată, netedă, superficială și marginile ei pot fi apropiate în mod exact fără să lase nici un gol, sau când în adâncimea ei nu se vede nici o infundătură sau mâncătură; în toate aceste cazuri pansamentul se face cu colodiu, diachilon (talion), sau o tafta de Englitera; toate aceste substanțe, încălzite puțin, se lipesc așa de bine de buzele răni încât nu mai trebuie legate cu feși și stau aplicate mai multe zile fără să fie trebuință de a le schimba și până ce rana se vindecă de desuptul lor. 2. *Pansamentele antiseptice*, cari sunt de 2 feluri: *uscate* și *umede*. *Pansamentele uscate* se întrebuintează mai mult decât toate celelalte; ele se aplică pe rănila proaspete cari nu supurează de loc sau foarte puțin, pe rănila operatorie numite *aseptice*. Aceste pansamente se fac astfel: după ce s'a spălat și curățit bine rana cu împrejurimile ei se presară asupra ei un praf antiseptic (*dermatol*, *aristol*, *xeroform*, *iodoform*, *ortoform*, etc.), se pune un strat de tifon sterilizat uscat, apoi un strat gros de vată idrofilă sterilizată; iar pe deasupra se aplică un bandaj sau o fașă strânsă potrivit. Pansamentele acestea se primesc la 2 zile odată, uneori și mai rar, când nu există supurație, cum se întâmplă în plăgile operatorie, unde aplicăm un strat foarte gros de vată și pe întindere mare în jurul răni, așa că aceste pansamente se ridică la 8 zile când rana este prinsă, iar așa cu care s'a cusut plaga se scoate și bolnavul este pe deplin vindecat. *Pansamentele umede* sunt și ele de 2 feluri: *deschise* și *închise*. Cele *deschise* se întrebuintează pentru rănila infectate, cari supurează mult și la rănila mari. Aceste pansamente constau în aplicarea pe rană a unor comprese (cârpe) muiate într-o soluție antiseptică, comprese cari se

schimbă foarte des, din 10 în 10 minute sau din jumătate în jumătate de ceas. Uneori pansamentul umed deschis începe într'o baie locală antiseptică, punând membrul rănit într'o baie potrivită, care durează un timp mai îndelungat, până la un ceas și mai bine; soluțiunea antiseptică este bine să fie cât poate suferi bolnavul de caldă, iar după scoaterea din baie se vor aplica asupra rănii comprese muiate în aceeași soluție antiseptică. Soluțiunile antiseptice pot fi făcute cu *sublimat coroziv* (1 la 10.000), *acid fenic* (1 la 1000), sau *creolină* (5 la 1000), etc. *Pansamentele umede închise* se fac pentru un timp de 24 ore. Ele se fac astfel: se curăță bine rana și împrejurimile ei cu apă caldă și cu săpun, apoi cu o soluție antiseptică, se acopere rana cu o compresă de tifon idrofil îndoit de mai multe ori după ce mai întâiu a fost muiată într'o soluțiune antiseptică (de *sublimat coroziv*, 1 la 2000; de *acid fenic* 1 la 100; de *lízol*, $\frac{1}{2}$ la 100; de *creolină*, 2 la 100, etc.) și stoarsă bine, pe deasupra se pune o foaie de gutapercă, ce împiedecă uscarea compresei, iar peste aceasta fașa. Pansamentele închise se fac la plăgile cari supurează mult și trebuie să stea mereu într'o umezeală caldă potrivită.

3. *Pansamente aseptice*. Acestea se fac fără să se întrebuințeze vreun medicament antiseptic, nici la spălarea rănilor, nici la legarea lor. Spălarea rănilor se face numai cu apă fiartă sterilizată, sau cu apă sărată, iar pe deasupra lor se pune numai un strat gros de tifon sterilizat la etuvă și un strat de vată idrofilă de asemenea sterilizată, apoi feși de tifon sterilizat.

4. *Pansamente cu vată după metoda lui Guérin*. Aceste pansamente se aplică atât la plăgile chirurgicale cât și la cele ordinare cu scopul ca aerul stricat, încărcat cu germeni infecțioși, să nu vină în atingere cu rana și să fie absorbiți de ea dând naștere la accidente grave de infecțiune purulentă. Metoda de pansament a lui Guérin se bazează pe proprietatea ce o are vata de a filtra aerul oprind și fixând microbii și sporii lor pe fibrele ei superficiale, așa că la rană ajunge numai aer curat, sterilizat, fără nici un ger-

mene infecțios. Un pansament rău făcut produce durere și atunci trebuie făcut din nou. Dar chiar când este făcut bine el trebuie revizuit la fiecare 2—3 zile și dacă se slăbește se vor pune alte straturi de vată și alte feși peste pansamentul vechiu, strângându-l bine. Lichidele secretate de rană formează în vata de lângă rană un fel de clei, care face să se lipească straturile de vată de pielea din jurul rănii rezultând astfel o ocluziune perfectă, încât aerul nu ajunge la rană decât filtrat bine apoi straturile cele groase de vată. Pansamentul stă pe loc mult timp fără să miroase urât.

Panseluțe de câmp. — V. Micșunea.

Pantaloni, nădragi, șalvari. — Prin aceste numiri se înțelege îmbrăcămintea membrilor inferioare ale omului. Pentru orașeni avem numai cuvântul de *pantaloni*, pe câtă vreme celelalte numiri ne arată îmbrăcămintea țaranului român. *Pantalonii* trebuie să fie făcuți din postav mai mult sau mai puțin gros, după anotimp, în timp de vară cât se poate de subțire, iar pe vremea de iarnă cât se poate mai gros. Pantalonii se poartă deasupra *ismenelor* cari se primenesc cât se poate de des. Obiceiul de a purta pantalonii fără ismene este foarte rău, căci ei se îmbăcesc de nădușală și de murdărie fără ca să se poată spăla. Pantalonii nu trebuie să fie prea strânși la încingătoare pentru ca pânțele să fie liber și mistuirea să se facă cu înlesnire, mai ales că multe dureri de stomac și de intestine provin din cauza cingătorii. Pentru a evita toate acestea este mai bine ca omul să poarte *pachești* sau *bretele*, decât să se strângă cu o curea sau cu un brâu. *Îțarii și cioarecii*, sau *bernevicii* sunt purtați de țaran peste ismene, sau fără ismene. Aceste haine se fac din lână țăsută în două ițe pentru *îțari* și în patru ițe pentru *cioareci*, cari sunt mai groși și se poartă iarna. Croiala *îțarilor* și *cioarecilor* este strâmtă, mai ales în partea de sus, din care pricină mișcările nu sunt destul de libere; ei sunt legați pe mijlocul soldului cu ajutorul unei curele. Cusurul *îțarilor* și *cioarecilor* este tocmai acesta, de a fi prea strâmți, pe câtă vreme stofa lor este destul de bună, moale și căl-

duroasă. Locuitorii dela deal poartă o îmbrăcăminte care după formă se poate numi *pantaloni*, a căror croială este mai rațională și se apropie de a orășenilor. Cea mai bună îmbrăcăminte pentru membrele inferioare sunt *pantalonii* a căror croială este cea mai rațională, cea mai bună și mai potrivită cu trebuințele corpului; ei acopăr bine jumătatea de jos a corpului, păstrându-i forma naturală și lăsându-i toată libertatea în mișcări și puțința de a se îmbrăca și desbrăca cu ușurință. Țăranii nu poartă bretele ei își fixează îmbrăcăminte la părții de jos a corpului cu o betelie sau cu o curea și fiindcă ei aleargă mult și se mișcă neconținut în munca lor sunt siliți să se strângă prea tare, ceea ce nu este sănătos.

Pânteco. — V. *Abdomen*.

Pânticărle. — V. *Diaree*.

Pânticărle cu sânge. — V. *Dizenterie*.

Pantofi. — V. *Încălțăminte*.

Pantopon (gr. *pan*, tot și *opós*, suc). — Este un preparat care conține toți alcaloizii *opiului* sub formă de cloridrate. Pantoponul este foarte solubil și ușor de întrebuintat în injecțiuni sub piele. El lucrează ca analgezic, ipnotic, sedativ general, calmant al tusei și antidiareic, reprezentând acțiunea totală a *opiului* sub o formă neiritantă. Doză: 6 până la 10 ctgr. pe zi, într'o porțiune de 200 din care se va da la fiecare 2 ore câte o lingură; sau în prafuri, ori comprimate de câte un centigram. Pentru injecțiuni subcutanate se recomandă soluțiunea de 0,02 gr. pe 1 cmc. injectată toată deodată. Se poate repeta de 5 ori în 24 ore.

Pantostat. — Un aparat care poate transforma un curent electric și să-l facă folositor sub diferite forme. Curentul trecut prin pantostat poate folosi la cauterizări (galvanocauterizări), la endoscopii, faradizări etc.

Papă, colarez. — Este un fel de mâncare ce se dă la copiii mici și se prepară de obicei cu lapte sau cu apă, în care, pe când fierbe, se amestecă o făină sau o feculă, punând uneori și puțin zahăr. Papa se face mai adeseori cu făină de grâu, dar se poate face și cu făină de ovăz, care pare a fi mai bună, căci prin fierbere nu

se face așa cleioasă ca cea de grâu; se mai face cu feculă de cartofi, cu *arrow-root* (v. acest cuvânt). Această papă este ușor de mistuit și cei săraci o dau la copii de multeori în loc de lapte.

Păpădie, papalungă, părăsita găinilor. (*Taraxacum officinale*, fam. compozitelor). — Plantă mică erbacee care crește prin fânețe, pășuni, locuri cultivate și pustii, grădini, dărâmături și pe lângă locuințe. Rădăcinile și frunzele tinere se întrebuintează în bucătărie ca salată (sănătoasă și răcoritoare). În medicină se întrebuintează rădăcinile și frunzele ca tonic, aperitiv, colagog, diuretic și ușor laxativ. Se dă sub formă de decoct (fierură). — La țară se crede că păpădia curăță sau *preînoiește sângele* pentru care se dă sub formă de decoct; în contra *frigurilor* se dă ciaiul de frunze, iar în contra *curgerii de sânge* ceaiul de rădăcină. Pe dinafară se întrebuintează zeama de frunze verzi pisate, care se pune la *buba neagră*; pe locurile cu *reumatism* se pune frunză de brusture după ce s'a întins pe ea rădăcină de păpădie pisată bine și prăjită în smântână proaspătă care după 24 de ceasuri se schimbă; la *beșica cea rea* și la *beșica cea vântată* se leagă o frunză de păpădie.

Papaină. — Pulbere amorfă, albă, care se scoate din suc al arborelui *Papaya carica*, solubilă în apă. Papaina este eupeptică (ușurează masticarea) din care cauză se dă în dispepsia ipocloridrică, în doză de 10—30 ctgr. în buline, sau în sirop.

Păpălău, cireșa evreilor, gogoase, iarba bubei, păpălăi, (*Physalis Alkekengi*, fam. solanaceelor). — Plantă erbacee care crește prin păduri, tufișuri, vii și pe lângă garduri și drumuri (Iunie—Iulie) și al cărei fruct este o boabă roșie de mărimea unei cireșe, închisă în caliciul roșu, umflat ca un balon. Poporul nostru întrebuintează această plantă pentru a vindeca buba și durerea de măsele. În medicină se întrebuintă



Fig. 328
Păpălău

țează pentru proprietățile ei diuretice și febrifuge. Principiul activ : *Fisalina*. Se dă : *extract* 4—6 gr. ; *praf* 5—20 gr. : *vin* 15—50 gr. ca diuretic, 60—100 gr. ca febrifug. Pe dinafară în spălături, oblojeli, injecțiuni calmante 60—100 gr. la un litru apă.

Papalungă. — V. *Păpădie*.

Paparoane. — V. *Mac roșu*.

Papaverină. — V. *Opiu*.

Papele. — V. *Păpălu*.

Paprică. — V. *Ardeiu*.

Papuci. — V. *Incălțăminte*.

Papule (lat. *papula*). — Ridicături mici pe piele a căror mărime variază dela aceea a unui bob de mei până la aceea a unui bob de linte, cari nu cuprind la interior nici un fel de lichid. Papulele sunt roșietice, uneori livide sau negre; ele pot fi ascuțite (acuminate), late, conice, semi-sferice; se văd în diferite boale de piele.

Păpușoiu. — V. *Porumb*.

Părul. — Părul este o anexă a pielii, ca și unghiile. Fire de păr se găsesc răspândite pe toată suprafața corpului, sunt mai numeroase, însă, pe cap, în axilă, regiunea pubiană și pe buza superioară (la bărbați). Atenție deosebită merită părul de pe cap, fiind o adevărată podoabă a omului, mai ales la femei. Privit la microscop firul de păr seamănă cu un tub cilindric, în interiorul căruia se găsește măduva firului de păr. Firul de păr trăiește și moare, fiind înlocuit cu alt fir, crescut din aceeași rădăcină permanentă. Crește cam 1 cm. pe săptămână. Numărul firelor de pe cap este în medie de aproximativ 100.000, ceea ce înseamnă că având în vedere durata vieții lor, în fiecare zi cad în mod normal cam 50 de fire moarte; peste această cifră, căderea trebuie să ne dea de gândit. Vorbind de igiena părului, celebrul dermatolog francez R. Sabouraud spune că „din toată mașina omenească puține organe sunt așa de maltratate, ca părul”. Cu drept cuvânt majoritatea oamenilor nu-și îngrijesc părul potrivit cu preceptele igienice. Printre mijloacele folosite pentru *îngrijirea igienică* a părului, locul principal îl ocupă *apa* și *săpunul*. Bărbatul cu părul normal se va spăla din 2—2 săptămâni. Femeia se va spăla mai rar. În genere părul gras

se spală mai des, decât părul uscat. Abuzul de săpun e dăunător pentru păr, ca și abuzul de apă. Rău fac cei care își udă părul cu apă, în fiecare zi, pentru a se așeza firele; în scopul acesta e preferabilă o plasă pentru păr. — Pentru igiena zilnică, peria și pieptenele ne fac servicii suficiente. În unele cazuri săpunul poate fi înlocuit cu gălbenuș de ou, folosit după ce se amestecă bine cu apă, până obținem o soluție de gălbenuș, deajuns de diluată. La două gălbenușuri e nevoie de aproximativ 500 gr. apă. — Săpunul mai poate fi înlocuit cu decoctie de lemn de Panama preparată astfel: luăm 50 gr. lemn de Panama, îl fierbem la un litru de apă până scade la două treimi, strecurăm, lăsăm să se răcească, apoi fricționăm pielea capului cu tampoane îmbibate până se face spumă, apoi clătim în 2—3 ape. Pentru părul femeilor se găsesc în comerț diferite preparate, numite *shampoouri* (citește: șampon); aceste preparate sunt compuse de obicei din săpun pulverizat amestecat cu borax, carbonat de potasiu, amoniac și alte substanțe similare. Abuzul de shampooon atacă firul fragil și moale. — După spălat părul se „clătește” cu apă, în care punem puțin oțet, cam două linguri la un litru de apă. — E de prisos să mai spunem că *peria de cap* și *pieptenele* sunt articole de toaletă strict individuale, care nu se dau și nu se cer împrumut, deoarece prin ele se pot transmite boli de păr greu de vindecat sau chiar incurabile. *Apele de păr* sunt substanțe folosite în același scop, adică să curețe părul și pielea capului. Cele mai multe reclame de ape de păr pretind că fac să crească părul căzut definitiv și să prevină chelia. E la mintea omului că bolile de păr nu se pot trata și vindeca cu medicamente uniforme, standardizate, fiecare caz de boală avându-și cauzele și remediile proprii. — *Părul* prea *uscat* dela natură trebuie ferit de prea mult spălat; acest păr are nevoie, dinpotrivă să fie uns din când în când cu câteva picături de ulei de păr sau *briliantină*, cum se numește în termeni farmaceutici. Cele mai bune *brilantini* se prepară din ulei de ricină și alcool. Sunt și brilian-

PĂRU

tine solide. — Uscăciunea sau grăsimea exagerată a părului sunt adevărate boli de păr, care trebuie tratate. Părul gras, ca și tenul gras, rezultă dintr'o stare seboreică a pielii. Seboreea se manifestă printr'o secreție exagerată de sebum, substanță secretată de glandele sebacee din piele. Starea seboreică este caracterizată prin mătreață, pori dilatați, puncte negre, păr gras, coșuri. Seboreea localizată pe pielea păroasă a capului face să cadă părul. Căderea părului se numește în medicină *alopecie*; alopecia duce la *chelie* (*calviție*). — *Mătreața* apare pela 9—10 ani. Cojile de mătreață la vârsta aceasta sunt cele dintâi semne ale cheliei, de mai târziu, mătreața nu evoluează însă întotdeauna înspre chelie. De foarte multe ori rămâne sub forma aceasta mulți ani, cojile ei devenind din ce în ce mai grase, până ajung să nu se mai deslipească de pe pielea pe care se formează. În faza aceasta pielea capului este acoperită încontinuu cu un strat de grăsime murdară, rezultată din aceste coji grase. Apa și săpunul, ca și apele alcoolice ne fac servicii bune în această fază a mătreații, pentru a cărei combatere se prescriu diferite medicamente, cu efect sigur. Mătreața trebuie tratată cât mai de timpuriu, pentru a evita o parte din neajunsurile estetice ale cheliei de mai târziu. — Se întâlnesc adesea femei cari, alarmate de căderea părului, se tem să nu ajungă la chelie. La femei părul se poate rări foarte mult, într'adevăr, în unele cazuri, dar chelia localizată sub forma cunoscută la bărbați este o boală exclusivă a acestora; femeile n'au niciun motiv să se teamă de o astfel de chelie, dar nu sunt scutite de rărirea părului, datorită unor boli neglijate, dintre care amintim bolile infecțioase, inclusiv sifilisul, și diferite intoxicații acute și cronice.

Estetica părului. — Considerându-l ca o podoabă naturală, omul a căutat întotdeauna să dea părului o înfățișare cât mai atrăgătoare. În scopul acesta se piaptănă în cele mai variate moduri, sau i se schimbă culoarea, voit, în toate nuanțele posibile. O preocupare deosebită este lupta contra încăruntării. Trebuie să spunem că încăruntirea nu poate fi împiedecată, decât

PĂR

în măsura, în care putem influența cauzele ei indirecte, adică necazurile permanente și stările nervoase continue, care de foarte multe ori fac să albească părul. Cine socotește că părul cârunt îl dezavantajează, poate recurge la tincturi, cu condiția să controleze compoziția lor, pentru a evita eventualele intoxicații. Cine vrea să-și vopsească părul e bine ca mai înainte să-și aducă aminte, că natura a stabilit o armonie între culoarea naturală a părului și coloritul pielii. *Tincturile de păr* strică, de multe ori, această armonie, și creează un contrast care dezavantajează persoana vopsită. Din fericire armonia poate fi restabilită revenind la culoarea naturală; transformarea e posibilă, deoarece tincturile inclusiv decolorarea cu apă oxigenată — nu atacă rădăcina. — Cele mai răspândite tincturi de origine vegetală sunt *henné* și *indigo*. *Henné*-ul este praf rezultat din măcinarea frunzelor uscate ale unui arbust exotic iar *indigo*-ul este o materie colorantă extrasă din diferite plante leguminoase, care cresc în regiunile tropicale. Vopsitul părului are o tehnică destul de complicată pentru care e nevoie de îndrumările amănunțite ale cârților de specialitate. — În ceea ce privește coafura e bine să se știe că orice manoperă, care tinde să dea părului o ondulație forțată, mai mult sau mai puțin permanentă, recurge la căldură ridicată, iar această căldură usucă firul până îl omoară. Părul ondulat este un păr lipsit de viață. Din fericire rădăcina își păstrează vitalitatea și în acest caz, astfel încât firele continuă să crească în mod normal, partea arsă eliminându-se cu timpul pentru a face loc altui păr sănătos, amenințat poate, de aceleași primejdii trecătoare, impuse de considerațiuni estetice. Detalii mai multe se pot găsi în *Igiena și estetica părului* de Dr. A. Voina.

Păr fals. — Astăzi *peruca* nu se mai vede decât pe scenele teatrelor și în străinătate o mai poartă, în anumite împrejurări, oamenii unor bresle, cum sunt advocații în Anglia cari nu pot pleda fără perucă și primarul Londrei, care nu poate eși în haine de mare paradă decât cu perucă, etc. *Peruca* este folosită pentru oamenii cari

sunt cu totul pleșuvi și cari, din această pricină, sunt foarte expuși să răcească la cap, să capete guturai, diferite nevralgii. etc.

Păr la deget. — V. *Panarițiu*.

Pară. — Este fructul arborelui spinos cunoscut sub numele de *păr, gorț* (*Pirus communis* din familia rozaceelor), care crește în stare sălbatică prin păduri și câmpuri. Părul s'a cultivat din timpurile cele mai vechi și a dat naștere la numeroase varietăți și subvarietăți cultivate prin grădini sub diferite numiri: pere arăpești, bergamute, boești, crăești, faraoane, etc. Perele sălbatice sau pădurețe servesc la fabricarea *vinului de pere* și ele nu sunt bune de mâncat. Perele cultivate sunt fructele cele mai gustoase și mai bune de mâncat și fiindcă varietățile cele multe de pere au diferite epoci de coacere, omul poate mânca pere dela începutul verii și până la mijlocul iernii. Sucul lor dulce și puțin acidulat în același timp, precum și parfumul lor variat le fac să fie tolerate cu înlesnire aproape de toate stomacurile. Nu trebuie să abuzăm de pere, ca și de ori care alt fruct, căci ne pot face și rău. — La *țară*, babele fierb o baniță de pere sălbatice și zeama o dau s'o bea, în fiecare zi câte un păhăruș înainte de masă, cei ce suferă de *rac* (cancer), iar la copiii slabi le fac băi de frunze de păr și frunze de salce cari cad singure din copac.

Paracenteză (gr. *para*, prin, și *ken-tein*, a înțepa). — Este o mică operație care constă în a înțepa (a *da cep*) o cavitate printr'un instrument special (un trocar sau un ac găunoșit) pentru a scoate apa care se găsește adunată acolo. Avem: *paracenteza abdominală* (a pântecelui) care se face în cazurile de ascită (când este apă în pân-tece); *paracenteza pericardului* pentru a scoate apa din cămașa inimii; *paracenteza toracelui* pentru a scoate apa din piept, dela plăpâmi, etc.

Parchernită, grăul potârnicii, (Parietaria officinalis, fam. urticaceelor). — Plantă erbacee care crește prin locuri umbrase și umede, pe lângă ziduri, prin ruine și prin păduri. Conține o cantitate mare de nitrat de potasă, care o face să fie *diuretică* (să facă urină mult) și pentru care se întrebuin-

tează în boalele de beșica udului (catar), în nisip (gravelă) și ori de câte ori urina este turbure și puțină. Se dă sub formă de ceai (infuziune) din 50 la 1000, sau se dă sucul plantei, 30—60 gr.

Parafimoză (dela *para*, schimbare, și *phimos*, eu strâng). — Este o complicație adeseori primejdioasă a *fimozei* (vezi acest cuvânt). Ea se observă mai cu seamă în cazurile de fimoză incompletă, când prepuțul este încă destul de larg ca să permită glandului de a eși în parte. În momentul erecțiunii, glandul care este umflat și întins străbate orificiul prepuțial, care, ca un guler, vine și strânge penisul (varga) înapoia glandului și acesta nu se mai poate desumfla; aceasta se numește *parafimoză*. Îndată ce se produce parafimoza trebuie redusă, adică trebuie să împingem glandul la locul lui, fie cu mâna, fie cu ajutorul unei mici tăieturi, pe care o facem asupra gulerului care îl strânge, căci, dacă nu o facem îndată, glandul se umflă și mai tare și poate să se gangreneze. Pentru ca să reducem parafimoza vom prinde membrul în mâna stângă, iar cu dreapta vom frământa glandul până ce se mai desumflă, apoi îl vom infunda cu degetul mare în fundul inelului format de degetele mâinii stângi. Dacă nu isbutim prin aceasta să reducem parafimoza după ce am încercat de mai multe ori, doctorul face o mică tăietură cu bisturiul asupra inelului care strânge introducând pe sub inel o sondă canelată și reducerea se va face cu înlesnire.

Parafină, ceară minerală. — Reziduu solid al distilațiunii uleiurilor grele de petrol. Se topește la 41—65°. Se întrebuințează în injecțiuni sub piele sau interstițiale, ca protetic pentru a îndrepta unele diformități ale nasului ale urechilor, etc., dar ea poate produce unele accidente (tromboză embolie). În farmacie se întrebuințează pentru a mări consistența supozitoarelor.

Paraform, triformol, trioximetilen. — Pulbere albă, insolubilă în apă. Se întrebuințează ca antiseptic intestinal puternic, în doză de 50 ctgr. până la 1 gr. și jumătate la adult și 25—27 centigrame la copil, în colera noastră, în buline sau într'o po-

PARA

țiune gumoasă. Pe dinafară să întrebuințeze ca antiparazitar în unele boale de piele (pitiriază, etc.) sub formă de colodiu.

Paraldehidă. — Lichid incolor neutru, cu miros eterat special, gust arzător. Se dă ca ipnotic (producător de somn) în doză de 2—4 gr. dintr'odată, într'o porțiune.

Paralizie (grec. *paralysis*, dela *paralyein*, a slăbi, a muia), *slăbănogie*. — Prin cuvântul *paralizie* se înțelege înțetarea contracțiunilor mușchilor și prin urmare pierderea mișcării, neputința de a se mișca. Paralizia *sensibilității* (a simțirii) se numește *anestezie*; ea însoțește de obicei paralizia mișcării, dar se poate întâmpla și din contră, ca ea să fie înlocuită printr'o sensibilitate prea mare, numită *ipe-restezie*. Adeseori paralizia este urmată de o înțepenire a mușchilor (*contractură*) și de slăbirea sau topirea mușchilor (*atrofie*). În aceste împrejurări se pot produce și *crampe* dureroase. O paralizie *incompletă*, adică în grad mic, se numește *parezie*. — Paralizia se poate produce sau în urma unei turburări în aparatul motor central al creierului, adică în părțile în cari fenomenele voluntare se transformă în excitațiuni motrice (ațățări de mișcare), sau prin nimicirea conductibilității căilor nervoase motrice. Din aceasta rezultă trei forme de paralizie: *cerebrală*, *spinală* și *periferică*, după cum și turburările se produc în creier, în *măduva spinării*, sau în *nervii periferici*. Mersul boalei atârână, bine înțeles, de sediul leziunii; o paralizie produsă prin *înmoierea* creierului este cu mult mai gravă decât aceea care rezultă dintr'o tăiere a unui nerv periferic. — **Cauzele** paraliziei sunt multe și variate. Când paralizia vine în mod pe neașteptate și este *completă* și *totală*, adică cu pierderea mișcărilor feței și a tuturor membrilor, atunci avem a face cu forma cea mai gravă, cu un *atac de apoplexie fulgerătoare*. Când paralizia este *subită* și *completă* dar mărginită la o jumătate a corpului (*emiplegie*, dambla), ea este produsă de o *congestiune cerebrală* (îngrămădire de sânge într'o parte a creierului), sau de o *emoragie cerebrală* (revărsare de sânge într'o parte a creierului). Para-

PARA

lizia prin *congestiune* este forma cea mai ușoară, care trece în câteva ceasuri, sau în 2—3 zile, pe câtă vreme cea produsă de *emoragie* poate dura mai multe luni. Când paralizia ocupă o *jumătate de corp*, fără ca să fie *completă* și *subită*, ci se stabilește pe încetul treptat, fiind precedată de o slăbire în mișcări și mai ales când se ivește la bătrânețe, atunci ea este produsă, mai mult decât probabil printr'o *înmoiere de creier*, formă foarte gravă, incurabilă. Când paralizia ocupă *jumătatea de jos a corpului* (*paraplegie*, ologeală), ea este produsă printr'o leziune a măduvii spinării. Dacă paralizia aceasta vine repede și se însoțește de pierderea involuntară a urinii (udului) sau de oprirea ei, precum și de pierderea materiilor fecale (paralizia mălului șezutului), atunci cauza poate fi o fractură (ruptură) a sirii spinării: dacă aceste simptome însă se dezvoltă încet și puțin câte puțin, cauza este o inflamație (aprinde) sau o altă boală a măduvii spinării. Paraliziiile pot fi produse de o alterațiune sau stricare a sângelui și a vaselor sangvine (*embolie* sau *tromboză*, *aterom* și *aneurism* al vaselor), de o leziune a țesutului nervos al creierului, sau al măduvii spinării, de răceală, reumatism, ataxie, diabet, difterie, gută, isterie, sifilis, o tumoră oarecare uremie, de otrăvire prin alcool, etc. — **Tratament.** O paralizie, ori care ar fi cauza și forma ei, se vindecă cu greutate și printr'un tratament îndelungat, din care pricină se cere o răbdare de fier, atât din partea bolnavului cât și din partea doctorului. Înainte de a începe un tratament trebuie să cunoaștem cauza paraliziei, căutând s'o îndepărtăm dacă se poate.

Paralizie agitantă, boala lui Parkinson. — Această boală se arată de obicei după etatea de 40 ani și are trei semne de căpetenie: tremurare, înțepenire și mai târziu un fel de paralizie. Tremurarea începe cu mâinile; toate degetele, afară de cel mare, fiind reunite și alungite ca și cum ar ține un condeiu de scris, tremură de odată în timp ce degetul mare alunecă asupra lor ca și cum ar fărâma pâne; pumnul se îndoește și se întinde în mod alternativ, tot astfel

și picioarele cu degetele lor. La unii le tremură și fălcile, limba și pleoapele. Prin voință tremurarea se micșorează, iar în timpul somnului înțețează. **Înțepenirea** (rigiditatea) mușchilor face ca bolnavul să aibă o atitudine specială în care trunchiul este aplecat înainte, gâtul este întins și apul dat puțin înapoi; privirea este fixă, ochii se mișcă foarte puțin; iar pentru ca să privească în lături bolnavul se întoarce cu tot corpul; trăsăturile feței sunt contractate astfel încât dau bolnavului o mască specială, de uimire amestecată cu neliniște și neîncredere, iar fruntea este încrețită, partea de jos a feței este fără expresiune și atonă, mersul este încet, cu pași mici, fără ca bolnavul să privească pământul pe care calcă. **Paralizia** vine târziu și în mod incomplet.—Boala lui Parkinson se desfășoară încet și în mod progresiv. Înțepenirea, sau tremurătura, începe printr-o mână, câștigă brațul, piciorul din aceea parte, întinzându-se apoi la cealaltă parte. Această boală poate dura mulți ani (10—30), fără a compromite viața; bolnavul însă devine din ce în ce mai infirm (neputincios); el sfârșește prin a sta în pat sau pe un fotoliu și moartea vine prin cachexie, sau prin vreo boală intercurrentă.—**Tratament.** Această boală n'are leac, iar medicamentele se dau numai pentru a mai ușura suferințele bolnavului și în special tremurătura și înțepenirea mușchilor. Pentru tremurătură se dă *hiosciamina amorfă*, *iodur de sodiu*, *bromidratul de hioscină* în soluțiune de apă clorofornată, *bromidratul de scopolamină*, *sulfatul de duboizină*, *sulfatul de sparteină*, etc. De altminteralea, având în vedere lungimea boalei și toxicitatea medicamentelor, întrebuintarea lor va fi variată și întreruptă adeseori, mărginindu-se mai mult la *tratamentul psihic* (moral), nelăsând bolnavul în uitare și retras, îngrijindu-l cu atențiune, interesându-ne de el, întreținându-l cu evenimentele zilei, căutându-i distracțiuni potrivite cu starea lui încurajându-l mereu, oprindu-i-se alcoolul, cafeaua și ceaiul, cari măresc tremurarea. Va face din când în când băi calde, sau călduțe, însoțite de mișcări pasive, de gimnas-

tică suedeză, de mecanoterapie, fricțiuni și masaj, baie electrică statică de 15—20 minute, galvanizațiune slabă a mușchilor (10—20 miliamperi). Afară de tremurătură și înțepenire se va combate și cachexia (slăbirea) prin tonice, aerațiune, insomnia prin trional, sau veronal, arterioscleroza prin iodur de sodiu, starea de melancolie prin sugestione și încurajare.

Paralizie facială. — V. *Față*.

Paralizie generală. — V. *Creer*.

Paralizie infantilă. — V. *Măduva spinării*.

Paralizie saturnină. — V. *Plumb*.

Paralizie spinală. — V. *Măduva spinării*.

Paraplegie (gr. *para*, defect, și *plassein*, a isbi), *oloeală*. V. *Paralisie*. — **Părăsita găinilor.** — V. *Păpădie*.

Paraziți. — Se numesc astfel animalele și vegetalele care trăiesc și pe corpul, sau în corpul omului și pe socoteala lui. Unii paraziți se ivesc pe corp și se înmulțesc din cauza murdăriei în care trăiește omul, din care pricină ei se adăpostesc numai în casele săracilor. Intre paraziții din regnul animal avem: *purecii*, *păduchii*, *ploșnițele*, *răia*, *trichina*, *viermii intestinali* (v. aceste cuvinte), iar între paraziții din regnul vegetal avem: *mărgăritărelul* și *chelia* sau *tinea* (v. aceste cuvinte).

Paraziticide. — Se numesc astfel substanțele cari nimicesc paraziții, cum sunt: *creozotul*, *acidul fenic*, *gaiacolul*, *naftolul*, *puccioasa*, *mercurul*, etc.

Paregorie (Elixir). — V. *Elixir și Opiu*.

Parezie (gr. *parezis*, repaus). — Paralizie incompletă, sau care se vindecă repede prin medicamente.

Parfumuri. — V. *Odorat*.

Parkinson (Boala lui). — V. *Paralizie agitată*.

Pârleală. — V. *Insolațiune și Pelagră*.

Parotidă. — V. *Salivă și Urechion*.

Parotidită epidemică. — V. *Urechion*.

Pârjuică. — V. *Diaree*.

Părucă sau perucă. — V. *Păr fals*.

Părul ciutei. — Caută *Nerprun*.

Părul Maicii Domnului. — V. *Strașnic*.

Păsări de casă, hoare, orătenii. — Carnea de pui și de găină este bună pentru toate stomacurile, dar mai ales pentru cele delicate și ale convales-

centților. Dintre pasările de casă nu toate au carnea deopotrivă de ușor de mistuit, astfel în această privință avem în primul rând *găina*, apoi vine *curca*, *rața* cea mai grea carne de mistuit este cea de găscă. Carnea de pasăre se prepară în mai multe forme, dar cea mai plăcută formă este *frip-tura*; sub această formă este și mai ușor de mistuit.

Păsat. — *Porumb.*

Paslune (lat. *passio*, grec. *pathos*), *patimă*. — Se zice că tot omul trebuie să aibă cel puțin una și fericit este omul care nu este stăpânit de nici o patimă. Și cu drept cuvânt, căci orice pasiune este o *agitație* permanentă, încordată, fixă, a sufletului, cum este *amorul*, *gelozia*, *ura*, sau este o *aplicare* violentă, imperioasă, irezistibilă, pentru un obiect oarecare sau pentru o acțiune, cum este *patima beției*, *a jocului de cărți*, *a fumatului*, etc. Pasiunile au asupra sănătății o influență cât se poate de rea, primejdioasă chiar, căci pe de o parte ele țin mintea omului, și prin urmare sistemul lui nervos întreg, într-o stare de încordare, care poate să-l ducă până la aiurare (delir) și nebunie, însoțite de agitațiune și care în cele din urmă produce o sleire nervoasă, putând da naștere la o adevărată boală de creier (demență, tâmpeală), sau de măduva spinării (paralizie); iar pe de altă parte pasiunile turbură cu timpul funcțiunile organelor de căpetenie ale existenței din cauză că ideea fixă, în care își ține mintea, împiedecă pe om de a se mai gândi la celelalte trebuințe ale corpului, sau fiindcă satisfacerea pasiunilor îl silește la acte cu totul contrarii cerințelor igienice. Știind toate acestea fiecare om să se ferească de patimi, iar dacă a fost acaparat de vreo patimă că caute să se desrobească pe cât se poate de iute de ea, prin *voință* și *hotărâre*.

Pastă. — Pastele sunt formate din zahăr, din gumă arabică și o soluție medicamentoasă, toate fierte la un loc câțva timp, apoi lăsate să se evaporeze până se obține o masă destul de tare, ca să-și poată păstra forma ce i-se dă. Pastele sunt sau transparente și turnate în forme (tipare), sau opace prin adăugirea unui albuș

de ou. Pastele cele mai întrebuițate sunt cele făcute cu lichen (mușchi de munte), cu lemn dulce, cu nalbă mare și cu fructe așa zise pectorale. Toate aceste paste calmează tusa mai ales că ele conțin mai întotdeauna și câte puțin extract de opiu, din care pricină nu trebuie să le întrebuițăm în măsură mare. — Mai sunt și altfel de *paste* cari se întrebuițează pe *dinafară*, cum sunt acelea cari se recomandă în boalele de piele și cari sunt făcute cu oxid de zinc, carbonat de calce, subnitrat de bismut, talc, amidon, etc. Acestor paste li se adaugă uneori medicamente active cum este acidul salicilic, etc. Efectul lor diferă cu totul de acela al alifiilor, căci ele descongesează, sau jupuiesc de piele regiunea pe care se aplică.

Paste alimentare. — Aceste paste se prepară din făină de grâu de calitate bună, turnate în diferite forme și uscate. Ele au diferite forme: unele sunt ca grăunțele, de diferite mărimi (*trahana*, *freacăței*), altele ca firele (*fidea*) și altele groase ca șiretul (*macaroane*), etc. Ele se mănâncă în supă, în lapte, cu brânză, în diferite feluri de mâncare; sunt foarte hrănitoare și ușor de mistuit; bune pentru orice stomac, pentru convalescenți, pentru cei slabi cari vroesc să se îngrășe.

Pasteur. — Este numele învățatului francez care a descoperit microbii și a dovedit, cu probe care nu mai puteau fi puse la îndoială, că ei sunt cauzele diferitelor boli. Acest învățat a făcut poate cel mai mare bine omenirii, căci de la descoperirea microbilor medicii, prin cercetări necontenite, au găsit mijloacele să-i omoare, fie prin sterilizare, fie prin diferite seruri și numai așa ne putem azi păzi de cele mai multe boli. Pasteur s'a născut la 27 Decembrie 1822 și a murit la 28 Septembrie 1895.

Pastile. — Medicamente uscate și solide, compuse din zahăr simplu, sau aromatizat, dintr'un mucilagiu de gumă și dintr'o substanță medicamentoasă. Pastilele se sug sau se înghit. Pastilele de *clorat de potasă* sunt bune pentru a potoli inflamațiunile gurii și ale gâtului; pastilele de *ipecă* sau de *chermes* ușurează scuiparea; pastilele de *pucioasă* și de *tolu* împuținează scu-

patul, cele de *mentă*, *Vichy* ușurează mistuirea.

Pastramă. — *V. Conserve Alimentare.*

Păstrav, păstrav de nuc. — *V. Ciuperci.*

Păsule. — *V. Fasole.*

Pat. — Cea mai importantă mobilă în casa omului este patul, care poate fi de lemn, de fier, de bronz după gustul și mai ales după punga fiecăruia. Patul de lemn, nu este așa de bun ca cel de metal, fiindcă lemnul oferă paraziților un adăpost mai bun decât metalul; apoi lemnul, fiind mai plin decât vergelele de metal, împiedică aerul de a circula. Așternutul patului se compune mai întâi dintr'un plan orizontal format sau dintr'un *mindir*, sau *străjac* umplut cu paie, sau dintr'o *somieră* elastică, făcută din resorturi de sârmă și păr de cal. Aceasta este mai bună fiind mai mlădioasă și putându-se ține mai curată și unde insectele nu pot să se adăpostească așa de bine. Dacă însă omul n'are decât *mindir* de pae, trebuie să le primenească des. Deasupra *mindirului* sau a *somierei* se pune *salteaua* sau *mădrafă*. De obicei se pune numai una, dar se pot pune și două, cu condițiune să nu fie așternutul prea ridicat. Saltelele sunt umplute cu lână care este moale și plăcută corpului, dar are cusurul de a trage umezeala, gazele, miasmele, etc. din odaie și după 2 sau 3 ani se îndeasă și devine mai grea. Pentru aceasta este bine ca salteaua să se bată și să se dăraască (scarmene) în fiecare an și tot la 3 ani să se dezinfec-teze prin vapori de pucioasă sau etuvă (*v. Dezinfecțiune*). — Mai bine se păstrează părul, dar el este mai aspru, pentru care de multeori se amestecă cu lână. Saltelele umplute cu pene nu sunt bune căci aduc căldură multă și fac ca omul să asude mult. Peste saltele se așterne un *cearșaf* sau *prostire*, tot cu cearșaful se îmbracă *învelitoarea* (*plapomă, oghial*). Lucrul de căpetenie este ca aceste cearșafuri să fie cât se poate de curate și să se primenească pe cât se poate de des. Învelitoarea servește pentru a ține corpul nostru într'o temperatură potrivită întocmai după cum o fac hainele în timpul zilei. Ea poate fi de lână sau de bumbac

și grosimea ei trebuie potrivită după anotimp; nu este bine să ne acoperim mai gros decât trebuie, căci am asuda prea mult și am putea să răcim când ne sculăm. În timpul verii este de ajuns să ne acoperim numai cu un cearșaf, având grije a pune la picioare o învelitoare mai groasă. În unele locuri se obișnuiește a se acoperi în timpul iernii cu o perină mare umplută cu puf ceeace nu este bine să se facă decât numai în nopțile prea friguroase. Omul trebuie să doarmă cu capul ceva mai ridicat de aceea are trebuință de *perne*. Ele se umplu cu păr, cu pleavă de ovăz sau cu pene; cele mai bune sunt cele cu păr, căci ele nu încălzesc capul așa de mult ca cele cu puf. O regulă igienică este ca tot așternutul să se scoată în fiecare zi la aer liber, pentru ca să se scuture de miazme. Pentru bolnavi patul trebuie să fie și mai îngrijit decât pentru cei sănătoși. În anumite cazuri și când mijloacele o permit, pentru bolnavi sunt paturi speciale, între cari vom aminti: *patul mecanic* făcut astfel ca să se poată ridica pe chingi bolnavul, fără ca el să se miște și în timpul acela se poate primi așternutul, iar dacă bolnavul are vreo rană de desupt să se poată face pansamentul; *patul ortopedic* compus dintr'o *somieră* elastică, sau dintr'o saltea umplută cu păr, orizontal, sau ceva mai ridicat la cap decât la picioare. — *Patul idrostatic* nu este altceva decât o saltea compusă din două pături de cauciuc vulcanizat, în care încap vreo 25 litri de apă; în mijlocul saltelei se află o deschizătură (gaură) pe unde bolnavul își poate face trebuințele fără să se miște. Patul copilului mic se chiamă *leagăn* (*v. Leagăn*). — *Patul țăranului român* este tot ce poate fi mai simplu și mai neigienic. El este făcut de scânduri. În pat se așterne o rogojină și peste aceasta o scoartă, sau o foiță, adică o țesătură subțire de lână, care ține loc de cearșaf. La cei săraci nu se găsește pe pat nimic afară de un țol de cânepă. În fundul patului se găsesc două perini cu paie, sau foi de porumb. La țărani chiburi se mai vede și câte o saltea (*mindir*) de lână; mulți se mulțumesc cu o saltea de paie. Din aceasta se poate

PAȚA

vedea că patul țăranului este mai mult de trudă decât de odihnă.

Pațachină. — V. *Nerprun* și *Roibă*.

Pațașca. — V. *Targă*.

Pătălgică de dalac. — V. *Lăsnicior*.

Pătălagină, limba oiei, plătagină, plă-tangină (*Plantago major*, fam. plantagineelor).

— Plantă mică erbacee care crește pe drumuri, pe marginea câmpurilor, prin fânețe umede și locuri cultivate până în marginea subalpină.

În medicină se întrebuințează numai apă distilată făcută din planta înflorită, ca colir astringent, pe câtă vreme la țară ea se bucură de mare trecere, căci cu ea se vindecă tăieturile, rănilile, umflăturile, cari se oblojesă cu frunze de pătălagină opărite, unse cu puțin unt proaspăt, cu smântână sau cu



Fig. 329
Pătălagină

scurpat. După ce a spart buboiul se leagă tot cu frunze, sub cuvânt că ele trag materia ce se formează. Brânca se tratează cu cataplasme fierbinți făcute cu frunze, apoi cu aburii de pătălagină; iar umflăturile de încheieturi de natură reumatică se tratează cu băi calde și cataplasme. Ceaiul de foi îndulcit cu catel este bun pentru tusa, răgușeală și tusa măgărească; iar zeama de pătălagină se dă copiilor pentru limbrici și pentru oprirea udului.

Patogenle (gr. *pathos*, bolă și *genesis*, naștere). — Este partea medicinei care se ocupă cu împrejurările cari dau naștere la o boală.

Patologie (gr. *pathos*, boală, și *logos* tratat). — Este partea medicinei care se ocupă cu descrierea boalelor. Patologia internă, sau medicală, se ocupă cu boalele din interiorul corpului și se tratează prin medicamente și în patologie externă sau chirurgicală, care se ocupă cu boalele de dinafară sau și de cele interne, cari trebuie tratate prin operație. Când un organ este bolnav zicem că el este în stare patologică, spre deosebire de starea normală (sănătoasă).

Pătrunjel, petrânjel, machedon. (*Petroselinum sativum* sau *Apium petroselinum* fam. umbeliferelor). — Plantă

PECI

erbacee care se cultivă foarte mult pentru gătitul mâncărilor și care nu trebuie confundată cu *pătrânjelul câinelui* (cucută mică, pătrunjică), o plantă foarte veninoasă care crește prin dărâmături, pe lângă garduri, numită în botanică *Aethusa Cybapium* tot din fam. umbeliferelor. Principiul activ al pătrunjelului este *apiolul* (v. acest cuvânt). În medicină se întrebuințează *rădăcina* ca excitant, aperitiv, sub formă de infuziune (ceaiul) din 15—20 gr. la 1000; *frunzele* ca rezolutiv și stimulent, sub formă de pulbere (praf), 2 gr., sirop 2—3 lingurițe pe zi; *fructele* cari sunt carminative; se dă sucul, 100—120 gr. Pe dinafară se întrebuințează cataplasmele în cazurile de lovitură și de înțepături de insecte. — La țară pătrunjelul este bine cunoscut ca *diuretic* și babele îl dau ca să pornească udul în cazurile de *dropică* (boală de apă) și când se apropie udul (retențiune urinară); ele fierb înădușit într'o oală nouă cu două ocă și jumătate de apă 6 până, la 10 rădăcini de pătrunjel tăiate mărunt, după ce a fiert și a scăzut apa de o jumătate de ocă, să făcăluiește pătrunjelul cu făină de in, se întinde pe un petic și se pune pe pânțec, iar zeama se bea. Să mai dă pătrunjelul fiert cu chimen, sau cu boabe de ienuper. Pătrunjelul fiert în lapte se bea pentru *scursură*. Pentru *durerea dela period* (soroc) se bea ceaiul de pătrunjel, iar pentru *frânt* se fierbe rădăcina tocată cu frunze de pătrunjel, zeama se bea, iar tocătura se pune la buric. Rădăcina de pătrunjel fiartă formează o beutură depurativă (curățitoare de sânge). Se bea primăvara; unii fac cură câte 2—3 luni. Când se umflă *testiculele* (orchită) se pune pătrunjel tocat fiert și prăjit cu untdelemn. Pentru *surpare* (ernie) se fierb 6—10 rădăcini cu vin alb, ori cu borș, se scurge buruiana cu care se leagă la buric, iar zeama o bea bolnavul. *Gălcile* se oblojesă cu pătrunjel fiert cu lapte dulce amestecat cu albuș de ou și cu camfor pisat. Când șezutul se întoarce pe dos se pune rădăcină pisată în oțet încălzit.

Pătrunjelul câinelui. — V. *Pătrunjel*.

Pecingine. — V. *Tinea*.

Pecingine rea. — V. *Pelagră*.

Pectoral (Sirop). — V. *Opiu*.

Pectorale (Preparațiuni). — Sunt medicamente cari se întrebuințează în contra guturailui și a boalelor de piept Potolesc tusa și înleznesc scuipearea. Preparațiunile pectorale sunt sub formă de ceaiu, decoct, paste sau siropuri. Se fac din *flori*, sau din *frunze* și din *fructe*. *Florile pectorale* sunt: acele de nalbă, de podbal, de mac roșu, de toporăși și vioarele sălbatice, de lumânare, de parpian, etc. *Speciile pectorale* sunt *frunzele* uscate de strașnic, de isop, de silnic, de iarba șarpelui și ventriliacă. Din flori sau din frunze se face ceaiu (infuzie) din 10 gr. la un litru apă. *Fructele pectorale* sunt curmalele, smochinele, stafidele, din cari se face decoct din 50 gr. la un litru de apă.

Pectorillocvie (lat. *pectus*, piept, și *loqui*, a vorbi), *voce cavernoasă*. — Se înțelege o rezonanță particulară a vocii, a tusei, a ralurilor, care se face într'un loc anumit al regiunii toracice, corespunzător cu existența unei caverne, cum se poate vedea tuberculoză (ofitică), în gangrena plămânului și în dilatațiunile (lărgirile) bronhiilor. Pectorillocvia se mai poate observa și în cazurile de exudate pleuretice foarte abundente, fără ca să fie vreo cavitate în plămâni.

Pediculoză. — *Păduche*.

Pedicur. — Cel ce îngrește sau taie *bătăturile*. Este bine ca înainte de a ne încredința bătăturile unui astfel de specialist să ne informăm de știința și practica lui, căci nu trebuie să ne expunem la *rănire* și la *infecție*, cari pot avea urmări triste.

Pedicuță, *brădișor*, *chedicuță*, *cornișor*, (*Lycopodium clavatum*, fam. lycopodiaceelor). — Mică plantă erbacee care crește în păduri și prin pășuni umede și pietroase din regiunea muntoasă. Praful galben format de sporiile acestei plante se întrebuințează în sgârieturile pielei, iar farmaciștii îl pun în cutiile cu pilule pentru ca ele să nu se lipească unele de altele. Acest praf la *fară* se numește *praful strigoilor*, cu care babele vrăjesc ca să ia laptele dela vaci, iar cu fiertura făcută cu acest praf spală câinii plini de râie.

Pediluv (lat. *pediluvum*, dela *pes*, picior, și *luere*, a spăla). — Se numește astfel orice *baie de picioare*. *Baia rece*

se întrebuințează pentru a opri dezvoltarea unei inflamațiuni (aprinderi) în urma unei scrintiri, sucituri de picior, a unei arsuri, etc. *Baia caldă* este bună după un umblet mult, după un marș militar. *Baia caldă și foarte caldă* se întrebuințează pentru a trage sângele spre partea din jos a corpului (când întârzie de a veni periodul, sau când sângele se îngrămădește la creeri ori la plămâni, *congestie cerebrală* sau *pulmonară*, în cazurile de guturailu, etc.). Picioarele trebuie să intre în apă cel puțin până în sus de glezne. Când facem baie foarte caldă, vom pune picioarele în apă caldă și pe urmă vom turna altă apă mai caldă. *Băile de picioare cu muștar* se fac numai cu apă caldă și nu vor ține mai mult de un sfert de oră. *Băile cu sare*, cu *oțet* se fac punând în apă doi pumni de sare, o lingură de oțet. (V. *Băi*).

Peladă, *chelie fără bube*. — Este o boală contagioasă caracterizată prin căderea părului în plăci, sau arii rotunde, fără să se schimbe culoarea pielii, fără bube, fără scâmoșare și care se arată mai cu seamă la cap și la barbă. Ea poate rămâne localizată numai într'o parte a corpului, sau se poate întinde la tot părul de pe corp. Această boală se arată mai mult la copii și la oamenii tineri, dar se poate vedea și la bătrâni. *Semnele*. Pelada începe adeseori prin mâncărime ușoară. Părul devine uscat, subțire, prăfos și se smulge ușor, apoi cade de odată, sau pe încetul, pe diferite întinderi sub formă de plăci rotunde (rotogoale), dela mărimea unui ban până la acea a unei piese de 2 lei, sau chiar de 5 lei, uneori și mai mare; adeseori aceste plăci se reuneșc între ele formând insule de chelie mai mult sau mai puțin mari, ale căror margini ne arată că sunt mai multe plăci unite. Pielea lipsită de păr este netedă, lucie, de culoare albă lăptoasă. Perii din jurul plăcii nu sunt sănătoși, se rup și se jumulesc cu înleznire. Când



Fig. 330. — Peladă

pelada s'a întins peste tot, bolnavul se pare că este cu capul ras. Când pelada se întinde peste tot corpul, bolnavul slăbește, n'are poftă de mâncare, nu mistue bine și devine anemic.

Această boală, dacă este căutată bine se vindecă și părul crește cum a fost. — *Tratamentul.* Fiindcă boala se poate lua și la alții este bine ca bolnavul să trăiască izolat; copiii de școală atinși de peladă să fie opriți acasă. Se cunosc multe mijloace de tratament, pe care nu le amintim, ci recomandăm

celor atinși de boală să se arate unui medic specialist, întrucât ei singuri nu vor putea să le aplice.

Pelagră jupuială, leprică, părleală, pecingine rea. — Una din boalele cari bântue populațiunea noastră rurală este *pelagra*. În anul 1937 au fost în România 89.000 de pelagroși la sate, față de 45.000 în 1930, deci în creștere. Județele cele mai bântuite sunt: Roman, Dâmbovița, Covurlui, Botoșani, Buzău, Dorohoi, Neamț, Râmnicul-Sărat, Prahova, Argeș, Muscel, Ilfov și Vlașca;

etc. Nu este mai nici un județ care să nu-și aibă pelagroșii săi. Afară de România pelagra mai bântuie Italia, Spania, Franța, Portugalia, Grecia, Bulgaria și Serbia, dar nicăiri în măsură așa de mare ca la noi. — După o părere mai nouă boala ar fi pricinuită de lipsa de *vitamine* din alimentația celor bolnavi. Un porumb stricat, consumat de oameni a căror alimentație este lipsită de *vitamine*, poate declanșa boala cu ușurință. Sărăcia, ignoranța și alcoolismul se pot considera numai ca condițiuni favorabile pentru izbucnirea pelagrei, întrucât populațiunea rurală nu are mijloace materiale, nici nu se pricepe a-și procura



Fig. 331
Căderea părului
după peladă



Fig. 332
Pelagră (aspectul
unei mâni)

porumb bun pentru hrană, nici să ia măsuri ca să împiedece stricarea porumbului, chiar când el ar fi de calitate bună; alcoolismul slăbește organismul și îl face mai puțin rezistent și prin urmare mai predispus la boală. — Otrăvirea cu porumb stricat se face încetul cu încetul, zilnic și atâta timp cât omul se hrănește cu mămăligă rea fără alte alimente hrănitoare, așa că pelagra și după ce s'a ivit continuă a fi întreținută și agravată dacă bolnavul nu-și schimbă hrana. Otrava se îngâmădește în organism, turbură și strică nutrițiunea organelor din ce în ce mai mult și boala, odată declarată va fi continuă ca și hrănirea otrăvitoare. Boala dispăre dacă bolnavul încetează pentru totdeauna de a se hrăni cu porumb. Otrăvirea pelagrosă crește, sau scade, după creșterea sau descreșterea otrăvei luate zilnic. Pelagra începe prin slăbirea puterilor, lăncezeală, greutate la muncă tristea, amețeli, văjuituri de urechi,



Fig. 333 — Pelagră (aspectul
figurii și al mânilor)

dureri în șira spinării și lipsă de somn, uscăciune de gură și de gât, arsuri la stomac și uneori urdinare. Spre primăvară bolnavul simte în palme și la tălpi o căldură, iar pe dosul mânilor și picioarelor o mâncărime, pielea începe a se înroși, a se umfla, a se acoperi de beșici mai mari și mai mici, pline cu o zeamă galbenă, cari crapă și din apa aceea se formează în atingere cu aerul niște coji galbene și murdare, pe alocurea pielea după ce s'a înroșit se usucă, crapă și se jupuiește

(*pârleală, eritem*). Această pârleală se arată nu numai pe mâni și picioare, ci pe toate părțile descoperite, atinse de arșița soarelui. În părțile pârлите bolnavul simte usturimi și dureri ca și cum ar fi ars, iar când beșicele crapă durerile sunt și mai mari. După ce cad cojile pielea rămâne subțire și lucioasă. Buzele și gura se înroșesc și produc usturime, limba este crăpată și roșie, bolnavul are urdinare și dureri în pânțele, rar se întâmplă să fie constipat. În același timp bolnavul are amețeli, greutate la cap, vederea i se întuneacă, sau vede scântei verzi, iar urechile îi vâjje; are dureri în tot corpul, uneori furnicături și cărcei prin mușchi. Această stare ține întreagă primăvara și o parte din vară, iar spre toamnă bolnavul se simte mai bine și dacă se îngrijește și se hrănește bine, se vindecă cu totul. Dacă însă el continuă a trăi tot așa de rău, boala îi aduce suferințe și mai mari. După trei sau patru ani de boală se ivește *nebulnia* (*mania pelagrosă*); unii caută să se răcorească prin apă și fără să-și dea seamă se aruncă în apă, se înecă; alții se spânzură sau își taie beregata alții dau foc la casă; în cele din urmă nebulnia pelagrosă slăbesc din ce în ce mai mult de nu-i mai țin picioarele, pielea le este vântată-neagră, mai ales la mână și la picioare, unde au pete, urdinarea îi istovește până ce mor în cea mai desăvârșită neștiință. — *Tratament*. Dacă pelagra se caută din timp se vindecă întotdeauna și dacă omul nu va mai mânca decât pâne în loc de mămligă, carne și verdețuri, ea nu mai revine niciodată. Dar fiindcă înlocuirea făinei de porumb cu făină de grâu nu se poate face așa de ușor în alimentațiunea populațiunii noastre rurale, trebuie ca să se ia diferite și urgente măsuri ca cel puțin țăranul să nu mai mănânce făină de porumb stricat. Porumbul bun, bine copt este cel mai hrănitor dintre toate cerealele și dacă porumbul se strică și devine primejdios aceasta provine numai din neglijență, sau nepricepere. *Tratamentul curativ* cel mai bun este să se dea tuturor bolnavilor de pelagră în loc de medicamente *pâne, zarzavaturi și fructe, unt, ouă, etc.*

Pentru aceasta ar trebui ca statul să înființeze în satele bântuite câte o brutărie după anumite sisteme, cari să întrunească brutăria cu morăritul, fabricând pâne bună și desființând traficul de făină, care este așa de păgubitor pentru introducerea alimentației cu pâne de grâu, sau de seacă. Bolnavii din perioada II și III a boalei se vor căuta în spitale unde pe lângă hrană bună li se vor da medicamente potrivite stării lor. Asupra acestor medicamente nu insistăm, întrucât bolnavul nu-și poate face singur tratamentul, acasă, iar aplicarea tratamentului în spital este în grija medicului. Din acestea se poate vedea că baza tratamentului este igiena alimentară și că pelagra va dispărea dela noi numai prin progresele igienii și ale poliției sanitare, după cum a dispărut în Franța de sud și în unele părți ale Italiei.

Pelin, pelin alb, absint (*Artemisia absinthium*). — Crește prin locurile sălbatice, necultivate și deșerte. Florile și frunzele lui sunt amare, din care pricină sunt întăritoare (tonice), stimulente. Se pisează de verzi, se strecoară printr'o pânză curată și se beau dimineața câte o linguriță, sau se fierbe pelin în cafea neagră, se strecoară și se bea. Fiertura de frunze și flori se bea nu numai pentru a combate frigurile, dar și pentru viermii de mațe (limbrici, panglică), precum și de femeile la cari li s'a oprit periodul. Dacă se pune în vin (*vin de pelin, pelinaș*) sau în rachiu și se bea înainte de mâncare câte un păhăruț, face poftă de mâncare și îndreaptă stomacul ușurând mistuirea, din care pricină se dă la oamenii slabi, după o boală grea și lungă, pentru a-și recâștiga puterile pierdute mai curând. Cu zeama de pelin fiert se spală rănile, mai ales acele din care curge materie urâtă. În popor se mai fac oblojeli cu pelin verde tăiat foarte mărunț, miez de pâne și vin, făcute cu mămligută moale și pusă într'o petică, la tot felul de umflături și scrântituri, ținute de cu seară până dimineața, sau și mai mult. De altfel, pelinul se va întrebuința numai în lipsă de alte medicamente mai bune pentru friguri, viermi intestinali și răni. — *Licoarea de absint sau absintul*

este o băntură foarte mult întrebuintată în Europa apuseană și mai ales în Franța, unde prin întrebuințarea ei peste măsură constituie o mare primejdie publică, întocmai ca și beția de alcool și în contra căreia patimi au început să se ia măsuri serioase. Omul care bea adeseori absint va suferi de : pierdere de apetit, vărsături dimineata, slăbire, paliditate, amețeli, aiurări, lipsă de somn, dureri în încheieturi și dealungul nervilor (întepături, arsuri, furnicături), accese de furie, idei de persecuție, atacuri de epilepsie, demență (tâmpeală). *Tratament* : beția sau accesul acut se combate cu cloral idrat 1—3 gr. la 50 gr. apă ; forma cronică, învechită și mai ales durerile și lipsa de somn cu preparatele de opiu, cu cloral, cu sulfonal, cu idroterapie, regim lactat pentru a liniști stomacul, apoi carne crudă (v. și *Alcoholism*).

Pelin de mături, pelin de pureci (*Artemisia scoparia*). — La țară femeile mătură casa cu o măturice de acest pelin pentru ca să piară purecii ; iar în pat aștern pelin verde.

Pelinariță, pelin negru (*Artemisia vulgaris*, fam. compozitelor). — Plantă erbacee care crește prin locuri necultivate, dărâmături, pe marginea drumurilor și a câmpurilor. Părțile cari se întrebuințează sunt frunzele, rădăcinile și florile. *Proprietăți* : tonic, stimulent, antiистерic, înlesnește venirea regulilor. *Doze* : se dă sub formă de ciatu din 10 gr. la litru ; sub formă de praf 2 până la 8 gr. ; sirop 30—60 gr., extract 2—4 gr.

Peliniță, pelin mic (*Artemisia pontica*). — La țară se face gargară cu peliniță fiartă cu apă neîncepută într'o oală nouă la durere de gât. In unele locuri se fierbe pelinița cu ceapă albă și fire de usturoiu în oțet și cu hoștină dela stupi și îngroșată cu țărâte de grâu, pentru buric.

Peltea, beltea, marmeladă (lat. *pulmentum*). — Este un fel de dulceată de poame fierte mult. Pelteaua de mere ușurează scaunele, este laxativă, pe câtă vreme pelteaua de gutui încuie, este constipantă. Pelteaua făcută din orice fructe este bună pentru dat în ea unele medicamente cu gust rău,

pentru hrana celor slăbiți, supra alimentația ofticoșilor.

Pelvipерitonită. — Peritonită localizată la peritoneul micului lighian (v. *Peritonită*).

Pelvis. — V. *Basin*.

Pemfigus, (gr. *pemphix*, beșică). — Se numește astfel o boală de piele care se arată prin niște beșici pline de apă limpede la început, care se poate să se prefacă în puroiu sau să devie ca sângele. Sunt mai multe varietăți de pemfigus. Varietatea mai remarcată este *pemfigul noilor-născuți* și care se arată de obicei la copii slabi, sau la copii născuți sifilitici. Beșicile se ivesc mai întâiu la mâni și la picioare, apoi pe membre, gât, față ; ele se însoțesc de mâncărime și de căldură. *Tratament*. Se vor aplica prafuri absorbante și antiseptice sau pastă de oxid de zinc cu mentol, sau de var cu unt de lemn, sau vaselină cu salol. Se vor face băi prelungite dacă bolnavul le poate suferi, în caz contrar se vor face învăluri cu vată sterilizată. La nou-născuți se va pune în șezut câte un săpunaș seara și dimineata cu bromidrat de chinină de câte 10 ctgr. unul. La copiii mai mari se vor da tonice, chinină, ergotină, cafeină, fier. In pemfigus cronic se vor da preparatele cu arsenic (arseniat de sodă, arseniat de fier, arseniat de chinină, câte 4—8 miligrame pe zi). La pemfigul *sifilitic* tratament antisifilitic sub orice formă posibilă.

Penteleu. — V. *Bâsca-Penteleu*.

Pepene galben, zămos (*Cucumis melo*, fam. cucurbitaceelor). — Plantă erbacee cu fructul mare, cu 8—12 șanțuri, cu suprafața netedă, sau scortșoi cu miezul suculent, dulce, de culoare albă sau galbină. Originar din Asia tropicală se cultivă mult la noi. Sunt mai multe varietăți, după aspectul exterior al fructelor, după mărime, după culoarea și gustul cărnei. Dintre aceste varietăți vrednică de amintit este *cantalupul*. Pepenele este un fruct plăcut la mâncare. Este bine să se mănânce mai rar și nu mult odată. Cei cu stomacul slab și cei supuși la urdinare, precum și cei se sufar de diabet să nu mănânce de loc. — La țară semințele uscate și pisate se beau cu apă pentru oprirea vărsăturilor.

Pepene verde, *harbuz, lubeniță*, (*Cucumis citrullus*, fam. cucurbitaceelor). — Plantă erbacee cu fructul de culoare verde, cu miez roșu sau galben, dulce și foarte suculentă. Originară din Africa sudică, se cultivă foarte mult pentru fructele sale comestibile (Maiu—August), Pepenele verde este plăcut la mâncare dar și el are cusurul de a fi greu de mistuit din cauza marel cantități de apă pe care o conține. Cei bolnavi de stomac și cei predispuși la diaree, precum și diabeticii nu trebuie să mănânce pepene verde, iar cei sănătoși să nu mănânce mult odată. — La țară se prepară cunoscutul *lapte de toate semințele* astfel: se pisează la un loc câte 2 linguri de semințe de pepene verde, pepene galben, bostan alb, bostan galben, castraveți și floarea soarelui; se picură peste ele în piuliță câte puțină apă caldă, se mestecă bine, se strecoară printr'o pânză deasă nouă și se dă de băut bolnavilor slăbiți mult de o boală lungă (în convalescență) ca să se întărească.

Pepsină. — Este principiul activ al sucului gastric și se extrage din mucoasa stomacului porcului, a oaci, a vacii. Se prezintă sub formă de praf fin alb-gălbui, cu miros ca de chiag fără gust, foarte solubil în apă. Pepsina se întrebuințează în cazurile de lipsă de apetit, mistuire grea, urdinare cu scaunele formate din materii alimentare nemistuite, boale care slăbesc, cu convalescență înceată. Sunt două feluri: *pepsină extractivă*, din care 10 ctgr. peptonizează 10 gr. de fibrină, și *pepsină medicinală* sau *amilacee*, care este un amestec din precedentă cu amidon sau zahăr de lapte, lactoză, din care 50 ctgr. peptonizează 10 gr. de fibrină. Doză: 50 ctg. până la 4 gr. de pepsină amilacee în pachete, în buline, pilule, etc. Pepsina se poate asocia cu *pancreatina*, cu *diastaza* (v. aceste cuvinte).

Peptonă. — Este produsul digestiunii artificiale a cărnei prin pepsină sau pancreatină în prezența unui acid (cloridric sau tartric) și la căldură cam de 50°. Excesul de acid se neutralizează cu bicarbonat de sodă. Peptona se prezintă sub două forme: *lichidă* și *uscată*. Cea lichidă reprezintă de 3 ori greutatea sa de carne și cealaltă

de 6 ori. Se întrebuințează în cazurile de dispepsie (mistuire grea) prin lipsă de secrețiune a sucului gastric, în diaree, la convalescenții fără apetit. Se dă în bulion 2—4 linguri din peptona lichidă, iar din cea uscată numai pe jumătate. Se mai dă în *clizme nutritive*, în aceeaș doză cu un gălbinaș de ou, 5 picături de laudan și un pahar de lapte.

Percelorur de fier. — V. *Fier*.

Percuțiune (lat. dela *percutere*, a lovi). — Este un procedeu medical de cercetare, cu scopul de a vedea dacă sunetul produs este închis (mat), sau deschis (clar, sonor). Percuțiunea se face cu mâinile sau cu o placă de sifed (*plessimetru*) aplicată pe piele, asupra căreia se lovește cu degetul sau cu un ciocănel.

Perdea. — V. *Cataractă*.

Perforant. — V. *Morb perforant*.

Peri răl. — V. *Trichiază* și *Ochiu*.

Pericard (gr. *peri*, în jur, și *kardia*, inimă). — Invelișul seros care încunjură inima, sau *cămașa inimii*.

Pericardită. — Aprinderea sau inflamațiunea pericardului.

Perii. — În medicină se întrebuințează câteodată *periile*, cari seamănă cu cele ordinare. Așa pentru a face *fricțiuni* sau frecături energice în cazuri de dureri reumatice vechi, în nevralgie sciatică, sau pentru a întefi funcțiunile pielei la un om slăbit, ne servim de așa zisele *perii medicale*, făcute cu păr, mai mult sau mai puțin tare, sau cu fire vegetale, sau chiar cu fire de metal. — Pentru a aplica *electricitatea* la suprafața corpului ne servim de așa numitele *perii electrice*: un fel de cutie care cuprinde o mică mașină electrică și a cărei capac are fire metalice dispuse în formă de pământ, care transmite fluidul electric dinăuntru cutiei la piele. Pentru spălat în gură toată lumea se servește de *perii de dinți*, cari trebuie să fie ținute foarte curate și având fiecare om peria sa (v. *Dinți* și *Dentifrice*).

Perine. — Cea mai simplă perină este un sac umplut cu tărâțe, sau cu pleavă de ovăz, care este bună în cazurile de fracturi pentru ca să se poată acomoda cu înlesnire membrului bolnav. Pleava de ovăz, lâna și penele au un cusur că țin prea cald și pentru

aceasta s'au înlocuit cu *păr*. Se mai întrebuințează perinile de *cauciuc* vulcanizat, cari au un șurup prin cari se umplu cu aer sau cu apă. Ele au avantajul de a fi răcoroase, mlădioase și de a nu se strica sub influența umezelei pansamentelor. Bune sunt perinele de cauciuc cari se umplu cu aer, cari nu se strică ușor. În cazurile de boală lungă, de zăcere pe spate timp mai îndelungat, este bine ca din vreme să punem sub șezutul bolnavului o perină de cauciuc sub formă de colac, pentru ca să prevenim formarea rănilor cari ne dau așa de mult de lucru și chinuesc bolnavul în mod cumplit.

Period. — V. *Menstruație*.

Periost (gr. *peri*, în jur, și *osteon*, os). — Se numește astfel membrana aplicată asupra oaselor, *cămașa oaselor* (v. *Os*).

Periostită. — Aprinderea sau inflamațiunea periostului.

Periostoză. — Umflarea sau îngroșarea periostului în urma unei periostite, acute sau cronice. Cauzele ei sunt: sifilisul, scrofuloza, tuberculoza etc.

Peritoneu (gr. *peri*, în jur, și *teinein*, a întinde). — Se numește astfel mem-




Fig. 334. — Secțiune verticală prin abdomen și basîn.

1=ficat; 2=stomac; 3=pancreas; 4=duoden; 5=colon; 6=jejun; 7=rectul; 8=beșica udului; a=epilon gastro-hepatic; b=cavitatea epilonului; c=marele epilon; d=mezentere; e=peritoneul ce trece dela peretele abdominal la beșica udului; f=fund de sac recto-vezical

brana (pelița, foița) seroasă care căptușește întreaga suprafață dinăuntru a părților pântecelui și care învelește fie în tot, fie în parte, cele mai multe din organele cuprinse în această ca-

vitare, trecând dela un organ la celălalt și ținându-le într'o pozițiune neschimbată. Aceste foițe formează diferite varietăți de îndoituri, dintre cari unele se duc dela peretele abdominal la un organ, cum este cu aceea care înconjoară intestinul, care se numește *mezentere* și care cuprinde vase sangvine și limfatice. Altele reunesc un organ cu un altul, *micul epiploon*; una din aceste îndoituri, numită *marele epiploon* sau *prașor*, se scoboară dela peretele inferior al stomacului, formează un fel de *șorț* pe dinaintea mațelor și se umple de grăsime. În starea normală de sănătate cavitatea peritoneală nu există decât în mod virtual și ea devine aparentă și reală numai în cazurile de exudate, când se adună apă în pânțele, în dropică (vezi *Ascită*).

Peritonită. — Este aprinderea sau inflamația *peritoneului*. Ea este *generalizată*, adică întinsă la întreg peritoneul, sau *parțială* (localizată într'o parte numai). Peritonita *acută* poate fi produsă foarte arareori de frig, adică de răceală simțită pe din afara corpului, sau de răceală simțită pe dinăuntru bând lichide reci dela gheață, sau cu gheață, în timpul când omul este asudat. Cele mai adeseori peritonita provine dintr'o boală a vreunui organ pe care îl acopere peritoneul și anume: o inflamațiune care dela organul bolnav se întinde la peritoneu, cum se întâmplă în cazurile de inflamație a intestinului, într'o ernie (surpătură) strangulată, sau în urma unei faceri grele, când s'a întins inflamația dela mîtră la peritoneu (*peritonită puerperală*); o ruptură a vreunui organ fie prin rănire fie în urma unei boale care i-a distrus pereții, iar conținutul aceluia organ (sânge, puroiu, fiere, urină, materii fecale) se varsă în cavitatea peritoneală și aprinde îndată peritoneul, după cum se poate întâmpla în abcesele ficatului și ale splinei, în apendicită, în ulcerul stomacului, în ulcerățiunile intestinelor din febra tifoidă, dizenterie, tuberculoză (oftică), etc. — *Semnele acute generalizate* sunt: o *febră* vie care începe printr'un fior strașnic, febră de 40° și continuă; pulsul mic, foarte iute încât abia se poate număra, o *durere*

cumplită în pânțele, mai întâiu mărginită la un loc, apoi întinsă peste tot pânțele. Durerea este însoțită de svâcnituri și mărită prin cea mai mică mișcare sau spălare, prin tusă, respirație și chiar prin greutatea plapomii, sau a velinței. Se mai arată o umflare sau balonare a pântecelui, care este atins în mod uniform și plin cu gaze




Fig. 335. — Peritoneu

multe cari dau un sunet de tobă când ciocănim pânțele, *sughituri* și *vărsături* neconținute, de materii mucoase, apoi bilioase (de fiere, de venin) verzi, *greutate* la urinare, limba este uscată, setea mare, fața trasă, nasul subțiat și alungit, ochii înfundați în cap și cercuiți, mâinile și picioarele sunt reci și învinețite ca și buzele, corpul se acopere cu o sudoare rece, vâscoasă. *Peritonita parțială* sau *localizată* își are sediul în iliace și în jurul mitrei, numindu-se *pelvi-peritonită*; ea are aceleași semne ca și cea generalizată, însă toate în măsură mai mică și ea nu este așa de mortală. *Peritonita cronică* este mai mult o complicație a unei boale, cele mai adeseori a *tuberculozei* (ofticei) de mae, produse prin microbul acelei boale, *peritonita tuberculoasă*, sau ea este produsă prin întinderea unui cancer al vreunui organ din pânțele, *peritonită canceroasă*. În toate aceste cazuri ea constituie o complicație foarte gravă, care grăbește moartea bolnavului. — *Tratamentul medical* al peritonitei acute constă în: *repaus absolut* pe spate,

imobilizarea mațelor prin *extract de opiu*. Pe pânțele se vor ține pungi *mari pline de ghiață*, reînnoite la fiecare 2 ore; *regim sever*, lichide reci din ghiață (lapte, șampanie, etc.) date cu lingura din sfert în sfert de oră. Pentru *sughit* și *vărsături* se va da ghiață pe dinăuntru, *apă cloroformată*, *cloral*, *mentol*, *poziunea lui Rivière*, la trebuință mare injecțiuni cu atropomorfina. Contra constipației se vor pune *clizme emoliente* însă cu mare băgare de seamă; *nu se vor da niciodată purgative*. Pentru *colaps* se vor face injecțiuni sub piele cu *eter*, *cafeină*, *ulei camforat*, *stricnină sulfurică*, *ser artificial*. Pentru balonarea sau umflarea pântecelui se va pune o sondă în șezut, pentru a să iese gazele. În peritonitele *supra-acute*, produse prin plăgi perforante ale intestinului și prin găurirea intestinului în cursul unei febre tifoide, ulcer al stomacului, sau apendicită, se va recurge la *tratamentul chirurgical* chiar dela început. *Tratamentul peritonitei parțiale* (închistată purulentă) constă în a deschide punga, tăind peretele pântecelui strat, cu strat, a spăla punga și a o drena cu un tub de cauciuc gros, care se va înlocui cu altele din ce în ce mai mici pe măsura în care scade curgerea de puroiu. *Tratamentul peritonitei tuberculoase* constă în *imobilitate* în pat și *regim de lapte* absolut, iar în formele cronice *supra-alimentație* (praf de carne, 100 gr. ouă, cereale, lapte, grăsimi). Pe dinăuntru se va da *arsenic*, *metil-arseniat disodic*, *creozot*, *creozolat*, *fosfotal* în injecțiuni sub piele, *antiseptice intestinale* (benzonaftol) în doze moderate. Pe dinafară se vor face ungeri cu *tinctură de iod* pe pânțele sau cu: *gaiacol* 1 gr., *tinctură de iod* 15 gr., *glicerină* 20 gr. Întrucât privește tratamentul *chirurgical* se recomandă *puncțiune evacuatoare* urmată de injecțiune de *naftol camforat* (3—4 gr.), sau de injecțiune de *aer* (3—5 litri), sau de *spălarea peritoneului* cu apă boricată fiartă și răcită până la 30—40°, până când lichidul iese limpede, sau cu apă sterilizată și la temperatură de 45°. Toate acestea se recomandă numai în peritonita cronică cu formă ascitică, în celelalte cazuri se va face *laparotomia* urmată

sau nu de *spălarea* cavității cu ser artificial, sau apă steralizată caldă, sau se va șterge numai peritoneul cu bureți înmuiți în soluțiune de sublimat, sau de naftol camforat.

Perj. — *Prun*.

Permanganatul de potasiu, hiper-
ganatul de potasiu. — Se prezintă sub formă de cristale mici, negre, cari se disolvă foarte ușor în apă caldă. Este un dezinfectant bun, conținând mult oxigen. Il întrebuințăm de regulă în soluție de 1 la 1000, sau 1 la 2000, pentru spălătul rănilor murdare și mirositoare, în spălăturile uretrale și vaginale, contra blenoragiei, la gargară în cazul când avem amigdalită, sau ca preventiv contra boalelor ce se iau prin gură. La nevoe putem steriliza, afundându-le într'o soluție de 1 la 1000 instrumentele de operat, sau orice obiect care a venit în contact cu un bolnav pe care-l presupunem infecțios (v. și Manganéz).

Peroneu (lat, *fibula*, grec *perone*, copcă, scoabă). — Osul cel subțire al gambei, care este așezat în afară.

Pervincă, brăbănoc, cununică, foaie în fir, merișor, saschiu, saseau (*Vinca herbacea* și *minor*, fam. apocinaceelor). Plantă erbacee care crește prin livezi, prin păduri și crânguri, cultivată adeseori prin grădini. Frunzele acestei plante sunt amare și astringente. Ele se pun pe răni pentru a opri sângele să curgă. Mai sunt și purgative. Se dau pentru a opri laptele, sub formă de infuziune (ceaiu) din 8—10 gr. cu trestie 30 gr. la un litru. Se mai întrebuințează pentru însușirea ei astringentă și în boalele de gât. — La *fară* se întrebuințează ceaiul de pervincă în curgerile de sânge (*emoragii*).

Pesar (lat. *pessarium*). — Un mic aparat care se introduce în vagin pentru ca să sprijinească mitra, sau s'o țină în poziția ei normală. Pesarele se fac de obicei din cauciuc și se întrebuințează în cazurile când mitra este căzută. sau strâmbă (v. *Mitră*). Pentru ca pesarul să se pună mai cu înleznire trebuie mai întâiu ca femeia să facă udul (să urineze) și să iese afară cu scaunul, punându-și o cliză. — Pesarele trebuie scoase din când în când, pentru a fi curățate. De asemenea femeia trebuie să se țină curată în tot

timpul cât poartă pesarul. Este de prisos să spunem că pesarele nu se vor pune decât numai după recoman-



Fig. 336. — Pesare

dația doctorului și vor fi aplicate numai de el.

Pesmet, pișcot, posmag. — Pesmeții se prepară dintr'un amestec de făină, de gălbenușuri de ou și de zahăr, la cari se mai poate pune, pentru a li se da aromă, lămâie, flori de portocale, vanilie, etc. Pesmeții sunt ușor de mistuit, nutritori, plăcuți la gust și se topecs în gură mai ales când sunt muiați în vin. Ei sunt foarte buni în unele boale, la convalescenți și la copii. În farmacie se fac pesmeți cu diferite medicamente, cari se iau mai ușor prin acest mijloc. Sunt *pișcofi de curățenie* (cu scamonee), *pișcofi de limbrici* (cu limbricariță, cu santonină și cu calomel), pe cari copiii îi mănâncă cu plăcere, câte o jumătate sau câte un pișcot întreg, după vârstă; mai sunt și *pișcofi cu fier*, cari însă nu se prea întrebuințează.

Pestă. — V. *Ciumă*.

Pești (lat. *pisces*, grec. *ichthyes*). — Carnea de pește este bună de mâncat, dar nu este așa hrănitore ca cea de bou, vițel, porc, berbec, pasări, de oarece nu conține principii nutritive (albuminoide) în cantitate așa de mare. Carnea de pește are numai 13.7% substanțe albuminoide, în schimb însă ea are cea mai multă grăsime (4—6%), iar gelatină are ca și carnea de vițel în cea mai mare măsură (4.4%). Carnea de pește, mai ales a unor anumiți pești, este dulce și gustoasă. Prin urmare, vom recomanda cetitorilor noștri să mănânce pește ori de

câte ori au bun și proaspăt și întru cât starea de sănătate a stomacului lor le-o permite. Varietățile de pește care se mănâncă sunt foarte numeroase. Pentru convalescenți și bolnavi carnea de pește nu este rea, mai ales carnea de cegă și de șalău; ea poate servi ca punte de trecere dela dietă la regimul alimentar al sănătății. Carnea unor pești prin ea însăși este fadă și pentru a se putea mânca trebuie preparată în diferite moduri, cu diferite sosuri, cari o fac mai gustoasă, dar cari în schimb o fac mai indigestă, din care cauză nu toate stomacurile o pot mistui. Persoanele supuse la boalele de piele, mai ales la blândă (urticarie) trebuie să se păzească mai cu seamă de peștele de mare.

Pestru. — V. *Efelide*.

Pete. — V. *Efelide* și *Nev*.

Pete de ficat. — V. *Pitiriază*.

Petrol. — Petrolul brut este un lichid unsuros la pipăit, verzui, roșietic și negru, cu miros neplăcut. Prin distilațiune se izolează mai multe produse volatile: *eter de petrol*, *esență minerală*, *uleiu de petrol* și niște *uleiuri greoaie* cari fierb la 280—400° (vaselină, parafină). Petrolul este puțin toxic pentru om și nu produce greață, diaree, vărsături, pierdere de cunoștință, decât dacă este luat în doze foarte mari (200, 300, 400 gr.). El are o acțiune *parazitică*, adică omoară viermii intestinali, răia, păduchii; pe piele provoacă o iritațiune mare. Se dă pe *dinăuntru* ca fortifiant (întăritor), antispasmodic, febrifug, în contra litiazei biliare (pietricele de ficat), în contra ofticeii, în doză de 5—30 picături în capsule, sau în perle. Pe *dinafară* în boalele de piele (psoriază), râie, păduchi, se întrebuintează curat, sau sub formă de alifie, săpun și liniment.

Pia-Mater. — Se numește astfel una din membranele (pelitele) cari învelesc creierul.

Piatră. — V. *Calculi*.

Platră acră. — V. *Alumen*.

Piatra iadului. — V. *Argint* și *Nitrat*.

Piatra-Neamț. — Oraș încântător capitala județului Neamț, situat la 390 m. înălțime. La răsăritul orașului se înalță munții *Cozla* (1650 m.) și *Petricica* (580 m.), parte acoperiți cu păduri și pășune; la dreapta *Cerne-*

gura (850 m.), cu păduri de brazi. Prin marginea orașului curge Bistrița, cu apa ei repede și adâncă de 1—2 metri. Orașul e frumos cu clădiri frumoase, școale și biserici multe, între cari este vestita biserică Sf. Ion, zidită de Ștefan cel Mare la 1498 pe un dâmb ce domină orașul, o grădină publică plantată cu brazi, teatru, clădiri nouă frumoase, oteluri, restaurante. *Clima* e plăcută, de munte, constantă, temperatura medie a verii este de 26°, aerul ozonizat, din care cauză se poate considera ca una din cele dintâi stațiuni climaterice din țară. Imprejurimi multe și din cele mai pitorești, vrednice de văzut.

Piatră vânăta. — V. *Cupru*.

Pică. — V. *Apetit*.

Picături. — Sunt multe medicamente cari se dau sub formă de picături.



Fig. 337. — Cum se pun picăturile în ochi, cu instilatorul

De obicei în rețete medicamentele date sub formă de picături se arată în cifre romane, pentru a se deosebi de cele date în doză de grame. Pentru a număra picăturile trebuie să ne servim de un *instilator*, care este un aparat compus dintr'un tub de sticlă, terminat la un capăt printr'un vârful ascuțit, iar la celalt printr'o pară, sau un tub de cauciuc. Se aspiră lichidul apăsând cauciucul, care se lasă să se umfle când vârful aparatului se află în lichid. Astăzi se întrebuintează adeseori în loc de instilator

PICI

sticle picătoare, cari au un dop de sticlă astfel făcut încât, dacă îl sucim într-o poziție anumită se numără cu ușurință picăturile. Numărul picăturilor variază după greutatea medicamentului. Astfel pentru greutatea de 1 gr. trebuie: 20 picături de apă, 20 de perclorur de fier, 22 de amoniac, 23 de licoarea lui Fowler, 25 de glicerină, etc. Atât de instigator, cât și de sticlele picătoare, ne folosim pentru a pune picături în ochii bolnavilor, după cum se vede în figurile alăturate.

Picior (lat. *pes*). — Partea terminală a membrului inferior se numește *picior*. Se află la capătul de jos al gambei cu care se articulează în dreptul *gâtului piciorului*. Piciorul se împarte în trei regiuni: *dosul piciorului*: *talpă*, concavă, reprezentând o *boltă* (secul piciorului) și care este formată din *tars* și *metatars*; este elastică, transmitând pământului greutatea corpului. Ea se termină înapoi prin *călcâiu*. A treia este formată de cele cinci *degete*, cari se numără de dinăuntru înafară (întâiul fiind degetul cel mare). Numărul oaselor cari compun piciorul este de 26. Oasele sunt mobile și puse în mișcare de



Fig. 338
Scheletul piciorului

20 de mușchi cari le acopăr. De ele se prind și tendoanele mușchilor gambei cari fac să se miște piciorul în totalitate lui. Piciorul suportă corpul prin călcâiu și vârful degetelor sprijinindu-se pe pământ. El este organul de căpetenie al mersului și al fugei mulțumită mobilității oaselor lui. Când călcăm *strâmb*, sau facem vreun *pas fals*, ligamentele sunt întinse prea tare și se rup, producând o *entorsă* (*sucitură*) care de multe ori este foarte supărătoare, și uneori punctul de plecare al altor boale mai grave (v. *Entorsă*). Degetele picioarelor fiind mai bogate în glande decât ori care altă parte a corpului *asudă* mult și sudoarea, neputându-se evapora, fermentează și

PICI

alterează pielea (o opărește); pentru a preveni aceasta trebuie să se facă, dacă nu în fiecare zi, cel puțin la 3 zile odată câte o *baie* de picioare cu apă caldă, simplă, sau cu săpun (vezi *Băi de picioare*) și să se presare între de-



Fig. 339. — Oasele piciorului

gete praf de talc. Mirosul cel urât al picioarelor se combate dacă punem în baie spirt, sau oțet și după baie presărăm printre degete praf de: bismut, talc și acid salicilic, sau punând în apa că care spălăm picioarele (cel puțin de 2 ori zilnic), o lingură de formol. *Inflamațiunile, abcese și răni-rile* cari se observă la picioare sunt aceleași ca și la mâni (v. *Mână*). — *Picioare strâmbe*. Sunt unii copii cari se nasc cu un picior strâmb, sau cu amândouă. Această deformitate constă în aceea că talpa calcă sau pe marginea din afară, sau pe cea dinăuntru, sau pe degete, sau pe călcâiu, de unde avem cele 4 varietăți de picioare strâmbe: 1. Picior strâmb *varus*, în care piciorul calcă pe marginea din afară. 2. Picior strâmb *valgus* în care piciorul calcă pe marginea dinăuntru. 3. Picior strâmb *equin* în care piciorul se găsește în extensiune forțată și calcă pe degete și pe partea dinainte a oaselor metatarsiene. 4. Picior strâmb *talus* în care piciorul calcă numai pe călcâiu și talpa privește înainte (formă foarte rară). Adeseori se combină între ele câte două varietăți, de exemplu varietatea 1-a cu a 3-a și aceste deformități se datoresc retracțiunii și scurtării unor

muşchi și drept cauze s'au invocat ereditatea, alcoolismul părinților, compresiunea mitrei, și altele. *Tratamentul* constă în operație, care variază după forma diformității. În toate formele, după ce s'au tăiat tendoanele scurtate, adică după ce s'a făcut așa zisa *tenotomie*, se îndreaptă cu sila piciorul în poziție normală și se fixează astfel printr'un *bandaj de ghips*, care se reînnoiește din zece sau din douăzeci în douăzeci de zile timp de 2—3 luni, adică până, la vindecare completă, după care se face piciorului o încălțăminte potrivită și destul de tare pentru ca să-l



Fig. 340 — Degetul mare al piciorului

(A — normal; B — umflătură (1) — degetului mare

până întotdeauna în poziție bună. — *Picior plat* sau *talpă lată*. Această diformitate constă în aceea că talpa în loc să formeze o boltă la partea ei mijlocie



Fig. 341. — Picioare strâmbe

1 — varus; 2 — equin; 3 — valgus; 4 — talus

cauciuc, convexă în sensul lungimei, care să depărteze talpa de sol reformându-i bolta (secul piciorului).

Pierle (Acid), *trinitrofenol*. — Acid *toxic*, se prezintă sub formă de lamele

galbene-deschise, cu gust foarte amar, solubile în 26 părți apă, mai solubile în alcool și eter. La căldură detu-



Fig. 342. — Picior plat

(stânga: călcătura normală, cu urmele sale; dreapta: călcătura unui picior plat, cu urmele sale).

nează formând picrate explozive, se recomandă în unele boale de piele (exema, zona zoster, erizipel), dar mai cu seamă în *arsuri*, unde lucrează ca analgezic (potolește durerea), anti-septic, grăbind vindecarea. Se întrebuințează în soluțiune apoasă; acid picric 5 gr., alcool 50 gr., apă 950 gr. și anume: în băi dacă partea arsă se poate cufunda ușor (degete, mâni, picioare), apoi se moaie cârpe (compresse) în acea soluție și se aplică pe rană acoperindu-se cu bumbac, iar nu cu un țesut impermeabil (guta-percă, tafta gumată) care ar menține umezeala și ar întârzia vindecarea. Pansamentele se schimbă la 3—4 zile odată. Pentru exema se întrebuințează aceeași soluție, sau alta conținând 6, 10, 12 gr. de acid picric la 1000 apă. Pentru zona zoster (foc viu) se fac ungeri cu ajutorul unui pomățuf mușat într'o soluție alcoolică de 1 la 10. Inconvenientul acidului picric este că mâinile persoanei care face pansamentul se îngălbenesc și această culoare dispăre numai dacă se spală cu o soluție saturată de borax, sau de carbonat de litină.

Pierotoxină. — Se extrage din fructele de *măslăd* (v. acest cuvânt) și se întrebuințează în contra epilepsiei și a coreei, în doză de 1 până la 2 mgr. Medicament primejdios.

Piele (lat. *pellis*, *cutis*, grec. *derma*). — Pielea este învelișul care acoperă toată suprafața corpului și se continuă modificându-se până la fața internă a nărilor, a conductului auditiv extern (al urechilor), a gurii și a șezutului cu membrana mucoasă. Pielea este elastică, mlădioasă, de rezistență și grosime variabilă după regiuni; suprafața ei este cam de un metru patrat

PIEL

PIEL

și jumătate. Este formată de două straturi suprapuse. *Epiderma* este formată de straturi de celule, cele superficiale sunt tari, cornate sau mai bine zis solzoase, cari sub acțiunea unei vezicături se deslipesc de celulele profunde, formând beșici pline cu apă; celulele adânci sunt mai moi



Fig. 343. — Papilele dermului

1—vână; 2—nerv; 3—arteră

conțin pigmentul, adică materia colorantă a pielii; în epiderm nu sunt vase sangvine. La palmă și la tălpi celulele superficiale sunt foarte groase. În stare normală celulele stratului superior se deslipesc pe neșimțite și cad sub forma unui praf foarte fin, dar în unele boale, cum sunt pojarul și scarlatina, această scâmoșare se face în mod mai vădit, în măsură mare. *Derma* este stratul profund al pielii; țesutul lui este format din celule și fibre încrucișate; o parte din acestea sunt fibre elastice, cari fac ca pielea să fie elastică. În punctul de unire cu epidermul, dermul prezintă niște ridicături, numite *papile*, separate prin adâncituri; prin fața lui din jos se unește cu mușchii și cu oasele printr'un țesut moale, numit *țesutul conjunctiv subcutanat*, cari în dropică se infiltrează cu apă. *Perii* sunt anexe ale epidermei, care, pentru a-i constitui, înfundă în derm niște mu-




Fig. 344
Corpusculi lui Pacini dintr'un deget

1—terminația nervoasă; 2—corpuscul al pipăitului



Fig. 345
Corpusculul lui Pacini

guri, *muguri piloși* cari se termină printr'o depresiune (înfundătură) în care intră o ridicătură a dermului numită *papila părului*, care cuprinde vase capilare sangvine. În partea dinăuntru a *bulbului pilos* se ridică *firul de păr*. Părul se află pe toată suprafața corpului, fie în stare rudimentară (*puș*), fie sub formă bine dezvoltată cum este la cap, mustăți, barbă, afară de palme și tălpi. Scopul părului este de a prinde și ține fixat o cantitate de aer, care formează un strat izolator și rău conducător de căldură. La peri sunt anexați niște mușchi mici, cari îi îndreaptă, (cum se întâmplă când ți se face părul măciucă de spaimă). — *Glandele sebacee*, cari sunt anexe ale perilor, sunt în formă de ciorchine



Fig. 346
O secțiune prin păr și piele

1—capilar sangvin
2—papila părului
3—bulbul părului



Fig. 347. — Secțiune în piele

1—corpuscul tactil; 2—glandă sudoripară;
3—vase capilare; 4—fir de păr 5—orificia glandei sudoripare; 6—bulbul părului

și ele fac un fel de grăsime pe care o varsă asupra părului și asupra epidermului, formând un strat protector. — *Glandele sudoripare*, cari fac *sudoarea*, sunt niște tuburi ce străbat epiderma înfundându-se în dermă; aceste tuburi sunt la început drepte, apoi ca un ghem. Pe toată întinderea pielii sunt 3 milioane de glande sudoripare și fiecare centimetru patrat prezintă, în termin mijlociu, 200 de orificii de ale acestor glande, fiind însă mai dese și foarte apropiate între ele în

palme și în tălpi. Sudoarea pe care o fabrică aceste glande se compune din 995 părți de apă, din puțină sare (clorur de sodiu), urme de uree și o substanță mirositoare. Când sudoarea iese din glande este alcalină, apoi



Fig. 348. — Orificii de glande sudoripare

1=pe palmă și talpă; 2=pe tot corpul

în contact cu aerul și cu grăsimea produsă de glandele sebacee ea devine acidă (acără), din care pricină irită pielea. În 24 de ceasuri cantitatea sudoarii se ridică la 1250 gr., adică 40—50 gr. pe oră, putând trece peste 500 până la 1000 gr. atunci când înădușim mult. În stare normală asudarea se face *pe nesimțite*, de oarece sudoarea, venind în dreptul stratului solzos al epidermului, este absorbită în mare parte de acesta, așa ca la pipăire pielea omului sănătos este puțin umedă, *jilavă*, pe câtă vreme în ca-




Fig. 349. — Lucrul făcut de organism pentru a înlătura un corp străin din piele

A=corpul străin infipt în piele; B=inflamația îl împinge afară; C=corpul străin înlăturat, pielea își revine înfățișarea obișnuită.
1=vase capilare; 2=fir de păr; 3=glande sudoripare.

zurile de fierbințeală uscată; când omul nu asudă de loc, pielea este uscată ca scândura. Sudoarea prin evaporație ia din căldura pielei, cu atât mai multă cu cât evaporația se face în măsură mai mare, așa că temperatura corpului scade în raport cu asudarea. Asudarea este *regulatorul temperaturii* corpului. Pentru ca asudarea să se facă, trebuie ca aerul

să nu fie prea încărcat cu umezeală; ea se face cu înleznire când aerul este uscat. La frig asudarea fiind foarte mică, aproape de loc, temperatura normală a corpului nu scade, rămâne constantă. Pielea este și organul *pipăitului*; *nervii senzibilității* se termină în ea prin niște umflături de formă ovalară, cari au o localizație diferită după rolul pe care îl au. Unele, numite *corpusculii lui Pacini*, de mărime de 2—3 milimetri, se află pe nervii colaterali ai degetelor, în țesutul celulelor subcutanate și dau simțirea *apăsării* (presiunii); altele, *corpusculii lui Meissner*, cu mult mai mici, se găsesc în unele papile ale dermului, la pulpa degetelor, la buze, la limbă, fiind organele *tactului* (pipăitului); altele, a treia varietate, se găsesc în intervalele celulelor *epidermice*, *corpusculii intra-epidermici*, mai cu seamă la pleoape, pe dosul mânilor, pe umerii obrazilor, cari par a da senzațiunea *temperaturii*. — *Igiena pielei*. Trebuie ținută în totdeauna în stare cât se poate de curată. Pentru aceasta trebuie spălată cu apă și cu săpun, iar în părțile expuse, cum sunt mâinile, și cu peria; cu ajutorul acestora se spală toate murdăriile formate din pulberi, cari se găsesc în aer și cari cuprind și microbi, cu sudoarea și grăsimea (materia sebacee) a pielei; prin spălături dese pielea se curată de toate aceste necurătenii și funcționează bine. — *Boalele pielei*. Ele sunt foarte numeroase și variabile (vezi *Erpes*, *Impetigo*, *Lichen*, *Lupus*, *Pitiriază*, *Psoriază*, *Urticare* sau blândă, *Eczemă* sau bube dulci, *Acnee* sau coși, fungei). Regimul alimentar are mare influență asupra boalelor de piele; astfel cei ce suferă sau sunt predispuși la aceste boale să se ferească de mâncări iuți, cârnățarie, de vânat, de raci, de raci de mare, midii și pește de mare, de smeură, fragi, nuci, de zaharicale, cafea, ceaiu, vin curat, rachiu, țuică, lichioruri; să mănânce carne albă (de pasăre, pește proaspăt de râu), legume verzi, ouă, lăpturi, fructe. În boalele de piele, cari la început produc arsuri și mâncărime, se recomandă băi de tărâțe, sau scrobeală, cataplasme de feculă de cartofi, de făină de orz, de miez de pâne (făina de in poate

să irite pielea), praf de scrobeală, de orez, spălături cu lăptuci, de nalbă, de soc, mai târziu băi alcaline, cu pucioasă, de aburi, apoi alifii de gudron, de ulei de cadin, de pucioasă etc. În boalele învechite se recomandă diferite ape minerale.

Piept, torace (lat. *pectus*, grec. *thorax*), **coșul pieptului**. — Pieptul este o cavitate mare în formă de con, care începe în sus dela gât și în jos se desparte de cavitatea **pântecului** (v. *Abdomen*) printr'un mușchiu subțire și lat ca o plasă, (*diafragma*) acătat de marginile de jos ale coastelor, din care pricină măcelării îi zic la vite *păiajen*. **Scheletul pieptului** este format înapoi din *șira spinării*, în părțile laterale de *coaste*, iar înainte de *osul pieptului* sau *stern*, care seamănă cu un cuțit și lat cu două tăișuri, așezat cu mânerul în sus; mânerul are o scobitură care




Fig. 350. — Scheletul toracelui
1 = sternul; 2 = coasta; 3 = coloana vertebrală

se simte prin piele sub mărul lui Adam dela gât, iar vârful osului pieptului se prelungește în jos către buric, printr'un sgârciu care uneori seamănă cu o lingură, din care pricină poporul îi zice *lingurea* (în medicină *apendice xifoidă*). Coșul pieptului este îmbrăcat pe dinafară cu mușchii cari se prind de coaste, pe cari le ridică și le scoboară în mod alternativ în mișcările respiratoare; aceste mișcări schimbă forma pieptului, care se lărgeste când tragem aer, în *inspirațiune*, și se strânge când dăm aerul afară, în *expirațiune*. Pe dinăuntru coșul pieptului este căptușit cu o peliță, sau membrană

numită *pleură*, care pe de altă parte se duce asupra plămânilor pe cari îi acopere peste tot. În coșul pieptului se află cei doi *plămâni*, sau *bojoci* și *inima*. Prin urmare în toate boalele acestor organe trebuie să examinăm cu deosebită băgare de seamă pieptul, dacă voim să cunoaștem care organ este bolnav și care este natura boalei. O *durere de piept* de cele mai multe ori ne pune pe cale în ghicirea boalei (v. *Junghiu*, *Pleurodinie*), tot astfel este tusa, apăsarea în piept (opresiunea) și palpitațiunile (bătăile de inimă) cari ne atrag atențiunea și mai mult asupra stării organelor din cavitatea toracică. Dar toate acestea nu ne pot lămuri așa de bine ca ciocănirea (percuța) și ascultarea pieptului, cu ajutorul cărora putem să ne dăm seamă de sgomotele produse de intrarea aerului în plămâni, precum și de cele produse de sânge în inimă. Sunt unele boale interne cari schimbă forma pieptului, între aceasta cea mai cumplită este *oftica* (*atac de piept*). La ofticoși pieptul este alungit, mai subțire în sus decât în jos pe câtă vreme la oamenii sănătoși, pieptul este mai lat în sus, mulțumită mușchilor mari și cărnoși cari se găsesc în aceea parte și cari la ofticoși se tocesc. Fiindcă multe boale de plămâni vin din răceală, trebuie să ne îmbrăcăm bine în timpul iernii, purtând *flanellă*, iar hainele de pe deasupra să fie potrivit de groase. Coastele pot fi *rupte* și să rănească plămânii prin înfundare, dând naștere la complicații grave, dar când sunt *numai ele rupte*, vindecarea se face ușor prin aplicarea unui bandaj de corp apropiat.

Piepten (lat. *pecten*). Toată lumea întrebuințează piepteni pentru a-și curăța părul de murdării și de paraziții cari se găsesc în el. Nu trebuie să întrebuințăm piepteni cu dinții prea subțiri, nici piepteni de metal, cari irită pielea și dau naștere la mătreață. Pieptenii de plumb pot produce otrăvire.

Pierdere. — Sub acest nume de obicei se înțelege *avortul*, sau *lăpădătura*.

Pierdere de cunoștință. — V. *Sincopă*.

Pierdere seminală. — V. *Spermatooree*.

Pierderi albe. — V. *Leucoree*.

Pierderi roșii, sau *curgere de sânge din mîtră*. — V. *Metrorație*.

Piersic, *persic* (*Prunus persica*, sau *prunus vulgaris*, fam. rozaceelor). — Arbore originar din Asia (China, Persia), care se cultivă des pentru fructele sale bune de mâncat. Prin cultură s'au obținut mai multe varietăți: piersica comună, piersica roșie, piersica golașă. Toate părțile piersicului conțin esență de migdale amare și *acid prusic*, cari le dă un gust și miros plăcut, dar cari prin abuz pot da naștere la amețeli, urdinare, convulsii (spazme) și chiar moarte. Mai periculoși sunt sămăburiile de care trebuie să ne ferim și să nu mâncăm decât foarte puțin. *Florile* de piersic, dacă le întrebuințăm sub formă de ceai (infuziune), din 10—20 la 1000, sunt un purgativ ușor și plăcut. *Siropul* se dă mai ales la copii, tot cu acelaș scop, 10—20 gr. Fructele, adică *piersicile*, sunt puțin acide (acre), zaharate, răcoritoare, foarte plăcute la gust, dar cam grele pentru stomac, din care pricină trebuie să mâncăm puțin, rar și ele să fie totdeauna coapte. — La *țară* se bea pentru durerea de piept ceaiu de flori și de frunze.

Pilocarpină. — V. *Iabaranni*

Pilor (dela grec. *pyloros*, portar). — Orificiu intestinal al stomacului.

Pilulă (lat. *pilula*, diminutiv dela *pila*, glob, *hap*). — Unele medicamente se dau sub formă de globulețe, sau de gloanțe (alice), de diferite mărimi, de consistență moale, sau semi-dură, cari se numesc *pilule* sau *hapuri*. Pilulele se compun dintr'o substanță activă (praf, extract, esență, sare, etc.) și dintr'o materie destinată să-i dea masei consistența voită (praf de nalbă sau de lemn dulce, miez de pâine, miere, etc.) pentru a forma o pastă, căreia i-se dă o formă cilindrică și pe urmă se împarte în atâtea bucăți câte pilule voim să facem. Scopul pilulelor este ca bolnavul să poată lua unele medicamente rele pentru ca să nu le simtă gustul. Pilulele se înghit întregi cu ajutorul apei, sau a altui lichid. Pentru ca să se păstreze mai bine unele pilule se învelesc în foite de aur sau de argint. Pilulele au însă neajunsul că uneori se întăresc așa de mult încât nu le mai pot

topi sucurile stomacului și trec în mațe întregi, din care pricină este mai practic să se dea medicamentele în buline, sau sub formă de lichid.

Pin, *chin*, (*Pinus sylvestris*, fam. coniferelor). — Arbore, în totdeauna verde, de prin pădurile din regiunea alpină și subalpină. În medicină se întrebuințează mugurii pentru acțiunea lor excitantă, diuretică și anticatarală, sub formă de ceaiu (infuzie) din 30 la 1000; apă distilată 150—1000 gr.; sirop, după voință.

Pioemie (dela grec. *pyon*, puroiu și *haima*, sânge), *infecțiune purulentă*, *septicemie embolică*, *febră purulentă*. — Când *microbii* pleacă dintr'un focar de infecțiune, pătrund în circulația sangvină, se împrăstie și produc focare de infecțiune secundară, *la distanță*, se zice că este o *pioemie*. Aceasta nu trebuie confundată cu *septicemia* (v. acest cuvânt) în care numai *toxinele* microbilor circulă, cu toate că cercetările moderne au dovedit că una nu exclude pe cealaltă, că mai întotdeauna ele *coexistă* și că numai predominarea uneia, sau a celeilalte creiază cele două tipuri deosebite. Pioemia este caracterizată prin formarea *abcesului* zis *metastatic*, care se poate forma la periferie sau în centru, sub piele sau în vreun organ și iată cum: în dreptul focarului primitiv o parte din puroiu este absorbită de vase și pătrunde în circulație: aceasta este *embolia microbiană*. Ea se oprește într'un țesut, sau într'un organ, când arterele cele mici sunt prea strâmte pentru ca ea să poată trece înainte; microbii încep acolo a se înmulți și formează un focar purulent secundar. *Embolia microbiană* vine adeseori dintr'o *flebită*, când se formează un *thrombus*, care dă naștere la *embolus*. Unele embolii grăsoase, plecând dintr'un focar de fractură complicată, pot produce o *infecțiune purulentă*. Mulțumită antisepsiei și aseptiei, care se aplică astăzi cu atâta îngrijire la pansarea plăgilor pioemia a devenit foarte rară. *Abcesele metastatice* se pot ivi pretutindenea, dar mai des se arată în plămâni și câte odată în număr foarte mare. Ele se mai arată în ficat, în splină, în creier, în rinichi, în țesuturile membrelor, în seroase,

etc. — *Cauzele* pioemiei sunt : *starea generală rea*, cum este la cei cachectici, la bătrâni, albuminurici ; *condițiunile igienice rele*, cum sunt : murdăria, lipsa de îngrijire, îngrămădirea de bolnavi în spitale, sălile de spital rău construite, etc. Pioemia complică focarele rău drenate, abcesele putride, unele boale cu microbi virulenți, osteomielita supra-acută, infecțiunea puerperală, etc. — *Semnele*. Pioemia începe la câțva timp după ce s'a infectat o plagă, care era roșietică, cu muguri cărnoși frumoși, cu supurație puțină. Acum ia un aspect urât, mugurii se vestejesc, devin vineți, marginile se deslăpesc, puroiul încetează de a mai eși și în locul lui curge o materie apoasă puturoasă, roșietică aproape ca sângele. Bolnavul este luat de un fior puternic, corpul întreg se scutură aproape o jumătate de ceas, alteori mai mult, apoi îl dă în *căldură* cu *sudori* multe, întocmai ca la frigurile palustre ; temperatura ajunge până la $40-41^{\circ}$, fața este trasă, pielea pămâtoasă. După 2 ceasuri accesul trece, bolnavul rămâne sdrobit, sleit de oboseală, temperatura scade aproape la normal, până în ziua următoare, când este luat de un nou acces și mai strașnic, apoi accesele se repetă zilnic și bolnavul pierе vâzând cu ochii. Dacă moartea nu vine repede, apar *abcesele metastatice* : durere adâncă, umflătură, apoi căldură, roșeață, fluctuațiune în abcesele dela membre, iar în abcesele organelor cu simptomele proprii ale organului atins. Alteori abcesele secundare se arată și se desvoltă *fără reacție* (umflătură și fluctuație) iar artritele purulente trec ne băgate în seamă și numai la autopsie se constată. Bolnavul se sfârșește în aceste cazuri în marasm și adinamie profundă. — *Tratament*. Înainte de toate trebuie evitată infecțiunea purulentă a plăgii, prin antiseptie riguroasă, drenaj, rezecție sau amputație, tratând focarul primitiv.

Piper. — (*Piper nigrum*, fam. piperaceelor). — Plantă erbacee originară din India, care se cultivă uneori prin florării. Fructele acestei specii constituie productul vegetal, aromatic, cunoscut în comerț sub numele de *piper*, condiment bine cunoscut și mult între-

buințat în bucătărie. Fructele curățite de coaje constituie *piperul alb*. Piperul se întrebuințează ca condiment foarte mult pentru aroma sa, care este fugace, din care cauză el nu trebuie măcinat decât în momentul întrebuințării. În doză *moderată*, piperul este folosit pentru a da gust unor mâncări și pentru a întefi funcțiunile unui stomac leneș. În doză *mare* piperul încălzește mai întâi stomacul, apoi îl irită și îl inflamează, tot așa și intestinul și gura (v. *Condimente*). — La *țară* se dă piper fierț cu vin și cu zahăr să se bea cald pentru ca să asude omul când este răcit, iar pentru colici se înghit nouă fire de piper. Pentru junghiu se pune o hârtie stropită cu rachiu, cu zeamă de lămâie și presărată cu piper.

Piperazină. — Masă cristalină foarte alcalină, cu gust amar amoniacal. Se întrebuințează mai mult *cloridratul*, care este mai stabil, *chinatul* sau *sidonatul* și *tartratul* sau *licetolul*. Piperazina formează cu acidul uric un urat, solubil în 47 părți de apă, din care cauză se întrebuințează pentru eliminarea acidului uric. Se dă în doză de 50 ctigr. până la 2 gr. pe zi, în buline de câte o jumătate de gr. ; sau într'o soluțiune de apă gazoasă ; 5—10 în injecțiuni sub piele. — *Sidonatul* se dă în doză de 5—8 gr. pe zi în buline sau în pachet, dizolvat în apă (tratament de 4—7 zile).

Pir, chir (*Triticum repens* sau *Agropyrum repens*, fam. gramineelor). — Plantă ierboasă care crește prin locuri cultivate și nisipoase, livezi, grădini, fânețe. În medicină se întrebuințează rizomul plantei, care conține nitrat de potasă, diuretic. Se dă sub formă de decoct (fierțură) din 20 gr. la 1000, sau sub formă de extract, cât voești. — La țară se bea fierțură de rădăcină în loc de apă în timpul frigurilor ca să tae setea, fiindcă dacă bei apă curată se prefăce sângele în apă și se dă în *dropică*. Se bea și ca diuretic.

Piramidon. — Praf cristalin, alb gălbui, fără gust apreciabil. Lucrează ca antitermic, analgezic. Se dă în doză de 30 ctgr. până la 1 gr. pe zi, putând merge până la 2 gr. în buline, sau prafuri contra febrei și durerii de cap.

Pirantină.—Este antipiretic și analgezic ca și antipirina. Se dă 1—3 gr. pe zi.

Piranum sau **Pirenol.**—Antireumatismal, antinevralgic, fără să slăbească inima. Se dă în migrenă, nevralgii, reumatism acut sau cronic, astmă, tusă măgărească, în doză de 2—4 gr. pe zi (în 2 sau 3 rânduri) în buline sau în soluție.

Piretru (*Phyethrum caucasicum*, *carneum* et *roseum*, fam. compozitelor).—Florile pulverizate se întrebuințează în contra insectelor (păduchi de lemn, purici, etc.).—*Piretru officinal* (*Antihenis Anacyclus Pyrethrum*, fam. compozitelor). Rădăcina se întrebuințează sub formă de *praf* (ars pe cărbuni), ca strănutător și insecticid, iar sub formă de *tinctură alcoolică* ca sialagog și în contra durerilor de dinți; câteva picături de tinctură de piretru într'o lingură de apă este o gargară minunată și curăță bine gura.

Pirexie (gr. *pyr*, febră, și *achein*, a avea).—Stare febrilă.

Piridină.—Medicament lichid, incolor, foarte volatil, care se amestecă cu apa în toate proporțiunile, cu alcoolul și cu eterul. Se întrebuințează în contra respirațiunii grele (antidispneic), în toate formele de astmă și de opresiune nervoasă, în angina de piept. Bolnavul respiră în timp de 25 minute, de 2—3 ori pe zi, într'o cameră mică în care se lasă să se evaporeze 4—5 gr. de piridină pusă pe o farfurioară.

Pirogalic (Acid), *pirogolol*.—Toxic. Se întrebuințează pe dinafară în boalele de piele (psoriază, lupus, pitiriază capului, herpes tonsurant, eczemă), în șancărul fagedenic, sub formă de pomadă (alifie), 5—20 la 100, sau în soluțiune alcoolică 5, 10 la 100.

Piroză (gr. *pirosis*, ardere), *jăragaiu*, *jăgal*.—Se numește astfel un fel de arsură pe care o simțesc unii oameni în piept, dela lingurea în sus până în gât, la câteva ceasuri după mâncare. Uneori această arsură se însoțește de *răgăituri acre*. Piroza este la unii foarte ușoară încât nici n'o bagă în seamă și trece cu un păhar de apă rece, la alții însă ea este așa de mare încât omul nu se poate liniști câteva ceasuri; la unii vine rar, la alții foarte des.

Cauzele sunt: boalele de stomac, mâncările bogate, mâncările grase, vinul, murăturile de sare și de oțet, substanțele iritante (piperate și ardeiate). **Tratament.** Regin mai mult de lapte; bolnavul se va feri de băuturile alcoolice, de mâncările făinoase, acre, piperate și ardeiate, va mânca lapte, ouă, carne, de tot felul, afară de carne de vânat vechiu, de cârnățarie; se va feri de salată, măcriș, pătlăgele roșii, va mânca legumi verzi și mai puțin din cele făinoase; băuturile calde sunt bune, cafeaua rea. Ca medicamente se recomandă bicarbonatul de sodă, 2—5 gr. pe zi, singur sau amestecat cu carbonat de litină 1 gr.; ape minerale alcaline (Vichy, Slănicul Moldovei).

Pișat.—V. Urină.

Pistru.—V. *Efelide*.

Pita lui Dumnezeu.—V. *Ciuperci* (*Răscovi*).

Pitiriază (dela grec. *pityron*, tărațe).—Este o boală de piele care se arată printr'o scămoșare târâtoasă (furfuracee) a epidermului. Sunt trei varietăți: 1. *Pitiriază simplă*, sau *albă*, care se arată de obicei la pielea capului și câte odată la față; ea constă în niște praf alb cunoscut sub numele de *mătreață*, care se formează uneori în așa de mare câtime încât cade pe umeri și pe haine. Mătreața provoacă o mâncărime, când mai mare, când mai mică și căderea temporară sau definitivă a unei cantități de păr. La față se scămoșează sub formă de pelițe făinoase cari cad într'una. Este o boală cronică ce se vindecă greu și recidivează adeseori. **Tratamentul** constă în spălături dese cu apă caldă și săpun alb, sau mai bine cu următoarea soluțiune: acid salicilic 6 gr., spirt de vin galic (coniac) 250 gr., tinctură de veratru verde 4 gr., apă de Colonia 50 gr. (cu un burete mic muat se va spăla pielea pe la rădăcina părului, de 2 ori pe săptămână).—2. *Pitiriază rozată* sau *roșietică*, se arată mai întâiu la gât, la piept, apoi se scoboară la membre; ea constă în niște pete roșietice de mărimea unui bob de linte până la acea a unui ban de argint de 5 lei și al cărui epiderm se deslăpesc dela centru spre periferie, producând o

inmăncărime mai mult sau mai puțin mare. Durată boalei este de 15—60 zile. *Tratamentul* constă în curățenii (purgative) repetate și în băi căldicele cu tărâțe, cu amidon (scrobeală) la cari se mai pun și 100 gr. borat de sodă, repetate în fiecare zi, sau la 2 zile; în fiecare seară se vor unge pețele cu : borat de sodă 2 gr., gliceroleu de amidon 50 gr. — 3. *Pitiriază versicoloră*, sau *galbenă*, cunoscută în popor sub numele de *pete de ficat* constă în niște pete de culoarea cafelei cu lapte, cari se ivesc pe piept și pe gât; ele se scâmoșează ca tărâțele și dau loc la o mănăcărime, la unii mai mare, la alții mai mică. Aceste pete sunt produse de un parazit numit *microsporon furfur*, care se poate transmite dela om la om. Petele au o culoare galbenă ca paiul, sau mai închisă ca culoarea cafelei cu lapte (poporul le numește pete de ficat fiindcă ar semăna culoarea lor cu a ficatului și el crede că cei cu astfel de pete sunt bolnavi de ficat); ele se pot întinde pe tot spatele și pe partea de dinainte a pieptului. *Tratamentul* constă în băi cu carbonat de sodă de 1—2 ore cu săpunare viguroasă; sau în băi de pucioasă, timp de 8 zile; sau în fricțiuni cu săpun negru, urmat de ungeri cu alifia următoare : acid sulfuric 5 gr., sulf precipitat 20 gr., vaselină 100 gr.; sau în spălături cu sublimat coroziv (2 la 1000); ungeri cu sulf precipitat și cu acid salicilic toate repetate până la vindecare.

Pitoancă. — V. *Ciuperici* (Mănățărăcile).

Piurie (gr. *pyon*, puroiu, și *ourein*, a urina). — Urinare cu puroiu, (v. *Beșică*, *Rinichi* și *Urină*).

Placentă, casa copilului. — Se numește *placentă* (cuvânt latin care pe românește însemnează *plăcintă*) partea cea mai groasă și mai cărnoasă a casei copilului prin care se fac schimburile între mamă și făt. Placenta conține vasele ombilicale. Ese din mîtră la scurt timp după ce s'a născut copilul; dacă ieșirea întârzie prea mult trebuie s'o scoată medicul, pentru că altfel se poate produce o emoragie mare, care să aducă moartea mamei, sau o infecție puerperală (frigurile facerii). Ea

trebuie scoasă toată, pentru că o bucată cât de mică, dacă ar rămâne în uter, poate pricinui o infecție puerperală.

Plăcere. — Plăcerea nu este o senzație (simțire), ci ea însoțește senzațiunea. Ea este un sentiment care rezultă din satisfacțiunea unei inclinațiuni (aplicări) naturale sau factice, mai cu seamă a unui instinct, sau a unei trebuințe organice. Plăcerea este legată de funcționarea regulată și armonică a organelor și de reparațiunea regulată a pierderilor produse de activitate.

Plăgă (lat. *plaga*, *vulnus*, grec. *trauma*), *rană*. — Se numește plăgă orice tăietură sau în termeni medicali orice soluțiune de continuitate făcută cu voință, sau din întâmplare (operație chirurgicală, omucidere, sinucidere, accident) într-o parte moale a corpului. Astfel o tăietură, o înțepătură, o rănire făcută cu un glonț se numesc *plăgi*, pe câtă vreme arsurile, o lovitură care nu rupe pielea, o ruptură de os (fractură) sau o scrintire se numesc numai *răniri* (v. *Răniși* și *Rănire*). Plăgile sunt de multe feluri și prezintă numeroase varietăți de forme și de dimensiuni (întinderi). Vindecarea plăgilor se face *prin primă intențiune* când buzele lor se lipesc repede între ele, fără întrepunerea unui țesut de nouă formațiune; când țesuturile sunt prea mult divizate, când este pierdere de substanță sau inflamație, vindecarea se face prin *cicatrizare*. *Tratamentul* plăgilor constă în a înlezni reunirea lor printr-o poziție bună, prin cusătură, prin bandaje aglutinative, provocând scurgerea lichidelor septice și combătând complicațiunile cari se prezintă prin *pansamente* apropiate (v. articolele mai sus citate și *Pansamente*). *Accidentele plăgilor sunt* : *durerea*, care este mai mult sau mai puțin mare, după gradul de inflamațiune și după țesutul rănit și care se combate prin tratamentul general al plăgii, prin darea pe dinăuntru a medicamentelor zise *narcotice* (opiu etc.) sau printr'un pansament făcut cu alifie calmantă; — *aprinderea* sau *inflamația* și *febra traumatică*, mai mult sau mai puțin vie, după întinderea plăgii, după natura corpului care a produs plaga,

după sănătatea generală a rănitului; — *pierderile de sânge sau emoragiile*, primitive sau întârziate; — prezența în plagă a unui *corp străin* — *accidente nervoase, emfizem traumatic, septicemie*.

Plămân (lat. *pulmo*, grec. *pneumon*), *pulmon*, *bojoc*. — Plămânul este organul *respirației*. Invelișul plămânului se numește *pleură*, care este o membrană seroasă. Omul are doi *plămâni*, unul în dreapta și celălalt în stânga; ei sunt așezați fiecare în jumătatea corespunzătoare a coșului pieptului; între ei se află *inima*. Forma fiecărui plămân este aceea a unei jumătăți de con cu *baza* în jos, care bază este foarte lată și concavă fiind în atingere cu *diafragma*. Vârful plămânului este îngust, rotund și atinge coasta întâia. Plămânul drept este mai mare decât cel stâng. Fiecare plămân este format de un mare număr de cuiburi rotunde ca niște beșicuțe, apăsate unele asupra altora; în aceste cavități mici vin




Fig. 351. — Plămânul și inima văzute din față

1 = cartilagiul tiroid (mărul lui Adam); 2 = trachea; 3 = vena cavă superioară; 4 = aorta; 5 = artera pulmonară; 6 = plămânul stâng; 7 = plămânul drept; 8 = inima

micile rămurele cari constituie extremitatea terminală a bronhiilor (v. *Bronchie*), așa că ele sunt atârinate de aceste rămurele ca boabele de strugure de ramurile ciorchinei. Aerul din afară vine prin aceste rămurele până în beșicuțe, cari toate la un loc constituie țesutul propriu al plămânului. În pereții acestor beșicuțe, (*alveole pulmonare*), se găsesc vase sangvine cu pereți foarte fini, foarte subțiri, prin care sângele vine în atingere cu aerul

dela care ia *oxigen* și îi dă în schimb *acid carbonic* (v. *Respirațiune*). Se zice că plămânii omului adult ar avea între 1700 până la 1800 milioane de *alveole pulmonare*, iar suprafața totală a acestor mici alveole ar reprezenta o suprafață de două sute de metri pătrați. Alveolele pulmonare sunt grupate în număr de 11 până la 15, și chiar 20 sub forma unui fund de sac închis, care se numește *lobul primitiv*, în care se termină o mică ramură bronhică, numită *canalicul respirator*. Mai mulți lobuli primitivi (9—10) se grupează la un loc pentru a forma un *lobul secundar*, în care vine o ramură bronhică mai mare, o *bronchiolă*. Taieturi adânci împart plămânii în mai multe porțiuni numite *lobi*; plământul drept, are *trei* lobii. Coloarea normală a plămânilor este roșie; la cei mai mulți adulți însă colorarea aceasta este închisă și chiar negricioasă prin depunere de particule de cărbune. Supra-




Fig. 352. — Plămânul și inima văzute din spate

1 = cartilagiul tiroid; 2 = trachea; 3—4 = vena subclaviculară; 5 = aorta; 6—7 = trachea; 8—9 = venele pulmonare; 10 = plămân; 12 = inimă

fața plămânilor prezintă o rețea regulată. Umflarea și turtirea plămânilor se face mulțumită țesutului elastic al alveolelor pulmonare și acestea sunt mișcări pasive de oarece plămânii nu fac decât să se acomodeze coșului pieptului în mișcările lui de lărgire și de strângere. *Pleura* este invelișul plămânilor; fiecare plămân își are pleura sa. Cele două pleure sunt niște membrane (pelițe) seroase, cari înconjoară peste tot fiecare un plămân. O pleură se poate asemăna cu un sac fără gură și gol, ai cărui pereți sunt lipiți, așa

că fiecare pleură are două foițe : una *parietală* care căptușește fața dinăuntru a cutiei toracice și fața de sus a diafragmului ; cealaltă foiță, numită *viscerală*, căptușește suprafața externă a plămânului. Între aceste două foițe se află *cavitatea pleurală*, în stare normală, ea nu conține nimic afară de o cantitate mică de lichid, care înleznește alunecarea celor două foițe, una asupra alteia, în mișcările pe cari le face plămânul în timpul respirației.

Boalele de plămân și de pleură. Boalele chirurgicale cum, sunt plăgile sau răniurile, fie produse printr'o lovitură de cuțit, de pumnal, de sabie, fie printr'un glonte de armă de foc, sunt întotdeauna grave. În momentul producerii leziunii cel mai grav accident este *emoragia* (curgerea de sânge), adică *scurparea de sânge*, care poate fi așa de abondentă încât să producă moartea. În aceste cazuri se recomandă odihnă deplină, un pansament asupra rănii, iar bolnavul va suge din când în când bucățele de gheață. Afară de emoragie, care de altfel se poate ivi și mai târziu, se mai poate declara o aprindere sau inflamație de plămân, o *pneumonie*, care este mai gravă decât pneumonia provenită din răceală și pe care vom descri-o mai la vale. Din această cauză trebuie bine îngrijite toată rănila plămânilor chiar dela început. Nu toate răniurile plămânilor se termină prin moarte ; s'au văzut cazuri de vindecare la răniți care avea plămânul străbătut de sabie dintr'o parte până în cealaltă sau de un glonte care a rămas acolo și s'a închisat. *Congestiunea pulmonară*, sau *îngrămădirea de sânge la plămâni*, este de 2 feluri : *activă* și *pasivă*. Cea *activă*, care este provocată de un flux prea mare de sânge, are mai multe cauze : inhalățiuni de vapori iritanți, alternative de frig și de cald, arsură, emoragie cerebrală, febră tifoidă, gută, isterie, paludism, oprirea regulelor, reumatism, etc. Cea *pasivă* are drept cauze : boalele de inimă, când cineva stă culcat pe spate timp îndelungat în cursul unei boale lungi. *Semnele* acestei boale sunt : greutate la respirațiune, tusă, junghiu, apăsare în piept (opresiune), scuipare

cu sânge. **Tratament.** La adulți se vor aplica pe piept revulzive : muștare, cataplasme de în presărate cu făină de muștar, ventuze cu sânge pe locul junghiului, sau cârpe înmuiate în apă rece stoarse bine și acoperite cu gu-




Fig. 353. — Bolnav de pleurezie

1 = cavitatea umplută cu lichid ;
2 = inima ; 3 = tracheea

tapercă ; pe dinăuntru se va da *ergotină* (în injecții sau în potiuune), și mai cu seamă *ipeca*, poligala, etc. În cazurile grave se va lua sânge dela o vână a cotului (200—300 gr.). La copii se va da *ipeca* (20—50 ctgr.) și se vor face fricțiuni cu alcool camforat sau cu terbențină ; în cazurile mai grave se vor face băi calde de 38° (5—10 minute) tot la 3 ore una, sau băi călduțe cu muștar. *Congestiunea pasivă* se va trata după boala care o produce și prin urmare nu ne vom ocupa de ea aci ; bolnavul trebuie să-și schimbe poziția în pat cât se poate mai des. E bine să stea puțin ridicat, având multe perini sub cap. — *Gangrena pulmonară* are următoarele cauze o răcire prelungită, o rănire a plămânului cu rămânerea corpului străin acolo, abcese de vecinătate deschise în bronchie, sau o embolie pulmonară, tuberculoza, boalele infecțioase (pojarul vărsatul, febra tifoidă), diabetul, alcoolismul, boalele de rinichi (Bright), alienația mentală. *Semnele* acestei boale de obicei se produc în cursul uneia din boalele mai sus citate și atunci febra crește ; bolnavul are apăsare mare în piept tușește și scuipe flegmă neagră în abundență, amestecată cu sânge și foarte fetidă (puturoasă) ; halena de asemenea este foarte neplăcută. **Tratamentul** constă în a sus-

ține forțele bolnavului prin *tonice*, *alcooli*, *chinină*; se va înlezni scuiparea dând pe dinăuntru *balsamicele*: esență de terbentină, tinctură de eucalipt, eucaliptol, etc.; se va prescrie iposulfitu de sodă, inhalări cu amestecuri balsamice și antiseptice. — *Pneumonia* sau *pulmonita* este aprinderea, sau inflamația plămânului provocată de un microb numit *pneumococ*. *Semnele*: boala începe cu indispoziție, durere de cap, insomnie, apoi cu un *fior prelungit* și unic; *junghiu* în dreptul țâței, care se mărește prin tuse, prin respirație adâncă; *tusă* chintoasă, la început seacă, apoi după una sau două zile se însoțește de *flegmă gălbue*, *ruginie*, ca zeama de prune, aerată și viscoasă, lipindu-se de fundul vasului, apăsare în piept sau *opresiune* care merge crescând, respirațiile sunt 40 pe minut în loc de 16, *febră mare* (39—40°) cu roșeața obrazilor, uscăciunea limbii, beșicuțe pe buze, udul închis, uneori bolnavul aiurează (are delir). *Pneumonia* își face cursul în 7—10 zile, când căldura scade (se face criza) în 24 ore cu sudori abundente. Complicațiunile pneumoniei sunt: pleurezia, nefrita, catarul biliar, etc. Între cauze se numără frigul, care este o cauză ocazională, iar alcoolismul, influența, sărăcia, etatea adultă sunt cauze predispunătoare; cauza determinată fiind *pneumococul*. *Tratamentul*. *Pneumonia benignă*, adică ușoară, se vindecă singură, fără medicamente. Bolnavul va fi pus într-o cameră mare, bine ventilată, a cărei temperatură se va ține la 18° și va sta cu capul ridicat pe perine. Hrana va consta în lapte dulce, lapte bătut, zeamă de carne (bulion), ouă, cafea, ceaiu, vin vechiu. Se vor da lichide multe ca să se poată elimina toxinele. Pentru *junghiu* se vor pune pahare cu sânge, vezicătoare, se va da *digitală* și medicamente expectorante: poligala, ipeca, kermes, oxid alb de antimoniu, iar în convalescență tonice. — *Tromboza și embolia arterei pulmonare*. Astuparea arterei pulmonare (care duce la plămân sângele negru ca să se oxigeneze transformându-se în sânge roșu) printr'un chiag format pe loc (*tromboză*), sau format într'un punct mai mult sau mai puțin depărtat și adus în artera

pulmonară prin circulație (*embolie*). *Cauzele* trombozei sunt: anevrismul sau vreo tumoră din vecinătate, paludismul oftica, iar cauzele emboliei sunt: un chiag format în inima dreaptă, inflamațiunea vinelor (*flebita*), boalele infecțioase (influența, variola, difteria, erizipelul, febra tifoidă), dar mai cu seamă varicele și umflarea picioarelor la femeile lehuze (*phlegmatia alba dolens*). *Semnele* sunt: sincopă (leșin) și moarte subită, sau: opresiune mare, coloarea vânăță a feței, junghiu, apoi




Fig. 354. — Lobul bronchial (mult mărit)

scuipare de flegmă roșietică închisă, vâscoasă, neaerată care ține mai multe zile. *Tratamentul* preventiv: repaus absolut când cineva suferă de flebită; iar pe piept se vor pune muștare, ventuze. — *Boalele pleurei*. Aprinderea sau inflamațiunea pleurei se numește *pleurezie* sau *pleurită*. În pleurezie se pot forma numai niște exudate fibrinoase, cari se lipesc de pleură sub formă de false membrane sau vilozități, dar se poate produce și o secrețiune de lichid seros, din care pricină avem două feluri de pleurezie: *seacă* și *alta* cu *exudat* (revărsare), și în acest caz lichidul poate fi *seros* (ca apa), *emoragic* (cu sânge) sau *purulent* (ca puroiul). Pleurezia purulentă se mai numește și *empiem*. Formele cari se văd

mai des sunt : pleurezia *seacă* și pleurezia *seroasă*, sau *sero-fibrinoasă*. Pleurezia începe de obicei printr'un *junghiu* strășnic care provine din cauză că cele două foițe ale pleurei, din netede ce erau, au devenit aspre și se freacă între ele la fiecare mișcare respiratoare ; frecarea aceasta se aude foarte bine dacă punem urechia pe acel loc și ascultăm cu băgare de seamă. Pleurezia *seroasă* (cu apă) începe și ea prin *junghiu* provenit tot din frecarea și din producerea falșelor membrane, căci lichidul nu se ivese decât mai târziu, când, ne mai fiind frecare, nu mai este nici durere. Pleurezia cu exudat nu este deci decât o formă mai înaintată a pleureziei seci. Când cantitatea lichidului este foarte mare bolnavul are opresiune fiindcă plămânii sunt comprimați, iar când lichidul este puțin putem constata prezența lui prin percuțiune (ciocnire) și ascultare. Când avem vreo îndoială despre prezența lichidului vom face o înțepătură cu o seringă și dacă dăm de lichid putem scoate puțin ca să vedem și natura lichidului, dacă este limpede, gălbui, sau cu puroiu. Pleureziile se produc sub influența *microbilor*, din care pricină ele se însoțesc de febră (fierbințeală) care poate fi de 38—39—40°. Pe lângă febră și *junghiu*, care de obicei este în dreptul unei țâțe, bolnavul are o tuse seacă, respirațiune scurtă, întreruptă, incompletă și opresiune (apăsare în piept). După ce s'a ivit lichidul (cam după 2—10—15 zile), *junghiul* dispare, dar opresiunea crește în raport cu cantitatea lichidului, bolnavul nu se poate culca decât pe partea bolnavă și aceasta pentru ca plămânul sănătos să poată respira liber. Pleurezia seacă durează dela câteva zile până la câteva săptămâni, uneori și mai mult, pe câtă vreme pleurezia seroasă (cu apă) ține săptămâni și chiar luni. Pleurezia seacă de obicei se vindecă, iar cea seroasă foarte rar se vindecă dela sine, cele mai adeseori însă trebuie să se scoată apa prin puncție și aspirație (*toracenteză*). Dacă nu se face această operație, vindecarea poate încă să se facă dela sine, după mai mult timp, dar atunci rezultă o diformăție a pieptului și modificări grave în condițiunile res-

piratoare. Vindecarea este incompletă și bolnavul rămâne suferind, slab, și în cele din urmă poate să se ofteceze. Cele mai multe pleurezii sunt de natură tuberculoasă, nu toate însă ; ele pot fi produse prin microbul pneumoniei, sau prin agentul încă necunoscut al reumatismului articular ; de asemenea și rănirile pieptului pot da naștere la pleurezii seci, sau cu apă. — *Pleurezia hemoragică*, adică aceea cu apă roșie ca sângele, este foarte gravă și nu se vindecă nici odată, căci ea este produsă sau de oftică (în pleură sunt tubercule) sau de cancer. — *Pleurezia purulentă* este de asemenea cele mai adeseori tuberculoasă, dar ea poate fi produsă și de *microbii supurațiunii*, în urma unei răniri sau a unui abces al plămânului, care a găurit pleura ; ea se mai arată în septicemie, în febra puerperală și mai cu seamă ea poate însoți pneumonia lobară (în care caz ea se vindecă mai adeseori). Pleurezia purulentă este o boală foarte gravă ; bolnavul slăbește și, dacă nu se operează la timp, bolnavul poate muri de septicemie, de slăbiciune sau de oftică ; rar se întâmplă ca puroiul să-și facă singur un drum de eșire printre coaste. *Tratament*. Repaus complet în pat, regim lactat absolut ; clizme laxative și purgative. Pentru *junghiu* se vor pune cataplasme cu muștar, ventuze uscate, sau cu sânge (tăiate) vezicători, dacă durerea este prea mare se vor face injecțiuni sub piele cu morfină sau dionină. In contra febrei (căldurii) se va da salicilat de sodă (4—6 gr.), salipirină, aspirină, antipirină, fenacetină, chinină, etc. In contra tusei se vor da preparațiuni cu opiu, eroină, apă de laur-ceras, tinctură de aconit. Când s'a format *exudat* (pleurezie seroasă) vom da diuretice, sudorifice și purgative saline pentru ca să se resoarbă exudatul, iar pe loc vom pune vezicători. Dacă însă exudatul nu se resoarbe în timp de 15—20 zile și apa este în cantitate mare (2—3 litri) producând dizlocarea organelor și mai cu seamă a inimii, dispnee (respirație grea), insomnie, congestie pulmonară, vom face *toracenteza*. In pleurezia *emoragică* vom scoate lichidul, repetând toracenteza tot la 5—6—7 zile dacă lichidul se repro-

duce. În pleurezia *purulentă* vom face *pleurotomia* sau *empiemul*, adică vom deschide larg cavitatea toracică și vom drena-o, aplicând un pansament uscat; în cazurile mai grave se va face *rezechțiunea costală*. — *Pneumotorax* și *idropneumotorax*, *piopneumotorax*. *Pneumotorax* va să zică introducerea aerului în pleură; iar dacă pe lângă aer este și apă avem *idropneumotorax*, sau puroi avem *piopneumotorax*. Cauzele sunt: găurirea pleurei provocată de tuberculoză, gangrena plămânului, pleurezia purulentă, abcesele ficatului, etc.

Plătăgină, plătangină. — V. *Pătla-gină*.

Pleşcaviță. — Sub numele acesta poporul nostru înțelege mai multe boale de piele cari fac materie și coaje, cum sunt: *eczema*, *ectima*, *impetigo* și *rupia*.

Plesnitoare (*Ecballium elaterium*, fam. cucurbitaceelor). — Plantă erbacee cărnosă acoperită cu peri aspri, care crește pe locuri necultivate, pe malul mării la Constanța, Mangalia și Sulina. Se întrebuințează fructul al cărui suc se stoarce; are ca principiu activ *elaterina*; lucrează ca purgativ violent. Se dă pe *dinăuntru* sub formă de extract de elaterium cu feculă 5—10 ctgr.; sau extract de suc pur 5—10 mgr. *Elaterină*; purgativ drastic; se dă sub formă de tinctură 20—40 picături.

Pleşuvie. — V. *Păr*.

Pletoră (gr. *plethora*, mare cantitate). — Cuvântul *pletoră* însemnează în medicină asupra-abundență de sânge, adică cineva are prea mult sânge. Ea este o stare bolnăvicioasă, contrarie *anemiei*, cu deosebire că *pletora* se vede cu mult mai rar decât *anemia* pe care în zilele noastre o întâlnim la tot pasul, din cauza condițiunilor rele de trai și de igienă în cari trăiește populația săracă, cea mai numeroasă. *Pletora* se vede numai la acei cari trăiesc bine, se hrănesc cu mâncări substanțiale, cari beau vinuri vechi și cari în schimb fac puțină mișcare. *Semnele* pletorei sunt: roșeața pielii, ochii injectați, fața purpurie pulsul plin și tare, mărirea căldurii corpului, lărgirea arterelor și vinelor gâtului, cari sunt umflate și bat tare, aplecare spre somn și amețeli. Cel ce suferă de *pletoră* este expus la pierderi de sânge, la emoragii. Dacă

emoragiile se fac în afară, cum este curgerea de sânge din nas, sau pierderea de sânge prin trânji, nu este rău, dimpotrivă omul se simte mai ușor. Dacă însă aceste emoragii se fac pe *dinăuntru*, mai cu seamă la creier, atunci omul poate avea, pe lângă o *congestiune cerebrală* și *apoplexie* (damba), care uneori poate fi fulgerătoare. Cei ce sufăr de *pletoră* trebuie să se supună la oare cari reguli igienice și anume: să mănânce mai puțin, să se scoale dela masă totdeauna în stare de a mai putea mânca un fel de mâncare, să mănânce numai carne albă (de pasăre) și de vițel, mai mult legume (regim vegetarian), să nu bea vin, nici alte băuturi alcoolice, să doarmă puțin, să umble mult și să ia din când în când curățenie ca să nu fie constipați (câte un pahar mare de apă de Breaza, de 2—3 ori pe săptămână). Dacă, cu toate acestea, omul continuă a suferi de greutate la cap, de amețeli și este amenințat de *apoplexie* cel mai bun lucru este ca să-și pună lipitori după urechi sau să-și lase sânge din vinele cotului.

Pleură (dela grec. *pleura*, coastă sau lature). — V. *Plămân*.

Pleurezie (grec. *pleuritis*, dela *pleura*, membrana seroasă care învelește plămânii, și terminațiunea *itis* care însemnează inflamațiune sau aprindere). V. *Plămân*.

Pleurită. — V. *Plămân* (*Pleurezie*).

Pleurodinie (dela grec. *pleura*, coastă sau lature și *odyme*, durere), *nevralgie intercostală*. — Durere intercostală datorită răcelii mușchilor paretului pieptului. *Pleurodinia* vine repede, pe neașteptate, fără căldură, fără fiori, ceea ce o deosebește de *pneumonie* și de *pleurezie*. Este caracterizată printr-o durere foarte vie, mărită prin apăsare, prin tusă, prin mișcare, etc. Această durere poate fi mărginită la un punct circumscris, sau se poate întinde pe o suprafață mai mare; ea face ca mișcările de respirație să fie foarte dureroase și bolnavul să aibă dispnee (respirație grea). Dacă ascultăm cu urechia nu auzim nimic la plămâni, ceea ce face ca acest *junghiu* să se deosebească de *junghiul* dela *pneumonie* și *pleurezie*. *Tratament*: muștare, ventuze tăiate (pahare cu sânge), vezi-

cătoare, lipitori, pulverizațiuni cu clorur de metil, ungeri cu : cloroform 10 gr., oleiu de iosciam 10 gr., oleiu de camfor 10 gr.; — pe *dinăuntru* : piramidon, antipirină, exalgină, fenacetină, sau injecțiuni sub piele cu morfină, când durerile sunt prea mari.

Pleuro-pneumonie. — Inflamația sau aprinderea pleurei și a plămânului, adică asociațiunea *pleureziei* cu *pneumonia*. *Plămân* și *pleură*).

Pleurostotonos. — V. *Tetan*.

Plevicioare. — Se întâmplă de multe ori că pielea din jurul unghiilor plesnește în mai multe locuri și mai mulți au obiceiul urât de a rupe, sau smulge acele pelițe, în loc de a le tăia cu foarfecile. Pielea plesnește din pricină că, fiind lipită de unghie, aceasta crescând întinde pielea din ce în ce mai mult până plesnește. Pentru a preîntâmpina aceasta cel mai bun lucru este ca din când în când omul să-și revizuiască unghiile și unde vede pielea lipită de unghie și întinsă prea tare s'o deslepească de unghie cu muchia briceagului. Plevicioarele nu trebuiesc rupte sau smulse, ci să fie tăiate cu foarfecile, ca să nu sângereze și să rămână rană, pe unde ar putea pătrunde microbii și alte murdării, dând naștere la sugiu (panarițiu), etc.

Pleznituri. — V. *Crăpături*.

Pleznituri la șezut. — V. *Fisuri*.

Plombaj. — V. *Dinți*.

Plop, plop negru (*Populus nigra*, fam. salicineelor). — Arbore mare frumos, cu coaja crăpată, care crește prin păduri, lunci și zăvoiuri. Se întrebuințează mugurii și ramurile tinere (principiul activ : acidul galic și acidul malic ; salicina). Mugurii se adună primăvara înainte de a încolți și poporul se servește de ei pentru a afuma prin casă punându-i pe cărbuni aprinși cu tămâie, ei răspândesc astfel un miros plăcut și fumul este un bun dezinfectant al odăilor în cari au zăcut bolnavii. Cu mugurii de plop fierți în untură, dacă li se adaugă puțină ceară galbenă și se strecoară, se face o alifie (*unguentul populeu*) foarte bună pentru a unge cu ea de 2 ori pe zi *trânșii* (emoirozii și *bubele dulci* (eczema). Ramurile tinere arse și făcute cărbuni, apoi pulverizate și trecute prin sâță deasă, ne dau un praf de cărbune bun

pentru a fi luat după mâncare, câte o linguriță într'o ceșcuță cu apă, de cei ce sufăr de gaze în stomac, înlezându-le mistuirea și producându-le o mare ușurare. Acest praf mai este bun și pentru spălarea dinților și a gurii, mai ales pentru acei ce au miros de gură.

Ploșniță. — V. *Păduche de lemn*.

Plumb (lat. *plumbum*). — Este un metal moale, ductil, cu tăietură strălucitoare, care, expus la contactul aerului, își pierde luciul, iar când se încălzește suprafața sa se acopere de un strat cenușiu de protoxis de plumb ; dacă se freacă el prezintă un miros și o savoare neplăcută. În medicină nu se întrebuințează plumbul, decât numai sub formă de săruri, însă are numeroase întrebuințări economice și industriale, dintre cari unele sunt vătmătoare sănătății, din cauza emanațiunilor și disoluțiunilor acestui metal și al sărurilor lui, cari, fiind introduse înăuntru corpului prin respirație, prin tubul digestiv sau prin piele, pot da naștere la turburări grave dureri (colici), tremurături, paralizii și altele. Apa venită prin conducte de plumb poate să fie stricătoare sănătății, ceace se poate evita dacă se ia precauțiunea de a nu se bea primele porțiuni de apă cari a trecut prin țevi de plumb nouă, cari n'au funcționat mai mult timp. Vasele în cari se țin substanțele alimentare și băuturile, cum sunt : vasele de bucătărie, cutiile de conserve, vasele de vin, de oțet, etc., cari conțin plumb, fie cât de puțin, pot produce *otrăviri*. — *Otrăvirea cronică* prin plumb, numită și *saturnism*, se observă la lucrătorii cari fabrică, sau umblă cu plumb și cu compușii lui, cum sunt : topitorii de litere de tipar, laminorii, olarii, spoitorii de vase, etc. Dar mai expuși sunt zugravii de case, fiindcă ei sunt în contact zilnic cu *carbonatul de plumb* (ceruză, știubete, alb de plumb), care este foarte otrăvitor. Această sare intră în compoziția unui mare număr de hârtii pictate, zugrăvite, și de farduri sau dresuri, sulimanuri, rumeneli ; el mai servește și la colorațiunea bomboanelor, etc., așa că toți cei ce întrebuințează acestea, încetul cu încetul, se otrăvesc, ceace se cunoaște

la început printr'un fel de *durere* pe care o simt în pânțece, numită *colică de plumb*. Această durere ocupă partea de sus a pânțecului și este foarte vie, continuă, mărită din când în când prin svâcnituri de nesuferit; Ea se însoțește de o *constipație* completă și care cedează cu greutate. Otrăvirea cronică mai aduce după sine *anemie* mare, slăbire, puls mic, o *dungă vânătă* pe marginea gingiilor (depozit de praf de plumb care se elimină prin mucoasă), *halena* fetidă, puturoasă. Mai târziu : pielea își pierde simțirea în unele puncte (*anestezie, analgezie*), sau din contră este prea simțitoare (*iperestezie*); pot să se ivească turburări ale vederii, apoi *paralizia* mușchilor întinzători dela amândouă mâinile (degetele se îndoiesc asupra mâinii, mâna se îndoește asupra pumnului); alți mușchi se mai pot paraliza, iar mușchii paralizați se atrofiază; mâinile încep a *tremura*, tremurăturile se măresc prin oboseala; în cele din urmă pot să se arate turburări cerebrale, adică : dureri de cap, insomnie, atac de apoplexie, spazme, delir, halucinațiuni; la unii se observă *guta* zisă *saturnină*, care este caracterizată prin diformația încheieturilor. *Tratament*. In contra durerilor de pânțece se vor pune cataplasme cu laudan, se vor face injecțiuni sub piele cu morfină. Apoi vom căuta să neutralizăm plumbul din organism, sau să-i înlesnim eșirea prin : *regim lactat, purgative salin* (sulfat de sodă, etc.), prin *băi de pucioasă* cari scot pe piele un strat de sulfat de plumb pe care îl vom spăla cu acid cloridric diluat (20 la 100) și săpun, servindu-ne și de operie. — *Otrăvirea acută* cu sărurile de plumb. Aceste săruri pătrund în corp prin căile digestive, prin respirație și prin piele. *Cauzele* sunt : absorpțiunea unei cantități mari de medicamente, cari au de bază plumbul, mâncarea unui vânat marinat cu gloantele de plumb în el, etc. *Semnele* sunt : gust metalic, sete mare, dureri în stomac, pânțecul tras, constipație, crampe, paralizia membrelor inferioare. *Tratament*. Se va deșerta stomacul dând un vomitiv, se va face o spălătură a stomacului cu o soluțiune de acid sulfuric (1—2 la 1000), apoi se va da

sulfat de magnezie, sau de sodă, 15 gr., în lapte dulce, apă albuminoasă, lapte mult. In medicină se întrebuințează următoarele săruri de plumb : 1. *Acetatul de plumb* (sarea lui Saturn, zahărul lui Saturn), care se dă în contra diareelor cu dureri, a emoragiilor pasive, în contra sudorilor ofticoșilor. Este astringent și siccativ; doză : 1—20 ctgr.; pe *dinafară* în alifii, colire, injecțiuni. 2. *Subacetatul de plumb lichid* (*extractul lui Saturn*) care este un medicament rezolutiv, astringent, siccativ, cicatrizant. Se întrebuințează numai pe *dinafară* sub formă de *apă de plumb* sau *apa lui Goulard* (2 gr. la 100 gr. apă). 3. *Carbonatul de plumb* (*ceruză, știubete*), ca rezolutiv și siccativ, se dă în alifii (10—20 la 100). 4. *Iodurul de plumb* (v. *Iodure*).

Plută. — V. *Nufăr*.

Pneumatoză (gr. *pneuma*, vânt). — Se numește astfel îngrămădirea de gaze în stomac și în mațe. Când cantitatea de gaz este mică se zice *meteorism*; când meteorismul durează timp îndelungat se zice *balonament*; când cantitatea de gaze este foarte mare se zice *flatulență*; când gazele se disloacă cu sgomot se zice *borborisme* sau ghiorăituri de mațe. *Cauzele* pneumatozei sunt : mâncarea multă, producând indigestie sau dispepsie, constipația, înodarea de mațe, peritonita, febra tifoidă, boalele nervoase, etc. *Tratamentul* constă în a combate cauza, sau boala care produce pneumatoza.

Pneumogastrie (gr. *pneumon*, plămân, și *gaster*, stomac). — *Nervul pneumogastrie* (*nervul vag, nervul perechii a zecca craniene*). El iese din părțile laterale ale bulbului și dă ramuri nervoase la faringe esofag, stomac, ficat, la laringe, trachee, plămâni, inimă și rinichi. Acest nerv este *mixt*, adică senzitiv și motor.

Pneumonie. — Inflamațiunea plămânilor.

Pneumotorax (dela grec. *pneumon*, plămân, și *thorax*, piept). — V. *Plămân*.

Poală albă. — V. *Leucoree*.

Poala Sfintei Marii. — V. *Granat*.

Poamă. — V. *Struguri*.

Poame de pământ. — V. *Cartofi*.

Poceală. — V. *Epilepsie*.

Podagră. — V. *Gută*.

PODB

Podbal, podval (*Tussilago farfara*, fam. compozitelor). — Plantă erbacee care crește prin locuri argiloase, calcareoase și umede, pe lângă pâraie, pe coaste și maluri rupte. Foile de podbal adunate toamna sunt bune să se facă cu ele cataplasme pentru scrofula la copii; iar ceaiul îndulcit cu candel este bun pentru tuse. — La țară se vindecă *orbaltul* cu oblojeli făcute cu frunze opărite, iar ceaiul se dă în contra tusei. În Moldova de sus se face sarmale cu frunze de podbal.

Podbal de munte. — V. *Arnica*.

Podofilină. — Este un purgativ, extras din rădăcina plantei *podophyllum pellatum*, fam. berberideelor. Se prezintă sub forma unui praf verde-gălbui, amar, insolubil în apă, solubil în alcool, eter și apă alcalinizată. În doză mică (1—5 ctgr.) face efect cam după 10—12 ore; în doză mare (5—10 ctgr.) face scaune multe amestecate cu bilă (fiere, venin); în doze și mai mari produce colici violente și vărsături. Podofilina se dă în cazurile de constipațiune obișnuită, asociată cu beladonă pentru ca să nu producă dureri; se mai dă în umflăturile de ficat, în cazurile de indigestie însoțită de un gust amar (când are omul mult venin).

Poftă de mâncare. — V. *Apetit*.

Pofte. — Femeile însărcinate câte odată, și numai unele din ele, au *poftă* mai mult sau mai puțin ciudate pentru unele lucruri de mâncare și uneori chiar și pentru lucruri cari nu se mănâncă. În popor se crede cu tărie că aceste pofte trebuie numai decât împlinite, căci altfel femeia pierde, sau se îmbolnăvește rău, sau că copilul se va naște cu pete, alunele, pe corpul lui, cari seamănă cu obiectele văzute sau dorite de mamă. Lucrul acesta nu este adevărat, dar, întru cât neîmplinirea unei pofte la o femeie însărcinată o poate enerva mai mult, decât în starea obișnuită, este bine să i se îndeplinească poftele bune.

Pogană. — V. *Aște*.

Pohăele, pohoială. — V. *Ochiu* (Caractă).

Poiana mărilor. — Localitate muntoasă păduroasă în județul Râmnicul-Sărat, așezată la o înălțime de 650

POJA

metri deasupra nivelului Mării Negre. Are un izvor mineral care în privința compoziției se apropie de acela dela Jitia; el conține clorur de sodiu, bromur de magneziu, iodur de magneziu. Apa nu se întrebuintează; localitatea este puțin cercetată.

Poiana țapului. — Un mic cătun al comunei Bușteni, între aceasta și Sinaia, la o înălțime de 880 metri, frumoasă și plăcută localitate de vilegiatură, cu împrejurimi admirabile.

Pojar, cori, rugeolă, zapor. — Această boală prin sine însăși nu este primejdioasă, însă câteodată ea poate deveni foarte gravă prin complicațiile la care poate da naștere; se arată mai des la copii, care rar scapă de această boală, omul nu ia boala decât odată. Este o boală molipsitoare, cu fierbințeală, însoțită de guturaiu, durere de gât, lăcrimare, tuse și eșirea pe corp a unor pete mici roșii, rotunde, puțin ridicate deasupra pielei și cari se aseamănă cu pișcăturile de purice, despărțite unele de altele de piele sănătoasă și cari sub apăsarea degetului se ascund pentru a se ivi din nou după ridicarea lui. Aceste pete în cele din urmă pier, iar pielea din dreptul lor se scămășează, se prefăce într'un fel de tărațe cari cad. Nu se cunoaște *microbul* acestei boale. Ori care ar fi natura lui, acest microb este foarte slab și pier repede la lumină și la uscăciune, căci nu s'a observat nici odată vreo contagiune prin haine, obiecte, infectate de bolnavul de pojar cu câteva săptămâni mai înainte. — *Semnnele* acestei boale se deosebesc după cele 4 perioade ale ei și anume: 1. Perioada de *incubație* (clocire) ține 7 până la 10 și chiar 20 zile și n'are nici un semn; omul pare a fi cu totul sănătos. 2. Perioada de *invaziune* (năvălire) se arată prin fierbințeală, care începe prin niște fiori neregulați; bolnavul se simte rău, abătut, sdrobot și moleșit; are durere de cap și câte odată greață și vărsături. Fierbințeala nu este așa mare ca la vărsat și după trei zile scade puțin pentru a se ridica pe la a 4-a zi până la 39—40°, când încep a se ivi și petele. Odată cu fierbințeala ochii se înroșesc, strălucesc și lăcrimează; bolnavul începe a strănuta, câteo-

dată îi curge sânge din nas, care este înfundat și umed; afară de acestea o tusa seacă îl cuprinde, însoțit de răgușeală și un fel de înec în piept (opresiune). Copiii mici sunt cuprinși uneori de spasme, de aiurare și de urdinare. Toate aceste semne durează patru până la cinci zile, când începe perioada următoare. 3. Perioada de *erupțiune* (izbucnire), în care se ivesc petele despre care am vorbit la început. Aceste pete încep cu fața, după care se întind peste tot corpul. Ele se ivesc nu numai pe piele, ci și pe căptușeala ochilor, a nasului, a gurii, a înghițitoarei, a răsuflării, a tubului digestiv, etc., de unde și provine lăcrimarea, guturaiul, greutatea la înghițit, răgușeala, tusa, greața, vărsăturile și urdinarea. După 3—4 zile aceste pete încep a se vesteji și a se scămoșa când începe perioada cea din urmă. 4. Perioada de *descuamațiune* (scămoșare), cam în ziua a 8-a până la a 10-a a boalei. Pielea se ridică în formă de tărațe foarte fine cari cad, așa că în 4—6 zile s'a isprăvit. — Peste tot pojarul ține 14 zile și așa cum l'am arătat până aci nu este primejdios. Uneori petele nu se arată de loc (rugeolă *anormală*); alteori se ivesc pete negre (rugeolă *hemoragică*), cari nu se ascund prin apăsarea degetului și în cazurile cele mai rele bolnavul are curgere de sânge, sau face udul cu sânge. Pojarul mai poate da naștere la alte complicațiuni, cum este: *bronchita capilară*, *broncopneumonia* și *gangrena gurii* și a obrazului; curgere de urechi, boale de ochi, de piele, etc. Dar ceea ce este și mai grav este că pojarul pe mulți îi predispune la *oftică* (tuberculoză). — *Tratamentul* pojarului simplu, fără complicații, este mai mult igienic, și are de scop să preîntâmpine complicațiile: bolnavul se va pune într'o odaie mare, bine aerată, bine iluminată și încălzită la 18°; el se va hrăni numai cu lapte, cu supă, băuturi acidulate, apă simplă sau tăiată cu vin, se vor spăla ochii, nările, gura, părțile genitale cu apă boricată, se vor unge buzele, gura, limba, gâtul cu glicerină boricată. Pojarul complicat cere un tratament mai energic. Copilul bolnav de pojar trebuie să stea în casă 4 săptămâni.

Copiii cari șed în aceeași casă cu un bolnav de pojar n'au voie să meargă la școală până ce boala a trecut și s'a făcut dezinfectarea locuinții. De regulă contagiunea (mălipsirea) se face înainte chiar de a se arăta boala; cu câteva zile înainte de apariția petelor copilul are lăcrămare și guturai. Aceasta este perioada cea mai contagioasă; după ieșirea petelor pe corp contagiunea se face foarte rar. De aci se vede cu câtă greutate ne putem păzi de această boală.

Pojarniță, iarba lui Sfântu Ioan, să-nitoare, sunătoare (*Hypericum perforatum*, fam. ibericaceelor). — Plantă erbacee care crește prin fânețe uscate, pe coline aride și prin mărăcinișuri. În medicină se întrebuințează vârfurile înflorite ca excitant, antihelmintic. Se dă sub formă de ceai (infuziune) din 20 la 1000, iar pe dinafară sub formă de ulei. — La țară se întrebuințează pojarnița foarte mult, mai ales pentru vindecarea rănilor. Florile se culeg în Iulie, se usucă și se păstrează; iar din aceste flori se fac cunoscutul *unt de sunătoare* (unt de pojarniță), punând o mână de flori într'o sticlă peste care se toarnă un sfert de Kgr. de unt de lemn, lăsându-se să stea astfel câteva zile. Acest unt este foarte bun pentru tăieturi, arsuri, strivituri, plescaviță, chelie. Pe *dinăuntru* ceaiul de sunătoare se dă pentru tusa, la femeile lehuze pentru potolirea durerilor; iar untul de sunătoare, ca și rachiul făcut cu flori de sunătoare, se dă în urdinare cu sânge (dizenterie).

Police. — V. *Mână*.

Policolie (dela grec. *polys*, mult, și *cholē*, fiere). — Producțiune de fiere (bilă) în cantitate prea mare, care câte odată se scurge prin materiile fecale fără ca să determine vreun accident, alte ori dă naștere la gălbinaie.

Polidipsie (dela grec. *polys*, mult, și *dipsa*, sete). — Sete prea mare, care se observă în boala de zahăr (*diabet*), în boalele cu căldură și nădușeală mare, etc.

Poligala (*Polygala Senega*, fam. poligalaceelor). — În medicină se întrebuințează rădăcina de poligala, care este diuretică, excitantă, expectorantă,

behică; în doză mare purgativă și vomitivă. Se dă sub formă de ceai (infuziune) de 1 la 100; praf 30 ctgr. până la 2 gr. extract alcoolice, 5 ctgr. până la 1 gr., sirop 20—60 gr., tinctură 50 ctgr. până la 8 gr.

Polip (dela grec. *polys*, mult și *pous*, picior). — Este un fel de tumoră (umflătură), uneori este moale și roșietică, alteori mai tare și cenușie; este fixată printr'o parte mai subțire, printr'un fel de picior (pedicul) de locul pe care se dezvoltă. Polipii se observă în regiuni diferite dând naștere la turburări variabile după cum este și locul pe care cresc. De obicei se arată în *nas*, producând un fel de scurgere ca de guturai, o înfundare a nării cu greutate în respirație și bolnavul vorbește pe nas, etc. în *ureche*, producând o scurgere cu durere și surzenie în acea parte; în *gâtleej* (laringe), producând răgușeală și greutate în respirație, în *mitră* dând naștere la dureri în partea de jos a pântecului și la pierderi de sânge, etc. Polipii nu se vindecă prin medicamente, ci numai prin operație, adică trebuie tăiați și scoși afară, iar locul de unde sunt prinși trebuie ars fie cu fierul roșu, fie cu piatra iadului (nitrat de argint), etc.

Polog. — V. *Pat*.

Polovraci. — Mănăstire situată în munții Gorjului, la o înălțime de 550 metri deasupra nivelului Mării Negre. Localitatea pitorească acoperită cu frumoase păduri. Lângă mănăstire se află faimoasa *Peșteră Polovraci*, cu neîntrecuții ei *stalactiți*, din care pricină ea este foarte mult cercetată în timpul verii.

Polygonum bistorta. — V. *Răculeț*.

Polyporus formentarius și **Igniarius**. V. *Babiță* și *Iască*.

Pomadă (lat. *pomatum*, dela *pomum*, fruct). — La început se numea *pomadă* oricare cozmec aromatic, în compoziția căruia intra grăsime și *mere* (frant. *pommès*). Astăzi se numește *pomadă* o preparațiune farmaceutică compusă din materii grase moi (de obicei untură de porc, sau axongie) amestecate cu diferite medicamente, cari se întrebuințează pe dinafară. O pomadă se deosebește de un *unguent*, fiindcă ea nu conține decât foarte puțină, sau de loc, rezină și

este mai moale. Pomezile se aplică pe piele, pe răni, pe diferite umflături (tumori), pe marginea pleoapelor, în nas, pe buze, etc., ungând sau fricționând partea locului. Pomezile sunt de mai multe feluri: *calmanie*, cari cuprind opiu, beladonă, etc.; *fondante* (cari topec o modălcă), cu iodur de plumb sau de potasiu, etc.; *astringente*, *rezolutive*, etc.

Pomniță. — V. *Fragi*.

Pomușoară. — V. *Coacăză*.

Povinoșie. — V. *Miopie*.

Popaz. — Săminte din *Sabadilla officinalis* sau *Veratrum officinalis*, familia liliacelor; o plantă mare erbacee care crește în Mexic. Se întrebuințează în medicină în contra viermilor intestinali, a reumatismelor, a nevralgiilor; este iritant, excitant veninos. Principiul activ este *veratrina*. Popazul se dă pe *dinăuntru*: 10—30 ctgr. In popor, femeile îl întrebuințează pentru păstrarea și creșterea părului. Popazul fiind *otrăvicios* trebuie întrebuințat cu mare băgare de seamă.

Populeu. — V. *Unguent*.

Populus nigra. — V. *Plop*.

Popușoiu. — V. *Porumb*.

Portocal (*Citrus Aurantium*, fam. aurantiaceelor). — Arbore în totdeauna verde, originar din Asia, se cultivă mult în țările din regiunea mediteraniar la noi numai prin case și florării. Fructele sunt bune de mâncare și cunoscute sub numele de *portocale*. În medicină se întrebuințează florile, foile, fructele. *Florile* de portocal calmează (potolesc) sistemul nervos și se dau sub formă de *ceaiu* (2—3 flori pentru o ceașcă de cafea). Din ele se prepară *apa de flori de portocale* din care se ia câte o linguriță într'o jumătate de pahar cu apă îndulcită cu zahăr; *siropul de flori de portocale*, care se dă în poțiuni (30 gr.); *lichiorul* și *bomboanele* de flori de portocale. *Foile* lucrează ca și florile, însă mai slab; se face din ele *ceaiu* (2 foi la o ceașcă), uneori asociate cu mușetel sau cu teiu. *Fructele* sunt de 2 feluri: *portocale dulci* și *portocale amare*, cari sunt fructele arborelui *citrus vulgaris*. Portocalele *dulci* lucrează ca antispasmodice și răcoritoare. Cele mai bune vin din Malta, Portugalia, Baleare, a căror specie mai bună sunt *mandarinele*.

Ele sunt bune pentru bolnavii cari au fierbințeală cu sete mare și pentru convalescenți, cari sug portocalele și mandarinele cu mare plăcere sau beau limonadă făcută din suc de portocale și apă îndulcită cu zahăr. De altfel portocalele sunt bune pentru toată lumea conținând o cantitate mare de vitamine.

Porumb, *cucuruz*, *gârnișor*, *mălaiu*, *păpușoiu*, (*Zea Mays*, fam. gramineelor). — Plantă erbacee, mare și puternică, originară din America (în Mexico crește sălbatică), ce se cultivă mult ca plantă alimentară, industrială și furageră în țările calde și temperate. Porumbul a fost introdus în Europa prin veacul XVI; în Muntenia pe la sfârșitul veacului XVII, sub domnia lui Șerban Cantacuzino (1678—88), în Moldova la începutul veacului XVIII de prințul Constantin Mavrocordat; în Ardeal sub domnia lui Gheorghe Racoți I (1631—48). Prin cultură s'au obținut numeroase varietăți: *cincantin*, *dintele calului*, *hangan* (varietate indigenă precoce, cultivată în comuna Hangu din Moldova) și *Scorumnice*. În România se cultivă foarte mult din pricină că poporul se hrănește pretutindenea cu porumb, din care face *mămăliga* sau *mălaiu*, pe câtă vreme grâul se cultivă numai pentru hrana locuitorilor dela orașe și pentru export. Porumbul ne dă o făină compusă din: 12.80% principii azotate, 58.40 amidon, 1.50 dextrină, glicoză, 7.00 substanțe grase, 1.50 celuloză, 1.10 săruri și 17.70% apă. Este mai sărac decât grâul în substanțe azotate și neazotate (amidon, dextrină și glicoză), dar este cu mult mai bogat în *substanțe grase*, așa de trebuincioase pentru omul muncitor și din care pricină porumbul se întrebuințează pe scară foarte întinsă la îngrășarea animalelor. Valoarea nutritivă a porumbului este recunoscută de cei mai mulți învățați, deși unii îi atribuie însușirea de a fi greu la mistuit, dar să fie de bună calitate și bine copt, *să nu fie stricat*, mucigăit, căci în acest caz el poate da naștere la o boală cumplită care bătându-se populațiunea țării noastre, *pelagră*. Din făina de porumb se face: *mămăligă*, *turtă* în spuză, *mălaiu* în țest, *mălaiu* în

tavă și *jumări cu lapte acru*, *terci*, *păsat*. Afară de aceste forme porumbul se mai mănâncă necopt și atunci se mănâncă fiert sau fript. În *medicină* ceaiul de mătasă de porumb se dă ca *diuretic* (pentru a înlezni udul) și ca *temperant* (10 gr. la 1000), sau sub formă de sirop 20—60 de gr. — La *țară* babele întrebuințează porumbul la multe boale. Astfel: când se oprește udul se iau 2—3 strujeni, vârful de la o mătură de grădină, 10 pătrunjei, se toacă la un loc mărunțel, se fierb în apă, se strecoară și apa se bea în mai multe rânduri amestecată cu sămânță de in pisată. Ceaiul de mătasă de porumb se bea pentru piatră în beșica udului. Cine vede pentru întâia oară în an un porumb înflorit îi ia mătasă, o usucă, o pune în rachie și o bea pentru friguri. Pentru emoragie (curgere de sânge) se bea ceaiul de ciocane de porumb amestecate cu coaje de stejar. Pentru bucele din cap și chelie se spală cu leșie de ciucălăi. Când cineva are dureri de pânțe se înfășoară cu mămăligă caldă, pusă în cărpe. Mămăliga caldă se mai pune amestecată cu măduva de falcă de porc și cu fiere de porc, peste cari se toarnă unt de neft, la *bolfele* dela gât.

Porumbul cucului. — V. *Rodu pă-mântului*.

Posmag. — V. *Pesmet*.

Post. — V. *Abstinență*.

Potârniche. — Carnea de potârniche este gustoasă și se mistuie ușor, mai ales când se mănâncă friptă. Carnea de pui de potârniche este mai ușor de mistuit, mai plăcută la gust și se frige mai iute.

Potasă. — Se obține tratând carbonatul de potasiu, în soluțiune slabă, prin calce stânsă iarăși în soluțiune slabă și fierbând acest amestec într'un cazan de fier. Potasa obținută în modul acesta nu este curată, de aceea se tratează cu alcool de 90°. Potasa curată este solidă, unsuroasă la pipăit, albă, fără miros, cu gust acru și arzător. Dacă punem potasă pe piele ea o arde, o distruge repede, pentru care motiv ea se întrebuințează numai pe *dinafară* (v. *Caustice*). În cazurile de otrăvire cu potasă cel mai bun antidot este apa cu oțet, ca și pentru

celelalte *alcali* (v. acest cuvânt). Potasa se combină cu diferite acide și formează săruri, dintre cari cele mai de căpetenie sunt: 1. *Acetatul de potasă*, care se întrebuințează ca aperitiv, diuretic și fondant, în doză de 1—10 gr. 2. *Azotatul de potasă* sau *nitratul de potasă* (*nitru, salpetru*), care în doză mică lucrează ca diuretic, în doză mai mare ca contra-stimulent (50 ctgr. până la 2 gr., sau 4—8 gr.). 3. *Carbonatul de potasă* (sare de tartru) se dă în boalele de piele pe dinafară, în soluție de 1 la 10. 4. *Bicarbonatul de potasă*, antiacid, antigutos, litontritic, în doză de 1—5 gr. 5. *Clorat de potasă* (v. *Clorat*). 6. *Clorur de potasiu*, febrifug, fondant, purgativ; 1—4 gr. 7. *Iodur de potasiu* (v. *Iodure*). 8. *Bromur de potasiu* (v. *Bromure*). 9. *Fosfatul de potasă*, purgativ, 20—50 gr. 10. *Sulfatul de potasă*, aperitiv, purgativ ușor, 4—8 gr.

Poțiune (lat. *potio*), *băutură*. — Preparație lichidă compusă cu unul sau mai multe medicamente, care se ia pe dinăuntru cu lingura sau lingurița, după etatea bolnavului și după tăria medicamentului. Poțiunile se împart în: *calmante*, cari cuprind extract sau sirop de beladonă, de opiu, sirop de gumă, apă de laur-ceras, etc.; *cordiale*, cari cuprind apă de mentă, scorțișoară, rom, coniac, *expectorante*, cari cuprind kermes, benzoat de sodă, sirop de tolu, poligala, etc.; *vomitiv*, cu emetic, ipeca, etc.; *purgative*, cu jalapa, mană, etc.; *antivomitiv*, cum este *poțiunea lui Rivière*.

Potroacă. — V. *Veninariță*.

Potroacă, potrocută. — V. *Fierea pă-mântului*.

Poziția corpului. — V. *Atitudine*.

Poziție (In). — V. *Sarcină*.

Praf. — V. *Pulbere*.

Prăjituri, plăcinte. — Din punctul de vedere al igienei prăjiturile nu sunt bune, căci fiind făcute, cele mai adeseori, dintr'un fel de cocă (pastă) grea și nedospită, în care se pun arimate, zahăr și corpuri grase amestecate de obicei cu tot felul de vâpseli, sunt grele pentru stomac, producând răgâituri acre și cu miros urât, durere și lipsă de apetit. Aci vorbim în general, căci nu toate prăjiturile

sunt de o potrivă de rele; astfel: pesmeții (pișcoturile), clătitele precum și prăjiturile făcute din multe foi foarte subțiri nu sunt așa grele la stomac ca sarailie, nugalele și celelalte prăjituri, ale căror nume și compoziție variază, a lor, dar cari toate au cusurul de a avea prea mult zahăr și sunt prea grele la mistuit. În general sfătuim pe gospodine să facă prăjiturile în casă, pentru că cele dela cofetărie, fiind, de multeori, prea vechi sau făcute dintr'un material mai prost, pot să dea multe turburări digestive și uneori chiar intoxicații.

Prapor, sau Prapur. — V. *Epiploon*.

Praz, prați, ceapă blândă, poriu, pur (*Allium porrum*, fam. liliaceelor). — Plantă erbacee bulboasă, care se cultivă ca plantă de bucătărie. Se mănâncă, fără să fie așa de iritant ca ceapa; se pune în supă cu alte legume pentru a-i da un gust plăcut, mâncat crud se mistuie greu. În medicină nu se întrebuințează, dar la țară babele coc prazul și zeama călduță o storc în ureche când are cineva *năjit*, iar cu zeamă de prazi fierț oblojesc *trânșii*.

Precipitat alb, galben, roșu. — V. *Mercur*.

Predeal. — Stațiune climaterică de munte, în Carpați, la o înălțime de 1050 metri deasupra nivelului Mării Negre, în comuna cu același nume. Se găsește pe un platou minunat în jurul căruia se întind munții acoperiți de păduri de brazi, fag, stejar și ulm, în spatele cărora se află vârful de munți, acoperiți de zăpadă chiar și în toiu verii. Predealul cu împrejurimile lui se pot număra între cele mai pitorești stațiuni climaterice și de vilegiatură din țară, în timpul verii. Clima este dulce, plăcută, iar temperatura variază între 15—25°; diminețile și serile sunt mai răcoroase. Această stațiune este foarte bună pentru cei ce suferă de anemie, cloroză pentru cei slabi de piept, cari suferă de bronchită, pleurezie și chiar de oftică la începutul ei, din cauză că aerul aci, din pricina pădurilor de brazi, este ozonizat, curat și balsamic. Predealul este un orașel cu foarte multe vile și case, cari mai de cari mai drăguțe și mai confortabile.

La Predeal sunt și 3 izvoare minerale : unul pe valea Joiței, altul pe valea Râșnovei și altul la Schitul Predeal, care este cel mai important ; aceste izvoare nu se exploatează. Imprejurimile sunt încântătoare : Schitul Predeal, Mănăstirea Redea, Bușteni, Azuga, Sinaia, întreagă Valea Prahovei, Valea Timișului, Brașov, și falnicii Bucegi.

Prelungoasă.—V. *Silnic*.

Prepeliță.—Carnea de prepeliță este foarte gustoasă și bună de mâncat, numai să fie proaspătă, pregătită în ziua în care a fost împușcată, sau cel mult a doua zi.

Presbiopie sau **Presbiție** (dela grec. *presbis* bătrân, și *ops*, vedere. — Se numește astfel un defect al vederii omului, care rezultă din slăbirea ochiului către bătrânețe, din cauză că lentila (cristalinul) nu mai poate să facă o bună acomodatie. Presbiții au vederea limpede, curată, numai când privesc lucrurile îndepărtate, iar lucrurile din apropiere le văd în mod confuz, contrar de ceea ce se întâmplă cu cei atinși de *miopie*, cari văd bine numai lucrurile din apropiere. Imaginea obiectelor apropiate nu se mai face pe retină, ci în spatele ei, pe-câtă vreme la ochiul miopului imaginea obiectelor mai depărtate se face înaintea retinei. Presbiția se arată între 40 și 50 ani, iar omul atins de ea trebuie să îndepărteze obiectele din ce în ce mai mult, ca să le vadă lămurit ; lucrurile prea mici, cum sunt literile de tipar, nu le poate vedea nici depărtându-le și cel ce s'ar sili să le vadă, fără să pună ochelari, are dureri de cap. Cei atinși de presbiție trebuie să poarte ochelari cu sticle convexe (bulbucate) și aceasta s'o facă chiar dela început, ca să nu-și ostenească ochii. Ochelararii trebuiesc aleși de medicul specialist și îndată ce vederea s'a slăbit trebuie să luăm alții mai tari, pentru a-i întrebuința la lucru. Ca regulă generală presbitul trebuie examinat de medicul oculist cam odată pe an, pentru a-i potrive ochelarii.

Prepuțiu (lat. *praeputium*), *sulac*. — Indoitura cutaneo-mucoasă care acopere capul membrului viril (v. *Balanită*, *Erpes*, *Fimoză*, *Parașimoză*, *Șancăr*, *Sifilis*).

Prian. — V. *Vitiligo*.

Priapism (dela grec. *priapos*, penis, membru viril). — Este o stare de erecțiune perzistentă și dureroasă, care se arată în unele uretrite, cistite și mai ales în cistita cantaridiană, în unele boale ale creierului și măduvii spinării, mai cu seamă în loviturile, fracturile și inflamațiunile părții de sus a măduvii. Priapismul se deosebește de *satiriază* prin faptul că în aceasta erecțiunea nu este dureroasă și provoacă raportul sexual, pe câtă vreme în priapism erecțiunea este dureroasă și bolnavul se teme de a avea raport sexual. *Tratament*. Lăsare de sânge locală, băi prelungite, injecțiuni cu laudan, clizme reci, iar pe dinăuntru bromur de camfor și bromur de potasiu.

Primăvara (lat. *ver*). — Pentru igieniști anotimpul cel mai bogat în boale, din cauză că are cele mai mari schimbări de temperatură, iar pe de altă parte pentru că omul este mai neglijent, văzând că a trecut frigul și răcește mai ușor. Tot în acest timp al anului mai este supus omul la boale de stomac și copiii la febrele eruptive (scarlatină, pojar). Pentru a evita toate acestea trebuie să fim cu mare băgare de seamă când intrăm în primăvară ; să nu lepădăm de odată toate hainele groase și flanelele, ci treptat.

Privată. — V. *Latrină*.

Prodrom (dela grec. *pro*, înainte și *dromos*, alergare, cursă). — Starea de indispoziție în care se află omul la începutul unei boale. Așa de exemplu durerea de ceafă, somnul neliniștit, membrele sdrobite sunt prodromele febrei tifoide.

Profesiuni (lat. *professio*), *meserii*, *meșteșuguri*. — Profesiunile, după natura lor, se împart în *salubre* (în mod relativ) și *insalubre*. Se consideră ca profesiuni *salubre* acelea în cari omul lucrează în aer liber, cum sunt agricultorii și grădinarii. Cele mai multe profesiuni sunt însă insalubre, astfel sunt profesiunile cari expun pe om să respire un aer încărcat cu emanațiuni iritante și toxice (otrăvitoare) de materii minerale, sau să trăiască într'un aer prea uscat, prea umed prea confinat (închis), sau neprimenit, prea agitat, prea rece, sau prea cald, etc.,

dând naștere la bronchite, boale de ochi (conjunctive), colici sau dureri intestinale, boale de nervi, reumatism, anemie, (lipsă de sânge), etc., sau îl silesc să stea în atitudine (poziții) vicioase prelungite, producându-i diferite diformități, cum sunt cocoșarea (ghibozitatea) șirii spinării la cismari, croitori, etc. Întru cât privește profesiunile așa zise *libere* și ele își au relele lor, așa de exemplu *medicina*: puțini pot să trăiască în amfiteatre și în spitale, fără ca să sufere fizicește; apoi avocații, profesorii, predicatorii, la câte boale sunt expuși în viața lor, ca angină, laringită (răgușală) cronică, emfizem (năduf), etc.; oamenii de științe, de litere, artiștii, mulți mor în floarea vârstei forțându-și prea mult creerii, etc. Profesiunile având mare influență asupra sănătății, datori suntem să ne întrebăm, când este vorba de copii noștri, ce carieră, ce profesiune să le dăm, care să se potrivească cu natura, cu temperamentul, cu constituțiunea lor, precum și cu dispozițiunile lor intelectuale și morale, alegând pe acelea cari pot să-i influențeze mai puțin în rău, ținând seamă și de *ereditate*. Pe cei cu natură calmă, delicată, cari se împacă cu mișcări mai puține îi vom îndemna spre carierele sedentare (funcționari, etc.); pe cei cu temperament sangvin, vioi, pentru cari aerul închis de cancelarie este neindesulător, îi vom sfătui să îmbrățișeze profesiunile cari se exercită în aerul liber și cari cer mișcare și oboseală, cum sunt agricultura, ingineria, etc., pe cei slabi de piept nu-i vom lăsa să devină cântăreți, artiști, muzicanți din instrumente de metal, etc. Dar, oricare ar fi profesiunea aleasă, omul este dator să-și apropieze sfaturile igienii împrejurărilor lui de traiu, să țină seamă că *alimentația*, hrana muncitorului cu mâna, nu se potrivește cu hrana celui ce lucrează cu mintea (v. *Alimente*); să țină seamă de *îmbrăcăminte*, care trebuie potrivită după felul muncii și după anotimp; să caute cel cu meserie sedentară, să facă plimbări și exerciții în afară de ocupațiile lui profesionale, să nu piardă din vedere pericolele băuturilor alcoolice, ale tutunului, etc. Părinții, înainte de a-și îndruma copii

spre o carieră, să consulte și pe doctorul de casă.

Profilaxie (dela grec. *pro*, înainte, și *phylassein*, a conserva, a păzi pe cineva de un rău). — Se numește astfel meșteșugul de a preîntâmpina producerea unei boale, de a păzi de acea boală pe individ și pe locuitori. Profilaxia a luat o mare dezvoltare în timpul de față, mulțumită progreselor igienii și a cunoștințelor mai precise asupra acțiunii substanțelor medicamentoase, sau alimentare.

Prognostic (dela grec. *pro*, dinainte, și *gnosis*, cunoștință). — Cunoașterea sau prevederea modului în care se va termina o boală, ceea ce se poate judeca după antecedentele bolnavului, după locul, gradul și mersul boalei, după starea forțelor generale ale bolnavului etc. Un prognostic bun se poate face numai printr'un *diagnostic* bun (v. acest cuvânt).

Prolaps (dela lat. *prolabi*, a cădea înainte). — Căderea sau coborârea unui organ, de exemplu: *prolaps al rectului*, înseamnă căderea sau eșirea mațului șezutului, *prolaps al uterului*, căderea mitrei, etc.

Propilamină (*Trimetilamină*). — Se recomandă ca specific în gută și în boalele reumatismale. Azi se întrebuințează mai puțin. Se dă pe *dinăuntru* propilamină, 10—30 picături în poțiune; cloridrat de trimetilamină, 50 ctgr. până la 1 gr. în poțiune.

Prostată (lat. *prostata*). — Glandă care se află numai la bărbat și care îmbrățișează canalul udului, uretra, imediat de desuptul gâtului beșicii. Prostata la copii este în stare rudimentară și nu este pe deplin desvoltată decât numai în epoca pubertății. Forma prostatei este ca aceea a unei castane, a cărei bază corespunde la gâtul beșicii, iar vârful se continuă cu partea membranoasă a uretrei; lungimea și lărgimea ei sunt cam de trei centimetri și jumătate, iar grosimea de un centimetru și jumătate. Prostata secretează un lichid alb, de consistență unsuroasă, care se amestecă cu sperma în timpul ejaculațiunii și îi dă aspectul său alb-lăptos. — *Boalele prostatei*. În primul loc avem aprinderea sau inflamația ei, care se numește *prostatită* și este de 2 feluri: acută și

cronică. *Prostatita acută* este produsă cele mai adeseori de *blenoragie*, de obicei pe la sfârșitul săptămânii a treia, în urma unei oboseli sau a injecțiunilor prea iritante. Ea mai poate fi produsă de lovături, de răceală, de piatră (calcul) sau de o boală din vecinătate (șezut). Intre *semnele* ei avem: o greutate la perineu (sub boașe), arsură în canal pe când trece udul, poftă de a urina și de a eși cu scaunul des, dureri mari în timpul eșirii afară. După ce se face puroi durerile sunt mai mari, svâcnitoare, bolnavul are febră; puroiul se desartă sau prin uretră, sau prin șezut. *Tratamentul* constă în băi calde prelungite, clizme calde de 50⁰ cu scurgere înceată, durând câte o jumătate de ceas, supozitoare (săpunașe) cu morfină sau cu opiu și cu beladonă. *Prostatita cronică* este trecerea celei acute în stare cronică, iar *semnele* ei sunt: dureri vagi în perineu, cari se duc în testicule, coapse și osul crucii: durerile se măresc prin mișcare, mers, ședere prelungită, mai cu seamă în trăsură, scurgere prin uretră a unui lichid lăptos, filant, galben-verzui, alături amestecat cu sânge. *Iperetrofia prostatei* adică *mărirea ei*. Această boală se vede mai mult la bătrâni și are următoarele *semne*: la început poftă deasă de a eși cu udul, mai ales în ultimele ceasuri ale nopții; udul ese fără forță și încet, uneori nu ese tot udul, rămânând o parte în beșică, mai ales dacă omul nu-l poate face atunci când îi vine; mai târziu bolnavul face ud încontinuu, picătură cu picătură (*incontinență* prin regurgitare, sau *incontinență adevărată*). Cantitatea de urină în 24 ore poate fi de 3 litri. La început ea este limpede, apoi ceva mai turbure, noroasă, în urma inflamației beșicii; uneori bolnavii pot avea curgere de sânge din beșică, urinare cu sânge (ematurie). Ca complicațiuni se notează cistita (inflamația beșicii) și nefrita (inflamația rinichilor). *Tratament*. Regim sobru, oprirea dela alcool, mâncări iuți, piperate, ardeiate și dela carne neagră; să nu se facă nici un exces; somn puțin, iar în pat să nu se stea decât 6—8 ceasuri; plimbări scurte și repetate, exercițiu

înainte de culcare, pază de răceală, de excese veneriene, ar fi bine chiar să se oprească raporturile sexuale. Se va combate constipația dând laxative ușoare (nici odată sabur sau purgative drastice) și clizme emoliente; bolnavul să urineze regulat din 3 în 3 ceasuri; nu se vor da narcotice. Când începe a se opri udul, se va deșerta beșica cu sonda, odată sau de mai multe ori pe zi. Când s'a oprit udul cu totul și beșica s'a umflat, iar udul țîșnește picătură cu picătură (prin regurgitare) se va face *sondașul* regulat și în mod cu totul aseptice, iar după eșirea udului se va injecta în beșică și se va lăsa acolo 50—100 gr. dintr'o soluție boricată de 3%. Când nu se mai poate face sondarea se va face *operație*.

Prostie. — V. *Imbecilitată*.

Prostrațiune (dela lat. *prosternare*, a da jos, a doborî). — O stare de abatere, de toropeală foarte mare, fizică sau morală. Prostrațiunea este un semn al mai multor boale generale grave, cum este de exemplu febra tifoidă.

Protargol (*Albuminat de argint*). — Praf fin gălbui, foarte solubil în apă (50 la 100), în glicerină. Antiseptic și caustic care nu irită, recomandat în contra blenoragiei acute și cronice, contra cistitei, conjunctivitelor, ulcerelor rebele, iar pe *dinăuntru* se dă foarte rar în enteritele copiilor, 5—10 ctgr. în soluție. Pe *dinafară* în injecțiuni uretrale, 1—2 la 100;



Fig. 355
Proteza gambei



Fig. 356 — Proteza brațului

în instilațiuni vezicale, 8—10 la 100; în spălături mari uretrale, 1—2 gr. la 1000; în picături contra conjunctivitelor 1 gr., la 100 gr. apă.

Proteză (dela grec. *pro*, în loc de, și *tithesyki*, a pune). — Inlocuirea unui organ pierdut printr'un aparat artificial; aplicarea unei mâni sau picior artificial după ce s'a făcut amputația. **Proteză dentară**, aplicarea unei denturi artificiale. **Proteză oculară**, punerea unui ochi de porțelan.

Protilină. — *Protalina fosforată* este un praf alb-gălbui, fără miros, fără gust; cuprinde 2—7 la 100 fosfor. Tonic excitant al nutriției. **Doză**: 4—10 gr. pe zi.

Protoxid de Azot. — V. *Azot*.

Prun, *perj* (*Prunus domestica*, fam. rozaceelor). — Arbore de origină asiatică, ce se cultivă foarte mult la noi prin ogrăzi, sau livezi, pentru fructele lui plăcute și folositoare numite *prune*, sau *perje*. Prunele coapte sunt bune de mâncat însă nu în cantitate prea mare; prunele necoapte, după cum obișnuiesc copiii să mănânce, produc boale de stomac, urdinare cu sânge. Prunele adunate toamna, opărite și uscate, păstrate bine și ferite de umezeală, preparate adică fierte în apă, la cari se pune zahăr cât trebuie, se mănâncă compot și sunt foarte bune, căci înlesnesc eșirea afară, fiind laxative. — La țară se întrebuințează prunele și ca leac, așa: pruna culeasă și descântată în ziua Crucii se pune la *buba rea*; pentru durere de măsele se pune cu țipirig; zeama de prune uscate și fierte se dă pe inima goală și la întorsul lunii la copiii mici, cari sufăr de limbrici.

Prunus Lauro Cerasus. — V. *Laur-Ceras*.

Prunus Persica, sau **Vulgaris**. — V. *Piersic*.

Prurit. — V. *Mâncărime*.

Prusic (Acid). — V. *Cianhidric* (Acid)

Pseudartroză (dela grec. *pseudēs*, fals, și *arthron*, încheietură). — Se numește astfel o articulație, sau încheietură falsă, care se stabilește între două fragmente osoase separate, sau că acestea au format mai înainte un singur corp unul cu altul și atunci avem *pseudartroză în continuitatea oaselor*, sau că ele n'au fost decât apropiate, alipite și atunci avem *pseudartroză în contiguitate*. Cea dintâiu se observă în fracturile neconsolidate.

Pseudo-Membrană sau *falsă mem-*

brană. — Se numește astfel o membrană (peliță) care se produce în unele boale, cum este *angina dîstetrică*, pe amigdale, în cerul gurii, în nas, în gât, și care se reproduce îndată ce se curăță.

Psihiatrie. — Studiul bolilor mintale și al tratamentului lor. Se poate zice de asemenea *medicină psihică*, sau *medicină mentală*. Bolile mentale au existat de când există lumea. Bolnavii mentali însă erau considerați unii ca inspirați, prieteni ai zeilor, iar alții ca fiind „în prada divinităților infernale”; de aceea, în această epocă de superstiție tratamentul lor era încredințat preoților. Creatorul medicinei mentale a fost Hipocrate. *Pinel*, în 1793, a pus temelia tratamentului moral și spitalizării bolnavilor mentali. Doctrina umanitară susținută temeinic în Italia, Anglia, Germania, Belgia și America a determinat progresul psihiatriei. În zilele noastre *psihiatria* face parte definitiv din științele medicale. (Retezeanu).

Psoriază (dela grec. *psora*, râie). — Boală de piele care se arată sub forma unor coji uscate, strălucitoare, de culoare albuie ca sideful, semănând uneori cu picăturile de lumânare de spermanțet. Mărirea și grosimea acestor coji variază foarte mult, tot astfel și forma lor, care poate fi rotundă (numulară), anulară și neregulată. Prin scărpinare cojile se deslăpesc lăsând în locul lor o piele roșie, lăcuitoare și sângerândă. Psoriaza se poate ivi pe diferite părți ale corpului, dar de preferință se arată la genunchi, la coate, la șele, pe pielea capului, nici odată la palme și tălpi, iar când se ivește în aceste părți boala este de natură sifilitică. Această boală se desvoltă pe încetul și puțin câte puțin în timp de 2—3 luni; ea se vindecă rar și numai după un tratament lung și serios. *Cauzele* sunt necunoscute și boala nu este contagioasă; ea se arată de preferință la cei ce sufăr de artrism, nervosism; unii au învinovățit un microb, care însă nu se cunoaște. *Tratament*. Se recomandă tratamentul igienic și dietetic al artrismului și gutei; *alcaline*, *arsenic*, *iodure* sau *medicațiune tiroidiană*. Cojile se vor curăți prin băi sau fricțiuni; se vor unge energic cu un pământ înmuiat

într'o soluțiune de acid crizofanic în cloroform (15 la 100). Pentru psoriaza sifilitică se va face tratamentul specific (v. *Sifilis*).

Pterigion (grec. *pterygion*, aripioară). O pieleță de formă triunghiulară, care se arată la ochiu, înăuntru sau afară de luminiță și care este produsă de îngroșarea conjunctivei sub forma unui țâsut vascular aderent de corneea. (Fig. 311). Această cărnătie nu se vindecă decât prin operație (v. *Ochiu*) și dacă nu se operează acopere tot centrul corneei.

Ptialină (dela grec. *ptyalon*, salivă). — Este fermentul salivei.

Ptialism (dela grec. *ptyalon*, salivă). — Exagerarea secrețiunii salivei, cunoscută și sub numele de *sialoree*.

Ptomaine (dela grec. *ptoma*, cadavru). Sunt niște alcaloizi cari se produc în timpul putrezirii cadavrelor, prin fermentațiunea materiilor albuminoide ale corpului, sub acțiunea microbilor.

Ptoză (dela grec. *ptosis*, cădere). — Se numește astfel căderea unui organ : rinichiu, uter, stomac, pleoapa de sus (v. *Ochiu*, *Blefaroptoză*).

Pubertate (lat. *pubertas*), *juneță*. Incepe dela 11 ani și ține până la 15 ani; ea este caracterizată prin stabilirea facultății procreatoare. La băiat pubertatea se arată prin dezvoltarea progresivă a membrului viril și a testiculelor, cari devin mai grele și încep a face spermă (sămânță). La fetiță încep să crească sânurile, să se ivească păr la subțiori și pe muntele lui Venus, să se arate regulile (*menstruația*). În amândouă sexele se schimbă vocea și caracterul. Pentru fete se recomandă mamelor să le pună în cunoștința acestei schimbări, să le prevină și să le explice lucrul, pentru ca fetele să nu se sperie când vor vedea pentru întâia dată sângele, mai ales că cele mai multe fete se rușinează să spună mamelor despre venirea periodului.

Pubis (dela lat. *pubere*, a se acoperi de păr). — Se numește astfel partea mediană anterioară a *lighianului*, formată de partea pubiană a fiecărui os iliac.

Pucioasa. — Stațiunea balneară în județul Dâmbovița, comuna Șerbănești-Poduri, departe 18 Km. de

orașul Târgoviște, de care este legată prin cale ferată. Pucioasa se află într'o vale prea frumoasă împădurită, la o înălțime de 350 metri deasupra nivelului Mării Negre. Clima este dulce, aerul curat, uscat și ozonizat, regiunea cu dealuri și înconjurată de păduri, ferită de curenți. Temperatura mijlocie în timpul verii 19°. Apele sunt sulfuroase și feruginoase, opalescente, cu miros pătrunzător de idrogen sulfurat. Băile se fac la temperatură de 28—30°. Sunt bune pentru boalele reumatice și artrite, în scrofuloză, în boalele de piele (eczemă, prurigo, raie, etc.), în boalele învechite de mitră și bășică, poală albă, limfatism, paralizii, intoxicațiuni cu mercur și plumb. În unele cazuri se recomandă apele amestecate cu cele iodurate dela *Vulcana*. Aceste băi nu sunt bune pentru cei bolnavi de inimă și predispuși la congestiuni cerebrale. Se găsesc câteva oteluri, numeroase locuințe țărănești, cari se închiriază cu luna, sau pe întreg sezonul, mai multe restaurante. Sezonul începe la 15 Iunie și ține până la 31 August. Imprejurimile foarte frumoase Mănăstirea Bunea, Vulcana, Lăculețele, Târgoviște, Mănăstirea Dealului, Petrosița, Sinaia.

Pucioasă. — V. *Sulf*.

Puerperală (Febră). — Boală gravă și contagioasă, era odinioară spaima femeilor cari se duceau să nască prin spitale și de unde puține eșiau cu viață. Mulțumită cunoștințelor bacteriologice și măsurilor de antisepsie și a sepsie ce se iau, astăzi febra puerperală a devenit foarte rară și statistică maternităților este cât se poate de bună. Se produce prin introducerea în organism a unui microb numit *streptococ*, care se înmulțește foarte repede; uneori se întovărășește cu un alt microb, *stafilococ* adică se face o *asociațiune de microbi*. Infecțiunea se face în două moduri: bolnava se infectează prin ea însuși printr'o altă persoană, prin contagiune. În primul caz avem ceea ce se chiamă *auto-infecțiune* și aceasta provine din descompunerea unei părți a organelor maternelle (gangrena vaginului și a mitrei), sau a chiagurilor, ori a rămășițelor din casa copilului, sau a păr-

ților putrezite ale unui făt mort; ea mai poate proveni din curgerile otrăvicioase ale vaginului anterioare facerii, din descompunerea lochiilor în urma necurăteniei și a murdăriilor cârpelor și a instrumentelor cu cari se fac spălăturile. În cazul al doilea avem ceea ce se numește *etero-infecțiune*, care provine din acțiunea *mierobilor*, cari la alte persoane pot produce brăncă, difterie, pojar, scarlatină, etc.—În forma *ușoară* avem: ridicarea temperaturii cu roșeața feții pânțelele este lat și nu este dureros, sânurile sunt pline de lapte. În forma *gravă* avem după facere un punct dureros la apăsare, în partea de jos a pânțecelui, într-o parte a mitrei, sau în amândouă părțile, pânțelele se umflă și durerea crește. De obicei bolnava are fiori, temperatura crește și sânurile se ofilesc; apoi încep sughițuri, vărsături galbene-verzui (bilioase); fața se trage, se sbârcește și devine palidă; bolnava cade în stare de toropeală mare, mâinile și picioarele se răcesc; respirația devine grea și întreruptă, vocea începe a se stânge; în cele din urmă se umflă încheieturile, mai cu seamă genunchii. Boala sfârșește cele mai adeseori prin moarte după 3—5 zile, alteori după 10 și chiar 20 zile. *Tratament preventiv* constă în *izolare* și în *îngrijiri igienice*. Femeia care naște trebuie să fie *izolată*, adică să nu primească pe nimeni decât numai pe cei ce trebuie s'o îngrijească, pentru ca pe deoparte vizitatorii să n'o obosească, iar pe de altă parte să nu aducă cu ei diferiți *microbi* producători de boală (*patogeni*). *Îngrijirile igienice* trebuiesc date înainte, în timpul și după facere. Femeile cari au scurgere albă (poală albă), care le produce un fel de opăreală, trebuie să facă cu vr'o 10—15 zile înainte de facere: băi, spălături calde cu hipermanganat 1 1000, dimineața și seara. În timpul facerii trebuie să se observe o curățenie foarte mare. După facere femeia trebuie primenită și ținută întotdeauna foarte curată, să nu miroase de loc și între picioare să aibă continuu vată sterilizată, care se va schimba des; spălături se vor face cu *apă fenicată* (1—3 la 1000), sau cu *acid boric* (30 la 1000), sau cu *sublimat coroziv* (20

cigr. la 1000). Odată febra puerperală declarată vom duce-o la spital cât mai de grabă, întru cât numai medicul este în măsură s'o mai scape dela moarte.

Pui. — Carnea de pui este cea mai ușoară de mistuit, cu mult mai ușoară decât carnea de yacă, de vițel, de oaie și miel, de porc. În același timp ea este și mai hrănitoare, din care pricină se recomandă la cei cu stomacul slab și la convalescenți. Pentru omul sănătos toată carnea puului este bună pentru slabi și bolnavi cea mai ușor de mistuit este aripioara. Puul *fript* este cel mai ușor pentru stomac, mai ales pentru cei slabi și pentru cei convalescenți; *supa de pui* este foarte săracă (v. *Bulion*), iar *mâncarea de pui*, preparată cu orice legumă, este bună pentru toate stomacurile sănătoase.

Pulbere (lat. *pulvis*), *praf*. — Aerul atmosferic este plin în totdeauna cu tot felul de pulberi și cu diferite microorganisme animale și vegetale. Dacă examinăm praful din aer cu instrumente măritoare vedem că el este format dintr'o mulțime de particule foarte diferite ca formă, dintre cari unele sunt neînsuflețite, *inerte*, și altele în-suflețite, *viețuitoare* (vegetale și animale foarte mici). Pulberile *inerte* cari se află în aer sunt de origine *animală*, *vegetală* și *minerală*. Pulberile de origine animală sunt formate din particule de cadavre de insecte, celule de epiderm, bucățele de păr, firicele de lână, etc. Pulberile de origine vegetală sunt formate din celule și fibre vegetală boabe de amidon, polen, spori, bucățele de in, de bumbac, etc. Pulberile de origine minerală sunt datorite pământului și pietrilor, cari prin frecatul picioarelor și al roatelor se sfărâmă și particulele mici se ridică în aer, apoi se mai află particule de fier provenite din tocitul potcoavelor, roatelor, etc., și o mare cantitate de particule de cărbune din fumul coșurilor. Dacă omul respiră un aer încărcat cu astfel de pulberi este expus la aprinderi sau inflamațiuni ale căilor respiratoare: *bronchită*, *pneumonie cronică*; cei mai expuși la aceste boale sunt pietrarii, zidarii, cărbunarii, fochiștii, etc. Aerul încărcat cu praf irită și ochii, îi înroșește, îi inflamează.

Pentru a ne păzi de toate acestea trebuie să respirăm numai prin nas (ținând gura închisă), să purtăm ochelari și să ne spălăm des ochii. Cei ce lucrează în fabricile de chibrituri, de produse arsenicale, sau în acelea în cari se întrebuințează săruri de plumb și respiră acel aer plin de prafuri otrăvitoare, sunt foarte expuși la otrăviri cronice; pentru aceasta se recomandă ca acei lucrători să respire prin anumite aparate cari să oprească praful. Pulberile *vietuitoare* sunt acelea cari conțin diferite animale mici, microscopice, cum sunt diferitele infuzorii, cu ouăle lor și diferite vegetale: spori de criptogame, mucegaiuri și ciuperci, dar cele mai importante dintre toate sunt *microbii*, căci ei sunt mijlocul cel mai bun de propagare a boalelor molipsitoare. Sub numele de pulbere mai înțelegem și substanță solidă sdrobotă și redusă în particule cât se poate de mici, prin mijloace mecanice (piuliță sau mojar, etc.). În medicină se întrebuințează o mulțime de pulberi (prafuri); unele *simple*, când sunt compuse numai dintr'o singură substanță (bicarbonat de sodă, calomel, cărbune, chimică, etc.) altele compuse, când se amestecă mai multe pulberi simple, cum sunt: *pulberea antihelmintică purgativă*: revent, scamonee, calomel în părți egale, cu zahăr 3 părți (doză 50—60 ctgr. pentru copii, 5—8 gr. pentru adulți); sau *pulberea diuretică*: nitru 20 gr., gumă arabică 120 gr., reglică (lemn dulce) 40 gr., nalbă 20 gr., zahăr de lapte 120 gr.; sau *pulberea lui Dower*: nitru 20 gr., sulfat de potasă 20 gr., sulfat de potasă 20 gr., ipeca 5 gr., reglisă 5 gr., extract de opiu uscat 5 gr. (doză 10—50 ctgr.; sau *pulbere de dinți* (v. *Dentifrice*) etc.

Pulmonită.—V. *Plămân* (*Pneumonie*).

Pulpă.—V. *Gambă*.

Puls (lat *pulsus*).—Dacă punem degetul pe arteră simțim o bătaie. Această bătaie se numește *pulsație*, iar simțirea degetului se zice *puls*, care nu este altceva decât lovitura degetului prin umflarea arterei produsă de mărirea presiunii sângelui și iată cum: sângele omului circulă neîncetat în vasele sangvine, fiind pus în mișcare de inimă, ale cărei con-

tracțiuni îl fac să înainteze într'o direcție hotărâtă (v. *Cord* și *Circulație*); fiecare bătaie a inimii împinge sângele arterei și produce o *ridicare* bruscă a pereților ei, urmată de o *turtire* imediată, după care vine altă



Fig. 357. — Cum se ia pulsul

ridicare, cu altă *turtire* și așa mai departe. Ridicările acestea lovesc degetul pus pe arteră și aceste *lovituri* se numesc *puls*. Pulsațiunile arterelor corespund în mod exact cu acelea ale inimii. Pulsul se caută de obicei pe o arteră așezată pe un plan osos, cum este artera *radială*, care se află aproape de marginea din afară a pumnului, sau artera *temporală* la tâmplă, etc. Bătăile pulsului variază după vârstă, după sex și după starea de sănătate. La nou-născuți avem 140 până la 180 de bătăi pe minut; în primul an 115—130, în al 2-lea 100—115; în al 3-lea 90—100; în al 7-lea 85—90; în al 14-lea 80—85; la adult 70—75; la bătrâni pulsul devine mai iute, 80—85. La femei, în orice etate, pulsul bate mai iute ca la bărbați. Inușeala pulsului se mărește când omul stă la căldură, sau în urma unei efortări mai mari, când ridică ceva greu, sau când fuge, după ce a stat la masă



Fig. 358. — Cum se ia pulsul

și în timpul mistuirii, sau când are o bucurie, o emoțiune mare. Dacă voim să avem date exacte asupra diferitelor caractere ale pulsului ne vom servi de un instrument numit *sfigmograf*. În stare de boală pulsul

se schimbă foarte mult, astfel în febră pulsul este mai tare și mai repede, pe câtă vreme în stare de sfârșeală, de leșin pulsul este încet și abia se simte; unele medicamente, cum este digitala, încetinesc pulsul, care se poate să fie așa de slab încât abia se poate număra; acest puls se cheamă *filiiform*. Alteori pulsul, în loc să aibă bătăi separate prin intervale de timp egale, are bătăi cari în unele momente se succed repede, în alte momente se succed mai încet, atunci el se numește *neregulat*; iar când bătăile sunt unele mai tari, altele mai slabe, pulsul se zice *inegal*. În toate cazurile acestea trebuie consultat doctorul, care singur este în stare să vadă și să cunoască la ce boale țin aceste schimbări ale pulsului.

Puncte de foc. — V. Cautere.

Puncție (lat. *punctio*, dela *pungere*, a înțepa), *înțepătură*. — Operație care are de scop de a scoate un lichid cuprins într-o cavitate închisă. Ea se face cu un instrument numit *trocár*, care are forma unei sule găurite. Puncția se cheamă *exploratoare* când o facem cu scopul ca să vedem dacă se află lichid și ce fel de lichid, adică pentru a stabili un *diagnostic*; ea este *curativă* când o facem cu scop de a deșerta o cavitate plină de lichid, cum este în *paracenteză*. Se mai numește *puncție* deschiderea artificială a unei colecțiuni de puroiu cu un bisturiu, deschiderea corneei sau a sclerotice cu un instrument special, etc.

Puncția rachidiană. — Are ca scop scoaterea lichidului cefalo-rachidian



Fig. 359 — Cum se determină locul puncției lombare

(v. acest cuvânt) sau introducerea în acest lichid a unor medicamente, în scop terapeutic. Această puncție se face în diferite regiuni ale coloanei

vertebrale, luând numele lor, de exemplu: puncție cervicală, puncție dorsală, puncție lombară. Dintre toate puncția lombară se practică mai des. Pentru



Fig. 360. — Puncția lombară (bolnavul stând pe scaun)

o puncție rachidiană avem nevoie de un ac de seringă sterilizat, lung de 8—9 cm. Se așează bolnavul culcat pe o lature, sau șezând pe pat, pe scaun, sau pe masă, după cum se vede în figurile alăturate. Se spală locul ales pentru puncție cu alcool, sau tinctură de iod, luăm acul sterilizat (bineînțeles după ce ne-am spălat mâinile cu apă și săpun 10—15 minute, apoi cu alcool) și-l introducem prin piele între două vertebre urmând cu vârful lui marginea de sus a vertebrei celei mai de jos și apăsăm încet, până când observăm că se scurge



Fig. 361. — Puncția lombară (bolnavul fiind culcat)

(uneori țâșnește) un lichid clar, prin ac. Acesta este lichidul cefalo-rachidian, pe care îl culegem într'un vas de sticlă, sterilizat, dacă avem nevoie să-l examinăm la microscop, sau îl lăsăm să curgă într-o tăviță, dacă n'avem nevoie de el. De multe ori avem nevoie să introducem în lichidul

cefalo-rachidian un medicament oarecare și în acest caz, după ce au curs primele picături de lichid, adaptăm o seringă, pe care o avem alături, plină cu medicamentul necesar și-l injectăm. Alteori avem nevoie să dăm afară o cantitate oarecare de lichid, pentru a ușura pe bolnav (în meningită, tumorile craniene, etc.). După ce s'a făcut punctia rachidiană pacientul trebuie să stea culcat cu fața în jos cel puțin 4—5 zile, uneori chiar 7—8 zile.



Fig. 362
Cum pătrun-
de acul în ca-
nalul rachi-
dian

Pungă de gheață. — Adeseori avem nevoie să aplicăm ceva rece pe o parte oarecare a corpului. Gheața, care este atât de trebuincioasă în medicină se sfarmă în bucățele mici și se pune într-o pungă de cauciuc, astupată la



Fig. 363. — Pungă de
gheață

cap; putem pune gheața și într-o bășică de bou, sau, la nevoie s'o învelim într-o bucată de mușama. Punga cu gheață nu trebuie pusă chiar pe piele, căci poate produce o rană, ci trebuie ca între ea și piele să punem o bucată de pânză.

Pulverizație (dela lat. *pulvis*, pulbere, praf). — Este o operație care constă în a arunca asupra diferitelor părți ale corpului, sau într-o cameră, diferite lichide reduse în picături foarte fine, în forma unui praf. Pulverizațiunile se fac cu scopul de a vindeca un organ bolnav (gâtul, laringele) sau de a desinfecta o locuință cu diferite substanțe antiseptice. Pulverizațiunile se fac cu un aparat special numit *pulverizator*, care poate fi construit în diferite moduri.

Pumn. — Se numește regiunea care corespunde cu încheietura antebr-

țului cu mâna. În dreptul pumnului se petrece mișcările prin cari mâna se îndoieste înainte, sau se răstoarnă înapoi. Scheletul pumnului se compune din capetele de jos ale oaselor antebrățului (*radiul* și *cubitul*) și de oscioarele *carpului* (v. *Carp*). Pumnul poate fi atins de aceleași boale ca și celelalte încheieturi (v. *Articulație*), dar cele cari se văd mai des sunt: *entorza* (suctura), *luxațiunile* (scrintirile) și *fracturile* (vezi aceste cuvinte). Pumnul este locul unde se ivește de preferință o mică tumoră lichidă, sau *chist sinovial* (*broască*), ce se desvoltă pe unul din tendoanele antebrățului cari se duc la mână, trecând pe partea dorsală a pumnului și care de multe ori trebuie operată, fiind supărătoare.

Pupat. — V. *Sărutat*.

Pupilă. — V. la *Ochiu*.

Purece (lat. *pulex*). — Insectă bine cunoscută de toată lumea, mai ales în timpul verii și în localurile publice, școli, internate, spitale, mănăstiri. Pुरेची au corpul ovalar, turtit pe lături, de culoare neagră roșietică, lucitoare, cu câte un rând de păr de fiecare înel; capul rotund, ochii ovalari și mari se găsesc înaintea antenelor. În stare adultă پुरेची trăiesc ca paraziții pe corpul omului și a diferitelor mamifere, sau paseri, al căror sânge îl sug. Înțepăturile de purece sunt dureroase fiindcă înțepă pielea și lasă în același timp în rană un lichid iritant, care seamănă cu al păduchilor de lemn. Mușcăturile de purece se văd sub formă de mici ridicături roșii, cari seamănă într-o câțva cu petele pojarului, sau altor erupții, dar de cari se deosebesc prin lipsa de febră (căldură) și prin modul neregulat cu cari sunt împrăștiate pe suprafața pielii.

Purgativ (dela lat. *purgare*, a curăți), *curățenie*. — Medicament care curăță corpul, deșertând din intestine materiile necurate și vătămătoare. Purgativele au o acțiune specială asupra intestinelor, mulțumită căreia omul are scaune dese și abundente. După efectul lor, adică modul lor de a lucra, purgativele se împart în trei clase: *purgativele ușoare*, sau *laxative*, cari nu irită mațele, producând dureri mici și fac unul sau două scaune lichide, între cari avem: miera, mana, ule-

PURG

iul de migdale dulci, prunele uscate fierte, siropul de pierseci, tamarul indian, etc. ; — *purgativele tari*, sau *drastice*, cari sunt iritante și au o acțiune mult mai energică, cum sunt : aloes (sabor), guma gută, jalapa, scamonea, uleiul de croton, colchicul, turbitul, etc. ; — *purgativele saline*, provoacă o secreție intestinală abondentă, între cari avem : citratul de magnezie, sulfatul de magnezie, (sarea amară), sulfatul de sodă, bicarbonatul de potasă, fosfatul de potasă, fosfatul de sodă, clorurul de sodiu (sarea), apele minerale de Breazu, de Slănic, de Carabana, de Buda, etc. — Purgativele se dau de obicei prin *gură* și fiindcă multe au gust amar, rău, se fac diferite preparațiuni cu scop de a le masca gustul și de a le face mai ușor de luat, fără însă ca să-și piardă efectul, astfel sunt : *pișcoturile* purgative, *ciocolatele* purgative *limonadele* și *pilulele* purgative (v. *Giocolată*, *Limonadă*, *Pilule*, *Pesmet*). Aceste purgative sunt *compuse* ; în ele intră două sau trei substanțe asociate între ele, sau câte o substanță purgativă asociată cu o materie inertă, etc. Mai bine este însă să se dea purgativele *simple*, formate dintr'o singură substanță și luate în natură, fiind mai ușor de dozat și cu efect mai sigur (ulei de ricin, sare amară, etc.). Unele purgative se dau prin șezut sub formă de *clizmă* (v. *Clistire*). Purgativele se dau ori de câte ori se simte trebuință de a curăți tubul digestiv de toate materiile de rea natură, cum sunt alimentele rău mistuite, cari, îngrămădindu-se în mațe, produc inflamație și colici (dureri), ghiorăituri (*enterită*), sau materiile putrezite cari fac ca să miroase urât scaunele și cari otrăvesc sângele stând mai mult timp în mațe (*febra tifoidă*), sau în caz de *otrăviri*, pentru a da afară substanțele toxice din tubul digestiv. Intru cât privește doza fiecărui purgativ cetitorul va căuta pe fiecare la locul său (v. *Aloe*, *Calomel*, *Ricin*, *Revent*, etc.).

Purgen (*Fenolftaleină*). — Laxativ și purgativ ; nu se dă în arterioscleroză, hemoragie cerebrală. Se recomandă mult la copii *Doză* : 2—5 ctgr. la copiii de 1—3 ani : 5—15 ctgr. la copiii

PURP

mai mari ; 10—30 ctgr. la adulți ; iar ca *laxativ*, se dă 10 ctgr. dimineața și seara. Se găsește în comerț sub formă de tăblițe de câte 5—10 ctgr.

Puroi (lat. *pus*, grec. *pyon*). — Este un lichid patologic, care se formează prin înmulțirea *microbilor* la suprafața rănilor ; el conține un număr mare de *globule albe* (leucocite) mai mult sau mai puțin alterate, cari însoțită într'un lichid sero-albuminos, afară de acestea se mai află și globule de grăsime. Puroiul se zice de *bună natură* când leucocitele sunt în mare cantitate ; el este de *rea natură* când leucocitele sunt rare și tind a se îngrămădi sub formă de grunzi (cocoloșit). Puroiul de bună natură este omogen, opac și de consistență cremoasă (smântânoasă) ; iar cel de rea natură este grunzuos, translucid, seros și rău legat. După *culoare* putem cunoaște intru câțva și microbul care a produs puroiul, astfel : puroiul gălbui și bine legat este produs de *stafilococul auriu*, cel alb de *stafilococul alb*, sau de *streptococ*, cel galben-verzui și gros de *pneumococ*, cel verzui de *gonococ*, etc. Puroiul ordinar are un miros fad, particular, el poate să aibă miros urât (fetid) când se formează în apropiere de gură, de mațe, de șezut. Un abces oarecare poate avea puroi fetid, ceea ce însemnează că el a fost copleșit de microbi de putrefacțiune (anaerobi). Sunt abcese cari n'au fost produse de microbi, abcese *aseptice*, datorite unei iritațiuni oarecare (o injecțiune cu un lichid iritant, esență de terbenină, etc.). Prognosticul și tratamentul colecțiunilor de puroi atâră de natura microbilor. Este bine să se știe cât mai de vreme dacă bacilul ofteicei (al lui Koch) este cauza, căci este mai periculos și reclamă un tratament deosebit. Puroiul cu streptococi este cu mult mai periculos decât cel cu stafilococi, pneumococi, etc. Mai ales în pleureziile purulente are mare importanță de a se cunoaște natura microbului, dacă este, sau nu, acela a ofteicei.

Purpura. — Prin acest cuvânt se înțelege o erupție de pete *purpurii*, *echimotice*, produse prin *hemoragie* spontană înăuntrul pielei (*intra dermică*). Purpura este produsă întotdeauna de

o infecție sau o intoxicație. Când avem numai pete roșii pe piele purpura se zice *simplă* (*exantematică*); când se însoțește de curgeri de sânge din nas, gură, șezut, se zice *hemoragică*. Purpura se poate ivi și în cursul boalelor *infecțioase*, acute sau cronice (mai cu seamă în infecțiunile digestive), în boalele *toxice*, *discrazice*, în boalele de *ficat*, de *rinichi*, de *sânge*, ale *aparaturii circulare*, ale *sistemului nervos*, în toate *cachexiile*, în *otrăvirile* cu iod, alcool, arsenic, săcară cornută. Petele cari se ivesc pe piele sunt datorite eșirii sângelui din vasele capilare și răspândirii lui în grăsimea pielii; ele nu dispar dacă le apăsăm cu degetul, sunt roșii la început, apoi negre, pe urmă gălbui sau verzui, până când pier cu totul. Forma lor este de obicei rotundă, ele sunt dureroase și ies mai mult pe membre. În purpura *reumatismală* bolnavul are dureri în încheieturi, cari se umflă uneori. În forma *emoragică* bolnavul are curgeri de sânge din nas, prin ud, prin șezut, prin gură, etc. *Tratamentul* constă în tratarea boalei care a produs purpura și variază după cazuri.

Purulentă (Infecțiune). — V. la *Pioemie*.

Pușche. — V. la *Afte*.

Pustulă. — Este o mică umflătură (beșică) a pielii, rotundă, regulată, de diferite mărimi și plină de lichid turbure și opac (puroiu). Când beșica se sparge, puroiul care iese și vine în atingere cu aerul se transformă într'o coajă (crustă) gălbuie, sau neagră și groasă.

Pustulă malignă, *beșica cea rea*, *bubă rea*, *dalac*, *antrax*, *cărbune*. — Această boală, bine cunoscută în poporul nostru provine dela animalele cari au suferit și au murit de *dalac* (*cărbune*, *antrax*, *carbunc*, *contagios*), precum sunt vitele cornute, oile, caii și altele. De aci vine și primejdia mai mare pentru oamenii cari sunt mai mult în atingere cu aceste dobitoace, sau cu produsele lor, cum sunt ciobanii, văcarii, măcelarii, bucătarii, tăbăcarii negustorii de piei crude, plăpomarii, tapițerii, lucrătorii de perii, pieptănarii, etc. Microbul a fost descoperit de învățatul francez Davaine, și este unul dintre cei mai trainici și care se în-

mulțesc mai repede. Răbdă frigul cel mai cumplit tot așa de bine ca și căldura; numai vaporii de apă fierbinte de 100 până la 104 grade îl pot omori. El pătrunde în om printr'o sgărietură mică a pielii, printr'o rană, din care pricină se vede



Fig. 364
Pustulă malignă
la mână



Fig. 365. — Pustulă
malignă la pleoapă (la
început)

buba rea mai mult pe părțile descoperite, cum sunt fața, ceafa, mâinile, picioarele. S'au văzut cazuri în cari microbul a fost transportat la om de muște, albine ori alte insecte, cari l'au luat dela animalele bolnave; mulți capătă boala purtând cojoace argășite rău și făcute din piele de oi moarte de dalac. Cei cari consumă carne crudă, friptă numai pe jumătate, capătă boala la mațe, iar cei cari înghit praf încărcat



Fig. 366. — Pustulă
malignă la pleoapă
(câte sfârșit)

cu microbi capătă pustula malignă la bojoci (plă-mâni). Boala se poate lua și dela om la om. *Semnele* acestei cumplite boale. În locul unde s'a așezat microbul se ivește mai întâiu o pată mică roșie, care se aseamănă foarte mult cu pișcătura de purice și care se însoțește de mâncărime

mare încât vrând-nevrând te face să te scarpini. Această pată se acopere de o beșicuță mică turtită, cenușie închisă și plină cu un fel de apă; mai târziu această beșicuță se sparge și în locul ei rămâne o rană mică roșie închisă, care se usucă, se îngălbeneste,

apoi se înegrește până ce se face ca un *cărbune*. Părțile de desuptul ei se întăresc, tot astfel și cele din jurul ei cari încep a se umfla. In jurul petei celei negre se ivesc beșicuțe albe, sub formă de cerc, cari se măresc, sparg la rândul lor și astfel pata devine din ce în ce mai mare. Pielea din jurul petei se învinețește și se umflă; umflătura crește și se întinde foarte mult și foarte departe. Așa la un om cu o pustulă malignă la față i se umflă tot capul, gâtul până la piept și la mâni. Până aici semnele boalei sunt *locale* și țin 2 până la 4 zile,



Fig. 367. — Ectropion al pleoapei inferioare (după pustulă malignă)

apoi se ivesc semnele *generale*, cari dovedesc că microbii boalei s'au înmulțit așa de mult încât au pătruns în sângele bolnavului și atunci începe fierbin-

teala, care poate ajunge până la 40 de grade. Pătimașul se mai plânge de durere de cap, amețeală, vărsături, urdinare, neliniște și altele. Spre sfârșitul vieții căldura scade și omul moare în 4, sau 6 zile. Se poate întâmpla ca bolnavul să se vindece dela sine, fără căutare, dar rareori; odată ce a început să i se otrăvească sângele nu mai are scăpare decât îngrijit de doctor. — *Tratament*. Cel mai bun lucru, când s'a ivit buba rea, este ca îndată s'o ardem adânc, cu un fier roșu, pentru ca să omorâm microbii până ce nu se înmulțesc, iar nu cum se face la țară: înconjură buba cu un cerc făcut cu piatra iadului și care nu are nici o putere asupra boalei. Bolnavului îi vom da băuturi întăritoare, vin, chinină, alcool, cafea, *rubiazol*. In același timp se va chema doctorul sau mai bine se va duce bolnavul la spital. *Tratamentul* cel mai bun este să se facă injecții, chiar dela început cu *ser anticarbonos*, care se fabrică și la noi în țară.

Putină. — V. *Baie*.

Putoare. — V. *Mefitism*.

Q

Q. S. — Prescurtare din *quantum salis*, care însemnează *atât cât trebuie*, sau *cantitate suficientă*. Formula farmaceutică ce se pune pe o ordonanță medicală, sub o substanță oarecare, pentru a arăta farmacistului să pună din ea *atât cât trebuie*.

Quartz (lampa de). — Dacă se produce o descărcare electrică într'un tub de quartz, care conține mercur, se obțin raze ultraviolete, care se întrebuințează în scop terapeutic. La capitolul „*Helioterapie*” am amintit că razele ultraviolete ale soarelui au acțiune binefăcătoare asupra corpului omenesc și sunt mijlocul cel mai bun de a trata multe boli. Lampa de quartz produce aceleași raze ultraviolete, ca cele solare și ne dă posibilitatea să tratăm bolnavii, cu acest mijloc, în orice anotimp, deci nu suntem legați de prezența razelor solare, pe care nu le putem avea la îndemână oricând. Această helioterapie artificială este mult întrebuințată în cazurile de ra-

chitism, unde ajută refacerea oaselor, îndreptarea lor și îngrășarea copilului. De asemenea aceste raze ultraviolete, produse în cabinetul medicului, sau la



Fig. 368. — Lampă de quartz funcționând

patul bolnavului, sunt de mare folos în tuberculoza osoasă, în cazurile de debilități și anemii, cu deosebire la

copii, și mai ales la convalescenței diferitelor boli infecțioase. Sunt contraindicate în tuberculoza pulmonară înaintată, în bolile cari produc febră mare. Lampa de quartz este ușor de manipulat și ușor de transportat dintr'un loc în altul, în cât bolnavii cu dare de mână o pot instala la domiciliu și pot avea multe foloase dela ea. Copiii pot fi expuși razelor ultraviolete artificiale în timpul ernii, când lipsește soarele și devin mai vioi, au poftă bună de mâncare și se îngrașă. Pielea expusă acestor raze se pigmentează

în tocmai ca după cura de soare. Să nu pierdem din vedere că aceste raze sunt supărătoare pentru ochi, deci trebuie să dăm celor expuși la raze ochelari special construiți, ca să le oprească.

Quasină. — V. *Cuasină*.

Quassia amara. — V. *Cuasia*.

Quercus sessiliflora. — V. *Stejar*.

Quinină. — V. *Chinină*.

Quinlum. — V. *Chinium*.

Quinquină. — V. *Chină*.

Quotidiană (Febră). — V. *Paludism*.

R

R. — Prescurtare care se pune la începutul unei rețete (ordonanțe medicale) și care însemnează *recipe*, primește.

Rabarbură. — *Revent*.

Rabie. — *Turbare*.

Rac. — Unii oameni nu pot mânca raci, din pricină că le provoacă *blândă* (urticarie). *Ochii de raci*, nu sunt ochii adevărați ai racului, ci niște gomoloațe pietroase (concrețiuni calcare), cari se formează în stomacul acestor animale. Ei se întrebuințau în medicină sub formă de praf, care se dădea bolnavilor de stomac, în contra arsurilor și acrimilor; astăzi însă, în locul lor, doctorii dau magnezie, bicarbonat de sodă, fosfat sau carbonat de calce. — La țară ochii de raci se pisează și se beau cu apă când se oprește udul; în popor se crede că ei au puterea de a roade piatra din beșica udului. Se mai dau în rachiul de drojdie, amestecați cu alte leacuri, în contra sculamentului, sau în apă curată în contra frigurilor.

Rac. — V. *Cancer*.

Rac de mare. — V. *Homar*.

Răceală. — Prin *răceală* se înțelege scăderea temperaturii (căldurii) corpului, precum și turburările cari rezultă din aceasta în starea sănătății. Scăderea căldurii corpului se simte cu atât mai mult cu cât a fost la început mai mare. În țările nordice acțiunea unui frig mare produce degerătură, iar *răcelile* sunt aproape necunoscute, în țările temperate, în cari schimbările de temperatură sunt mari și brusce, *răcelile* sunt foarte dese și

degerăturile rare. Răceala *pe dinăuntru* se face când omul bea băuturi reci, cu ghiță, ceea ce face să scadă repede căldura organelor prin cari trec, în mod instantaneu, mai cu seamă căldura stomacului și a mătelor. Această scădere de căldură poate să dea naștere la o indigestie, la colici, la diaree, la vărsături și în cazuri mai grave la peritonită (v. *Băuturi*). Răceala *pe dinafară* se face prin lucrarea aerului asupra pielii, ea este cu atât mai mare cu cât pielea este mai asudată, din cauză că evaporarea, care se face la suprafața pielii, scade căldura corpului. Efectele acestei răceli variază după om, după constituție, după starea organelor lui, încât unul se va alege cu un guturaț simplu, altul cu guturai și tusă, un altul cu durere de gât și răgușeală, al patrulea cu pneumonie sau pleurezie și în cele din urmă chiar cu oftică, un al cincelea cu diferite nevralgii (dureri) sau cu reumatism și așa mai departe. Pentru a scăpa de răceală omul nu trebuie să se scoale noaptea din pat când este înădușit, iar dacă este silit s'o facă să-și ia un halat, sau o haină pe spate și papuci în picioare; primăvara și toamna să iese afară îmbrăcat potrivit, să nu stea în curenți de aer pe stradă, în tren, sau în localurile publice, iar căldura în casă în timpul iernii să fie de o potrivă în toate oăile prin cari umblă. Dacă, cu toate acestea, cineva a răcit să nu facă greșala de a nu se căuta și a se expune și mai departe la răceală, căci astfel omul

RACH

dintr'o simplă tusă cu guturai poate capăta o pneumonie, sau vreo pleurezie, care poate să fie fatală.

Rachialgie (grec. *rachis*, șira spinării, și *algos*, durere). — Durere într'un punct oarecare al șirii spinării. Poate fi spontană sau provocată; ea este un simptom al mai multor boale: meningita spinală, mielita acută, congestie spinală (perioada menstruală), comotivitatea măduvei spinării, meningita tuberculoasă (oftica); apoi în morbul lui Pott (oftica șirii spinării), care se anunță întotdeauna printr'o durere într'un punct oarecare, în cancerul șirii spinării, anevrismul aortei, boalele nervilor spinali, reumatismul mușchilor șirii spinării, în otrăvirea cronică cu plumb, în boalele de mitră și în cele mai multe febre: febra tifoidă, vărsat, pojar, scarlatină, febra galbenă, etc. Durerea de spinare variază foarte mult, atât ca intensitate și acuitate, cât și în întindere și în gradul de iradiere. Apăsarea pe șiră uneori o mărește, alteori nu. Pentru ca s'o găsim trebuie câte odată s'o căutăm apăsând metodic pe diferite părți ale șirii, să percutăm (ciocănim) cu degetul, sau să plimbăm dealungul șirii spinării un burete muiat în apă caldă, prin care metodă se produce o durere foarte vie în locul unde se află boala. Tratatamentul rachialgiei va fi acela al boalei care o produce.

Rachianestezie. — V. *Anestezie*.

Răchită albă. — V. *Salcă*.

Răchitan, *lemmușcă*, *sburătoare bărbătească* (*Lythrum salicaria*, fam. litraceelor). — Plantă mare erbacee, care crește prin locuri umede, mlaștinoase, pe lângă bălți, tufișuri umede (Iulie—Septembrie). În medicină se întrebuințează florile și tulpina, cari lucrează ca astringent, antidiareic, antileuco-reic. Se dă pe *dinăuntru* sub formă de infuziune (ceaiu), 50—100 gr.; praf, 1—10 gr.

Rachitism (*rachitis*, grec. *rachis*, șira spinării). — Este o boală caracterizată printr'o turburare a osificării, care micșorează soliditatea (tăria) oaselor și din care pricină rezultă diferite diformări (șlături) ale scheletului. Această boală se vede mai des în anul al doilea al vieții, apoi din ce în ce se vede mai rar, până în a

RACH

doua copilărie și chiar până în adolescență (junetă); după vârstă avem *rachitismul sugacilor* și *rachitismul tardiv*. — *Cauzele* sunt: întârzierea prea de timpuriu, hrana rea, prea puțină sau prea multă, într'un cuvânt turburările tubului digestiv și urmările lor asupra nutrițiunii generale. Iată cauza rachitismului copiilor mici: umezeala, toate condițiunile igienice rele, de cari sufăr mai ales copiii săraci, în orașele mari, contribuie la ivirea rachitismului. La aceasta se mai poate adăuga obosala (surmenajul) în școală și atelier, care ajută ivirea rachitismului tardiv. Mai expuși sunt copiii



Fig. 369
Copil rachitic



Fig. 370
Copil rachitic

eiși din părinți beți, ofticoși, sau sifilitici. — *Semnele*. De obicei rachitismul se arată între 6 și 8 luni, sau dela un an până la 3 ani și începe prin aceea că copilul devine trist, obosindu-se la cea mai mică mișcare și nesimțindu-se bine decât fiind culcat; apoi începe să aibă febră și să se umfle încheieturile, mai cu seamă genunchii și pumnii; gamba se strâmbă înafară și înăuntru, brațele se diformează. Prin faptul că osificarea oaselor craniului se face mai târziu, capul devine mare. Pieptul nu crește, ceea ce face ca respirația să devină mai anevoioasă. Dinții și măselele încetează de a eși, sau ies în mod neregulat. De altfel tot scheletul suferă o încetinire în dezvoltare sau chiar se oprește pe loc, mai cu seamă picioarele, cari rămân scurte. Dacă copilul nu se tratează la timp, adică din vreme și cum trebuie, boala devine incurabilă și chiar mortală. Durerile, pe



Fig. 371
Scheletul
unui copil
rachitic

cari până aci bolnavul le simțea numai la mișcare, acum devin spontane și din ce în ce mai mari; diareea și febra merg crescând și împiedecă bolnavul de a putea dormi, așa că el slăbește repede. Genunchii se freacă, coapsele se diformează, copilul umblă din ce în ce mai greu, ca o rață, oscilând de pe un picior pe celălalt. Brațele se diformează mai puțin, pe câtă vreme pieptul suferă diforțiuni foarte pronunțate și anume: sternul (osul pieptului) se strâmbă și face o boltitură anterioară, iar coastele de asemenea prezintă umflături, apoi șira spinării, prin faptul că vertebrele se moaie, se strâmbă la rândul său formând o cocoasă mai pronunțată decât osul pieptului. *Tratament.* În cazurile ușoare se recomandă următoarele: să se reguleze sugerile la copiii de țată, mâncările la copiii înțărcați, să se dea lapte fosfatat, bolnavul să stea la aer curat, la țară, pe malul mării sau, în lipsa soarelui, să i se facă tratamentul cu *quartz*. La copiii mai în vârstă se va prescrie o hrană bogată în fructe, fosfate și în azot: lapte, ouă, supe de fasole și linte sub formă de pireu, legume verzi, pâine de făină de grâu cu țărâte. Se vor da preparate cu calciu, între cari *calcigenolul iradiat* este foarte bun, *fosfate* (mai ales de *calce*), *untura de pește*, *fosfor* în doză de $\frac{1}{2}$ până la 1 miligram pe zi, se va da *lecitina*, sub formă de untură de pește lecitinată. Preparatele cu vitamine sunt foarte bune în rachitism și absolut trebuincioase.

Rachiu, *vinars*, *țuică*, *basamac*, *lichior*. Rachiu de *tescovină*, produs prin distilarea tescovinei fermentate, se compune din apă 80—85 părți, iar restul până la 100 cuprinde alcool de vin, alcool amilic, propilic, enantic, caprilic și caproic, etc. — Rachiu de *drojdie* se formează din distilarea drojdiei de vin și cuprinde aproape aceleași substanțe ca cel de tescovină. — *Țuica* este produsă prin fermentarea și destilarea prunelor, foarte răspândită la țară, mai ales în localitățile de jos ale regiunii muntoase, pe dealuri; pe lângă alcool ea mai are și o esență dată de samburi, care-i dă gustul și mirosul ei special. — *Coniacul* este

produs prin distilarea vinurilor de calitate mijlocie; la noi se face mai mult cu alcool luat din cereale, din care cauză acest coniac are mai mult alcool amilic, care e foarte otrăvitor. *Romul* se face din trestia de zahăr, supusă la fermentație și distilare; este compus aproape din părți egale de apă și alcool. Romul din comerț cele mai adeseori este produs din melasa de trestie de zahăr, care este cu mult mai periculos. Romul bun, cum ar fi cel din Jamaica, luat în doze mici, din când în când, la sfârșit de masă, poate fi un stomachic plăcut. Intre rachiurile *artificiale* avem pe acelea făcute din spirt tăiat cu apă, la cari se adaug diferite vegetale, sau esențe de vegetale, cari le dau un gust și o aromă particulară (chimionul, cuișoara, scorțișoara, nucușoara, portocala, chitra, melisa, isma, trandafirii). În comerț se află tot felul de esențe cu cari negustorii fac rachiuri și lichioruri, foarte periculoase, cari strică sănătatea ei omoară pe cel ce abuzează de ele. *Lichiorurile* sunt niște rachiuri în cari, pe lângă alcool și apă, se mai află și zahăr esențe aromatice, provenite din plante. Abuzul de rachiuri se arată prin diferite boale de stomac (gastrită, etc.) prin turburări nervoase, tîmpenie, nebunie, prin boală de ficat, etc.

Rachiu nemțesc sau *tinctură de jalapa compusă*. — Este un purgativ drastic, compus din: jalapa 8 gr., turbit 1 gr., scamonea 2 gr., alcool de 60°, 90 gr. Doza: 10 până la 40 gr., în apă îndulcită cu zahăr, sau se dă cu un sirop: de nerprun, de mană, etc. Acest rachiu nu trebuie luat decât după porunca doctorului (v. *Jalapa*).

Răcirea corpului. — V. *Algiditate*.

Răcitur. — V. *Gelatină*.

Răcoritoare. — Se numesc astfel substanțele cari potolesc setea, acelea cari domolesc sângele, adică îl fac să fie mai puțin excitant și acelea cari ușurează pânțelece înlesnind scaunele. Seta se potolește cu apă proaspătă de bună calitate și cu diferite *limonade*. Substanțele cari ușurează scaunele sunt: mierea, prunele, spanacul, portocalele, strugurii proaspeți, etc. precum și *laxativele* și *purgativele*. Sângele se domolește cu *alcaline*.

Răculeț, cârligat, nodurar, rădăcina șerpilor (*Polygonum Bistorta*, fam. polygonaceelor) — Plantă erbacee care crește prin pășunile umede din munți. Partea întrebuințată în medicină este rădăcina, având ca principiu activ taninul. Lucrează ca astringent. Se dă sub formă de fiertură (decoct), 20 la 1000, extract 1—4 gr. în pilule.

Rădăcină de ghimbir. — V. *Ghimbir*.

Rădăcină de piper alb. — V. *Ghimbir*.

Rădăcină dulce. — V. *Lemn dulce*.

Rădăcina șerpilor. — V. *Răculeț*.

Rădăcini. — Rădăcina (lat. *radix*)

unei plante este partea care crește în pământ în sens contrar cu trunchiul, care crește în aer și în sus; ea nu este niciodată verde din pricina lipsei de lumină și servește pe de o parte de a fixa planta în pământ, iar pe de altă parte de a suga din pământ hrana trebuincioasă. Unele rădăcini sunt bune de mâncat (morcovii, ridichile, etc.), cele mai multe însă sunt *medicinale*, adică au însușiri vindecătoare, de obicei mai pronunțate decât celelalte părți ale plantelor (rădăcina de gențiană, de ipeca, etc.). Rădăcinile se culeg primăvara, sau toamna, primăvara fiindcă atunci rădăcinile încep să adune sucurile ce trebuiesc la dezvoltarea frunzelor, toamna se culeg pentru că sucurile, ne mai fiind necesare decât la dezvoltarea semințelor, se îngrămădesc în rădăcini, cari continuă a se dezvolta până când frigul întrerupe vegetațiunea. Rădăcinile scoase se vor curăți de pământ spălându-se cu mâna, sau cu periuța, fără ca să se atace epidermul, se taie firele rădăcinii și părțile stricate, se înșiră pe ață și se pun la uscat. Rădăcinile uscate și ajunse în mâna farmacistului iau diferite forme de: praf, hapuri, extract, siropuri, vinuri, etc., sau se fac din ele *decocturi* (fierturi) prin fierbere mai îndelungată; nici odată însă nu vor fi numai opărite, cum se fac *infuziile* (ceaiurile); ele se mai *plămădesc* (adecă se fac macerațiuni) în diferite lichide în cari stau timp îndelungat.

Rădiche. — V. *Ridiche*.

Radiografie, Radioscopie, Radioterapie. — Raxe X, descoperite de învățatul profesor Roentgen, din Würtzburg, se întrebuințează în medicină

pentru cercetarea corpului omenesc și pentru vindecarea unor boale. Pentru examinarea corpului putem utiliza razele X în două moduri: obținând imaginea pe un paravan (ecran) fluorescent, ceea ce se chiamă *radioscopie*, sau fixând-o pe o placă sensibilă, ceea ce se numește *radiografie*; tratamentul boalelor prin aceste raze se zice *radioterapie*. Cărnurile se lasă a fi străbătute și nu se mai desenează decât foarte puțin, pe câtă vreme oasele formează o umbră neagră, un desemn negru.—*Radioscopia*: permite

să se vadă mișcările părții examinate; astfel pe un om viu se pot vedea mișcările inimii, dislocările ficatului, mișcările de ridicare și de scoborâre ale diafragmului. — Să vedem acum cari sunt *aplicațiunile* și *lămuririle* cari ni le pot da radiografia și radioscopia. Mai întâiu ele ne arată starea normală a organelor, progresele osificațiunii cartilajelor (sgârciurilor) pe măsura în care omul crește cu vârsta; ele ne mai arată orice corp străin s'ar găsi în corpul omului: un glonț, un ac, o lamă de cuțit, un os de pește, un dinte artificial, un ban, etc.; apoi ne pot arăta orice scintire, sau sărire din loc a unui os, o ruptură de os (fractură), o strâmbare a șirii spinării o atrofie osoasă produsă printr'o paralizie spinală, atrofică, a copilăriei, diformațiunile oaselor mânilor și picioarelor, o piatră în beșica udului, sau la ficat. Razele X ne mai pot arăta dacă lighianul unei femei însărcinate este bine conformat pentru ca să nască ușor, precum și poziția copilului; apoi unele boale cum sunt: anevrismul aortei, pleurezia cu exudat, tuberculoza oaselor, etc. In unele cazuri, dacă introducem în stomac bismut, putem să vedem dimensiunile acestui organ; încurcătura de mațe se poate determina dacă dăm bol-




Fig. 372. — Tub roentgen

navului să înghită argint viu (mercur), care se va opri tocmai în punctul unde se află încurcătura, dându-ne în acel loc o umbră bine vizibilă; tuberculoza plămânilor se poate vedea ușor. — **Radioterapia.** Razele X se întrebuințează într-un mare număr de boale, și anume: în boalele de piele (dermatoze), în diferite tumori (neoplazme), în limfadenii și leucemii, în durerile nevralgice. Intre dermatoze avem chelia, cunoscută sub numele de favus, herpes tonsurant și sicoza bărbii, apoi pruritul nervos și pruritul care însoțește prurigo și lichenul; în toate acestea, precum și în multe alte boli, se obțin succese vădite. Intre neoplazme avem cancerul epitelial al feței, năsului, urechilor, buzelor, limbii, etc., apoi nodulii cicatrici consecutivi operațiunii tumorilor canceroase ale sânului, în fine sarcomele, toate acestea se micșorează sub influența razelor X și



Fig. 373
Radiografia mâinei
la un adult

unele se vindecă, afară de cancerul profund. În leucemie prin razele X se micșorează numărul globulelor albe, se mărește acela al globulelor roșii și cantitatea hemoglobinei, iar volumul splinei scade simțitor, dar, din nenorocire, nu ține mult. Durerile nevralgice faciale, unele dureri de măsele, durerile fulgerătoare ale tabeticilor, se potolească foarte iute sub influența acestor raze, cari au o acțiune analgezică puternică. **Accidentele** produse de razele Roentgen sunt numeroase: diferite turburări din partea inimii (intermitențe în bătaie, palpitațiuni) la oameni sănătoși și mai cu seamă turburări din partea nutrițiunii, cum ar fi: inflamațiuni de piele, căderea părului, stricarea unghiilor, ulcerăriuni rebele, etc. Deci trebuie să fim cu mare băgare de seamă, când umblăm cu aceste raze și să nu ținem pacientul prea mult timp sub influența razelor lui Roentgen.

Radiu (lat. *radius*). — Se numește

astfel osul din afară al antebrațului. La capătul de sus radiul are o căciuliță care se încheie cu o ridicătură rotundă a osului brațului (humerus). Capătul de jos este mai gros și formează o cavitate care primește oasele carpului (arșicile pumnului), constituind cea mai mare parte a articulațiunii pumnului (radio-carpiană).



Fig. 374
Radiu

a = capul osului; b = tuberozitatea; c = corpul osului; d = apofiza stiloidă

Radiul, Radiumterapie.

— Radiul este un element care se găsește în natură într-o cantitate destul de mare, dar combinat cu alte elemente, sub formă de stânci, minereuri, ape, etc. Are proprietatea de a emana (răspândi) căldură, electricitate, lumină.

Căldura emanată de el, din toate combinațiile în care se găsește pe suprafața pământului, contribuie într-o mare măsură la menținerea căldurii de pe pământ, oprindu-l astfel să se răcească. Emanația se face foarte încet, așa că după o mie de ani abia pierde o jumătate din puterea sa, de unde se vede marea valoare a acestui metal, căci radiul este un metal. Descoperit de soții *Petre și Maria Curie*, în anul 1908, este întrebuințat dela acea dată din zi în zi mai mult, în folosul omenirii. Produce, asupra țesăturilor pielei, adânci arsuri, cari sunt vătămătoare când activează asupra pielei sănătoase, dar sunt folosite când sunt aplicate asupra țesuturilor bolnave, în scop de a-le însănătoși. Această acțiune însă este diferită dela un țesut la altul, așa în cât radiul lucrează într'un fel asupra pielei, altfel asupra sistemului nervos, altfel asupra sângelui, etc. Asupra pielei, dacă este lăsat mai mult timp pe aceeași loc, poate să producă răni adânci; asupra sângelui acționează de asemenea diferit, înmulțind globulele albe, dar scăzându-le simțitor dacă acționează timp mai îndelungat. Asupra sistemului nervos lucrează de asemenea, cu deosebire asupra vaselor, pe cari le lezează și sensibilizându-le într'un mare grad. Are o mare putere de acțiune asupra celulelor tinere din

corpul omenesc, distrugându-le mai ușor ca pe cele bătrâne, de aci importanța de a-l aplica mai de grabă asupra cancerului la început, dând astfel posibilitatea de a-l vindeca radical. Una din întrebunțările lui importante azi este tocmai pentru combaterea cancerului, la diferite organe, cu un succes deosebit. După cum spuneam se găsește și în apele minerale, precum și în nămolul din diferite stațiuni balneare, de unde emanându-se activează în mod favorabil asupra reumatismului și gutei. Aceste ape minerale și nămoluri se numesc radioactive și în țara noastră se găsesc în multe localități. Un neajuns mare este că radiul curat, așa cum trebuie pentru a-l întrebuința în medicină, cu deosebire contra cancerului, este foarte scump și din acest motiv se găsește cam greu.

Ragadă (grec. *rhagas*, crepătură, pleznitură). — Se numesc *ragade* mici ulcerăriuni cari se văd în piele și pe mucoasa anală. Ele se arată mai cu seamă la picioare, printre degete, la palme, la nări, la buze, la mamelle, în jurul sfârcului. Numele acesta s'a aplicat mai mult la leziunile *sifilitice*, dar astăzi este aproape uitat.

Răgăituri, răgăieli. — Darea afară din stomac a unor gaze, oricare ar fi compoziția lor. Răgăielile provin din cauza unei mistuiri anevoioase (indigestiuni), grele și incomplete, iar dacă se fac zilnic și după orice mâncare, atunci este un semn că omul suferă de *dispepsie*.

Răgușeală. — Este o turburare a vocii (a glasului), provenită dintr'o îngroșare a cordelor vocale sub influența unei inflamații sau aprinderi (v. *Laringită* și *Voce*).

Râie (lat. *scabies*). — Este o boală bine cunoscută, produsă de un mic animal din familia *arachnidelor* (a păienjenilor), numit *acarus*, sau *sarcoptes scabiei* (căpușe de râie), care este așa de mic încât abia se vede cu ochiul liber; el are forma emisferică, este alb gălbui și are mișcări foarte repezi. Masculul șade în adânciturile umede ale părții celei mai superficiale a pielii, înăuntrul unor beșicuțe mici, așezate și ele în apropierea șanțurilor locuite de femelă. Aceasta rupe pielea cu

fălciile ei și după ce a săpat un fel de tunel (galerie) în piele își depune acolo ouăle și moare. Fiecare femelă face 20—25 ouă, cari în câteva zile ajung la coacere și dau noi acari, cari după 15 zile se reproduc și ei tot așa de repede. Doi indivizi, mascul și femelă, pot da naștere în 3 luni la un milion și jumătate de indivizi; așa se explică cum de în timp așa de scurt boala se întinde la tot corpul. — Când un animal s'a așezat pe mâna omului, sau pe altă parte a lui, începe să-și sape șanțul, sau tunelul în piele, în lungime de unul sau doi centimetri; în dreptul acestui tunel omul simte o mâncărime mare, care îl silește să se scarpine, ceea ce produce erupțiuni de pete roșii și mici bubulițe pline de apă, care, scurgându-se, se




Fig. 375. — Râia

1=parazitul mascul; 2=parazitul femeie; 3=galerii săpate sub piele

usucă și face coji cari miroase urât. Locul de predilecție al râiei este acolo unde pielea este mai fină, mai subțire: la mâni și picioare printre degete, la palme, la sânuri, la subsori, în stinghii, etc. Dacă am deschide cu un ac un tunel, găsim la un capăt al lui animalul sub forma unui punct mic alb-gălbui, uneori roșietic, lucitor, moale. — Râia se întinde dela om la om prin atingere mai îndelungată, dormire împreună într'un pat, sau îmbrăcând aceleași haine. De altfel râia se află și la câini, la pisici, cai boi, oi, etc. dela cari o poate lua și omul. — *Tratamentul.* Înainte de a se cunoaște bine râia, vindecarea ei se făcea foarte greu și în timp îndelungat. Astăzi ea se poate vindeca în 4—5 zile. Pentru aceasta bolnavul se freacă bine

cu săpun ordinar, sau, dacă avem, cu săpun de păcură, negru, care moaie pielea și deschide șanțurile prin cari trăiește animalul; apoi face o baie de o jumătate de ceas și după eșirea din baie se unge bolnavul peste tot corpul, afară de cap și față unde nu se întinde râia niciodată, cu *alifie de pucioasă*. În timpul acesta hainele bolnavului sunt puse într'un cuptor cald de 80—100°, sau în lipsă de acest cuptor se afumă cu pucioasă pentru ca să moară toți paraziții din ele, după care bolnavul se îmbracă, sau se fierb într'un cazan. Există multe medicamente cu cari putem vindeca râia; cal mai bun și eftin este pucioasa (sau sulful) despre care am vorbit mai sus. Lucrul de seamă în tratament și pe care să nu-l uităm, este ca odată cu ungerea corpului să schimbăm rufăria de pe noi cu alta curată, căci altfel nu scăpăm de boală. Tratamentul să fie făcut în același timp de toți ai casei cari sunt bolnavi.

Ral (lat. *rhonchus*). — Sub numele de *raluri* se înțeleg în medicină tot felul de sgomote anormale (hârcăituri) cari se aud în piept și cari sunt produse de aerul care merge în plămâni, în cazurile când omul suferă de bronchită (vezi acest cuvânt), din cauza lichidului care se găsește în cantitate prea mare când bronchiile sunt inflaminate. Aceste raluri se găsesc și în pneumonie, emfizem, oftică; ele se aud foarte bine când punem urechia pe piept. Nu trebuie să se confunde aceste raluri cu sgomotul sau mai bine zis *horcăitul* omului, care trage să moară, numit *ral tracheal* și care rezultă din trecerea aerului printre mucozitățile (scuipatul) ce se îngrămădesc în gâtul muribunzilor, în urma paraliziei progresive a respirației și care este un semn al *agoniei*.

Ramolismient cerebral. — V. *Inmoriere de creeri*.

Rană. — V. *Plagă și Ulcer*.

Rana trănșilor. — V. *Pelagă*.

Răniți, răniri. — De obicei cuvântul de *rănire* se aplică cu înțeles mai restrâns, la o *plagă*, dar în înțeles mai larg cuvântul *rănire* înseamnă o uniune locală, care rezultă dintr'o violență exterioră, cu, sau fără o soluțiune de continuitate a părților su-

perficiale, a pielii. Prin urmare, *rămirile* cuprind nu numai plăgile, ci și contuziile (loviturile), entorzele și luxațiile (scrintirile), fracturile (frânturile de oase), arsurile, etc. De multe ori doctorul este chemat să lumineze justiția asupra naturii și a urmărilor unei răniri și atunci trebuie să se știe că rănirile sunt *ușoare* când ele nu împiedecă pe om de a munci (incapacitate de muncă) mai mult de 20 zile, *grave* când această incapacitate ține mai mult. Rănirile sunt deplin sau *complet* vindecabile, sau *incomplet*, după cum ele lasă sau nu lasă după vindecare vreo turburare în sănătate, sau după cum ele lasă în infirmitate (neputință) temporară, sau permanentă. *Primele îngrijiri ce se dau răniților*. Când cineva s'a rănit, sau este rănit, acasă la el sau în casă particulară, iar nu pe drum, cel dintâi lucru este de a-l pune pe un scaun, cu picioarele pe un scăunaș, cu spațele sprijinit pe perini, sau și mai bine, de a-l pune într'un pat. Camera să fie aerată și ocupată numai de puține persoane, numai de acelea cari sunt absolut trebuincioase și aceasta pentru ca rănitul să aibă destul aer și să stea liniștit. Rănitul trebuie desbrăcat cu blândețe și pricepere, fără grabă, pentru ca să nu i se mărească suferințele dar nici prea încet ca să nu se obosească. Hainele cari nu se pot desbrăca cu înlesnire se vor tăia, pentru ca să micșorăm suferințele rănitului. Dacă curge sânge se va încerca oprirea lui cu apă rece, cu apă cu oțet, cu scroieală, cu piatră acră, cu perclorur de fier, etc. (v. *Emoragie*). Dacă rănitul este aproape să-și piardă cunoștința, sau să leșine, se stropește pe față cu apă rece, i se pune sub nas eter, sau amoniac, ca să respire, sau i se dau câteva picături de eter în apă, puțin coniac sau rom. Dacă cumva vedem că un membru (mână sau picior) nu poate face nici o mișcare voluntară, dar este cuprins de tresărituri sau mișcări produse de greutatea lui, cari produc dureri rănitului, atunci de sigur că acel membru este rupt, sau scrintit și trebuie să-i aplicăm un aparat provizoriu (v. *Apărate*). Făcând toate acestea, ca prim ajutor, vom aștepta să vină doctorul

care, după ce va examina bolnavul, îi va hotărî un tratament apropiat după felul rănirii. *Cum se face transportarea răniților.* Când bolnavul are curgere de sânge, sau e gata de a-și pierde cunoștința, cel mai bun lucru este să alergăm la doctorul cel mai din apropiere, să intrăm într-o farmacie, sau să ne adresăm la vr'un post de ajutor al asistenței medicale, pentru ca să se lege rana, să se oprească sângele, rănitul să-și vină în fire și apoi să-l ducem acasă. Când rănirea este și mai gravă, încât nu numai că bolnavul nu poate merge, dar cea mai mică mișcare îi face dureri mari, cum este la o rană mare, la o ruptură de os, sau la o scrintire, atunci transportarea lui acasă, sau la spital, trebuie făcută cu o deosebită băgare de seamă, pentru ca să nu se zdruncine partea rănită și pentru aceasta cel mai bun mijloc de transportat este *targa*, sau în lipsa ei să ne folosim de un fotoliu sau o saltea. Mai bună decât chiar și trăsura este targa, în care bolnavul stă întins ca în pat și nu se sdruncină așa tare. Pentru a așeza un bolnav pe targă trebuie mai mulți oameni de ajutor: unul să susțină capul și partea de sus a corpului, altul să țină de mijloc, alții doi de șolduri și picioare. În cazurile de fractură a coapsei sau gambei, aceasta trebuie să fie așezată pe un plan înclinat așa încât capul bolnavului să fie ceva mai jos decât ea; când rana e la cap sau la piept, ori la pânțele, capul trebuie să fie mai ridicat. În tot cazul transportul trebuie să se facă încet, cu timpuri de odihnă cât se poate mai multe și supraveghind accidentele cari s'ar putea ivi pe drum.

Ranula, broscuță. — Se numește astfel o umflătură care se formează sub limbă, în podeaua gurii, care este un *chist salivar*, adică o pungă plină cu un lichid ca albușul de ou. Pentru a se vindeca se face o înțepătură pentru ca să curgă lichidul, apoi se injectează tinctură de iod; sau prin drenaj, trecând un tub din gură până în afară sub falca de jos; sau prin tăierea unei părți din chist.

Rănunchioară. — V. *Silnic*.

Rânză. — V. *Stomac*.

Răpciugă și Cârțiță (*Morvă și Farcin*,

Maliasm acut și cronic). — Aceste două nume sunt bine cunoscute poporului nostru și, în realitate, ele nu înfățișează decât una și aceeași boală, produsă prin aceeași otrăvă, prin același *microb* (bacil) descoperit de Babeș și Loeffler. Aceste două numiri ne arată cele două forme ale boalei și anume: *răpciuga* (morva, maliasm acut), care își are semnele localizate în aparatul respirațiunii începând dela nas și până la plămâni, și *cârțița* (farcin, maliasm cronic), care își are semnele localizate pe piele și în țesutul de desuptul ei. Boala se poate arăta când sub o formă, când sub alta, dar de obicei aceste două forme se însoțesc, așa că boala poate să înceapă cu cârțița și să sfârșească cu răpciuga. Această boală, care se mai numește și: *troahna cailor* și a *măgarilor*, este foarte otrăvitoare și vine dela cai și măgari, dela cari se poate întinde la oi, capre, iepuri de casă, pisici, câni și la om. Ea nu scutește decât boul și porcul. Aproape toți caii și oamenii bolnavi mor. — Omul capătă această boală dela calul bolnav, viu sau mort, deadreptul sau prin lucrurile cari au fost în atingere cu dobitoacele bolnave, cum sunt cergile, hamurile, așternutul, nutrețul, etc. Microbul boalei se găsește la calul bolnav în muci, în puroiul din bube, în băle (salivă), în carne, în sânge și oase, așa că primejdia este foarte mare pentru omul care vine în atingere cu animalul răpcigos, sau cu lucrurile purtătoare de molimă și pentru acei ce consumă carne crudă de cal, cum fac Tătarii noștri din Dobrogea. Otrăvirea omului se face printr-o sgârietură mică de pe piele, buze, ochi, căpтуșeala nasului, pe care s'a depus otrava adusă de vânt, sau de mână. Din această pricină oamenii cei mai expuși sunt acei cari prin meseria lor sunt în atingere cu caii: vizitii, rânđașii, birjarii, gîmbașii, soldații, călăreții, sacagiii și doctorii veterinari. Această boală se întinde cu mare iuțeală dela un cal la altul, într-o herghelie, sau printre caii armatei, care locuiesc mai mulți într'un grajd; grajdurile, hamurile de asemenea înleznesc întinderea boalei. — Înainte de a merge mai departe să vedem în câteva cuvinte cum se în-

fățișează această boală la cal. Răpciuga are trei semne: mai multe *răni* (bulbițe sparte) pe căptușeala nasului, *scurgerea* din nas a unor muci groși și puturoși (*jetagi*u) uneori cu șuvițe de sânge, ghinduri sau *gâlci* la gât. Cârțița se arată sub forma unor nodulețe, sau bolfe, în piele, cari se sparg; picioarele se umflă. Din răni se scurge o materie purulentă foarte otrăvitoare. Aceste semne sunt numai cele din afară, cari se pot vedea și după cari se poate cunoaște boala. Calul răpciugos tușește, răsuflă greu, are fierbințeală și slăbește văzând cu ochii. — Iată acum *semnele* boalei la om. Dacă otrăvirea omului s'a făcut printr'o sgârietură, pe care s'a depus otrava, în punctul acela pielea se în-



Fig. 376 — Orhita morvoasă a cobaiului (inflamația testiculelor)

roșește, ghindurile din apropiere se umflă și sunt dureroase, apoi sub pielea umflată se face puroi. Dacă otrăvirea s'a făcut prin ducerea otrăvii în gură, de unde a fost înghițită, sau, după cum se citează cazuri, în cari omul s'a îmbolnăvit bând apă dintr'o găleată din care băuse un cal răpciugos, boala începe ca lingoarea (febră tifoidă), sau ca reumatismul, cu fierbințeală, durere de cap, greață, dureri prin încheieturi și altele. După această perioadă dela început boala își ia apoi una din cele două forme ale ei. Când avem a face cu *răpciuga*, bolnavul are un fel de guturaiu, tușește și scuipă un fel de flegmă puturoasă și răsuflă greu, din ochi se scurg lacrimi pline de puroiu. Bolnavul are fierbințeală mare. Când avem a face cu *cârțița*, încep a eși pe diferite părți ale corpului niște bolfe, sau buboaie cari coc, se umplu de puroiu și sparg, dând loc la niște răni urâte, murdare, din cari curge un fel de puroiu puturos și scârbos. Apoi se ivesc niște sgaibe, cum ar fi sgaiba de altoi (vac-ein), sgaibe numeroase, adunate ori înprăștiate și cari sunt un semn foarte

rău, căci moartea se apropie. Afară de acestea se mai arată în jurul încheieturilor, ici și colo, câte o pată neagră. — Boala *durează* 3 până la 10 zile, iar când nu vine cu furie mare poate să țină 3 până la 4 săptămâni. Mai este o altă formă a boalei numită *cronică*, ce poate dura 10 până la 15 luni și bolnavul moare de slăbiciune. În această formă avem bolfe cu puroi în diferite locuri, cari uneori se deschid și se închid, iar alte ori rămân deschise sub formă de răni. *Microbul* răpciugii este aerob și se prezintă sub formă de bastonașe (*bacili*) mici, subțiri, cu extremitățile rotunjite; el se dezvoltă bine pe toate mediile de cultură, în special pe cartofi. Microbul se află în sângele omului bolnav, în salivă, în urină, sudoare, mușchi, în ganglioni și vase limfatice cu deosebire; nici odată însă el nu s'a găsit în fiere, nici în lapte. Microbul se dezvoltă bine la 38° și culturile rezistă 3—4 luni; căldura mare îl omoară repede, (microbii mor în 5 minute la o temperatură de 60—80° și în 2 minute la 100°). — Boala se poate lua și *dela om*. Orice caz de răpciugă, la om sau la animale, trebuie adus la cunoștința autorității. Animalele bolnave îndată se vor împușca și arde împreună cu pielea și cu toate rămășițele lor; animalele bănuite se vor deosebi (izola) făcându-li-se injecțiuni cu *maleină*, care este, față de bacilul răpciugii, ceea ce este tuberculina față de bacilul ofitei.

Raphanus sativus. — V. *Ridiche*.

Rapin. — V. *Răpciugă*.

Rapiță albă, rapiță de muștar. — V. *Muștar*.

Rărunchiu. — V. *Rinichiu*.

Ras. — V. *Barbă*.

Răs (lat. *risus*). — Omul se deosebește de animale și prin *răs*, care este o însușire pe care natura a dat-o numai omului. Maimuța poate să facă orice grimasuri (strămbături sau schimono-situri), papagalul poate să vorbească, albina și furnica să-și adune cele trebuincioase traiului, cănele să găsească lucrurile pierdute, unele animale pot chiar să plângă, însă nici una din ele nu va fi în stare să râdă. Singur omului îi este dată puterea de a se scutura cu totul de jugul care apasă asupra

RĂS

RĂSU

naturii întregi și de a atinge culmile senine, în care bucuria își dă drumul, în ceea ce noi numim *râsul*. De aceea s'a numit omul cu drept cuvânt *ființa care poate râde*. Această însușire omească trebuie întrebuințată și dezvoltată ca și toate celelalte însușiri, căci dacă nu vom face și vom lăsa-o în părăsire este semn că ne lipsește ceva, că se petrece o turburare mare în organismul nostru. Dacă, dimpotrivă, ne folosim de ea, o cultivăm, este semn vădit că ne simțim bine, că suntem sănătoși. Râsul este una din pornirile care se desvoltă mai întâi la om; copilul râde înainte ca să poată spune vreun cuvânt. Copilul acesta râde, dar de ce râde el? De nimic sau de tot. În casele în cari părinții sunt tăcuți, serioși, domnește tristețea mormântului, aerul este greu, înăbușitor încât abia te lasă să respiri; toți sufăr și mai ales copiii cei mici, cari încep a se ofili. Doctorii știu bine că bolnavii cei mai greu de vindecat sunt copiii a căror veselie a fost înăbușită de suferințe fizice, sau de persoanele tăcute, cari îi îngrijesc și din această pricină ei recomandă, înainte de toate, de a face jucării acestor copii, de a le face diferite petreceri mici, potrivite vârstei lor, de a le cânta și, dacă este cu putință, de a-i pune și pe ei să cânte, de a le povesti tot felul de istorioare plăcute și vesele, cari îi fac bine dispuși, îi fac să râdă. Copilul, crescut astfel, păstrează mult timp sau chiar toată viața această comoară de veselie, adunată în etatea primei copilării. Există un mușchiu care se întinde, ca o coardă elastică, dela umerii obrazilor până la colțurile gurii. Când se strânge, colțurile gurii se ridică și în fiecare obraz se formează o gropiță. În acest moment figura este preparată pentru râs, dar încă nu râde pe jumătate. Pentru ca râsul să fie complet trebuie să intre și ochii în joc. Mușchii pleoapelor se strâng, sprâncenele se lasă în jos și în jurul ochilor se formează încrețituri. Acești mușchi arată diferența între râsul adevărat și între râsul fățarnic. Dar afară de ei mai vine și laringele să contribuie la râs, ai cărui mușchi vibrează nu numai când râde omul

cu hohot, ci chiar și când surâde. Râsul poate să fie așa de puternic încât să pună în mișcare mușchii umerilor, ai spatelui și ai stomacului. Râsul nu este întotdeauna expresiunea veseliei. Uneori el poate fi provocat de suferințe fizice. Râsul are mare influență asupra sănătății. Sofocle a murit într'un acces de râs, iar papa Leon X, când a aflat că Francezii au fost gonți din Milan, a fost apucat de o bucurie așa de mare încât a murit. Dacă aplicăm râsul cu măsură dreaptă și în anumite cazuri, el poate fi un leac bun. Este știut că râsul înlezește respirația, mărește căldura corpului și grăbește mistuirea; astfel din antichitate chiar doctorii au recomandat râsul ca un mijloc de a întreține bunul umor și prin acesta sănătatea. În casele de sănătate se caută să se distreze bolnavii prin reprezentațiuni comice, cari să-i facă să râdă, ceea ce le face bine. Râsul joacă un rol important atât asupra bunei stări a corpului, cât și a moralului. După un râs bun suntem mai bine dispuși la lucru și cu sentimente mai bune față de cei ce ne înconjoară. Prin urmare să respectăm râsul ca pe unul din binefăcătorii omenirii.

Râșcovi. *râșcovi de faș.* — V. *Ciuperca*.

Râșină. — V. *Rezină*.

Rasol. — Carne de vacă, sau de oricare animal, după ce a fiert, obținându-se astfel *bulionul* se numește rasol. Acest rasol, când a fiert prea mult, a pierdut mult din proprietățile sale nutritive, care în bună parte au trecut în bulion, sau așa zisa *zeamă de carne*. Pentru aceasta este bine ca omul să mănânce și supă și rasolul dacă vrea să fie bine hrănit. Supă cu rasolul constituie o bună hrană, mai ales pentru omul sărac, care nu poate să facă lux la mâncare. Dar fiindcă rasolul este cam greu de mistuit, se înțelege dela sine că nu-l vom da la cei cu lipsă de sânge (anemici), la cei slabi, la bolnavi sau convalescenți. La toți aceștia, când e vorba să le dăm carne, le vom da mai bine câte o friptură bună de mușchi la grătar.

Rast. — V. *Paludism*.

Răstic. — V. *Gogoși de ristic*.

Răsuflare. — V. *Respirație*.

Răsuflătoare. — V. *Laringe*.

Rață. — Carnea de rață este grea, grasă și greu de mistuit, nu este așa de bună ca cea de pui. Astfel fiind nu vom da celor bolnavi de stomac, nici convalescenților carne de rață. Cea de *rață sălbatică* este mai bună decât cea de rață de casă. Este bine să se mănânce carnea de rață *friptă*, iar nu gătită cu legume.

Ratania. — Rădăcina diferitelor specii ale arbustului *Krameria* (triandra, ixina, grandifolia, tomentosa) din fam. poligaleelor. Această rădăcină conține foarte mult *tanin*, care-i dă un gust astringent și puțin amar. Se întrebuițează în contra diareei rebele, a dizenteriei cronice, în urinarea cu sânge, în curgerile de sânge din mitră (singură sau asociată cu ergotină). Se dă sub formă de infuzie (ceaiul) din 10 la mie; praf 1—10 gr.; extract 50 ctgr. până la 5 gr.; sirop 10—100 gr.; tinctură 5—20 gr.; tizana din 20 la 100; supozitoare (săpunase) cu 1 gr. de extract. Pe *dinafară* în alifie 10 la 100; clizme (decoct din 10 la 1000 sau, extract 5—10 gr.

Rățin. — V. *Ricin*.

Rătungioară. — V. *Silnic*.

Rău de mare. — V. *Boală de mare*.

Rău de munte. — V. *Boala munților*.

Răul teatrelor. — V. *Teatru*.

Reacție. — Prin cuvântul *reacție* se înțelege în medicină efortarea prin care corpul omului se năzuiește a cumpăni influența unui agent, la acțiunea căruia a fost supus. Când facem o baie rece, sau un duș rece, fiind sănătoși și în bune condițiuni, simțim mai întâi un fior în tot corpul și pielea devine palidă și aceasta din pricină că sângele, sub influența frigului, fuge din părțile superficiale spre părțile adânci, centrale; dar îndată vitalitatea corpului își reia drepturile și simțim o căldură plăcută, pielea se înroșește; din cauză că sângele reîncepe a circula pretutindenea și revine cu mai multă putere în părțile pe cari le-a părăsit; această reluare a circulației, care pentru un moment a fost suspendată, se numește *reacție*. Reacția trebuie înleznită prin toate mijloacele: mers repede, exercițiu, fricțiuni uscate, etc., pentru

ca să nu întârzie a se face, căci șederea prelungită a sângelui în părțile centrale (în creeri, în plămâni, etc.) poate produce *congestiuni* supărătoare. Când această reacție se face cu anevoință trebuie să renunțăm la cura de apă rece (v. *Băi, Duș, Idroterapie*). Sunt cazuri în cari trebuie să domolim reacția, cum se întâmplă când acțiunea frigului asupra unei părți, sau asupra întregului corp, s'a simțit prea mult timp și cu mare intensitate așa că întoarcerea repede a sângelui în părțile de unde a lipsit mult timp ar produce acolo o inflamație urmată de gangrenă (v. *Congelație și Degerături*). Când microbii pătrund într-o parte a corpului acolo se produce, o reacție, adică se adună un număr mai mare de globule albe ale sângelui (fagocite), cari mănâncă microbii. O boală își face evoluția după cum reacțiunea organismului este, sau nu, îndestulătoare.

Recădere, întoarcere, reîntoarcere de boală (lat. *morbi reversio*). — Reîntoarcerea unei stări morbide, care era pe cale de a dispărea. Românul zice: *l'a întors boala*, ceea ce nu trebuie să se confunde cu *recidiva*.

Receptivitate. — V. *Microbi*.

Recidivă (lat. *recidivus*, care reîncepe). — Contrar de ceea ce se întâmplă la *recădere*, *recidiva* este repetarea unei boale determinate, care se produce astfel de mai multe ori, cu toate semnele și leziunile ei proprii.

Reconstituante. — V. *Tonice*.

Recrudescența (dela lat. *re*, care însemnează repetiție, reduplicațiune, și *crudescere* a deveni violent). — Reaparițiunea unor semne ale boalei, cu intensitate, după o perioadă de remisiune.

Rect. — (dela lat. *rectum*, drept). — Partea din urmă a mălului gros (v. *Intestin*), care se scoboară pe dinaintea osului crucii (sacru), dela articulația celui os cu cea din urmă vertebră până la *anus* (șezut). — Intre boalele rectului avem *căderea lui*, sau *prolapsul anal*, în limba poporului *eșirea șezutului*. Această boală se arată la bătrâni și la copii, având mai multe cauze: scremetele, constipația, diareea, hemoroizii, tusa chintoasă, efortările violente, etc. La început șezutul eșit

se poate pune la loc cu înleznire, mai târziu însă el nu mai intră și atunci se inflamează, se rănește și este foarte dureros. *Tratamentul*. Șezutul se va introduce cu degetele ori decâte ori a eșit, iar pentru ca să nu mai iese se vor face clizme și spălături cu apă rece și cu substanțe *astringente* cu decoctiune de ratania. Când nu este alt chip de vindecare se va face *operație*, adică se va tăia toată partea eșită afară.

— *Inflamația* sau *aprinderea rectului*, se numește *rectită*, și are drept cauză; o inflamație a matului gros, trânjii, crăpăturile și plezniturile șezutului, oxiurii, întrebunițarea prea deasă a clizmelor, a săpunașelor, a purgativelor, etc. In forma *acută* bolnavul simte greutate la șezut, dureri, are constipație, scremete și scaune dureroase, uneori cu sânge. *Tratamentul* constă în băi de șezut, clizme cu ceaiu de nalbă și un decoct de frunze de nuc.

Reducție (lat. *reductio*, dela *reducere*, a aduce la loc). — Operație care constă în a pune la locul său un os scrintit, sau viscer erniat, cum se întâmplă la o *hernie* când se introduce în pânțele matul eșit.

Reflex (lat. *reflexus*). — Act incon-



Fig. 377 — Reflexul rotulian

- 1 = terminații nervoase sub rotulă
- 2 = terminația la șira spinării
- 3 = legătura care determină senzația
- 4 = locul unde nervii provoacă contracții musculare

știent, pe care îl poruncește măduva spinării fără ca să intervie voința.

Regim (lat. *regimen*, dela *regere*, a

guverna a cârmui). — Prin cuvântul *regim* se înțelege rânduiala la mâncare în tot timpul boalei, până la vindecare. Regimul alimentar al omului sănătos trebuie să se compună din alimente de calitate bună, ușor de mistuit și în cantitate potrivită; mâncarea să se facă la ceasuri regulate, iar mesele să fie depărtate unele de altele cu socoteală, la intervale suficiente; apoi alimentele trebuiesc alese în așa fel încât să repare toate pierderile corpului, să fie întocmite în așa fel încât să cuprindă toate elementele trebuincioase organismului, sub un volum potrivit, având în vedere vârsta, sexul, obiceiurile, condițiunile sociale, anotimpurile, climatul, etc. Regimul omului bolnav se va afla la fiecare boală, descrisă la locul ei și la cuvântul *dietă*. In unele cazuri trebuie să se prescrie un regim zis *exclusiv*, adică compus dintr'un singur fel de aliment, cum este *regimul lactat* *regimul animal*, sau *regimul vegetal*. In alte cazuri, pentru a întări bolnavul, trebuie să-i prescriem un *regim alimentar* asociat cu un *regim medicamentos*, adică un *regim substanțial*, *tonic*, *reconstituant*, *fortifiant*.

Regim lactat. — V. *Lapte*.

Reglisă. — V. *Lemn dulce*!

Regule. — V. *Menstruație*.

Remediu (lat. *remedium*). — Ori ce mijloc care este în stare să îmbunătățească starea sănătății.

Remisiune (lat. *remissio* dela *remittere*, a suspenda, a micșora). — Scăderea sau micșorarea temporară a simptomelor unei boale. In special se numește *remisiune* perioada scurtă a unei boale febrile, în care scade febra.

Repaus. — V. *Somn*.

Resorecină. — Se prezintă sub formă de prizme romboidale incolore, cari se tocesc la 119°; solubilă în apă, alcool și eter. Se întrebuințează pe *dinafară* în boalele de ochi, de piele (acnee, eczemă, cuperoză, ulcere), în soluție apoasă (1—4 gr. la 100) sau alcoolică (10—25 la 100) sau în alifie (10—20 gr. la 100 gr. vaselină), iar pe *dinăuntru* se dă în tusa măgarească și ca antifebril, 2—4 gr.

Respirație (lat. *respiratio*), *răsuflare*. — Sângele pe care îl trimete inima în *plămâni* este *negru*, încărcat

cu *acid carbonic*, iar după ce a venit în atingere cu aerul atmosferic se înarcă cu *oxigen*, în locul acidului carbonic, pe care îl dă afară și devine *roșu*, ducându-se astfel din nou în inimă, care apoi îl trimite în tot corpul. (v. *Cord și Circulație*). Această funcțiune fiziologică, așa de importantă, se numește *respirație*, sau *răsuflare*. Să vedem mai întâiu cari sunt *organele* respirației. Aerul atmosferic pătrunde prin nas sau gură în *faringe*, trece în *laringe*, apoi în *trachee*, care se desparte în două *bronchii*. Acestea se duc fiecare în câte un *plămân*, unde se ramifică într'o mulțime foarte mare de canale, din ce în ce mai mici, *bronchiole*, cari se sfârșesc fiecare într'un




Fig. 378 — Plămânii în respirație (inspirație)




Fig. 379 — Plămânii în respirație (expirație)

fel de săculeț, *veziculă pulmonară*, cari formează grupuri, *lobuli pulmonari*. Plămânul este format din aglomerația acestor *lobuli*. Trei sferturi din suprafața *veziculelor* pulmonare sunt acoperite de *capilare sanguine*. *Cantitatea de sânge* care trece prin plămâni, în 24 ore, este de 20.000 litri. Mucoasa (căptușala) arborelui aerian este acoperită de *cili vibrațili*, cari aruncă afară mucozitățile și praful (*scuripatul*). Iată cum se face *respirația*: sângele vine în plămâni împins de inimă, iar aerul atmosferic este atras înăuntru printr'un fel de gol (vid) care se produce în piept în minutul în care păreții lui se depărtează unul de altul și cavitatea pieptului se lărgeste; acest timp se chiamă *inspirație*, adică tragerea aerului *înăuntru*; apoi aerul iese afară prin strângerea pieptului, care

se face mulțumită mușchilor așezați între coaste (*intercostali*) și mușchiului care desparte pieptul de pânză (*diafragm*), acest timp se numește *expirație*, adică darea aerului afară din plămâni. Cantitatea aerului *inspirat*,



Fig. 380 — Respirația artificială (timpul I)

apoi *expirat*, este cam de o jumătate de litru; ea poate să se ridice în timpul exercițiului la 3 litri și jumătate; plămânii conțin 5 litri de aer, de unde rezultă că nu tot aerul se modifică, ori cât de mari ar fi mișcările respiratoare; aerul care nu se schimbă se chiamă *aer rezidual* și cu cât este în cantitate mai mică, cu atât și transformățiunile țesuturilor sunt mai complete. Aerul expirat este foarte mult schimbat, în raport cu cel inspirat; el este bogat în acid carbonic (4.5 la 100) și foarte sărac în oxigen (14.5 la 100), pe câtă vreme cel inspirat n'are decât urme de acid carbonic și 21 la 100 de oxigen. În plămâni



Fig. 381 — Respirația artificială (timpul al II-lea)

se fac următoarele schimbări: globulele roșii absorb oxigenul, care formează cu o materie conținută în aceste globule, *hemoglobina*, o compoziție numită *oxihemoglobină*, a cărui oxigen se pierde pe măsura în care sângele străbate țesuturile. În același

timp acidul carbonic, care rezultă din arderile ce se fac în țesuturi sub acțiunea oxigenului, este absorbat de serul sângelui, unde el se asociază cu soda pentru a forma bicarbonate, cari la nivelul suprafeții pulmonare se desdoiesc și lasă să se separe acidul carbonic. Aerul expirat, care se mai numește și *alenă*, pe lângă acidul carbonic mai cuprinde și alte materii vătămătoare, ceea ce face ca această alenă să fie foarte primejdioasă pentru oamenii cari o respiră, producând diferite accidente (v. *Aer confinat*); prin urmare aerul trebuie primenit în continuu, având în vedere că pentru aceasta trebuiesc 10.000 litri de aer pentru o oră. — *Mișcările respiratoare*, (inspirația și expirația) se văd foarte bine chiar și când omul este îmbrăcat și se pot număra cu înleznire. În *stare de sănătate* ele sunt în număr de 16—18 pe minut la adult, de 20 la 15 ani, de 25 la 2 ani, de 35 în primul an, întocmai ca și bătăile inimii (pulsul) cari sunt cu atât mai multe cu cât omul este mai tânăr. Mișcările respiratoare, oricare ar fi vârsta omului, se fac în aceeași întindere (cu aceeași amploare), cu ușurință și se însoțesc de un murmur dulce, ușor, care se aude foarte bine când punem urechia pe pieptul cuiva și care murmur se deosebește foarte lesne de *raluri* (v. acest cuvânt). În *stare de boală* respirația este sgomotoasă, sacadată, (smăcită), inegală și mai iute decât în stare normală, murmurul se aude din depărtare, mișcările respiratoare sunt anevoioase, se fac cu greutate așa că pieptul se ridică cu putere și câte odată chiar se oprește în mișcarea sa. Numărul respirațiilor crește mult, de 2 ori și poate și mai mult decât în stare obișnuită, așa că respirația devine penibilă (*dispnee*) și în același timp turbură și funcțiunea inimii, care trebuie să bată cu mult mai iute (palpitații). — Pentru a întări plămânii se recomandă așa numita *gimnastică respiratoare*, care constă în niște exerciții cari au de scop să activeze (să iutească) arderile, să mărească câmpul respirator (pulmonar) și să dea afară aerul rezidual. Această gimnastică, e pusă în practică pe scară mare în Suedia. Se face în cazurile de asfixie,

când nu mai putem respira de loc și când se încearcă introducerea unei cantități de aer curat, cât mai mare, în plămâni. Felul cum trebuie făcută se vede pe figurile alăturate. (v. și *Asfixie*). — Omul este bine să respire numai prin nas, care curăță și încălzește aerul; să nu respire pe gură.

Respirație artificială. — V. *Asfixie*.

Retenția urinei. — V. *Urină*.

Retină și Retinită. — V. *Ochiu*.

Retinol, rosinol. — Hidrocarbur complex, care provine din distilația uscată a colofonului (uleiul de rezină). Se întrebuințează *extern* ca antiseptic (tampoane în contra vaginitei blenoragice); iar pe *dinăuntru* se dă uneori, în capsule de câte 25 ctgr. (6—12 pe zi), în contra blenoragiei (sculamentului).

Retroversiune. — V. *Mitră*.

Reumatină, salicilat de salochinină. — Lichid puțin solubil în apă. Se dă ca analgezic și mai cu seamă în contra reumatismului muscular și articular acut, fără să provoace sudori mari: 2—6 gr. pe zi, după etate, în prafuri, buline, sau într'o poțiune.

Reumatism (grec. *rheumatismos*, dela *rheum*, fluxiune, îngrădădire de umori într'o parte oarecare a corpului). — Este o boală generală constituțională, vecină cu guta, care este caracterizată prin fenomene de fluxiune la o articulație (încheietură), la un mușchiu, un nerv, un organ intern, însoțită de o durere vie. Mai des se observă reumatismul la încheieturi, *reumatism articular*, care are două forme: *acută* și *cronică*. Cea mai obișnuită cauză a reumatismului este frigul și umezeala (răceala), cari lucrează cu mai multă, sau mai puțină putere asupra unei persoane, după cum este ea, sau nu, predispusă prin ereditate sau prin temperamentul său propriu. Reumatismul acut atinge de obicei etatea de 15—30 ani, iar reumatismul cronic, nodos, mai mult etatea de 40—50 ani. Femeile par a fi mai predispuse la această boală; de asemenea și cei cari trăiesc în mizerie (sărăcie). Drept cauză determinantă s'au învinovățit de către unii *microbii*, dar până acum nu se cunoaște microbul reumatismului. — *Reumatismul articular acut*, începe de obicei printr'o indispozițiune generală

fiori, febră mare; urina are o culoare închisă și formează un depozit roșu cărămiziu. După 24 sau 48 ore o încheietură, sau mai multe, devin *dureroase*, mai calde ca de obicei și ca cele rămase sănătoase, se *umflă* și pielea se înroșește. Durerea este foarte vie și umflătura este mai mult sau mai puțin mare, întinzându-se la țecile tendinoase și pungile seroase din vecinătate. Încheieturile mari sunt prinse de obicei în ordinea următoare: genunchi, glezne, coate, umeri, pumni; iar încheieturile mici ale mânilor, picioarelor, fălcilor, vertebrelor sunt prinse mai rar, contrar de ceea ce se întâmplă în *gută*. Reumatismul poate de altfel să facă ocolul corpului, mergând dela încheietură la încheietură până ce le cuprinde pe toate, așa că nenorocitul bolnav nu se mai poate da jos din pat. Reumatismul articular acut vine prin atacuri, cari se pot repeta. Durata unui atac variază între 2—8 săptămâni (coplesirea încheieturilor mici este întotdeauna un semn de durată lungă). Fiecare încheietură se vindecă în câteva zile, dar poate fi apucată din nou. În marea majoritate a cazurilor reumatismul se vindecă, afară numai de cazul când se ivesc complicații, cari din nenorocire sunt multe și unele foarte grave. Între acestea avem *reumatismul cerebral*, care se termină, de obicei, prin moarte, *endocardita*, care de asemenea este mai întotdeauna incurabilă, *fluxiune*, *pneumonie*, *pleurezie*, *albuminurie*, *nefrită*, *cistită*. Tocmai din cauza acestor multe și grave complicațiuni reumatismul articular trebuie tratat cu cea mai mare atențiune și energie. *Tratament*. Acest tratament este bazat pe *salicilatul de sodă*. Bolnavul va fi pus în repausul cel mai absolut posibil, adică în pat și la regim de lapte, îndulcit din când în când cu puțină supă; *Salicilatul de sodă* va fi prescris în doză maximă de 50 ctnr. de fiecare an la copii, până la 15 gr. zilnic la adulți, fie în buline, fie în poțiune, însă totdeauna în doze fracționate. Când se ia în buline trebuie ca după fiecare doză să se bea o cantitate suficientă de apă; se va da mai bine câte unul la fiecare oră. Salicilatul se poate da în poțiune. Un bun preparat

este salicilatul „Ana”, mai bun la gust și mai ușor de tolerat, cu deosebire în reumatismul acut. Nu se va lua salicilatul nici cu vin, nici cu limonadă de lămâie, nici cu rom. Pentru a înlătura oarecare complicații de partea stomacului, e bine să se dea salicilatul tot ca mai sus, dar amestecat și cu o cantitate egală de bicarbonat de sodă. Salicilatul trebuie luat și în timpul nopții, dacă nu la fiecare oră, la 2 sau 3 ore. Pe dinafară se poate întrebuința *salicilatul de metil* și în acest caz se mai poate reduce doza de salicilat de sodă; se vor face ungeri pe încheieturile cele mai dureroase, apoi se vor acoperi cu vată și gutapercă, sau cu flanelă. Unii bolnavi nu pot suferi mirosul acestui medicament. Salicilatul de sodă nu se poate da la bolnavii cari sufăr de rinichi (nefrită cronică), la cei ce sufăr de boală de inimă în grad înaintat; la femeile însărcinate. Când bolnavul nu poate suporta salicilatul de sodă, din pricina văjiturilor de urechi și a durerilor de stomac, se va da în locul lui *aspirină*, 2—3 gr. în buline de câte 50 ctnr., *piramidon*, salipirina, citrofenul (2—4 gr.), *atofan*, care este un bun medicament contra reumatismului, luându-se sau sub formă de pastile, sau de injecții (atofanil), în cazul când stomacul nu suportă pastilele. La femeile însărcinate se poate da antipirina, 2—3 gr., în 4 sau 6 doze. La cei ce sufăr de rinichi se va da benzoatul de sodă, citratul de sodă sau acidul citric în aceleași doze. La sfârșitul reumatismului se va prescrie masaj, ungeri cu tinctură de iod și la trebuință puncte de foc, sau vezicători, dând pe dinăuntru preparatele fieruginoase, în special iodurul de fier, în contra anemiei.—*Reumatismul articular cronic*. Urmează reumatismului articular acut, rău tratat, sau se arată dela început sub forma sa înceată. Încheieturile sunt umflate și cam înțepenite, puțin dureroase la repaus, numai la mișcări sunt supărătoare. Alteori se prind încheieturile cele mici, dela degetele mânilor și picioarelor, cari se umflă și produc dureri mai ales noaptea, prezentând cu timpul un fel de noduri caracteristice, cari au făcut să i-se

dea numele de *reumatism nodos*. Într-o mână se diformează, luând o înfățișare caracteristică. Boala înaintează fără încetare, fără întrerupere, sau cu perioade de ameliorare foarte scurte. Tratamentul va fi întocmai ca la reumatismul articular acut, având ca bază salicilatul de sodă. În perioada a doua (faza cronică) tratamentul va consta în *iodur de potasiu*, sodiu, sau de litiu, în doză de 2—4 gr. pe zi dat timp îndelungat, sau tinctură de iod (30 picături) pe zi la adulți, 6—10 picături la copii de 5—10 ani); tot la 15—20 zile se va întrerupe iodul pentru 5—8 zile. Se mai recomandă preparatele fieruginoase, în special siropul de iodur de fier, untura de pește, fricțiuni uscate, alcoolice, terebentinatate. Băile minerale naturale: *Herculane*, *Govora*, *Lacul sărat*, *Teichir-Ghiol*, *Ocna Sibiului*, sunt cele mai bune în reumatismul articular cronic, apoi *Monteoru-Sărata*, *Pucioasa*, *Vulcana*, *Oglinzi*, de asemenea dau rezultate bune. Reumatismul de mușchi se arată de preferință în mușchii cei mari, în șale, când se numește *lumbago* (v. acest cuvânt).

Revaccinare. — V. *Vaccinare*.

Revent, *rabarbură*, *rubarbă* (*Rheum officinale*, fam. poligonaceelor). — Plantă erbacee mare și frumoasă originară din Tibet, a cărei rădăcină este galbenă roșietică, are un gust foarte amar, văpșește saliva în galben portocaliu și conține acid galic, acid tanic, acid *erizofanic*, oxalat de calciu și un principiu purgativ. În doză mică reventul deschide pofta de mâncare, stimulează tubul digestiv, înleznește mistuirea și întreține eșirea afară. În doză mai mare el este purgativ fără ca să irite mâțele și face foarte puține dureri; se recomandă la cei ce suferă de dispepsie, la cei ce simt o greutate după mâncare, fără să aibă dureri, la cei ce suferă de constipație obișnuită.

Revulsie (lat. *revulsio* dela *revelere*, a scoate cu putere), *revulsive*. — Revulsiunea este o formă de tratament care constă în a irita, prin ajutorul unor medicamente, numite *revulsive*, o parte a corpului mai mult sau mai puțin depărtată de locul inflammat, cu scopul de a atrage sângele și cele-

alte umori, cari s'au îngrămădit în organul bolnav. În practică *revulsie* și *derivație* înseamnă același lucru, așa că medicamentele *revulsive* se confundă cu cele *derivative*. Între *revulsive* se numără: muștarul, băile de picioare calde, simple sau cu muștar, luarea de sânge, tinctură de iod, vezicătoarele.

Rezecție (lat. *resectio*, dela *resecare*, a tăia). — Operație care constă în a tăia și a scoate o parte dintr'un os, sau unul ori mai multe oase întregi, păstrând părțile moi din jurul lor.

Rezine (lat. *resina*), *rășină*. — Se dă acest nume la niște produse naturale compuse din oxigen, hidrogen și carbon, cari se află în scoarța și fructele unui mare număr de plante, unde se găsesc asociate cu esențe volatile și de unde se scurg dela sine, sau prin tăieturi. Rezinele sunt substanțe semi-lichide, groase, viscoase și adeseori inflamabile; multe din ele se întrebuințează în medicină: unele sunt stimulente, ca *esența de terbențină*, etc., și se dau pe dinăuntru, sau pe dinafară, pentru a produce o excitațiune cu scopul de a vindeca o boală; altele sunt purgative, cum sunt: *jalapa*, *scamonea*.

Rezoluție și Rezolutive. — Prin cuvântul *rezoluțiune* se înțelege întoarcerea la stare normală a unui țesut bolnav, prin rezorbirea materiilor organice lichide, sau solide, infiltrate în acel țesut. Medicamente și mijloace *rezolutive* se numesc acele cari produc acest rezultat: purgativele, diureticele, antiflogisticele, iritante (preparatele cu iod, iodurul de potasiu, cu arsenic, etc.) lăsarea de sânge din vine, lipitorile, ventuzele cu sânge, vezicătoarele, cataplazmele, *revulsivele*, tonicele excitante, astringentele, aplicațiunea de gheață, masajul, compresiu-ne, etc.

Rezorpțiune (lat. *resorptio*). — Prin acest cuvânt se înțelege dispariția unui lichid revărsat într'un țesut, sau o cavitate și ale cărui elemente sunt luate de circulație.

Ricin, *rițin*, *căpușe* (*Ricinus communis*, fam. euforbiaceelor). — Plantă arborescentă, originară din Africa, unde ajunge la o înălțime de 10—12 metri, care s'a introdus în Europa și se cul-

tivă mai mult ca plantă ornamentală. Sămânțele de mărimea boabelor de fasole, cu pete roșii, luate cu lapte, sub formă de ceaiu în număr de 5—6, constituie un purgativ drastic, iar dacă se iau mai multe produc iritația și chiar ulcerarea mățelor, ceea ce poate avea urmări grave și de aceea se recomandă mare băgare de seamă. Oleul extras din sămințele de ricin, unt de ricină, se întrebuințează foarte mult în medicină ca purgativ. În China se întrebuințează ca oleu alimentar. Untul de ricină este un purgativ foarte bun și se dă în doză de



Fig. 382 -- Ricin

o jumătate de lingură la copiii nou-născuți, o linguriță la copii până la etatea de 3 luni, o jumătate de lingură la copii de 1 an, o lingură la copii până la 5 ani, iar la adulți 2—3 linguri (30—40 gr.). Untul de ricină are însă un cusur, gustul său rău, care câte odată provoacă greață și chiar vărsături, din care pricină se întrebuințează în diferite forme, pentru a-i masca gustul. Când nu se poate lua singur, se va da în bulion fără grăsime și cald, într-o ceașcă de cafea neagră, sau de ceaiu, în zeamă de varză, sau cu zeamă de lămâie, de portocale, etc. Untul de ricin se mai dă și în capsule gelatinoase, în care caz este bine ca bolnavul, îndată ce a înghițit capsulele, să bea o ceașcă de zeamă de carne, pentru ca ele să se topească mai iute.

Ridiche, (*Raphanus sativus*, fam. cruciferelor). — Plantă erbacee cu rădăcina cărnoasă, foarte umflată, originară din Asia, care se cultivă mult ca plantă alimentară. Prin cultură s'au obținut mai multe varietăți dintre cari menționăm: *ridichea neagră*, cu rădăcinile mari, cu coaja neagră; *ridichile de lună*, cu rădăcinile mici, cu coaja albă, roșie violetă sau negricioasă. Ridichile de lună au un gust înțepător, care atâta pofta de mâncare; când sunt fragede și tinere sunt mai ușor de suportat de stomac, cu condiție însă ca să nu se mănânce

în cantitate mare; cei cari au răgăituri acre și dureri de stomac să nu le mănânce deloc. Ridichile negre sunt și mai greu de mistuit și prin urmare să nu le mănânce decât cei ce au stomac tare, dar și aceia în cantitate mică și rar.

Rigiditate. — *Rigiditate cadaverică.* — Înțepenirea mușchilor după moarte.

Rigolot. — V. Muștar.

Rinichiu, rărunchi, (lat. *ren*, grec. *nephros*). — Rinichii sunt organele prin cari se strecoară urina (udul). Ei sunt în număr de doi, așezați în pânțele, câte unul de fiecare parte a șirii spi-




Fig. 383 — Locul ocupat de rinichi

A=canalele ce duc la bășica udului (B).

nării, la șeale. Rinichii sunt separați de peritoneu printr'un strat de țesut celulo-grăsos (*capsulă adipoasă*, la copii, foarte subțire, iar la adulți, mai ales la cei grași, foarte gros, cuprinzând multă grăsime. Coloarea rinichilor este roșie închisă; forma este ca aceea a unui bob de fasole, având o lungime de 10 cm, o lățime și o grosime cam de 5 cm fiecare. Partea excavată a lor privește spre șira spinării și se numește *hil*; ea cuprinde *vena renală*, *artera renală*, *basinul* sau *lighienazul* și începutul canalului (*ureter*), care conduce urina în *beșică*. *Artera renală* intrând în *hil*, se împarte în mai multe ramuri, *rămurele*; fiecare *rămurea*, se ramifică în *capilare*, pentru a forma un ghem vascular care se chiamă *glomerul* (lat. *glomerulus*, glob), învelit de o dilatație a unui *tub urinifer*, care îl înconjoară ca o

capsulă. Acest tub, după ce s'a îndoit de mai multe ori asupra lui însuși, se termină printr'o parte dreaptă, care se sfârșește printr'unul din orificiile unui fel de stropitoare, numită *papilă renală*, care se ridică în *basinet* (lighenaș). Fiecare papilă este formată prin reunirea a vreo douăzeci de orificii de tubi drepecți. Dacă tăiem un rinichi în două, vedem pe suprafața de tăiere două părți, una *corticală* (coajă), care este granuloasă și granulațiunile sunt formate de glomerule; alta *medulară* (măduvă) în care se vede un șir de dungii, cari sunt tubii uriniferi. *Funcțiunea* rinichilor. În prima rețea capilară, aceea a glomerulelor, presiunea sangvină fiind foarte mare, partea apoasă a urinei se filtrează din vasele sangvine, prin capsula care termină tubii uriniferi. A doua rețea capilară, formată de vasele eșite din glomerule, înconjură tubii uriniferi, a căror lungime este așa de mare încât, dacă i-am pune cap la cap, întinderea lor ar fi de 20 Km.; sângele lasă să transude partea solidă: uree, acid uric, clorur de sodiu, fosfate și sulfat alcaline. Celulele cari căptușesc tubii sunt însărcinate să aleagă aceste principii solide ale sângelui. Urina, care se formează picătură cu picătură în tubii uriniferi, ajunge în basinet, de unde trece prin uretere în vezică. — *Boalele de rinichi*. Adeseori omul are dureri. Boalele proprii ale rinichilor sunt grave. Mai întâiu toate *rămirile* făcute asupra rinichilor, cu un glonț de armă de foc, cu un cuțit, sau numai printr'o lovitură puternică, sunt foarte grave, putând da naștere la diferite complicații prin revărsarea urinei în peritoneu, producând o *peritonită* mortală. Un *abces* în vecinătatea rinichiului poate fi produs de răceală, de lovituri sau contuziuni, de răniri, de călărit prea mult, etc. În acest caz bolnavul are dureri în dreptul rinichiului, lipsă de poftă de mâncare, constipație; apoi partea bolnavă se umflă; umflătura merge crescând după cum se înmul-



Fig. 384
Rinichiul tăiat
vertical

tește puroiul, din care cauză trebuie operat cât se poate mai iute, făcând o tăietură mare ca să se scurgă bine puroiul. — *Aprinderea*, sau *inflamațiunea mucoasei calicelor* și a basinetului, se numește *pielită*, iar când este și rinichiul inflammat avem *pielonefrită*. Această inflamațiune poate fi produsă de *calculi* (pietricele), de inflamațiunea uretrei (în cazurile de blenoragie, de stricturi), a vezicii sau a ureterelor, de boale infecțioase, etc. În aceste cazuri trebuie să se facă *operație* cât se poate mai iute, pentru ca să nu slăbească prea mult bolnavul și să nu-i intre puroiul în sânge. Rinichiul *căzut* (*rinichiul flotant*) se vede mai des la femei, din pricina sarcinilor repetate, a *corsetului*, a *sforțurilor* prea



Fig. 385 — Rinichi, cu uretere și bășică

mari; se anunță prin durere bruscă în partea de sus a pântecului și bolnavul simte că-l trage ceva, că atârna




Fig. 386 — Schema unui corpuscul al rinichiului

a = vas conductor de sânge; b = vas pe unde iese sângele; c = sâmburele unei celule de perete; d = sâmburele de celulă; e = peretele vasului; f = peretele capsulei

ceva în locul dureros; durerea înce-tează prin odihnă în pat. Se observă și turburări digestive, la unele femei și turburări nervoase (isterice). *Tratamentul* constă în purtarea unui bandaj și în, cazurile grave în *operație* (*nefropexie*, adică punerea rinichiului la locul său, cosându-l), sau *nefrectomie*, adică tăierea și scoaterea rinichiului cu totul). — *Litiază, colici nefritice, calculi* (pietre). Sărurile urinii se pot precipita în rinichi sub formă de concrețiuni pietroase (*litiază*, dela grec. *lithos*, piatră) cari pot să fie așa de fine ca praful (*nisip* sau să formeze pietricele mici, *pietriș*, care produc *colici nefritice*, sau să formeze pietri mai mari, ca aluna, ca nuca




Fig. 387 — Tubii uriniferi și vasele sanghine în rinichi

1 = fața externă a rinichiului; 2 = glomerul înconjurat de tub urinifer; 3 = arteră; 4 = arteră renală; 5 = vână renală; 6 = vână renală; 7 = Tub urinifer; 8 = deschiderea unui canal urinifer în bazin

și chiar ca oul. Pietricelele pot fi una sau mai multe, rotunde sau colțuroase; ele sunt formate cele mai adeseori de acid uric și de urate, când sunt tari și roșietice, sau de oxalat de calciu, când sunt brune și smeurii, sau de fosfate de calciu, albe și spărgăcioase. *Litiază* este produsă de hrană prea bună și prea multă, de lipsă de mișcare de *artrism*, de *ereditate*. Când se fac pietri-

cele în rinichi sunt duse de urină în uretere și de acolo în vezică. În tot drumul acesta ele dau naștere la *dureri*, cari sunt cu atât mai mari cu cât pietricica este mai mare, ceea ce face ca ea să pătrundă cu mare anevoință prin canalul ureterului. Aceste dureri se cheamă *colici nefritice*, sau *colici de rinichi*. Accesul poate să fie precedat cu câteva ore de niște dureri surde în dreptul rinichilor, cu o senzație de greutate și de pofte dese de a urina. Apoi, cu prilejul unei mișcări, unei sdruncinături, sau după luarea unei ape minerale, apare o *durere cumplită* în șale,

care se întinde în diferite direcțiuni, dar mai cu seamă spre vezica urinară. Accesul acesta de durere poate să țină 1—8 ceasuri, continuu, sau cu mici întreruperi, când pietricica a trecut în vezică și încetează durerea. *Tratament*. Pentru a micșora durerile și a înlesni trecerea mai iute a pietrii se recomandă cataplasme foarte calde laudanizate, pe regiunea dureroasă (în șale); băi calde prelungite de 34°, iar pe dinăuntru se dă, când bolnavul




Fig. 388 — Rinichi căzut (A)

n'are vărsături, antipirină, cloral, extract de opiu, clizme calmante cu laudan, sau cu cloral, supozitoare (săpunase) cu opiu, sau în cazuri grave injecțiuni sub piele cu morfină. Odată criza trecută se va prescrie un *tratament preventiv*: se va interzice bolnavului să mănânce măcriș, spanac, pătlăgele roșii, sparanghel, carne de vânat, se vor opri băuturile alcoolice; apoi se vor da preparatele cu litină și apele minerale: Căciulata, Vittel, Carlsbad, etc. Când s'a format o piatră mai mare, *calcul*, care nu mai poate eși, rămânând fixat, bolnavul urinează cu sânge (*ematurie*), mai cu seamă dacă umblă cu trăsura sau călărește; el are greutate și durere în dreptul rinichiului. În aceste cazuri trebuie să se facă *operație*, să se scoată piatra. *Idronefroza* (gr. *hydor*, apă și *nephros*, rinichi) constă în lărgirea calicelor și basinetului prin urină. Ea este produsă prin oprirea unei pietre în ureter, sau apăsarea ureterului printr'o tumoră și se arată printr'o umflătură

în pânțele și în regiunea rinichiului bolnav. *Tratamentul* și aci constă numai în *operație*. — *Aprinderea sau inflamațiunea rinichiului* se numește *nefrită*. *Nefrita acută* este produsă de boalele infecțioase (*scarlatina*, *pojarul*, *vărsatul difteriei*, *influența*, *pneumonia*, *febra tifoidă*, *brânca*, *oreioanele*), de intoxicațiunile cu fosfor și cu arsenic, de vezicători cu cantaride, de *răceală*, mai ales la cei ce au suferit de *scarlatină*, de *sarcină*, etc. *Semnele nefritei acute* sunt: *fiori* și *febră*, *dureri* în dreptul rinichiului bolnav, o *buhăială* (edem) a feței, și mai ales la pleoape; *membrele inferioare*, mai cu seamă *gleznele*, sunt umflate, umflătura aceasta (edemul) se întinde și la organele genitale externe; *durere de cap* și uneori *vărsături*. *Urina* se face rar și în cantitate mică, uneori abia 500 gr. în 24 ore, ea este închisă și conține *albumină* (50 ctgr. până la 2—6—8 gr. și alteori și mai mult). *Nefrita acută* se vindecă încet, în câteva săptămâni, dar poate să reapară sub formă *cronică* (*Boala lui Bright*), sau bolnavul poate să moară mai iute, prin *uremie*. *Tratamentul* constă în *regim lactat*, bolnavul va mânca numai lapte, 2—4 Kgr. pe zi; se vor pune în regiunea rinichilor ventuze cu sânge. *Nefrita cronică*, sau *boala lui Bright*, poate fi urmarea unei nefrite acute necăutată, sau se poate ivi chiar dela început, având aceleași cauze ca și cea acută. *Urina* este spumoasă adeseori și conține *albumină* (5—6 gr.). *Nefrita cronică* se poate complica de *pneumonie*, *pleurezie*, *peritonită*, *flegmoane*, *erizipel*, *uremie*, *turburări în vedere* care pot duce la orbire, etc.; ea durează 2—10—12 ani. *Tratament*: *regim de lapte* absolut, cu întreruperi din când în când și atunci bolnavul va mânca: *legume verzi*, *carne albă*, *făinoase*; se va da fier, *chinchină*, se vor face *fricțiuni uscate*, *masaj*, băi calde și calde, *exercițiu moderat*, *plimbare în aer liber fără oboseală*, *ședere într'un climat cald*. În cazurile de *uremie* se va lăsa sânge din vine. Pentru edem se vor da *diuretice*, etc. *Uremia* (dela grec. *uron*, *urină*, *ud*, și *haima*, sânge), numită și *sânge urinos*, sau după cum zice poporul *otrăvirea*

sângelui cu ud, este caracterizată prin *turburări foarte grave* și este produsă când rinichiul nu mai este în stare să curețe sângele de elementele urinii). *Uremia* are mai multe forme: *cerebrală*, *respiratoare*, *gastro-intestinală*. În forma *cerebrală*, ea se arată brusc, după o *împuținare a urinii*, prin *dureri de cap*, *amețeli*, *turburări ale vederii*, apoi *atacuri convulsive* ca în *epilepsie*, sau un fel de *nebunie* cu *excitație la lucru*, sau la *vorbă*, cu *depresiune* și *idei de sinucidere*, cu *halucinații* și *idei de persecuție*, sau cu *somnolență comatoasă*, ca într'un atac de *apoplexie*. În forma *respiratoare* bolnavul are *accese violente de opresiune*, cari se produc la *intervale variabile*. În forma *gastro-intestinală* bolnavul are *vărsături incoercibile*, *diaree*, etc.



Fig. 389 — Rinoplastie (după un procedeu vechiu)

Rinită (dela grec. *rhin*, nas, și *termi-națiunea itis*, care însemnează *inflamațiune*). — Sinonim cu *coriză*.
Rinoplastie. — Se numește astfel o operație care constă în restaurarea unui nas distrus. Porțiunea care lipsește, sau chiar nasul tot, se poate

reface cu ajutorul unei bucăți de cartilagi, sau de piele, dela aceeași persoană. Chirurgia poate azi să refacă un nas distrus, de aceea suferinzii să aibă încredere și să ceară ajutorul medicului.




Fig. 390 — Rinoplastie (înainte și după operație)

reface cu ajutorul unei bucăți de cartilagi, sau de piele, dela aceeași persoană. Chirurgia poate azi să refacă un nas distrus, de aceea suferinzii să aibă încredere și să ceară ajutorul medicului.

Rinoscopie. — V. Nasul.

Ristic. — V. Gogoși de ristic.

Rodea. — V. Roibă.

Rodie, pitlingean (*Punica Granatum* din fam. mirtaceelor). — Arbore mic și frumos, care face un fruct de forma și mărimea unui măr, cu semințe numeroase înconjurate cu un înveliș cărnos, roșietic, partea comestibilă a fructului. Acest arbore, originar din regiunea mediterană (Sudul Europei) se cultivă pe la noi ca plantă de po-doabă uneori având florile învoalte. Scoarța rădăcinii se întrebuințează în contra *teniei* (panglicei). Din coaja de rodii se extrage principiul ei activ numit *pelletierină*, care se dă pentru același scop, însă numai la adulți, în doză de 35 până la 40 ctgr., într'un sirop oarecare.

Rodul pământului, călindar, piciorul vișelului, porumbul cucului (*Arum maculatum*, fam. araceelor). — Plantă erbacee veninoasă, care crește prin păduri umbroase și dumbrași. În medicină nu se întrebuințează. Babele dau rodul pământului în contra *trânjilor*; bolnavul îl mănâncă pisat și amestecat cu miere, sau îl bea plămădit în rachi; *rânile gangrenoase* le spală cu fiertură și le ung apoi cu alifie de rădăcină și de frunze pisate, amestecate cu grăsime. *Otrăvirea* cu rodul pământului are următoarele semne: umflarea limbii, vărsături, spazme, luminile (pupilele) ochilor largite, nesimțire.

Roibă, pașachină, rodea, rumenele (*Rubia tinctorum*, fam. rubiaceelor). — Plantă erbacee care crește pe dealuri și prin vii, uneori cultivată ca plantă de vâpsit. Se întrebuințează rădăcina, care este bună în contra rachitismului. Se dă sub formă de decoct (fiertură) din 20 la 1000; praf, 2 până la 4 gr.

Roiniță, iarba stupului, mașăcină, melisă, mintă turcească, moloachă, roiște (*Melissa officinalis*, fam. labiatelor). — Plantă erbacee, foarte aromatică, ce crește prin păduri și, fiind foarte căutată de albine, se cultivă mult prin stupării. Frunzele au un miros, gust plăcut, și cam amar; ele cuprind o rezină amară și un ulei esențial, compus mai ales din *citral* și *citronellal*; au proprietăți stimulente, stomachice, antispasmodice, excitante, su-

dorifice. — La noi *apa de melisă*, se fabrică de către călugări (Mănăstirea Ciolanu, Buzău); se iau câteva picături pe o bucată de zahăr, sau în puțină apă, pentru durere de stomac și pentru sfârșeală; la țară se dă ceaiul și decoctul de melisă pentru durere de stomac, de intestine și pentru urdinare.

Roiște. — V. Roiniță.

Rom. — V. Rachi.

Romăniță bună. — V. Mușetel.

Roșcovi, roșcovani. — V. Ciupercei.

Rosinol. — V. Retinol.

Roșioară. — V. Filimică.

Rosmarin, rușmarin (*Rosmarinus officinalis*, fam. labiatelor). — Arbust mic odorant, originar din regiunea mediterană, care se cultivă prin grădini și locuințe. Ramurile florifere, *herba rosmarini*, se întrebuințează în medicină ca stomachic, stimulent și emenagog. Se dă sub formă de infuzie (ceaiul) din 10—20 la 1000; esență 4 picături, iar pe dinafară spirtul de rosmarin se întrebuințează în fricțiuni, sau pentru spălat pe cap când cineva are mătreață. — La țară femeile beau rosmarin, plămădit în rachi de drojdii, pentru vătămătură.

Rostopască, iarba rândunelei, rostopaste (*Chelidonium majus*, fam. papaveraceelor). Plantă erbacee care conține un lapte galben-portocaliu, acru și foarte veninos, cu florile galbene; crește prin locuri umbroase, pe lângă garduri, locuințe, râuri, stânci și ziduri vechi. În medicină se întrebuințează sucii plantei, mai ales al rădăcinii. Principiul activ se numește *chelidonină*, care s'a dat ca narcotic în contra durerilor de stomac (cancer) și de mațe, în doză de 10—20 ctgr. Sucul acestei plante lucrează ca purgativ. La țară se vindecă cu această plantă *negeii*, din care pricină se numește și *negelariță*. În Banat, unde se numește *Crucea voinicului*, cu frunza se leagă la tăieturi și vătămături. Rădăcina, nu multă, căci este veninoasă, dar foarte lecuitoare, se fierbe ca un decoct în rachi curat, împreună cu rădăcina tainicului, plataginei și a coadei șoricelului, punându-se și cucuruz de brad, cucuruz galben, roșcove, zahăr galben (candel) și negru și așa fierse se beau pentru *tusă*

grea. În Bucovina se vindecă *pecin-genea*, care se spală cu zeamă caldă de rostopască. Cei cu *mătreașă* se spală pe cap cu zeamă de rostopască. Cei ce au *friguri*, beau rachiul de floare și frunze. Pentru *sugel* și *beșică rea* se pune frunză, tot așa la *tăieturi* și *vătămături*.

Roșuliță. — V. *Filimică*.

Rotulă. — V. *Genunchiu*.

Rotundioară. — V. *Silnic*.

Roua cerului, iarba fiarelor, (Drosera rotundifolia, fam. droseraceelor). — Mică plantă ierbacee, care crește la munte, prin livezi. Această plantă interesantă este *carnivoră*, hrănindu-se cu insecte. În medicină se întrebuințează planta întreagă, lucrând ca antispasmodic; s'a întrebuințat în contra tusei măgărești, în contra otitei. Se dă pe *dinăuntru* sub formă de tinctură, 5—20 picături.

Rovină. — V. *Mlaștină*.

Roză. — V. *Trandafiri*.

Rozeolă (lat. roseola). — Erupțiunea de pete mici roșietice, foarte numeroase și prea puțin, sau de loc, ridicate, însoțită sau nu de febră, în general benignă. Se arată la copii în timpul dentițiunii, uneori și la adulți; după câteva zile se vindecă fără complicații. Se tratează prin odihnă în pat, regim de lapte și pudră de orez pe piele. Afară de acest fel de rozeolă, mai sunt așa numitele *rozeole secundare*, cari se ivesc în cursul unor boale infecțioase: febra tifoidă, meningita cerebrospinală, febra puerperală, reumatismul, sifilisul, etc. Mai sunt un fel de rozeole produse de diferite medicamente: iodul, balsamul copaiv, sulfatul de chinină, etc.

Rubarbă. — V. *Revent*.

Rubefiant (lat. rubefaciens). — Medicament care, dacă se aplică pe piele, produce *roșeață* și, în același timp, o *congestie sanguină*. Rubefiantele intră în cea mai mare parte între mijloacele *revulsive* cum sunt făina de muștar, esența de terbentină, aplicațiunile de apă fierbinte, etc.

Rubeola. — Este o boală epidemică molipsitoare, care nu prezintă nici o gravitate. Ea se aseamănă într-o cârva cu *pojarul* dar este cu mult mai ușoară și n'are complicații. Rubeola începe prin fiori, durere de cap, uneori spazme. Erupția constă în niște pete roșie-

tice, mai rare și nu așa de ridicate ca la *pojar*; petele produc mâncărime și dispar repede. *Tratamentul* constă în purgativ, dietă (lapte, supă), iar pentru fierbințeală se va da chinină, antipirină. La sfârșitul boalei se va face baie caldă cu săpun.

Rubia tinctorum. — V. *Roibă*.

Rubiazol. — Este un colorant azoic, cu o puternică activitate antibacteriană atât preventivă, cât și curativă. Se dă în special în boalele febrile, provocate de streptococ, având însă o influență binefăcătoare și asupra meningococilor, stafilocacilor, etc. Acțiunea lui este *preventivă*, în gripă (în timpul epidemiilor), în febra puerperală (în care se dă înainte, în timpul durerilor de facere și după naștere) și *curativă* în erizipel (brâncă), meningită, furuncule, antrax, sinuzite, otite și în multe alte infecții. Se dă sau în pastile (câte 4—12 pe zi pentru adulți, 3—6 copiilor și 1—3 pe zi copiilor până la 1 an), sau în injecții în cazurile mai grave. Medicamentul, eliminându-se din organism prin urină, o culorează în galben, lucru pe care bolnavul trebuie să-l cunoască.

Rucăr. — Stațiune climaterică de munte, se află la o depărtare de 2 ore cu trăsura dela Câmpulung (Județul Muscel), într-o poziție din cele mai pitorești; el este înconjurat de munți stâncoși și păduroși, de păduri de brazi, la o înălțime de 630 metri. Satul este mare și curat românesc, unde s'au păstrat toate tradițiile strămoșești și portul mândru. Industria casnică este în floare; acolo se coasă și se țese cămăși și fote frumoase, se țese borangicul, atât de minunat cusut, în negru, de țărance. Clima este ceva mai aspră decât la Câmpulung, dar binefăcătoare, aerul fiind ozonizat de mirosul brazilor din jur. Excursiuni sunt minunate.

Rufărie, albituri, lîngerie. — Rufăria are de scop de a apăra pielea de necurătenile de dinafară precum și de a curăți-o de acele pe cari le produce ea însăși, absorbindu-le. Rufăria se face din pânză de in, de cânepă, de bumbac. Rufeles trebuie spălate cât se poate mai des; dacă se poate este bine ca omul să se primească în fiecare zi, pentru ca pielea să func-

ționeze bine și prin urmare starea generală a sănătății să fie bună și în starea de a rezista la boale. De altfel primenirea rufăriei atârână și de meseria omului, cu cât cineva prin meseria lui este mai supus la murdărie, cu atât trebuie să se primenească mai des. Primenirea bolnavilor se va face cu ușile și ferestrele închise, pentru ca ei să nu răcească și în vreme de iarnă rufele vor fi încălzite înainte de a fi date bolnavilor.

Rug, ruje. — V. *Trandafiri*.

Rug de munte, rug de smeură. — V. *Smeură*.

Rugeolă. — V. *Pojar*.

Rugul jidovului. — V. *Smeură*.

Rujuliță. — V. *Filimică*.

Rumegare. — V. *Mericism*.

Rumenele. — V. *Roibă*.

Rumineală. — V. *Fard*.

Rupia. — Este o boală de piele care se arată la persoanele slăbite, cachectice. Ea se prezintă sub formă de cruste (coji) cenușii formate dintr'un amestec de puroiu, de serozitate și de sânge, cari cad după câteva săptămâni, lăsând în urma lor răni sângerândă cu marginile groase și vineții. În cele din urmă se vindecă, sub formă de pete negre înfundate. Rupia se arate cu deosebire la persoanele slabe, cachectice; ea se mai observă în unele forme de sifilide. *Tratamentul* intern constă în tonice potrivite după starea bolnavului, iar *tratamentul* local este ca cel dela *ectima*.

Ruşcuță primăvăratăică, spânț (*Adonis vernalis*, fam. ranunculaceelor), care



crește pe colinele, mai ales calcaroase, pe locuri deschise și prin poieni, în regiunea câmpiilor. Principiul activ este *adonidina*. Proprietăți: regulează bătăile inimii, mărește presiunea arterială, face ud mult (diuretic). Se întrebuințează frunzele și tulpina, se dă în ceaiu, 20 la 1000; extract apos și alcoolic 50 ctgr. până la 1 gr.; tinctură 4—8 gr. pe zi.

Ruşinea fetei. — V. *Morcov sălbatic*.

Rută, virnanț (*Ruta graveolens*, fam. rutaceelor). — Plantă erbacee originară din regiunea mediteraniană, cultivată mult și vulgarizată pentru uzul medical. În medicină se întrebuințează vârfurile înflorite, cari lucrează ca *emenagog puternic* și excitant nervin. Se dă pe *dinăuntru* sub formă de: esență 1—10 picături; extract alcoolic 10—25 ctgr. infuzie (ceaiu) 2 la 1000; praf 1—1 gr. și jumătate. — La țară se culeg vârfurile înflorite în lunile Iunie și August, se usucă la un loc nu prea călduros și se păstrează în săculețe de pânză, ferite de umezeală, pentru a face un ceaiu, luându-se căldicel când cineva are durere de stomac și colici de mațe.

S Ș

S. A. — Prescurtare care se pune pe ordonanțele medicale în locul cuvintelor latine: *secundum artem*, cari înseamnă *după artă*, adică farmacistul să prepare prescripțiunea medicală după regulile artei.

Sabină, cetenă de negi (*Juniperus sabina* sau *sabina officinalis*, fam. coniferelor). — Arbust în totdeauna verde, originar din regiunea mediteraniană care se cultivă adeseori prin parcuri. În medicină se întrebuințează frunzele și vârfurile ramurilor pentru proprietățile lor abortive, emenagoge, vermifuge și escarotice (pentru scăderea negilor).

Sabur, aloe (aloes). — Este un medicament, sau mai bine zis o curățenie, cunoscută de multă lume, care foarte adeseori se ia fără porunca doctorului. *Aloele*, sau *saburul*, este suc ce se obține, prin diferite proceduri de scurgere, din foile cărnoase și în stare proaspătă ale mai multor plante din familia liliaceelor, cari cresc în Africa tropicală. În farmacie se folosește *Aloele socrotin*, sau translucid, care vine în bucăți, sau în felii, de o culoare roșie, o transparență imperfectă, de aspect sticlos. Saburul este un purgativ drastic, o curățenie tare. *Pilu-lele* sunt cunoscute sub mai multe

numiri: *Anderson, antecibum, Bon-tius, Hollowa, hapuri de viață și de sănătate*. Sub formă de tinctură alooele constituie *elixirul de viață lungă* (Codex). Pentru gustul său amar, se întrebuințează spre a înteiți pofta de mâncare și grăbește mistuirea la cei al căror stomac este leneș, la cei ce se balonează după mâncare. Saburul se întrebuințează mai ales ca *purgativ* și atunci se ia 30 până la 60 ctgr. și chiar 1 gr. de odată. Saburul pe lângă că este *purgativ drastic, tonic*, mai e și *emenagog* (provoacă menstruația), *antihelmintic* (contra viermilor intestinali).

Săcară cornută (*Secale cornutum*) *clonții babei, corn de săcară, mama săcării*.—În holdele de săcară se văd, mai ales în apropiere de munți, unde clima este mai rece, unele spice cari au niște grăunțe, mari, negre-vineții, cari ies din șirul celorlalte. Aceste grăunțe poartă mai multe numiri, cel mai întrebuințat în medicină fiind numele de *săcară cornută*; ele au o lungime cam de 2—3 cm. și o grosime de 2—4 milimetri, sunt subțiate la capete, cam arcate, având forma unui *corn*, sau a unui *pintene de cocos*; pe dinafară au o culoare neagră-vineție și se rup cu înlesnire, lăsând să se vadă o masă internă alburie și compactă. Aceste grăunțe sunt produse de o ciupercă numită *Claviceps purpurea*, care atacă grăunțul de săcară tânăr și îl schimbă în *corn de săcară*, cari ajung la un spic de săcară, după ce au fost atinși de o ploaie caldă, încolțesc și formează niște fire subțiri, cari se întretes luând forma de mucegai. Firele acestea ocolesc încet cu încetul întreg grăunțul tânăr (ovariul). Mucegaiul grăunțului începe să rodească și produce *conidii*. Acești spori, suflați de vânt, se duc pe alte spice, încolțesc și le îmbolnăvesc și pe acelea. Buretele care înconjură grăunțul de săcară tânăr și produce conidii și spori; a fost considerat mult timp ca un burete deosebit, sub numele de *Sphacelia segetum*. În conidiile buretelui se găsește o materie dulce, căutată de albine, de fluturi și de alte insecte, cari în timpul când sug dulceța buretelui se încarcă pe corp cu semințe de burete, cu spori

și, trecând la alte specii, duc sporii și le îmbolnăvesc și pe acelea. Buretele din jurul grăunțului de săcară, după un timp oarecare, încetează cu conidiile și sporii, pătrunde în miezul grăunțului, unde se îndoiește, se încolăcește mai de multe ori, formând o țasătură albă, care crește de jos în sus, umple grăunțul și îl face mai mare decât celelalte. Această țasătură albă, înconjurată de o peliță neagră-vineție, este așa zisa *săcară cornută*, sau *mama săcării*, sau *cornul de săcară*, miceliul buretelui *Claviceps*. Din acestea se vede că *cornul de săcară* este a doua formă a buretelui; cea dintâi a fost aceea din jurul grăunțului (*Sphacelia*), care slujește la înmulțirea din timpul verii, iar a doua este corpul de săcară (*săcară cornută*), care trebuie să ierneze și să continue cu înmulțirea buretelui, prin sporii care-i produce primăvara. Săcară cornută este *otrăvitoare* prin alcaloidul care îl conține, cunoscut sub numele de *ergotină*. Prin urmare făina amestecată cu săcară *cornută* nu este bună și dă naștere la o boală foarte gravă, cunoscută sub numele de *ergotism*. Săcară cornută se întrebuințează foarte mult în medicină, pentru proprietatea ce are de a provoca contracțiunile mitrei (*abortiv*) și de a opri sângele (*emostatic*). Pentru *extractul apos* și *alcaloidul* cristalizat al săcării cunute să se caute la *Ergotină* și *Ergotinină*.—*Otrăvirea* cu săcară cornută are următorul tratament: spălarea stomacului, sau să se dea *vomitiv*, *purgative* (unt de ricină 30 gr., sulfat de sodă 30 gr., ulei de croton (1 sau 2 picături), tanin, în doze de câte 2 gr., în apă, des repetate, ceai rusesc tare (toate acestea la trebuință se vor introduce în stomac cu sonda), înhalțiuni de nitrit de amil, caldura la mâni și picioare.

Săcărea. — V. *Chimen*.

Săcărea, Săcărea de grădină. — V. *Molură*.

Sacăz. — V. *Mastic*.

Saccharină, zaharină. — Derivat al acidului benzoic; praf cristalin alb, fără miros, cu o putere îndulcitoare foarte mare (de 280 de ori mai mare decât a zahărului). Se absoarbe ușor și se elimină prin urină. Pentru ani-

male nu este toxică, însă ea împiedecă funcțiunile digestive opunându-se la lucrarea pepsinei asupra albuminei și a diastazei asupra amidonului. Lucrează ca antiseptic și antifermentescibil destul de puternic. Se întrebuințează mai cu seamă pentru a înlocui zahărul la cei ce suferă de *diabet* (5 ctgr., amestecată cu 5 ctgr. de bicarbonat de sodă echivalează cu o bucată de zahăr); ea are gustul dulce dar n'are nici o valoare alimentară. Se întrebuințează sub formă de tăblițe de câte 5 ctgr. (asociată cu bicarbonat de sodă), 1—4 pe zi. Se va supraveghea efectul și se va suspenda îndată ce se ivesc turburări digestive.

Saccharum. — V. *Zahăr*.

Sacrum, osul crucii. — Este un os în formă triunghiulară, așezat între cele două oase iliace (oasele șoldurilor) cu cari constituie *ligheanul* (*bazinul*); el



Fig. 392 — Sacrul

a = văzut dinsinte; b = văzut dinapoi

formează partea de jos a șirii și se compune din cinci vertebre rudimentare, sudate între ele; de desubtul lui se găsește *osul noadei*. De sacrum se prind mușchii profunzi ai spatelui și buclilor.

Safran. — V. *Safran*.

Săfterea. — V. *Fumărică*.

Săgetătură. — V. *Apoplexie*.

Saiodină. — Preparat de iod, succedaneu al iodurului de potasiu. Fără gust; acțiune repede; ușor de suportat. Doză: 2—4 gr. pe zi; dozele se iau la o oră după masă.

Salacetol, salicilacetol. — Rezultă din acțiunea monocloracetinei asupra salicilatului de sodă. Antiseptic mai ales intestinal și superior salolului, desdoindu-se în intestine în acid salicilic și în acetol. Doză: 2—3 gr. pe zi, dizolvat în 20—30 gr. de ulei de ricin:

bun în diareele coleriforme și reumatismul articular acut. Pe dinafară se dă în aligie 20 la 100.

Salacresol. — Se obține prin acțiunea acidului salicilic asupra creozotului. Lichid închis, uleios. Aplicat asupra pielii se rezoarbe ușor, fără s'o یره și se descompune în organism. Se întrebuințează pe *dinafară*, aplicându-se prin ungeri, sau fricțiuni pe partea bolnavă, în doză de 5—20 gr. pe zi, în reumatisme, în brâncă și ca colutor în anfine.

Saladă, salată. — V. *Lăptuci*.

Salată. — Preparațiune culinară a cărei bază este constituită de foile sau frunzele mai multor plante, sălbatiche sau cultivate. Păpădia, Lăptucele, etc.). Salata este un aliment plăcut din cauza condimentelor pe cari le are, nu este bună însă decât pentru stomacurile tari din cauză că se mistuie greu.

Salbă moale. — V. *Nerprun*.

Salbie, sălvie, de grădină. — V. *Jale*.

Salcă, răchită albă, salce, salcie alburie (*Salix alba*, fam. salicineelor). — Arbore mic, care crește pe malurile râurilor și în locurile umede. Rădăcina conține un principiu numit *salicină*, care lucrează ca astringent și febrifug; se dă în doză de 1—4 gr.

Salce. — V. *Salsaparilă*.

Salep. — Se numește astfel *fecula* scoasă din tuberculele uscate ale diferitelor specii de *Orchis* (fusca, maculată, speciosa, ustulată, etc.). Salepul este o substanță nutritivă, ușor de mistuit; el se prepară cu zeamă de carne (bulion), sau cu lapte și este o mâncare plăcută, foarte bună și potrivită pentru stomacurile oamenilor slabi și convalescenți.

Salibromină. — Este o combinație organică de brom (51.6 la 100) și de acid salicilic (44.5). — Praf alb, fără gust, fără miros. Lucrează ca antiseptic. Doză: 2—5 gr. pe zi, în buline de câte o jumătate gr.

Salicilie (Acid), salicilate. — Acidul salcic este antiseptic, antifebril, anti-reumatismal. Se dă pe dinăuntru în doză de 1 până la 2 gr. în buline, sau într'o poțiune, iar pe *dinafară* în alifie 1 la 10, sau în soluțiune 1 la 50, sau în praf asociat cu talc 1 la 10 gr. (bun pentru nădușeala de pi-

cioare). *Salicilatul de bismut* se recomandă mult ca dezinfectant al intestinului, antidiareic. — Se dă în doză de 2—10 gr. în prafuri, buline sau poțiune. — *Salicilatul de litină* este foarte bun în contra gutei, gravelei, acidului uric. Se dă în doză de 50 ctgr. până la 2 gr. pe zi, în buline. — *Salicilatul de metil* se recomandă în reumatismul muscular și în cel articular pentru a micșora durerile. El se întrebuințează pe *dinafară* astfel : se toarnă pe o bucată de flanelă, sau de pânză, 20—50 picături, cari apoi se aplică pe locul dureros, unde se ține cât poate răbda bolnavul ; aceste aplicațiuni se pot face de 3—4 ori pe zi. E mai bine să fie întrebuințat următorul unguent : *Salicilat de metil* 5 gr., vaselină pură 50 gr. cu care se unge locul dureros și apoi se acopere cu o flanelă. — *Salicilatul de sodă* este, am putea spune, specificul reumatismului articular acut (v. *Reumatism*), pe care îl ameliorează în câteva zile, cu condiția de a fi dat în doze mari. Se mai recomandă în pleureziile, endocarditele reumatismale, reumatismul muscular, sciatică, irită reumatismală, reumatismul infecțios (blenoragie, etc.), artropatiile gutoase sub acute și cronice, în colicile de ficat, icter infecțios, epatite infecțioase, etc. Nu se poate da la cei ce sufăr de nefrită cronică, boală de inimă înaintată, arterioscleroză, etc. Se dă în doză de 4—12 gr. pe zi, în buline sau în soluțiuni pentru pansamente, gargarisme, clizme, loțiuni, etc.

Salicilină. — V. *Salcă*.

Saliformină. — Prafcristalin alb. Antiseptic și bun disolvant al acidului uric, se recomandă mai cu seamă în afecțiunile infecțioase ale căilor urinare, când urina este amoniacală. *Doză* : 1—2 gr. pe zi.

Sălină. — V. *Țelină*.

Salipirină, salicilat de antipirină sau de *analgezină*. — Combinație a antipirinei cu acidul salicilic, în părți egale. Antitermic și analgezic, în nevralgii și în reumatismul cronic. *Doză* : 2—6 gr. pe zi, în buline de 1 gr. (la 2 ore câte unul).

Salivă (lat. *saliva*, grec. *sialon*, *pryalon*). — Este un lichid transparent, cam viscos, fără gust, fără miros, puțin mai

dens decât apa. Se compune din apă, săruri și o substanță albuminoidă numită *diastază* (gr. *diastasis*, separațiune) sau *ptialină*, ferment solubil, care transformă amidonul în zahăr, așa că saliva începe mistuirea substanțelor feculente și amilacee, cari constituie cea mai mare parte a pâinii și a legumelor. Saliva este produsă de 6 *glande salivare*, câte 3 de fiecare parte : *glanda parotită, submaxilară și sublinguală* : *Glanda parotidă* (gr. *para*, lângă și *otos*, urechie) este așezată înaintea urechii, între piele și mușchiul mestecător) și cântărește 25 gr. Saliva acestei glande se varsă în gură, în dreptul primei măsele mari de sus. Saliva produsă de parotidă este foarte lichidă, alcalină, și se scurge mai cu seamă când mestecăm. *Glanda submaxilară* se află sub falca de jos și cântărește cam 6 gr. ; ea își varsă saliva în apropiere de frâul limbii. *Glanda sublinguală* se găsește sub poduța guri, într'o gropiță a osului fălcii de jos și își varsă saliva în apropiere de orificiul precedent. Saliva acestor două glande este vâscoasă și se întinde ca un fir de ață între degete ; ea lipește particulele alimentare între ele și ajută înghițirea (v. *Digestiune*). *Cantitatea salivei* variază dintr'un minut în altul și după starea de sănătate sau de boală. Între mese saliva este mai puțină ; ea se înmulțește când mestecăm și când dăm de gustul și mirosul mâncărilor, atunci curge în cantitate mare așa că ni se *umple gura de apă*. Saliva se împuținează în urma unei emoțiuni morale mari, supărare sau spaimă, uneori pierde de tot, încât ni se usucă gura și gâtul și nu mai putem înghiți nici vorbi. — Când saliva se produce în cantitate prea mare avem ceace se chiamă *salivație* (ptialism). Sunt unele medicamente (iodurul de potasiu și mai ales mercurul) cari, intrând în corpul nostru, sub orice formă și pe orice cale, provoacă o secreție mai mare de salivă (*salivațiune mercurială*). În timpul *sarcinii* femeile au salivație, uneori foarte mare, care durează câteva zile la început, apoi dispare dela sine. Salivația se mai observă în inflamațiunile de gură și de gât (stomatite, amigdalite, angine), sau în unele

boale nervoase (isterie, epilepsie, turbare, nevralgie facială). — Saliva este în *cantitate mai mică*, sau poate să *lipsească cu totul*, în unele boale: febrele grave, în cari gura este uscată, roșie, caldă, limba se lipește de cerul gurii, vorbirea este anevoioasă, înghițirea grea, etc. — Saliva în stare normală nu are gust, dar în unele boale poate să aibă un gust variabil, astfel în diabet saliva este puțină și dulce.

Sălnică. — V. *Silnic*.

Salochinină, eter chinic al acidului salicilic. — Lucrează ca și chinina, adică este antiperiodic; bun analgezic în contra nevralgiilor. *Doză*: 2—6 gr. pe zi, în buline, prafuri, sau într'o poțiune. Nu produce zăpăceală ca chinina.

Salofen. — Lamele cristaline, fără culoare și fără miros, aproape insolubile în apă rece, solubile în alcool. Antiseptic intestinal ca și salolul și benzonafitolul. S'a dat în contra reumatismului articular ca succedaneu al salicilatului de sodă. *Doză*: 4—6 gr. pe zi, în 4 sau 6 rânduri.

Salol, salicilat de fenol. — Praf alb cristalin, antireumatic, antipiretic și antiseptic. Se recomandă mult în boalele căilor urinare; el face urina aseptică, pentru care se dă în boalele contagioase și în cazurile chirurgicale. *Doză*: 1—4 gr. până la 8 gr. Pe *dina-țară* se întrebuințează ca și iodoformul, pulverizând rănilor, plăgile, tuburile de drenaj, piesele de pansament.

Salpetru. — V. *Nitrate* și *Potasiu* (Acetat de potasă).

Salsaparilă, salce, sarce. — Rădăcina mai multor specii de *Smilax: medica, officinalis, sarsaparilla*, etc., din fam. smilaceelor, cari cresc în America centrală și de sud. Această rădăcină are o culoare cenușie, un gust amar și acru; în doză mare produce vărsături și stare de toropeală, în doză mică produce sudoare, deschide pofta de mâncare, ușurează mistuirea, dă putere și îmbunătățește starea de sănătate a celor ce sufăr de dureri reumatice, de boale de piele, de scrofule, etc., lucrând ca un bun curățitor de sânge (depurativ). Se dă sub formă de tizănă (băutură) din 60 gr. la 1000 apă; sirop simplu sau depurativ, 50—

120 gr.; sirop compus care conține și siminichie, limba mielului și trandafiri; extract 1—5 gr.; praf 1—10 gr. La *fară* babele întrebuințează *salcea* foarte mult dându-se celor cu boale lumești.

Saltea. — V. *Pat*.

Saltea de apă sau de aer. — Această saltea se face din cauciuc vulcanizat și se poate umplea cu apă sau cu aer. Ea se întrebuințează la bolnavii atinși de boale învechite, sau de boale lungi, pentru a preîntâmpina rănirea șalelor și a șoldurilor prin zăcere lungă, este bună pentru că se poate spăla ușor, ori de câte ori este murdărită de bolnav.

Salvari. — V. *Pantaloni*.

Salvia officinalis. — V. *Jale*.

Sambucus ebulus. — V. *Boz*.

Sambucus nigra. — V. *Soc*.

Șampanie. — Șampania este, dintre toate vinurile spumoase, cel mai bun, mai gustos și mai sănătos. Culoarea șampaniei variază, uneori albă, alteori roșietică, deși ea se prepară în totdeauna din struguri negri (v. *Vin*). Șampania conține cam 11—12 la 100 alcool, dar însușirea ei cea mai de căpetenie se datorește acidului carbonic, pe care îl are și este cu atât mai spumoasă cu cât are mai mult din acest gaz; unele, cari au mai puțin acid carbonic, spumează puțin, cele cari n'au de loc nu fac spumă. Șampania lucrează asupra creierului, stomacului și rinichilor. Ea întârță inteligența, o excită, mintea devine mai vioaie, gândurile se înveslesc, dar șampania îmbată mai repede decât celelalte vinuri, beția ei însă este trecătoare, veselă și nu tâmpită și greoaie cum este cea produsă de vinurile și băuturile mai alcoolice. Pentru stomac de asemenea șampania este bună, căci îl stimulează și oprește vărsăturile; tot așa și pentru rinichi, fiind diuretică, adică înlesnește facerea urinei. Șampania prea multă produce neliște și nedormire și dacă abuzul se continuă devine primejdioasă. Pentru stomacurile leneșe, care mistuie greu dar nu sunt dureroase, cel mai bun leac este câte nițică șampanie, mai ales șampanie ținută la gheață (frapată) luată în timpul mâncării. Șampania mai e bună și la vărsăturile pro-

SĂNĂ

duse de răul mării, de meningită, de peritonită.

Sănătate (lat. *sanitas*). — Se numește *sănătate* starea corpului nostru, în care toate funcțiunile se îndeplinesc cu ușurință și în mod regulat. Sănătatea este echilibrul dintre toate organele, întreținut astfel încât fiecare organ să-și îndeplinească în mod exact rolul său, așa că nici unul să nu rămână înapoi în slujba lui, nici să nu lucreze mai mult decât este trebuință. Maxima lui Juvenal: *mens sana in corpore sano*, ne arată cât de intim este raportul între moralul și fizicul nostru, cum o minte sănătoasă nu se poate adăposti decât într'un corp sănătos și prin urmare cât de mult trebuie să ne păzim sănătatea.

Sanatoriu (lat. *sanatorium*). — Prin acest cuvânt se înțelege la noi un stabiliment adoptat în mod special la cura igienico-dietetică a *tuberculozei pulmonare* (ofticei). Situația, expoziția, amenajarea interioară și exterioară trebuie să contribuie la cea mai bună realizare a *curei de aer* și a *supra-alimentării*. Un sanatoriu trebuie să fie instalat într'un *climat favorabil*, uscat și cu mult soare, cu aer curat, cu plantațiuni, mai ales de brazi și la o altitudine oarecare deasupra nivelului Mării, dacă aceasta este cu putință. — Să aibă *camere mari*, întinse, bine aerate ziua și noaptea, ușor de ținut în stare aseptică, încălzite în mod igienic. — Mijloacele de *hrană* să fie îndestulătoare și variate; *supraveghiere medicală* continuă. La noi în țară s'a făcut un bun început în această privință. În București funcționează un astfel de stabiliment pe dealul Filaretului și alte sanatorii în diferite părți ale țării (Geoagiu, Cluj, Vijița, Moreni, Budachi, etc.) aduc mult bine celor ce le cer ajutorul. Tot numele *sanatoriu* se dă unor spitale particulare, unde se operează și se îngrijesc bolnavii, plătindu-și fiecare întreținerea. Asemenea sanatorii se găsesc aproape în toate orașele și sunt, de regulă, proprietatea medicilor.

Șancăr sau **Șancru** (*Ulcusculum can-crosum*). — Este o rană, sau mai bine zis un ulcer venerian, contagios, ale cărui urmări nu sunt întotdeauna

ȘANC

sifilisul, însă care dă naștere adeseori la complicații serioase. Sunt mai multe feluri: *șancăre moi simple*, *șancăre îndurate* sau *sifilitice* și *șagedenice*. — *Șancărul moale simplu*, numit și *șancroid* se vede cu mult mai des decât cel *îndurat*. El se ivește în puțin timp (1—3 zile) după o împrejurare necurată; este rotund, cu marginile tăiate drept, puțin deslipite; mai în totdeauna sunt în același timp mai multe șancăre de aceeași natură; din aceste răni se scurge un fel de puroi virulent și contagios (lipicios, molipsitor) în mare cantitate. Șancărul moale are pornire spre întindere; el nu se înconjoară, chiar și când se aprinde (se inflamează), de un cerc sau aureolă dură, tare, sgârcioasă. El dă naștere adeseori la baboane, a căror puroiu se poate inocula chiar pe bolnavul însuși și dă naștere la o rană, sau șancăr, care se aseamănă cu cel dintâi. Durata șancărului moale este adese ori foarte lungă, însă mai întotdeauna se vindecă prin Fig. 393 — Șancru sifilitic



— *Șancărul îndurat*, numit și *șancăr infectant*, sau *șancăr sifilitic*, este rotund, dar cu suprafața netedă, cu fundul cenușiu; centrul său este mai închis, marginile lui sunt ridicate, nedeslipite, de obicei el este singur, unic, face puroiu puțin, baza lui este tare, îndurată și rezistentă ca sgârciul, iar puroiul lui nu se mai poate inocula la însuși bolnavul care este infectat de mai înainte. El dă naștere la niște adenite (scurte) cari sunt mai multe și de ambele părți, nedueroase, nu fac puroiu și nu se sparg, nu se deschid. Durata acestui șancăr variază între 4—6 săptămâni. Indurația, sau țăria, persistă câțva timp și după cicatrizare. Șancărul îndurat nu se ivește îndată după împreunarea necurată, ci numai după o perioadă de incubație (clocire) destul de lungă. — *Șancărul mixt*, sau *amestecat*, este acela care are însușirile atât ale șancărului

moale cât și ale șancărului îndurat. Dacă inoculăm pe suprafața unui șancăr îndurat puroiul unui șancru moale se poate forma o ulceratie care este în același timp infectantă și reinoculabilă la aceeași persoană; numai astfel se poate explica cum un șancăr moale a putut deveni sifilitic. — *Șancărul fagedenic* (*serpiginos*, *rozător*, etc.) este acela care se întinde în suprafață, distruge pielea și țesutul celular subcutanat, ia o formă neregulată, serpiginuoasă (șerpuitoare), cu marginile rupte, deslipite, găurite în unele puncte, fundul este cenușiu murdar; puroiul inoculabil; cele mai adeseori nu este sifilitic, adică nu dă naștere la accidente secundare. — *Tratament*. Pentru șancărul moale simplu, la început, se va căuta să se distrugă rana prin *caustice* sau prin *termocauter*, ori *galvanocauter*. Odată șancărul constituit se vor prescrie *băi locale* de 2 ori pe zi în apă fenicată (1 la 100), sau într-o soluție de sublimat coroziv (1 la 4000) la temperatură de 45°; se va arde tot la 3—4 zile cu clorur de zinc (1 la 10) sau cu nitrat de argint (5 la 100), sau cu acid fenic 1 gr. la 10 gr. alcool de 90°. După fiecare ardere se va pansa rana cu iodoform, xeroform, iodol, aristol, dermatol, salol, etc. Pentru șancărul fagedenic se va pansa rana cu unguent cinereu, sau cu iodoform, se va arde cu perclorur de fier sau cu termocauterul, iar pe dinăuntru se va da un tratament *mixt*: iodur de potasiu, 2 gr. pe zi, fricții, sau injecții mercuriale. Pentru șancărul îndurat, vezi la *Sifilis*.

Sânge (lat. *sanguis*, grec. *haima*). — Sângele este lichidul hrănitor al corpului nostru; el duce elementele destinate pentru întreținerea sănătății și a vieții în toate părțile. Dacă, din vreo cauză oarecare, sângele nu poate merge într-o parte a corpului, acea parte se gangrenează, moare. Dacă sângele curge din corp în măsură prea mare, omul moare. Din acestea se poate vedea foarte bine cât de mare importanță are sângele pentru viață. Sângele este pus în mișcare de către inimă, de unde pleacă prin niște canale, numite *artere*, în toate părțile corpului, unde vine în atingere cu toate particulele cele mai adânci și mai mici,

prin niște tuburi foarte fine, numite *capilare*, apoi se întoarce iar la inimă prin alte canale numite *vânc*. Această plimbare a sângelui în corpul nostru se numește *circulația sângelui* (v. *Cord și Circulație*). Când sângele iese din inimă este de culoarea roșie deschisă și această culoare o păstrează în tot drumul pe care îl face prin artere, apoi, după ce a hrănit toate țesuturile el își schimbă culoarea și devine aproape negru și astfel se întoarce la inimă, care pe alte căi îl trimite în plămâni, ca să se primenească, să dea afară *acidul carbonic* și să ia o nouă doză de *oxigen*, care la minut îi redă culoarea lui roșie. *Compoziția sângelui* am arătat-o la *Cord și Circulație*. Amintim numai că sângele se compune din două părți; o parte lichidă, care este *serul* (zărul), și o parte solidă care este formată de *globulele roșii* și *albe*, cari iau oxigenul din plămâni și îl duc în intimitatea țesuturilor corpului, împreună cu cele mai multe principii hrănitore, luate din tubul digestiv. — *Cantitatea totală* a sângelui din corpul omului este în termen mijlociu a *noua* parte din greutatea corpului. La un om adult vine cam 6 litri și ceva, iar la cântar 6 Kgr. și jumătate. Omul nu poate să piardă dintr'odată mai mult de 3—4 Kgr. de sânge, pentrucă moare. Când omul a pierdut sânge mult, până la 3 Kgr., sănătatea lui este primejduită. În aceste cazuri cel mai bun lucru este să i se facă o *transfuzie de sânge*, care constă în a face să treacă în vinele lui o cantitate de sânge din vinele unui om sănătos și robust (vezi *Transfuzie*). — Corpul nostru suferă foarte mult, ori de câte ori *cantitatea sângelui* se împuținează prin esirea lui bruscă din vase (v. *Emoragie*, *Epistaxă*, sau curgere de sânge din nas, *Pierderi*, *Plagă*, *Scuipare* de sânge, *Vărsături* de sânge). De asemenea noi suferim și când *calitatea sângelui* nu mai este normală, când el este mai sărac în globule (v. *Anemie* și *Cloroză*) sau când el se strică prin formarea unor principii pe cari nu le are în stare obișnuită (v. *Diabet*, *Otrăvire*, *Turbare*). Era un timp când mulți ofticoși, la începutul boalei și mulți anemici, după recomandăția doctorilor, făceau *cură*

de sânge în abator. Când se tăiau vitele luau sângele cald și îl beau, un sfert de pahar până la un pahar. Această cură desgustătoare a fost în curând părăsită, căci s'a constatat că cea mai mare parte din sângele înghițit merge afară cu scaunele, ne fiind digerată. Sângele care se scurge dintr'o friptură, este bun ca excitant al secrețiunii gastrice și în același timp și un reconstituant, mai ales pentru copii. *Băile de sânge* n'au nici un efect și astăzi sunt cu totul părăsite. Azi se întrebuințează diferite părți cari compun sângele (hemoglobina, serul, etc.) și despre care am vorbit la capitolele respective.

Sânge (Curgere de). — V. *Emoragie*.

Sânge (Lipsă de). — V. *Anemie* și *Cloroză*.

Sânge (Prea mult). — V. *Pletoră*.

Sânge (Scuipare de). — V. *Emoptizie*.

Sânge (Vărsare de). — V. *Ematemeză*.

Sânge de nouă frați, sângele dracului. — Product vegetal rășinos, recoltat de pe fructul plantei acățătoare *Calamus Draco*, din fam. palmierilor, originară de Borneo și Sumatra și din insulele Sonde. *Sângele de nouă frați* este o substanță rășinoasă, solidă, uscată spărgăcioasă, opacă sau puțin transparentă, de o culoare roșie, fără miros, fără gust, solubilă în alcool și în uleiurile grase și volatile, este inflamabilă și arde răspândind un miros balsamic plăcut. În medicină se întrebuința odată ca astringent și emostatic (opritor de sânge), sub formă de praf, 1—10 gr. — La *fară* femeile beau pentru vătămătură sânge de nouă frați, plămădit în rachiu.

Sângele dracului. — V. *Sânge de nouă frați*.

Sângeorgiul românesc. — Stațiune balneo-climaterică, la poalele munților Rodnei, pe linia ferată Cluj—Rodna Veche. Sezonul 15 Mai — 15 Septembrie. Sunt 5 izvoare cu apă de băut, cunoscută în comerț sub numele de „Hebe” și apă pentru băi, reci și calde. Apa conține bicarbonat de sodiu, magneziu, fier, litiu, cloruri și urme de iod. Este recomandabilă în bolile tubului gastro-intestinal, ficatului, sistemului urinar, în bolile de femei, etc. Se găsesc vile frumoase și hoteluri cu restaurante ce oferă vizitatorilor

regimul alimentar recomandat de medici. (După D-rii Câmpeanu și Țeposu).

Sănitore. — V. *Pojarniță*.

Sanaform, diodosalicilat de metil. — Praf alb cristalin, fără miros, fără gust, solubil în alcool, eter, vaselină. Se întrebuințează ca succedaneu al *iodoformului* (vezi acest cuvânt).

Santal. — *Santalum album*, sau *santalul citrin*, este un arbore care crește în Indii și Oceania; din lemnul lui se scoate prin distilație *uleul de santal*, care este galben deschis. Acest ulei se întrebuințează în contra bleonoragiei (sculamentului), când se dă în ultima perioadă a boalei, după ce a trecut faza de inflamație; el lucrează eliminându-se prin urină. Se dă în doză de 1—8 gr., în capsule de câte 25 ctgr.

Santonină. — V. *Semen-contră*.

Sânuri (dela lat. *sinus*) *mamele, țâțe*.

Așa se numesc cele două organe sau glande cari produc laptele și cari sunt așezate în partea de sus a pieptului, una de fiecare parte, deasupra mușchiului marele pectoral, începând dela coasta a 3-a și până la a 7-a, între osul pieptului (stern) și subțioară. Țățele au formă emisferică, cu o mică ridicătură conică la mijloc, care se numește *mamelon* (*sfârc, gurguiu*). Acest sfârc are o lungime de un centimetru până la unul și jumătate; el are culoare roșietică, sau neagră și este înconjurat la baza lui de un cearcăn (*areolă*) de aceeași culoare și a cărui suprafață este aspră (rugoasă) în timpul sarcinii. Gurguiul are 12 până la 15 găurele, pe unde curge laptele și cari sunt terminațiunea *canalelor galactofore*. Țăța, sau *glanda mamară*, este formată prin reunirea a vreo cinci-sprezece glande în formă de ciorchină, cari dau naștere la tot atâtea *canale galactofore*, cari se deschid în gurguiu, după cum am arătat mai sus. Glanda mamară este înconjurată de un strat



Fig. 394
Secțiune în sân
2=mamelon; 3-4=
glande de lapte

gros de grăsime. În timpul sarcinii femeia simte în sânuri un fel de înțepături și o greutate; ele cresc și în minutul facerii sunt gata să hrănească pe noul născut (v. *Alăptare*). Când vrem să luăm o doică pentru copil trebuie, mai înainte de toate, să se



Fig. 395. — Glandă a mamei

a = glandă de lapte; b = canal lactifer

examineze țățele (v. *Doică*). De asemenea și când mama voeste să-și alăpteze copilul, ceace este foarte bine, atât pentru ea cât și pentru copil, trebuie să vedem dacă este sănătoasă, dacă are lapte îndeajuns și bun, dacă

sfârcurile sunt bine conformate pentru ca să poată suga copilul. Cantitatea laptelui produs de femeie în 24 ore se ridică la un litru și două sute grame, iar compoziția lui este urmată de: *caseină* (materie albuminoidă) 28, *unt* (globulele laptelui) 30, *lactoză* (zahărul laptelui) 45, *fosfate* 2.56, apă 894.50 la 1000. Hrana femeii are mare influență asupra secrețiunii laptelui și asupra regularității sugerilor. Unele medicamente date doicii, sau mamei, trec în lapte, de unde și puțința de a da copilului medicamente pe această cale. — *Boalele sânilor*. *Loviturile* sau *contuziunile* sânilor se observă foarte des, din pricină că aceste organe, prin poziția lor, sunt foarte expuse; ele sunt foarte dureroase și de multe ori dau naștere la abcese și chiar la cancer. *Plăgile* și *arsurile* se tratează ca și în alte regiuni. La femeile tinere, a căror piele este foarte fină, când alăptează pentru prima oară se întâmplă câteodată să le pleznească sfârcurile, și le împiedecă de a da lapte (v. *Creșterea*). Aceste pleznituri, sau crăpături trebuesc tratate cât se poate de iute și de bine, căci ele pot da naștere la *inflamația* sau *aprinderea sânilui*, cu formare de *puroi*, care mai poate fi produs de frecarea sânilui de corset, de lovături, de plăgi, de arsuri, dar mai mult de îngrămădirea de lapte prea mult în țăță, fie prin faptul că nu se dă regulat copilului să sugă,

fie că copilul a ajuns la *înțărcat* și femeia încetează de a mai da lapte. — *Tumorile sânilui* sunt *benigne*, adică de bună natură, cari se ivesc înainte de vârsta de 40 de ani, nu recidivează după ce au fost ridicate și nu strică sănătatea generală, cum sunt: *fibromele*, *adenomele*, *adenofibromele*, *adenomixomele*, sau *maligne*, adică de rea natură, cari sunt rău limitate, aderente de restul glandei, se confundă cu ea, năvălesc repede țăsurile vecine, infectează ganglionii limfatici, recidivează, după ce au fost ridicate, se generalizează, *cancerale*, *epiteliomele*, *carcinomele*.

Saponaria officinalis. — V. *Odogaci*.

Săponel, săponele. — V. *Odogaci*.

Săpun (lat. *sapo*). — Săpunurile sunt niște combinații ale acizilor grași cu oxidele metalice. Săpunurile cu bază alcalină sunt solubile (se tolesc) în apă și mulțumită acestei însușiri ele curăță așa de bine; se tolesc și în alcool și în eter. Toate celelalte săpunuri sunt insolubile (nu se tolesc). Săpunurile solubile sunt de 2 feluri: *moi* și *tari*; cele moi au ca bază potasa, iar cele tari soda. Săpunurile sunt cu atât mai tari cu cât materiile grase, din cari se fabrică, au mai mulți acizi solizi; afară de untul de ricin care chiar și cu potasa face un săpun tare și spărgăcios. Pentru toaleta corpului nu toate săpunurile sunt bune. Un săpun bun pentru toaleta trebuie să fie făcut dintr'un amestec de sodă (nu de potasă) în cantitate mică și un corp gras proaspăt, de exemplu unt de lemn. În medicină se întrebuințează așa numitul *săpun medicinal*, sau *amigdalîn*, fiindcă el este făcut cu unt de migdale dulci; este ușor purgativ pentru care se poate da și pe dinăuntru, în pilule (hapuri) de 25 ctgr. (2—6 pe zi); la copii se dă sub formă de săpunașe, cari se pun în șezut (de altfel aceste săpunașe se pot face și din săpun ordinar, de rufe, sau săpun de Marsilia). *Săpunul negru*, sau de *potasă*, se întrebuințează în mai multe boale de piele, servind de excipient la preparațiuni numeroase, cu bază de acid salicilic, de rezorcină, de naftol, de pucioasă, etc. *Săpunul antiseptic* se prepară cu diferite medicamente antiseptice: acid fenic, salol, sublimat,

etc. și se întrebuințează pentru spălarea mânilor, după facerea pansamentelor, sau după ce s'a umblat cu lucrurile bolnavilor de boale molipsitoare. De altfel și săpunul ordinar, în soluție de 30—40 la 1000, omoară microbii.

Săpunariță, săpunel, săpunul popii. — V. *Odogaci*.

Săpunaș, săpunel. — *Supozitor*.

Sărata. — Această localitate se află la poalele muntelui Moșu, pe pârâul Sărata, în cătunul Dealu-Nou, la 6 Km. de Bacău. Sunt 5 izvoare, dintre cari trei cloro-sodice-sulfurate, foarte concentrate. Apele nu sunt captate, nici nu se întrebuințează.

Sărata-Monteoru. — Stațiune balneară în județul Buzău, la 7 Km. dela gara Monteoru și la 15 Km. dela orașul Buzău. Stațiunea se află în comuna Sărata și este înconjurată de dealuri acoperite de păduri. Clima e plăcută; temperatura medie peste vară 15—22°; aerul ozonizat și gudronat din cauza emanațiunilor vaporilor de păcură din împrejurimi. Sunt 15 izvoare cu ape minerale. Izvoarele iodurate și cloro-sodice se recomandă în boalele reumatismale, gutoase, în cloroanemie, scrofuloză, limfatism, în boalele de femei, boalele de piele.

Sărături. — Pentru păstrarea unor substanțe alimentare se întrebuințează sarea de bucătărie. Astfel se păstrează untul, unele legume, varza, peștii, carnea și mai cu seamă carnea de porc. Carnea sărată, fie de porc, de vacă, sau de oaie, își pierde apa și sucurile ei, ceea ce face ca să-și piardă o bună parte din puterea ei nutritivă pe deoparte, iar pe de altă parte să fie și mai greu de mistuit. Afară de aceasta carnea sărată produce o sete foarte mare, precum și diferite turburări digestive, mai ales când se mănâncă des și în cantitate mai mare. Cel ce se hrănește mult cu cărnuri sărate și vechi capătă scorbut. Igiena nu admite mănecarea cărnurilor sărate decât foarte rar și în cantitate mică și aceasta numai ca variație în alimentația obișnuită.

Sarce. — V. *Salsaparilă*.

Sarcină, graviditate, poziție interesantă, altă stare. — Se numește astfel starea unei femei a cărei mîtră se mărește, prin dezvoltarea unui sau a

mai multor copii, din minutul fecundațiunii până la naștere. Sarcina este simplă (cu un copil), gemelară (cu 2 copii, gemeni), multiplă (cu mai mulți copii). Sarcina simplă se mai numește și normală. — Semnele sarcinii sunt mai multe, unele așa zise de probabilitate, cari n'au importanță, numai dacă sunt mai multe de odată și altele de certitudine (siguranță). Cele dintâi sunt: *oprirea regulelor* deși sunt sarcini în cari femeia poate pierde sânge uneori în tot timpul, dar acest sânge se deosebește de acela al regulelor, prin colorarea și câtimea sa; — *greață și vărsături*, repetate dimineața, în timpul celor trei luni dela început, cu pierderea poștei de mâncare, sau cu poftă prea mare, sau cu poftă de lucruri cari nu se mănâncă, cu constipație, mai ales în lunile din urmă; — *înepături în sânuri* cu *înegrirea cearcănului* din jurul sfîrcului și ivirea unor mici brobonele din cari, prin apăsare, curge un lichid albului, lăptos; — *înegrirea liniei mijlocii* a pântecelui, mai ales dela buric în jos; pete galbui pe frunte, în jurul nărilor și gât; — Semnele de siguranță sunt: *mișcările copilului*, pe cari le simte femeia dela 4 luni și jumătate înainte; *sgomotele inimii* copilului, cari se aud cu urechia ca bătăile unui ceasornic de buzunar pus sub perină. Aceste bătăi sunt în număr de 110 până la 160 pe minut și se aud bine începând din a cincea lună, aproape de buric. Durata sarcinii variază între 260 și 290 zile; mijlocia este de 275—280 zile, sau 10 luni lunare. Pentru a cunoaște data când va naște femeia însărcinată se vor număra 9 luni de calendar dela sfârșitul celei din urmă regule, adăugând la socoteală încă 5 zile, astfel dacă femeia a avut cea din urmă zi de regulă la 10 Martie, adăugând 5 zile se face 15 Martie, ziua de naștere va fi 15 Decembrie. Femeia în timpul sarcinii să nu se strângă peste mijloc, să nu poarte corset, sau, dacă vrea, să poarte corsetul așa zis de sarcină; să nu poarte jaretiere, ca să nu facă varice la gambe, iar dacă se fac să nu se agraveze; să poarte încălțăminte largi. Femeile cari au făcut mai mulți copii să poarte, începând dela luna a 6-a, o cingătoare abdominală. Să

se acopere bine seara și iarna ca să nu răcească și să capete guturai și tusă, care le-ar produce sdruncinături. Să se hrănească în deajuns, dar nu prea mult, să aibă scaun regulat, exercițiu moderat și regulat (plimbări zilnice pe jos), să nu danseze, să nu călătorească, să nu umble cu bicicleta, să nu călătorească, mai ales în ultimile săptămâni. Să nu lucreze cu mașina de cusut, să se țină curate jos, cu irigatorul să umble încet și domol ca să nu se lovească, iar apa să fie caldută, când își fac spălături. Incepând din luna a 5-a doctorul va examina udul în fiecare lună, iar de va găsi albumină, va prescrie tratamentul preventiv al *eclampsiei*. Aproape de naștere se va chema doctorul, ca să vadă dacă copilul se află în poziție bună și în caz contrar să-i schimbe poziția. — *Turburările sarcinii*. Pentru *vărsături repetate, grave* (incoercibile): se vor încerca succesiv: băuturi și mâncări foarte calde, sau reci (ținute în gheață), vin, șampanie; ceaiuri aromatice, de teiu, portocale, mentă, mușetel, ceaiu rusc, după mâncare, cu o linguriță de coniac sau de kirș, mâncări dese și puțin abondente, luate fiind culcată. În cazurile când vărsăturile nu se pot opri cu nici un chip se va cere ajutorul medicului, care e nevoit, de multe ori, să întrerupă sarcina, pentru a scăpa viața mamei. Pentru *albuminurie* cu umflătura picioarelor, cu buhăiala feței, etc., se recomandă regim absolut de *lapte*, pentru ca să se prevină eclampsia, după cum s'a spus mai sus. Pentru *dureri în pânțe*: repaus și calmante.

Sarcocel. — V. *Testicul*.

Sarcom (dela grec. *sarx*, carne). — Tumoră de rea natură, care se dezvoltă cele mai adeseori fără cauză apreciabilă; se observă în toate perioadele vieții. Poate să se propage la distanță și să recidiveze, după ce a fost extirpată; încetul cu încetul sănătatea se compromite și cu ea viața bolnavului, dacă nu s'au luat măsuri la vreme să fie operată (v. și *Cancer*).

Sardele. — La noi se consumă multe sardele de cutie, păstrate în unt de lemn, și cu drept cuvânt, căci sardelele sunt hrânitoare, plăcute și ușor

de mistuit. Este bine să le mâncăm numai pe ele, lăsând untuldelemn la o parte, afară numai de cazul când din cauza slăbiciunii vrăm să facem o cură de îngrășat; atunci acest ulei poate ține într-o câțiva locuri unturii de pește.

Sare (lat. *sal*). — Sarea nu este numai un condiment, ca piperul sau zahărul, ci este un accesoriu neapărat trebuincios în regimul alimentar, în hrana noastră, fără de care nu putem trăi, din cauză că sângele nostru conține o cantitate anumită de sare, care nu poate să scadă sub oarecare limită, fără ca sângele să nu-și piardă din însușirile lui restauratoare; saliva, sucurile stomacului, deasemenea conțin sare și fără de ea nu și-ar putea îndeplini slujba lor. Mâncările fără sare sunt fade, fără gust și se mistuie greu. Crescătorii de oi, de porci, de vite, știu din experiență că fără sare aceste animale slăbesc și de aceea le dau sare. Cantitatea acestei sări pentru un om adult ar fi de 15 până la 20 gr. pe zi. Abuzul de sare nu este bun; cei ce mănâncă alimentele prea sărate capătă iritațiuni și crampe de stomac. În medicină sarea se întrebuințează în băi și clizme (v. *Băi sărate* și *Clistere de sare*).

Sărpun, sărpunel. — V. *Cimbrisor*.

Sărutat, sărutare. — Acest obicei, adânc înrădăcinat în omenire, este și a noi în țară întins, ca în oricare parte a lumii. Sărutul copiilor a ajuns o adevărată pacoste, pentru că acest obicei poate să pricinuiască rele mari, fiind un mijloc de transmitere a multor boale. Iată ce se poate întâmpla: mîna doamnei, sau a preotului, este sărutată de un ofticos, care, având în gura lui, pe buze sau în salivă microbi, îi lasă pe mîna sărutată; apoi vine un om sănătos de, sărută aceeași mîna și cu acest prilej ia pe buze o parte din acei microbi, cari, fiind introduși în gură, încep a se înmulți și a pătrunde în stomac cu mâncare, sau în plămâni. Dacă găsesc un teren prielnic, adecă dau de un organism slăbit, din cauza vreunei alte boale anterioare, îl îmbolnăvesc. Se mai poate întâmpla ca microbii ofticei de pe mîna sărutată să găsească acolo o mică sgârțetură și să producă după câțiva timp *tuberculoza*

pielei. Prin sărutat se mai pot împărtăși și alte boale tot așa de grozave : *sifilisul*, *anghina difterică*, *febra tifoidă*, *gripa* (influența), *pojarul*, *scarlatina*, *tusa măgărească* și altele. În interesul sănătății proprii, precum și al celor ce sărută, trebuie ca doamenele și preoții să nu-și mai întindă mâna, iar pentru copiii mici să facem ca în Anglia, unde ei poartă pe pălării scrise următoarele cuvinte : *nu mă săruta !*

Saturn (Extract de). — V. *Plumb*.

Saturnism. — V. *Plumb*.

Sbârciogi grași. — V. *Cimperi*.

Sburător. — V. *Lipitură*.

Sburătoare bărbătească. — V. *Răchitan*.

Scabie. — V. *Răie*.

Scabiosa columbaria. — V. *Mușcatu dracului*.

Scăete muscălesc. — V. *Holeră*.

Scăfărlie. — V. *Cranii*.

Scalu rusesc. — V. *Holeră*.

Scăldătoare. — V. *la Baie*.

Seamă. — Până acum vreo cincizeci de ani se întrebuința la legarea rănilor scama, care se făcea destrămând bucăți de pânză veche, în special de pânză de in. Fiindcă scama nu se putea avea în stare *aseptică*, a fost înlocuită, din fericire, cu vată și tifon.

Seamonee. — Suc rezinos și gumos, care se scoate din rădăcina plantei *Convolvulus scammonia* din fam. convulvalaceelor. Sunt 2 feluri : *scamonea de Alep* și *scamonea de Smirna*. Cea mai bună este de Alep, care se prezintă în bucăți negre, acoperită cu praf alb. Scamonea este un purgativ drastic, care, fiind iritant ca toate drasticele, se dă numai în constipațiunile cerebrale, în contra viermilor intestinali, etc., niciodată însă în cazurile de colici și de iritațiuni de intestine. Se dă sub formă de : praf, în lapte, în dulceață, în ostie (bulin), 50 ctgr. până la 1 gr. ; rezină 40—50 ctgr. ; tinctură 2—8 gr. ; se mai prepară și niște pișcoți, de câte 60 ctgr. unul (copiii vor lua câte o jumătate de pișcot). Scamonea intră și în compoziția tincturei de jalapa compusă (rachiu nemțesc).

Scămoșare. — V. *Descamație*.

Scapulă. — V. *Omoplat*.

Scârbă. — V. *Desgust* și *Greață*.

Scarificație și **Scarificator**. — Prin cuvântul *scarificație* se înțeleg în medicină niște tăieturi superficiale, făcute în piele sau în mucoase, cu scopul de a da curgere unei mici cantități de sânge, sau de serozitate, infiltrată, pentru a descongestia, a face o revulziune, ori a modifica vitalitatea unor țesături. Scarificațiunile se fac cu o lanțetă, cu un bisturiu sau mai bine cu un instrument numit *scarificator*, care se compune dintr'un fel de cutie de metal, din care ies niște lame mici tăioase, sub presiunea unui resort. Acest scarificator se întrebuințează mai mult când punem ventuze tăiate, de exemplu într'o aprindere de plămâni, sau la congestie pulmonară. Scarificațiile se recomandă și în unele boale de piele (lupus).



Fig. 396
Scarificator

Scarlatină, *cochinadă*, *cochinar*, *coracă*. — Este o boală molipsitoare, cu fierbințeală mare, însoțită de durere de gât (anghină) și caracterizată prin eșirea pe piele a unor puncte roșii, la început separate între ele, dar cari mai târziu se împreună formând pete mari, de culoare smeurie, acoperind pielea peste tot, sau în parte. Aceste pete în cele din urmă se scămășează și cad sub formă de pelițe late (plăci). *Microbul* acestei boale nu se cunoaște până acum, deși în sângele bolnavilor, în produsele faringiene și în puroiul complicațiilor se găsește foarte adeseori un *streptococ*, care desigur trebuie să joace un mare rol în patogenia scarlatinei. Ceea ce se știe însă, este că ea se transmite prin aerul din jurul bolnavului, prin scuipat, prin muci, prin pelițele jupuite de pe piele, prin haine și prin unele mâncări, cari stau în odaia bolnavului, cum este laptele nefiert, etc. Scarlatina este contagioasă în toate perioadele ei. Mai primitori de această boală sunt copiii în jos de 10 ani ; dela 20 de ani în sus se observă mai des la femei ; femeile lehuze sunt mai amenințate decât cele sănătoase. Scarlatina se

arată sub formă de *epidemie*, care uneori este ușoară și trece nevăgată în seamă, alteori însă este foarte omorâtoare, ca ciuma și holera. — Scarlatina are 4 perioade și *semnele* ei sunt următoarele: 1. Perioada de *incubație* este, ca și la pojar și la vărsat fără nici un semn și ține 3—5 zile. 2. Perioada de *invaziune* se arată prin fierbințeală și durere de gât (anghină). Aceste două semne pot să fie pronunțate, sau pot să lipsească cu totul și în acest caz se ivesc petele pe corp din perioada următoare. Câte odată bolnavul are greață și vărsături, uneori are urdinare ori este încuiat (constipat). Durerea de gât este unul din semnele de căpetenie ale acestei boale. Fundul gâtului este roșu, uscat; gâlcele dela gât sunt umflate și dureroase. Această perioadă ține 12 până la 36 ceasuri; câte odată poate lipsi. 3. Perioada de *erupțiune* începe cu gâtul, apoi pe piept și membre, întinzându-se pe tot corpul. Se ivesc pete largi (plăci) neregulate, de o culoare roșie înfocată, foarte apropiate unele de altele, fără să fie ridicate deasupra pielii din jur și pielea dintre pete este sănătoasă la început, dar în curând se înroșește și ea, așa că întreagă, pielea are o culoare uniformă smeurie înflăcărată în unele locuri. În formă a doua se ivesc puncte mici roșii, foarte apropiate unele de altele și foarte regulate. Prin apăsarea cu degetul roșeața pierе, pentru a se ivi din nou după ridicarea lui. Petele se ivesc și pe mucoase, adică pe căptușala dinăuntru a corpului, gura este roșie, înfocată, tot astfel și limba, care mai este și puțin umflată spre rădăcină. Uneori se întâmplă ca scarlatina să fie fără pete pe corp; petele au eșit, dar au trecut așa de repede încât n'au putut fi văzute. După cercetări mai noi microbul scarlatinei s'ar afla în gât și se răspândește la cei din jur prin scuipat și prin secreția nasului. Bolnavii cărora li s'a ținut gura curată și li s'a dezinfectat, după ce n'au mai avut gâtul roșu, n'au mai fost contagioși, cu toate că boala era în plină evoluție. Durata acestei perioade este de 5 până la 6 zile. 4. Perioada de *descuamațiune* (scămoșare). Pielea se scămoșează sub formă de pelițe late

(lambouri), cari se deslipesesc și scad. Pielea de pe degete se deslipește în bucăți mari și cade sub formă de degete de mănuse, iar la tălpi cade în bucăți și mai mari; s'au văzut cazuri în cari a căzut întreagă pielea cea groasă a tălpii, sub formă de opincă. Această perioadă ține 8—15 zile. Peste tot scarlatina durează dela 16 până la 24 zile, iar cu convalescența, până la 40 zile. — Nu trebuie să uităm că această boală are și alte forme. Așa uneori ea este *fulgerătoare*, omorând bolnavii în 24 ceasuri, cu căldură peste măsură de mare, cu aiurare, neastâmpăr, trăsături, uscăciunea pielii, lipsă de ud (anurie). Alte ori ea are forma *emoragică*, bolnavul are curgere de sânge din nas, varsă sânge și se udă cu sânge, iar pe corp se ivesc pete cari nu pier sub apăsarea degetului; forma aceasta nu iartă niciodată. Mai este o formă numită *frustă*, în care lipsește unul din semnele principale. Câte odată bolnavul n'are decât anghină, fără să iese vreo pată pe corp, alteori anghina este urmată de dropică (boală de rinichi), etc. — Nici o boală molipsitoare nu are așa de multe *complicații* ca scarlatina. La unii bolnavi se ivesc uime la gât, cari fac puroiu și sparg; la alții le coc urechile și curg; la unii se ivesc dureri prin încheieturi, cari se pot umfla; la alții se arată boală de rinichi cu dropică; unii se udă cu sânge, la alții li se oprește cu totul udul; unii capătă boală de inimă (endocardită), alții aprindere de plămâni și junghiu (pneumonie și pleurezie), și alte multe. — *Tratament*. Pentru a opri întinderea boalei trebuie să depărtăm pe cei sănătoși de bolnavi; Școalele în cari s'a ivit boala să se închidă și dezinfecteze. Bolnavul se va trata după cum este și boala. În scarlatina simplă, ușoară, sunt de ajuns îngrijirile igienice: bolnavul va fi acoperit potrivit, va sta în pat, într-o odaie mare, bine aerată, bine luminată, unde va sta în tot timpul boalei, chiar și în convalescență; din odaie se vor scoate perdele, preșuri, covoare, mobilele netrebuincioase, dela începutul boalei. Hrana bolnavului va consta numai din lapte (dulce și bătut) în tot timpul cât are fierbințeală (câl-

dură), iar după aceea i-se mai poate da supă de carne, simplă, goală (bulion), cafea cu lapte, ceai, ceai cu lapte, însă toate fără pâine; apă câtă vrea bolnavul. Urina va fi adunată zilnic, observată și fiartă ca să se vadă dacă are albumină. Ca tratament se vor face spălături dese în gură, gât și nas cu apă boricată și alte antiseptice, mai cu seamă la copiii mici. În nări se mai pot face instalațiuni de 2 ori pe zi cu uleiul rezorcinat (1 la 50) sau antiseptol. Când temperatura este mare se vor face băi calde de 32—35°. Se vor face injecțiuni și cu ser antis-treptococic. Complicațiunile vor fi combătute prin mijloacele proprii fiecăreia. Scămoșarea se va înlezni cu băi de săpun calde, 2—3 pe săptămână. În timpul convalescenței bolnavul va fi ferit de răceală și de exces de hrană; el va sta în pat 40 de zile, după cari se va da pe jos și va începe să mănânce câte ceva: ouă, brânzeturi, supă cu făinoase, diferite mâncări ușoare de pui, etc., toate cu pâine, iar după o săptămână va putea eși pe afară, reluându-și ocupațiile.

Schelet. — V. Os.

Schinduf. — V. Cimbrișor.

Schinel (*Centaurea benedicta* sau *Cnicus benedictus*). — Plantă erbacee, lănoasă și spinoasă, din fam. compozitelor, cu florile galbene și tubuloase, care se cultivă ca plantă oficială. În medicină se întrebuințează florile, pentru proprietatea lor tonică, stomatică și febrifugă. Principiul activ se numește *cnicin*. Se găsește sub formă de ceai, 15—30 gr. la 1000; de praf, 1—4 gr. pe zi.

Schilod. — V. Infirmitate.

Schiopare. — Când un picior te doare, sau când este înțepenit, ori când este mai scurt decât celalt, atunci mersul nu se mai poate face în mod regulat, mișcările corpului nu sunt deopotrivă și rezultatul este că ești *șchiop*. Uneori se întâmplă că o încheietură a piciorului să fie înțepenită, sau anchilozată (v. *Anchiloză*) într-o poziție rea, strâmbă, cum se vede adeseori la genunchi, atunci omul iarăși schiopătă și este silit să poarte cârji.

Schir (grec. *skirrhos*). — V. Cancer.

Sciatică. — Cel mai mare nerv din

corpul omenesc este *nervul sciatic*, care pleacă din fiecare parte a jumătății de jos a măduvei spinării, se împarte și subîmparte într-o mulțime de rămurile, din ce în ce mai mici, pentru întreg membrul inferior, adică coapsă, gambă și picior. *Nevralgia sciatică*, sau numai simplu *sciatică*, este o durere care se simte sau pe întreagă lungimea nervului, sau numai într'un punct, ori în mai multe puncte. Durerea aceasta poate fi continuă, mărindu-se din când în când prin mișcare, tusă sau atingere; ea se iradiază în sus spre spate, până în dreptul rîni-chiului, iar în jos până la pulpă. sau gleznă, durere surdă, plicticoasă penibilă; alte ori durerea vine prin svăcnituri, fulgerături, cari pleacă dintr'un punct oarecare, și își au sediul la șold sau înapoia coapsei, ori în dreptul gleznei dinafară, în talpă; apăsând pe acele puncte bolnavul simte durere. În intervalul acceselor toată partea bolnavă dă o simțire de arsură și de furnicătură. *Nevralgia sciatică* se observă mai cu seamă la adulți și se poate ivi în urma unui mers obositor, sau mai des în urma unei răceli (frigul umed), la cei ce se culcă pe pământ, sau într-o odaie răcoroasă și umedă, cari lucrează în apropiere de apă, în pivniți, la cei ce sufăr de gută, diabet, reumatism, tuberculoză, blenoragie, etc., sau provine dintr'o apăsare (compresiune) a nervului. *Tratament*. Bolnavul va sta în odihnă, în pat. Pe locul dureros se vor pune lipitori, sau ventuze (păhare) cu sânge; se va aplica pe traiectul nervului, pe punctele dureroase, acid cloridric concentrat, la 2—3 zile odată, sau vezicători, se vor face injecțiuni adânci pe traiectul nervului cu clorofom, cloridrat de cocaină, sau alcool. Când sciatică este de natură reumatică se va da salicilatul de sodă (4—12 gr. pe zi), sau aspirină (4 gr.), antipirină, fenacetina, exalgină, citrofen, piramidon, reumatină, salochinină și chinină. În caz de dureri vii se vor face injecțiuni cu morfină, sau dionină. După ce a trecut perioada acută se va face electrizare. Se mai recomandă băi de aburi, băi simple, băi de pucioasă, masaj. În nevralgiile cronice, produse de o boală oarecare: reumatism, sifilis,

artrism, gută, diabet, etc., se va trata acea boală.

Seilla maritima. — V. *Ceapă de mare*.

Scleremă, scleremie. — V. *Sclerodermie*.

Sclerodactilie. — V. *Sclerodermie*.

Sclerodermie (dela grec. *skleros*, tare și *derma*, piele), *scleremă, scleremie*. — Sub acest nume se înțelege o boală a cărei natură nu este încă bine cunoscută, dar care se pare a fi de origine nervoasă și care este caracterizată prin întărirea și îngroșarea pielii și adeseori și a țesăturilor de desuptul ei, producând atunci atrofii și diformități, uneori considerabile. *Semnele* acestei boale sunt: la început pielea prezintă senzațiuni de căldură, sau de frig, mâncărimi sau chiar dureri mai mult sau mai puțin adânci; apoi încetul cu încetul pielea devine lucitoare, alburie, întinsă și rece, își pierde orice mișcare și capătă o consistență fibroasă; sensibilitatea însă este păstrată, uneori este chiar exagerată. După câțva timp pielea se retractă. Leziunile se produc în mod simetric la început, de obicei la față, apoi la spate și pe piept și mai târziu pot cuprinde întreg corpul. Vorbirea și hrănirea se face cu greutate; ochii lacrimăază într-una; degetele se subțiază. În unele cazuri se ivesc pe ici pe colo gangrene localizate, în urma căror degetele cad. Atrofia falangelor celor mici, se arată precedată de contractura în doi torilor, îndoind aceste falange asupra celor mijlocii, formând varietatea care se numește *sclerodactilie*. În general sclerodermia se dezvoltă pe încetul, alteori poate merge foarte repede; moartea vine printr-o slăbiciune gradată. Această boală se observă mai mult la femei, la cei nervoși și reumatici. — *Tratament*. Pază de răceală, idroterapie, exercițiu. Puncte de foc pe șira spinării, electroterapie (curenți continui), masaj, dușuri sulfuroase calde, emplastru mercurial. Pe dinăuntru se dau bromure, ergotină, valeriană. Tratamentul tiroidian nu prea a dat rezultate bune; radioterapia și aplicațiunile radiului trebuie să se încerce cu mare precauțiune.

Sclerotică (dela grec. *skleros*, tare). — Invelișul alb al ochiului (v. *Ochiu*).

Scleroză (dela grec. *sklerosis*, întă-

rire). — Se numește astfel întărirea țesuturilor datorită unei atrofii a elementelor constitutive ale organelor,



Fig. 397

a = Arteră sănătoasă; b = Arteră unui sclerotic

sau datorită adeseori unei inflamațiuni primitive a țesutului conjunctiv, care se retractă (se strânge) și determină în cele din urmă atrofia parenchimelor (scleroza sau ciroza ficatului, plămânilor, rinichilor, etc.).

Scleroză în plăci. — V. *Măduva spinării*.

Scleroză laterală amiotrifică. — V. *Măduva spinării*.

Scilipeți, scrântitoare (*Tormentilla erecta*, fam. rozaceelor). — Plantă mică erbacee, care crește prin pășunile umede și uscate de prin pădurile de munte, prin crânguri, rășișuri, tufișuri. În medicină se întrebuințează rădăcina, care conține tanin și lucrează ca astringent puternic. Pe *dinăuntru* se dă sub formă de decoct (fiertură) 10—20 la 1000; extract 1—4 gr.; iar pe *dinăfară* decoctul 20—50 la 1000. — La *țară* se întrebuințează planta întreagă în contra curgerii de sânge, a dizenteriei și tusei cu sânge; în rachiul de drojdi, oblojeli contra surpăturii.

Școale. — Școalele trebuiesc clădite




Fig. 398. — Modele de mese-bănci

pe un *pământ uscat* și ceva mai ridicat; trebuie să aibă o sală de gimnastică, o curte și o grădină pentru jocul elevilor. Sala de studiu, sau clasa, trebuie să aibă ca *suprafață* câte un metru

patrat de fiecare elev ; înălțimea trebuie să fie de 3 până la 4 metri ; într'o clasă să nu fie mai mult de 50 de elevi. Clasa să se aereze prin deschiderea din când în când a ferestrelor și a ușii, sau prin ventilatoare permanente.




Fig. 399. — Mese-bănci mai mari

Trebuie să se dea o deosebită băgare de seamă *luminatului* ; în timpul zilei lumina soarelui trebuie să intre în clasă prin *partea stângă*, căci dacă vine din față supără ochii, dacă vine dinapoi umbra corpului este aruncată asupra hârtiei și a cărții, dacă vine din dreapta umbra mâinii va fi aruncată pe hârtie în timpul scrisului ; dacă ar veni din două părți de odată ar fi lumina prea mare și ar supăra vederea. Lumina trebuie așezată așa ca să cadă în partea stângă a elevului. — *Mobilierul școlar*, adică masa de lucru și banca trebuie să ne preocupe tot așa de mult ; ele trebuiesc făcute astfel în cât vederea elevului să fie cruțată, elevul să nu fie silit să-și ia poziții rele, cari să-i producă strămbări ale șirii spinării. Masa și banca trebuie să fie mobile, să nu aibă mai mult de 2 locuri și să aibă pentru fiecare elev cel puțin 60 cm. de lărgime ; *pupitrul* să fie puțin aplecat de partea elevului ; masa să nu fie nici prea sus, ceeace ar produce o sucire a trunchiului, ridicând prea mult umărul drept, nici prea jos, ceeace ar sili elevul să se aplece asupra hârtiei ; l-ar obișnui să privească prea deaproape și i-ar produce miopie (vedere scurtă). Ar fi bine ca mobilierul să fie în raport cu diferitele mărimi ale elevilor. În Statele-Unite ale Americii sunt opt modele de bănci, așa că mobilierul e în totdeauna în proporție cu talia școlarului. Mai practic este să fie un singur model de masă, însă cu bănci de diferite înălțimi și sub

masă stinghii pentru picioare, la înălțimi diferite, în raport cu talia elevului. Banca să fie lată în deajuns pentru ca întreagă coapsa să fie sprijinită. Ar fi bine ca școlarul să fie izolat, adică să-și aibă scaunul său, după cum este în Suedia și Statele-Unite. O bună masă este cea a lui Feret, care, printr'o dispoziție foarte simplă, se ridică, se lasă în jos, ia diferite înclinații, pentru ca să servească la scris, în poziție șezând, sau stând în picioare, pentru desemn, etc. Masa, pe lângă aceste avantaje, se poate acomoda la orice vârstă, la orice talie. — *Cărțile* trebuie să fie tipărite cu litere destul de mari și rare, pentru ca să fie ușor cetite. *Scrierea* cere și ea o supraveghere îngrijită. Scrierea englezească, adică cea plecată, silește pe școlar să ia o atitudine vițioasă ; cea mai bună scriere este cea *dreaptă* pe hârtie dreaptă și ținând corpul drept. Aceste precauțiuni au de scop de a preveni miopia și deviația, sau strâmbarea columnei vertebrale, boale cari de obicei se contractă în școală.

Scobitoare. — Mic instrument cu care ne servim pentru a scoate rămășițele de materii alimentare de printre dinți și măsele. Se face din pană de găscă, din lemn, din sidef, din metal. Cele de lemn și de pană vor servi numai odată, după care se vor arunca : celelalte se vor curăța și păstra la adăpost de praf. Pe cât se poate să nu se întrebuințeze scobitori de metal.

Scolioză. — Un fel de diformiație a șirii spinării (v. *Columna vertebrală*).

Scopulamină. — V. *Măsălarită*.

Scorbut. — Este o boală generală, sporadică, nemolipsitoare, fără febră, și care se arată la oamenii cari trăiesc în condițiuni rele igienice. Este caracterizată prin emorații (curgeri de sânge) multiple ale pielii și mușchilor, printr'o stricăre specială a gingiilor, printr'o slăbire organică, cu mers încet și treptat, și în fine printr'o vindecare repede, sub influența întrebuințării cărnei sau a vegetalelor proaspete. — Scorbutul se produce întotdeauna în aceleași împrejurări, la oamenii adunați, sau îngrămădiți mai mulți la un loc, cari se hrănesc numai cu conserve, sau cu alimente lipsite

de vitamine. Această boală atinge toate etățile, amândouă sexele, în toate anotimpurile, dar mai des primăvara, când nu prea se găsesc legumi proaspete. Cauza determinantă a scorbutului este lipsa de *măncări proaspete*, hrana cu conserve, (sărături) cărnuri uscate, legume conservate, etc). Cauza principală este lipsa *vitaminelor* din alimente vechi, conservate.—*Semnele* acestei boli sunt: slăbire progresivă, însoțită de dureri în încheieturi, la gambe, în partea de jos a pieptului, uscăciunea pielii și paloarea feței. În perioada a doua gingiile se umflă, se moaie, se rănesc și sângerează, alena este puturoasă, dinții și măselele se clatină, căptușala gurii se acopere cu pete vineții și cu beșicuțe pline cu sânge amestecat cu serozitate. Pe diferite părți ale corpului se ivesc pete (plăci) roșietice, apoi negre, sau galbene-verzui, mai cu seamă pe membrele inferioare. Scorbutul se poate complica de pneumonie, pleurezie, gangrenă de plămâni, de miocardită, pericardită (boale de inimă) de gangrena gurii, etc. El poate complica alte boale epidemice, cum sunt febra tifoidă, tifosul, holera, etc. și atunci aceste boale sunt mortale.—Scorbutul tratat bine și dela început se vindecă. Moartea se produce prin emoragii, slăbiciune, complicațiuni, sincopă cardiacă.—*Tratament*. Pentru a preveni ivirea scorbutului se recomandă să se întrebuințeze numai alimente proaspete, carne, fructe și legume, evitând pe cât e cu putință întrebuințarea conservelor, iar dacă facem uz de ele să le mâncăm în cantitate mică și rar, niciodată însă să nu ne hrănim numai cu ele și în timp prea îndelungat. Legumele proaspete, salatele, ceapa, usturoiul, cartofii sunt foarte bune, fructele toate sunt *antiscorbutice*, în special portocalele și lămâile, tot așa vinul și laptele și mai ales ardeiul roșu, care conține o cantitate mare de vitamină antiscorbutică (vitamina C). Ca hrană se va da bolnavului carne proaspătă și legumi verzi, măcriș, usturoiu, ceapă, muștar, varză, salate, cresson, lingurea (cochlearia); fructe: pere, struguri, lămâi, portocale; bere, drojzii de bere; rănila gingiilor se vor atinge cu tinctură de iod, acid cronic, 1 la 10 apă, sau

cu zeamă de lămâie. În contra emoțiilor, se va da acid ascorbic, perclorur de fier, feropirină, ergotină, chinină, digitală.

Scordium (Teucrium). — V. *Iarba usturoasă*.

Scorțișoară (franț. *cannelle*).—Scoarta aromatică a arborelui *Cinnamomum zeylanicum* din fam. lauraceelor, care crește în Ceylan, în India și se cultivă adeseori prin țările calde. Scorțișoara se întrebuințează în bucătărie ca condiment, iar în medicină sub denumirea de *cortex cinnamomi*, pentru însușirile sale excitante, stimulente, antispasmodice, stomachice și carminative. Se dă sub formă de: praf 50 ctgr. până la 5 gr., apă destilată 10—60 gr., într'o poțiune; tizana 8 gr. la 1000; tinctură 10 gr. într'o poțiune; alcoolat 5—15 gr.; esență 1—2 picături; sirop 30—60 gr. într'o poțiune.

Scrântitoare. — V. *Ciumărea* și *Sclipeți*.

Scremut. — V. *Sfortare*.

Serimă. — Este unul din cele mai grele exerciții, căci scrima cere creșterii o sfortare mare și continuă de băgare de seamă și hotărâre, mușchilor o repeziciune mare în contracțiune, o preciziune desăvârșită în coordonarea mișcărilor mâinii, brațului, trunchiului, care se duce repede înainte sau înapoi, după cum sunt mișcările adversarului. Scrima grăbește respirația, circulația (bătăile inimii), creșterea temperaturii, activitatea arderilor, de unde provine și pierderea cea mare pe care o suferă corpul în timpul scrimei. Așa dar din punctul de vedere al igienii, scrima este un exercițiu minunat pentru omul adult, mai cu seamă pentru cei limfatici și nepăsători, pentru a preveni și a combate *artritisul* (obezitate, gută, gravelă, sau colici de rinichi, colici de ficat, diabet) și pentru unii *neurastenici*, dar la aceștia cu condiție ca scrima să nu se facă în toate zilele și nici prea mult timp odată. De asemenea și pentru bătrâni se recomandă scrima în mod cât se poate de moderat, din cauza oboselii inimii și a plămânilor.—Scrima *trebuie oprită* la copii până la etatea de 14 ani, la cei bolnăvi de inimă și de plămâni, apoi trebuie multă băgare de seamă

ca să nu răcească omul după ce face scrimă, care-i produce multă nădușeală.

Serintire. — V. *Luxație*.

Scrobeală albă. — V. *Amil*.

Scrofulă (lat. *scrofulae*, dela *scrofa*, scroafă), *scrofuloză*. — Numele acestei boale ciudate și care atinge mai cu seamă vârsta copilăriei, vine de acolo că gâtul celor bolnavi seamănă cu gâtul unei scroafe. Prin cuvântul *scrofulă* se înțelege o boală cu manifestațiuni multiple, foarte comune, care are de cele mai multe ori raporturi foarte strânse cu oftica (tuberculoza), însă care are o evoluție particulară, o fizionomie destul de caracteristică pentru ca s'o descriem separat.—Ea se întâlnește mai des în îngrămădirile de oameni de prin orașe și pretutindenea unde condițiunile igienice înlezesc dezvoltarea ofticei. În afară de ereditate se mai citează între cauzele scrofuli hrana rea a copiilor sugaci și a copiilor mici, întărcarea prea de vreme, mâncare indigestă și neîndestulătoare, locuințele nesănătoase, frigul (răceala), umezeala, lipsa de aer curat, de lumină, etc. — Între primele *semne* ale scrofuli avem ivirea pe părțile laterale ale gâtului a unor ghinduri (tumori) mici, de diferite mărimi, tari la început și cari joacă sub deget, fără ca să fie dureroase și fără ca pielea deasupra lor să-și schimbe culoarea obișnuită. Aceste umflături nu sunt altceva decât *ganglionii limfatici*, cari se umflă și iau un volum destul de mare pentru ca să fie simțite cu ușurință prin pipăire și mai târziu văzute din depărtare. Aceste ghinduri cresc încet și în continuu până ce mai târziu, după câteva zile, săptămâni, sau luni, pielea care le acopere se întinde, devine lucitoare și se înroșește, apoi ghindurile se înmoaie și în cele din urmă sparg pielea care s'a subțiat din ce în ce mai mult și lasă să se scurgă un fel de materie galbenă-verzuie, formând răni neregulate, cari nu produc dureri mari și se vindecă foarte încet și cu mare greutate. Cicatricile (semnele) cari rămân după ele sunt neregulate, adâncite și cu încrețituri. Unii scrofuloși capătă și *oftică* la mațe, sau la plămâni, care le sfârșește zilele.—*Tratamentul* scrofuli constă în a modifica a îmbunătăți terenul a preveni infec-

țiunile și când ele s'au dezvoltat, în a le împiedeca să înainteze și a le vindeca. Nici într'o boală nu trebuie să se țină în seamă cu atâta sfintenție regulile igienice ca în scrofulă. *Alimentația*, sau hrana, trebuie să fie bogată în carne, în grăsimi, în sare (clorur de sodiu), în fosfate (pește, creeri, cereale). *Aerul de țară* și mai cu seamă *aerul de mare* se recomandă foarte mult; mai ales *cura de mare* (pe malul mării) este foarte bună și are o lucrare favorabilă asupra gâcilor scrofuloase superficiale, asupra inflamațiunilor din fundul gurii și din gât, asupra boalelor de ochi și de urechi, asupra anemiei (lipsei de sânge), și aceasta cu atât mai mult cu cât cura de mare are o acțiune minunată asupra scrofuli la copii, precum și puterea de a preveni oftica. Unele băi *sulfuroase*, cum sunt cele dela Govora, Techir-Ghiol, Pucioasa, etc., sau *saline*, cum sunt cele dela Constanța, Lacul Sărat, Monteoru-Sărata, Bălătești. Ocnele-Mari, Târgul Ocnei, etc., sunt foarte bune. Când nu putem trimite bolnavul la Mare, unde soarele e foarte activ, îi vom face *helioterapie* ori unde ne găsim, păzind regulile descrise la acest cuvânt, sau băi de quartz. Între medicamente locul întâiu îl ține *untura de pește*, care se dă în doză progresivă, supraveghind funcțiunile digestive. *Iodul*, care are o acțiune foarte mare asupra sistemului limfatic, preparațiunile cu iodur de fier, precum și cele iodotanice, sunt cele mai bune. De asemenea se dă și iodurul de potasiu, singur sau asociat cu iodul după formula următoare : sirop de gențiana (sau de chinchina) 200 gr., iodur de potasiu 2 gr., tinctură de iod 2 gr.; o linguriță la fiecare masă; — sau : tinctură de iod 30 picături, iodur de potasiu 50 ctgr. până la 1 gram, sirop de coji de portocale amare 300 gr., din care se va da o linguriță la copiii de 2 ani și 2 lingurițe la cei de 4 ani. *Arsenicul* este foarte bun în contra anemiei, sub formele : licoarea lui Fowler, licoarea lui Pearson, sau *arsenicul organic* cum este : cacodilatul de sodă, arenalul. *Preparațiunile fosfatate* dau rezultate iarăși foarte bune atât cele minerale. *Hemostilul* și *vi-gantolul* de asemenea sunt folositoare.

Scrot. — V. *Testicul*.

Seuamă (lat. *squama*, solz). — Pielică epidermică ce se desface de piele sub formă de praf (tărățe), ca la pojar, sau de bucăți numeroase de diferite mărimi, ca la scarlatină.

Seufie. — V. *Tichie*.

Scuipare, scuipat. — Prin scuipare se înțelege darea afară prin gură a oricărei materii apoase, formată în această cavitate, sau într'unul din canalele prin cari se duce aerul în plămâni. Acea materie se numește *scuipat*, *spută*, sau *flegmă*, iar scuiparea în știință se chiamă *espectorație*. De multe ori se confundă scuiparea cu vărsarea, zicându-se am *vărsat sânge*, în loc de am *scuipat sânge*, ceea ce nu e tot una; când cineva varsă sânge, acel sânge nu vine nici din gură, nici din plămâni, ci din *stomac*; tot ceea ce se dă afară din *stomac* prin gură se zice *vărsătură*. Scuipatul vine din gură, din gât, din laringe (gâtlej) din bronchii și din plămâni. În stare de sănătate fiecare din aceste organe dă o cantitate mică de lichid, care este trebuincios la împlinirea slujbei lui și fără de care el s'ar usca. Când acel lichid se formează în cantitate ceva mai mare se naște trebuința de a-l da afară, de a-l scuipa. Scuiparea se face sau în urma tusei, sau fără tusă; în cazul întâiu avem scuipare propriu zisă și scuipatul vine din gâtlej, din bronchii sau din plămâni; iar în cazul al doilea scuipatul vine numai din gură și din fundul ei și el este dat afară fără efortare, fără tusă, numai ca un lucru supărător. Când scuipatul este limpede, transparent, în cantitate mare și curgând în continuu, atunci este vorba de o *inflamație în interiorul gurii*, mai ales a gingiilor, sau că avem a face cu *aște* sau *mughet*; în aceste cazuri scuipatul seamănă cu saliva (*balele*). Când scuipatul iese tot așa fără nici o tusă, dar este viscos, cleios, ca o soluție de gumă, atunci trebuie să știm că este o *inflamație în fundul gurii*, a *gâtului*, o *amigdalită* sau o *angină*. În amândouă aceste cazuri este ușor să știm de unde vine scuiparea, căci bolnavul se plânge de durere în gură sau în gât. Când scuipatul vine sub formă de gomolețe mici, rotunde, glo-

buloase, adeseori colorate cenușiu, sămănând cu niște boabe de mărgăritar, atunci avem o inflamație de laringe (gâtlej). De obicei scuipatul *n'are miros*, dar poate să devie fetid, cu miros grețos, apropiindu-se de mirosul usturoiului, ceea ce este un semn rău. Întru cât privește *cantitatea*, copiii nu scuipă; ei mai mult înghit și numai dela 7 ani încep a scuipa în cantitate mică, cu vârsta însă omul scuipă mai mult, mai ales fumătorii. *Coloarea* scuipatului variază mult. Câte odată ea poate fi galbenă-verzue, atunci când avem guturai cu tusă și când flegma este coaptă, ceea ce nu trebuie să ne sperie. Tot așa și cu *coloarea roșie*, care provine din sângele ce se poate ivi în scuipat atunci când tușim prea tare, într'o chintă puternică de tusă, sau sub influența unei temperaturi ridicate, a unei frecări prea aspre a gingiilor, a unei curgeri de sânge din nas, când sângele s'a dus în fundul gurii, de unde este aruncat cu materiile scuipate și, în fine, sputa mai poate fi roșie într'o mulțime de alte împrejurări, ceea ce nu trebuie să ne înspăimânte, căci acestea nu sunt adevărate scuipări de sânge după cum vom arăta mai jos. În *pneumonie* adică în apărinderea de plămâni, sputa are caractere proprii cari ne pot lămuri asupra boalei, tot așa este și în oftică în gradul din urmă. Scuipatul coprinde *microbii* boalelor cari se pot transmite, cum sunt: oftica, influența (gripa), etc. Scuipatul uscându-se se prefăce în praf, care se ridică în aer și odată cu aceasta îl respirăm și ne putem îmbolnăvi. Pentru aceasta este neapărată trebuință de a scuipa întotdeauna, mai ales bolnavii, într'un vas, într'o *scuipătoare* specială (vezi fig. 400), care să aibă un lichid dezinfectant și care se va deșerta în latrină. În unele cazuri este bine să ușurăm scuiparea, să n'o oprim, mai cu seamă la bătrâni, cărora nu le vine bine când li se îngrămădește flegma în piept. *Scuipare de sânge*. Când cineva scuipă sânge din piept, adică din bronchii și plămâni, sângele este *roșu deschis*, rumen, fluid și amestecat cu beșicuțe de aer; afară de aceasta bolnavul, înainte de a scuipa, are un fel de căldură, de greutate și de apăsare în piept.

Când sângele este *negru*, gros, nearat, coagulat, atunci vine din nas, sau din stomac. Scuiparea de sânge se vede în mai multe boale: în oftică, în boalele de inimă foarte des, în rănille plămânului, în fracturile coastelor, în loviturile pieptului. Sunt unii cari scui pă sânge de mai multe ori fără ca să fie bolnavi. Când însă scui patul conține mult sânge, atunci lucrul este serios și trebuie să căutăm să-l oprim cât se poate mai iute. În cazurile de scui pare de sânge (*emoptizie*), până să vină doctorul, vom ține bolnavul în repaus (odihnă) absolut, îi vom pune muștare la pulpe, îi vom da numai lucruri reci, lapte rece, apă rece și chiar cu gheață, apă curată, sau cu câteva picături de oțet, sau perclorur de fier, sau va înghiți bucățele de gheață.

Scui pătoare. — Cei ce sufăr, de piept, ofticoșii, au datoria să scui pe în totdeauna în scui pătoare închisă, (fig. 400), care să conțină un lichid antiseptic. Aceasta este spre binele lor și al semenilor lor. Scui pătoarea o pot purta în buzunar ca pe o tabachieră. În clădirile publice, în birouri unde se adună mult public, trebuie să se pună jos scui pători de metal smălțuit, în care să se toarne o soluție de acid fenic 5 gr. la 100; sau la nevoie chiar apă simplă. Toată lumea va scui pa numai în aceste vase, cari trebuiesc golite în fiecare zi, în closet și curățite.



Fig. 400
Scui pătoare de buzunar

Sculament. — V. *Blenoragie*.

Scurtă. — V. *Adenită*.

Scutire de boală. — V. la *Imunitate*.

Sdrobire, strivire. — Între multele nenorociri de cari este cuprins omul este și aceea când i se apucă o parte a corpului între două corpuri, sau planuri rezistente, cari strâng până ce o strivesc, sau o sdrobesc, în parte sau de tot. Lucrul acesta se întâmplă în zilele noastre foarte des, în ateliere și fabrici.

Sebaceu (lat. *sebaceus*, dela *sebum*,

seu). — *Glande sebacee* (v. *Piele*). *Chist sebaceu* (v. *Modălcă*).

Seboree (dela lat. *sebum*, seu, și grec. *rhein*, a curge). — Boală de piele care constă în exagerarea secrețiunii glandelor sebacee (v. *Piele*). Ea are două varietăți; una *uscată*, cunoscută sub numele de *pitiriază*, și alta *grăsoasă* (uleioasă). *Seboreea grasă*, de care ne vom ocupa în aceste rânduri, are 2 forme: *discretă* și *crustoasă*. *Forma discretă* este produsă de un *microb* (bacil), care este unul din cei mai mici microbi. Microbul intră în orificiul unei glande sebacee dela față (nas, obraz) și formează acolo ceea ce se numește o *acnee*, caracterizată prin exudația unei materii grase care dă feței un aspect unsuros. Apăsând între unghii orificiul glandei iese un firicel care seamănă cu un viermușor, compus din grăsimi în care se află o colonie de microbi. Când boala aceasta se arată pe pielea capului poate să dea naștere la căderea părului.

Sec. — V. *Abstinență*.

Secale cornutum. — V. *Săcară cornută*.

Secrețiune (lat. *secretio*, dela *secerare*, a separa). — Se numește secrețiune, oricare lichid produs în interiorul unei glande și vărsat afară prin orificiul acelei glande, de exemplu: secrețiune gastrică (suc gastric), secreune biliară, secrețiune salivară, etc.

Secvestru (lat. *sequestrum*, dela *sequestrare*, a depărta). — Porțiune de os mort (necrotizat), care stă în țesuturi ca un corp străin și care trebuie scos prin operație, pentru ca să nu dea loc la supurație (v. *Necroză*).

Sedativă (Apă). — V. *Apă sedativă*.

Sedative. — V. *Calmante*.

Sedentară (Viață). — Cele mai de căpetenie funcțiuni ale corpului nostru, precum sunt: respirația, circulația sângelui, digestiunea (mistuirea) și celelalte nu se pot îndeplini cu destulă vigoare atunci când omul duce o viață sedentară, adică o viață mărginită în casă și într-o poziție întotdeauna aceeași. Viața sedentară strică sănătatea, o slăbește, oricare ar fi etatea și sexul omului. Sunt unii oameni cari duc această viață de bună voia lor, mulți însă sunt obligați a o duce prin felul meseriei lor; și într'un caz ca

și în celălalt ea este tot așa de stricătoare sănătății. Boalele care rezultă din viața sedentară sunt mai multe: constipația este în primul loc, apoi dispepsia, emoroiții, inapetența; afară de acestea mai trebuie să avem în vedere că stând locului, închis într'o odaie mai multe ceasuri, omul respiră un aer stricat, cu oxigen puțin, care nu este îndestulător pentru a reînsufleți sângele și țesuturile corpului, pe cari acesta le hrănește. Gimnastica scria, călăritul, vânătoarea sunt tot atâtea distracțiuni plăcute și foarte sănătoase, mai ales pentru cei obligați la o viață sedentară. Afară de aceasta, toți cei ce stau închiși într'o odaie, într'un atelier, ceasuri întregi, să caute ei singuri dacă nu cumva se pot bucura de binefacerile unei ventilațiuni sistematice, să caute deci a-și deschide ferestrele mai des, pentru ca să-și reînnoiască aerul.

Sedlitz. — V. *Apă de Sedlitz și Magnezie.*

Sedol. — Succedaneu al morfinei; bun sedativ al sistemului nervos, antispasmodic, analgezic general, ipnotic. Nu produce greață. Sedolul este o asociație a morfinei cu *scopolamina*.

Sefterea. — V. *Fumărică.*

Seler. — V. *Țelină.*

Seltz. — V. *Apă gazoasă.*

Semen-Contra. — Se numesc astfel florile încă nedeschise (muguri) unor plante din familia sinantherelor: *Artemisa contra*, *Art. glomerat*, *A. judaica*, *A. racemosa*, originare din Africa, al căror principiu activ este *santonina*. Praful de semen-contra este roșietic, are un miros foarte tare, aromatic, un gust amar și cam acru. Se întrebuințează cu mult succes în contra limbricilor, dându-se sub formă de praf 1—10 gr., după etate, în miere, dulceată, sau un sirop oarecare; infuziune (ceaiu) din 10 la 1000; extract, 50 ctgr. până la 1 gr.; ulei volatil 2—10 picături.

Santonină. *Toxic.* Viermifug lombricoid. Doză: 2 ctgr.: până la 5 și 10 ctgr. la copii, după etate și numai după 3 ani. *Otrăvirea* cu santonină are următoarele semne: pupilele dilatate, fața palidă, convulsii sau spasme, sudori reci, pierdere de cunoștință, puls încet, urina galbenă

ca lămâia. *Tratament.* Se vor provoca vărsături gâdilind omușorul cu degetul, băuturi calde, muștare la pulpe și la picioare. Inhalățiuni de eter, iar pentru spasme se va da cloral.

Sempervivum tectorum. — V. *Urechelniță.*

Senă, siminichie, sinamichie. — Se numesc astfel frunzele uscate ale mai



Fig. 401

Senă

multor specii de *Cassia* din fam. leguminoaselor. Sunt două varietăți: *Cassia acutifolia*, originară din Africa (Alexandria, Egipt), cunoscută în farmacie sub numele de *folia sennae alexandrinae* și alta *Cassia angustifolia*, originară din Africa și Arabia, mult cultivată ca plantă medicinală cunoscută în farmacie sub numele de *folia sennae tinnevelly*. Principiul activ al acestor foi este *acidul crizofanic*, care lucrează ca purgativ energic. Sena se întrebuințează foarte mult, singură sau asociată cu mană, cu revent, cu sulfat de sodă. Ea are un cusur că irită mațele și produce dureri (colici). Sena se dă sub formă de: infuzie (ceaiu) din 10—30 la 1000; praf 4—10 gr.; sirop 15—30 gr.; tinctură 15—30 gr.; în climă, sub formă de ceaiu, în care se pun 20—30 grame de sare amară.

Senilitate. — V. *Bătrâneță.*

Sensuri, simțuri (lat. *sensus*); **sensiuni, sensibilitate.** — *Sensurile* sau *simțurile* sunt organele prin cari noi ne punem în raport cu lucrurile cari ne înconjură și le cunoaștem existența și însușirile lor. Aceste lucruri, sau obiecte, produc asupra simțurilor noastre impresiuni variate după natura lor, cari impresiuni se transmit prin nervi și prin măduva spinării la creier unde ele sunt simțite în mod diferit. Aceste impresiuni se chiamă *sensiuni* (simțiri), iar însușirea ce o avem de a simți tot ceea ce vine dinafară se numește *sensibilitate*.

Această *sensibilitate* se compune din trei acte succesive: 1. *Impresiunea* făcută asupra unuia din organele simțurilor; 2. *Transmisiunea* impresiunii până la creier; 3. *Percepțiunea*, sau aprecierea

creerului. Sunt *cinci* sensuri (simțuri) : *auzul*, *gustul*, *odoratul* sau *mirosul*, *pipăitul* și *văzul* sau *vederea*. Fiecare din aceste simțuri este punctul de plecare al diferitelor impresiuni, cari sunt transmise la creier cu o repeziune așa de mare încât nici nu ne dăm seamă de timpul ce trece între producerea și percepțiunea lor de către creier (v. *Nerv*). Impresiunea produsă de același obiect exterior este simțită în același fel de toți oamenii sănătoși, cu o singură deosebire că unii o simțesc în grad mai mare și alții în grad mai mic ; astfel unii copii au simțurile mai dezvoltate, sunt mai *sensibili*, precum sunt și unii adulți mai *impresionabili* decât alții. Această exagerare a sensibilității ne arată că acei copii și adulți au un *temperament nervos* și ea trebuie respectată atât cât nu trece peste măsură, de frică să nu provocăm un atac de nervi, sau de spasme (v. *Impresionabilitate*). Se întâmplă în unele cazuri că sensibilitatea este micșorată, sau chiar perdută cu totul, din pricina unei stări bolnăvicioase a sistemului nervos ; de altfel această insensibilitate poate fi provocată și de doctor atunci când face o operație mai mare și bolnavul nu poate suferi durerile. În alte cazuri se întâmplă că sensibilitate este turburată, pervertită, prezentând oarecari aberațiuni (rătăcirii), cari se pot reduce la două tipuri cunoscute sub numele de : *halucinațiuni* și *iluziuni ale simțurilor*. În *halucinație* o senzațiune este percepută de creier fără ca să fie provocată de vreo cauză exterioară, așa că n'a fost nici o impresiune, nici o transmisiune și cu toate acestea apar *gândiri* și *acte* ca și cum ar fi fost determinate de o senzațiune reală și completă. În *iluziune* se întâmplă contrariul ; aci este o impresiune produsă asupra unui sens care a fost transmisă creierului, dar acesta o falsifică, o denaturează, așa încât ea nu mai este cum ar fi trebuit s'o producă fenomenul exterior.

Septic (grec. *septikos*, care corupe, strică). — O plagă este *septică* atunci când este năvălită de *microbi*, contrar de o plagă *aseptică*, ce n'are nici un micro-organism stricător.

Septicemie (grec. *septikos*, care

corupe, strică și *haima*, sânge). — Se numește astfel o otrăvire a sângelui datorită *toxinelor* produse de microbi într'o plagă. Septicemia se deosebește de *pioemie* prin aceea că acolo sunt însăși *microbii* cari circulă în sânge. În *septicemie* toxinele strică elementele nobile ale organelor, mai ales ale centrilor nervoși și mai cu seamă ale centrilor termici, iar în *pioemie* *microbii* merg să producă focare purulente la *distanță* (abcese metastatice). De altfel aceste două boale au mai multe puncte de atingere ; nu este *pioemie* fără *septicemie* și în *septicemie* adeseori se găsesc microbi în sânge. *Cauza* septicemiei este *infecțiunea* și aceasta ia un mers diferit ; adeseori ea nu este în raport cu gravitatea boalei ; o înțepătură la deget poate să producă o limfangită septică, cu septicemie, atunci când supurații mari nu dau loc decât la ușoare fenomene generale. Totul atarnă dela virulența microbului și dela slăbiciunea organismului ; numărul microbilor n'are decât o importanță mică. Lipsa de curgere a puroiului are o importanță cu mult mai mare și ori de câte ori un focar purulent nu este drenat cum se cade se ivește o ridicare de temperatură. Dintre diferitele tipuri pe cari le prezintă septicemia noi vom descrie pe aceste trei : 1. *Febra traumatică*. Această febră se vede în zilele noastre din ce în ce mai rar și aceasta mulțumită pansamentelor antiseptice, cari se fac îndată după orice accident, așa că supurația se face foarte rar și tot așa de rar se ivește și *febra traumatică*. Ceeace produce mai adeseori febra traumatică este fără îndoială *infecțiunea* ; cu toată antisepsia făcută, chiar îndată după accident, se poate foarte bine ca o cantitate mică de otrăvă să fie absorbită ; într'o plagă infectată febra se arată când puroiul nu se poate scurge bine, când el se îngămădește în părțile declive, în fundurile de sac ale cavităților, când mugurii cărnoși astupă plaga cutanată, când tubul de drenaj este cotit, sau apăsat într'un punct oarecare ; în toate aceste cazuri se produce o absorbiune de puroi urmată îndată de o ridicare de căldură. Această căldură crește repede, ajungând în 2—3 zile până

la 39—40°, apoi scade gradat, ajungând la normal. Ridicarea căldurii corespunde cu absorbțiunea în masă a unei cantități de toxine, iar scoborârea ei este în raport cu destrucțiunea toxinelor prin mijloacele de apărare ale organismului, ceea ce ne lasă să înțelegem că pricina septicemiei este trecătoare. Dacă însă cauza persistă atunci avem a face cu septicemia zisă *cronică*. Odată cu ridicarea căldurii bolnavul mai are și turburări din partea tubului digestiv, puțină durere de cap și o stare de toropeală. — 2. *Septicemia acută* se prezintă cu caractere grave. Tipul acestei forme este *înțepătura anatomică* fără fenomene locale, abia cu o ușoară suviță de limfangită. După câteva ceasuri bolnavul este cuprins de slăbiciune, de o stare de leșin, apoi *deodată* căldura se ridică la 40—41°. Moartea vine după 8 — 10 zile. Când vindecarea este sfârșitul, bolnavul începe să facă ud mai mult, pielea să se acopere de sudori, limba să se umezească și temperatura să scadă repede în 24 ceasuri; slăbiciunea bolnavului este foarte mare și uneori totul se termină printr'un focar de supurație, într'un punct oarecare. — *Septicemia cronică*. Această formă este urmarea unei absorbțiuni încete și prelungite a toxinelor, cari nu sunt în stare să producă imediat moartea. — *Tratament*. Septicemia, oricare ar fi forma ei, trebuie preîntâmpinată printr'un tratament energic și din vreme al plăgilor murdare. Când plaga este infectată trebuie să se facă un drenaj îngrijit, părțile compromise trebuiesc ridicate și la nevoie se va face amputația. În cazurile de septicemie acută tratamentul local n'are putere și trebuie să ne mărginim la susținerea stării generale a bolnavului, prin preparațiuni tonice, alcool, injecțiuni cu ser artificial, combinate cu luări de sânge, injecții cu ser anti-streptococic, etc.

Septicemie embolică. — V. *Pioemie*.

Septicemie puerperală. — V. *Puerperală* (Febră).

Ser artificial. — S'a observat că clorul de sodiu (sarea), pus în soluțiunile de laborator, micșorează și oprește chiar înmulțirea *microbilor*, de unde s'a născut ideea de a face injecțiuni cu soluțiuni saline în doze mari (100—

2000 gr.) sub piele, în vine, în diferite boale grave, cum sunt: holera, uremia, eclampsia, etc., precum și în stările de slăbiciune mare, observate în urma boalelor și operațiunilor, pentru a modifica starea sângelui în mod




Fig. 402 — Aparat pentru injectat ser artificial

repede. Soluțiunea cea mai întrebuințată este de 7 gr. de clorur de sodiu la 1000 gr. apă sterilizată. Serul artificial se mai numește și *ser fiziologic* și se injectează în corp cu ajutorul unui aparat special.

Seroasă și serozitate. — Se numește *seroasă* o membrană care formează un sac fără deschizătură. Între cei doi pereți ai ei se află un lichid în cantitate mică, ce se cheamă *serozitate* și care înleznește alunecarea unui perete asupra celui alt. Unele *seroase* învâluie organele, cum este *pericardul* în jurul inimii, *pleura* în jurul fiecărui plămân, *peritoneul* în jurul tuturor organelor din pânze și *arahnoida* în jurul centrilor nervoși. Alte *seroase* conțin un lichid lipicios, viscos, numit *sinovie*, din care pricină se cheamă *sinoviale* și ele căptușesc încheieturile pe dinăuntru, precum și tecile tendoanelor, având rolul de a înlezni mișcările articulare, întocmai după cum celelalte seroase înleznesc mișcarea organelor (*seroase viscereale*). Uneori lichidul se înmulțește în seroase fără să producă nici o schimbare și atunci avem ceea ce se numește *idropizie* (vezi acest cuvânt); alteori el se înmulțește în urma unei inflamațiuni (aprinderi) care produce modificări, după cum se întâmplă în *peri-*

cardită, pleurezie, peritonită (vezi aceste cuvinte).—Compoziția *serozității*, adică a lichidului din seroase, se apropie într-o câțva de cea a serului sângelui. Sunt mai multe varietăți de serozitate: aceea a seroaselor în stare normală, sau în idropizii, aceea dela beșicile dela vezicători și dela arsuri, aceea dela *edem* (vezi acest cuvânt), în care lichidul este infiltrat în țesutul celular.

Seroterapie. — Se numește astfel tratamentul infecțiunilor prin *seruri* de animale imunizate, sau vaccinate, în contra lor. *Seroterapia* s'a pus în practică mulțumită cercetărilor învățaților *Behring* și *Roux* asupra *difteriei* și a lui *Kitasato* asupra *tetanului*. De atunci s'a făcut numeroase lucrări, cu succes și fără succes, cu privire la diferite infecțiuni. Termenul seroterapie se mai aplică și la întrebuințarea serurilor sangvine, naturale și artificiale, precum și a diferitelor soluțiuni saline, mai mult sau mai puțin complexe, cunoscute sub numele de seruri, întrebuințate, în injecțiuni sub piele sau în vine, în contra diferitelor stări patologice. Iată câteva din cele mai importante seroterapii: *antidifterică, antidizenterică, antipestoasă, antipneumococică, antistreptococică, antitetanică, antituberculoasă, antitifică, antivenoasă*. Medicina azi trage mari foloase și pune mari speranțe, în acest mijloc de tratament.

Serozitate.—V. *Seroasă*.

Șerpe (lat. *serpens*). — Unii șerpi nu sunt veninoși cum este *șerpele de casă*. *Vipera*, sau *năpârca*, *șerpele cu clopotei*, *șerpele cu ochelari*, etc. sunt periculoși.

Serpengea, Serpenginea. — V. *Antrax*.

Șerpi (Mușcăture de). — V. *Viperă*.

Serul sângelui. — V. *Cord*.

Sesamoid (dela grec. *sesamon*, sesam, susan, și *eidos*, formă). — Se numesc astfel niște oscioare mici rotunde, cari se aseamănă cu sămânțele de susan și cari se dezvoltă în tendoanele ce trece pe lângă unele încheieturi, dându-le mai multă putere.

Sesamum indicum sau orientale.—V. *Susan*.

Sete (lat. *sitis*, grec. *dipsa*). — Când avem sete ni se usucă gura și mai ales gâtul și această uscăciune este

semnul că corpul nostru are trebuință de a bea, adică de a introduce o cantitate de apă în tubul digestiv. Dacă nu putem satisface această trebuință setea devine un chin din cele mai mari, cu mult mai mare decât *foamea* și poate da naștere la accidente foarte grave, mortale chiar. Omul trebuie să bea apă pentru ca să îplinească pierderile pe cari le suferă organismul prin sudoare, urină, etc., și cari pierderi fac ca sângele să se îngroașe, să nu mai poată circula bine, iar funcțiunile pielii și ale rinichilor nu se mai pot îndeplini de loc și se otrăvește corpul. Afară de aceasta lichidele introduse în stomac înleznesc mistuirea alimentelor solide. Prin urmare pentru ca omul să poată trăi trebuie să bea, întocmai după cum trebuie să mănânce. Dar alegerea apei de băut și a celorlalte băuturi, temperatura și cantitatea lor, nu trebuiesc lăsate la întâmplare, ci trebuie făcută după regulile dictate de igienă. Setea de multe ori este exagerată, după cum se întâmplă în urma unui prânz compus din mâncări prea sărate și prea iuți, din fripturi uscate, din feculente. În aceste cazuri putem bea apă ceva mai multă decât în timpurile obișnuite, putem bea chiar și întremese, pentru ca să preîntâmpinăm o iritație de stomac. Setea mai este exagerată de toate boalele însoțite de căldură, de boalele tubului digestiv (dispepsie, indigestiune, etc.), dar, dintre toate boalele cea care produce setea mai mare, mai arzătoare și nepotolită este boala de zahăr, sau *diabetul*.

Șezut. — Se numește astfel partea de jos a trunchiului, care în boalele lungi, prin zăcere îndelungată, se rănește cu atât mai iute cu cât bolnavul este mai slab. Aceasta provine de acolo că pielea este apăsată între oasele de desupt, sacru și coccix și între saltea, așa că sângele nu poate circula bine, pielea nu se poate hrăni în de ajuns și tinde a se gangrenă. Această rănire se numește *decubit* și se arată de obicei în boalele grave: febră tifoidă, paralizii, boalele măduvii spinării, etc. care silesc bolnavul să zacă mult timp pe spate, nemișcat. Pentru a preveni decubitele se recomandă ca acești bolnavi să fie culcați pe saltele de lână,

sau mai bine pe saltele de cauciuc, umflate cu apă, sau cu aer, sau să aibă numai o perină de acest fel sub șezut. Imdată ce pielea se înroșește se vor face spălături cu vin, sau oțet aromatic, se va pudra cu praf de china, de amidon, de talc, etc. și dacă este rană, se va pansa cu vaselină iodoformată, etc., iar bolnavul își va schimba poziția de mai multe ori pe zi.

Șezut, anus.—Orificiul de jos al matului.

Șezutului (eșirea).—V. *Rect*.

Sfânta de boală.—V. *Dizenterie*.

Sfârc de țâță.—De multe ori se întâmplă că femeile lăuze au sfârcurile dela țâță foarte mici, încât copilul nu poate suge, sau și dacă suge produce mamei dureri mari, prin sforțările ce face ca să poată suge; sau sfârcurile, deși sunt mari în deajuns, sunt crăpate și foarte dureroase când suge copilul. În toate aceste cazuri este bine să ne slujim de un *sfârc artificial*, care este făcut de cauciuc, ca și cel dela *biberon* care se aplică pe o pâlnie mică de sticlă, ce acoperă bine sfârcul țâței mamei cu toată partea din jurul lui. Copilul sugând din sfârcul de cauciuc trage laptele din țâță, cu înleznire, fără să se ostenească și fără ca mama să simtă durere. Acest sfârc de țâță artificial trebuie ținut foarte curat, pentru ca să nu rămână în el lapte, care se înăcrește și strică laptele dela sugerea următoarea.

Sfârșeală.—V. *Lipotimie*.

Sfârșenie.—V. *Inaniție*.

Sfigmograf (grec. *sphygmos*, puls și *graphein*, a scrie).—Aparat destinat să desemneze liniile formate de bătaile arterelor (ale pulsului). Sfigmograful se compune dintr'un resort,



Fig. 403 — Sfigmograf

care pe de o parte apasă artera, iar pe de altă parte este în raport cu o pârghie foarte ușoară, prevăzută cu o pană. Această pană, fiind pusă în mișcare la fiecare oscilațiune (bătaie)

a arterei, înscrie pe un cilindru, care se întoarce, seria acestor oscilațiuni, după cum se poate vedea din figura




Fig. 404 — Inregistrarea pulsului pe hârtie

1=normal; 2=în anevrism; 3=în insuficiența aortică; 4=în strictura aortică; 5=în insuficiența mitrală; 6=în strictura mitrală; 7=la bătrâni; 8=în febra tifoidă

aci alăturată și care ne arată pulsul normal în comparație cu pulsul unor boale.

Sfincter (grec. *sphiggein*, a strânge).—*Mușchii sfincteri* sunt niște fășii musculare așezate în jurul unui orificiu, cu scopul ca să-l țină închis, astfel sunt: sfincterul buzelor (orbicularul buzelor), al pleoapelor (orbicularul pleoapelor), sfincterul anal (al șezutului), vezical (al beșicii udului), etc.

Sforăială.—V. *Horcăire și Somn*.

Sforțare.—(franț. *effort*), *opintire*.—

Sforțarea este o totalitate de contracțiuni musculare cari imobilizează pieptul cu scopul de a da un punct de sprijin puternic mușchilor din restul corpului, ori de câte ori aceștia sunt acționați de voință, cu maximul de energie. Când mușchiul contractat în aceste condițiuni este departe de piept, toți mușchi cari îl separă de piept se contractă: astfel, o contracțiune energică a mâinii face să se contracte mușchii antebrațului, ai brațului, ai umărului și în cele din urmă ai pieptului. Sforțarea se produce în mai multe feluri printr'o inspirație adâncă, în care, umflându-se plămânii cu aer, se lărgeste pieptul în gradul cel mai mare, sau printr'o contracțiune a deschiderii laringelui (a glotei), cu scop de a împiedeca eșirea aerului din piept;

sau prin contracțiunea energetică a mușchilor pântecelui, cari trag în jos pieptul (toracele). — O sfortare mare, sau des repetată, poate de multe ori să aibă urmări rele. În timpul sfortării plămânii servesc de punct de sprijin coastelor, veziculele pulmonare suferă o apăsare prea mare, pe care ele o transmit vaselor mari din piept; o sfortare mare și lungă poate produce o ruptură de vezicule și omul să capete emfizem (năduf), sau o ruptură de vase, producând o apoplexie pulmonară, sau poate produce palpitațiuni (bătăi de inimă), o sincopă (leșin), sau asistolie (oprirea bătăilor inimii). Aceste urmări rele se observă mai ales la cei ale căror artere sunt pietroase (arterio-scleroză).

Sfrentie (mal-français). — V. *Sifilis*.

Sgalbe dulci. — V. *Eczemă*.

Sgârcenie. — V. *Avariție*.

Sgârciu. — V. *Cartilagi*.

Sgârietură. — V. *Escoriațiune*.

Sgău. — V. *Mitră*.

Sghiab. — V. *Gutieră*.

Sialogog (grec. *sialon*, salivă, și *agein* a alunga, a goni). — Medicament care întărește secrețiunea salivei (face bale multe), cum sunt: preparațiunile amoniacale, jaborandi, pilocarpina, calomelul, cresonul, tutunui, etc.

Sialoree. — V. *Ptialism*.

Șiarchin. — V. *Pepene verde*.

Șibilant. — (dela lat *sibilare*, a fluera, a șuera). — Sgomot muzical care se aude când punem urechia pe pieptul unui bolnav de tusă (*raluri sibilante*) și care se produce în bronhii. Aceste ralurii sibilante se aud în bronchită, emfizem (năduf), astmă, când este o apăsare pe bronhii, etc.

Șicativ (lat. *sicare*, a usca). — Medicament care înleznește uscarea unei plăgi (răni), care scurtează sau previne supurațiunea, cum sunt prafurile absorbante de: licopodiu, amidon (scrobeală), feculă de cartofi, etc.

Sicoză (grec. *sykosis*, dela *sykon*, smochină). — Aprinderea sau inflamațiunea foliculelor părului de pe față. Semnele acestei boale sunt: pustule în jurul unor peri, izolate sau reunite mai multe între ele; se mai văd și niște plăci pe cari apar vegetațiuni roșii, umede: pustulele sunt urmate

de cruste (coji) negre, cari cad și lasă suprafețe roșii, jupuite. Sicoza este o boală care ține luni și ani. *Tratamentul* constă în alifii sulfurate (cu pucioasă), simple sau cu tanin, alifii mercuriale; epilațiune (v. *Tinea*).

Sideroză (grec. *siderosis*, dela *sideros*, fier). — Se numește astfel o pneumonie (aprindere de plămâni) cronică, produsă prin inhalațiune de praf de oțel.

Sidonal. — V. *Piperazină*.

Siestă. — Așa se cheamă odihna și somnișorul de după prânz. Dacă este bine, sau nu, este greu de spus, căci unii doctori zic într'un fel și alții în altfel, așa că rămâne să hotărască mai mult omul, care singur poate să judece, după cum se simte, dacă siesta îi face bine, sau dacă îi face rău și în acest caz se va lipsi de ea.

Sifilisul. — Sifilisul este o boală infecțioasă deosebit de gravă, care se transmite cu ușurință dela om la om, pe cale directă sau indirectă. A apărut în Europa pela sfârșitul secolului al 15-lea, fiind adus din America de corăbierii, cu care Cristofor Columb a descoperit acest continent, pătrunzând mai întâi în Spania, de unde s'a răspândit, treptat, pretutindeni. — Boala



Fig. 405
Microbul sifilisului (*Treponema pallidum*)



Fig. 406 — *Treponema palidă*

este cauzată de un parazit microscopic, numit *spirocheta palidă* sau *treponema palidă*, descoperit în anul 1903

de cercetătorul german Schaudinn. Această descoperire a dat oamenilor de știință puțința să studieze boala foarte amănunțit, ajungând să cunoască toate neajunsurile pe care le cășunează omenirii.—Sifilisul este o



Fig. 407 — Sifilom primar al buzei

boală de lungă durată care niciodată nu dă îndărăt de bună voie, adică fără tratament. Deși apare în primul rând pe piele, germenii lui se împrăștie în tot organismul, localizându-se în diferite organe pe care le rod pe tăcute, ani și zeci de ani de zile, până la distrugere.—*Evoluția sifilisului*.—Din clipa în care pătrunde în corp și până la sfârșitul vieții celui suferind, sifilisul trece prin mai multe faze. De cele mai multe ori pătrunde în corp prin piele. În locul pe unde a pătruns apar anumite semne vizibile, de care omul curat își dă seama fără întârziere. Aceste semne se arată sub forma unei răni nedurerose, așezată de



Fig. 408
Sifilom primar al degetului (accident frequent la medici și moașe)



Fig. 409
Sifilis secundar

cele mai multe ori în zona organelor genitale; infecțiunea făcându-se mai ales pe calea raporturilor sexuale. Rana

aceasta se numește *șancru sifilitic* sau *sifilom primar*. După 2—3 săptămâni spirocheții din șancrul sifilitic se împrăștie în întregul organism. Înainte de împrăștierea infecțiunii în corp, boala localizată poate fi stinsă cu mai multă ușurință decât mai târziu. După generalizarea ei, vindecarea este mult mai grea. Trebuie să insistăm asupra acestui fapt, deoarece de graba cu care se începe tratamentul depinde tot viitorul bolnavului.—Dacă suferindul n'a fost destul de prudent și nu s'a grăbit să se trateze chiar dela începutul bolii, adică din *perioada primară* a șancrului, sifilisul se dezvoltă mai departe, trecând în altă fază, numită *perioada secundară*, în care infecțiunea se generalizează, învederează toate organele și apare pe piele sub formă de pete și diferite feluri de erupțiuni din cele mai variate și mai neplăcute. Erupțiunile acestea se numesc mai ales *sifilide* și *plăci mucoase* și sunt localizate în deosebi în zona organelor genitale, la șezut, în gură, pe buze, pe frunte, în regiunile care transpiră mult și pe pielea păroasă a capului. Părul sifiliticului secundar cade în șuvițe apreciabile, astfel încât după câțva timp pare ca mâncat de molii.—Toate erupțiunile umede din sifilisul secundar sunt tot așa de molipsitoare ca și sifilomul primar dela începutul bolii. Bolnavul cu sifilis secundar este periculos pentru cei din jur, întrucât le poate transmite boala cu ușurință nu numai *în mod direct*, pe calea raporturilor sexuale, ci și *în mod indirect* prin anumite obiecte infectate de bolnav și folosite apoi de cel sănătos. Erupțiunile sifilisului secundar sunt așa de variate, încât se pot asemăna cu aproape oricare boală de piele. Pentru recunoașterea lor este negreșit nevoie de medic. Suferindul care, pe baza celor citite aici sau în altă parte, crede că poate ca însuși să stabilească natura boalei, riscă să se înșele, îndepărtând posibilitățile de vindecare grabnică a bolii. În afară de semnele exterioare vizibile, bolnavul de sifilis în perioada secundară are dureri de cap, nu mai are poftă de mâncare, face febră, se simte abătut; femeilor li se poate opri menstruația sau, dim-

potrivă, poate apărea în cantitate mai mare. Dacă intervine tratamentul, situația se schimbă repede în bine, dar chiar și fără tratament după câțva timp sifilisul secundar se potolește în aparență, semnele lui vizibile dispar, pentruca totul să intre pentru câțva timp într-o fază de liniște înșelătoare, chiar foarte înșelătoare, deoarece în realitate boala continuă să mocnească în adâncurile organismului periclitându-și cele mai prețioase funcțiuni de viață, până la distrugerea lui completă. *Faza latentă* a sifilisului este mai primejdioasă pentru bolnav, decât *faza activă*, tocmai din cauza falsei iluzii de vindecare, pe care o dă bolnavului.



Fig. 410 — Sifilide secundare



Fig. 411 — Sifilide între degetele picioarelor

În mersul său încet dar neîntrerupt, sifilisul ajunge în *perioada terțiară*, care apare după câțiva ani dela începutul bolii, dar care poate izbucni și mult mai târziu. Răbufneli târzii ale sifilisului neglijat se pot produce chiar după 20—30 de ani. Bine înțeles că bolnavii tratați temeinic n'au de ce să se teamă. Leziunile sifilisului terțiar pot apărea sub cele mai neașteptate și mai impresionante forme; oasele nasului, sau din altă parte a corpului, se înmoaie și se turtesc, răni mari și adânci găuresc pielea și mușchii până la os, vederea se turbură, auzul slăbește, simțul mirosului scade. Organele interne schioapătă, suferindul tânjește, dragostea de viață se împuținează, bolile se incuibează mai ușor și evoluează mai repede. De aici și până la desnodământul fatal nu mai

e mult, deoarece din faza terțiară sifilisul trece în *perioada cvaternară* a complicațiunilor nervoase și mintale, care duc la tabes și paralizie generală. Cine nu știe, doar, că o mare parte din clientela azilelor de alienați este formată din sifilitici care și-au neglijat tratamentul! — *Sifilisul moștenit*. Sifilisul părinților se transmite la urmași. Fătul infectat moare în pântecul mamei înainte de a fi ajuns la maturitatea celor 9 luni de sarcină. Unii urmași ai părinților sifilitici se nasc vii, dar sunt destinați unei morți timpurii, sau trăiesc tânjind toată viața. — *Copilul eredo-sifilitic* are o înfățișare caracteristică: pielea lui e lipsită de frăgezime, fața îi e zbârcită și întreaga lui făptură seamănă cu a unui om îmbătrânit înainte de vreme. Fruntea unora e bombată, dând capului o formă anormală; la alții, nasul e turtit, încheieturile strâmbe, dinții rari și neregulați. Dar primejdia cea mai mare, care paște pe copilul atins de sifilis moștenit, este orbirea. — Față de toate aceste neajunsuri grave, care pot atinge pe urmașii părinților bolnavi de sifilis, soții bolnavi vor trebui să-și dea seama că sunt datori față de cei ce vor urma după ei, ca și față de națiune, să se trateze cu băgare de seamă atât cât ordonă medicina. Părinții sifilitici tratați regulat vor da naștere la copii perfect sănătoși. — *Cum se ia sifilisul*. — În afară de transmiterea prin moștenire dela părinți, sifilisul se mai poate lua:



Fig. 412 — Sifilis secundar varioliform

1. Prin contact direct cu persoana bolnavă.
2. Prin contact indirect cu persoana

bolnavă, adică prin mijlocirea obiectelor infectate de bolnav și atinse apoi de sănătos.

În contaminarea directă dela om la om, persoana sănătoasă vine în contact cu persoana bolnavă în timpul unui raport sexual, sau persoana sănătoasă vine în contact cu bolnavul în diferite alte împrejurări fără nicio legătură cu sexualitatea.—Nouă din



Fig. 413 — Sifilis malign

zece persoane se molipsesc pe cale sexuală, sau venereană; din cauza acestei origini sifilisul se numește boală venerică, deși în mersul său viitor nu mai are aproape nicio legătură cu poarta de intrare, întrucât infectează întregul organism, devenind, astfel, o boală generală.—Contactul sexual cu o persoană sifilitică, atinsă de leziuni contagioase, molipsește sigur pe partenerul sănătos, dacă nu se iau măsuri de profilaxie după contact. Mai mult chiar: boala poate fi transmisă chiar de o persoană deocamdată sănătoasă, dacă aceasta a avut legături cu un sifilitic contagios. În felul acesta



Fig. 414 — Sifilis malign

transmit boala mai ales prostituatele întrebuințate într'un interval scurt de mai mulți bărbați.—Deoarece erupțiile sifilitice contagioase apar întodeauna și pe mucoasa buzelor, vom înțelege ușor de ce se vorbește așa de mult de riscurile de a se transmite sifilisul prin sărutul bolnavilor cu răni sifilitice pe buze. Sărutul acesta poate fi drăgăstos, sau convețional; copiii cad

adeseori victime acestui fel de dovezi de dragoste. Părinții care leagă de gâtul copiilor pieptare cu avertismentul „Vă rog nu mă sărutați” au perfectă dreptate să ia această măsură.—Muscătura sifiliticului este tot așa de periculoasă ca și sărutul. Sifiliticul tuberculos, care ne tușește în față, ne poate dărui în același timp și treponema sifilisului, și bacilii tuberculozei. Sânul doicii sănătoase poate fi infectat de sugarul sifilitic, iar doica sifilitică poate transmite boala sugarului sănătos pe care îl alăptează.—Dintre obiectele care înlesnesc conta-



Fig. 415
Sifilis terțiar
(gome sifilitice
profunde și
superficiale)



Fig. 416 — Sifilide
tubero-ulceroase

minarea indirectă mai vinovat este paharul care trece din gură în gură. Spălat bine și uscat, același pahar nu mai este primejdios, deoarece uscăciunea omoară spirocheții. Țăranul se contaminează cu plosca, sau cu sticla de țuică, trecută din gură în gură. E de ajuns un singur sifilitic contagios, în mijlocul unei familii, ca să se îmbolnăvească toți ai casei, prin lingura și strachina comună și chiar prin așternutul în care dorm îngheșuiți părinți și copii, bunici și nepoți. Un instrument prin mijlocirea căruia se poate lua sifilisul este briciul; degetele cu care frizerul a atins cine știe ce răni ascunse, de asemenea. Să nu punem niciodată în gură țigara umezită de buze nesigure! Tot așa de prudenți să fim și cu trompetele trâmbițele și alte jucării destinate copiilor. Peria de dinți străină poate deveni un instrument, de contagiune sifilitică. Servitorii bolnavi își pot infecta stăpânii, de ale căror perii de dinți se folosesc pe ascuns. Ca măsură de prevedere împotriva acestui risc,

după întrebuințare peria de dinți se va așeză astfel, ca să se poată usca bine, îndu-se spirocheții mor.— Din aceste exemple se poate vedea că există nenumărate posibilități de contagiun indirectă prin diferite obiecte de toaletă intimă, pe care vom căuta să le păstrăm în astfel de condiții igienice, încât să fim feriți de primejdia infecțiunii.

Apărarea împotriva sifilisului. — Grija noastră principală este de a veghea ca infecțiunea sifilitică să nu pătrundă în corp. Dacă n'am reușit să ne ferim de boală, suntem datori să o facem inofensivă prin tratament. Prin urmare de sifilis ne apărăm prin măsuri de apărare preventivă și prin



Fig. 417
Sifilide terțiare
ale limbei



Fig. 418 — Gomă
sifilitică ulcerată
profundă

tratament stăruiilor. Intrucât primejdia de contaminare decurge în primul rând din exercițiul funcțiunii sexuale, vom căuta ca această funcțiune să fie înconjurată de toate măsurile de prevenire posibile. Raporturile sexuale nu vor începe decât atunci când organismul a ajuns la desăvârșirea dezvoltării sale. În pubertate și adolescență raporturile sexuale sunt lipsite de înțeles real, deoarece materialul de viață, risipit pe această cale, este necesar corpului pentru propria sa dezvoltare. Abstenența tineretului nu e dăunătoare; dimpotrivă. Educatorii sunt datori să explice tinerilor acest lucru, arătându-le rostul adevărat al existenței, prin exemple luate din biologia animală și vegetală. Pinard, un mare medic și educator francez, a spus că adevărata civilizație începe abia atunci când lumea e convinsă de necesitatea educației sexuale.— Împotriva raporturilor sexuale inevitabile și riscante, la timpul cuvenit, luptăm prin *curățenie corporală*. Apa

și săpunul sunt cele mai active arme ale curățeniei. Săpunul omoară spirocheții. Oamenii murdari se îmbolnăvesc mult mai ușor de sifilis și blenoragie, decât cei curați. Prin urmare după contact spălarea abundentă



Fig. 419 — Sifilis terțiar a
oaselor nasului

cu apă caldă și săpun a regiunilor expuse la contaminare. Se mai recomandă și fricțiuni cu pomada lui Metchnikoff compusă din : Calomel 33 gr. lanolină 67 gr. și vaselină 10 gr.—Se mai întrebuințează pomada lui Gauderchau compusă din : Cianură de



Fig. 420 — Sifilis hereditar

mercur 10 ctgr. i timol 1 gr. 75, calomel 25 gr. lanolină 50 gr. vaselină 23 gr. 15. Preparată bine și întrebuințată cu pricepere la această pomadă nu rezistă nici spirocheții, nici gonococii, dar să nu uităm că oarecare riscuri de infecțiune există întotdeauna, oricât de atente ar fi măsurile preventive, ceea ce înseamnă că raporturile sexuale întâmplătoare, practicate cu femei de

moravuri ușoare, profesioniste, sau cu femei care în mod obișnuit și din ușurință se împrumută solicitatorilor, pot duce la infecțiunea veneriană. În cadrele mariajului aceste riscuri sunt mult mai mici, deși ele nu sunt excluse atunci când unul din soți duce o viață sexuală extraconjugală.

Tratamentul sifilisului. — Dacă nu s'au luat măsuri de profilaxie, sau dacă măsurile luate nu au dat rezultatele așteptate, producându-se infecțiunea, bolnavul e dator să se trateze, pentru a feri pe alții de infecțiune, ca și pentru a fi pus la adăpost de complicațiile îndepărtate ale sifilisului netratat. Acest tratament trebuie să înceapă cât mai neîntârziat dela apariția semnelor suspecte. Înainte de a începe tratamentul trebuie să se stabilească precis natura boalei de un medic specialist. Diagnosticul sigur de specialitate este absolut necesar, deoarece nu orice rană pe organele genitale, sau în altă parte a corpului, înseamnă sifilis, deși orice rană, oricât de neînsemnată, ne îndreptățește să ne gândim la această boală. Trebuie lucrat cu cea mai mare viteză, pentru a putea lua măsuri înainte ca infecția să aibă timp să pătrundă în sânge, făcând astfel *tratamentul*, *abortiv*, care este de 3—4 ori mai scurt decât *tratamentul curativ*, instituit după gene-



Fig. 421. — Alopecie sifilitică

ralizarea infecțiunii. Dacă infecțiunea s'a generalizat, sau nu, ne spune *analiza sângelui*, numită *seroreacția Wassermann*. „Wassermann pozitiv” înseamnă că infecțiunea e generalizată. Analiza negativă nu înseamnă însă cu certitudine că persoana examinată nu e bolnavă de sifilis. Când

boala e potolită și ascunsă, analiza sângelui nu ne lămurește asupra stării bolnavului. În astfel de cazuri numai examinarea medicală e hotărâtoare. Pentru tratamentul sifilisului se întrebuițează preparate de arsenic, bismut, mercur și iod. Denumirile farmaceutice ale acestor preparate sunt foarte variate. Felul lor, ca și durata tratamentului, se hotărăște de medic, dela caz la caz. Bolnavul care respectă cu sfîntenie prescripțiile medicale poate fi sigur că se vindecă; bolnavul neglijent este îndreptățit să fie îngrijit de soarta sa. Tratamentul complet al sifilisului durează 3—4 ani, cu anumite pauze, fixate după natura boalei și epoca tratamentului. Dispariția semnelor de boală de pe piele nu îndreptățește pe suferind să se considere vindecat, deoarece *sifilisul nu este numai o boală de piele ci*, după cum am mai spus, *o boală generală a întregului organism*, care cere să fie examinată cu toată seriozitatea.

Prin daunele aduse colectivității naționale, în urma pierderilor cauzate materialului omenesc, sifilisul este considerat cu drept cuvânt una din cele mai temute plăgi sociale. (Dr. Aurel Voinea).

Silhă. — V. Brad.

Silnic, *coarda ielelor*, *olbâl*, *rătun-gioară*, *sâlnică* (*Glechoma hederacea*,



Fig. 422 — Silnic

fam. labiatelor). — Plantă erbacee care crește prin locurile umede, livezi de pomi, păduri și tușiuri umbroase. Se întrebuițează foile și florile sub formă de fiertură în doză de 10 gr. la un litru de apă. Această băutură înleznește scuiparea în tusă și grăbește

vindecarea. În Banat babele vindecă cu silnic *orbâlul*.

Simarubă. — Coaja rădăcinii de simarubă, care conține *cuasina* (vezi *Cuasia*). Ea se dă ca tonic și în contra diareei, sub formă de ceaiu (infuziune) din 50 la 1000 și de praf, 1—4 gr.

Siminichie. — V. Sena.

Symptom (grec. *syn*, cu și *piptein*,

a cădea). — Turburări funcționale prin cari se arată boalele și cari sunt legate de dezordini organice, apreciable sau nu, de simțurile noastre de cercetare. Simptomele se împart în *obiective*, pe cari le vede și le cunoaște medicul, *subiective*, pe cari le simte numai bolnavul, de exemplu: durerea este un *simptom subiectiv*. Simptom *patognomonic* este acela care permite să afirmăm felul boalei. Simptomele mai sunt *directe* sau *indirecte*, acele produse deadreptul de leziune și acele cari se produc în mod indirect, prin dezordinele consecutive acestei leziuni. *Medicină simptomatologică* va să zică tratarea simptomelor unei boale, iar nu însăși boala, de exemplu: combaterea căldurii cu chinină, a turburărilor de stomac și de intestine prin stomachice, vomitive și purgative, a slăbiciunii prin excitante, stimulente și tonice.

Simțuri. — Caută la *Sensuri*.

Simulație (lat. *simulatio*, prefăcătorie, fățărnicie). — Unii oameni simulează, provoacă, sau disimulează diferite stări patologice, sau fiziologice, cu un scop oarecare; astfel se poate simula, sau disimula, o sarcină sau o facere; se poate simula o slăbire de vedere, o miopie, surzenie, o nebunie, o epilepsie, o paralizie; o curgere de sânge, etc.; se poate provoca o rănire, o conjunctivită, o rană la picior, o boală de piele, o bătaie de inimă, etc. Înșelăciunea se poate însă ghici cu înleznire când ținem seamă de toate semnele acelor boale.

Sinaia. — Stațiune climaterică de munte, pe Valea Prahovei. Comună urbană, reședința de vară a Familiei Regale. Sinaia se află la poalele muntelui Furnica, pe platoul ce se coboară spre Valea Prahovei. Localitatea este închisă ca într-o baie și înconjurată de păduri frumoase ce se întind pe coamele munților Bucegi. Ea se găsește la limita Peleşului, în vecinătatea căruia se ridică Castelul Peleş și între linia izvoarelor unde se întinde o pajiște minunată. Regiunea este dintre cele mai pitorești. Sinaia este un oraș de munte, cu străzi regulate, hoteluri mari, vile numeroase în diferite stiluri, un centru mare industrial și cea mai importantă localitate de vilegiatură din țară. Sinaia

se găsește la o înălțime de 850 metri deasupra nivelului Mării Negre. Mulțumită acestei înălțimi și a pădurilor uriașe de brazi și de stejari ce înconjoară localitatea, aerul este curat, ozonizat, clima este dulce, plăcută și constantă. Diminețile și serile sunt mai răcoroase, timpul de peste zi este cald. Vânturile dominante sunt cele dela N. și S., ele însă nu sunt tari. Clima Sinaii este bună pentru cei ce suferă de anemie, de cloroză, de scrofuloză, de surmenaj. Sezonul începe la 15 Iunie și ține până la 15 Septembrie. Orașul este iluminat cu electricitate și are apă de băut foarte bună, adusă din izvoarele sf. Ana și Peleşul; un parc întins în centrul orașului, cu alei numeroase, chioșcuri și bănci, bufet, muzică; priveriște admirabilă spre munți cari încing Sinaia. Imprejurimile sunt din cele mai pitorești; Mănăstirea Sinaia, cu muzeu și bibliotecă, Castelele Peleş, Pelisor, Foișor, sunt tot atâtea lucruri vrednice de văzut și de admirat; apoi o mulțime de fabrici și excursiuni minunate la Cuibul Reginei Maria, Valea Rea, Poiana Țapului, Bușteni, Azuga, Predeal, etc.

Sinamichie. — V. *Senă*.

Sinapis alba și nigra. — V. *Muștar*.

Sinapisme. — V. *Muștar*.

Sinblefaron. — V. *Ochiu*.

Sincopă, leșin. — Se numește astfel o stare caracterizată prin *încetarea*, mai mult sau mai puțin lungă, a *bătăilor inimii*, din care pricină și oprirea mișcărilor de respirație ale pieptului. Când cineva a leșinat inima încetează de a bate, sau bate așa de slab încât nu se mai simte nici o mișcare, dacă punem mâna pe piept în dreptul inimii, nici degetul nu mai simte pulsul dela mână, iar mișcările de respirație sunt întrerupte în același timp. Leșinul ține de obicei un timp scurt, câteva secunde sau câteva minute, după cari bătaile inimii încep să se simtă, mai întâi slabe, apoi din ce în ce mai tari, de asemenea și respirația reîncepe a se face, ochii se deschid și omul începe să se simtă și să cunoască ceea ce este în jurul lui, apoi începe să vorbească și să se miște. Dacă însă starea de nesimțire și de nemișcare se prelungește mai mult timp, fără să se simtă

bătăile inimii și pulsul, nici mișcările respiratoare, atunci nu mai avem a face cu un leșin, ci cu o moarte, *aparentă* sau *definitivă*, pe care știe numai doctorul s'o cunoască (v. *Moarte*). *Tratamentul* leșinului constă în a culca bolnavul cu capul ceva mai jos, făcându-i frecături uscate, sau cu oțet, pe frunte, față, mâni și pe tot corpul, dându-i să miroasă oțet tare, eter sau nitrit de amil. În cazurile grave se vor face injecțiuni cu cafeină și eter, *tracțiuni* (trageri) *ritmate ale limbii* și respirațiunea artificială. Se înțelege că vom începe cu desbrăcarea bolnavului, desfăcând toate legăturile (craută, guler, corset, încingătoare, jaretiere). La femei vom încerca și apăsarea deasupra ovarelor.

Șira spinării. — V. *Columna vertebrală*.

Siringă, tulumbă, tulumbiță. — Instrument cu care se injectează un lichid oarecare într-o cavitate, în țesături sau între țesături. Cele mai bune si-



Fig. 423
Siringă




Fig. 424 — Siringă
în alcool

ringi sunt cele de sticlă, cari se pot steriliza cu ușurință prin fierbere, sau afundate în alcool.

Siringomieli. — V. *Măduva spinării*.

Sirop (lat. *siropus*). — Este o preparațiune formată din zahăr alb și apă, *sirop simplu*, sau dintr'un medicament și un sirop simplu. Siropurile se întrebuintează foarte mult în medicină, cu scopul de a masca gustul neplăcut al unor medicamente. *Siropul simplu* se prepară astfel: se bate un albuș de ou în 6 litri de apă, se amestecă două părți din această apă cu un Kgr. de zahăr, se a-

daugă un litru de apă ordinară, se încălzește puțin câte puțin, amestecând din când în când: după ce s'a topit tot zahărul și lichidul a început să fiarbă, se adaugă restul din apa cu albușul de ou, se bate și se continuă fierberea până ce siropul este destul de gros. Siropurile de *cireșe*, de *coacăze*, *smeură*, *mure*, *portocale*, *lămâie*, *rodie*, *gutui*, etc., se prepară astfel: se tolesc 950 gr. zahăr alb în 500 gr. de zeamă de fructe, se fierbe amestecând până ce lichidul se îngroașe după cum vom, apoi se filtrează. Aceste siropuri sunt răcoritoare și luate cu apă, sau cu apă gazoasă, taie setea bolnavilor cari au căldură. *Siropurile medicinale* se prepară din siropul simplu la care se adaugă substanța medicamentoasă. Siropurile cu medicamente tari, cum sunt: siropul de *digitală*, de *opiu*, de *beladonă*, de *eter*, de *cloral*, etc., nu se liberează decât după ordonanța doctorului și în cantitățile prescrise de el. Toate celelalte siropuri se vând în farmacie după cerere.

Sisinei. — V. *Dediței*.

Sistolă (grec. *systellein*, a strânge). — Mișcarea de contracțiune, sau de strângere, a inimii (v. *Cord*).

Slăbănogie. — V. *Paralizie*.

Slăbiciune (lat. *debilitas*). — Lipsă de putere, o împușinare a forțelor generale: Slăbiciunea poate să provină dintr'o pierdere de sânge (emoragie), dintr'o hrană rea și neîndestulătoare. Sunt mulți oameni slabi din firea lor, deși sunt cât se poate de sănătoși. *Cura de îngrășat*, deși nu dă întotdeauna rezultatul dorit, este bună și nu prezintă nici o primejdie. Înainte de a începe o cură de îngrășare, trebuie căutată cauza slăbiciunii, dacă ea este dela natură, sau dacă este produsă de vreo boală și în acest caz trebuie tratată mai întâi acea boală. Astfel, dacă cineva mistue greu, fiind atins de o gastrită (inflamație de stomac), sau de o dispepsie, nu se va putea îngrașa orice i s'ar da, până ce stomacul lui nu va fi vindecat și nu va mistui bine; tot astfel va fi și cu un om atins de vreo boală de piept, sau de febră tifoidă, de cancer, etc., el va fi întotdeauna slab și slăbiciunea va merge crescând cât timp va dăinui boala; de geaba vom în-

cerca să-l îngrășăm că nu vom izbuti până ce nu va începe convalescența. Pentru a se îngrășa cineva trebuie să urmeze un regim alimentar desosebit, *să se hrănească mult și bine*, va mânca pâine multă și de calitate bună, unt și grăsimi, carne de tot felul și sub toate formele, în mâncări și fripturi, șuncă, paste alimentare (macaroane, tapioca, stelișoare, fidea, etc.), ciorbe grase, fasole, linte, mazăre, mai mult decât cartofi; zahăr și zaharicale, prăjituri, compoturi, dulceturi, cafea, ciocolată, câte puțin vin bun și vechiu, bere și ape gazoase. Afară de mâncare, ceea ce mai îngrășe pe om este *somnul* și repausul (odihna) în pat, prelungit; după o ședere în pat de 8—10 ore, este bine ca cel dintâiu dejun să se compună din ciocolată cu lapte, apoi după fiecare mâncare să stea liniștit pe o canapea; lăsând ca stomacul să-și facă slujbă în regulă, să facă exercițiu puțin, să umble mai mult cu trăsura, să nu-și obosească nici mintea, nici corpul. Ca medicamente se vor da preparatele arsenicale, fieruginoase și tonice: iarna untură de pește.

Slânicul din Moldova. — Stațiune balneară și climaterică la o depărtare de 18 Km. de orașul Târgu-Ocna, într-o înfundătură de munți acoperiți cu păduri întinse de brazi, stejar și paltini. Regiunea este foarte pitorească. Drumul la Slânic se face pela Târgu-Ocna, de unde omul merge cu trăsura pe o șosea frumoasă dealungul apei Slânicului. În tot drumul acesta călătorul are vederi minunate, iar priveliștea muntelui Piatra Corbului te înspăimântă, căci prin blocul stâncilor lui este săpat drumul spre Slânic. Această stațiune se află la o înălțime de 350 metri deasupra nivelului Mării Negre. Clima este dulce, plăcută și constantă, temperată, aerul curat, îmbalsămat de mirosul coniferelor și fără curenți simțitori; temperatura medie în timpul verii este de 15—18°, vântul care predomină este cel dela S. V. și este răcoritor. Valea este înconjurată de munți păduroși. La dreapta este muntele Cerbu, sau Sura și muntele Pufu, iar la stânga sunt o serie de munți cari se întâlnesc la cascada Slânicului, aproape de graniță. Slâ-

nicul are 17 izvoare, dintre cari mai importante sunt 7, cari iau naștere din muntele de pe malul drept al Slânicului, numit Piciorul Borvizului. No. 1 este bun pentru dispepsii, gastrite, ipercloridrii, diaree cronică, gută, artrism, diateză urică, cistite, uretrite, nisip în rinichi, în digestiunile lenșe, în lipsa de apetit. No. 3 sau *Regele Slânicului*, este special pentru boalele de stomac, intestine și ficat. No. 6 se recomandă în obezitate, atonie gastro-intestinală, congestiunea și mărirea ficatului, constipații rebele. No. 8 (fieruginos) este bun pentru anemie, cloroză, debilitate generală. Băile se fac cu apă din izvoarele No. 4, 5, 7; *băi calde și băi reci*; se recomandă în boalele nervoase, reumatice, surmenaj. Mai sunt *băi electrice*, instalație de aer comprimat. Sunt oteluri și numeroase vile, locuințe și restaurante bune; în sat deasemenea sunt locuințe și restaurante eftine. Imprejurimile admirabile. Sezonul începe la 1 Iunie și ține până la 15 Septembrie

Slânicul din Prahova — Stațiune balneară în județul Prahova, în comuna Prahova, ce se întinde pe amândouă părțile râului Slânic. Stațiune de cale ferată legată prin gara Ploești, la o depărtare de 45 Km. Stațiunea se află la o înălțime de 390 metri deasupra nivelului Mării Negre. Se fac băi de sare. Apele dela Slânic sunt salină, foarte bogate în clorur de sodiu. Izvoarele se găsesc în partea apusană a comunii, pe o colină unde sunt 2 guri mari, pline cu apă sărată concentrată, verde la culoare și foarte densă, așa că omul plutește deasupra apei; o gură se numește *Baia Baciului* și cealaltă *Baia Verde*; instalațiunile sunt primitive. Băile dela Slânicul din Prahova se recomandă în următoarele boale: anemie, boale de piele, boale de mitră, reumatism, scrofuloză. Se găsesc hoteluri și numeroase locuințe eftine. Sezonul începe la 1 Iulie și ține până la 15 August; farmacie, poștă, telegraf și telefon. Excursiunile din împrejurimi foarte plăcute: Fântâna rece, Gorganu, Vulpea, Piatra Verde, Salinele vechi și noi, Măciuca, Mănăstirea Crasna, Câmpina, etc.

Slănină. — V. *Cârnațarie și Grăsimi*.

Sleire nervoasă. — V. *Neurastenie*.
Slobonov, slobonov de câmp. — V. *Trepădătoare*.

Smântână. — Dacă lăsăm laptele să stea în voia lui, după câțva timp se adună pe deasupra lui o materie groasă, unsuroasă, alb-gălbuie, cu un gust plăcut, care se numește *smântână* și din care se prepară *untul*. Ea este foarte hrănitivă din cauză că pe lângă unt mai conține o substanță albuminoidă numită *cazeină*. Smântâna însă, ca toate substanțele grase, este cam grea la mistuit, din care pricină rar se întrebuințează singură; ea servă de obicei la dresul altor mâncări: ciorbă de pui dresă cu smântână, perișoare cu smântână, etc. cari toate sunt foarte gustoase.

Smântânică. — V. *Crețușcă*.

Smâre. — V. *Mlaștină*.

Smeu. — V. *lipitură*.

Smeură, azmură. — Fructele arbuscului *smeur*, numit și *mana jidovului*, *rug de munte*, *rug de smeură*, *rugul jidovului*, *smeurar* (*Rubus Idaeus*, fam. rozaceelor), care crește prin pădurile dela munte adeseori cultivat prin grădini pentru fructele lui, cari sunt bune și plăcute la mâncat. În medicină se întrebuințează fructul, adică *smeura* care lucrează ca *diuretic*, *laxativ* și *răcoritor* dându-se mai mult sub formă de *sirop*, după voie.

Smirna, benzoe. — Este un suc rezinos (ca rășina) ce se scurge prin tăieturile ce se fac în scoarța arborelui *Styrax Benzoin*, din fam. stiraceelor, care crește și se cultivă mai cu seamă în insulele Sumatra, Iava și Borneo. Sucul acesta, în atingere cu aerul, se întărește, are gust dulce și balsamic. Smirna arde răspândind un miros plăcut din care pricină se întrebuințează în ceremoniile religioase ale bisericii noastre. Principiul activ este un ulei volatil, *acidul benzoic*. Lucrează ca *excitant*. Pe *dinăuntru* sub formă de praf, 50 ctgr. până la 2 gr.; *tinctură* 2 până la 10 gr. Pe *dinafară* se dă în alifie contra durerăturilor și în plesniturele de pe sfârscul țâțelor. Se mai dă pentru oprirea sângelui, sub formă de *apă emostatică* (v. *Emostază*).

Smoc. — V. *Dioc*.

Smochină, hică. — Este fructul ar-

borelui *smochin* (*Ficus Carica*, fam. moraceelor). Smochinele se mănâncă proaspete, sau uscate; sunt bune și se mistue ușor. Din cauza zahărului și a materiei mucilaginoase, ele sunt îndulcitoare și emoliente. Taiate și fierte în apă, sau în lapte, ne dau un lichid viscos, care este bun pentru gargară în durerile de gât și ca băutură în tusă (în catar de piept). — La noi crește smochinul pe la Vârciorova și în Dobrogea, pe lângă Mangalia, unde Turcii și Armenii întrebuințează smochinele în contra gâlcilor și a tusei la copii, sub formă de cataplasme (smochine fierte în lapte) puse în jurul gâtului, iar ca intern beau laptele în care au fiert smochinele.

Smorodin. — V. *Struguri negri*.

Șnep. — V. *Sitar*.

Soare (lat. *sol*, grec *helios*). — Așezat în centrul sistemului nostru planetar soarele este izvorul de lumină și de căldură și prin urmare de viață pentru pământ. Soarele și lumina lui sunt cei mai puternici dezinfectanți, omorând microbii. Culturile de microbi se fac foarte greu dacă sunt expuse la lumină; la întuneric însă ele se dezvoltă foarte bine. S'a constatat că în apa unui lac acțiunea soarelui se simte până la trei metri de adâncime, iar în apa unui râu microbii se găsesc în număr mai mare pe la asfințitul soarelui. Lumina n'are putere omorătoare de microbi decât numai dacă lucrează deadreptul, atât în aer cât și în apă. Imbrăcămintea și rufăria se desinfectează foarte bine la soare, cu condiție ca fiecare obiect să fie întins așa ca să fie peste tot pătruns de lumină. Pentru convalescenți precum și pentru scrofuloși *cura de soare* este foarte bună (v. *Helioterapia*).

Soare sec, soarele în cap. — V. *Congestie* și *Insolație*.

Sobe. — V. *Încălzit*.

Sobrietate (lat. *sobrietas*, cumpătare în mâncare și băutură). — Igiena cere dela fiecare om cumpătare în toate, căci orice abuz devine stricător sănătății. Este foarte greu însă de a face o regulă generală în privința sobrietății, căci se poate întâmpla ca ceea ce pentru unul să fie *prea mult*, pentru un altul să nu fie *îndeajuns*, în ceea ce privește mâncarea și băuturile. Tre-

bunța de mâncare și de băut variază după felul de muncă al omului, după modul lui de a trăi, după obiceiuri, etc.; astfel fiind vom lua de călăuză apetitul și setea fiecăruia, cu condiție ca fiecare să-și satisfacă numai trebuințele naturale, fără să recurgă la mijloace artificiale pentru a-și crea alte trebuințe. Omul cumpătat va mânca și va bea numai atât cât îi trebuie pentru repararea pierderilor încercate în cursul zilei (v. *Alimente*, *Băuturi*, *Mese*), dacă voește să fie sănătos.

Soc, iboz (*Sambucus nigra*, fam. ca-

prifoliaceelor). — Arbust care crește prin păduri, mărăcinișuri, zăvoiuri și pe lângă gardurile de prin sate. În medicină se întrebuințează florile cunoscute sub numele de *flores sambuci*, care lucrează ca excitant și sudorific; boabele ca sudorific; Fig. 425 — Soc



coaja și rădăcina ca purgativ drastic. Se dă sub formă de ceai (infuziune), 5 la 1000; apa distilată, ca vehicul de potțiuni; extractul de fruct, 1—10 gr.; sucul de coaje, 30—150 gr.; oleiul, 8 gr. Pe *dinașară* ceaiul de flori, 20—50 la 1000, în spălături și sub formă de carpe înmuiate și aplicate pe pielea iritată sau inflamată (erizipel). — La țară florile de soc se strâng în luna Mai, se întind pe cergi, se usucă repede la soare și se păstrează în săculețe de pânză ferite de umezeală ca să nu se înegrească și mucezească. Cu floarea de soc se face un ceai bun de tusă îndulcit cu zahăr galben (candel). Din flori se face o apă pentru spălat pe obraz, apoi se mai fac perinute cari se înfierbântă și se pun calde la orbalț. Zeama de coajă, fiartă la un loc cu lapte dulce, se bea pentru tusă, iar măsă de pe lemn fiartă cu lapte se dă s'o bea copii cari au limbrici. Rădăcina și coaja bine pisate se storc și zeama se dau la bolnavii cu *rast*, câte trei cescuțe pe zi. Coaja verde se întrebuințează ca curățenie și pentru a face să verse (purgativ și vomitiv). Coaja verde de soc tânăr se jupuește,

se încălzește între două pietre calde și se pune la brâncă.

Socote. — V. *Atrepsie*.

Sodiu. — Combinațiuni cu oxigenul formează o bază, care, combinându-se cu acizi formează săruri, singurele cari se întrebuințează în medicină. Dintre acestea vom aminti: *Arseniatul de sodă* (v. *Arsenic*). *Azotatul de sodă* (v. *Nitrate*). *Benzoatul de sodă* (v. *Benzoate*). *Bicarbonatul de sodă* (v. *Bicarbonat de sodă*). *Carbonatul de sodă* care se întrebuințează sub formă de băi (v. *Băi alcaline*), 100 gr. pentru o baie. *Citratul de sodă*, care se dă în doză de 20—30 gr. la 120 gr. apă, ca purgativ. *Ipcoclorit de sodă* sau *lîcoarea lui Laborraque*, care este un dezinfectant. *Fosfatul de sodă*, care se dă ca reconstituant în doză de 1—5 gr. *Salicilatul de sodă* (v. *Salicilic Acid*). În fine, *sulfatul de sodă*, numit și *sarea lui Glauber*, care lucrează ca purgativ, în doză de 15—60 gr.

Șofran, *safran* (*Crocus sativus*), fam. irideelor). — Plantă mică erbacee, originară din Azia, care se cultivă mult în Franța și Spania (Septembrie—Octombrie). Șofranul se întrebuințează în bucătărie ca condiment, în industrie pentru vâpsit, iar în medicină ca excitant, stimulent general, stomachic, emenagog. Se dă sub formă de: praf 20 ctgr. până la 2 gr.; extract 10 ctgr. până la 1 gr.; sirop 20—60 gr.; tinctură 4—20 gr.; ceai 50 ctgr. pentru o ceașcă.

Șoimanele. — V. *Emiplegie*.

Solanum dulcamara. — V. *Lăsnicior*.

Solanum nigrum. — V. *Zărnă*.

Solanum tuberosum. — Caută la *Cartofi*.

Sold. — (lat. *coxa*, grec. *ischion*). — Se numește astfel partea corpului în dreptul căreia coapsa se leagă de trunchiu. Soldul este format de încheietura numită *coxo-femorală*, adică a osului *femur* cu *ligheanul* și care este îmbrăcată de mușchi groși pentru a o adăposti în contra loviturilor. Mulțumită acestei mari încheieturi, coapsa se îndoiște asupra trunchiului și omul poate umbla cu înleznire. Boalele soldului sunt de mai multe feluri. Astfel uneori mișcările sunt dureroase, se fac cu anevoință sau nu se pot face de loc, ceea ce poate să provină din mai

multe cauze : sau în urma unei lovituri tari, sau a unei căderi asupra soldului și în aceste cazuri avem a face cu o *contuzie* (lovitură), sau cu o *fractură* (ruptură), a părții de sus a *semurului* (osul coapsei), sau cu o *luxație* (scrintire) în care caz capătul osului a sărit din cuibul sau cavitătea sa. Când articulația este dureroasă, fără ca omul să se fi lovit, sau să fi căzut și când mai sunt și alte încheieturi dureroase ne vom gândi la *reumatismul articular*, mai ales când bolnavul are la început fierbințeală (febră). Se întâmplă uneori că mersul începe să devie încetul cu încetul mai greoiu și în timpul mersului piciorul să se strâmbe înăuntru sau în afară, fără căldură la început, atunci, mai ales fiind vorba de copii, trebuie să ne gândim la inflamația încheieturii cunoscută sub numele de *coxalgie*. Și într'un caz și în altul trebuie chemat doctorul ; să nu așteptăm să se închească și să se mărească boala, căci pe urmă va fi prea târziu, mai ales că încheietura soldului este una din cele mai importante atât prin mărimea ei, cât și prin rolul ce-l are la mers.

Soldat, militar ; viața militară ; armată. — Din studiul statisticelor militare rezultă că în armată mortalitatea este mai mare decât în viața civilă, *între oamenii de aceeași etate*. Apoi s'a mai constatat că mortalitatea este mai mare în anul întâi de serviciu decât în ceilalți ani ; că ea este mai mare la soldați decât la subofițeri și mai mare la aceștia decât la ofițeri. Cauzele cari fac mortalitatea mai mare în armată sunt mai multe : mai întâiu avem *vârsta tânără* a soldatului, care îl predispune mai mult la unele boale contagioase și epidemice, cum sunt : febrele eruptive (pojarul, vărsatul, scarlatina), febra tifoidă, tifosul, holera, etc. ; — în al doilea rând vine *viața în comun*, care ajută întinderea și împrăștierea acestor boale, care de multe ori iau un caracter foarte grav, după cum de altfel se întâmplă în tot locul unde este *îngrămădire* prea mare de oameni. — În al treilea rând vine *schimbarea de loc*, înstrăinarea și despărțirea repede de familie și de viața obișnuită, *schimbarea de hrană*, care, ori cum ar fi de bună, pentru moment

nu corespunde gustului și nu convine stomacului, nu atât în ceea ce privește calitatea cât cantitatea. — În al patrulea rând vine *exercițiul și intemperțiile* la cari este expus soldatul, *uniforma, echipamentul și armamentul*, cu cari trebuie să se obișnuiască. — În fine diferite *obiceiuri rele*, vicioase, excese de *băuturi alcoolice* și de *tutun* la cari soldații se dedau, imitându-se unii pe alții. Soldatul trebuie să ducă o *viață cumpătată*, care singură este în stare să-i păstreze puterea și sănătatea ; apoi să se ferească de orice *excese* și mai ales de patima beției ; să caute ca puținul ce are să-l întrebuințeze întru ameliorarea traiului, îmbunătățindu-și hrana ; să caute să-i păstreze cât se poate de bine îmbrăcămintea, ca ea să fie în bună stare și să-l apere de frig ; să se spele des, să se țină curat, făcând adeseori băi.

Solovârc, solovârș, sovârv. — V. *Sovârv*.

Solulol. — Acid timinic pur. Pulbere aproape albă, fără miros, solubilă în apă. Eliminator normal și fiziologic al acidului uric. Se dă în toate manifestățiunile diatezei urice : colici de rinichi, gravelă, reumatism diformant, obezitate, diabet, boale de piele. Doză : 25 ctgr. de 3 ori pe zi (în tablete de câte 25 ctgr.), adică 75 ctgr., putând merge în cazurile grave până la 1 gram și jumătate.

Soluție (lat. *solutio*). — Se numește *soluție* combinația unui lichid cu un solid, în care acesta ia forma lichidă.

Somatoză. — Praf galben, puțin granulos solubil în apă, fără miros, gust puțin apreciabil. Cuprinde albumoză 28 la 100, și peptonă 2.4 la 100. Se întrebuințează în anemie, turburările gastro-intestinale, dispepsie. Doză : 10 — 15 gr. pe zi, iar pentru copii 3—6 gr. ; în lapte, bulion, etc.

Somn (lat. *somnus*, grec. *hypnos*). — Omul are mare trebuință de somn pentru a-și odihni corpul. În timpul somnului încetează slujba organelor cari ne pun în raport cu lumea exterioară ; creierul nu mai funcționează. În schimb însă toate funcțiunile cari au de scop întreținerea corpului, cum sunt : respirația, circulația sângelui și asimilația alimentelor, continuă a se îndeplini cu deosebită regularitate.

Din acestea se vede că corpul nostru în timpul somnului nu mai cheltuiește nimic, ci numai câștigă. Timpul cel mai potrivit pentru somn este *noaptea*. Omul *adult* trebuie să se culce între 10 și 12 ore, așa ca întotdeauna miezul nopții să-l găsească adormit. Culcându-te mai târziu n'ai timpul îndestulător pentru somn. Culcarea înainte de 10 nu-i bună, căci nu s'a făcut încă mistuirea mâncării de seară, ceea ce ți-ar produce somn neliniștit și visuri rele. Regula este ca dela mâncare până la culcare să treacă trei ceasuri.



Fig. 426

Sus: poziție rea pentru dormit; inima, plămânii, stomacul, sunt înghesuite. Picioarele amorțesc din cauza circulației rele.

Jos: poziție bună; organismul se destinde, plămânii primesc aer destul, inima bate nestingherită, stomacul nu-l apăsă.

Copiii trebuie să se culce mai de vreme, în totdeauna la 9 ore să fie în pat și dacă se poate chiar și la 8 ceasuri și jumătate, căci la ei mistuirea se face cu înleznire și în timpul somnului; ei trebuie însă să fie culcați cu o regularitate foarte mare, în totdeauna la același ceas. Copilul trebuie culcat cel mic în *leagăn*, cel mare în pătucul său, nici odată cu mama. — Omul adult trebuie să doarmă în termen mijlociu 7 ore bărbatul și 8 ore femeia, copiii însă au trebuință de 8 până la 10 ceasuri de somn, după etate. Oamenii învățați, cari lucrează mai mult cu mintea, au trebuință mai puțină de somn decât lucrătorii câmpului și meseriași; de asemenea și oamenii grași trebuie să doarmă mai puțin decât cei slabi. *Ceasul scularii* atârână de cel al culcării. Timpul cel mai potrivit de sculat este vara la ora 6 și iarna la ora 7, socotindu-se bine înțeles că ai dormit 7—8 ceasuri. — Se întâmplă uneori că omul și-a pierdut somnul,

nu poate dormi, are *insomnie*. Această insomnie, foarte supărătoare, provine din mai multe cauze. Singur medicul va determina cauza și-i va prescrie leacul.

Somnal, *etilcloraleuretanic*. — Ipnotic care nu este mai bun decât cloralul. Se dă în doză de 2—5 gr. în poțiune aromatizată.

Somnambulism. — V. *Somn*.

Somnifer (lat. *somnus*, somn, și *ferre*, a purta, a duce). — Medicament care produce somn. Intre medicamentele somnifere avem: opiul, cloralul, sulfonalul, veronalul, trionalul, etc.

Somnișor. — V. *Mac*.

Somnoform. — Anestezic, care se întrebuințează în inhalațiuni. Se compune din: clorur de etil 60 gr., clorur de metil 35 gr., bromur de etil 5 grame.

Sonda și sonde. — Introducerea unei sonde într-o cavitate *naturală* (nas, esofag, trompa lui Eustațiu, conducte lacrimale, uretră) sau *accidentală* (plagă, fistulă) se numește *sonda*. Sonda este un tub cilindric făcut din metal, din cauciuc sau gumă. Sunt două feluri de sonde: unele pentru cavitățile naturale și altele pentru cele accidentale. *Sondele pentru cavitățile naturale* sunt niște tuburi cilindrice deschise la un capăt, iar la celalt se termină sau printr'un fund de sac sau cioc cu o deschizătură sau două pe părțile laterale (ochiuri), sau numai printr'o




Fig. 427 — Sonde

simplă deschizătură, însă mai mică decât cea din capătul celalt. *Sondele uretrale* ordinare servesc la deșertarea udului din beșică. Ele sunt de metal, cauciuc sau gumă. Cele de metal au o curbură specială, iar celor moi li se dă o curbură introducând în interiorul lor o sârmă (mandrin), dar de obicei

ele se întrebuințează fără mandrin. Calibrul lor variază după diametrul canalului prin care trebue să intre. La bărbați se întrebuințează sondele în cazurile de stricturi, sau strâmtoari ale canalului udului (uretrei), de ipertrofie a prostatei, iar la ambele sexe când s'a oprit udul (retențiune urinară). *Sondele cu dublu curent* își au canalul împărțit în două printr'un părete longitudinal formând două conducte paralele așa că lichidul să poată intra prin unul și să iasă prin celalt. Sondele trebuesc ținute în stare *aseptică*. *Sonda lui Anel* este un tub fin destinat pentru a sonda conductele lacrimale. *Sonda lui Belloc* este destinată pentru a tampona deschizăturile dinapoi ale nasului, pentru a opri curgerea de sânge. *Sonda esofagiană* este flexibilă, cu un diametru de un centimetru; ea se introduce prin gură, alteori prin nări, până în stomac; servește la hrănirea cu forța a nebulilor și bolnavilor cari nu vreau să se hrănească. *Sondele pentru cavitățile accidentale*. Aci avem *sonda canelată* care este din metal, având un șanț (șghiab) adânc pe una din fețele ei; ea călăuzește bisturiul în unele operațiuni.

Șopârlaiță, șopârlaița cea rea, șopârlaghiță. — V. *Diŋteric*.

Soporific (lat. *sopor*, somn și *facere*, a face). — V. *Narcotice*.

Șoricioaică. — V. *Arsenic*.

Soroc. — V. *Menstruație*.

Sorocină. — V. *Coadă șoricelului*.

Sos. — Sunt multe feluri de sosuri, însă puține, bune pentru stomac și am putea zice că cele mai simple sunt mai sănătoase. Intre acestea avem sucule de carne friptă, simplă sau cu puțin unt proaspăt, care este cel mai bun sos; apoi vine sosul gătit cu unt de prima calitate. Nu tot astfel sunt sosurile făcute cu unt de lemn și cu oțet, cari irită stomacul, fac răgăituri neplăcute, provoacă boale de piele etc.

Șoșoni. — V. la *Încălțăminte*.

Sovârv, arigan, dost, milot, solovârc, solovârș, solovârv, sovârc, sovârș, sovovârv (*Origanum vulgare*, fam. labiate-lor). — Plantă erbacee aromatică ce crește prin livezi, tufișuri, locuri uscate, vii, pe lângă păduri și prin lo-

curi pietroase până în regiunea sub-alpină (Iunie—August). Această plantă se întrebuințează foarte mult de poporul nostru la colorat. În medicină se întrebuințează vârfurile înflorite ca excitant sub formă de decoct (fier-tură) din 20 gr. la 1000. — La țară cu sovârvul amestecat cu cimbrușor de câmp și cu smicele de mărar dulce se vindecă *celperitul* (sifilisul), bând decoctul făcut din acestea și făcând băi; credință deșartă și primejdioasă, căci bolnavii de această cumplită boală își pierd timpul și-și agravează boala în loc să meargă la doctor, sau în spitale, unde își pot găsi leacul repede și sigur. Pentru durere de gură și miros greu se spală în gură cu ceaiu de floare de sovârv; iar pentru fierbințeală la picioare se pisează frunză de sovârv verde și se fac oblojeli. Pentru *strânsul cel mare* (v. *Strâns*) se fac scăldători de sovârv cu floare cu tot și cu scuturătură de fân.

Sovata. — Este una dintre cele mai frumoase stațiuni balnearo-climaterice din Ardeal. Așezată între munți înalți, ea însăși fiind la o altitudine de 560 m. Sovata este păzită de vânturi și curenți. Are aer curat și răcoros și isvoare neîntrecute prin puterea lor binefăcătoare. Sovata nu este interesantă numai din punct de vedere balnear, ci și geologic. Nicăiri nu vedem într'un loc atât de restrâns ca aci forța uriașă distructivă și constructivă a naturii. Apa topind în cursul anilor blocuri și masive de sare, terenul se surpă, ca în locul acela să se formeze lacuri sărate, sau să le sece pe cele existente. Intreg teritoriul văii e străbătut de vine de apă, cari în vreme caldă seacă, lăsând în albia lor scoarță de sare, ce seamănă cu ghiața. În timpul Romanilor în Sovata erau saline. Se zice că, în locul unei astfel de saline surpată, s'a format *lacul negru*, cu 6426 m² suprafață, 7 m. adâncime și 520 m altitudine. Lacul cel mai important este *lacul urșilor*, ale cărui ape sunt calde și care își capătă căldura dela Soare. În lacuri și în stabilimentul balnear se fac băi reci și calde. Apa lacurilor conține; clorur de sodiu, de potasiu și de litu, bicarbonat de magneziu,

calciu, fier și mangan și acid salicilic. Băile Sovata sunt indicate în: gută, reumatism, sciatică, boli de femei, rachitism. Este o localitate minunată de frumoasă, în cât își poate oricine găsi o bună recreație și confort întru toate mulțumitor. (După D-rii Câmpeanu—Țeposu).

Soveja. — Stațiune climaterică în munții Vrancei din județul Putna, situată în fundul văii Sușița, în satul cu același nume, la o înălțime de 540 metri deasupra nivelului Mării Negre. Localitatea este muntoasă, ocolită de munții: Țina Spână (alt. 1069 m.), Fața Schitului, Sboina neagră și Sboina verde, la poalele căruia este stațiunea climaterică Soveja; are păduri seculare de brazi. Clima este constantă; aerul curat, ozonizat și îmbalsamat de mirosul pădurilor de brazi; nu sunt curenți de aer; bradul se scoboară din vârful munților până în sat. Apă minunată. Soveja este o localitate de vilegiatură foarte plăcută. Populația ei este viguroasă, robustă, cu port mocănesc; locuințele de lemn, încăpătoare, curate. Pădurile de brad de pe munții Sovejei sunt alcătuite mai mult din molift. Stațiunea cea mai aproape de cale ferată este Panciu, de unde se merge cu trăsura pe o șosea bună. Regiunea pitorească. Sezonul începe la 1 Iulie și ține până la 15 August. Imprejurimi superbe.

Spălare, abluțiune. — Legile igienei și ale curățeniei cer ca omul să-și spele cu apă, cel puțin odată pe zi, fața gâtul și mâinile. Ori de câteori o facem aceasta se chiamă că am făcut o *abluțiune*, prin care se mai înțelege și spălarea corpului întreg. La Evrei și Turci abluțiunile constituie o practică religioasă, care are aproape aceeași importanță în cultul lor ca și rugăciunea.

Abluțiunile parțiale constau în spălarea feței și a mânilor, cel puțin odată pe zi. Spălarea mânilor are o importanță deosebită din pricină că ele vin adeseori în atingere cu membrane delicate, cași căpătușesc interiorul nasului, a ochilor, a gurii și mai cu seamă că ele duc mâncarea la gură. Afară de aceasta cu mâinile atingem, mai în fiecare minut, lucruri murdare și stricătioase

sănătății. Din această cauză este bine ca să nu ne mulțumim numai cu spălarea de dimineață a mânilor, ci să le spălăm de mai multe ori pe zi, mai cu seamă *înainte de fiecare mâncare*. Trebuie să ne servim de apă rece, atât vara cât și iarna, prin aceasta se obișnuiește fața și mâinile să fie nepăsătoare la acțiunea aerului exterior și să scape de degerăturile și crăpăturile produse de frig. Fiindcă spălarea cu apă rece ne impresionează iarna în mod neplăcut, mai ales la început, este bine ca îndată după spălare să ne ștergem cu un șervet de până mai aspră, după care simțim un fel de căldură plăcută. Nu trebuie să uităm însă că dacă spălăturile cu apă rece sunt bune pentru adulții sănătoși, nu tot așa sunt și la copii și bătrâni. La copii se vor face spălăturile, atât cele parțiale cât și cele generale, cu apă caldută, cât de des repetate până la 4 sau 5 ani, având în vedere că ei, până la vârsta aceasta, sunt foarte simțitori la frig. Tot astfel este pentru bătrâni, pentru bolnavi și convalescenți. Pentru spălăturile parțiale este bine să întrebuițăm *săpun*, care curăță pielea de grăsimea ei și care ar rămânea pe loc, spălându-ne numai cu apă curată. *Abluțiunile generale* se deosebesc de dușurile reci prin faptul că apa curge lin dealungul corpului, în loc de a-l izbi cu putere și prin urmare ele sunt mai puțin excitante (ațățătoare și se potrivesc mai bine la cei cu temperament prea slab, sau prea nervos, cari n'ar putea suporta dușurile. Intrebuițarea săpunului și a apei calde în abluțiunile generale n'are nici un înțeles, căci ele nu se fac pentru curățenia corpului, ci numai pentru acțiunea frigului, care mărește activitatea funcționării pielei întărind astfel sănătatea și depărtând pricinile unui mare număr de boale. Abluțiunile generale sunt de mare folos la copii și la adolescenți, a căror dezvoltare este lăncedă și sunt expuși la cloroanemie mai cu seamă cei cu temperament limfatic; ele dau organelor o vitalitate mai mare și preîntâmpină boale grave, cum sunt scrofulele și oftica.

Spălare. — V. *Loțiune*.

Spălarea corpului. — V. Piele.

Spălarea stomacului. — Sunt unele boale de stomac, cum este *dilatația*, sau *lărgirea stomacului*, precum și unele *otrăviri*, în cari cel mai bun tratament este spălarea. Pentru a face această spălare avem trebuință de un aparat, cunoscut sub numele lui *Faucher*, sau al lui *Debove*, compus dintr'un tub de cauciuc lung de 1 metru și jumătate și larg de 8—10 milimetri diametru, având un *semm* la 40 de cm. dela capătul lui cel de jos și care capăt are în partea



Fig. 428 — Spălături stomacale

laterală o deschizătură de o jumătate de centimetru de lungime, pe un centimetru de lărgime, destinată să înlocuiască deschizătura dela capăt când se astupă. La capătul de sus al tubului se află o pâlnie de sticlă. Acest aparat simplu se întrebuințează astfel: bolnavul, după ce a înmuiat capătul de jos al tubului în lapte, sau în unt de lemn, pentru a-i înlezni alunecarea, așează acest capăt pe limbă, apoi împingându-l încet îl înghite puțin câte puțin prin mișcări de înghițire, până în minutul în care *semmul* tubului a ajuns la buze, ceea ce arată că tubul se află introdus pe o lungime de 40 cm. și capătul lui este deja în stomac. Atunci se umple pâlnia cu apă de Vichy, de Vals sau cu orice alt lichid dat de doctor și pe când pâlnia este aproape de a se goli se lasă repede în jos pentru a constitui un fel de sifon și a aduce în afară lichidul care a spălat stomacul și care lichid este primit într'un lighian. Am spus că spălarea stomacului se face de obicei în *dilatația stomacului*. Deșertarea materiilor solide, lichide și gazoase, îngrămădite în stomac și cari îl lărgesc în mod mecanic, provocând între altele fermentațiuni putride, are rezultate cu atât mai bune cu cât apa

întrebuințată modifică vitalitatea păreților stomacului și nimicește la trebuință aciditatea prea mare a sucurilor gastrice. În *otrăviri* spălarea stomacului are de scop să subțieze și să deșerte otrava. Spălarea stomacului nu trebuie făcută în boalele de stomac cari sângerează, cum este *ulcerul* și *cancerul*; de altfel ea se va face numai după porunca doctorului.

Spânac, *spînat* (*Spinacea oleracea*, fam. chenopodiaceelor). — Plantă erbacee, originară din Asia, care se cultivă foarte mult pentru trebuințele culinare. Aliment răcoritor și laxativ, bun pentru cei ce suferă de constipație.

Fig. 429
Spanac

Spânj. — V. *Rușcuță primăvăratică*.

Spânzurare (lat. *suspensio*, *suspendium*), *suspensare*. — Moarte produsă printr'o legătură, sau frânghie, aplicată în jurul gâtului și strânsă prin greutatea corpului, așa în cât să întrerupă circulația sângelui și intrarea aerului în plămâni. Semnele spânzurării variază după cum omul a murit mai întâiu de congestiune cerebrală (îngrămădire de sânge la creier), sau prin *asfixie* (vezi acest cuvânt), după modul de aplicare al legăturii. Se poate întâmpla ca moartea să fie foarte repede, aproape subită, produsă prin alungirea măduvii. Fața este umflată și ochii bulbucați numai în cazurile când sângele a fost reținut în măsură mare în părțile superioare. În cazurile de asfixie se constată semnele ordinare din partea plămânilor; rar se văd echimoze subcutanate, nu se văd echimoze subpericardice, sau subpleurale. Limba poate fi eșită afară din gură prin strângerea legăturii și tiachea să cuprindă puțină spumă. În jurul gâtului se observă șanțul produs de legătură, care nu se prelungește pe partea dinapoi a gâtului și care este de culoare violetă, cu marginile roșietice, iar în țesutul celular de sub piele se află sânge extravazat, sau coagulat. Moartea prin spânzurătoare poate să se producă și când picioarele nu atârnă în aer. — Când cineva vede un spânzurat cel dintâiu lucru ce

trebuie să facă este să-i taie legătura, susținându-i corpul pe cât îi este cu putință, apoi să-i desfacă hainele, să le deschidă ca să nu-l strângă și să nu-i împiedece respirațiunea și circulația sângelui, să-l întindă pe un pat sau pe o saltea, într'un loc aerat. Dacă fața este roșie, vânătă, umflată, dacă vinele gâtului sunt îngroșate, albastrii, pline de sânge, se vor aplica lipitori înapoia urechilor, se va pune ghiață la cap, muștare la pulpe și la picioare, întocmai după cum se face la orice congestie cerebrală. Când fața este palidă, decolorată, când corpul este rece și bătăile inimii și ale pulsului abia se simt, când respirația este înceată și greoaie, se va stropi fața cu apă rece, se vor face fricțiuni cu oțet și cu eter pe tâmpile, pe piept și în dreptul inimii, se va da spânzuratului să respire eter, dându-i, dacă se poate, să înghită și câteva picături din el, iar prin gură i se va sufla aer (vezi *Asfixie*).

Sparadrap. — V. *Diachilon*.

Sparangă. — V. *Sparanghel*.

Sparanghel *spargă*, *sparangă*, *sparangin*, *spergea*, *umbra cucului*, *umbra iepurelui* (*Asparagus officinalis*, fam. liliaceelor). — Plantă erbacee care crește prin păduri, fânețe, livezi, tufișuri și pe coline aride; se cultivă adeseori prin grădini pentru a se mânca. Ramurile tinere aeriene sunt bune de mâncare și constituie o hrană ușoară, plăcută și sănătoasă. Sparanghelul are în țesăturile lui o substanță numită *asparagină*, care face ca această plantă să aibă proprietăți medicinale: aperitivă amară, *diuretică* (face să fie ud mult), pentru care se întrebuințează în *idropizie* și *icter* sau gălbănare (vezi aceste cuvinte) și în diferitele boale de inimă, când ajung la *dropică*. Asparagina se dă în doză de 60 ctgr. pe zi; sirop 30—50 gr.; infuzie (ceaiu) din 20 gr. sparanghel la 1000 apă.

Sparangin. — V. *Sparanghel*.

Spargă. — V. *Sparanghel*.

Sparteînă. — Alcaloid volatil, extras din *Genista scoparia* fam. leguminoaselor. Se întrebuințează *sulfatul de sparteînă*, care este *toxic*; el lucrează ca dinamic și regulator al bătăilor inimii, în doză de 10—20 ctgr. în

injecțiuni sub piele; la copii 1 ctgr. de fiecare an.

Spasme. — V. *Convulsiiuni*.

Spasul dracului. — V. *Ferigă*.

Spată. — V. *Omoplat*.

Spata dracului. — V. *Ferigă*.

Spatulă (lat. *spathula*). — Este o lamă de metal, de lemn, de sticlă, de corn, cu care se amestecă și se întind diferitele alifii și plastore, în farmacie.

Spazme. — V. *Convulsiiuni*.

Specialist și specialitate. — Se numește medic specialist acela care se ocupă numai cu o ramură a medicinei, precum și farmacistul care prepară numai unele medicamente (leacuri). Această *specializare* este bună, căci medicina, fiind o știință foarte întinsă, este greu pentru un om ca s'o studieze pe toată în toate amănuntele ei și fără specialități nu s'ar fi făcut nici un progres. Limitându-se câmpul de lucru s'au putut face acele descoperiri cari au nimit lumea și au adus atâta folos omenirii. Fără specialitate n'ar fi răsărit *bacteriologia* (știința microbilor), care a revoluționat lumea și dela care se mai așteaptă, cu drept cuvânt, încă multe minuni. Afară de bacteriologi astăzi avem specialiști în boale de ochi, de urechi, de nas, de laringe, de boale de piele, alienație mentală, ginecologie, de faceri, etc. E bine ca un bolnav să recurgă totdeauna la ajutorul unui specialist, astfel va fi îngrijit foarte bine.

Specialități farmaceutice. — Se numesc astfel medicamentele cărora fabricantul le-a dat numele său, ori un alt nume și pentru care se face o reclamă deosebită. Unele din aceste specialități sunt bune; cele mai multe însă nu trebuie luate în seamă, mai ales acele zise remedii secrete, vândute fără ordonanță medicală și cari, sub nume provocante, înșeală lumea, nevând nici o însușire vindecătoare.

Specific (lt. *specificus* dela *species*, specie, fel, soiu, calitate, și *facere*, a face). — *Medicament specific* se numește acela care face să dispară un simptom special al unei boale, sau să se vindece chiar boala; de exemplu: chinina este specificul frigurilor palustre, mercurul specificul sifilisului, etc.

Specul (dela lat. *speculum*, care în-

semnează oglindă). — Speculul este un instrument destinat să lumineze cavitățile naturale, pentru a putea fi examinate; astfel sunt: speculul de *urechi*, speculul de *nas*, speculul *vaginal*, pentru examinarea mitrei, speculul de *șezut*, etc.

Spergea. — V. *Sparanghel*.

Speribană. — V. *Obligeană*.

Speribană tărcată. — V. *Obligeană*.

Sperlă. — V. *Funinginc*.

Spermatooree (grec *sperma*, sămânță, materie prin care se zămislesc vițuitoarele și *rhein*, a curge), *pierdere de sămânță*, *pierdere seminală*. — Se numește astfel darea afară involuntară a spermei. Cauzele spermatooreei sunt mai multe: excesele veneriene, onanismul, prostatita, blenoragia, constipația, trănzii, oxiurii (viermușiori din șezut), îngrămădirea de murdărie în jurul măciulei membrului, unele boale ale șirii spinării; cetirea și spectacolele excitante. Spermatoorea se produce la început numai noaptea, mai ales când omul doarme culcat pe spate și se însoțește de erecție și senzațiuni plăcute (voluptoase); mai târziu, când pierderile de sămânță se fac mai des senzațiunile acestea se slăbesc și pier, precum și erecțiunile membrului; atunci pierderile seminale încep a se face și în timpul zilei. *Sperma* care curge este un lichid alb cenușiu, gros și scrobește rufăria; uneori acest lichid poate să nu fie spermă, ci numai un lichid dela prostată, care este albui, unsuros și nu scrobește rufe. Spermatoarea produce un fel de moleșală și oboseală foarte mare, nepuțință de a munci, bătăi de inimă, durere de cap, amețelă; omul își schimbă firea, devine neliniștit de starea în care se găsește, ochii i-se înfundă în cap și slăbește văzând cu ochii. Această boală se vindecă cu atât mai greu cu cât se învechește. Starea generală derivă, în mare parte, din *neurastenie* (vezi acest cuvânt). — *Tratament*. Mai întâiu vom căuta să depărtăm cauza boalei: abținere sexuală mai mult sau mai puțin completă, evitarea spectacolelor și a cetirii scrierilor excitante; bolnavul să nu se acopere noaptea prea mult, să nu doarmă pe spate; să fie cumpătat la mâncare, să nu bea băuturi alcoo-

lice, vin, cafea, ceai; să facă afuziuni reci dimineața, iar seara spălături reci la șezut și hidroterapie.

Spetează, spetează pestriță. — V. *Obligeană*.

Sphacelia segetum. — V. *Săcară cornulă*.

Spichinat. — V. *Leventică*.

Spin muscăleșe. — V. *Holeră*.

Spin-bifida, idrorachis. — Vițiu de conformațiune, care constă într'o deschizătură în partea dinapoi a șirii spinării, prin care iese o parte din măduvă și din învelișele ei, formând o tumoră (umflătură) rotundă, moale în parte reductibilă. Spina bifidă se observă de obicei la partea mijlocie sau partea de jos a șirii.

Spina-ventosa. — Este o varietate de osteită tuberculoasă, care se arată mai cu seamă la degete. Boala începe prin durere și umflătura osului bolnav; părțile osului se subțiază și în cele din urmă se sparge dând naștere la fistule.

Spinare. — V. *Columna vertebrală*.

Spinat (*Spinacea oleracea*). — V. *Spanac*.

Spinul cerbului. — V. *Nerprun*.

Spiraca ulmaria. — V. *Crețușcă*.

Spirobacterii. — V. *Microbii*.

Spirit. — V. *Alcool*.

Spirit de țiperig. — Sinonim cu amoniac ordinar din comerț (v. *Amoniac*).

Spirit volatil. — Sinonim cu carbonat de amoniac (v. *Amoniac*).

Spirtoase (Băuturi). — V. *Alcoolice*.

Spital (lat. *hospitale*, loc primitiv în gazdă) și **ospiciu** sau *hospiciu* dela lat. *hospes*, oaspe). — Spitalele și ospiciile erau la început niște stabilimente cari primeau oaspeții călători, iar mai târziu au început să primească bolnavii cari se pot vindeca (spitale) sau cei cari nu se pot vindeca, incurabili, sau bătrânii, copiii asistați (ospicii). Un spital trebuie să fie bine construit, să aibă aer, lumină și soare îndejuns; să nu fie cu etaje, ci în pavilioane depărtate unele de altele, ventilatoare cât se poate de practice făcând o ventilațiune permanentă, paturile să fie astfel așezate față de ferestre și ventilatoare încât să nu fie în curenți de aer. Fiecare spital trebuie să aibă pavilioane separate pentru boalele molipsitoare, sau

pentru cei ce sunt într'o excitațiune nervoasă, pentru răniți, pentru operați, pentru convalescenți. Păreții, tavanele și podelele să fie astfel făcute încât să se poată spăla ușor și cât se poate de des, colțurile și liniile de unire ale zidurilor să fie rotunjite pentru a împiedeca depozitele de microbi. Spitalele trebuie să aibă apă în abundență și apă de calitate bună; să aibă *latrine* sistematice și un bun sistem de încălzit (calorifere în spitalele mari).

Splanchnic (grec. *spiagchnon*, viscer). — Se numesc nervi splanchnici nervii și vasele cari se duc la viscere (măruntaie).

Splanchnologie. — Este acea parte a anatomiei care descrie viscerele (măruntaiele).

Splenic (grec. *splen*, splină). — Vasele și nervii cari se duc la splină se numesc *splenic*.

Splină (lat. *lien*, grec. *splen*. — Splina este o glandă vasculară sangvină, de consistență moale, spongioasă, de culoare roșie violetă, întotdeauna plină cu sânge. Ea este așezată în pânțece, în partea stângă, sub partea stângă a diafragmului (v. *Abdomen*); forma ei este alungită, turtită în sens transversal, cu diametrul antero-posterior de 8 cm. cu diametrul transvers (grosimea) de 5 cm.; greutatea sa este cam de 200 gr. Rolul splinii încă nu este bine determinat; se crede că ar fi o uzină în care se fabrică și se reînnoește sângele (glandă ema topoetică). La oamenii cari sufăr mult timp de friguri splina crește, se mărește ajungând uneori la mărimea unui cap de om mare și producând bolnavului multă greutate. Ea întreține în aceste cazuri o stare de anemie generală foarte înaintată. Splina se mai mărește și în sifilis, în cancer, în boalele cronice de inimă, în *leucocitemie* (vezi acest cuvânt), etc.

Splină mare. — V. *Berberină* și *Paludism*.

Spongie, burete. — Se întrebuințează pentru toaletă și alte trebuințe casnice. În medicină nu se mai întrebuințează fiindcă nu se pot ține sterilizate, de aceea în pansamentul rănilor s'au înlocuit cu vată. *Spongia prepa-*

rată, sau *presată*, servește pentru lărgirea gâtului mitrei, dar înainte de a o întrebuința trebuie dezinfectată într'o soluție de ipermanganat de potasă (4 la 600) și într'o soluție de acid sulfuros, după care se spală cu multă apă

Sporadice (Boale). — Boale sporadice se numesc acelea cari se răspândesc ca sămânța (grec. *sporos*), ici și colo, fără legătură etiologică comună, deosebindu-se prin aceasta de boalele endemice și epidemice.

Sporic, *sporici*, *spornic*, *sporiși*. — V. *Verbină*.

Sprânceană. — V. *Ochiu*.

Spulberătură. — V. *Dumbăț*.

Spure, spureăciune. — V. *Eczemă*.

Spută. — V. *Scuipare*.

Spuzeală. — V. *Erpes*.

Stafide. — V. *Struguri*.

Stafilococi. — V. *Microbi*.

Stafilom. — V. *Ochiu*.

Stafilorafie (dela grec. *staphyle*, omușor, și *raphe*, cusătură). — Cusătura cerului gurii (vălului palatin) când este despicat din naștere sau în mod accidental.

Stângeni, stângeniță. — V. *Stânjini*.

Stângerea vocii. — Cel mai mare grad al răgușelii (v. *Răgușeală* și *Voce*).

Stânjini, crini, crin vânt: floare vântată, liliie vântată, stânjinei, (*Iris florentina*, fam. iridaceelor). — Plantă erbacee care crește, în Italia și în Orient. Se cultivă mult prin grădini pentru florile sale frumoase. Se întrebuințează rădăcina. În stare proaspătă este vomitivă. Mirosul ei este ca de vioarele pentru care se întrebuințează la parfumarea rufăriei și la prepararea pudrei de orez și a altor pudre.

Stațiuni. — Stațiunile *balneare* și *climaterice* au mare importanță din punct de vedere igienic și medical. *Stațiunile balneare* stabilite la izvoarele de ape minerale naturale se numesc *termale*, fiindcă apa iese caldă din pământ. La noi în țară avem multe ape termale. Natura apelor și prin urmare a boalelor cari pot fi tratate în aceste stațiuni sunt arătate la fiecare stațiune, iar generalitățile sunt arătate în articolul: *Ape minerale*. *Stațiunile climaterice* sunt de două feluri; de *vară* și de *iarnă*. *Stațiunile de vară*, numite și *stațiuni de altitudine*, cari sunt foarte bune pentru a scăpa de căldurile înă-

bușitoare ale verii pentru toată lumea și mai ales sunt bune pentru ceice suferă de anemie, cari au constituție slabă, pentru convalescenți, pentru cei slabi de piept. Ele sunt bune prin aerul lor temperat, curat, tonic, puțin mai rar (v. *Aer rarefiat*). *Stațiunile de iarnă* au climatul dulce pentru ca bolnavii să poată sta și trăi în aer liber. Ca *stațiuni maritime* avem Constanța, Techirghiol, Mamaia și Mangalia, așa de bune, prin aerul lor și apa de mare în tratamentul multor boale.

Statură (lat. *statura*). — Prin cuvântul *statură* se înțelege lungimea corpului omenesc dela cap până la picioare. Statura variază foarte mult după rase și chiar după indivizii aceleiași rase. Luând termenul mijlociu, statura constituie un caracter antropologic foarte important. Când în acelaș grup etnic variațiunile staturii sunt mari putem conchide că acel grup rezultă dintr'un amestec de rase. — Statura nu arată nici superioritate, nici inferioritate de rase. Patagonii, cari au o statură mijlocie de 1 m. 77, sunt tot așa de inferiori ca și Boșimanii cari n'au decât 1.44. În general Negrii sunt de statură mare, Mongolii sunt mici, iar Albii oferă sub raportul staturii variațiuni foarte mari. — Statura omului merge crescând dela naștere până la etatea de 20 ani în mod progresiv și regulat după anumite legi; adeseori însă omul continuă a crește până la 25 și chiar 30 de ani, cam de 12—15 milimetri pe an; dela 50 de ani înainte statura începe să scadă câte puțin, așa că un grup care are în termin mediu o statură de 1 m. 68 la 30—40 de ani, nu mai are decât 1,67 și 1,61 la 80 de ani.

Steatooree (grec. *stear*, *steatos*, grăsime, și *rhein*, a curge). — V. *Sebooree*.

Steatoză (grec. *steatoun*, a transforma în grăsime). — Transformarea în grăsime a elementelor anatomice.

Stege. — V. *Ștevie*.

Ștegie, *șteghie*, *ștevie*. — V. *Dragavei*.

Ștejar (*Quercus sessiliflora*, fam. fagaceelor). — Arbore mare și frumos, al cărui fruct este mult cunoscută *ghindă*. În medicină se întrebuințează scoarța, al cărei principiu activ este *taninul*, ce lucrează ca astringent. Se dă

sub formă de fiertură gargară, injecțiuni, spălături la răni. — La *șară* se întrebuințează *ghinda*, prăjită și rășnită, dându-se la copii s'o bea cu apă ca să-i strângă la pânțele când au *treapăd* (urdinare).

Ștelniță. — V. *Păduche de lemn*.

Steluță. — V. *Bunghișor*.

Sterilitate (lat. *sterilitas*), *sterpicune*, *nerodire*. — Este o stare bolnăvicioasă, care împiedecă reproducerea speciei, adică facerea de copii, fără însă ca să facă cu neputință apropierea sexuală. Nu trebuie să se confunde sterilitatea cu *neputință* (impotența). Sterilitatea unei căznicii poate să provină din pricina *bărbatului*, (lipsa de spermatozoizi din sămânță, de o boală a testiculelor, cum este orchita de orice natură ar fie ea, *spermatoorea*), sau a *femeiei* (strâmbarea mitrei, strâmtorarea gurii mitrei, metrite, ovarite sau din viții de conformație ale vulvei, vaginului).

Sterilizatie. — Se numește astfel acțiunea de a *steriliza*, adică de a *nimici* germenii patogeni (microbii producători de boale) de ori unde s'ar găsi ei. *Sterilizarea apei* și a *laptelui* se face prin *fierbere* prelungită cel puțin de 40 minute, uneori repetată de 2—3 ori. Pentru ca sterilizarea să perziste trebuie ca vasele să fie cu îngrijire astupate. *Sterilizarea instrumentelor* și *obiectelor de pansat* se face tot prin fierbere timp de 20—30 minute, punând în apă 10⁰/₀ carbonat de sodă, sau mai bine se face cu aparate speciale. *Sterilizarea mânilor* și a *pielei* în general se face cu apă caldă și cu săpun, apoi cu diferite antiseptice.

Stern (lat. *sternum*, grec. *sternon*, piept), *osul pieptului*. — Osul mijlociu al pieptului, care se află în partea de dinainte și de care se prind coastele.

Sterpicune. — V. *Sterilitate*.

Stetoscop (grec *stethos*, piept și *skopein*, a examina). — Instrument care se întrebuințează pentru a asculta sgomotele dinăuntrul corpului omenesc și mai ales sgomotele inimii și ale vaselor mari.

Ștevie, *ștege* (*Rumex patientia*, fam. poligonaceelor). — Plantă mare erbacee, originară din Austria de jos, care se cultivă ca plantă culinară. Cu frunzele se prepară mâncare cu carne, cu

orez, etc. În medicină se întrebuințează rădăcina, care are gust fad la început, apoi amar și astringent plăcut, dându-se sub formă de băutură, preparată din 30 gr. rădăcină uscată, sau 60 gr. rădăcină proaspătă la un litru de apă, ca depurativ (curățător de sânge), în contra scorbutului și în boalele de piele.—La țară se dă pentru vărșături ceaiul de semințe de ștevie amestecate cu coajă de porumbel. La *pecingine* se pune rădăcină de ștevie pisată la un loc cu usturoiul, iar *bubele dulci* se ung cu zeama ce se scoate din frunzele verzi pisate la un loc cu rădăcina.



Fig. 430—Ștevie

Stibiu. — V. *Antimoniu*.

Stilet. — Instrument cu care se sondează o plagă fistuloasă, sau se introduce un fitil într'un canal accidental sau natural, într'o fistulă.

Stimulente. — V. *Excitante*.

Stinghie, regiunea ingvinală. — Partea corpului așezată la unirea pântecelui cu coapsa, sau armul, cunoscută și sub numele de *îndoitura ingvinală*. Această îndoitură este mărginită prin două suprafețe cari se apropie, se freacă și produc *roșeață*, un fel de *opăreală*. Cel mai bun mijloc pentru a preveni-o este de a despărți cele două suprafețe ridicate una de alta cu ajutorul unui praf fin (pudră) de orez, de licopodiu, sau de talc. Nu trebuie să punem grăsimi, alifii, cari mai mult irită. *Loviturile și rănirile* cari se fac asupra stinghiei pot avea uneori urmări foarte grave, fiindcă prin această parte trec din pânțe spre picior vase mari (artere și vene) și cari pot fi punctul de plecare al unor hemoragii. Se observă des în această regiune *hernia* (surpătura, boșorogeala), despre care ne-am ocupat mai mult în alt loc (v. *Ernie*). În stinghie se mai ivesc buboanele în urma șancărului (v. *Adenită*).

Stipticină, cloridrat de cotarnină. — Praf galben, solubil în apă. Se întrebuințează ca emostatic (opritor de

sânge) în contra emoragiilor *interne* și *externe*; foarte bun în ginecologie în contra emoragiilor când femeia se apropie de etatea critică (menopauză). Să nu se dea în sarcină, căci poate provoca avortul. Se dă *pe dinăuntru* în doză de 10—20 ctgr. pe zi, în poțione sau în injecțiuni sub piele. *Pe dinafară* în soluție de 30 la 100; pomadă (alifie), 2—5 la 100.

Stipol, Italat neutru de cotarnină. — Praf galben cristalin, solubil în apă. Lucrează ca și *stipticina*; se dă în contra emoragiilor în doză de 1 gr. 50 cigr. pe zi.

Stirigie. — V. *Funingine*.

Știrigoaie, ștergoaie, strigoaie, helebor alb (*Veratrum album*, fam. liliaceelor). — Plantă erbacee *veninoasă*, care crește prin fânețe, pășuni în regiunea montană și alpină. Se întrebuințează rădăcina, care conține un principiu numit *veratrină*; lucrează ca purgativ violent, emetic (produce vărșături), strănutător, contra reumatismului, contra boalelor de piele. Se dă sub formă de : praf, 5—10 ctgr.; tinctură, 10—30 picături; pe dinafară sub formă de alifie : 20—50 ctgr. de praf la 30 gr. de vaselină. — *Veratrina* se dă în contra gutei, a reumatismului, în doză de 10—25 mgr., iar pe dinafară se dă în linimente, în alifii. — *Otrăvirea* cu știrigoaie are următoarele semne : arsură în gât, greutate la înghițit și la respirat, salivă (bale multe), vărșături, urdinare, colici de intestine, durere de cap, bătăi de inimă, amețeli, puls încet și slab. *Tratament* : spălarea stomacului sau medicamente ca să verse (vomitive) : ipeca, apomorfina; stimulente (alcool, șampanie, eter, acetat de amoniac, cafea caldă și tare, la trebuință în clistere), căldură la picioare și mâni (căramizi calde, sticle cu apă caldă), fricțiuni; bolnavul să stea culcat.

Stomac (grec. *gastir* și *stomachos*, dela *stōma*, gură și *echein*, a avea), *rânză*. — Stomacul este un fel de pungă ai cărei pereți sunt subțiri mlădioși, elastici și rezistenți. El ocupă mijlocul părții de sus a pântecelui și este organul de căpetenie al mistuirii. Are forma unui cimpoi și are două deschizături : una în sus, numită *cardia*, prin care intră mâncarea care vine prin *esofag*,

cealaltă în jos, numită *pilor*, prin care stomacul comunică cu intestinul subțire. Aceste două deschizături închid stomacul și nu se deschid decât de sus în jos; cu toate acestea în *vărsăturile* ordinare cardia se înmoaie (se relaxează) pentru a lăsa să se




Fig. 431 — Stomac

a = curbură mică; b = curbură mare; c = cardia; d = duoden; p = pilor; pa = pancreas

arunce afară conținutul stomacului și în vărsăturile bilioase și fecaloide pilorul face același lucru. Orificiile stomacului (cardia și pilorul) sunt legate între ele prin cele două margini ale lui; una superioară, puțin concavă, care se cheamă *curbura mică*, cealaltă inferioară, mult mai lungă și convexă, care se numește *curbura mare*. În apropiere și la stânga cardiei se află




Fig. 432. — Stomacul, cu organele vecine

E = stomacul; C = extremitatea cardiacă a stomacului; G = extremitatea pilorică; B = diafragul; D = duodenul; F = ficatul; V = beșica fielei; R = splina; P = pancreasul.

1 = trunchiul celiac; 2 = artera diafragmatică inferioară; 3 = artera hepatică; 4 = artera cistică; 5 = artera gastroepiploică dreaptă; 6 = artera pilorică; 7 = artera pancreatică-duodenală; 8 = artera coronară a stomacului; 9 = artera splenică; 10 = artera gastroepiploică stângă; 11 = artera mezenterică; 12 = artera abdominală.

o umflătură bine pronunțată, numită *marele fund de sac* al stomacului, în care stă mâncarea până se mistuie. Păreții stomacului sunt formați din mai multe straturi, cari, luate de dinăuntru înafară, sunt: căptușala stomacului, numită *mucosă*, care cu-

prinde glandele gastrice și care varsă *sucul gastric*, prin ajutorul căruia cărnurile se transformă în peptone lichide. Alt strat, numit *muscular*, care se compune din trei feluri de *fibre*, oblice, circulare și longitudinale, cari au slujba de a amesteca, a frământa alimentele, a le pune în atingere strânsă cu *sucul gastric*, apoi a le împinge în mațe și alt strat, numit *seros*, format dintr-o parte a peritoneului, care îngăduiește stomacului a se mișca asupra organelor vecine. — Rolul stomacului este de a mistui (*digera*) alimentele și băuturile. Acest rol și-l împlinește stomacul în două moduri: unul *mecanic*, prin ajutorul fibrelor sale musculare, și altul *chimic*, cu ajutorul *sucului gastric* mai sus pomenit, care cuprinde o substanță numită *pepsină* și care lucrează asupra materiilor alimentare înmoindu-le, umflându-le și transformându-le într-o masă pe jumătate lichidă pe care intestinul se însărcinează s'o facă să treacă în sânge. *Rănilile*, sau *plăgile* stomacului sunt rare, dar în schimb sunt foarte primejdioase și cele mai adeseori mortale, din pricina *peritonitei* pe care o produc. *Indigestia*, sau *nemistuirea*, este produsă de mâncare prea multă, de carne stătută, de băuturi prea multe și de orice exces. *Frigurile* de stomac, sau *febra gastrică*, are următoarele semne: durere de cap, lipsă de poftă de mâncare, limba încărcată, gură rea, uneori greață și vărsături, fierbințeală, fiori, dureri de șale. Tratamentul este: curățenie (sare amară), regim lactat. *Gastrita*, sau *inflamația stomacului*, este produsă de hrană de calitate rea, de mâncări ardeiate și piperate, de mâncările cu oțet, de băuturile alcoolice, etc. Cea *acută* începe printr-o căldură generală, lipsă de apetit, sete, lipsă de somn, febră, o durere vie, svâcnitoare, care se mărește prin apăsare și se simte la lingurea, vărsături, sughiț. Aceste semne sunt și mai pronunțate în gastritele produse de otrăvuri: fosfor, sublimat coroziv, arsenic, vitriol, etc. Ea se poate vindeca în 8—15 zile, prin odihnă, dietă, o curățenie sau un vomitiv. *Gastrita cronică* urmează câte odată celei acute, dar cele mai adeseori ea se stabilește chiar dela început, desvoltându-se în-

STOM

cet sub influența acelorasi cauze : hrană prea multă, neregulă la mese, abuzul de băuturi alcoolice și de tutun ; alte ori ea însoțește boalele de ficat și de inimă, cloroza, etc. Semnele ei sunt : o micșorare a apetitului, o înțetineală, sau lenevie a mistuirii, dureri de cap, aplecare spre somn, uscăciunea limbii, răgăeli acre și amare, vărsături de materii alimentare. O boală foarte lătită este *gastralgia*, *crampele de stomac*, sau *durerea de stomac*. *Gastralgia* este o durere acută, foarte tare, svâcnitoare sau sfâșietoare, cu simțire de înțepătură, de mușcătură de arsură, de furnicătură, de răceală ca de ghiată la lingurea, de unde ea se întinde peste tot pântecul și mai ales în spate, între spete, putând fi uneori așa de mare încât să dea naștere la sfârșeală, aiurare, spazme, leșin. Această durere revine prin accese cari se ivesc, mai mult înainte de mâncare decât după masă și durează câteva minute, până la mai multe ceasuri. Din acestea se poate vedea că *gastralgia* nu este decât o nevralgie de stomac și durerea se liniștește pentru moment prin apăsare prelungită pe locul dureros cu mână, pe câtă vreme în gastrită durerea crește prin cea mai mică apăsare. *Gastralgia* se observă mai ales în adolescență și etatea adultă, mai adeseori la femei și persoanele nervoase, provenind din mâncare prea multă, abuz de băuturi alcoolice, emoțiuni vii, oboseala minții, veghierile prelungite, cafea, ceai. Se însoțește adeseori de anemie, cloroză, isterie ; alături, ivindu-se în timpul sarcinii, alăptării prelungite, sau cu prilejul prezenței viermilor în intestine. Pentru a preîntâmpina ivirea durerilor de stomac trebuie să ne păzim de tot ceace știm că ne face rău, schimbându-ne felul de traiu și tratând boalele cari le întrețin. În momentul durerii să se aplice la lingurea un șervet înmuiat în apă fierbinte, sau un vas turtit de tinichea, plin cu apă fierbinte. *Dilatația de stomac*, sau *lărgirea stomacului* este o formă specială de dispepsie ; stomacul poate să ajungă ca să cuprindă 10—15 litri de lichid. *Cauzele* acestei boale sunt : mâncarea multă, băuturile în cantitate prea mare, mai ales bere, gastrita cronică, neurastenia, slăbirea

STOM

generală, boalele de lungă durată. *Semnele sunt* : apetit variabil, constipație mare, mistuirea înceată, vărsături, iar mai târziu, ne mai putându-se absorbi bine alimentele, slăbire mare. *Ulcerul de stomac*, sau *rana la*



Fig. 433

În stânga : Stomacul normal, primește și digeră bine alimentele.

În dreapta : Stomacul atonic, căzut, primește puțin și digeră greu.

stomac, are drept cauze : dispepsia, alcoolismul, oftica și se observă mai des la femeie. Semnele sunt la început diferite turburări în mistuire, cari țin câteva săptămâni, apoi se ivește o simțire de *arsură* la lingurea și cu *durere* la spate în acelaș drept. Această durere se mărește prin mâncare, sau la apăsare. *Vărsături* alimentare, ca albușul de ou, sau cu sânge, care poate fi roșu sau negru ; o parte din acest sânge poate fi dat pe jos cu materiile fecale ; slăbire repede și pierdere de putere. Când bolnavul este bine căutat, boala se vindecă, iar după ce au dispărut toate semnele întoarcerea treptată la mâncarea obișnuită. Odihna și regimul de lapte vor dura cel puțin 4—6 săptămâni, după care bolnavul va putea părăsi patul și când nu va mai avea nici un semn de boală va lua mâncări solide. Când ulcerul este de natură *sifilitică* se va institui tratamentul specific mixt (neosalvarsan, bismut, mercur și iodur de potasiu). Când sunt vărsături de sânge, alimentația bolnavului se va face prin șezut (clizmă compusă din : 2 gălbenușuri de ou într-un pahar de lapte, cu puțină sare și câteva picături de laudan, făcându-se 5—6 clizme pe zi) ; apoi se va aplica o beșică cu ghiată la lingurea, în permanență, opiu în pilule, morfină în injecții sub piele ; contra durerii se mai pot da : cocaină, mentol, codeină. *Cancer la stomac*.

Cancerul se ivește de obicei în apropierea pilorului. Intre semnele din-tăiu avem: pierderea apetitului, mistuiri grele, greutate la stomac, răgăeli acre, întocmai ca și la dispepsie și la gastrita cronică. După câțva timp se ivesc adevăratele lui semne cari sunt: *vărsăturile*, cari la început sunt compuse din materii ce se întind ca ața și pe cari le are bolnavul mai cu seamă dimineața, pe nemâncate, cam cum sunt vărsăturile bețivilor; apoi vărsăturile sunt formate de mâncare, care este dată afară la câteva minute după masă, sau numai după câteva ceasuri; pe urmă vin vărsăturile cu sânge, rar cu sânge curat și roșu, cele mai adeseori cu sânge negru. După câțva timp se simte o *tumoră* la limba, când apăsăm cu mâna. Durerea se simte în dreptul acestei tumori. În cele din urmă bolnavul *slăbește*, se sbârcește la față și devine palid, galben ca paiul. Sfârșitul acestei boale este în totdeauna moartea, dacă nu se operează cât mai de vreme.

Stomac (Acime de, Aciditate de).—*V. Acrime.*

Stomachic.—Medicamente cari înleznesc funcțiunile stomacului, cari ușurează mistuirea mâncărilor, din care pricină aceste medicamente se mai numesc și *digestive*. Medicamentele *stomachice* sunt în primul rând substanțele *amare*: chinchina, columbo, cuasia, gențiana, cari de obicei se iau *înainte* de mâncare cu un sfert de ceas, sub formă de macerațiune (plămădeală) în apă, sau în vin. Aceste substanțe amare întăresc stomacul și îl ajută la mistuire; afară de acestea ele deșteaptă pofta de mâncare, sunt *aperitive* (vezi *Amare*). Unele stomachice se iau *după* mâncare, cum sunt băuturile calde și ușor stimulente, cari sunt foarte bune digestive. Intre acestea se numără cafeaua neagră și ceaiul rusec cari sunt bune, însă nu pentru toată lumea (persoanele nervoase și cei se sufăr de palpitații să se ferească de ele și în locul lor să bea ceaiu de mușătel, de teiu, de foi sau de flori de portocale, de mentă, de melisă, de anason, etc.).

Stomatită (grec. *stoma*, gură și terminațiunea *itis*, care însemnează inflamațiune).—Aprinderea, sau in-

flamațiunea gurii și gingiilor (în popor numește *strudniță*)

Stovalnă.—Anestezic local, mai puțin toxic decât cocaina. Se întrebuințează mult pentru anestezia operatorie, prin căile sub cutanate și intrarachidiană pentru anestezia oculară, laringiană, etc., în instilațiuni, pentru analgezia medicală, sub forme variate, în nevralgii, angine dureroase, emoroizi, coriză, gastralgie, etc., în arta dentară în contra durerilor de măsele și pentru a le amorți la scoatere.

Strabism (dela grec. *strabos*, ciacăr, șasiu încrucișat, care se uită cruciș).—Pe când atențiunea vizuală este în-



Fig. 434. — Strabism convergent

A=înainte și B=după operație
(operată de Dr. I. Olăvan)

dreptată către un punct hotărât, cele două axe optice converg către acest punct și se încrucișează acolo. Această



Fig. 435. — Strabism convergent

A=înainte și B=după operație
(operat de Dr. I. Olăvan)

convergență este actul instinctiv și esențial al vederii binoculare. Dacă, dintr-o cauză oarecare, una din axele optice este abătută din poziția ei normală, cealaltă axă va fi îndreptată singură spre obiectul hotărât, vedere binoculară nu se mai face și atunci

avem un *strabism*. Strabismul este așa dar o deviație a privirii, în urma căreia, pe când un ochi fixează un punct oarecare, celalt ochi este îndreptat către un alt punct din spa-



Fig. 436. — Strabism divergent
înainte și după operație
(operat de Dr. I. Glăvan)

tiu. Strabismul este întotdeauna un simptom (semn), sau o urmare a unei boale de ochi: paralizii sau contracturi musculare, anomalii de refracție, ambliopii din naștere, sau câștigate, slăbirea vederii în urma unui defect de transparență a mediilor, pete pe corneea (albeață), piedecă adusă la mișcările ochiului printr'o tumoră, sau cicatrice. Strabismul poate să se arate sub diferite forme și anume: 1. Strabism divergent, sau extern; 2. Strabism convergent, sau intern; 3. Strabism monolateral; 4. Strabism bilateral și alternant. Cel ce suferă de strabism, ciacărul, vede lucrurile duble la începutul boalei; după ce se obișnuiește cu această infirmitate și funcționează numai ochiul cel bun, nu mai vede dublu. *Tratamentul* cel mai sigur este operația care dă foarte bune rezultate, cum se vede în alăturatele figuri.

Strabometru (grec. *strabos*, ceacăr și, *metron*, măsură). — Instrument cu care se măsoară gradul de deviațiune a ochiului atins de *strabism*.

Straie. — V. *Vesminte*.

Strangulare (lat. *strangulare*, a gătui), *gătuire*, *sugrumare*. — În vorbirea obișnuită prin acest cuvânt se înțelege moartea provenită din oprirea respirației și circulației prin strângerea gâtului cu mâna, sau cu o sfoară. În cazurile de omucidere se observă rup-tura gâtuleului (laringelui) cartilajului cricoid și urme de violență, de luptă (fața umflată, vânătă, echimoze pe

față, gât, piept, limba eșită și strânsă între dinți). Plămânii sunt umflați, congestionati, cu noduli la suprafață, vânătăi în pleură; congestiunea vaselor creierilor. În medicină se mai aplică cuvântul de *strangulare* și în cazurile în cari intestinul se sucește asupra lui însuși (*încurcătură de mafe*), sau este apăsător de o tumoră, strâns de vreo cicatrice, ori de apendicele ilio-cecal, așa că materiile nu mai pot circula prin el. O *ernie* se numește *strangulată* când intestinul este așa de strâns încât nu mai permite circulația materiilor.

Strănutare, strănut (lat. *sternutatio*). Este produsă de iritația căptușelii nasului, printr'un corp străin, printr'o insectă, printr'un gaz sau praf, miros urât, sau este începutul unui guturaiu.

Strașnic, capilaria, acu pământului, părul maicii domnului (*Asplenium Trichomanes* sau *Adiantum Capillus Veneris*, din fam. poliposiaceelor). — Mică plantă erbacee, care crește prin crăpăturile stâncilor calcare și umbroase, prin păduri și văi de munte. Se întrebuințează pentru a calma, domoli, tusa și ca sudorific, sub formă de ceai sau fiertură (10 gr. la un litru de apă) sau ca sirop 30—60 gr.

Streptococi. — V. *Microbi*.

Stricare de stomac. — V. *Diaree*.

Strienină. — V. *Nuca vomică*.

Strictură, strămtorare. — Strictura esofagului (v. *Esofag*). Strictura uretrei (v. *Uretră*).

Stridii. — Stridiile sunt bune pentru toate stomacurile, chiar și pentru ale celor ce sufăr de dispepsie (mistuire grea) și a convalescenților; ele se mistuie și mai ușor când sunt stropite cu suc de lămâie și se bea după ele puțin vin alb; nu e bine să se pună și piper peste ele, după cum le place unora. Stridiile este bine să se mănânce crude, vii și să se mestece bine în gură, iar nu să se înghită întregi. Stridiile gă-tite, fierte, fripte, marinate, sau cu sosuri, nu sunt bune căci se mistuie cu mult mai greu decât stridiile crude. Apa de stridii, care este un amestec de apă mare și de sânge de stridii, este laxativă (înleznește scaunele), aperitivă și conține puțin iod ca și stridiile, de aceea este bună la cei slabi și lîmfatici. Scoicele de stridii sunt com-

puse, în cea mai mare parte, de carbonat de calce, pentru care în vremea veche se întrebuințau sub formă de praf în *acrimelle de stomac*, în gușe. Stridiile trebuesc mâncate numai în lunile cari au un R, adică dela 1 Septembrie până la 30 Aprilie, iar nu dela 1 Maiu până la 21 August, care este epoca lor de reproducție. Sunt unii oameni, cari îndată ce mănâncă stridii capătă mâncărime de piele, blândă (urticarie), pentru care trebuie să se ferească de ele, precum și toți cei ce suferă, sau sunt aplicați la boale de piele, eczema, etc.

Strigoale. — V. *Strigoale*.

Ștrimfi. — V. *Ciorapi*.

Strivire. — V. *Sărobire*.

Strofant (*Strophantus hispidus*, fam. apocinaceelor). — Tonic sau întăritor al inimii, care lucrează mai iute și câte odată în mod mai energic decât digitala. Se dă sub formă de tinctură 5—30 picături (la copii 1 picătură); extract 1—6 mg. — *Strofantina*, foarte toxică, este principiul activ al *strofantului*; se întrebuințează în boalele de inimă în doză de o jumătate de miligram până la un miligram.

Stronțiană, oxid de stronțiu. — Se întrebuințează bromurul, iodurul și lactatul de stronțiană. Se dă în contra gastralgiiilor, spasmelor, epilepsiei, albuminuriei; în doză de 2—6 gr. pe zi.

Stropșeală, stropșitură. — V. *Epilepsie*.

Strudiniță. — V. *Stomatită*.

Strugurei, strugurei roșii. — V. *Coacăză*.

Struguri, poamă. — Fructele comestibile ale *vișei de vie*. Sunt cele mai bune fructe, când cămașa lor (pelița) nu este prea groasă. În acest caz este mai bine să mănâncăm strugurii fără peliță, precum și fără sămburi, cari de altfel trec prin corpul omului fără să fie mistuiți, dar cari obosesc tubul digestiv și uneori pot să se îngrămădească în vr'un colț al intestinului, iritându-l și inflamându-l. Strugurii au un miros plăcut și sunt ușori pentru stomac, din pricina zahărului pe care îl au; ei sunt răcoritori și laxativi, mulțumită apei pe care o conțin; se păstrează timp mai îndelungat prin diferite procedee. Potolesc setea bolnavilor și a convalescenților și, luați

la sfârșitul mesei, de către cei sănătoși ei întrețin libertatea pântecelui, înlezând scaunele. Sunt buni mai ales pentru cei ce suferă de obicei de constipație. *Cura de struguri* este foarte bună în multe cazuri. Ea constă în a mânca struguri în fiecare zi. Cantitatea variază după om și după trebuință. Se începe cura cu câteva ciorchine, apoi se mărește doza în mod progresiv și după 5 până la 6 săptămâni se micșorează doza puțin câte puțin. Cantitatea fixată se împarte în 3 doze, cari se iau; dimineața pe nemâncate, la 11 ore și între 5 și 6 ceasuri. Pentru ca să nu se irite gingiile este bine ca după fiecare mâncare de struguri omul să-și clătească gura cu apă, simplă, sau cu puțin bicarbonat de sodă. Dozele obișnuite sunt de 500 gr. până la 1000 gr. fiecare. Va trebui să spălăm bine strugurii înainte de a-i mânca, pentru că se poate să rămână pe boabe sulfat de cupru (piatră vântată), cu care s'au stropit frunzele ca să nu se mănască și ne putem otrăvi. Cura de struguri întărește funcțiunile digestive și diureza, moderează fermentațiunile intestinale, micșorează aciditatea urinii și cantitatea acidului uric, excită secrețiunea bilei (fierei), reduce oxidațiunile azotate. Strugurii pot fi înlocuiți cu *mustul lor* (cum iese de sub teasc, păstrat în sticle aseptice) care nu încarcă mațele cu pelițe și cu sămburi. Mustul este bun în toate cazurile în cari se impune regimul de lapte: nefrită, ciroze, febră tifoidă, febrele eruptive la început; precum și în boalele în cari se recomandă supra alimentația: tuberculoza, neurastenienă. Mustul de struguri modifică în mod favorabil: enterocolita, hepatitele cronice, cistitele, etc.

Strugurii negri, *coacăz negru*, *smorodîn* (*Ribes nigrum*, fam. saxifragaceelor). — Arbust fără spini, cu fructe sub formă de boabe negre, bune de mâncare și cu un miros caracteristic ca și frunzele. Crește prin pădurile de munte, uneori cultivat prin grădini. Fructele servesc la prepararea unui lichior puțin alcoolic, care, îndoit cu apă, este o băutură răcoritoare, fără nici un efect rău asupra stomacului.

Struguri spinoși. — V. *Agriș*.

Strugurii ursului. — V. *Uva ursi*.

Strună. — V. *Unghie*.

Strunga. — Stațiune balneară în județul Roman, lângă orașul Târgul-Frumos, la o depărtare de trei sferturi de oră pe o șosea minunată. Stațiunea este așezată pe coasta răsăriteană a dealului Strunga, o margine a codrilor Strungi, ce se întind pe dâmburi și dealuri necurmăte, între Prut și Siret, formând un adevărat codru de pădure.

Băile Strunga sunt așezate pe o terasă încântătoare, la o înălțime de 226 metri deasupra nivelului Mării Negre. Coamele dealurilor păduroase „Masa Tălharilor” domină localitatea. Imprejurimile sunt salubre. Sunt 7 izvoare, dintre cari 3 mai principale. Apele sunt sulfuroase, alcaline, atermale. Aceste băi se recomandă pentru reumatism, scrofuloză, artritis, boalele de piele. Izvorul alcalin are întrebuințare internă și se recomandă în boalele de nas, gât, bronhii și în dispepsii. Izvorul fieruginos este bun pentru cloro-anemie și în cachexii. Imprejurimile sunt admirabile; se pot face excursiuni în pădurea Strungii, Târgul Frumos, Ruginoasa, Mircești, etc.

Studentină. — V. *Gingii*.

Stupit. — V. *Scuipare*.

Stupoare. — V. *Amorțeală și Năucie*.

Styrax benzoin. — V. *Smirnă*.

Subcutină (*parafoenolsulfonat de anestezină*). — Praf alb cristalin, solubil în apă. Anestezic local. În injecțiuni sub piele din soluția cunoscută sub numele de *subcutol* și care se compune din: subcutină 80 ctgr. până la 1 gr., clorur de sodiu 70 ctgr., apă distilată sterilizată 100 gr.; 1—5 c. c. pe zi.

Sublamină. — V. *Mercur*.

Sublimat coroziv. — V. *Mercur*. (*Bicolor* de mercur).

Submersiune. — *Inecare*.

Subsuoară (*Axilla*), *subțioară*, *regiunea axilară*. — Este cavitatea sau înfundătura care se găsește sub împreunarea brațului cu umărul: ea răspunde înăuntru la piept, iar în afară la braț și cuprinde ganglioni limfatici, sau ghinduri în număr mare, în mijlocul unui strat bogat de grăsime; este străbătută de vase (artera și vena axilară) și de nervi (un pachet

format de ramurile plexului brachial), cari vin dela gât și se duc la braț și până în vârful degetelor. — Pielea dela subțioară este bogată în păr și în glande sudoripare, cari produc nădușeală. Ea este de altfel destul de subțire pentru ca să lase a fi străbătută de alifiile medicamentoase cu care se unge. — La subsuoară se ivesc adeseori *bube dulci*, sau *eczemă*. Uneori se ivește un fel de *roșeață*, însoțită de mâncărime și de usturime, care rezultă sau din frecarea părților între ele, la persoanele grase, sau din aplicarea unor alifii cam tari, sau din sudoarea prea multă, care are câte odată un miros iute, respingător și decolorează, sau mai bine zis pătează rufăria și hainele. Pentru a ne feri de toate acestea este bine ca să ne spălăm subțiorile cât mai des cu apă rece și să punem praf de lycopodiu, praf de paie, de scrobeală, făină de cartofi, sau talc. — Tot din aceleași cauze se mai pot ivi în această parte a corpului *abcese*, cari se mai pot desvolta și în urma unei lovituri, sau a unei răni dela mână sau antebraț, mai cu seamă în urma unei înțepături cu un ac murdar, sau ruginit; ori din cauza unui sugiu la degete (panarițiu), etc. Aceste abcese sunt foarte dureroase și când sunt adânci pot ajunge la piept, de aceea nu trebuiesc lăsate în voia lor, adecă să se spargă când vor ele, ci să se trimită îndată după un doctor ca să le deschidă. *Arsurile* se văd rar la subsuoară, dar când aceasta se întâmplă, vindecarea de multe ori se face lipindu-se brațul de piept, ceea ce produce o infirmitate lucru care se poate preveni cu multă băgare de seamă. *Contuziunile* și *plăgile* subțioarei sunt adeseori urmate de curgeri de sânge, paralizii și alte turburări grave, contra cărora numai doctorul poate lupta. Tot astfel este și cu *tumorile*, sau *bolfele*, cari se pot ivi în această parte a corpului.

Subțioară. — V. *Subsuoară*.

Suc de carne. — V. *Carne*.

Sucitură. — V. *Entorză*.

Sudoare (lat. *sudor*), *nădușeală*. — Se numește astfel lichidul secretat de glandele sudoripare și vărsat la su-

prafața *pielei* (v. *Piele*). Sudoarea secretată reprezintă 40 gr. pe ceas, ceea ce face aproape un litru pe zi. Ea este acidă în locurile expuse la aer liber, alcalină în îndoiturile pielii, la subțorii, stinghii, printre degete. Cantitatea sudoarii este mărită prin exercițiu violent, prin fugă, alergare; mărită în unele boale, cum sunt: frigurile palustre, oftica, etc., precum și prin unele medicamente numite *diaforetice*, sau *sudorifice* (v. acest cuvânt).—Unii oameni suferă de *nădușeală multă* și cu *miros greu*, la picioare și la mâni. Pentru *nădușeala dela mâni* se recomandă ungeri cu o soluțiune de acid cromic (10 la 100), făcute tot la 5 zile odată. Coloarea galbenă a pielii care este produsă de acest medicament dispare după mai multe spălături. După zece ungeri omul se vindecă. Să luăm seama ca să nu fie sgăriată pielea când se unge. Pentru *nădușeala dela picioare* se recomandă să se presare printre degete praf de acid tartric, sau talc. Un bun rezultat dau băile zilnice cu apă caldă, în care se pun 2—3 linguri de formol, la 3—4 litri de apă.

Sudorifice (lat. *sudorificus* dela *sudor*, sudoare, nădușeală și *facere*, a face).—Se numesc astfel agenții cari produc sudoare. Intre aceștia primul loc îl ocupă *căldura*; aplicată la *exterior* sub formă de băi de aer cald, de băi de aburi, (de dușuri de aburi, etc. cari vindecă durerile reumatice și nevralgice provocând nădușeală, sau aplicată pe *dinăuntru* sub formă de diferite ceaiuri (infuziuni) băute foarte calde și în abundență. Intre plantele cari servesc la prepararea acestor ceaiuri se numără: brusturul, limba mielului, ienupărul, jaborandi, melisa, salsaparila (salcea), săpunelul, socul, apoi nalba, viorelele, florile pectorale etc. Ceaiul rusesc fierbinte, cu puțin rom, chiar și laptele dulce fierbinte, cu puțin rom, provoacă nădușeală. Plantele aci înșirate sunt sudorifice numai dacă sunt luate sub formă de ceaiuri fierbinți, așa că în definitiv căldura este aceea care provoacă sudoarea. Sudorificile sunt bune la începutul febrei eruptive (pojar, scarlatină, vărsat) pentru ca să înlesnească eșirea erupțiunii, în răceală

cu guturaiu și tusă, în influență, în tot felul de răceli, având însă grija de a ne păzi de curenți și de frig atunci când înădușim.

Sudoripare (Glande). — V. *Piele*.

Suflare. — V. *Alenă*.

Sufletele. — V. *Dediței* și *Mărgăritărel*.

Sufocație (lat. *suffocatio*), *îneacăciune*, *înăbușire*. — Prin acest cuvânt se înțelege greutatea de a respira, ajunsă la cel mai înalt grad, și care vine sub formă de accese. *Sufocația* se deosebește de *opresiune* prin aceea că pe câtă vreme în aceasta bolnavul simte numai o greutate prelungită la respirație, în sufocație respirația se pierde momentan și în mod brusc. Bolnavul este cuprins dintr'odată de o îneacăciune, nu poate respira, nu are aer, se încearcă să respire și nu poate, din care cauză figura lui ia o înfățișare de spaimă, de neliniște, ochii i se înroșesc, i se umplu de lacrimi, buzele i se învinețesc, se agită, se agață de toate lucrurile din jurul lui căutând un sprijin pentru brațe cari, la rândul lor, ajută pieptul să se lărgească, sau își duce mâinile la gât, ca și cum ar vrea să smulgă piedeca ce-i oprește aerul. El luptă cu toată puterea în contra morții care i se pare că vine cu grăbire; dar totul este în zădar și asfixia poate sosi dacă cumva obstacolul nu dispare dela sine, sau prin ajutor doctoresc. Sufocațiunea poate fi produsă de mai multe cauze. Uneori ea vine la un om sănătos când a înghițit rău o bucătică de mâncare, apă, sau altceva, care, a scăpat în căile respiratoare și atunci, aerul ne mai putând pătrunde în plămâni, omul se îneacă, se sufocă. Alteori se întâmplă că omul este apucat de o contracțiune (strângere) involuntară, convulsivă, de un *spasm al glotei* și aerul nu mai poate pătrunde în plămâni ceea ce se vede mai des la copii în *gușter*, sau *crup fals* (v. *Crup*). trebuie chemat doctorul care, în caz de trebuință, va face operațiune numită *tracheotomie*, adică va înțepa gâtulejul, punând o țevă de argint (sub mărul lui Adam) pentru ca aerul să intre pe acolo în plămâni.

Sulf. — V. *Sulfină*.

Sugaciu (lat. *alumnus*), *sugător*, *copil*

de față. — Mortalitatea copiilor de față este foarte mare, atât în orașe cât și la sate. Cauzele acestei mortalități, așa de mare, sunt multe și variate: frigul, lipsa de curățenie și hrana rea. La țară mamele nu iau toate precauțiunile necesare pentru a adăposti copilul în contra frigului și în contra variațiunilor de temperatură, nici nu dau toate îngrijirile de curățenie, pe cari le cere vârsta fragedă a copilului, apoi în privința hranei păcătuiesc și mai rău, căci dau copilului să mănânce prea din vreme diferite lucruri grele, cari irită stomacul și intestinele, producând de multe ori inflamațiuni, sau aprinderi, mortale (v. *Alăptare mixtă*). Pentru a îndrepta aceste rele provinete mai mult din ignoranță decât din lene, ar trebui să se răspândească cu îmbelșugare în populația dela sate noțiunile elementare de igienă, cu privire la creșterea copiilor, prin broșuri scrise pe înțelesul tuturor, prin medicii de plasă, prin agenții sanitari și mai ales prin moașele dela țară, cari ar putea propovădui cuvântul bun în toate ocaziunile ce li se prezintă. În toate orașele mari, unde sunt o mulțime de copii crescuți de doicile de prin mahalale, trebuie să se înstitue supraveghierea continuă a tuturor copiilor crescuți în aceste condițiuni, după cum se face în Franța, printr'o *Lege* numită a lui *Roussel*, pusă în aplicare încă dela 1879, și care prevede că orice copil mai mic de 2 ani, care este dat cu plată sub îngrijirea unei femei (la față sau înțarcat), în afară de locuința părinților, devine prin acest fapt obiectul unei supraveghieri a autorității publice, având de scop de a proteja viața și sănătatea lui. Pentru aceasta s'au numit medici inspectori în toate părțile, cari vizitează pe toți acești copii, încredințându-se de starea lor. Mulțumită acestei măsuri mortalitatea a scăzut în mod simțitor.

Sugel, sugiu. — V. *Panarițiu*.

Sugel alb, urzică albă, urzică creasă, urzică moartă *Lamium album*, fam. labiatelor). — Plantă erbacee care crește prin păduri, tufișuri, livezi, pe lângă garduri și drumuri. În medicină se întrebuințează florile ca astringent ușor și emostatic (opritor de sânge). Se dă

sub formă de ceaiu, 10 gr. la 1000, câte o lingură la fiecare jumătate de oră; sirop, 50 gr. pe zi; tinctură, 100 gr.: iar pe *dinafară* se întrebuințează în injecțiuni vaginale, sub formă de infuzie din 10 gr. la 1000, în leucoree (poală albă).

Sugestiune. — V. *Ipnatism*.

Sughit (lat. *singultus*). — Este o sdruncinătură bruscă, convulsivă și involuntară a pântecului și a pieptului, care se simte mai ales în dreptul stomacului, sguduind uneori și umerii, capul și chiar corpul întreg, producând o simțire neplăcută, care repetându-se poate să devină dureroasă și însoțită în totdeauna de un sgomot răsunător și ascuțit. Sughitul este produs de contractiunea repede a *diafragmului* și care, întinzându-se dintr'odată, sdruncină cu putere organele din aceste două cavități și în special plămânii, de unde și vine sgomotul caracteristic al sughitului. — *Cauzele* sunt mai multe: stomacul prea întins prin mâncare multă, prea caldă, sau prea rece, înghițită cu grăbire, un râs prea tare și prelungit, frig la picioare, copiii sugaci când se udă și răcesc la pânțele; diferite boale mai ales aprinderile sau inflamațiunile organelor din vecinătatea diafragmului, cum sunt: ficatul, stomacul, mașele, peritoneul, pleura. În epidemiile de gripă se observă adeseori sughitul. Când se ivește la sfârșitul unei boale grave, el este un semn rău și moartea nu-i departe. Sughitul obișnuit, care vine la omul sănătos, nu prezintă nici o primejdie, fiind mai mult supărător. — *Tratament*. Sunt multe mijloace de a opri sughitul: să-ți ții răsuflarea (respirația) cât se poate mai mult, sau, din contră, să respiri adânc de mai multe ori consecutiv, să bei un pahar de apă rece, sau să tragi tabac pe nas, o emoțiune vie, o ocupație importantă, care să fixeze tare atențiunea, de unde și obiceiul popular de a speria pe cel ce sughită, sau a-i spune o noutate, fie falsă, numai să fie impresionantă. Se mai poate opri sughitul bând încet, prin mici înghițituri, puțină apă de melisă, ținând limba scoasă mai mult timp, sau trăgând-o în mod ritmic, punând muștar la stomac (la lingurea) cataplasme

calde, ori ghiată, sau încălzind pân-tecele strâns.

Sugrumare. — V. *Asfixie* și *Strangulație*.

Șuhărie. — V. *Coriză*.

Șuiu. — V. *Emfizem pulmonar*.

Sulac. — V. *Prepuțiu*.

Suleină. — V. *Sulfină*.

Sulf. *pucioasă.* — Corp simplu de co-loare galbenă, fără gust, care dacă arde dă un miros tare pătrunzător. În medicină se întrebuințează sub trei forme: 1. *Sulf sublimat*, sau *floare de pucioasă*; 2. *Sulf spălat*, care este sulful sublimat spălat și curățit; 3. *Sulf precipitat*, care se obține prin acțiunea acidului cloridric asupra unei solu-țiuni de polisulfur de sodiu. Pe *dinauntru* se întrebuințează numai sul-ful spălat și cel precipitat, ca diafo-retic și expectorant, 2—4 gr. în bu-line, tăblițe sau prafuri compuse; ca purgativ, 6—15 gr. în electuar, sau melite; la copii 5—10 ctgr. de an' după etate. Pe *dinafară* se dă ca para-ziticid în contra *răei*, în alifie sau lo-țiuni glicerinate. Pomada lui Helme-rich conține: sulf 10 gr. carbonat de potasă 5 gr., ulei de migdale dulci 5 gr. și axongie 35 gr. În fumigațiuni (fumuri) ca dezinfectant. — *Trisulfura de potasiu*, sau *hepar sulfuris*, sau *ficat de pucioasă*, servește pentru băi, 100 gr. la baie și loțiuni cu 1 la 50 apă; se dă în reumatism și boale de piele. — Sulful combinându-se cu oxigenul dă *acidul sulfuric*, cu care se fac *sulfatele* și *sulfurele*.

Sulfate. — Săruri formate prin com-binarea acidului sulfuric cu un alcali, un alcaloid, sau o bază. Cele mai în-trebuințate sunt: *sulfatul de aluminiu*, cunoscut sub numele de *alun*, *sulfatul de calce*, *sulfatul de cupru*, *sulfatul de fier*, *sulfatul de magnezie* sau *sarea amară*, sau *sarea de Sedlitz*, *sulfatul de chinină*, *sulfatul de sodă*, *sulfatul de zinc* (v. *Sodă* și *Zinc*).

Sulfidric (Acid), *idrogen sulfurat*. — Gaz cu miros de ouă clocite, care se găsește mai cu seamă disolvat în apele minerale sulfuroase. *Apa de Căciulata* are un miros pronunțat de idrogen sulfurat.

Sulfină, *iarbă de piatră*, *molotru mo-lotru galben*, *suful*, *sulcină*, *trifoiu mare*

(*Melilotus officinalis*, fam. leguminoaselor). — Plantă erbacee care crește prin livezi, locuri cu iarbă, pe câmpuri pe marginea drumurilor, printre semănături, fânețe și locurile cultivate. Ramurile înflorite se întrebuințează în medicină ca emoliente, carminative. Din flori se face ceaiul sau infuziunea (15—30 gr. la 750 apă) pentru clizme. — La *țară* sulfina se fierbe cu vin alb și se bea pentru poală albă; floarea se fierbe și se bea pentru nădușeală, iar pentru durere de șale se încinge cu sulfină. Sămânța fiartă în apă se bea în contra vărsăturilor. Florile de sulfină se pun printre rufe și haine, pentru a le parfuma și a le apăra în contra moliiilor.

Sulfonal. — Cristale mici prizmatice incolore, fără miros, fără gust. Ipnotic. Se dă în doză de 50 ctgr. până la 1 gr. în buline. După ce s'a luat sulfonalul este bine să se bea un ceaiu cald, de floare de teiu, de mușătel, de flori de portocale, etc. La copii se dă 10—50 ctgr. după etate.

Sulfuric (Acid), *vitriol*. — Se for-mează prin combinarea pucioasei cu oxigenul. Acidul sulfuric este un li-chid igrosopic, foarte caustic (arzător), incolor, uneori galben-cafeniu și cu consistență oleioasă. Lemnul, scro-beala și zahărul se înegresc în atingere cu el. Acidul sulfuric se combină cu multe corpuri pentru a forma *sulfate*. Vitriolul este, o otravă puternice ce distruge repede substanțele animale și vegetale cu cari vine în atingere. Aruncat asupra unui om arde părțile corpului pe cari le atinge; o singură picătură în ochiu este de ajuns a-l strica, din această cauză vitriolul se întrebuințează așa de des în răzbunări, încercări de omucideri și sinucideri. O arsură de vitriol se tratează ca toate *arsurile*. Dacă se înghite vitriol el produce arsuri și dureri cumplite, cari nu încetează decât numai cu moartea, iar dacă omul nu moare, rămâne cu turburări în sănătate, pen-tru toată viața. Tratamentul otrăvi-rilor cu vitriol este acela ca și în otră-virile cu celelalte acide. În medicină se întrebuințează foarte rar, sub formă de *limonadă sulfurică*, în contra emo-ragiilor (v. *Limonade*), sau sub formă de *apa lui Rabel*, din care se dă 1—4 gr.

într-o poțiune, iar pe *dinafară*, pentru a arde uneori câte o rană otrăvită.

Suliman. — V. *Fard*.

Sulina. — Oraș pe amândouă laturile brațului Sulina, în județul Tulcea. Stațiune climaterică. Clima constantă și dulce; temperatura medie, în timpul verii, este de 21°. Această localitate însă are un defect fiind încunjurată de mlăștini. Paludismul este întins în acest oraș.

Sunătoare. — V. *Măsălarită* și *Pojarniță*.

Suncă. — V. *Cărnățaric*.

Supă. — V. *Ciorbă*.

Supozitor, (lat. *suppositorium*, dela *supponere*, a pune de desupt), *săpunaș*, *săpunel*. — Supozitoarele sunt niște medicamente, de formă conică, ce se pun în șezut (anus). Ele se fac din unt de cacao, din glicerină, din *săpun*, de unde le vine și numele românesc de săpunașe, la cari se adaugă medicamentele trebuincioase. Unele se fac simple, fără medicamente, al căror scop este numai de a înlezni eșirea afară, Săpunașele pot avea și forma oului.

Suprarenale (Glande). — Deasupra fiecărui rinichi se află câte o glandă, care poartă numele de *suprarenală*. Aceste glande, prin alterațiunea lor, pot da naștere la diferite boale, cum sunt boala lui Basedow, diabet, neurastenii, din care cauză s'a recomandat pentru aceste boale întrebuințarea pulberii de glande suprarenale, luate dela vițel și oaie. Leziunile acestor glande s'au observat mai cu seamă în *boala bronzată a lui Addison*, care este caracterizată printr-o stare de abatere foarte mare, prin dureri de stomac și spate, vărsături alimentare sau bilioase, sughiț, pete negricioase, bronzate, cari se întind cu timpul pe tot corpul. *Tratamentul* acestei boale constă în: *repaus absolut* (în aer liber vara), regim de *lapte*, mai târziu carne albă, carne crudă, injecțiuni subcutanate cu glicerofosfat, stricnină, formiat de sodă, arsenic, etc.

Supurație (lat. *suppuratio*). — Face-rea de *puroiu* într'un punct oarecare al corpului se numește *supurație*. Când puroiul se adună într'un loc se formează ceea ce se numește *abces*.

Surditate, *surdo-mut*. — Este o

infirmiitate *congenitală*, adică din naștere; *surdo-mutul* se naște cu un viciu de conformație al *urechilor*, iar nu al organelor vorbiri, cari sunt întregi, sănătoase. În aceste cazuri *ereditatea* (moștenirea) joacă rolul de cătenie în producerea acestei infirmități, care în unele familii atinge numai pe băieți, în altele numai pe fete; când unul din părinți este *surdo-mut*, sau în căsătoriile dintre neamuri se văd adeseori astfel de infirmi. Alteori *surdmutitatea* se ivește în primii ani ai vieții și în acest caz copilul își pierde mai întâiu auzul, printr'o cauză oarecare, așa că el ne auzind sunetele nu le poate învăța prin imitație (*surditate-precocă*), sau dacă și-a pierdut auzul la etatea de 2—6 ani uită sunetele pe cari nu le mai aude de loc și devine mut (*surditate-tardivă*, urmată de mutitate). Leziunile cari produc surzenia ating urechia mijlocie (otita medie supurată, anchiloza sau înțepenirea oscioarelor), urechia internă, sau chiar originea nervului auditiv în creier. Febra tifoidă, scarlatina, pojarul, difteria, influența, produc adeseori surditate, prin complicațiunile la cari dau naștere din partea urechilor. Boalele nasului se pot întinde la trompa lui Eustațiu și de acolo în urechia mijlocie (cutița timpanului), producând otite supurate. Odată *surdmutitatea* confirmată și definitivă rămâne ca să educăm pe *surdo-mut*, adică să-l învățăm să vorbească prin semne, instinctive, sau convenționale, făcute cu degetele mâinilor (*dactilologie*), formând alfabetul întreg prin *mişcările degetelor*. Dar această metodă este grea și nu se pot înțelege între ei decât doi *surdo-muți*, cari o cunosc, așa că un *surdo-mut* cu un om sănătos, care nu cunoaște alfabetul acesta, nu se pot înțelege. Pentru aceasta s'a inventat *metoda orală*, învățând pe *surdo-mut* să citească pe buzele persoanei cu care vorbește, pe mișcările cari le fac buzele pronunțând literile și cuvintele. *Surdo-mutul* poate să învețe astfel să vorbească aproape corect. Mai este *metoda fenomenică*, o combinațiune a celor două metode de mai sus.

Surditate (lat. *surditas*), *surzenie*, *surzire*. — Infirmiitate care constă în pier-

derea completă a *auzului*. Slăbirea au-
zului se vede mai des decât surzenia;
mai mulți aud greu, fără însă ca să
fie surzi pe deplin, așa că am putea
împărți surzenia în două feluri: *in-*
completă și completă. Surzenia se vede
la toate etățile, dar mai mult la copii
și la bătrâni. *Cauzele* ei sunt mai multe:
aprinderea sau *inflamația urechii de*
mișloc (otită medie supurată) care
vine în urma unui guturaiu la copii
mici și care este lăsată la voia întâm-
plării, necăutată, sau ca complicație



Fig. 437. — Cornete
acustice

a febrei e-
ruptive (scar-
latină), etc.;
apoi, *reflexele*
nervoase, cari
atrag numai o
surzenie trecă-
toare în urma
viermilor din
intestine, sau
a isteriei;
zdruncinarea a-
paratului audi-
tiv printr'o ex-
plozie, lovituri
de tun, etc.;
sgomotele *profe-*
sionale *violen-*
te, continue sau nu, din uzinele metalice,
telefoane, etc., *schimbarea prea bruscă a*
presiunii atmosferice, precum se întâm-
plă în urcările cu balonul, în scufundările
în apă cu scafandru, etc.; *intoxicați-*
unile, sau otrăvirile cu plumb, tutun, al-
cool; *boale generale* cum sunt: tubercu-
loza sifilisul, etc.; *ereditatea*, *bătrâneța*
(arterio-scleroza, artrismul). Surdul
vorbește sau prea încet sau prea tare,
neputându-și auzi vocea; privirea lui
este fixă, uitându-se în gura celui
ce-i vorbește; el este de obicei trist.
Ca măsură *preventivă* se recomandă
tratarea la timp și în mod energic a
oricărui guturaiu și oricărei boale de
urechi, dela început. Ceice nu sunt surzi
de tot, cari au numai auzul slăbit,
pot să-l întărească servindu-se de un
corn acustic sau de un *audiofon*, care
constă într'o placă de cauciuc tare,
care fiind foarte lungă, absoarbe o
mare cantitate de unde sonore și le
transmite la un os al craniului când
instrumentul este ținut în gură sau
sprijinit pe un număr al obrazului.

Surmenaj, *istoveală, istovire, oboseală,*
supra fatigă. — Surmenajul fizic se ob-
servă în urma sfortărilor prea mari,
continue și repetate, cari fac ca pute-
rile omului să se piardă, pulsul lui
să devină slab și mic, respirația să i-se
împiedece, să nu poată rezista la frig,
la căldură și la boale, amenințându-l
accidente grave, mortale chiar, dacă
nu se va odihni la timp și hrănindu-se
bine. Surmenajul *intelectual* își arată
efectele mai încet, mai pe nevăgăte
în seamă, dar cu timpul poate să
să sdruncine din temelie sănătatea,
micșorând rezistența la boale. Istovi-
rea aceasta se arată mai cu seamă
la copiii de școală, și la adolescenții
câtoră li se încarcă mintea cu tot felul
de cunoștințe abstracte, pe cari puterea
lor de gândire nu le pricepe îndeajuns
ca să le poată fixa. Surmenajul inte-
lectual predispune pe elev la diferite
boale de nervi și de creier, îl face mai
primitor de orice boală *microbiană*,
îl face mai puțin rezistent la frig. In-
contra tuturor acestora lumea s'a a-
larmat cu drept cuvânt și de vreo câțiva
ani încoace autoritatea școlară s'a
năzuit a ușura ocupația intelectuală
a elevilor, a o împărți în mod rațional
și a da locul cuvenit exercițiilor fizice
de tot felul: gimnastică și jocuri în
aer liber. Igiena cere ca lucrul inte-
lectual să nu treacă de 2 până la 3
ore pe zi pentru un copil de 7—8 ani,
de 3 până la 3 ore și jumătate pentru
un elev de 8—9 ani, de 4 ore pentru
unul de 10 ani și de 8 ore pentru elevii
cari au trecut de 15 ani; iar tot restul
timpului să fie ocupat de exercițiile
fizice sub toate formele și de somn.

Surpătură. — V. *Ernie și Mitră*.

Surzenie, surzire. — V. *Surditate*.

Susan. — Semințele oleaginoase co-
mestibile ale plantei erbacee *Sesamum*
indicum sau *Sesamum orientale* din fam.
Pedaliaceelor. Această plantă originară
din India estică se cultivă în Egipt,
Turcia asiatică și Persia. Din semințe
se scoate uleiul de susan, care se mănâ-
ncă întocmai ca untul de lemn. Cu
semințele de *susamum indicum* se pre-
pară *tahânu*, care se întrebuințează
la fabricațiunea *halvlei*. *Susanul* se
pune pe covrigi.

Susana. — Localitate de vilegiatură
foarte mult vizitată în timpul verii.

Este mănăstire de maici situată pe valea Teleajenului, la 4 ore departe de Vălenii de Munte și la 1 oră de mănăstirea Cheia.

Suspensor.

Banda format dintr'o pungă de pânză cusută pe o încrengătoare, tot de pânză, care se poartă pentru a susține scrotul bolnav.



Fig. 438
Suspensor

Svâcnituri. — Sunt niște dureri vii, acute, cari vin prin accese și în mod subit și cari se aseamănă cu durerile produse printr'o înțepătură cu cuțitul, cu pumnalul, cu o lance, cu un ac. Svâcniturile se simt în nevralgia facială, în caria dentară (durere de dinți, de măsele), în sugiu, în furnicele (buboaie) și se mai observă și în tumorile de rea natură, în cancer. Tratamentul svâcniturilor este același ca la toate durerile.

T T

Tabac. — V. *Tutun*.

Tabes dorsalis sau *Ataxie locomotrice*.

V. *Ataxie* și *Măduva spinării*.

Tablete sau *tablete*. — Medicamente solide, formate din una sau mai multe substanțe active învelite în zahăr și în gumă transformată în mucilagiu, cu ajutorul apei. Ele nu se deosebesc de pastile decât numai fiindcă sunt mai mari.

Tahân. — V. *Susan*.

Tăiere. — V. *Incizie*.

Tăiere împrejur. — V. *Circumcizie*.

Tăieturi. — Plăgile, sau rănirile făcute cu un instrument tăietor, sunt foarte variate ca lungime și adâncime. La orice rănire cea dintâiu grijă este să oprim sângerile punând partea rănită în apă rece pentru câteva minute, când este vorba de degete, de mână sau de picior; dacă nu se poate face aceasta, cum se întâmplă la cap, sau la piept, punem pe rană cârpe înmuiate în apă rece, care micșorează durerile și opresc sângerile. Dacă apa curată nu ajută, îi vom pune puțin oțet, sau câteva picături de perclorur de fier (acest medicament nu este bine să-l aplicăm curat fiindcă arde), vată simplă, sau fenicată, legându-se potrivit de strâns cu o fașe. După ce sângerile s'a oprit de a curge și după ce s'a curățit sângerile închiegat, vom încerca să apropiem buzele rănii, ținându-le apropiate cu una sau mai multe șuvițe de talion (emplatru diachilon), sau cun un strat de țiplă sau colodiu; pentru ca aceste lucruri să se poată aplica bine și să țină, trebuie ca mai înainte pielea să fie uscată. Pentru ca vindecarea să se facă pe

cât se poate mai iute este bine ca partea rănită să fie ținută câțva timp în odihnă și la adăpost de aer. Când plăgile sunt mai mari vor trebui cusute, ceea ce numai doctorul o poate face. Pansamentul sau legarea rănilor se va face la 3—4 zile odată, când nu este puroiu; când rana începe să facă puroiu atunci legarea se va face zilnic până la vindecare.

Talan. — V. *Pustula malignă*.

Talc de Veneția. — Este un silicat de magnezie, care conține puțin aluminiu, fier, potasă și apă. Se pulverizează cu înleznire în praf fin, dulce și unsuros la pipăire. Talcul se întrebuințează, ca și amidonul, pentru a pudra părțile umede, pentru a împiedica opărelile (excoriațiunile): la subțiori, la stinghii, printre degetele picioarelor. El este bun pentru facerea masajelor. Degerăturile degetelor, dela mâni, sau picioare, se vindecă foarte ușor introducând partea degerată într'un săculeț cu praf de talc și lăsând-o astfel până la vindecare, fără să fie nevoie de pansamente, sau alte medicamente.

Talion. — V. *Diachilon*.

Talpă, tală lată. — V. *Picior*.

Talpa mâtei. — V. *Parpian*.

Tămâie, oliban. — Este suctul rășinos care se scoate din scoarța unui arbore mic numit *Boswellia serrata* din fam. amirideelor, care crește în țara Somalilor (Africa) și în Arabia prin crăpăturile stâncilor din munți și prin pietrișurile dela baza colinelor din apropierea mării. Prin tăieturi longitudinale făcute în scoarța acestui arbore se scurge un lichid lăptos care

se întărește în atingere cu aerul, formând bucăți rotunde, globuloase, de culoare gălbuie. Tămăia are un miros plăcut și aromatic, care se dezvoltă bine abia la temperatura de 100° , când se înmoaie fără a se topi, la temperatură mai ridicată se descompune și dă naștere la vapori aromatici, proprietate care face ca ea să fie întrebuințată în ceremoniile religioase ale bisericii noastre. În medicină s'a întrebuințat pentru proprietățile ei stimulente, tonice și stomachice. Tămăia intră în compozițiunea pilulelor de cinoglos și a teriacului. Poporul o întrebuințează în contra pustulei maligne (dalac) sub formă de praf, iar la reumatism sub formă de fumuri (fumigațiuni).

Tămăioară. — V. *Micșunea*.

Tămăioară, tămăioare. — V. la *Vioarea*

Tamar indian (*Tamarinus indica*, fam. leguminoaselor). — Arbore care crește în Asia, Africa și America, al cărui fruct conține o pulpă abondentă, acriedulce, răcoritoare și ușor purgativ (laxativă). Diluată în apă foarte caldă, apoi strecurată și răcită, această pulpă constituie o băutură răcoritoare și plăcută: 15—30 gr. la un litru de apă este suficient, iar dacă punem 50—60 gr. la un litru este laxativă. Această pulpă amestecată cu sevă și preparată cu ciocolată constituie ceea ce se numește *tamar indian* sau *tamarind*, care nu produce greață nici dureri, producând un efect ușor, pentru care se dă la copii.

Tâmpeală, tâmpire. — V. *Demență și Hebetudine*.

Tâmplă (lat. *tempus*, timp). — Se numește astfel partea laterală și inferioară a craniului, cuprinsă între urechi și ochi. Prin tâmplă trec un mare număr de vase sangvine și osul fiind foarte subțire face ca rănirile și loviturile în această regiune să fie foarte primejdioase, putând produce o emoragie mare, uneori mortală.

Tanalbin, tanat de albumină. — Praful gălbui deschis, fără gust, care cuprinde jumătate din greutatea sa tanin. Lucrează ca astringent intestinal, nu este toxic; se dă în contra diareei, la copii mai ales, a enteritelor acute, sau cronice, a dizenteriei. La adulți se dă 2—4 gr. pe zi, iar la copii pe jumătate.

Tandură osoasă. — V. *Eschilă*.

Tanigen, acetiltanin. — Derivat din tanin, care nu se descompune în stomac, ci numai în intestin. Lucrează ca astringent intestinal, nu este toxic; se dă în contra diareei copiilor, a enteritelor acute sau cronice, a dizenteriei. La adulți se dă în doză de 50—60 ctgr. de 4 până la 6 ori pe zi; la copii 10—30 ctgr. de 4—6 ori pe zi.

Tanin, acid tanic, acid galotanic. — Principiu astringent foarte răspândit în organele, frunzele, scoarța, lemnul diferitelor vegetale, dar în medicină se întrebuințează taninul de *stejar*, sau de *gogoși de ristic*. Taninul este foarte solubil în apă, alcool și eter apos. El lucrează ca astringent, în contra emoragiilor pasive, a hemoptiziilor, a diareelor seroase, a leucoreei (poalei albe), a ofticei, a colicelor de rinichi, a anazarcei (dropiceii); este o contra-otrăvă a alcaloizilor (a opiumului, laudan sau morfina, a atropinei și beladonei, a digitalinei, a stricninei, a santoninei), fiindcă el formează cu alcaloizii niște săruri cari nu se topecsc în sucurile digestive, nu pătrund în sânge și pierd puterea otrăvitoare. Taninul se dă *pe dinăuntru* în doză de 2—4 gr., și mai mult; iar *pe dinafară* se întrebuințează în spălături, injecțiuni, alifii, creioane, glicerolee, colire, etc. 1—4 la 100.

Tanoform. — Product care rezultă din condensarea acidului galotanic și al formaldeidei. Praful alb roșietic, ușor, insolubil în alcool. Bun sicativ pentru plăgile provenite din decubit prelungit și pentru rănile (ulcerele) atone. Se întrebuințează singur sau amestecat cu amidon (1 la 4) în arsuri, ulcerăriuni, ozenă, etc. S'a dat *pe dinăuntru* în contra catarului intestinal cronic la adult în doză de 1—2 gr. pe zi în buline și la copii, 50 ctgrame până la 1 gr.

Tanon, sau tanopină, sau tanat de urotropină. — Se recomandă în contra diareei în doză de 1—3 gr. în buline.

Tânțari. — V. *Paludism*.

Tapioca. — Feculă alimentară care se scoate din planta *Manioc*, sau *Manihot*, care crește în Brazilia. Rădăcina acestei plante se sdrobește într'un sac cu apă, dând un suc care lasă să

se depună o feculă albă. Această feculă se spală bine și se usucă pe plăci calde, prăjindu-se puțin și aglomerându-se în grunzuri tari, cari se vând sub numele de tapiocă. Fiartă în lapte sau în bulion, tapioca se umflă și dă o supă plăcută și ușor de mistuit, din care pricină se dă mult la copiii cari se înfarcă, la convalescenți, și la bolnavii cu stomac alb.

Tapinoși. — V. *Nemțișori*.

Tărățe (lat. *furfur*). — După ce s'a cernut făina de grâu rămân tărățele, cari sunt formate din învelișul grăunțelor. Tărățele nu sunt așa de hrănitore ca făina curată, dar în schimb pânea, care cuprinde și tărățe, se mistuie ușor și ușurează eșirea afară, așa că cei ce suferă de *constipație* ar face bine să mănânce mai mult pâne de aceasta, făcută din făină cernută cu sita rară, sau numai din tărățe curate (v. *Pâne*). — Tărățele se întrebuințează în medicină pe dinafară pentru a calma iritațiunea și mănăririmea de piele, pentru aceasta se recomandă băile de tărățe (v. *Băi de tărățe*).

Taraxacum officinale. — V. la *Păpădie*.

Targă, potașcă, năsalie. — Este un fel de pat portativ, formată din mai

multe bucăți de lemn și pânză groasă, cu care se duc bolnavii sau răniții. Targa obișnuită este formată din două bucăți lungi de lemn (hulube), legate între ele cu alte 2 lemne mai mici, puse transversal, formând un fel de ramă lunguiață, pe care se întinde o bucată de pânză groasă; la capetele țargii sunt niște bretele pentru purtători. Pe această targă se pot așterne perini, sau o salteluță. La targă se mai poate pune și un fel de coviltir, care apără bolnavul de vânt, praf și de vederea trecătorilor. Sunt un fel de țargi cu roate, foarte bune, întru cât este de ajuns o singură persoană pentru transportarea bolnavului, care însă nu se simte așa de bine ca în targa obișnuită,



Fig. 439
Targă făcută
din frânhii

în care este dus pe sus. Roatele sdruncină targa mai ales când drumul nu este neted. Când n'avem targă cu




Fig. 440 — Țargi de urgență

roate, nici targă obișnuită, putem face o targă zisă de urgență, de orice ne cade în mână, de exemplu dintr'o bu-




Fig. 441 — Targă obișnuită

cată de pânză și 2 drugi, lungi de câte 2 metri, pe cari fixăm acea pânză; în locul pânzei ne putem servi la




Fig. 442 — Cărucior pentru
transportat bolnavi

nevoie de un sac, sau de 2 saci, sau chiar și de o frânhie lungă, pe care o trecem de pe o hulubă pe cealaltă, dela un capăt la celalt al hulubelor; se înțelege că pe deasupra așternem ceva mai moale. În spitale avem nevoie de o targă pe care s'o așezăm pe un

cărucior, cu roate de cauciuc, ca să transportăm bolnavii dela sala de operație la pat.

Târgu-Ocna. — Localitate climaterică, cu aer curat, dulce și răcoros. Regiunea muntoasă, pitorească. Târgu-Ocna se află la o înălțime de 260 m. deasupra nivelului Mării Negre și se mărginește cu valea Trotoșului. Stațiune mult vizată în timpul verii.

Tarhon. — V. *Granat*.

Tars (dela grec. *tarsos*, așezat în rând). — Scheletul părții dinapoi a piciorului, format din șapte oase: *astragalul*, care se încheie cu oasele gambei, *calcaneul* care formează călcâiul, apoi înainte *scapoidul*, *cuboidul* și *trei oase cuneiforme*, compunând un rând care se încheie cu oasele *metatarsului*.

Tarsalgie (grec. *tarsos tars* și *algos* durere). — Dureri pe cari le simte bolnavul în partea dinapoi a piciorului, adică în *tars*, și din care pricină piciorul capătă o atitudine vițioasă. Tarsalgia este produsă de umblet mult și de stat mult în picioare, de încălțăminte cu talpă subțire, de frig umed. Durerea la început vine în răstimpuri și este mai tare dela mijlocul tălpii spre călcâiu, ea crește prin statul în picioare și câte odată este așa de mare încât omul umbla cu mare greutate, sau nu mai poate umbla de loc. Piciorul se deformează; bolnavul calcă mai mult pe marginea dinăuntru a piciorului. *Tratament*. Repaus în pat, ghetă cu talpă care se prezintă o parte convexă adaptată la suprafața tălpii piciorului și făcută după model luat după picior, masaj, elec-tricitate, etc.

Tartric (Acidul sau *tartric*). — Se întrebuințează ca răcoritor. Se dă în limonadă 1 la 1000, sau sub formă de sirop de acid tartric, 1 la 100, din care se pune 50 gr. la 1000 apă (limonadă); praf de gazogen neutru (pulbere de Seltz); praf gazogen alcalin (pulbere Powders). Acidul tartric se poate da 2—6 gr. pe zi. — *Tartrat ferico-potasă* (v. *Fier*). — *Tartrat de potasă acid*, purgativ, 8—30 gr., răcoritor, 2—4 gr. — *Tartrat de potasă neutru*, purgativ, 15—30 gr. — *Tartrat de potasă și de sodă* purgativ, 15—50 gr. — *Tartrat de magnezie* purgativ, 10—30

gr. — *Tartrat de sodă*, purgativ, 10—30 gr.

Tartru stibiat. — V. *Emetic*.

Tătă (Sfârc de). — V. *Sfârc de țată*.

Țăța oaei. — V. *Degetar*.

Țățe. — V. *Sânuri*.

Tatniși. — V. *Nemțșori*.

Tatuare (grec. *stiktographia*). — Operațiune care constă în a imprima pe piele figuri cari nu se șterg, cu ajutorul unor materii colorante, cum sunt: cărbunele, praf, chinovar (minefal roșu produs prin combinarea mercurului cu pucioasă), cari sunt introduse în piele prin înțepături sau inciziuni. Acest obicei, care datează din antichitate, se păstrează încă la unele popoare din Asia, Oceania și Africa; el are la unele un caracter religios, dar scopul principal este de a da persoanelor tatuate o înfățișare mai temută, sau de superioritate, din care pricină tatuarea se face mai cu seamă la față, acoperind câte odată cea mai mare parte din suprafața corpului. Procedul obișnuit constă în a desemna cu condeiul, sau cu o pensulă, figura voită, pe o parte a corpului, a înfunda adânc pe liniile desemnului un ac încărcat cu materia colorantă și a spăla apoi cu apă, sau cu rachiu. Colorile întrebuințate sunt cerneală de China, cerneală roșie, cerneală albastră, chinovar, etc. Această operație de obicei nu este periculoasă; câte odată însă se întâmplă de se inflamează partea înțepată, se înroșește, se umflă și devine dureroasă, apoi se pot forma abcese și chiar gangrenă. Uneori avem nevoie să facem tatuajul unor organe, de pildă al corneei, în cazurile de albeață, când, cu ajutorul tușului de china, putem văpsi cornea în negru, așa că nu se mai cunoaște albeața.

Tău. — V. *Mlaștină*.

Taula. — V. *Crețușcă*.

Tăun (*Înțepături de*). — V. *Albine*.

Taxis. — V. *Ernie*.

Tazlău. — Este o localitate în județul Bacău, pe malul drept al Tazlăului, la poalele râului Măgura și de parte de 2½ Km. de mănăstirea Tazlăului. Ea se află la o înălțime de 528 m. deasupra nivelului Mării Negre. Apele sunt sulfuroase sodice, dar nu se întrebuințează.

Teacă. — V. *Vagin*.

Teastă. — V. *Craniiu*.

Teațire. — V. *Năut*.

Teatru. — Teatrul îți recreiază mintea, obosită de monotonia ocupațiilor zilnice și îți înalță sufletul în alte sfere, îndemnându-l la fapte nobile și eroice, așa că se explică ușor de ce teatrul a ajuns să fie absolut trebuincios vieții. Obiceiul de a merge la teatru însă are unele inconveniente; între acestea amintim întâi stricarea aerului prin îngrămădirea spectatorilor, prin lipsă de ventilație suficientă, prin căldura care se produce, din care cauză mulți au durere de cap, amețeală, greață, vărsături, opresiune, leșin (v. *Acr confinat*). Afară de aceasta, teatrul mai are alt inconvenient și acesta este faptul că lumea se duce la teatru îndată după ce a stat la masă, când începe digestia și care nu se poate face din cauza atmosferei înăbușitoare în care trebuie să stea 3—4 ceasuri; după teatru ajungi acasă foarte târziu iar somnul este neliniștit și neîndestulător, ceea ce face ca a doua zi să te scoli indispus. Copii nu trebuie să meargă la teatru înainte de 15—16 ani, sau pentru ei să se dea reprezentații numai după amezile și aceasta cât se poate mai rar. Cei ce sufăr de astmă, de palpi-tațiuni și boale de inimă, sau de plămâni, precum și cei ce sufăr de nervi, nu trebuie să meargă la teatru.

Tebaie (Extract). — V. *Opiu*.

Teină. — Alcaloid al ceaiului analog cu *cafeina* (v. *Ceaiu*).

Teiu (*Tilia platyphyllos*, fam. *tiliaceelor*). — Arbore mare și frumos care crește prin păduri

și adeseori cultivat. În medicină se întrebuințează florile, cari lucrează ca antispasmodic, calmant și diaforetic. Se dă sub formă de infuzie (ceaiu), 10—15 la 1000 gr. de apă distilată și băi. — La țară se întrebuințează foarte mult florile de teiu. Pentru *tusă* se fierbe floare de teiu, urzică și cicoare în



Fig. 443 — Flori de teiu

părți egale și cu puțină floare de lămânică; zeama se strecoară într-o sticlă și se păstrează astupată; dând bolnavului să bea de câte ori îi va fi sete. Când femeia are pierderi prea mari de sânge, la period, bea cu apă cărbune de teiu pisat.

Tekir-Ghiol. — Stațiune balneară în Dobrogea pe marginea Mării care poate fi considerată și ca stațiune climaterică marină. Lacul Tekir-Ghiol se află la 8 Km. departe de Constanța, spre sud, la o altitudine de 20 m. deasupra Mării Negre, departe de mare cu 150 m. și legat de ea printr-o limbă îngustă de pământ. Clima este plăcută, constantă; variațiunile de temperatură sunt mici. Suprafața lacului este de peste 1000 hectare; adâncimea lui, pe la mijloc, este de 8 m. Pe margini sunt trei capuri: capul Tekir, capul Sanatoriului maritim și capul Tuzla. Apa este sărată, murdară, cu densitate mare, cu miros de pucioasă (idrogen sulfurat); ea conține 35% sare, pe câtă vreme Marea nu conține decât 13%, apoi mai conține brom. Această apă poate fi considerată cloro-sodică-magneziană concentrată. Lacul este bogat în *nămol*. Stabilimentul de băi se găsește la marginea lacului din spre nord. Băile se pot face calde sau reci, cu, sau fără, *nămol*. Se recomandă în scrofuloză, boale de femei, reumatism, boale de piele, rachitism, paralizii. Sezonul începe la 1 Iunie și ține până la 15 Sept. Regiunea Tekir-Ghiol este tot atât de însemnată prin *nămolul* ei, cât și prin cura de soare care se poate face pe plaja de pe marginea Mării.

Telega. — Localitate de vilegiatură, care se află în județul Prahova. Comuna Ocna-Telega are 4000 locuitori și se află în apropiere de gara Dof-tana. Are izvoare minerale; apele saline conțin 313. 920^{0/00} de clorur de sodiu. Se fac băi în lac. Regiunea păduroasă, clima dulce și răcoroasă.

Țelero. — V. *Țelină*.

Țelină, celer, sălină, seler, țeler (*Apium graveolens*, fam. *umbeliferelor*). — Plantă erbacee, aromatică; crește prin locurile sărate de pe malul mării (Dobrogea), cultivată în grădini ca plantă culinară (Iulie—Septembrie). Rădăcina și fructele au proprietăți aperitive,

excitante, diuretice; frunzele se mănâncă sub formă de salată. Țelina ace parte din cele cinci rădăcini aperitive și intră în compoziția *siropului de cinci rădăcini* (țelină, sparanghel, anason dulce, pătrunjel, ghimbe pădureț). Ceaiul de țelină se face din 15—20 gr. la 1 litru.

Temere. — V. *Frică*.

Temperament, lat. *temperantum*). Multă vreme s'a confundat *temperamentul* cu *constituția*, deși aceste cuvinte nu au aceeași însemnare, ultimul având un înțeles mai general decât temperamentul. Prin cuvântul *constituție* se înțelege modul de alcătuire a organismului, sau starea de compunere și modul de unire a diferitelor elemente și substanțe cari intră în compoziția țesuturilor. Fiecare om se naște cu o anumită constituție, arătată printr'o dezvoltare anumită a organismului, printr'un grad de putere și printr'o rezistență mai mult sau mai puțin mare și îndelungată, față cu diferitele elemente vătămătoare. Constituția unui om se judecă după gradul de putere, după regularitatea funcțiunilor, după modul cum ea înlătură diferitele boale, precum și după gradul de vitalitate a corpului, care este arătată mai întotdeauna printr'o sănătate mai mult sau mai puțin înfloritoare. *Temperamentul* arată modul de a fi, care rezultă din predominarea de acțiune a unui organ, cum este ficatul, sau a unui sistem, cum este sistemul nervos asupra celorlalte sisteme, sau organe ale corpului. Astfel dară constituția și temperamentul au o acțiune foarte mare asupra sănătății, însă într'un caz această acțiune să face de totalitatea organismului, pe câtă vreme în celalalt caz numai de către o parte a corpului. O constituție *bună, forte, puternică*, este aceea în care toate sistemele, deopotrivă dezvoltate și deopotrivă energice, își îndeplinesc funcțiunile lor cu ușurință și activitate. Cei ce se bucură de o astfel de constituție se îmbolnăvesc mai rar decât alții, fiindcă, ei rezistă mai bine în contra influențelor stricătoare din afară; iar când cad bolnavi, ei zac mai puțin, se vindecă mai ușor și mai adeseori, în schimb însă la ei boala ia un caracter mai

acut, vine cu furie mai mare și prin urmare ei trebuiesc tratați cu medicamente mai tari, mai active, cu lăsare de sânge, cu purgative mai tari, etc. Cei cari au constituție *delicată, slabă*, nu se prea îmbolnăvesc de boale acute, inflamatoare; la ei boalele se ivesc fără sgomot, pe încetul, și cele mai adeseori boalele devin cronice și au mai multe complicațiuni, iar puterile li se slăbesc mai repede și mor mai adeseori; tratamentul în aceste cazuri va consta mai mult în medicamente stimulente și tonice. *Temperamentul* are influență asupra sănătății, variabilă după natura organului sau a sistemului organic a cărui predominare îi dă tipul său special. Sunt patru feluri de temperamente: *sangvin, nervos, limfatic* și *bili*; apoi mai sunt temperamentele *mixte*, formate prin asocierea a două temperamente între ele: *nervoso-sangvin, nervoso-linfatic*, etc. 1. *Temperamentul sangvin*. Caracterele acestui temperament sunt: pielea netedă, caldă, albă roșietică; fața colorată, părul castaniu, grăsime potrivită, gâtul scurt, pulsul tare; circulația, nutriția, respirația, calorificatia și secrețiunile se fac cu putere și în mod regulat. Oamenii cu acest temperament, când sunt bolnavi, au întotdeauna febră mai mare, sunt mai expuși la inflamațiuni, la emoragii, la boale de inimă, la inflamațiuni de piept și de încheieturi. Acești oameni trebuie să se hrănească mai puțin și cu mâncări mai puțin excitante; ei nu trebuie să bea băuturi alcoolice, nici excitante, cum sunt cafeaua și ceaiul; trebuie să ducă o viață de muncă și de mișcare, trăind în odăi mari, bine aerate și cu căldură potrivită, spre a evita îngrămădirile de sânge (congestiunile) în diferite organe; este o mare greșală pe care o fac mulți sangvinici lăsându-și sânge, din obișnuință. 2. *Temperamentul nervos* are pielea moale și subțire, albicioasă, corpul macru, mușchii puțin dezvoltați, fața palidă, slabă, foarte schimbătoare, privirea vie, fruntea înaltă, mișcările rezezi; cei cu acest temperament se impresionează ușor și puterea lor se slește cu înleznire; simțurile lor sunt foarte mobile, inteligența dezvoltată, activitatea organelor

sexuale prea mare. Acest temperament se observă mai des la femei și este adeseori combinat cu alt temperament, mai des cu cel sangvin. Boalele iau o înfățișare mai alarmantă și se însoțesc de turburări nervoase în grad mai mare; durerile sunt mai simțitoare și exagerate. Cei cu acest temperament sunt mai supuși la nevroze. Ca măsuri igienice se recomandă regim hrănitor, pază de condimente usturătoare, de băuturi alcoolice și excitante, băi calde și reci, lucru mai mult cu corpul decât cu mintea, ca să nu-și obosească sistemul nervos.

3. *Temperamentul limfatic.* Oamenii cu acest temperament au părul blond sau roșcat și subțire, ochii albaștri, pielea subțire și albă, carnea moale, buzele și ochii puțin colorați, nasul, buzele și urechile mari, obrazii roșii, dinții stricați, mâinile și picioarele mici. Sunt anemici și predispuși la scrofule; proporțiunea lichidelor cari străbat toate țesuturile este prea mare, vitalitatea și puterea de funcționare a organelor este scăzută. Acest temperament se capătă prin naștere dela părinți bolnavicioși și debili, sau se capătă prin rele împrejurări igienice, sărăcie, hrană neîndestulătoare, locuință rea, îmbrăcăminte insuficientă și diferite boale cronice. Limfaticii n'au putere să lupte în contra boalelor. ei au o predispoziție deosebită la scrofule și la oftică, ai cărei microbi îi atacă cu multă înleznire, cele mai multe boale luând formă cronică se vindecă cu mare greutate.

4. *Temperamentul bilios* pentru unii nu există, iar pentru mulți el nu ar fi decât un *temperament nervos*, cu dezvoltarea mai mare a ficatului. Caracterele temperamentului bilios sunt: pielea gălbuie, negricioasă, părul negru, tare și gros, ochii negri, expresiunea figurii pronunțată, arătând tărie de caracter, inteligența mare, musculatura puternică, corpul macru, scheletul osos, bine dezvoltat; *ficatul mare* producând multă fier (bilă); funcțiunile digestive se îndeplinesc în mod regulat și cu multă înleznire. Oamenii cu acest temperament sunt predispuși la boale de ficat, care funcționează prea mult și la boalele tubului digestiv; în special ei sunt amenințați de tranși (emo-

roizi).—5. *Temperamentele mixte*, sau *compuse*. În general temperamentul nervos și cel limfatic se văd la femei, iar cel sangvin și cel bilios la bărbați; câte odată însă se asociază câte două temperamente, adică la cel din naștere să mai întovărășește un alt temperament. De obicei se observă aceste trei feluri de împărechieri: *temperamentul nervoso-sangvin*, care se arată mai mult la bărbați și la populația de munte; *temperamentul nervoso-limfatic*, care se vede mai mult la femei și *temperamentul sangvino-limfatic*, care se observă cu deosebire la bărbați. Rezultă că constituția și temperamentul sunt ereditare, transmitându-se întregi sau prea puțin modificate, dela părinți la copii și că prin măsuri igienice, luate la timp, ele se pot modifica chiar dela început, din leagăn, dând unei constituții slabe, delicate, puterea care-i lipsește sau prevenind boalele la cari expune un temperament limfatic printr'o hrană întăritoare, un aer curat și de viață dătător, etc., micșorând neajunsurile unui temperament nervos cu ajutorul hidroterapiei, al gimnasticii, al exercițiilor fizice pozitive.

Temperant (lat. *temperans*, dela *temperare*, a modera, a domoli, a potoli).—Medicamente *temperante* sunt acele cari domolesc activitatea circulației și micșorează însușirile excitante (ațățătoare) ale sângelui, cum sunt: acidul azotic (nitric), citric, lactic, oxalic, sulfuric, tartric (băuturile acidulate), ni nitratul de potasă, etc.

Temperatură.—Se numește temperatură *starea de căldură* care se constată într'un corp, sau într'un loc oarecare. Influența variațiunilor de căldură asupra sănătății am arătat-o în articolele: *Căldură*, *Congelație*, *Frig*, *Insolație*, *Răceală*; temperatura pe care trebuie s'o aibă lichidele și alimentele de cari ne servim am arătat-o la: *Băuturi* și *Coacerea alimentelor*; iar temperatura atmosferică la: *Aer* și *Climate*. Aci ne vom ocupa de *temperatura corpului omenesc* și a *locuințelor*. *Temperatura corpului.* Când cineva are febră, temperatura corpului se ridică și aceasta se poate constata nu cu mâna, care ne poate înșela, ci cu *termometrul*. Termometrul cu care se

constată căldura omului se numește *medical*, spre a se deosebi de *termometrul de băi și apă caldă*. Cele mai bune termometre medicale sunt cele numite *maximale*, cari conțin un arătător care rămâne fixat în punctul




Fig. 444
Termo-
metru
maximal

maxim la care s'a urcat mercurul sub acțiunea căldurii. Pentru a face să se scoboare arătătorul după ce am văzut temperatura, se prinde termometrul de extremitatea cea mai groasă și se sguđuie puțin în aer, de 2—3 ori. Termometrul se pune la persoanele mari la subțioară, unde stă 5 până la 10 minute, ținând brațul strâns asupra corpului, fără ca să fie cămașă sau flanelă între piele și termometru. La copiii mai mici de doi ani este bine să se pună termometrul în șezut. Diferința între temperatura din subțioară și cea din șezut este de 5 linii, adică temperatura de 37.5 din șezut corespunde cu temperatura de 37 luată la subțioară. Temperatura trebuie luată de 2 ori pe zi, între 7 și 8




Fig. 445 — Cum se ia temperatura

ore dimineța și între 5 și 7 seara.— Temperatura omului sănătos este de 36.5 până la 37°. Ea poate crește în urma unui exercițiu violent, în timpul mistuirii; poate să scadă sub influența unei impresiuni morale penibile sau a unei dureri; dar aceste modificări nu trec peste o jumătate până la un grad cel mult. În caz de boală temperatura se ridică chiar dela început și ea are o mare importanță; când se ridică la 38° bolnavul are fe-

bră, dacă ea merge până la 39°, 40°, 41° atunci este semnul unei boale mai grave, o inflamație (aprindere) a vreunui organ important, sau al unei scarlatine, febre tifoide, pneumonii, etc. Dacă temperatura crește repede în cursul unei boale, ea arată ivirea unei complicații. Cel mai mare grad care s'a observat este 43° și atunci este un semn sigur de moarte apropiată; o scădere a căldurii în cursul unei boale arată apropierea vindecării. — *Temperatura locuinții*. Căldura camerilor de locuit trebuie ținută la un nivel constant, cu ajutorul aparatelor și materialelor de ars. Se măsoară tot cu termometrul, făcut anume pentru acest scop. Fiecare cameră trebuie să aibă termometrul său, acățat pe perete, cam pe la mijlocul camerei, nici prea aproape de sobă, nici prea aproape de ferestre, pentru ca să vedem temperatura mijlocie. Regula este ca temperatura să fie cât se poate de egală în toate camerele, pentru ca omul să nu treacă dela cald la frig, nici dela frig la cald; temperatura camerelor nu trebuie să fie prea mare pentru ca să nu nădușim, nici prea mică pentru ca sângele să circule cu înleznire. În odaia de lucru, unde omul stă nemișcat mai multe ceasuri, temperatura trebuie să fie de 16° până la 18°: o căldură mai mare ar produce greutate la cap. În *sufragerie* (prânzitor) temperatura trebuie să fie de 14—15°; o căldură mai mare micșorează apetitul și dă o senzație neplăcută în momentul când mâncarea ajunge în stomac. Nu trebuie să pierdem din vedere că temperatura sufrageriei mai crește prin respirația celor ce stau la masă, iar seara prin căldura dată de lămpi. După ce am mâncat trebuie să mergem într-o cameră cu temperatura egală cu aceea a sufrageriei în momentul când am eșit din ea, să aibă cel puțin 15°, dacă vrem ca mistuirea să se facă bine. Pentru camera de dormit temperatura poate fi cam de 15°; iarna trebuie să se facă focul seara și dimineța, ca să nu ne sculăm pe frig, iar în camera de toaletă temperatura trebuie să fie mai dulce, de 16—18°. Pentru bolnavi și convalescenți temperatura camerei trebuie ținută între 16—18°.

Temporal (osul tâmplei). — Os gros al craniului care conține organul auzului (urechia). Mușchiul *temporal*, care se prinde pe o parte a acestui os, este ridicătorul fălcii de jos. Arterele *temporale* sunt în număr de trei: una *superficială*, care șerpuște pe sub pielea tâmplei și două *profunde* cari se ramifică în mușchii regiunii temporale.

Tenară (grec. *thenar*, palma mâinii), *eminența tenară*. — Ridicătură formată de mușchii degetului mare (policelui) în partea anterioară și exterioară a mâinii.

Tendon (grec. *tetnein*, a întinde). — Tendoanele sunt niște cordoane fibroase prin cari mușchii se prind de oase.

Tenesm (grec. *teinein*, a întinde). — Simțire neplăcută de strângere și de întindere, fie la șezut, fie la gâtul beșicii, cu silă continuă și dureroasă (tăieturi) de a eși cu scaunul, sau de a face udul. Pentru tenesmul șezutului să se caute la *Dizenterie*, *Emoroizi*, *Enterită*; iar pentru tenesmul beșicii la *Beșică*, *Prostată*.

Tenia. — V. *Viermi intestinali*.

Tenifuge. — Medicamente cari se dau pentru a scoate *tenia* (panglica), cum sunt: *cuso*, *feregă*, *rodin*, etc. (v. *Viermi intestinali*).

Tenotomie (grec. *tenon*, tendon și *tome*, tăiere). — Operație care constă în tăierea unui tendon.

Tensiunea arterială. — Sângele, circulând prin vâne și artere, apasă a-



Fig. 446 — Măsurarea tensiunii arteriale

supra pereților vaselor în care se găsește și forța cu care apasă se cheamă

tensiunea sangvină. Cea mai importantă este tensiunea arterială. Când se strânge inima și sângele pornește cu forță mare în artere, tensiunea este cea mai mare, adică *maximă*, iar când se dilata (se lărgeste) sângele apasă cu cea mai mică putere asupra arterelor, avem tensiunea *minimă*. În practica de toate zilele avem nevoie de multe ori să știm care este ten-




Fig. 447. — Tensiunea arterială crește cu vârsta

A = la 20 ani; B = la 40 ani; C = la 60 ani; D = la 80 ani.

siunea arterială și pentru aceasta este de ajuns dacă știm maxima și minima; ele ne spun de multe ori că suntem în fața unui bolnav a cărui inimă nu mai este în stare să pompeze sângele în artere, sau care îl pompează prea tare. Avem o mulțime de aparate cu care măsurăm tensiunea; cel mai modern și precis este al lui Vaquez-Laubry, a cărui figură o dăm aci.

Teobromină. — Alcaloid extras din cacao, care lucrează ca diuretic și se dă în doză de 2—3 gr. pe zi, în buline de câte $\frac{1}{2}$ gr.; se continuă 2—3 zile, apoi se poate reînchepe dacă mai este trebuință. — *Acetat bisodic de teobromină*, cunoscut sub nume de *agurină*; foarte bun diuretic care lucrează în doză mai mică, 25—50 ctgr., putând merge până la 1 gr. 50 ctgr. — *Salicilatul de sodă și de teobromină*, sau *diuretina* se dă în doză de 2—4 gr. pe zi; diuretic cu mult mai slab decât *agurina*.

Teocină, *teofilină sintetică*. — Se extrage din ceai; diuretic mai puternic decât cafeina, dar nu poate s'o înlocuiască pentru că n'are acțiune excitantă asupra inimii. Se dă în doză de 60 ctgr. până la 1 gr. 50 ctgr. în buline de 20—40 ctgr., sau în prafuri, când se poate da în ceai după masă.

Teratologie (grec. *teras*, monstru și *logos*, descriere). — Parte a medi-

cinii care se ocupă cu descrierea monștrilor.

Terciu. — V. Porumb.

Terebentină. — Cea mai întrebuințată este terebentina care se scoate din *brad*. Când se distilează se obține un lichid incolor, care, în atingere cu aerul, se îngălbeneste, cu miros tare, cu gust acru și arzător, care se numește *esență*, sau *ulei de terebentină*. Terebentina se dă ca stimulent în boalele bronhiilor ale beșicii (blenoragie) în doză de 4—8 gr. în capsule, perle, poțiuni; sau sub formă de pilule de câte 30 ctgr. una, de sirop (1/10), 20—30 gr., iar pe *din afară* ca revulziv în contra reumatismului, sub formă de plastro, alifii, sau de balsam (Fioravanti). — *Esența de terebentină*, sau *uleiul esențial de terebentină*, care se scoate din *Pinus maritima*, lucrează ca stimulent energetic, viermifug, dându-se și în contra tetanului, a peritonitei puerperale, a salivațiunii mercuriale, apoi ca antidot în otrăvirea cu fosfor; iar pe *din afară* lucrează ca revulziv, rubefiant (ca muștarul), dându-se sub formă de liniamente. Pe *dinăuntru* esența de terebentină se dă în doză de 4—8 gr. în capsule perle. Ca antidot al fosforului se dă până la 30—40 gr., în pilule de câte 30 ctgr. una. Pe *din afară* se dă în fricțiuni în reumatism, în bronchite (tuse), nevralgii (sciatică), singură sau asociată cu alte substanțe (balsam Fioravanti).

Termocauter. — V. *Cautere* și *Cauterizațiune*.

Termodină. — Antipiretic, analgezic. Se dă în doză de : 50 ctgr. până la 2 gr. în buline.

Termofor. — Este un aparat cu ajutorul căruia putem ține căldura aplicată mai mult timp asupra unui organ. Sunt termofoare cu apă caldă, cum ar fi de pildă o pungă de cauciuc în care punem apă fiartă și, legând-o la gură, o aplicăm pe pânțele, ochi, etc., sau un vas de tinichea, turtit, în interiorul căruia punem deasemenea apă fierbinte și îl aplicăm pe pânțele atâta cât e nevoie. Mai bune sunt termofoarele electrice, care se încălzesc punându-le la o priză electrică, la temperatura pe care o dorim și le ținem aplicate pe organul bolnav cât

e nevoie. Unele din ele sunt mari, ca o perină și se aplică pe abdomen,



Fig. 448 — Termofor electric pentru ochi și urechi

alte sunt mici, se aplică asupra ochiului, etc.

Termometru (grec. *therme*, căldură și *metron*, măsură). — Instrument care arată schimbările de temperatură.

Terpină. — Se extrage din terebentină și se prezintă sub formă de cristale, fără miros, fără culoare, solubile. Lucrează ca diuretic, modificând secrețiunile bronchice și urina. Pe *dinăuntru* se dă 10 ctgr. până la 2 gr. în buline, pilule, poțiune.

Terpinol. — Lichid incolor, cu miros de zambilă. Modifică secrețiunile bronchice (scuipatul). Pe *dinăuntru* se dă 50 ctgr. până la 1 gr., în capsule sau pilule.

Testicul (lat. *testis*, *testiculus*), *boș*, *coiu*. — Testiculele sau glandele genitale masculine, sunt în număr de două, unul drept și altul stâng, atârinate într'un fel de pungă numită *scrot*. Testiculul are forma oului, turtit puțin în sens lateral; el are o lungime de 5 cm., o lărgime de 3 și o grosime de 2½. Testiculul din stânga este ceva mai mare decât dreptul și atârână mai în jos; greutatea mijlocie este de 21 gr. Pe partea dinapoi a testiculului se află *epididimul* (dela grec. *epi*, pe, și *didymos*, testicul), un organ de consistență moale, iar nu tare ca testiculul. Testiculul este format de o mare cantitate de canale, numite *canale aferente*, cari intră în epididim și se termină într'un canal unic, *canalul epididimului*, care la rândul său se continuă prin *canalul deferent*. Acest canal deferent, după ce trece pe lângă marginea

dinapoi a testiculului, se duce în sus spre *inelul ingvinal*, așezat la partea de jos a pântecelui și intră prin acest inel în pân-tece, unde se așează pe partea dinapoi și din jos a beșicii, apoi se duce de se deschide în canalul udului, în uretră. La testicul se duc nervi și artere și din el pleacă numeroase vine, cari se pot îmbolnăvi, devenind prea largi, ca în varice (*varicocel*). Nervii, arterele și vâenele se unesc cu canalul deferent și formează *cordo-nul spermatic*, care pătrunde în pân-tece prin inelul ingvinal. Fiecare canal deferent are ca anexă o *veziculă seminală*, care servește ca rezervor pentru spermă sămânță) și cari secretă și un fel de lichid special.

Boalele testiculului și anexelor lui.

Despre boalele învelișului, a scrotului, s'a vorbit la *ematocel* și *idrocel*, despre acele ale vinelor la *varicocel*. Aci ne vom ocupa numai de acele ale testiculului și epididimului. *Ectopia* (dela grec. *ek*, afară, și *topos*, loc), care constă în oprirea testiculului în drumul ce-l face în timpul vieții fetale din pân-tece spre scrot. Când ectopia se află în amândouă părțile avem *criptorchidie* (dela grec. *kryptos*, ascuns, și *orchis*, texticul), și în acest caz nu mai este scrot; când este ascuns numai un testicul se zice *monorchidie* (dela grec. *monos*, singur). Testiculul se oprește de obicei în inelul ingvinal, adică la partea de jos a pântecelui, unde se simte cu degetul; el poate să degenereze în grăsime, sau în cancer; alteori el rămâne în pân-tece. Tratamentul constă în operație cu ajutorul căreia testiculul se scoboară dela inelul ingvinal în scrot. — *Orchita acută* este inflamația, sau aprinderea testiculului, iar *epididimita*, inflamația epididimului; când sunt amândouă avem *orchi-epididimita*. Cauzele sunt: lovitură, rănire, efortare violentă, blenoragie, prostatită, calcul sau piatră în beșică, urechioane și boale infecțioase. *Semnele* acestei boale sunt: dureri foarte mari, cari se măresc prin atingere și prin mișcare; pielea scrotului este roșie și umflată, febră mai mult sau mai puțin mare. De obicei numai un testicul se inflamează; dar și celalt se poate inflama la rândul său. Boala durează cam 15

zile și se termină prin vindecare. *Orchita*, care este produsă de boalele cronice ale uretrii și beșicii, merge mai încet și poate sfârși prin supurație. *Orchita sifilitică* se arată la cei ce au suferit de sifilis; ea vine pe nesimțite, fără durere. Dacă tratamentul specific nu se face la timp, testiculul se atrofiază. Se mai pot ivi și *gome sifilitice* în testicule, cari interesează și pielea, inflamând-o și dând naștere la supurație. — *Orchita tuberculoasă* este mai rară, dar cu mult mai periculoasă. Câte odată începutul ei este acut, dar cele mai adeseori el se face pe încetul, epididimul se umflă, se întărește, prezentând noduri; după el începe și testiculul, apoi se prinde și scrotul și în urmă începe supurația. Tratamentul constă în operație (*castratie*) care trebuie făcută cât se poate mai din timp.

Tetan, tetanus, fâlcărița, (grec. *tetanos*, dela *teinein*, a întinde). — Această boală se arată printr'o contracțiune permanentă și foarte dureroasă a mușchilor fâlcilor și ai gâtului, cu reînnoiri convulsive, întinderea contracturilor la mușchii trunchiului și membrelor și în cele din urmă la toți mușchii corpului. Cauzele sunt rănirile mânilor și picioarelor, plăgiile contuze, etc. prin care pătrunde un *microb* special descoperit de Nicolaier, care se găsește în materiile fecale ale cailor, în gunoariile acestor animale și în pământul pe unde umblă caii. Tetanul începe cu contracțiunea (întepenirea) mușchilor fâlcii de jos (*trismus*), care contracțiune se poate mărgini aci, însă cele mai adeseori ea se întinde la mușchii din-afară ai trunchiului și ai membrelor, așa că corpul omului se îndoieste pe spate (*opistotonos*). În alte



Fig. 449 — Microbul tetanosului

cazuri mai rare sunt atinși mușchii îndoiitori și atunci capul este aplecat spre piept, genunchii îndoiți spre pân-tece, antebrățele îndoitte asupra brațelor (*emprostotonos*). În alte cazuri

și mai rari corpul se îndoieste într-o parte (*pleurostotonos*). În cele din urmă tetanul se întinde la toți mușchii corpului. La început contracturile se arată numai prin trăsături trecătoare, cari devin din ce în ce mai dese, se măresc în intensitate și se întind în mod progresiv la toți mușchii. În unele momente contracturile se mai slăbesc pentru a deveni și mai puternice. Durerea este mai mult sau mai puțin violentă, temperatura se ridică la 40—42° și chiar la 43° în ultimele zile și chiar după moarte. Bolnavul nu se poate hrăni, căci nu poate deschide gura, iar inteligența rămâne întreagă.—*Tratamentul* preventiv constă în a îngriji cu deosebire orice rană, a o curăți de corpurile străine cari se găsesc în ea, a o spăla cu substanțe antiseptice, (sublimat coroziv) mai cu seamă pe acele cari sunt murdărite cu pământ și se va recurge imediat la injecțiunile cu *ser antitetanic*, care distruge toxinele cari nu s'au fixat încă în centri. Dar acest ser antitetanic are numai un rol preventiv, căci odată boala izbucnită el nu mai are putere decât în cazuri mai rare. Cetitorul să citească articolul *Fălcarita*, unde va găsi mai multe lămuriri.

Tetanie (dela grec. *teinein*, a întinde. Contractura sau strângerea extremităților. Cauzele ei sunt turburări ale glandelor paratiroidice și ale transformării sărurilor de calciu, în organism. La animalele cărora li s'au scos glandele paratiroidice s'a observat, când au accese de tetanie, o foarte mare scădere a cantității de calciu din sânge. Tetania se arată prin furnicături și amorțirea degetelor, cari cu timpul devin țepene și sunt atinse de o contractură dureroasă; toate degetele se strâng unele asupra altora și sunt puțin îndoit (ca o mână care ar cere pomană); pumnul este de obicei îndoit, mai târziu încep și degetele dela picioare a se strânge și îndoi, iar călcâiul a fi tras în sus, așa că piciorul se încovoie. Contractura se mărginește de obicei la jumătatea corpului, dar uneori se întinde la față și la trunchiul, gât, laringe; mușchii respirației provoacă o opresiune mare și în cele din urmă contractura se înso-

tește de anestezie, paralizie parțială și de umflarea părții bolnave. Se arată sub formă de accese de o durată de mai multe ceasuri, cari se succed în aceeași zi, sau în ziua următoare; asociația acceselor constituie un atac, care poate dura până la trei luni. De altfel manifestațiunile sunt cele mai adeseori de scurtă durată și se termină prin vindecare. *Tratamentul*. Se va da bromur, cloral sau alt calmant; se va da suferindului, mai multă vreme, calciu și extras din glanda paratiroidă. Repaus în pat, băi prelungite calde, cloral. — La *fară* poporul numește această boală *strâns*, mai ales când ea se arată la copii, cari au dureri de șale, se svârcolesc și se înțepenesc. *Strânsul* se mai numește tot pe graiul poporului și *apucat* el este de două feluri: *strânsul cel mic*, sau *strânsul copiilor* și *strânsul cel mare*. Babele freacă copilul bolnav de strâns cu untdelemn, peste tot corpul, iar peste șale îl înfășoară cu puțină balegă de porc, prăjită cu seu de lumanare și pusă pe frunză de varză. În unele locuri se fac scăldători de sovârv cu floare cu tot și cu scuturătură de fân, sau cu spân vânat (v. *Fălcarită*).

Tetrageni. — V. *Microbi*.

Teuerium chamaedrys. — V. *Dumbăț*.

Thea chinensis. — V. *Ceai*.

Thymus serpyllum. — V. *Cimbrisor*.

Thymus vulgaris. — V. *Lămâioară*.

Tibia. — V. *Genunchiu*.

Tic. — Se numește astfel o mișcare convulsivă, care se repetă într-o parte a corpului și care rezultă din contracțiunea involuntară a unui sau a mai multor mușchi. Ticul se vede mai cu seamă la față și la cap; el constă în trăsărituri repezi și trecătoare, asemenea celor produse de electricitate, cari fac să se încrețească fruntea, să se ridice un colț al gurii, schimbând pentru câteva secunde fizionomia. Uneori ticul se vede la gât, care se îndoieste într-o parte sau în alta și apleacă capul în dreapta, sau în stânga, înainte sau înapoi. Câte odată este prins umărul, care se înalță și se coboară, brațul sau mâna, cari se mișcă în toate senzurile, gamba sau piciorul, cari se îndoiesc sau se întind, etc. Mai sunt o mulțime de gesturi și de

atitudini, cari la început se observă mai rar, apoi cu timpul devin din ce în ce mai dese, încât obosesc pe om. Tratamentul ticului constă în educație și părinții sunt chemați să-și observe de aproape copiii și de câte ori văd aceste ticuri să-i dojenească până ce se desvâță de ele. Oamenii mari se vor desvâța singuri; prin voință și hotărâre, căutând să se abțină sau să facă mișcări în sens invers. Când aceste mișcări sunt întreținute de o excitațiune a sistemului nervos se vor da preparate de opiu, de beladonă, bromur de potasiu și alte medicamente calmante.

Tichie, chitie, căciuliță, căiță, scufie. E bine ca persoanele pleșuve să poarte tichie, care-i apără de guturaiu, durere de cap. De asemenea și copiii de țâță trebuie să aibă scufiță, pentru ca să nu răcească la cap.

Tidvă de apă. — V. Nufăr.

Tidvă de pământ. — V. Impărătească.

Tiflită (grec *typhlos*, orb). — Aprinderea sau inflamația cecului și a apendicelui său (v. *Apendicită*).

Tifoidă (Febră), *dotienenterie, lungoare, friguri tifoide, ileotifus, tifus abdominal* (cuvântul *tifoidă* vine dela grec, *typhos*, abatere, stupoare, toropeală și *eidos* formă). — Dintre boalele molipsitoare foarte răspândită este *febra tifoidă*, bine cunoscută și în poporul nostru, mai ales prin durata ei lungă, de unde îi vine și numirea de *lungoare*, sau *lungoare*; pe alocurea țărani o mai numesc *boală mare*, sau *boală rea*. Lungoarea atacă cu deosebire pe oamenii dela 15 până la 30 ani, mai rar pe copii și mai rar pe bătrâni. Ea este produsă de un *microb* numit *bacilul lui Eberth*. Purtătorii acestui microb sunt apa, aerul, rufele și hainele murdărite de scaunele bolnavilor. Dar cel mai primejdios purtător este *apa de băut*, apa cu care gătim mâncarea. Epidemiile cari se ivesc în orașe, ca și epidemiile dela sate, sunt produse de apa murdărită de scaunele bolnavilor. Aceste scaune aruncate lângă un puț, lângă o fântână, sau lângă un râu, străbat prin pământ și ajung în apă, iar cei ce se slujesc de această apă otrăvită se îmbolnăvesc de friguri tifoide. În acest mod boala se întinde peste o parte

din sat, peste tot satul, sau din sat în sat, peste un ținut întreg; tot astfel se întâmplă și la orașe prin apa de fântâni, prin apa de râu, sau prin apa adusă prin canale, cari alimentează tot orașul și care vine în atingere cu materiile din latrine (privăți) prin mijlocul unor crăpături, sau prin aruncarea lor deadreptul în râu. Boala se propagă cu înlesnire și prin lapte, în care s'a pus apă infectată. Microbul febrei tifoide se poate ridica în aer și prin aer se poate transporta în mâncări și băuturi; aerul *umed* este mai priincios pentru acesta. Ce din apropierea bolnavului pot căpăta boala



Fig. 450 — Microbii febrei tifoide

umblând cu *rufăria* murdărită de scaunele lui și ducându-și apoi degetele otrăvite la gură, sau pe mâncare. Tot așa de periculoase sunt hainele și așternutul pacientului. Lingoarea atinge de obicei numai odată pe om; uneori însă același om poate să zacă de această boală de mai multe ori în viața lui, dar în aceste cazuri el nu este așa de grav bolnav cum a fost întâia oară. — *Semneli* lungoarei sunt mai multe și se deosebesc după cele *trei perioade* ale boalei. În *perioada I*-a omul are o durere de cap stranică și neîntreruptă; stă culcat pe spate, iar dacă se ridică se clatină ca și când ar fi beat. El este fără putere, are amețeli, văjiituri de urechi, dureri de șale, prin mâni și picioare, și mai pe sus de toate neputință de a dormi. Limba este alburie, adeseori roșie pe margini, uscată, se lipește de deget; lipsă totală de poftă de mâncare, sete mare. Pântecul se umflă, este dureros la pipăit, mai ales în partea dreaptă și spre vintre. În cele dintâiu 2—3 zile omul este încuiat (constipat), apoi este cuprins de urdinare. Splina crește și este dureroasă. Celor mai mulți bolnavi le curge sânge din nas. Fierbinteala (căldura) este mare și începe cu fiori; ea crește încetul cu încetul, în toată ziua cu câte un grad, fiind dimineața mai mică decât seara; mai mare este cam

pe la 5-a sau 6-a zi, ajungând până la 40°; inima bate de 100 până la 150 de ori pe minut. Unii bolnavi tușesc. În *perioada a II-a*, cam pe la începutul săptămânii a doua, durerea de cap se micșorează, dar bolnavul începe a aiura, uneori fiind liniștit, alte ori furios; limba este uscată, aspră, crăpată și funingioasă, tot așa sunt buzele și gingiile. Înghițirea se face cu anevoiță, pânțele este tot cam umflat, urdinarea deasă și adeseori bolnavul iese afară în neștire. În această perioadă se ivesc niște pete roșii de mărimea unui bob de linte, cari pier prin apăsarea cu degetul, pentru ca să se arate din nou după ridicarea lui; ele se arată pe pielea pânțecelui și a pieptului, rar pe spate. La unii se mai arată și astfel de pete, cari nu pier prin apăsarea degetului; la alții se ivesc niște beșicuțe mici, dese și numeroase pe la subțiori, pe gât și pe piept, cari se sparg, scurgându-se un fel de apă. Fierbințeala este de 40—41°, rămânând astfel cam 9—10 zile. Bolnavul slăbește foarte mult, este cam surd și într-o stare de toropeală foarte mare; limba tot uscată și setea mare. În *perioada a III-a*, dacă bolnavul merge spre vindecare, toate semnele boalei se îndreptează; pacientul începe a se simți, fierbințeala scade, slăbiciunea nu mai înaintează, pofta de mâncare vine, ba încă prea mare. Dacă bolnavul merge spre rău, atunci slăbiciunea se mărește din ce în ce și bolnavul se stinge pe nesimțite, sau moare de vreo complicație cum ar fi: aprinderea sau inflamarea peritoneului (peritonită) produsă prin spargerea mațelor, scurgere de sânge (emoragie) prin șezut, junghiu, etc. O complicație care se vede des este surzenia; la mulți le cade părul; alții capătă dropică (boală de apă), uni fac puroiu în diferite părți ale corpului etc.—Vindecarea se face foarte încet și bolnavul este supus spre sfârșit la multe complicații, din care cauză trebuie bine păzit. Pofta de mâncare fiind foarte mare, trebuie să-l păzim de mâncare multă, ca să nu-l întoarcă boala. Durata febrei tifoidice, când merge bine, este de 21—30 zile, iar în cazuri de complicații

ea poate ține până la 80—90 zile — *Tratament*. Febra tifoidă n'are un tratament sistematic, care să se poată aplica în toate cazurile, fără deosebire de vârstă, de forme, de complicații. Fiecare febră tifoidă își are tratamentul său, după condițiunile individuale ale bolnavului. Tratamentul de căpetenie însă, până acum, sunt *băile reci*, cari se aplică la orice bolnav tânăr, care are inima bună, neobosită și care are o temperatură de 39°. Băile reci au o lucrare binefăcătoare întru cât ele schimbă forma gravă a boalei într-o formă ușoară, sau împiedecă pe aceasta de a deveni gravă. Băile reci trebuiesc date chiar dela începutul boalei. Baia va fi așezată lângă patul bolnavului; apa să fie de 28°. Bolnavul este pus în baie, iar apa trebuie să-l acopere până deasupra umerilor. În 2—4 minute trebuie să răcim apa în mod progresiv până la 23, 22, 20°. Se va supraveghia starea bolnavului, pulsul, starea de congestie, sau de paloare a feței, ritmul respirator și la trebuință se va face o injecție cu eter, cafeină sau ulei camforat. În timpul băii vom stoarce un burete ud asupra cefei, iar pe cap vom pune cârpe ude reci; este bine să se fricționeze în apă mâinile, picioarele și pieptul bolnavului. După 8—15 minute bolnavul simte un fior, ceea ce însemnează că a sosit timpul ca el să fie scos din apă; se șterge repede și ușor, se pune în pat învelindu-se într-o plapomă de lână, dându-i-se un ceai cald cu câteva picături de coniac, sau lapte cald, ori bulion. După baie bolnavul mai întotdeauna asudă, se simte mai bine și doarme liniștit, iar căldura scade cu o jumătate până la un grad. Se vor face 6 băi în 24 ore; în formele grave (ataxo-adinamice) 8—10. Când nu putem întrebuința băile vom aplica *cearsăfuri reci*, adică vom înveli bolnavul într'un cearșaf gros înmuiat în apă rece și stors bine, iar după 10 minute îl vom pune în alt cearșaf tot așa de rece, urmând astfel până la 5—6 cearșăfuri. În formele ușoare ne vom mulțumi cu *spălături*, sau *fricțiuni* peste tot corpul, cu apă rece, sau cu oțet simplu, sau aromatic. Cearșăfurile precum și spălăturile se vor face re-

gulat din 3 în 3 ore. Pe cap și pe pânțele se vor pune cârpe reci. Bolnavul își va clăti gura de mai multe ori pe zi cu apă fiartă, sau boricată, parfumată cu câteva picături de mentă, iar dinții se vor spăla cu peria și cu o pastă de dinți. Este bine să se facă clizme reci de 15—20 grade cu apă care a fost fiartă, punând un litru la fiecare clizmă. — *Regimul*: dietă absolut lichidă și anume: lapte fiert curat, sau cu puțină cafea sau ceai, bulion, apă cu vin, limonadă de lămâie, de portocale, de sirop de coacăze. În lapte dulce se poate pune de 2 ori pe zi câte un gălbenuș de ou; Afară de lapte dulce se poate da și lapte bătut. Toate acestea se vor da des, la fiecare oră, în cantitate potrivită. Apa care se dă să fie fiartă, sterilizată. Cantitatea totală a lichidelor în 24 ore trebuie să fie 3—4 litri pentru ca să înlezim eliminarea toxinelor. — Ca *medicamente* vom da antiseptice intestinale: naftol, betol, benzonaftol, salol, salacetol, salicilat de bismut, acid lactic, clorofom, și altele. *Medicațiunea tonică* va consta în vin negru, tăiat cu apă; la alcoolici li se va da coniac, 60—100 gr. pe zi; la bătrâni și la cei slabi vin vechiu cald, sau ceai cu rom, sau cu coniac; preparatele de chinchina, etc. — *Sero-terapia* febrei tifoide s'a făcut cu ser luat dela cai imunizați prin injecțiuni repetate de toxine. Acest ser are mai mult o acțiune preventivă, din care cauză el trebuie injectat la om chiar dela începutul boalei; se va injecta serul în doze slabe. *Serul antitific* este foarte util, în timpul epidemiilor, pentru a păzi pe cei sănătoși să nu ia boala. Injectat la toată populația unui sat, oraș, sau regiune, putem opri epidemia cu multă ușurință. — Bolnavul de febră tifoidă trebuie pus într'un pat comod, simplu, așezat într'o cameră mare, bine aerată, fără perdele, fără covoare, având ca mobilier numai strictul necesar. Scaunele bolnavului vor fi sterilizate cu sulfat de cupru (500 gr. de sulfat de cupru la 10 litri apă); oala de noapte se va spăla des, precum și lighienele. Persoanele din jurul bolnavului nu vor bea, nici nu vor mânca nimic în camera bolnavului și întot-

deauna își vor spăla mai întâi mâinile cu săpun și soluțiuni antiseptice. — În timp de epidemie apa și laptele se vor bea numai după ce s'au fiert, sau sterilizat. Locuințele și mai cu seamă latrinele se vor ține în stare de curățenie mare și se vor dezinfecța des, mai cu seamă latrinele, cari trebuiesc deșertate și în cari se va turna des apă de var. Măsurile de pază nu sunt greu de executat: să nu bem apă de cât dela izvoare cunoscute ca curate, contrariu s'o fierbem. Microbul febrei tifoide trăește multă vreme, și în bune condiții, în gheață, de aceea să n'avem încredere în cea naturală, adunată de prin bălți și să nu uităm că și cea artificială poate să fie infectată de căruțașii cari o aduc la locuință.

Tifus exantematic (grec. *typhos*, abater, stupoare, toropeală). — Este o boală infecțioasă (molipsitoare) al cărei microb nu se cunoaște până acum. Tifusul se aseamănă cu febra tifoidă și cu febrele eruptive, în special cu pojarul. El se vede foarte des în Irlanda și în Silezia, mai rar în Germania și în Franța. În mod epidemic se găsește în Rusia, în provinciile baltice și în Polonia. În România, până acum 25 de ani, am avut epidemii de tifus în închisori și câte odată epidemii mici în garnizoanele militare. Epidemia grozavă din timpul războiului 1916—1919 ne-a cerat zeci de mii de vieți în mai puțin de 1 an. Cazuri sporadice de tifus s'au observat în București în unele locuinți mizerabile, ocupate de oameni necurați (măturători de stradă, bragagii, servitori). Tifusul se mai cunoaște și sub numele de *tifus peteșial*. Se dezvoltă mai cu seamă unde se află îngrămădiri de oameni, la cei ce trăiesc în sărăcie, murdărie, lipsiți de hrană îndestulătoare, cari sunt supuși la oboseli, la suferințe morale și fizice, cari trăesc în aerul stricat al închisorilor, al unor cazărmi, etc. Microbul care produce boala nu se cunoaște, dar e sigur azi că este transmis dela om la om prin înțepăturile păduchilor. Cel ce a suferit odată de tifus este scutit în viitor. — Tifusul are 3 perioade. În *perioada I*, numită de *invaziune*, bolnavul are fiori, durere

de cap, tremurături, amețeli, căldură mare, neliniște, lipsă de somn, o stare de toropeală adâncă. În *perioada* II, sau de *erupțiune*, încep să se ivească niște pete roșietice la început, cari devin mai târziu roșii închise (negre, de unde și numele de *tifus negru*). Aceste pete se arată mai întâiu pe pânțele, apoi pe tot corpul, afară de față. Semnele din *perioada* I merg crescând și bolnavul începe să aiureze (să aibă delir violent) de obicei el este constipat. În *perioada* III starea de abatere și de toropeală devine mai pronunțată, până ce bolnavul moare. În cazurile de vindecare febra scade repede și cu ea dispar și celelalte simptome. — *Tratamentul* general igienic și dietetic este ca și acela al febrei tifoide. Antisepsie riguroasă. Medicatiune tonică (vin, alcool, cafea). În contra febrei și a delirului se vor întrebuința *băile reci*, (v. *Tifoidă — febră*), dându-se și chinină. În contra constipației se vor face clisme. În contra turburărilor respiratoare se vor pune ventuze uscate pe piept, se vor face injecții cu eter, cu camfor, inhalații cu oxigen. În cazurile de adinamie (lipsă de putere) se vor da excitantele difuzibile cum sunt: acetatul de amoniac, cafeină, eterul. *Tratamentul profilactic* constă în paza pe care trebuie s'o instituim ca bolnavii să nu mai vină în contact cu cei sănătoși. Cum boala se ia prin intermediul păduchilor ne vom îngriji ca bolnavul, hainele și rufăria lui de pat să fie deparazitate; distrugând toți păduchii, cari conțin în ei germenul boalei, păzim oamenii sănătoși de a lua-o.

Tifus abdominal. — V. *Tifoidă* (Febră).

Tigenol. — Antiseptic și antiparazitoid. Se dă pe *dinafară* în soluțiuni sau în alifii, 15—20 la 100.

Tigvele. — Munte care face parte din șirul de munți ai Gorjului. Stațiune climaterică la o înălțime de 750 metri deasupra nivelului Mării Negre. Climă foarte plăcută și constantă; localitate pitorească.

Tilia platyphyllos. — V. *Teiu*.

Tilichin. — V. *Tulichină*.

Timian. — V. *Cimbrisor*.

Timol (acid *timic*). — Este principiul

activ al plantei *thymus vulgaris* (lă-măioară). El lucrează ca antiputrid puternic, succedaneu al acidului fenic. Se dă în doză de 50 ctgr. până la 2 gr., iar injecțiuni sub piele în doză de 20—50 ctgr.

Timp. — V. *Rodu pământului*.

Timpan (dela grec. *tympanon*, tobă). V. *Urechie*.

Timpanism. — V. *Gaze intestinale*.

Timpanită (dela grec. *tympanon*, tobă) Se numește astfel umflarea pântecelui prin producțiune de gaze multe în intestine, cum se întâmplă în cazurile de încurcătură de mațe (ocluziune intestinală) sau în peritonită.

Tinctură (lat. *tingere*, a văpsi). — Medicament lichid care se prepară dissolvând una sau mai multe substanțe vegetale, mai rar animale sau minerale, în alcool și câte odată în eter. Cele mai întrebuințate în medicină sunt tincturile făcute cu alcool, care disolvă și păstrează bine medicamentele. Tincturile sunt medicamente tari, foarte active. Tincturile tonice și stimulente, cum sunt cele de chinină, de gențiană, de revent etc., se dau cu lingurița (1—2 pe zi), pe câtă vreme cele făcute cu substanțe otrăvitoare (digitală, opiu, beladonă, etc.) se dau numai cu picăturile, cu mare băgare de seamă și numai după îndrumările date de doctor. Acestea se dau pe o bucată de zahăr, sau mai bine în apă, sau într'o poțiune. Pe dinafară cea mai întrebuințată este tinctura de iod (v. *Iod*), care de altfel se poate da și pe dinăuntru, în picături, în unele cazuri de opresiune respiratoare, de gușe, de scrofula, etc.

Tinea, chelbe, chelie. — Sub acest nume se înțeleg două boale ale pielei capului: una numită *tricoșiție*, sau *tinea tonsurantă*, iar cealaltă numită *favus*, sau *tinea favoasă*. Unii pun în acest loc și boala cunoscută sub numele de *peladă* sau *alopécie arcată*, care este o *chelie fără bubă* (v. *Peladă*). I. *Tricoșiția*. Această boală se produce printr'o ciupercuță microscopică numită *trichophyton tonsurans*. Ea se arată pe pielea capului, unde formează *erpesul tonsurant* (chelbe, chelie), la barbă sub numele de *sicoză tricoșitică*, sau *mentagră* și pe alte părți ale pielei, sub numele de *erpes circinat* (*pecin-*

gine, cur de găină). Cauza boalei este un parazit vegetal format din niște tubi lungi, regulați, puțin onduțați, lipiți cap la cap și cu ramificațiuni departe unele de altele și din spori.

Acest tricofit a fost inoculat la unele animale și pe diferite mediuri și s'a reproduș. Tricofiția se ia prin atingere, direct și indirect, prin pălărie, căciulă, broboadă, pieptene, șerve-



Fig. 451

Bulbul părului năvălit de ciuperca favusului (1) și ale herpesului tonsurant (2).

vete, mâni, etc. Cânele, calul și vitele cornute transmit cele mai adeseori primele cazuri. În școală boala se propagă cu mare înleznire. Bărbierii transmit boala prin briciu, pieptene, pomade, perii, etc. — 1. *Tricofiția capului* numită și *erpes tonsurant*, sau *linea tonsurantă* (chelbe, chelie). Această boală constă în aceea că pielea capului prezintă pe o suprafață, a cărei mărime variază dela aceea a unui ban până la aceea a unei piese de 5 lei, uneori și mai mare, un fel de răsură, par'că ar fi rasă, însă în mod incomplet, firele de păr fiind rupte deasupra pielei. De obicei această boală se vindecă, mai ales când este tratată. *Tratamentul* are de scop de a nimici focarele infectante și parazitul. Înainte de toate trebuie să se facă *epilația*, adică să se smulgă fir cu fir tot părul din goliștea sau placa tricofitică, cu o cimbistră, cu o scufă de plastore galben (talion), care aplicată pe cap, după ce părul s'a lipit bine, se ridică repede și trage toate firele de păr, mai ales cele bolnave, cu ajutorul razelor lui Roentgen sau, tot cu electricitate, prin diferite aparate. Bolnavul va fi despărțit de cei sănătoși și va purta capul acoperit cu o scufă, care se va spăla des. — 2. *Sicoza tricofitică*, sau *mentagra*, este aceeași boală ca cea de mai sus, dar se numește astfel fiindcă se arată în barbă. Ea începe prin niște noduri roșii, cari cuprind părul la mijloc și de jur împrejurul lui se află o beșică plină de puroiu. *Trata-*

mentul și aci constă în curățirea și epilarea completă a părților atinse și a regiunilor periferice, întrebuintând apoi spălături emoliente cu leșie de tărâte și cu săpun negru, sau săpun gudronat, după care se va unge partea bolnavă cu alifii paraziticide dimineața și seara. Bărbierii vor fi obligați să-și țină instrumentele în cea mai mare curățenie, dezinfectându-le în apă care fierbe, în soluțiuni tari de acid fenic, sau în alcool; perii și pieptenii se vor dezinfecta în sublimat coroziv 1 la 1000; pudra și pomătuful, cari vor fi servit la un client bolnav de această boală se dau la o parte, nefiind permis a se servi de ele la cei sănătoși.



Fig. 452 - Favusul capului

3. *Tricofiția circinată*, sau *erpes circinat* (pecingine). Această boală începe cu o pată roșie rotundă; epidermul din mijlocul acestei pete se deslipește în lamele mici, iar în jurul petei se ivesc beșicuțe mici, formând cercuri. Pata se întinde din ce în ce ajungând la mărimea unui leu și chiar a unei piese de 20 lei. Părțile pe cari se ivește de obicei această boală sunt: fața, ceafa, gâtul, antebrățele, dosul mâinilor. *Tratamentul* constă în ungeri cu *vințură de iod*, până când se produce o iritație mare, în piele, sau în ungeri cu alifii pe cari le va prescrie doctorul. Tricofiția poate să se dezvolte și la unghii de unde prin scărpănare se poate întinde la cap, sau în alte părți. Prin urmare trebuie tratate și unghiile bolnave, căci dacă nu, boala se va repeta. — II. *Tinea favoasă* sau *favus* (cuvânt latin care însemnează fagur de miere), iar de poporul nostru numită *chelie căprescă*. Această boală este produsă de parazitul *Achorion Schönleini*. Acest parazit se desvoltă de obicei pe pielea capului, unde atacă perii, făcându-i să cadă, intrând în ei și în epidermul din vecinătate. El se poate dezvolta și în alte părți unde este păr mic.

foarte rar pe unghii. În cazuri foarte rare se poate întinde pe mucoasa tubului digestiv (esofag, stomac, mae). Parazitul este vegetal, format din tubi și spori. Sporii sunt rotunzi în bubele favusului și turtiți în păr, unde formează lăntișoare și sunt înveliți într-o cămașă de celuloză. Tubii sunt simpli, noduroși, articulați și ramificați; unii au spori se întind în păr numai în lungimea lui, formând o rețea cu ochiuri lunguețe și așezate după axa firului. Ei străbat, plecând dela epiderm, se lasă în jos pe țeava părului până la rădăcină, de unde intră în bulb și apoi se suie în corpul firului de păr. Uneori parazitul pătrunde deadreptul în fir. Prin urmare leziunea favică cuprinde epidermul, părul și apoi dermul. Contagiunea se face prin trecerea parazitului deadreptul dela un bolnav la cel sănătos sau la animale, prin locuire la un loc și prin aer, sau prin trecerea indirectă cu obiectele cu cari s'au servit cei bolnavi: pălărie, căciulă, ștergar, pieptene, etc. Favusul se localizează de obicei pe pielea capului; se poate ivi și în alte părți cu păr ale pielei și la unghii. *Tratamentul.* Vindecarea se obține cu atât mai iute cu cât tratamentul se face mai la începutul boalei; ea este sigură până când tecile perilor nu sunt atrofiate. Tratamentul constă în tăierea părului, apoi se ridică cojile (crustele) înmoindu-le cu ajutorul cataplasmelor, după care se face epilația, adică se smulge părul. Razele X aduc și în aceste cazuri mari foloase.

Ținere de minte. — V. *Memorie*.

Ținerea corpului. — V. *Atitudine*.

Ținerete. — V. *Adolescență*.

Țintaulă, țintaură. — V. *Fierea pă-mântului*.

Țioel, gaiacol sulfonat de potasă. — Pulbere care conține 60% gaiacol. Se dă în contra otitei și a diareei. Doză: 2—8 gr. până la 16 adult; la copii câte 50 ctgr. de fiecare an; în buline, poțiune, sau sirop.

Țioform, ditiosalicilat de bismut. — Praf galben, fără miros, care lucrează ca *iodoformul*.

Țiperig (Spirt de). — V. *Amoniac*.

Țipete. — Țipetul copilului, când se naște, este un fel de plâns pe care l-am

putea numi *orăcăire*, și el este provocat de atingerea aerului cu care corpul copilului nu este încă obișnuit și de pătrunderea aerului pentru întâia dată în plămâni lui, ceea ce de sigur îi produce o simțire neplăcută sau chiar dureroasă. Această primă impresiune ține puțin și țipetul încetează îndată ce copilul este înfășat și pus la sân. De aci înainte copilul țipă pentru a-și arăta trebuințele, iar țipetele lui sunt bine cunoscute de mamă, sau de doică. Până la vârsta de 3—4 luni, copilul *țipă fără să verse lacrimi*, din care pricină cei ce nu știu aceasta cred că copilul este rău, supărăcios și că țipă fără nici o trebuință, iar pentru ca să-l împace încep să-i dea tot felul de ceaiuri și siropuri, dintre cari unele făcute cu mac ca să-l adoarmă, ceea ce este foarte rău pentru sănătate. Nu este bine să lăsăm copilul *să țiepe prea mult*, căci aceasta poate să-i provoace convulsii, sau surpătură, etc. Când copilul *țipă fără motiv*, fără trebuință, se cunoaște după aceea că deși plânge mult, sănătatea lui rămâne tot bună, că el nu slăbește și atunci vom căuta să-l împăcăm prin diferite cântece sau arătându-i diferite obiecte lucitoare sau zgomotoase, cari să-i atragă atenția. Uneori copilul *țipă fiindcă este prea strâns înfășat*, ceea ce este ușor de constatat desfășându-l, după care copilul tace. El țipă întotdeauna când *îi este foame* și atunci își întoarce capul în toate părțile, își deschide gura ca și cum ar căuta țâța, dă din mâini și picioare, sau își prinde un deget în gură și îl sugă; pentru aceasta cel mai bun lucru este ca să-i regulăm ceasurile de supt, cam la 3 ore ziua, la 3—4 ore noaptea (vezi *Alăptare*). Țipetul de foame se deosebește de cel de durere, care este mai tare, crescând în raport cu durerea și în timpul căruia fața copilului ne arată suferința, iar corpul său se mișcă în mod dezordonat; cele mai adeseori el are *mătrice* (colici intestinale). Când copilul a trecut de 4 luni începe să plângă cu lacrimi, ori de câteori are vreo trebuință. Țipetul slab este semnul unui sfârșit apropiat, atunci când copilul s'a născut aproape asfixiat, când este mai mare este semnul unei slăbiciuni mari în urma unei

boale învechite, a unei diaree rebele, etc. Țipetul *ascuțit, sunător*, care s'ar asemui cu lătratul de câne, este semnul unor boale de laringe și de bronhii (crup fals, sau gușter, tuseă măgărească, etc.). Țipetul *răgușit, spart și acoperit*, ne arată că este vorba de un crup de natură difterică.

Țiplă. — Este o peliță foarte subțire, mlădioasă și transparentă, făcută din mațe de bou sau de oaie. De obicei această țiplă este acoperită cu gumă pe una din fețele ei, *țiplă gumată*, cu care o aplicăm pe deasupra sgărieturilor, rănilor și arsurilor superficiale și mici ale pielei, udând cu puțină apă partea gumată, pentru ca să se lipească bine. Sub această țiplă rana se vindecă la adăpost de aer și de murdărie, văzând cu ochii, căci ea fiind transparentă putem vedea cum se face vindecarea. Când vrem s'o ridicăm, sau s'o înlocuim cu alta, n'avem decât s'o udăm cu puțină apă caldută. Când o aplicăm trebuie să așteptăm întotdeauna ca sângele să se oprească, pentrucă altfel nu se lipește.

Tiroidă (Glanda). — Se află așezată dedesubtul și de fiecare parte a laringelui. La unii oameni ea crește și formează ceea ce se numește *gușă*. Glanda tiroidă se întrebuințează ca medicament sub formă de pulpă proaspătă, de berbec, în contra *mixedemului*, a *gușei*, a *psoriazei* și a *obezității*. *Tiroidina* este praful uscat al glandei tiroide, care se dă în aceleași boale ca și ea. S'au observat însă unele accidente la întrebuințarea tiroidinei, din care cauză ea trebuie dată cu multă băgare de seamă. *Tiroidina*, sau *iodotirina*, este un produs scos din glanda tiroidă care conține mult *iod*; se dă în boale ca și tiroidina și cu aceleași precauțiuni. *Boalele tiroidiei*. Uneori glanda tiroidă se




Fig. 453. — Glanda tiroidă și timusul

- 1 = glanda tiroidă
- 2 = tracheea
- 3 = timusul
- 4 = plămân

mărește, se umflă și produce boala numită *gușă*, în care se produc, pe lângă mărirea de volum și modificări în structura ei. Această boală, de o deosebită însemnătate pentru țara noastră, am descris-o la capitolul *gușă*. *Gușa exoftalmică*, sau *Boala lui Basedow* se arată prin mărirea glandei tiroide, deci *gușă*, care de cele mai multeori este mică, ochii sunt eșiți în afară (exoftalmie), palpitații și tremurături ale mânilor și capului. Ochii sunt uneori atât de bulbucăți că te înspăimântă, dându-i bolnavului înfățișarea unui nebun. Boala se arată mai adeseori la femei ca la bărbați și le produce în același timp oprirea menstruației, insomnie, le face nervoase. Bolnavul slăbește și de multe ori moare de tuberculoză, sau din cauza slăbirei inimii. Se ivește adeseori după o lovitură a capului, după o boală infecțioasă, cum ar fi febra tifoidă, reumatismul, sifilisul. Cauza adevărată ar fi o excitare prea mare a nervului marele simpatic și turburările glandei tiroide. **Tratamentul**: este foarte variat, dela caz la caz. În general se dă chinină; salicilat de sodiu, digitală, *ginergen* (un nou preparat din secara cornută), care are puțința de a răi bătăile inimii într'un grad oarecare. **Tratamentul** cu *iod* este folositor, dar trebuie dat cu multă grijă și în doze mici. Nu se va da iod fără sfatul medicului. Prin operație s'a reușit în ultimii ani să se aducă o îmbunătățire de lungă durată în starea bolnavilor (tăierea simpaticului). Bolnavii să stea liniștiți, la țară dacă se poate, să nu fie supărați de nimeni, să nu li se dea cafea și ceai prea mult să bea.

Tismana. — Această faimoasă mănăstire se găsește în județul Gorj, într'o poziție din cele mai pitorești. Localitate de vilegiatură, cu un climat plăcut, dulce și constant.

Tizana. — Băutura făcută din infuzia, decoctiunea sau macerația unor substanțe medicamentoase într'o mare cantitate de apă și care se bea cu ceașca, sau cu paharul. Tizanele sunt simple, sau compuse. În aceste din urmă se pot topi și unele substanțe medicamentoase, pentru ca să fie mai active. Tizanele sunt îndulcitoare, sau calmante, amare sau aperitive, anti-

spasmodice, astringente, depurative, digestive și stomachice, diuretice, laxative, pectorale, răcoritoare, sudorifice.

Toaletă. — V. *Abluțiuni, Săpun.*

Toamnă (lat. *autumnus* sau *tumnus*). Acest anotimp ține la noi cam dela 1 Septembrie până la Decembrie. Toamna se ivește frigul și umezeala, cari produc atâtea boale: guturaiul, durerile de gât, răceala, crupul, tusa, junghiul, reumatismul, apoi se mai observă în acest anotimp febra tifoidă, colicele de intestine și diareea. Trebuie dar să ne păzim de răceală și de umezeală, să ne îmbrăcăm potrivit, mai ales dimineața și seara; cei obișnuți, să pună flanelele și ciorapi de lână.

Toană. — V. *Manie.*

Tocătură, carne tocată. — De obicei mănâncă tocături oamenii cari n'au măsele cu ce să macine carnea și le-ar fi peste putință să mănânce carnea sub formă de rasol și mai ales sub formă de friptură. Să nu înghițim carnea tocată, sub orice formă ar fi gătită ea, s'o ținem mai mult timp în gură, frământând-o cu gingiile pentru ca să se amestece cu *saliva*, care este trebuincioasă la mistuire. În acest mod se poate recomanda mănăcarea cărnii tocate.

Tofus (*tophos*, orice concrețiune tare). Se numește astfel orice îngrămădire de fosfate calcare, sau de urate, cari se fac de obicei în apropierea încheieturilor la cei suferiți de *gută* și *reumatism*.

Tolu. — Balsamul de Tolu, sau balsamul de Peru se scurge din tăieturile făcute în coaja arborelui *Toluijera Balsamum*, din fam. leguminoaselor, care crește în provincia Tolu din Columbia. Acest balsam are un miros plăcut, un gust dulce și o acțiune foarte mare în contra guturaiului, a catarului de piept, a bronchitelor (tusei) a laringitei acute și cronice. El mai lucrează ca stimulent și diuretic. *Pe dinăuntru* se dă sub formă de: balsam 5 ctgr. până la 2 gr.; emulsiune 2 la 100; sirop 30—60 gr.; tablete, după voie; tinctură 4—8 gr.; în poțiune. *Pe dinafară* se întrebuințează Balsamul de Peru.

Tonic (*tonos*, tensiune, vigoare, putere). — Se numește tonic oricare agent, sau medicament, care redeșteaptă

activitatea vitală a unui organ, sau a organismului întreg, care dă putere. Medicamentele tonice, sau *întăritoare* se deosebesc de cele *excitante* sau *stimulente* prin aceea că ele lucrează încet, în mod progresiv, iar efectele lor durează timp mai îndelungat, pe câtă vreme excitantele lucrează repede și efectul lor ține puțin; astfel alcoolul și toate preparatele alcoolice sunt stimulente, iar vinul este un tonic. Tonicile pentru ca să aibă efect trebuiesc continuate mult timp, mai multe săptămâni, sau chiar luni. Când este vorba de tonice, mai înainte de a ne gândi la medicamente, trebuie să ne adresăm naturii, care ne dă cele mai bune *întăritoare*, fără de cari tonicele luate din farmacie n'ar avea nici un efect. Iată cari sunt tonicele pe cari ni le pune igiena la dispoziție: *aerul și lumina soarelui*; aerul uscat, nu cel umed, aerul proaspăt, curat, dădător de viață, dela țară și de pe malul mării; lipsa de aer și de lumină dă naștere la anemie, la lipsă de sânge; — *hrana*, sau *alimentele* bune, constituiesc regimul așa zis *tonic*, care se compune din carne, ouă, lăpturi și brânzeturi, asociate cu făinoasele (mai ales lintea) și cu grăsimi și zahăr; — *vinul* de calitate bună, în special vinul negru, natural și vechiu; — *exercițiul* în aer liber și *idroterapia* sub diferite forme. Medicamentele tonice cele mai importante sunt *fierul* cu toate preparatele lui, *chinchina*, *arsenicul*, *fosfatul de calce*, *coca*, *kola*, *untura de pește*; apoi *amarale* (cuasia, colombo, gențiana, nuca vomică); ele deșteaptă apetitul, întăresc stomacul făcându-l să mistuie bine, ceea ce înleznește absorpțiunea substanțelor nutritive și dă putere organismului.

Topic (*topos*, loc). — Se numesc medicamente *topice* acele cari se aplică pe dinafară, pe locul dureros sau bolnav: cataplazmele, vezicătorile, muștarul, etc.

Torace. — V. *Piept.*

Toracenteză (*thoras*, piept și *kentein*, a găuri, a înțepa). — Operațiune prin care se scoate lichidul din cavitatea pleurală. Toracenteza se face cu ajutorul unui tub metalic care este ascuțit la un capăt, iar la celalt este în raport, printr'un tub de cauciuc, cu

un vas de sticlă în care se face *vid* și unde vine lichidul tras din piept, cum se întâmplă la *Pleurezie*.

Toropeală, moleșire, apatie, stare de abatere, de obosire, de amorțire.—Starea de toropeală se deosebește după vârsta celui atins. La *bătrâni* este cu mult mai mare; *copiii* cer într'una să fie ținuti în brațe, sunt ursuzi, îndărătnici și nu le mai plac jucăriile și petrecerile, după cari râvneau mai înainte așa de mult. De altfel la orice vârstă și oricare ar fi gradul de abatere, obosiții au ochii înfundați în cap, fața este trasă, palidă și arată un fel de lăncezeală, indispoziție generală. La copii mici de tot singurul semn al acestei stări de oboseală este această *schimbare la față*. — *Cauze și tratament*. Nu trebuie numai decât să ne înfricăm când vedem pe cineva din casă că este *abătut*. Înainte de toate trebuie să căutăm pricina. Astfel la omul adult, sau la adolescent, ea se ivește de multe ori când schimbarea anotimpurilor se face repede. Pătimașul suferă în același timp de o scădere sau o pierdere a poftei de mâncare, dimineța la deșteptare are gura rea, iar în timpul zilei nu mai poate de sete. Când starea de toropeală vine dintr'o pierdere mare de sânge, din nas sau altă parte, vom da bolnavului o băutură spirtuoasă și stimulentă, puțin rachiou, sau țuică tare, sau rom, ori câteva picături de eter (10—15) pe zahăr, sau în apă de băut, apă de melisă, vin bun, vechiu. — Dacă această stare este venită în urma unei otrăviri, vom da bolnavului mai întâiu să verse, apoi va lua din celelalte leacuri. — Când starea de moleșire nu ține de aceste împrejurări și merge crescând însoțit de ferbințeală, durere de cap, sau de piept, de turburări în mistuire, etc. atunci ea este înaintemergătoarea unei adevărate boale, în care caz trebuie chemat un doctor, singur în stare de a cunoaște acest lucru. — Starea de toropeală se vede mai des la *copii* decât la oamenii mari. Ea vine adeseori fără nici o pricină vădită și încetează dela sine în câteva ceasuri. Alteori ea este pricinuită de o ușoară turburare în mistuire, de bătaia soarelui sau șederea lângă un foc prea mare, sau de un joc greu

sburdalnic; o odihă nă de câteva ceasuri și nițică dietă este deajuns ca să treacă. Adeseori ea vine din eșirea prea anevoioasă a dinților, sau dintr'o ridicare a temperaturii din afară, ori dintr'un accident sau întâmplare nenorocită. Dacă această stare de abatere nu încetează, atunci trebuie să ne temem de vreo boală gravă și să chiemăm doctorul. La *bătrâni* starea de toropeală este un semn rău, căci adeseori ea prevestește o îngrădădire de sânge (congestiune) la piept sau o îmoiere de creeri. Ne vom feri de a le da să facă spălături reci, sau să bea spirtuase, le vom recomanda să facă băi călduțe scurte și să bea câte puțin vin bun, ceea ce îi ușurează numai decât, afară de cazul când această stare este începutul unei boale grele. Uneori starea de moleșire se poate ivi la sfârșitul unei boale grele, în convalescență; atunci vom da reconstituantele (chină, fier, duș rece, untură de pește) și o hrană bună (carne, lapte, ouă, vin vechiu) și pentru orășeni vom recomanda să se ducă, dacă se poate, la țară.

Torticolis, gât strâmb. — Se numește astfel aplecarea gâtului și a capului asupra trunchiului, mai întotdeauna însoțită de sucirea capului. *Cauzele* sunt mai multe: o cicatrice vicioasă a pielii în urma unei arsuri sau abces, o fractură sau scintire a șirii, o nevralgie, spasme, care se arată cu ocazia unei munci oarecare, paralizii ale nervului spinal, dar cele mai adeseori torticolisul este de origine musculară, fiind produs de o răceală, de reumatism. Se mai poate produce această boală printr'un flegmon al gâtului, prin adenite tuberculoase, printr'o miozită sifilitică, prin manoperile obstetricale din timpul nașterii. Mai toate aceste cauze produc un torticolis *permanent*, pe câtă vreme torticolisul *trecător* se produce de frig, o poziție rea în timpul somnului, sau de isterie. Cauza adevărată pare a fi o leziune de origine nervoasă centrală. În torticolis *permanent* de obicei leziunea se află la dreapta și *nu este dureroasă*: capul este aplecat în partea dreaptă, bărbia este îndreptată în partea opusă, gâtul este cu mult mai scurt din partea aplecată și se simte

un fel de coardă formată de contracțiunea mușchiului. După câțva timp se produce o strâmbare compensatoare a șirii spinării în partea ei dorsală, ceea ce face ca umărul drept să se ridice și umărul stâng să se coboare; partea dreaptă a feței devine mai mică decât stânga. În torticolisul *trecător* strâmbarea gâtului este tot astfel, cu aceleași semne din partea gâtului și capului, dar el este *dureros* și uneori însoțit de căldură; acest torticolis se mai numește *acut*, spre deosebire de cel permanent, *cronic*. — *Tratament*. În torticolisul produs de răceală se dă salicilat de sodă, aspirină, antipirină exalgină, acetopirină, piramidon, diferite fricțiuni excitante, cu balsam Fioravanti, cu liniment volatil cu liniment amoniacal camforat, cu ol. de terebentină; iar mai târziu masaj.

Toxic (gr. *toxikon*, otrăvă). — V. *Otrăvire*.

Toxine. — V. *Microbi*.

Trachea-arteră (gr. *trachos*, aspru, și *arteria*, arterie). — Este un conduct elastic aerian, care începe dela laringe și merge până la *bronchii*. Are forma unui tub cilindric, turtit pe fața dinapoi, așezat pe linia mijlocie și înaintea esofagului; are o lungime de 12 ctm. și o lărgime de 2 ctm. Ea se compune din 16—20 cerceulețe sgârcioase, unite între ele și de laringe printr'o peliță fibroasă și elastică, căptușită pe dinăuntru cu o altă peliță moale, umezită fără încetare printr'un lichid mucos secretat de niște glande presărate în grosimea ei. Astfel fiind constituită, trachea-arteră își păstrează lărgimea așa că aerul pătrunde întotdeauna cu înleznire din laringe până la plămâni, atât la dus, cât și la întors. Aerul este împiedecat uneori de a intra în trachee printr'un corp străin oprit în laringe, printr'un polip sau un cancer al laringelui, prin falsele membrane cari se fac în boala numită *cruș* (gușter). În aceste cazuri aerul nu poate pătrunde în plămâni și omul moare de asfixie; pentru a evita aceasta se face operația numită *tracheotomie*, adică tăierea tracheei pe o întindere oarecare și punerea unei țevi (canule) de argint, prin care aerul să pătrundă cu înleznire. Inciziunea sau tăierea tracheei, se face pe linia mijlocie, în

partea de sus a ei, imediat sub laringe. Canula stă pe loc până ce se vindecă boala care a împiedecat aerul să intre în plămâni, când se ridică, iar rana se vindecă cu mare ușurință în câteva zile. În cazurile când obstacolul la respirație nu dispare niciodată, bolnavul va trăi cu canula în gât până la moarte.

Trachom. — V. *Ochiu* (*Conjunctivită granuloasă*).

Trahana, *frecăței*. — Pastă alimentară care se prepară ca și fidea, dar nu sub formă de fire lungi, ci sub formă de grăunțe. Trahanaua se mistuie ușor.

Trandafiri. — Sunt mai multe varietăți de trandafiri, ale căror flori au un miros plăcut, însă tare. *Trandafirul sălbatec*, *măcieș*, *cacadâr*, *rug*, *ruje* (*Rosa canina*, fam. rozaceelor), este un arbust spinos, ale cărui flori sunt albe, rare, plăcut mirositoare (*răsură*, *ruje*) și ale cărui fructe sunt lungărețe, sau globuloase, roșii și se înmoaie numai după primele înghețuri (*măciase*, *măcieșe*, *scoabe*). Măcieșul crește în tufișuri. În medicină se întrebuințează fructul, care este astringent și este baza conservei de cinorodon, foarte mult întrebuințată la prepararea hapurilor. Oțetul de flori de trandafiri se întrebuințează pe dinafară în fricțiuni, pentru ca bolnavii să asude și să scape de răceală. *Trandafirul de dulceață*, *roză* (*Rosa centifolia*), arbust spinos, originar din Asia mică, se cultivă adesea ca plantă decorativă și pentru trebuințele caznice; prin cultură s'au obținut varietăți numeroase. Din flori se face *dulceață*. Din florile acestui trandafir se face *apa de trandafiri*, care se întrebuințează în colire, la conjunctivite ușoare. *Siropul* se dă ca laxativ, 10—30 gr., care asociat cu *sinamichia*, sau *sena*, ne dă siropul de trandafiri *compus* și care este purgativ. *Esența* de trandafir intră cu ceara albă și cu untura de porc în prepararea *pomadei* de trandafir, sau *pomadei rozate*, cu care este bine să se ungă omul pe buze în timpul iernii.

Trânjii. — V. *Emoroizii*.

Tranzfuziune (lat. *transfundere transfusum*, a vărsa dintr'un vas într'al-tul). Operația care constă în introducerea în căile circulatorii ale unui bolnav sânge dela un om sănătos.

Această operație datează din anul 1667, când s'a făcut pentru întâia oară la om, injectându-i-se sânge de miel, după care bolnavul s'a vindecat. Mai târziu s'a făcut transfuziunea sângelui dela om la om. Sângele care



Fig. 454 — Obiecte trebuincioase la transfuzie

trebuie transfuzat la om, este cel de om, de oarece sângele unui animal, după ce a fost introdus în vinele omului, se descompune, globulele lui se nimicesc și hemoglobina pusă în libertate



Fig. 455 — Cum se face transfuzia

devine un corp străin și poate produce accidente grave. Aparat mai noi dau puțină azi să se facă transfuzia fără personal mult și cu cea mai mare siguranță de sterilitate. Bolnavul fiind așezat aproape de cel ce-i dă sânge, aparatele de azi dau puțină medicului ca sângele, scos din vâna celui sănătos, să fie introdus îndată la cel

bolnav, fără să mai vină în contact cu aerul; acele legate la cele 2 tuburi sunt introduse în vânele celor 2 persoane și medicul nu face altceva decât ca, printr'un aparat, să tragă sângele dela persoana sănătoasă și să-l împingă, în același timp, în vâna bolnavului. Pentruca totul să meargă repede, așa cum cere nevoia în asemenea cazuri, personalul spitalelor este cercetat azi ce fel de sânge are, înscriind pe toată lumea într'un tablou; când vine un rănit în spital determinăm și grupa lui sangvină, recunoscută ușor după anumite calități ale sângelui, alegem din tabloul spitalului persoana care are sânge din aceeași grupă și executăm transfuzia imediat. În orașele mari există chiar centre, sau spitale de transfuzie, unde se găsește sânge de dat în orice moment. Transfuzia de sânge se recomandă în emoragiile grave, desperate, cari nu se pot opri prin alte mijloace, cari se ivesc în timpul sarcinii și după naștere, sau în urma rănilor, sau operațiilor chirurgicale, cari au cauzat mari pierderi de sânge. Ea se mai recomandă și în unele cazuri de anemie și cloroză și în unele boale infecțioase.

Transpirație (lat. *trans*, prin, și *spirare*, a sufla). — Acest nume se dă la exalațiunile și secrețiunile cari se fac la suprafața pielii (v. *Sudoare*).

Trăsnet (lat. *fulmen*), *fulger*. — Când descărcarea electrică se face între nor și om, poate rămânea mort pe loc prin închiegarea sângelui și oprirea repede a tuturor funcțiunilor. Descompunerea tuturor lichidelor face ca corpul să putrezească repede. Când omul nu moare pe loc, ci numai a căzut la pământ, trăsnetul îi topește și îi volatilizează obiectele de metal, pe cari le are asupra lui, îi zbârlește și îi arde părul, barba, hainele producând arsuri mai mult sau mai puțin adânci și vânătăi (echimoze), ca în urma unei lovituri puternice; alteori trăsnetul nu produce efecte exterioare, ci lucrează numai asupra sistemului nervos, producând fără veste paralizia mânilor și picioarelor, pierderea auzului, gustului, pipăitului, vederii, etc. Când trăsnetul n'a omorât pe loc, omul atins rămâne într'o stare de tâmpeală, pentru care trebuie să-l reînsuflețim prin fricțiuni

energice, stropiri pe față cu apă rece, simplă sau amestecată cu oțet, să-i punem la nas oțet sau eter, iar pe dinăuntru o băutură *cordială* (v. acest cuvânt). Apoi vom îngriji arsurile prin mijloacele obișnuite, tot așa și echimozele, vânătăile, iar pentru a evita gangrena care se poate ivi în regiunile atinse punem *oblojele* calde, uscate sau umede. Paraliziile, deși adeseori nu se mai pot vindeca, le va îngriji numai doctorul.

Tratament. — Prin acest cuvânt se înțeleg mijloacele, fizice și morale, precum și medicamentele date pe dinăuntru și pe dinafară, cari se întrebuințează cu scopul de a vindeca, a ușura, sau de a scurta o boală.

Traumaticină. — Soluție de gutapercă în clorofom (1 la 10). Se întrebuințează în boale de piele și în erizipel, sau brăncă.

Traumatism (grec. *trauma*, rănire).

— V. *Răniți și Răniri*.

Traumatozol, iodoeresil, iodocresină. — Succedaneu al iodoformului conține 54 la 100 iod. Pe *dinăuntru* se recomandă ca antiseptic și astringent, în contra diareei tuberculoase, în pilule de câte 1 ctgr., 5—10 pe zi, în mod progresiv. Pe *dinafară* se întrebuințează ca și iodoformul.

Treapd. — V. *Diaree*.

Treapd cu sânge. — V. *Dizenterie*.

Tremurătură (lat. *tremor*, *tremere*). — Se numește *tremurătură* o agitațiune involuntară a corpului sau a unei părți, compusă dintr'o serie repede de mișcări încolo și încoace, cari însă nu împiedecă mișcările voluntare, ci numai le micșorează preciziunea. Tremurătura este generală sau parțială, putând fi mărginită la o jumătate laterală a corpului, la un membru, la un mușchiu, sau la un grup de mușchi, etc.; poate să fie continuă, alte ori intermitentă (cu întreruperi), nearătându-se decât cu prilejul unei mișcări determinate, sau neînctând de loc prin odihnă, sau venind decât când cineva întinde mâna cu degetele depărtate. Aceste caractere ale tremurăturii ne pun pe cale de a ghici boala căroare ele se datoresc. Astfel, în cazurile de *otrăvire* cu alcool, tutun, mercur, opiu, plumb, cafea, ceai, etc., tremurătura este ge-

nerală. La *alcoolici* se vede tremurătura dacă-i punem să-și întindă mâinile cu degetele desfăcute. La cei ce suferă de *ataxie locomotrice* tremurătura este mărginită uneori la un membru. În *paralizia generală*, la început, tremurătura este foarte mărginită, ocupând mai ales mușchii feței, limbii, buzelor, câte odată mușchii membrilor superioare. În *paralizia agitantă* (boala lui Parkinson) tremurătura la început este parțială, apoi se întinde peste tot, afară de cap, și încetează pentru moment prin efortarea atențiunii și când se caută a se face o mișcare intenționată, pe câtă vreme ea persistă în timpul odihnei. Tremurătura la bătrâni (*senilă*) începe cu capul și numai cu timpul se întinde și la alți mușchi. Tremurăturile nervoase, precum și cele ale convalescenței, isterie, etc., se apropie de acelea cari se văd la otrăviri. În tot cazul, imediat ce se ivește vreo tremurătură, trebuie să se consulte un doctor, care singur este în stare să cunoască boala care o produce și să instituie din timp tratamentul apropiat.

Trepădătoare, brăie, buruiănă cănească, slobonov, (Mercurialis annua, fam. euforbiaceelor). —



Fig. 456

Plantă erbacee care crește prin locuri cultivate, pe lângă ziduri vechi, prin dumbrăvi. Această plantă este emolientă, laxativă; este un purgativ popular, multumită unui principiu amar care se topește în apă. Mai este și diuretică (face ud mult). Se întrebuințează mai cu seamă sub formă de decoctiune (fierătură), 15 la 500; de extract apos, 4—8 gr.; de miere cu trepădătoare (părți egale de suc și de miere) încorporată mai ales în clizme purgative (30—60 gr. pentru adulți și 5—10 gr. pentru copii).

Trepan și trepanațiune (grec. *trypanon*, sfredel). — Se numește *trepanație* o operație care constă în a face deschizătură în părțile craniului cu ajutorul unui sfredel speciale numit *trepan*, pentru a da scurger, puroiului, sau pentru a opera o tue-

moră, sau pentru a scoate niște oase infundate în creier în cazurile de răniri.

Trestie mirositoare.—V. *Obligeană*.

Trichiază (grec. *thrix*, păr).—În această boală părul genelor este întors spre globul ochiului, pe care îl freacă și îl irită în continuu. Trichiaza se deosebește de *entropion*, prin faptul că aci este numai părul întors spre ochi, pe câtă vreme în *entropion* este și marginea pleoapei întoarsă cu păr cu tot. (V. ochiu).

Trichină, Trichinoză.—*Trichina* ste un vierme lung în forma



Fig. 457 — Trichină

sucul gastric topește pungulița în care se află și viermele fiind liber trece în intestinul subțire, unde se oprește în partea de sus a lui, se dezvoltă acolo și se înmulțește formând *trichinoza mațelor*. Trichinele mature mor în mațe și sunt date afară cu materiile fecale, iar cele tinere străbat prin perețele intestinelor și se răspândesc în mușchi, unde se învelesc în niște pungulițe și dau *trichina mușchilor*. Carne de porc este cauza



Fig. 458 — Trichină închistată într'un mușchiu

acestei boale la om și trichinoza se observă foarte des în țările în cari carnea de porc se mănâncă crudă. La noi se observă mai rar de oarece carne de porc se mănâncă bine friptă, sau fiartă, iar în Germania, unde se mănâncă mai mult sub formă de mezeluri și șuncă, nefierte, se observă des și chiar sub formă de epidemii. Trichinoza este o boală originală a porcilor, cari

o capătă mâncând materiile fecale ale porcilor cu trichinoză intestinală.—**Semnele** la om în prima perioadă sunt: turburări digestive, adică dureri de stomac și de pânțe, greață, vărsături, urdinare, lipsă de poftă de mâncare, însoțite de slăbiciune mare. Aceste semne dispar după două săptămâni, dar în formele grave se mai însoțesc de o stare de toropeală foarte mare, de febră vie, de dureri din ce în ce mai mari și perzistente în membre, de buhăiala feței, de lipsă de somn; bolnavul din pricina durerilor, cari cresc la orice mișcare, este condamnat să stea în repaus aproape absolut; uneori are și delir o tasă seacă și deasă, apăsare în piept, tot atâtea semne cari fac să te gândești mai mult la o febră tifoidă. În cazurile cele mai grave bolnavul își pierde puterile, respirația devine din ce în ce mai scurtă, deasă și foarte greoaie, iar moartea vine prin asfixie. Este foarte greu să se cunoască boala după aceste semne și numai atunci ele ne pot pune pe cale când știm că bolnavul a mâncat carne de porc trichinată, sau când boala se arată sub formă de epidemie.—**Tratament.** Când bănuim că bolnavul a mâncat carne trichinată și e la începutul boalei, îi vom da numai decât un purgativ tare, ca să-l scoată de mai multe ori afară. Când trichinele sunt numai în mațe vom da santonină, 30 ctgr., calomel 1—2 gr., împărțite în 6 pachete, din cari bolnavul va lua câte una la fiecare 2 ore. Când însă trichina a ajuns în mușchiu nu mai avem ce-i face. Astfel fiind cel mai bun tratament este cel preventiv, adică să oprim mâncarea cărnei de porc despre care nu suntem convinși că este sănătoasă. Pentru aceasta trebuie ca orice carne de porc să fie examinată cu microscopul înainte de a fi pusă în vânzare. Apoi pentru mai multă siguranță consumatorul să nu mănânce carne de porc decât bine friptă, sau fiartă, căci căldura omoară trichinele, cari nu pot suporta o temperatură mai mare de 75°. Carne de porc trebuie friptă, sau fiartă, cel puțin 2 ceasuri, pentru ca să fie pătrunsă până la mijlocul ei. Prin acest mijloc omul nu va suferi nici odată de trichinoză.

Tricocefal (gr. *thrix*, *trikhos*, păr,

și *kephale*, cap). — Vierme fin, lung de 3—4 cm. și gros de o zecime de milimetru.



Fig. 459 — Tricocefal
1 = viermele; 2 = oul său.

Acest vierme intră în om de obicei cu alimentele și trăiește în mațul gros (cecum și colon).

Trifenină. —

Pulberea albă, cristalină, cam amară, care lucrează ca antitermic, anti-

piretic și antinevralgic. Se dă în doză de 1—3 gr. pe zi, în buline de câte o jumătate gram.

Trifoiste, trei frați, trifoiu amar, trifoiu de baltă, (*Menyanthes trifoliata*, fam. gențianaceelor). — Plantă erbacee aquatică, ce crește prin lacuri și mlăștini. Frunzele conțin un principiu, *meniantină* și se întrebuințează în medicină ca întăritoare, în contra frigurilor și în contra scorbutului. Se dă sub formă de ceai (infuziune) din 10—15 la 1000; extract 1—2 gr.; praf 60 ctgr. până la 1 gr. în buline.

Trimetilamină. — V. Propilamină.

Trinitrină. — Se întrebuințează în soluție alcoolică de unu la sută, din care se dau 2—3 picături pe zi, ca antispasmodic antinevralgic, antiisteric. Se mai dă și în injecțiuni sub piele: din soluțiunea de 1 la 100, se pune 40 picături la 10 c. c. de apă distilată din care se fac 2—3 injecțiuni pe zi, în afecțiunile aortei și în angina de piept.

Trional. — Sulfonal în care un atom de metil s'a înlocuit cu un atom de etil. Lucrează ca ipnotic și calmant. Se dă în doză de 1—2 gr., producând un somn de 6—8 ceasuri. Se dă în buline, iar după luarea fiecărui bulin să se bea o ceașcă de lichid cald (ceaiu de floare de teiu, de nalbă, de mușătel, etc.

Troahnă. — V. Catar.

Troahna cailor și a măgarilor. — V. Răpciugă.

Tromboză (gr. *thrombos*, chiag). — Se numește astfel închegarea sângelui într'un vas sanguin și astuparea lui. Această tromboză produce gangrena

(mortificarea) întregii regiuni hrănite de acel vas, dacă cumva nu se stabilește o circulațiune colaterală suficientă.

Tuberculoză (lat. *tuberculum*, nod), atac, *tusă seacă. Ftizie, oftică.* — Tuberculoza este o boală infecțioasă datorită unui microb, numit *bacilul lui Koch*. Este foarte răspândită, ia o mulțime de înfățișări anatomice și clinice, are o evoluție foarte variabilă, după puterea infecțiunii și rezistența organismului. Microbul acestei boale are forma unui bastonaș (bacil) fin, drept sau puțin strâmb, a cărui lungime este de 2 până la 3 mimi de milimetru. În scuipat, unde de obicei se constată, el este ceva mai alungit, strâmb, câte odată fragmentat și sămănat cu spațiuuri luminoase. Acest microb nu se poate vedea la microscop decât numai dacă se vâpsește cu anilină și mai cu seamă cu fucsină fenicată. Bacilul lui Koch poate fi ușor cultivat pe oarecari medii speciale. Rezistă la agenții de uscare și virulența lui nu este decât micșorată prin căldura uscată la 100°, pe câtă vreme căldura umedă de 71° face să piară cu totul. *Razele soarelui îl distrug* în câteva ceasuri, iar lumina difuză îl omoară în mai multe zile. Bacilul ofitei secretează *otrăvuri*: unele *difuzibile*, agenți ai efectelor generale ale bacilului lui Koch asupra organismului și a căror tip este *tuberculina* lui Koch; altele *aderente*, cari explică acțiunea locală exercitată de bacil în locul în care vegetează. Tuberculina lui Koch injectată la un animal, sau la omul bolnav, determină reacțiunea locală și generală făcând în țesutul pe care îl inflamează niște noduri, sau *tubercule*, de unde a provenit și numele acestei boale: *tuberculoză*. Aceste tubercule, se pot vedea cu ochiul liber și pot avea trei feluri de înfățișări: sau sunt ca niște granulațiuni, mici, opace, de mărimea unui bob de meiu, (*granulațiuni cenușii*), sau sunt ca niște noduri mari, ca bobul, sau galbene și mai mult sau mai puțin imoiate (*tuberculele lui Laëneg*), sau sunt ca niște mase de diferite mărimi, de culoare gălbue, de consistență moale (*infiltrațiuni cazeoase*). În toate aceste producțiuni leziunea elementară, care se recunoaște

TUBE

TUBE

la microscop, este *foliculul tuberculos*, care arată unitatea fundamentală a tuturor soiurilor de tubercule mai sus înșirate. *Foliculul tuberculos* este format de trei feluri de elemente, cari corespund la trei zone; în centru este *celula gigantică* (uriașă), cu marginile neregulate, care conține o mare cantitate de noduri, dispuse în mod diferit (în formă de secere, etc.). Bacilul lui Koch se află cu deosebire în celula uriașă, în centrul, sau la periferia ei, ceea ce înseamnă că tuberculul este o *producțiune care arată rezistența la învălirea microbiană*. Tuberculul, în unele cazuri, poate să nu aibă celula uriașă în altele să aibă mai multe celule uriașe. Când începe cazeificațiunea, tuberculul își schimbă aspectul. Am spus mai sus că tuberculul apare ca o *leziune de rezistență a organismului*, produsă cu ajutorul secrețiunilor bacilare, cari însă sunt influențate prin natura chiar a terenului, asupra căruia se dezvoltă bacilul. După acțiunea reciprocă astfel exercitată de bacil și elementele celulare ale organismului, neoplazia fibrocazeoasă evoluează către *scleroză*, care este un proces de vindecare, sau către *cazeificațiune*, care este un proces de agravare. Sunt cazuri, după cum rezultă din cercetările mai proaspete, în cari bacilul poate lucra fără să provoace leziuni foliculare, lucrând numai prin otrăvurile lor, difuzibile, sau aderente, cari produc leziuni inflamatoare, scleroase sau nu, de aparență banală. Bacilul lui Koch se găsește în scuipat, în puroi, în materiile fecale ale ofticșilor, în laptele și în unele părți ale animalelor cari servesc la alimentație. Când unele din aceste substanțe se usucă fără să fi fost distruse, bacilii ajung în atmosferă sub formă de praf. — Tuberculoza este contagioasă dela om la om, dela animale la om și dela om la animale. Ea poate atinge toate țesăturile, toate organele. Ne vom ocupa în acest articol de tuber-




Fig. 460 — Bacilii tuberculozei

culoza plămânilor, sau *pulmonară* și de aceea a *intestinelor* (*enterita tuberculoasă*). — Sunt mai multe feluri de tuberculoze: uneori leziunile sunt mărginite la unele țesături (*locale*), în cari microbii rămân închiși și în acest caz contagiunea nu se mai poate face; alteori leziunile sunt deschise, în raport cu exteriorul în cari microbii sunt dați afară cu scuipatul și puroiul și atunci contagiunea se face cu mare înleznire. — Tuberculoza poate fi foarte *acută*, adică să aibă un mers foarte repede, a cărei gravitate și dezvoltare repede se datorește și faptului că pe lângă bacilii lui Koch se întovărășesc și alți microbi (ai erizipelului, pneumoniei, etc.). Tuberculoza poate fi *acută*, a cărei dezvoltare se face mai încet; dar cele mai adeseori ea este *cronică* și încă cea mai gravă din toate boalele cronice și cu mortalitatea cea mai mare, căci după statistici rezultă că ea produce a șeasa parte din toate decesele. Tuberculoza este *curabilă* și se poate ușor evita, dacă se iau toate măsurile igienice necesare. Leziunile zise scrofuloa se nu sunt altceva decât tuberculoze locale și atenuate, în cari bacilul lui Koch există în număr foarte mic și este puțin virulent. Să vedem cum se face *contagiunea*. Ea se face prin foarte multe căi și anume: prin *plămâni*, absorbind praf cu microbi, sau cu particule pulverizate de scuipat, prin *tubul digestiv*, bând lapte de vaci tuberculoase, mai ales la copiii cari se hrănesc mai mult cu lapte și la cei ce urmează un regim lactat, mâncând măruntaie, ficat, creier, rinichi, bojogi, etc., dela animale ofticșoase; prin *piele*, făcând pansamente cu carpe, de cari s'au servit tuberculoșii, sau rănindu-se cu scuipătoarea, prin *conjunctive*, etc. Microbii tuberculozei se găsesc foarte răspândiți și la tot pasul dăm de ei, așa că toată lumea ar trebui să se îmbolnăvească, dar din fericire nu este așa și pentru ca omul să se ofticșeze trebuie să întrunească oarecare condiții, numite *cauze predispunătoare*. Intre acestea avem mai întâiu *existența ofticșei la părinți*, ceea ce face ca copiii să se nască mai debili, mai slabi, mai puțin rezistenți la boale și prin urmare mai primitori de oftică, din care pricină he-

reditatea joacă rol așa de mare în căpătarea tuberculozei. Pentru aceasta copilul născut în astfel de împrejurări trebuie să fie îndepărtat de părinții bolnavi, căci ia boala dela ei repede.



Fig. 461 — Diferite forme de bacili ai tuberculozei (mult măriti)

Etațea cea mai prielnică este în mica copilărie și în vârsta de școală. Bărbatul este cu mult mai predispus decât femeia. Orașele sunt locul de predilecție a ticeii; cu cât un oraș are populație mai de-




Fig. 462
Scuipătoare
—obișnuită; 2—de buzunar

să și mai mare cu atât are mai mulți ofticoși. Lipsa de exercițiu dă o mortalitate mai mare, după cum se întâmplă în închisorii și mănăstiri, unde oamenii trăesc închiși în camere mici. Meseriașii cari lucrează în ateliere închise, în cari aerul se ncarcă cu praf, sunt foarte expuși, precum sunt: brutarii, plăpămarii, fâietorii în piatră, cărbunarii, tipografii, fierarii, etc. Unele boale sfârșesc adeseori prin oftică, astfel sunt: pneumonia, pojarul, diabetul, etc. O cauză care predispune foarte mult la această boală este alcoolismul, care slăbește organele. De asemenea și căsătoria prea de timpuriu predispune mult la oftică, de aceea nu trebuie ca fetele să se mărite mai înainte de 20 ani, mai ales acele din orașe și născute din părinți bătrâni. La acestea în timpul sarcinilor adeseori se arată tuberculoza. În fine, viața neregulată,

excesele de orice natură, predispun foarte mult la atac. — Înainte de a izbucni tuberculoza sunt oarecari semne așa zise precursorii, pe care este bine să le cunoaștem, cu atât mai mult cu cât ele prevestesc această cumplită boală și ne pun în stare de a lua măsuri serioase de vindecare, chiar dela începutul ei, mai ales că oftica numai la început poate fi vindecată cu mijloacele de cari dispunem până astăzi. Aceste semne sunt: un fel de slăbire care merge crescând, fără ca omul să-și dea seama și această slăbire poate fi însoțită de lipsă de poftă de mâncare, de dispepsie (mistuire grea), de urdinare deasă. Apoi guturaiul cu tusa, care se repetă prea des, scuirea de sânge, un fel de friguri, cu creșterea temperaturii până la un grad, cari se arată după cea mai mică oboseală, după masă chiar și cu deosebire seara, etc. — Oftica de obicei se arată în formă cronică, având o durată de 1 an până la 20 ani, cu intervale de sănătate aparentă. Această formă are trei perioade sau trei grade. În perioada I-a bolnavul tușește des fără ca să scuie, are un fel de tusa seacă de unde și numele de boală seacă, friguri ușoare din când în când, apoi începe a slăbi, transpiră ușor, pierde din putere și din grăsime, din cauză că nu poate mânca, fiindcă n'are apetit. Are junghiuri, mai cu seamă în partea de sus a plămânilor, cam pe la vârfuri. În perioada a II-a bolnavul tușește mai des și începe a scuipa o flegmă groasă murdă, care însoată în apa din vas; tâmpile și ochii se înfundă, obraji de asemenea; el are o apăsare în piept și greutate la respirațiune, somnul începe să-l părăsească din pricina tusei. În perioada a III-a, sau perioada cavernelor, bolnavul scuipă flegmă din ce în ce mai multă, flegmă amestecată cu puroi, care miroasă urât și are forma zisă numulară (rotundă ca banul) friguri cu căldură mare în fiecare după amiază care merge crescând până la miezul nopții, când bolnavul asudă cumplit, se face lac de apă și din care cauză el continuă a slăbi în mod simțitor, a nu mai avea putere nici să umble, a se topi văzând cu ochii, a se consuma (de unde și

numele grecesc al boalei de *ftizie*, sau *phthisis*). Apoi i se umflă picioarele, uneori varsă sânge roșu amestecat cu spumă, are urdinare, vărsături și vocea i se răgușește până ce se stânge. În forma *acută*, care se vede cu mult mai rar, avem aproape aceleași semne, însă aci boala merge foarte repede, din care cauză boala se numește și *oftică galopantă*, care poate omorî în 15—30 zile.

Tuberculoza intestinală (oftica de mațe) numită și *enterită tuberculoasă*. Acest fel de oftică se poate ivi singură, sau poate însoți oftica de plămâni. Ea are următoarele *semne*: urdinare, care la început este trecătoare, apoi se îndesește până ce devine continuă, ceea ce slăbește bolnavul în mod cumplit. Se însoțește de dureri prin pân-tece și uneori scaunele sunt cu sânge. La copii această boală mai prezintă și creșterea ganglionilor părții peritoneului care învelește mațele; pân-tecele se mărește și vinele de prin pielea pântecelui se văd șerpuiind. Despre tuberculoza la creier am vorbit la *Meningită tuberculoasă*. — *Profilaxia și tratamentul tuberculozei*. Se știe de toată lumea că mai ușor este de a preîntâmpina o boală decât a o vindeca. Nicăiri nu se potrivește aceste vorbe așa de bine ca la oftică. Omul să umble întotdeauna cu gâtul liber, neînvelit cu basmale după cum obișnuiesc mulți și cari sunt cu mult mai expuși la răceală. Obiceiul de a *să-rula* pe cineva în gură trebuie să piară, căci foarte ușor se poate îmbolnăvi omul prin acest mijloc. Este bine ca omul să trăiască pe cât se poate de mult în aer liber, să doarmă într'o odaie mare, bine aerată, ale cărei ferestre să stea toată ziua deschise, iar noaptea, dacă se poate, o fereastră să rămână întredeschisă, apărând patul de curent cu ajutorul unui paravan. *Laptele* să se bea întotdeauna *fiert bine*, iar *carnea* să se mănânce *bine friptă*. Fiecare om să facă zilnic *exercițiu*, însă cu regulă, adică să nu se obosească prea mult, iar când este asudat să nu stea pe loc, nici în curent. Nu este permis ca omul care tușește să scuipe pe jos, ci într'o scui pătoare specială, care să conțină un lichid antiseptic. Când cineva suferă de umflă-

tura amigdalelor din fundul gurii, cari pe lângă că-i împuținează aerul inspirat formează un bun adăpost pentru microbii ofticei, el trebuie să se caute și la trebuință să se supună la operație, adică la tăierea și scoaterea lor (*amigdalotomie*). — *Cei ce sunt siliți să trăiască cu ofticoșii*, sau să *îngrijească de ei*, trebuie să-și spele cu îngrijire mâinile cât se poate de des și mai ales înainte de mâncare, să-și clătească gura cu apă înainte de masă, să-și taie unghiile, ca ele să fie cât se poate de mici și ori de câte ori pune mâinile pe vreun obiect de al bolnavului să și-le spele cu sublimat coroziv. Toate obiectele bolnavului trebuiesc dezinfectate prin fierbere, ru-făria lui spălată la o parte, iar după sfârșitul boalei trebuie să se facă o de-zinfecare totală. Vaccinul contra tuberculozei, descoperit de învățatul *Calmette*, se dă azi pe o scară întinsă copiilor la naștere, ca să-i apere de tuberculoză. El este cu atât mai recomandat copiilor ai căror părinți sunt ofticoși. Publicul să aibă încredere în acest mijloc de combatere a boalei, care se arată a fi de mare folos și care se practică și la noi în țară pe o scară întinsă. — *Copiii cari au părinți ofticoși* trebuiesc duși din casa părintească, dacă se poate la țară și cât mai îndată după naștere, unde vor fi alăptați și îngrijiți de o doică bună. Copiii mai mari trebuiesc țin-uți în continuu în aer liber și lăsați să se joace pe afară cea mai mare parte a timpului; ei trebuiesc hrăniți bine și îmbrăcați potrivit cu anotimpul. Acești copii nu trebuie crescuți în internate și când se vor termina studiile secundare să li-se recomande cariere potrivite stării lor, cariere cari să nu-i oblige a sta mult în casă, în aer confinat. Pentru ei cea mai bună carieră este agricultura, silvicultura, etc., care le înlesnește traiul în aer liber și curat. — *Ofticoșii vor scuipa numai în scui pătoare*, atât la ei în casă, cât și afară și pentru aceasta vor avea în buzunar o *scui pătoare portativă* (cum ar fi o tabacheră), care să aibă la fund puțin lichid antiseptic, scui pătoare cu capac care să se închidă bine. Prin acest mijloc nu numai că nu vor îmbolnăvi pe alții, dar chiar

și ei vor fi feriți de reinfecție, căci atmosfera din jurul lor nu va fi plină de microbii scuipați de ei. Cel ofticos să nu înghită niciodată scuipatul, pentru ca să nu-și infecteze tubul digestiv, mai cu seamă mațul subțire. Scuipătoarea se va deșerta în latrină, apoi goală se va fierbe într'o soluțiune de cristale de sodă. Bolnavul de tuberculoză va dormi *singur*, într'o cameră bine aerată și în care atât aerul cât și soarele să pătrundă cu înleznire și în mare cantitate; în acea cameră să nu fie decât strictul necesar, nici • mobilă de prisos, nici perdele, nici covoare; camera va fi spălată cu cârpe umede și cu soluțiuni antiseptice. Ofticosul va face fricțiuni uscate, mai târziu alcoolice, iar îmbrăcămintea îi va fi potrivită după anotimp. Damele nu vor purta corset, nici rochii lungi, cari să șteargă podelele. Fumatul este oprit cu desăvârșire, iar gura va fi dezinfectată și spălată cu îngrijire în fiecare zi, cu soluția următoare: alcoolatură de eucalipt 50 gr., alcool 350 gr., acid benzoic 10 gr., timol 1 gr., esență de wintergreen 15 picături, esență de mentă 20 picături; să se pună o jumătate de linguriță într'un pahar mare de apă. *Tratamentul propriu zis al tuberculozei este de 2 feluri: igienic și medicamentos. Tratamentul igienic.* Pentru ca un tuberculos să se vindece are neapărată trebuință de hrană bună, substanțială și în cantitate cu mult mai mare decât omul sănătos, de • arece lui nu-i ajunge numai *porția de întreținere*, căci celula, în lupta ei cu microbul, trebuie să fie bine nutrită ca să învingă. Între alimentele cele mai bune primul loc îl ocupă *carnea crudă*, tocată, care poate fi luată în globulețe trecute prin zahăr, în bulion călduț, sau rece, sau amestecată cu pirea de cartofi, sau de linte. Carnea de berbec este mai bună decât cea de vacă; Când bolnavul se desgustă se poate întrerupe întrebuințarea ei, sau când are diaree se poate înlocui cu *sucul* de carne, care, deși nu este așa nutritiv, mărește apetitul. Se înțelege dela sine că bolnavul nu va mânca numai aceeași carne, care va trebui să fie numai ca o completare a mâncării.

Apoi vin *ouăle*, cari pot fi mâncate sub toate formele posibile, pentru ca bolnavul să nu se desguste. Se va avea în vedere însă că ouăle sunt cu atât mai ușor de mistuit cu cât sunt mai moi, mai puțin coapte; se va lua un ou crud la ora 10 și altul la ora 4; gălbenușul, din care se scoate medicamentul numit lecitină, este cel mai hrănitor, dar și albușul, care este format din albumină, este bun. *Peștele*, mai ales cel cu carnea albă și fină, este foarte recomandabil și variază în mod plăcut lista de mâncare a bolnavului. *Laptele* sterilizat, sau numai fiert, simplu sau cu *pâine* prăjită, legumele, cartofii cu unt, de asemenea se recomandă foarte mult. Când bolnavul are stomacul bun și nu suferă de dispepsie poate să mănânce tot felul de carne. Dacă bolnavul n'are poftă de mâncare i se poate da, cu o jumătate de oră înainte de masă, o jumătate pahar de apă de Vichy, care înlesnește secrețiunea sucului gastric și un pachet de cretă, sau de magnezie, cari absorb gazele. Se vor mai da și excitante: sosuri iuți, salate cu lămâe, băuturi calde. Dacă bolnavul are diaree i se va da numai lapte, mai ales lapte de capră, sau de măgăriță, suc de carne, gelatină, etc. Bolnavul va mânca de 5 ori pe zi: dimineața, la ora 10, la amiază, la ora 4 și seara, luând la 10 și la 4 numai câte o gustare, compusă din carne crudă, ouă crude și lapte. În general va mânca bine și variat, iar verdeța și fructele nu vor lipsi din alimentația tuberculosului. Ca băutură va lua apă curată, sau cu puțin vin alb și bere. Peste noapte, când îi este sete, poate să bea un pahar de lapte. Afară de hrană bolnavul are nevoie de *repaus*, de odihnă. Repausul de noapte va dura dela 9 ore seara până la ora 9 dimineața, iar după amiază 1—2 ore. Dacă bolnavul are febră va sta culcat cât mai mult timp, iar dacă febra trece de 39°, el va sta lungit în continuu. Odihna se va face ziua într'o cameră cu ferestrele deschise, fără însă ca bolnavul să fie în curent, sub un adăpost. Intru cât privește plimbările, ele se vor face în trăsură, sau pe jos, după puterea bolnavului.

dimineata între 10—11 ore și seara dela 5 până la 7. In al 3-lea rând vine *cura de aer*, care are deosebită importanță. Ea se poate face la țară, la munte, la mare, într'un sanatoriu sau într'o vilă aranjată astfel încât aerul să fie reînnoit în continuu. Cura de aer trebuie făcută într'o stațiune unde oscilațiunile temperaturii să fie foarte mici în timpul zilei, pământul să fie uscat și soarele să străbată cu înlesnire. In formeile grave ale tuberculozei, la început, este bine ca bolnavul să stea anul întreg într'un sanatoriu, la o altitudine mare. Se recomandă mai bine sanatoriile maritime și de șes, precum și cele dela o altitudine mijlocie. Deci să nu se uite că la începutul boalei, când sunt foarte puține semne și bolnavul n'are temperatură, poate merge la mare, la soare și îi va face bine, lucru care nu mai este permis când boala s'a agravat. La sfârșitul boalei cele mai bune stațiuni sunt cele din climatele dulci, dela țară și de pe malul mării. In țara noastră există numeroase localități de munți unde avem și sanatorii dintre cele mai moderne din Europa.—Trecem acum la *tratatamentul medicamentos*. Având în vedere că la ofticiă alimentația joacă rolul cel mai mare, vom căuta să crăuăm stomacul, să nu-l obosim cu multe medicamente. Astfel ne vom mărgini la săruri de calciu și untura de pește, din care vom da 1—2 linguri pe zi, cu întreruperi din când în când, iar în caz de diaree vom înceta de a mai da-o. Operațiile în contra leziunilor tuberculoase trebuie să se facă cu multă economie și numai în cazuri bineindicate și la mare trebuință, cel mai bun lucru este să ne adresăm la tratamentul general întărind organismul. In leziuni mai înaintate se fac operația asupra plămânilor, cu mult succes. Leziunile superficiale, cum sunt cele ale pielei (lupus), se tratează cu succes prin scarificațiuni, galvanocauterizare iar acum de curând prin fototerapie, prin radioterapie și prin radiumterapie precum și prin curenți electrici de mare frecvență.

Tulcă. — V. *Rachiu*.

Tulchină, cleiță, chiperu lupului,

lemn cânesc, piperu lupului, tilichin, tulchin, tulpină (*Daphne Mezereum*, fam. timeleaceelor). — Mic arbust *veninos* cu florile roșietice, câte odată albe, cu fructele boabe roșii, de mărimea boabelor de mazăre. Crește prin pădurile din regiunea muntoasă și subalpină (Martie—Aprilie). Se întrebuințează scoarța, al cărei principiu activ este *dafneina*. Se dă în boalele de piele (herpes, psoriază). Scoarța are și proprietate vezicantă. Se dă *intern*: coaje 4—5 gr.; extract alcoolic 8—12 ctgr. — La țară se întrebuințează fieritura de coaje pentru durere de dinți.

Tumenol. — Product sulfurat care samănă cu ichtiolul, al cărui succedaneu este; el se întrebuințează ca si-cativ neiritant, în boalele de piele (eczemă) și în mâncărime. Se aplică în natură sub formă de praf, singur sau cu talc, sau sub formă de alifie, 5—15 la 100.

Tumoare (lat. *tumor*, dela *tumere*, a umfla), *bolfă, umflătură*. — Se numește *tumoare* oricare masă constituită de un țesut de formațiune nouă și care are tendință de a perzista, sau de a crește. Prin urmare nu orice umflătură este o tumoare, așa de exemplu un *abces* (colecțiune de puroiu), oricare ar fi mărimea lui, nu este o tumoare, din cauză că el nu poate dura întotdeauna și după un timp oarecare se deschide singur, iar puroiul curge și umflătura scade. O tumoare poate fi datorită unei activități anormale a unor elemente ale țesăturilor, cari cresc și formează un fel de monstruoșitatea a acelor țesuturi (*lipom*). Alteori tumoarea constă într'o întindere, sau umflare a unui organ, sau a unei părți de organ printr'un *chist*. Câte odată țesutul poate fi modificat prin înmulțirea tuturor elementelor sale, cum este în *ipertrofie*, sau numai a unui element, cum este în *scleroza* țesutului conjunctiv, sau că acele elemente se înlocuiesc prin alte elemente cu totul nouă și anormale, cum se întâmplă în *cancere*. Sunt mai multe feluri de tumori, dar toate varietățile se pot reduce la două, și anume: tumori de bună natură, numite *benigne*, cari nu strică sănătatea generală și sunt supărătoare

numai prin mărirea lor, producând prin apăsare diferite turburări în organele în carise dezvoltă, sau în organele din vecinătate și care odată scoase nu se mai reproduc, precum sunt *lipomul*, *fibromul*, *chistul*, etc.; tumori de rea natură cunoscute sub numele de *maligne*, cari cresc, se ulcerază, produc emoragii, iar după ce au fost scoase prin operație se formează din nou în același loc, sau în ganglionii limfatici din apropiere, sau se generalizează în tot corpul. Se întâmplă însă, în unele cazuri, că unele tumori maligne există în același timp cu unele tumori benigne, sau le urmează acestora. De altfel gravitatea unei tumori atârnă și de locul în care se arată. — *Cauzele* tumorilor nu le vom arăta aci, ele fiind variabile pentru fiecare tumoră, iar cetitorul le va găsi la descripțiunea fiecărei din ele. Intru cât privește *tratamentul* vom spune numai atâta că o tumoră, oricare ar fi natura ei, nu se poate vindeca decât prin operație, iar tumorile maligne să se ridice împreună cu țesuturile sănătoase dimprejurul lor. Cu cât o tumoră se operează mai de vreme, cu atât și vindecarea se face mai degrabă și este mai dăinuitoare.

Tumoare albă. — Mai de mult se numea *tumoare albă* inflamația, sau aprinderea cronică a unei încheieturi, care este de natură tuberculoasă (ofitică la încheietură, sau *artrită tuberculoasă*). Această tumoare albă, este caracterizată prin producerea de fungozități, prin tendința de a face puroiu și prin copleșirea progresivă a tuturor țesuturilor cari formează încheietura, așa că în cele din urmă membrul atins își pierde slujba și omul de multe ori viața. Articulațiile, sau încheieturile, cele mai expuse la această boală sunt: șoldul, genunchiul, gleznele, cotul și umărul. Tumoarea albă este produsă de microbul ofitei sau *bacilul lui Koch*, care se dezvoltă în articulația bolnavă și atunci avem tuberculoză *locală*, sau se dezvoltă în același timp și în alte organe, mai cu seamă în plămâni și atunci avem tuberculoză *generalizată*. Această boală se arată mai ales în copilărie și adolescență. Tumoarea albă începe uneori în mod brusc și acut, de obicei

însă începutul ei se face încet, pe nevăgăte în seamă și printr'o durere surdă, care se simte mai ales la oboseală, sau la atingere, iar mai târziu durerea devine continuă, localizată într'un punct. Alteori durerea o simte bolnavul în încheietura din josul celei bolnave, cum ar fi în genunchiu când boala este localizată în șold. Orice mișcare produce durere și articulația începe a se *umfla*. Piele se înroșește, arde și devine lucitoare, apoi mai târziu se simte *fluctuație*, ceea ce arată că încheietura a făcut puroiu. Membrul bolnav ia o poziție vițioasă, anormală dictată de durere. Tumoarea albă se vindecă uneori, când este bine tratată și dela început, dar ea se poate ivi din nou. După ce a suferit vindecarea se face mai greu și uneori bolnavul moare de *septicemie*, sau de *ofitică la plămâni*. *Tratamentul* local constă în ținerea membrului în nemișcare, într'un aparat de ghips, în injecțiuni așa zise sclerizante, sau în operație. *Tratamentul* cel mai eficace este imobilizarea și helioterapia. *Tratamentul general* constă în băi sărate și în medicație igienică.

Turbare (lat. *rabies*, grec, *lyssa*, *hydrophobia*). — Boală virulentă, care se dezvoltă la câine, la pisică și la alte animale și se transmite la om prin mușcătură, sau numai prin lingere. Această cumplită boală trebuie tratată încă dela început, cum a intrat otrava în sânge, căci dacă boala a isbucnit ea este mai întotdeauna mortală. Un om mușcat de un câine turbat, fără să știe că acel câine a fost bolnav, din care pricină nu se caută, nu aleargă să i se facă *vaccinațiunea antirabică*, acel om trece prin următoarele perioade ale turbării. *Perioada întâia* numită *latentă*, sau de *incubațiune*, durează dela 20 zile până la 2 luni, când omul a fost mușcat la membre (mâni și picioare), sau numai 10—15 zile când el a fost mușcat la față. În această perioadă boala rămâne tăcută, lucrează pe ascuns în organism, fără să se arate prin vreun semn oarecare; rănila sunt ușoare și se vindecă repede fără să prezinte un caracter bănuitor, întocmai ca și o rană produsă de un animal sănătos. Pe la sfârșitul acestei perioade, când

rănile s'au vindecat pe deplin, începe omul să simtă în regiunea mușcată și dealungul firisoarelor nervoase, cari o inervează, niște senzațiuni ciudate de furnicăture, înțepături, arsuri, uneori chiar dureri svâcnitoare sau fulgerătoare. În același timp bolnavul are anestezie în dreptul răni și ipereștezie în zona din jur; altelei mai are tresărituri musculare și paralizii motrice localizate. Toate acestea arată că otrava turbării merge dealungul nervilor periferici pentru a atinge mai pe urmă centrele medulare și cerebrale. *Périada a doua, turbarea declarată.* În această perioadă boala are două forme: forma *cerebrală*, numită *turbare furioasă* care se vede de obicei și forma *spinală*, numită *turbare paralytică*, mai rară, însă care completează uneori pe cea dintâi. Amândouă formele sunt precedate de o scurtă perioadă zisă *prodromică* și care durează 2—3 zile. *Forma furioasă.* Boala se declară prin următoarele *prodrome*: schimbarea caracterului, a inteligenței și a sentimentelor afective. Bolnavul este trist, melancolic, neliniștit, preocupat de starea lui; el caută singurătatea, fuge de ai săi, devine incapabil de a-și mai vedea de lucru. Are o durere de cap supărătoare, care nu-l mai slăbește are halucinațiuni, somnul neliniștit, adeseori nu poate dormi de loc, iar când doarme are visuri rele. După 5—6 zile respirația începe să fie împiedecată, inspirațiunile sunt sacadate, întretăiate, venind prin spazme, modificând ritmul respirator. În același timp se ivește o opresiune (o apăsare în piept) neliniștitoare. Pulsul devine mai iute, bolnavul începe să aibă sughițuri și adeseori vărsături. Dar ceace chinuște mai mult pe bolnav este greutatea la înghițire, datorită contracțiunilor spasmodice ale mușchilor faringelui; alimentele solide, sau lichide, provoacă aceste spasmuri și o frică deosebită de a le duce la gură, mai cu seamă când este vorba de băuturi, o adevărată *idrofobie* (frică de apă), care este nelipsită în această formă a boalei. Incercând să bea, în momentul în care duce apa sau orice lichid la gură, bolnavul se dă înapoi înspăimântat, figura lui exprimă suferință și spaimă, ochii sunt ficși,

trăsăturile feței se contractă, membrele tremură, corpul se înfioară și acest acces îl pune în neputință de a înghiți măcar o singură picătură și cu toate acestea setea este porunci-toare; acest acces nu se produce numai în minutul când bolnavul vrea să bea, dar și când vede apa, sau aude un sgomot de curgere a unui lichid. Reflexele tendinoase, cutanate, musculare, senzoriale sunt exagerate, apoi halucinațiile și aiurarea completează acest tablou înspăimântător. Acum încep adevăratele accese de turbare; bolnavul nu mai poate sta locului, se ridică, iar se scoală, umblă prin odaie, se lovește de pereți, se rănește, sbiară cu voce răgușită, ochii i se rătăcesc, gura se umple de spumă. Caută să fugă, să sară pe fereastră, apoi se culcă din nou, se agită în mod furios, rupe așternutul, hainele, mușcă uneori ce-i cade la gură, dar nu se leagă de ai lui decât foarte rar, dimpotrivă se ferește de ei. Indată ce a trecut accesul, bolnavul se odihnește pentru un moment. Alte ori accesul de turbare are altă formă, mai puțin înspăimântătoare pentru familie; bolnavul are contracțiuni, cari se aseamănă cu acele ale epilepsiei, sau se pot ase-măna cu accesele tetanice. Aceste accese, odată liniștea revenită, nu întârzie să reînceapă, din ce în ce mai dese și bolnavul poate muri prin asfixie în cursul unui acces. Crizele devin mai rari, mai slabe, dispar înghițirea se poate face din nou și după excitația cea mare urmează paralizia; unele grupuri de mușchi se paralizează, în fine vine colapsul urmat de moarte, fie prin sincopă, fie prin asfixie. Din momentul în care s'a declarat turbarea și până la moarte nu trec mai mult de 5—6 zile. *Forma paralytică.* În această formă sunt aceleași prodrome ca în forma furioasă. Apoi în loc de fenomene de excitațiune, aci avem din partea membrului mușcat paralizie, de mișcare și de senzibilitate. Adeseori bolnavul are dureri peste mijloc. Paralizia, limitată la început, este flască, însoțită de dureri pe tractul nervos și adeseori de tremurături și de mișcări ataxice; ea se întinde apoi, urmând un mers descendent, variind, după cazuri, trecând

câte odată dela dreapta la stânga, sau invers. Astfel tabloul boalei se schimbă cu fiecare caz, simptomele nervoase încep cele mai adeseori prin partea mușcată, apoi paralizia se generalizează, copleșește regiunea bulbară și dă loc la fenomene din partea musculaturii faciale, oculare, etc. Respirația se schimbă, pulsul de asemenea, în cele din urmă, însă mai rar, se poate constata idrofobia, ca în forma furioasă; moartea vine de obicei prin sincopă. — *Cauzele.* Turbarea provine întotdeauna dela un animal, de obicei dela câne sau dela pisică, mai rar dela lup. Agentul contagios al turburării se află în salivă (bale), în sânge și în substanța cerebrospinală a animalului turbat. Modul de propagare al acestei boale probează că virusul ei constă într'un *microb* specific, care se găsește mai ales în sistemul nervos, în glandele salivare și limfatice. Inoculația microbului se poate face sau prin mușcături, după cum se întâmplă cele mai adeseori, sau prin ghiarele mânjite cu balele otrăvitoare, sau prin lingerea unei suprafețe sgâriate. *Tratament.* Turbarea odată izbucnită nu se mai poate vindeca, cel puțin până în ziua de astăzi, de cât în cazuri rare, așa că doctorul asistă ca orice profan la desfășurarea tuturor simptomelor, cari duc la o moarte sigură. În fața unei astfel de nenorociri vom căuta cel puțin să ușurăm suferințele bolnavului. Se vor da medicamente *sedative* (domolitoare) în doze mari: morfină, cloral idrat, bromure alcaline. Se mai întrebuințează băi calde prelungite, injecții cu ser artificial, asociate sau nu cu lăsare de sânge, diuretice, purgative, toate acestea pentru a ajuta eliminarea toxinelor. Când medicamentele nu se pot da pe gură, din cauza spasmele faringelui, se vor da medicamentele sedative prin injecțiuni sub cutanate. Dacă până acum nu avem un tratament curativ pentru turbare, avem însă *tratamentul preventiv*, ale cărui succese sunt minunate. Acest tratament trebuie făcut nu numai la persoanele mușcate de un câne turbat, ci și la acele mușcate de un câne bănuț de turbare. Prin urmare, imediat ce avem a face cu o persoană, în aceste con-

dițiuni, trebuie s'o trimitem la Institutele antirabice (București, Iași, Timișoara, etc.) unde se va face tratament de 15 sau 20 zile, după cum este și cazul, cu inoculări de măduve rabice atenuate. Întru cât privește rănila produse de mușcătură, iată cum trebuie să procedăm: vom stoarce imediat rana ca să curgă din ea cât se poate mai mult sânge, vom spăla-o cu apă multă și vom arde-o bine cu fierul roșu, iar pe deasupra se va aplica un pansament antiseptic, sau aseptice.

Tusă (lat. *tussis*). — Prin cuvântul *tusă* se înțelege un sgomot de intensitate variabilă, pe care îl produce aerul când este dat afară din plămâni, în mod brusc, violent și sacadat. Tusa este de multe feluri; ea poate să vină prin chinte, prin accese, sau numai prin sguduiri depărtate, și poate fi grasă, umedă (cu scuipat) sau seacă. În *laringită* tusa este precedată de un fel de gâdilătură în gât, ea revine prin chinte produse mai ales prin acțiunea de a bea, de a mânca, de a vorbi; este sgomotoasă, sonoră, însoțită de un acces scurt de sufocație, care este urmat de scuiparea unei flegme globuloase, mici, ce se aseamănă cu o perlă cenușie. Când însă flegma este roșie, apoi verde, tusa ne arată o *laringită tuberculoasă*, sau oftică în gât. În *crup* tusa este la început răgușită și sgomotoasă, apoi devine din ce în ce mai înăbușită, mai stânsă și mai rară. În *pojar* tusa este cam tot așa, păstrându-și caracterul dela început până la sfârșit. În *tusa măgărească* (convulsivă) tusa vine sub formă de chinte prelungite, precedate de o neliniște și este compusă dintr'o serie de expirațiuni sgomotoase, întretăiate de inspirațiuni șuerătoare, cari seamănă cu cântatul unui cocoșel, urmate de vărsături și de curgere de bale (salivă). La persoanele nervoase, la copiii mici atinși de guturaiu, sau cari au viermi intestinali (limbrici) tusa seamănă puțin cu cea de la tusa măgărească, dar ea nu are acele inspirațiuni șuerătoare. În *bronchită* tusa este la început seacă, rară, penibilă, însoțită de o gâdilătură, sau arsură la gât și în partea de sus a pieptului, apoi când flegma s'a copt, ea devine mai, ușoară, nu

este dureroasă și bolnavul scuipă o flegmă groasă, galbenă-verzuie. În *catarul de piept* tusa este grasă, umedă, cu scuipat foarte abundant, mai cu seamă dimineața și se face fără durere, lăsând în urma ei o mare ușurare pentru bolnav. În *pleurezie* și *pneumonie* tusa începe în mod brusc, este precedată de fiori și însoțită de căldură mare, de opresiune și de un junghiu puternic, care nu lasă bolnavul nici să tușească. Întru cât privește scuipatul el nu există în pleurezie, unde tusa este seacă, ci numai în pneumonie, unde flegma este opacă, groasă, gălbuie sau ruginie. În *oftică*, tusa variază foarte mult, după perioadele boalei; la început ea este seacă, rară, mai mare seara, apoi devine mai deasă în tot timpul zilei și flegma este rotundă ca banul, groasă, verde cenușie și puturoasă. — *Tratamentul* tusei variază după boala care o produce, căci pentru ca ea să înceteze trebuie vindecată cauza ei. Cu toate acestea sunt unele medicamente cari se pot face în casă și domolesc tusa, precum sunt: băturile calde și îndulcitoare de nalbă, de flori pectorale, de muguri de brazi, de isop, de viorele, de mușătel, de soc. Bolnavul trebuie să se păzească de frig și mai ales de schimbările brusce de temperatură, să trăiască într-o cameră cu atmosferă curată, dulce, nu prea caldă, nici uscată printr'un foc prea mare; în tusa uscată, chinuitoare, să dăm bolnavului *codoform*, câte 4—5 comprimate pe zi și se va liniști.

Tusa convulsivă, tusa măgărească buduhală. — Este molipsitoare și de obicei omul suferă numai odată în viață. Ea atinge mai mult copiii la etatea de 2—5 ani, dar se poate arăta la orice vârstă, chiar și la 80 de ani. Se datorește unui *microb* care, până acum, nu s'a putut determina. Tusa măgărească prin sine însăși nu omoară pe copii, dar culege un mare număr prin complicațiile la cari poate da naștere. Are trei perioade. *Perioada I* se numește *catarală* și ni se înfațișează ca o tusa simplă, însoțită de o mică fierbințeală și lipsă de voie bună; câte odată însă tusa este mai tare și mai deasă, de multe ori este sgomotoasă și întretăiată de sughit.

Lucrurile se petrec astfel 5 până la 15 zile, când începe *perioada II*, numită *convulsivă*, care este adevărata tusa măgărească. Copilul simte mai întâiu, în gâtlee, un fel de gâdilitură care îi provoacă tusa și caută din toate puterile să i se împotrivească, dar fără folos, căci accesul începe: micul bolnav se scoală repede, se agață de pat, de gâtul mamei, și apoi se pune pe tușit și tușește într'una până ce i se învinețesc buzele, i se umflă obraji și i se înroșesc ochii, cari îi lăcrămează. Când se oprește tusa bolnavul face o inspirație șuerătoare și prelungită, întocmai ca coșelul la sfârșitul cântatului, apoi scuipă niște bale viscoase și ațoase. Cu aceasta s'a terminat accesul. Reîntoarcerea tusei cele mai adeseori se face dela sine, alteori este provocată printr'o întăritare oarecare, prin râs, prin plâns. Tusa este mai deasă noaptea decât ziua din pricină că aerul din casă este stricat și din cauza balelor cari se îngrămădesc în plămâni. Intre accese copilul este foarte abătut, obosit, are durere de cap, dar n'are fierbințeală. Numărul acceselor este variabil dela 10 până la 20 în timp de 24 ore, dar sunt cazuri când se poate urca până la 80, ceea ce nu este un semn bun. Această perioadă poate dura dela 2 până la 6 săptămâni, când începe *perioada III*, dela sfârșit, care este cu mult mai ușoară; tusa este mai rară și mai puțin obositoare, scuipatul se schimbă, este gros, verzui și de forma puroiului întocmai ca la sfârșitul tusei simple. Am spus mai sus că ceea ce omoară copiii nu este tusa convulsivă, ci *complicațiile ei*, cari sunt numeroase și se ivesc de obicei în perioada II-a a boalei. Copilul poate să aibă curgeri de sânge din nas, scuipări de sânge sau curgeri de sânge din gură, din urechi, din ochi, poate să capete o aprindere de plămâni (pneumonie), ori oftică, sau poate să fie cuprins de vărsături, cari îl împiedecă de a mânca. Mulți se aleg cu surpătură (ernie), cu eșirea șezutului, etc. Tusa măgărească este foarte lungă, dar ea ține cu atât mai puțin cu cât este mai ușoară, și este mai scurtă în timpul verii decât iarna. Durata totală este

de 1 lună până la 10 săptămâni. *Tra-lament*. Indată ce copilul se îmbolnăvește de această tuse, trebuie să-l despărțim de cei sănătoși; de altfel nu-i vom schimba obiceiurile, vom căuta să-i dăm aer curat, luându-se măsurile obișnuite de dezinfecție. Bolnavul va sta în casă, îl vom feri de oboseală și de complicații scurtând astfel durata boalei. Este bine ca bolnavul să aibă două odăi: una de zi și alta de noapte, bine aerate. Când accesul, sau chinta de tuse, începe este bine să punem copilul să șadă, să-l liniștim, să-i ținem capul sprijinându-i fruntea cu mâna. Dacă chințele de tuse sunt prea tari putem să-i punem la nas în timpul lor să miroase eter, sau cloroform. Pentru a combate vărsăturile alimentare, cari slăbesc așa de mult bolnavul, vom avea de grije să dăm copilului să mănânce câte puțin după ce i-a trecut accesul de tuse, ca să poată mistui cel puțin în parte ceea ce i-am dat până la accesul următor. Hrana va fi ușoară și câte puțin odată (lapte, ouă, carne tocată, etc.). Se recomandă multe medicamente, ceea ce arată că până astăzi n'aven nici un specific al acestei boale. În perioada I se dă de obicei siropul de ipeca, la ceas câte o linguriță. În perioada II se dau antispasmodicele: aconit, codeină, naceină, cloral, valerianat de chinină și mai cu seamă *beladonă*, *antipirină*, *bromure* și *bromoform*. Cele mai folosite sunt antipirina (20—30 ctgr. socotite de fiecare an al etății copilului) și bromoformul (10—15 picături pe zi într'o poțiune), care însă trebuie supravegheat de aproape fiind periculos. *Schimbarea de aer* dă bune rezultate dar numai în perioada III-a a boalei, când vindecarea se face mai repede. La *fară* babele dau pentru tusa măgărească supă de broască țestoasă, zeamă stoarsă din balebă proaspătă de măgar, iar cu balebă uscată afumă prin casă, untură de urs, scăldători de căldărușă fructe de călin fierte în rachiu de drojdii cu zahăr, dulceață de hrean, câte o linguriță dimineața și seara, dulceață de morcov ras pe răzătoare.

Tușnad. — Stațiune balneară și climaterică, așezată pe linia ferată Miercurea Ciucului—Brașov. Are o alti-

tudine de 650 metri, și este în mijlocul unor frumoase păduri de brad. Climatul este plăcut, fără schimbări de temperatură prea mari. Isoarele sunt bogate în bioxid de carbon, calciu, fier. Sunt recomandabile în anemii, scrofuloză, rachitism, boli de femei, tuberculoza la început. Are vile frumoase de locuit și hotel cu un confort multumitor.

Tusol (*amigdalat de antipirină*). — Corp cristalin, solubil în apă, care se recomandă în tusa măgărească și ca analgezic la copii. Se dă în poțiune, soluțiuni, buline, prafuri, în doză de: 50 ctgr. până la 4 gr., iar la copii 5—10 cigr. la cei mai mici de un an, 10—20 ctgr. până la 2 ani, 25—30 ctgr. până la 4 ani.

Tutun, tabac, (*Nicotina tabacum*, fam. solanaceelor). — Tutunul a fost găsit de Spanioli în insula Tabago, care face parte din Antilele mici. În Europa s'a introdus de către ambasadorul francez la curtea din Lisabona, în anul 1560, Ioan de Nicot, care a trimis praf de tutun (tabac) reginii Caterina de Medicis. Prin anul 1565 s'a introdus în Germania, însă numai ca plantă medicinală. Obiceiul fumatului s'a văzut pentru întâia dată în Europa în anul 1585 la soldații cari au debarcat în Portugalia și Spania. Nu mult după aceea, cam prin anul 1620, s'a introdus fumatul în Germania prin trupele auxiliare engleze, cari treceau în Boemia, apoi acest obicei s'a întins repede în toată Europa, cu toate măsurile aspre de oprire. Astăzi tutunul se cultivă foarte mult în toate țările și constituie pentru state un venit considerabil. Tutunul conține o materie foarte otrăvitoare, numită *nicotină* (alcaloid), care, dată în cantitate de 10 ctgr. omoară un câine de statură mijlocie. În medicină se întrebuințează frunzele „*folia nicotina*” ca narcotic, iritant, purgativ; se dă în contra limbricilor, în contra cheliei (favus) și a râiei. Pe *dinăuntru*, sub formă de infuzie (ceai), până la 1 gr. pentru 100 în clizme, foarte rar până la 5 pentru 100; praf 5—10 ctgr.; pe *dinafară*: decoțiune (fiertură) 10 pentru 1000 în spălături, loțiuni. — *Nicotina* s'a recomandat în contra tetanului, în contra paraliziei beșicii;

TUTU

dându-se în doză de 1—3 picături, iar pe *dinafară* 60 ctgr. pentru 100 în injecțiuni. *Salicilatul de nicotină* sau *eudermol*, este o substanță cristalizată, incoloră, solubilă în apă; se dă pe *dinafară* în alifie, 10 ctgr. pentru 100, în contra psoriazei. *Otrăvirea acută*. În starea acută otrăvirea se produce la tinerii fumători. Forma gravă este provocată prin absorbțiunea tutunului ca medicament, greșind doza; ea este rară fiindcă acest mod de tratament se întrebuințează foarte rar. Semnele acestei otrăviri sunt: arsură în gât, dealungul esofagului și în stomac, greață, vărsături cu senzație de sfârșeală și de pierdere; amețeli, turburări de idei, micșorarea vederii, puls slab, pielea rece, acoperită de sudoare viscoasă.

ULEI

Otrăvirea cronică se vede la cei care lucrează la fabricile de tutun, la cei cari fumează (8—20 țigări pe zi), cari trag tabac pe nas, cari țin tutun în gură. *Semnele* acestei otrăviri sunt: aspectul cenușiu al feței, pierderea memoriei, mai cu seamă aceea a cuvintelor, tremurătura mânilor, picioarelor, limbii, amețeli, dureri nevralgice prin umeri și brațe, *angină de piept*, stomatite (inflamații de gură) și faringite cronice, dureri mari de stomac și *constipație* rebelă, palpitațiuni (bătăi de inimă), slăbirea vederii (musculițe jucătoare), pierderea gustului, micșorarea auzului, congestii cerebrale (îngrămădiri de sânge la creeri), amorțeli, etc. *Tratamentul* constă în părăsirea obiceiului de a fuma.

U

Ud. — V. Urină.

Udmă. — V. Adenită.

Uioara. — I se mai zice și Ocna Mureșului. Stațiune balneară din jud. Alba Inferioară, pe malul Mureșului, la o înălțime de 252 m. Ape sărate concentrate bune pentru anemie, gută, reumatism, scrofuloză, boli de femei, boli de piele.

Ulcer (lat *ulcus*), *rană*. — Poporul nostru prin cuvântul *rană* înțelege ceea ce în medicină se numește *plagă* și *ulcer*. Pentru el orice soluție de continuitate a pielii se numește *rană*, pe câtă vreme noi trebuie să facem o deosebire între o *plagă* și un *ulcer*. Astfel o plagă este produsă de o cauză externă, o lovitură cu un corp contondent, sau tăietor, ori ascuțit, sau prin armă de foc, etc.; iar un ulcer ține de o cauză internă, sau un vițiu local. Cele mai multe ulcere se văd la gambe,



Fig. 463
Ulcerale ale
gambei

fiindcă acolo este locul de predilecție. Afară de varice mai sunt și alte cauze cari dau naștere la ulcere: un corp străin cum ar fi un glonț care nu s'a putut scoate și produce puroi, o carie osoasă (os mort, colț de lup), sau o stare scrofuloasă, care împiedică plăgile să se vindece, sau cari dau naștere la adenite la gât, cari se sparg și nu se mai vindecă, sau un cancer ori altă tumoare care sparge, se ulcerează, etc. Prin urmare în toate aceste cazuri de ulcere trebuie combătute cauzele, tratate boalele cari le întrețin, iar ulcerele se vor pansa cu îngrijire până la vindecare. Pansamentele cu Imunizol vaccin au dat rezultat bun.

Ulcer la stomac. — V. *Stomac*.

Ulei, oileu, (lat. *oleum*). — Orice grăsimă care, la temperatură obișnuită, rămâne în stare lichidă, se numește *ulei*, spre deosebire de *unt* sau *untură*, care la răcire se întărește. Uleiurile se scot din regnul animal (uleiul de pește, de ficat de *morun*), sau din regnul vegetal, din semințele unor plante (de in, de nucă, de migdale, de masline, de ricin, etc.), sau din regnul mineral (petrol). Uleiurile au o consistență viscoasă, gust fad, sau nul, când sunt proaspete (înainte de a rânzezi); ele pătează hârtia, sunt mai ușoare decât apa, deasupra căreia în-

noată fără să se amestece cu ea, se dizolvă în alcool, eter, benzină, esențe din care cauză toate acestea se întrebuințează la curățirea petelor de ulei. Unele uleiuri stând la aer nu se rânchezesc, dar iau o înfățișare rășinoasă și se *întăresc*, pentru care se întrebuințează în pictură, numindu-se uleiuri *sicative* (uleiul de in, de nuci, de ricin, etc.). Altele stând la aer nu se îngroașe și se rânchezesc (untul de lemn, sau uleiul de masline, de migdale dulci, etc.). Uleiurile minerale, cum este petrolul, nu seamănă cu celelalte decât numai prin însușirea de a arde la aer. Dintre uleiurile de mâncare, sau *comestibile* vom aminti *untuldelemn*, care se scoate din fructele *măslinului*. Pentru mâncare și în medicină se întrebuințează numai calitatea întâia, adică untdelemnul virgin în prepararea alifiilor, a plasturilor, a uleiurilor compuse, în clizme, etc.). *Uleiul de jir*, care se scoate din fructele *fagului*, este dulce, plăcut la gust și cu cât se învechește cu atât este mai bun. *Uleiul de nucă* proaspăt este verzui și plăcut la gust, dar nu se poate păstra bine și devine gălbui. *Uleiul de alune*, care n'are miros, nici culoare, se întrebuințează puțin. În general uleiurile joacă în alimentația omului același rol ca și celelalte grăsimi; cu ele se prepară mâncările. În natură se mănâncă puțin. Sunt multe țări (Grecia, Italia de sud, Franța de sud, etc.) în cari aproape toate mâncările se prepară cu untdelemn și oamenii fiind obișnuți cu ele nu sufăr de stomac, deși ele sunt mai greu de mistuit decât mâncările pregătite cu unt din lapte. Dintre *uleiurile medicinale* ne vom ocupa în primul rând de *untura de pește*, care se întrebuințează așa de mult. Sunt trei calități: untura de pește *albă*, care n'are gust, n'are miros și se scoate numai prin simpla apăsare a ficiștilor de morun aruncați în puțină; untura *brună*, mai groasă, cu miros, cu gust pronunțat și care se scoate prin tescuirea ficiștilor după ce a eșit din ei untura cea albă; untura *neagră*, groasă, cu miros și gust neplăcut, care se scoate prin fierberea ficiștilor în apă și tescuirea lor; ea este cea mai bună pentru sănătate. De altfel cu cât untura de pește va fi

mai *purificată*, prin diferite mijloace (acid sulfuric, potasă, cărbune, etc.) cu atât este mai săracă în însușiri vindecătoare, deși la gust este mai plăcută. Untura de pește trebuie luată în natură, așa cum este ea, înainte sau îndată după mâncare, ca să se amestece cu mâncările și să se mistue o dată cu ele, căci singură fiind în stomac nu se mistuie. Ea trebuie luată în lunile de iarnă și să fie ținută la răceală. De obicei cura cu untură de pește se începe în Noemvrie. Când vedem că copilul își pierde pofta de mâncare, sau că are urdinare, vom întrerupe luarea ei câteva zile. Se poate lua cu câteva picături de esență de anason, sau cu cafea neagră, cu ceai, cu lapte dulce, sau cu lămâie (storcând o lămâie pe fundul păhărușului, apoi punând untura și deasupra ei iar lămâie; sau să se bea, îndată după ce s'a luat untura, puțin vin, sau să se ia 1-2 măslin, sau o coajă de pâne, sau imediat să înceapă mâncarea. Untura de pește este bine să se dea la toți cei slabi, sau slăbiți prin muncă sau excесе, la cei scrofuloși sau aplicați spre scrofula, la cei ce cresc repede, la cei oficioși în gradul întâiu, sau numai cu aplecare la oftică. Am putea face o regulă generală care se poate aplica astăzi: untura de pește să se dea la toți copiii dela etatea de 3 ani în sus până la 14, căci ea nu lucrează numai prin iodul și fosforul pe cari le conține în cantitate foarte mică, ci mai mult prin însușirea ei de corp gras, întreținând căldura animală, și prin anumite vitamine cari ajută creșterea.

Ulm (*Ulmus campestris*, fam. ulmaceelor). — Arbore frumos care crește prin păduri și tufișuri cultivat prin aleie și parcuri. În medicină se întrebuințează coaja de pe ramuri, curățită de pelicioara de deasupra. Principiul activ este *ulmina* și se dă în boalele de piele și ascită (boală de apă, dropică), în decoct (fiertură) din 20 la 1000. Se mai prepară și un sirop. — La țară se spală cu zeama de ulm rănila.

Ultramicrobi, *microbi invizibili*, sau *virusuri filtrante*. — Sunt microbi cari nu se pot observa cu mijloacele noastre actuale. Se presupune că: variola, trahomul, herpesul, poliomie-

lita epidemică, ar fi datorite ultra-microbilor.

Ultramicroscop. — Un dispozitiv optic, cu ajutorul căruia putem observa microbii sifilisului și microbi foarte mici, cari nu se pot vedea cu microscopul obișnuit.

Umăr (lat. *humerus*). — Rădăcina membrului superior (a mâinii, cum zice poporul) se numește *umăr*. Încheietura umărului se formează din capătul de sus al osului brațului (*humerus*) și din *spată* (omoplat, scapulă). Umărul în partea de sus este rotund și îmbrăcat cu mușchii groși cari pun în mișcare brațul, iar în partea de jos este găușoit și regiunea aceasta se chiamă *subsuoară*. — Dintre toate încheieturile omului, umărul este cea mai mobilă, permițând să ducem brațul în toate direcțiile, și de a face cu brațul o mișcare în formă de cerc întreg în jurul axei încheieturii. Aceste mișcări însă pot fi dureroase, în parte sau în total, și unele nu se pot face decât cu mare greutate, cu mare sforțare, cum se întâmplă în urma unei răceli, sub acțiunea frigului și a umezelii și în *reumatism*. Mișcărilor umărului pot fi dureroase și în urma unei lovituri, sau a unei căderi și tratamentul lor este același ca și în alte părți. Mișcărilor acestei încheieturi pot fi micșorate, sau pierdute de tot, când mușchii sunt *paralizați*, sau uneori și fără cauză vădită, când se recomandă cu succes electricitatea. Dacă încheietura umărului este *scrintită* (luxată), mișcărilor membrului sunt cu neputință. Scrintirea se produce repede prin căderea asupra mâinii, asupra cotului, sau asupra umărului. Umărul scrintit se cunoaște prin aceea că el nu este rotund ca celalt, ci este turtit, iar capătul de sus al osului brațului se simte sub andrea (claviculă), sau în *subsuoară*. În toate aceste scrintiri trebuie chemat cât se poate mai îngrabă doctorul, care va pune osul la loc cu atât mai iute cu cât va fi chemat mai curând. Reducerea scrintirii umărului se face foarte lezne de cele mai multe ori. După ce s'a redus luxația se ține mâna legată cu un colțar pe după gât, o zi, sau două. *Înțepăturile* umărului sunt grave numai atunci când sunt făcute cu un instrument

foarte ascuțit, care pătrunde adânc. *Tăieturile*, sau plăgile sunt rare; atât unele cât și celelalte se tratează ca și orice răniri.

Umblet, mers. — Pentru oricare om mișcarea cea mai folositoare și cea mai ușoară este *umbletul*. În timpul mersului nu numai mușchii membrilor inferioare sunt în lucrare, mutând corpul dintr'un loc în altul și purtând greutatea lui când pe un picior, când pe celalt, dar și mușchii membrilor superioare, cari cumpănesc greutatea corpului, ai pieptului și ai pântecelui, cari păstrează echilibrul. Mușchii corpului apleacă corpul înainte și înapoi pentru a nu cădea; mușchii membrilor lucrează în mod alternativ, când îndoitorii, când întinzătorii, ceea ce face că după mișcare urmează un timp de odihnă. Din acestea se vede că umbletul nu ține mușchii în contracțiune continuă ca *starea în picioare* și prin urmare este mai puțin oboseitor. Mișcarea corpului este împărțită la toate organele dinăuntru, înlesnindu-le funcțiunile. Mersul grăbește circulația sângelui. Respirația se face mai adânc și omul ia o mai mare câtime de oxigen, mistuirea se face mai ușor și mai complet, căldura și nutriția corpului se măresc, puterile cresc și omul se întărește prin umblet. Mersul moderat și pe un teren drept este bun pentru fiecare om, pe câtă vreme umbletul repede, suișul pe scară, sau pe un munte, este primejdios pentru cei ce suferă de piept, sau de inimă. Copilul începe a umbla la 8—12 luni, după cum se dezvoltă mai repede sau mai încet și primii pași ai lui sunt un prilej de mare bucurie pentru părinți; dacă copilul întârzie de a umbla, se va ajuta dezvoltarea dându-i preparate cu fosfat de calce, sau untură de pește, ținându-l la aer curat și la soare, pe malul mării etc. *Mersul pe munți*, sau *urcarea* se deosebește de mersul pe teren drept, prin aceea că corpul în loc să fie ținut drept, trebuie să fie *aplecat* înainte, ceea ce ușurează mult urcarea căci se pun în acțiune mușchii șalelor, cari sunt mai dezvoltăți decât întinzătorii coapselor întru trebuința în atitudinea dreaptă. La urcuș mersul trebuie să fie încet cu clătinări încete dela stânga la dreapta

și dela dreapta la stânga. Mușchii întinzători dintr-o parte atrag segmentul opus al corpului, formând pentru aceea o masă rigidă care ia un punct de reazăm fix pe gamba îndoită înainte și din aceeaș parte. Omul se urcă cu spatele său utilizând greutatea capului și a trunchiului aplecat spre pământ, care are drept efect de a dizlocă înainte centrul de gravitate al corpului. În *scoborâre*, atitudinea trebuie să fie *verticală înapoi* pentru a duce centrul de gravitate al corpului de dinainte înapoi, după un plan perpendicular la orizontală. Pentru aceasta toată greutatea corpului trebuie să stea pe *tâlpi*. Picioarele ating pământul după un plan oblic, paralel cu acela al coastei. Scoborârea pe *călcâie* se face numai pe planuri *foarte aplecate* și călcâile joacă un rol de *țărși* tari, cari se infundă pentru a susține greutatea corpului contra căderii înainte. Capul este aruncat mult spre spate, pentru a servi ca contra greutate.

Umbra iepurelui. — V. *Sparanghel*.

Umbra nopții. — V. *Zărna*.

Umflarea sau balonarea pântecului. — V. *Abdomen*, *Gaze intestinale*, *Stomac* și *Intestine*.

Umiditate (lat. *humiditas*), *umezeală*, *igrasie*. — Vorbind despre aerul atmosferic am spus că conține o cantitate oarecare de aburi de apă. Dacă acești aburi sunt în cantitate mai mare decât de obicei, aerul este umed, adică încărcat de *umezeală*. În apropiere de bălți, de lacuri, de mare, sau în locuri unde ploile sunt mari și dese, sau în cari masa subterană de apă este prea aproape de suprafața pământului, sau în locurile împădurite, etc. umezeala aerului este mai mare și această umezeală poate pătrunde în locuințe și produce multe boale, între cari avem *reumatismul*, sub toate formele lui și diferite *nevralgii*, *laringita* (răgușeala), *bronchita*, *congestiunile de piept*, *pleurezia* și *oftica*. Afară de aceasta, umezeala mai este și un mijloc puternic de răspândire a microbilor unor boale, ducându-i dintr'un loc în altul, din care pricină *colera*, *febra tifoidă* și chiar *frigurile palustre* se întind repede în țările umede. Trebuie să deosebim umezeala *rece* de

umezeala caldă. În cea *rece* simțim frigul mai mult prin faptul că aburii reci iau din căldura corpului și omul are simțirea că este îmbrăcat în haină udă; iar umezeala *caldă*, aduce greutate la respirație și la mișcare, moleșindu-l. Cei slabi de piept și de încheieturi este bine să schimbe localitatea umedă, ducându-se într'un loc uscat, ridicat, departe de râuri și ape mari, pe locuri stâncoase, unde vor fi la adăpost de multe boale.

Unghie (lat. *unguis*, grec. *onyx*). — Unghiile sunt producțiuni cornoase ale epidermului, cari la om iau forma unei plăci, sau lamele rotunde și ocupă fața dorsală a ultimei falange a degetelor. Scopul unghiilor este de a apăra vârful degetelor de lovituri, de a sprijini ultima falangă în timpul pipăitului și a mersului. O unghie se compune din trei părți: una anterioară, vârful unghiei, de culoare albă cenușie, care este liberă și trece de vârful degetului, o parte mijlocie sau *corpul*, de culoare roșietică, rotunzită în sens transversal, lipită de patul unghiei și altă parte posterioară, *rădăcina*, care este constituită printr'o margine subțire ce se infundă într'o îndoitură a pielii și care este sediul de căpetenie al creșterii unghiei. Unghiile încep a se forma cam în a 3-a lună a fătului, în luna a 6-a ies și la naștere ele au o grosime de o jumătate până la un milimetru, trecând peste vârful degetelor. Creșterea unghiilor se face în continuu și dacă partea liberă nu se taie, ele pot ajunge până la o lungime de 4—5 ctm. după cum se poate vedea la Chinezi. Pentru ca o unghie să fie cu totul reînnoită îi trebuie 116 până la 152 zile. Creșterea este mai repede la copii, mai înceată la adulți și la bătrâni. *Boalele* au deosebită influență asupra creșterii și a formei unghiilor. În *febra tifoidă* și în alte boale grave, unghiile încetează de a crește și acest timp de oprire dă loc la formarea unui șanț transversal și la ivirea unei linii albe, înapoia căreia unghiile au o culoare mată, neobișnuită. Culoarea unghiilor în *asfixie* și în *agonie* este vântată, sau neagră. În *oftică* unghiile iau o formă specială: vârful degetelor se îngroașe și se lărgeste, iar unghia se îndoieste spre pulpa degetului.

în loc de a fi dreaptă, așa că vârful degetului seamănă ca un cap de măciucă, sau ca un cap de șarpe (v. *degle ipocratrice*). Dacă unghia este deslipită nu trebuie s'o smulgem, ci s'o lăsăm să cadă singură, cu timpul. Când a pătruns sub unghie un corp străin, trebuie să-l scoatem cu grijă, să nu se infecteze. *Unghia încarnată*, sau *intrată în carne*. Această boală se ivește de obicei la degetele mari dela picioare. Pielea dela una din marginile unghiei se inflamează adecă se înroșește, se umflă și produce durere. Cu cât pielea se umflă mai tare cu atât acopere mai mult unghia, apoi partea umflată se ulcerază și face puroi. Cauzele acestei boale sunt: încălțăminte rău făcută, care este sau prea mare, sau prea mică, obiceiul rău de a tăia unghia rotund, așa că marginea unghiei, crescând, taie și se înfige în carne, mai ales că prin umblare talpa degetului, fiind apăsată de pământ, pielea din jurul unghiei se ridică asupra ei. Tratamentul constă la început în îngrijiri igienice, adecă în a purta încălțăminte bine făcută, a face des băi de picioare, a introduce între marginea unghiei și carnea crescută un mic fitil de vată, care se schimbă în fiecare zi și care va fi din ce în ce mai mare, se va arde puțin carnea cu piatră iadului (nitrat de argint). Se va tăia unghia drept, iar nu rotund. Dacă însă cu acestea nu trece se va face o mică operație, care constă în a tăia și ridica jumătatea înfundată a unghiei, după ce s'a amorțit degetul cu eter, sau mai bine cu cocaină ori stovaină. Sub vârful unghiilor se adă-



Fig. 464
Unguraș

postesc, împreună cu alte murdării, o sumedenie de microbi, cari pot fi duși în diferite părți ale corpului, în nas, în gură sau în piele. **Unguraș, cătușnică sălbatică, voronic** (*Marrubium vulgare*, fam. labiatelor). — Plantă erbacee, care crește prin locuri necultivate și aride, drumuri, garduri, dărâmături și locuri virane (Iunie — Septembrie). Se întrebuințează planta înflorită, având ca principiu activ *marubina*. Această plantă are proprietăți

amare, viermifuge și stomachice. Se dă sub formă de extract alcoolic 1—2 gr.; praf 4—8 gr. La țară se întrebuințează în contra tusei.

Unguent (lat. *unguentum*, dela *ungere*, a unge), *alifie*, *ir*. — Unguentele sunt medicamente cari se întrebuințează pe dinafară. Ele au consistență moale și sunt compuse dintr'un corp gras, rezină (rășină) și un principiu medicamentos (săruri, oxide metalice, uleiuri esențiale, pulberi vegetale, etc.) Pentru prepararea unguentelor se tolesc împreună substanțele grase și reșinoase, se strecoară printr'o pânză pentru a scoate necurătenii, apoi se amestecă până se răcesc. Când se adaugă substanțe aromatice și volatile, acestea se pun la sfârșit, tot așa și camforul și uleiurile volatile, iar când se adaugă pulberi, acestea trebuiesc să fie foarte fine, triturate sau porfirizate cu puțin ulei. Cele mai întrebuințate unguente sunt: *unguentul cu acetat de plumb*, *unguentul aromatic*, *unguentul de beladonă*, sau *mătrăgună* (extract de beladonă 1 gr., unguent simplu 9 gr.); *unguentul emolient* sau *alifie de spermanțet* (ceară albă 30 gr., spermanțet 60 gr., ulei de migdale dulci 240 gr., apă de trandafiri 60 gr.); *unguentul napolitan* (mercur 150 gr., unguent mercurial simplu vechiu 25 gr., seu de oaie 100 gr., axongie benzoată 100 gr.); *unguentul populeu* sau *alifie de muguri de plop* (muguri de plop uscați de curând 75 gr., foi de măsălarită, mătrăgună, mac, câte 50 gr., axongie benzoată 500 gr.).

Unt. — Untul este cea mai plăcută grăsime naturală, cu care se gătesc mâncările noastre. Are aceleași însușiri ca toate alimentele grase, dar este superior prin gustul său plăcut. Trebuie întrebuințat în cantitate mică, de oarece și el, ca și celelalte grăsimi, poate da naștere la greutate de stomac, când este luat în cantitate prea mare. Cei cu stomacul slab vor mânca puțin unt pentru ca să nu aibă arsuri și dureri, asemenea cei predispuși la grăsime ca să nu se îngrășe prea mult, în schimb cei slabi vor mânca mult unt, mai ales când au stomac bun, căci untul poate înlocui până la un punct oarecare *untura de pește*. Untul se întrebuințează *proaspăt*, *topit* sau

sărat. Cel proaspăt are o culoare gălbui deschisă, un miros plăcut, un gust de alune. Numai untul proaspăt și de calitate bună. se poate mânca singur, pe pâine; el se mistuie mai ușor decât cel topit, sau sărat, cari se întrebuințează numai la gătitul bucatelor, dar cari în schimb se poate păstra timp mai îndelungat. Pentru un kgr. de unt ajunge 20 gr. sare. Există și unt artificial (v. *Margarină*). — *Untul de cacao* este o substanță grasă, solidă la temperatura ordinară, se extrage din migdalele de cacao. Este îndulcitor și se întrebuințează în cazurile când sfărcurile dela fățe sunt crăpate; în farmacie la facerea săpunășelor (supozitoarelor).

Unt de recin. — V. la *Ricin*.

Untură de pește. — V. *Ulei* (uleiuri medicinale).

Uraseptină. — Medicament antiseptic urinar, format prin asociațiunea *acidului benzoic* și a *benzoatelor* cu *urotropina*, *helmitolul* și *piperazina* (vezi aceste cuvinte). Asociațiunea acestor principii lucrează într'un mod mai activ decât fiecare luat separat. Uraseptina se recomandă în pielite, pielonefrite, cistite, prostatite, uretrite, piurie (urinare cu puroiul) blenoragie, abcese urinoase, catarul beșicii; apoi în formele artritismului: gută, gravelă (nisip), colici de ficat, colici de rinichi, reumatisme, calculi (pietri) etc. Uraseptina se prezintă sub forma granulată și sacharată, care este mai practică decât forma de pastile comprimate, sau lichidă. Doză: 3—6 lingurițe de cafea pe zi, în puțină apă, luate în orice timp al zilei, la intervale de cel puțin două ore. Uraseptina nu este toxică, nu obosește stomacul, nici nu debilitază.

Urați și Acid uric. — Urații sunt



Fig. 465. — Cristale de urați

niște produse incomplete ale arderii

materiilor azotate ale organismului. Ele sunt săruri formate de acidul uric, în combinațiune cu amoniacul, cu calciul (*calculi* sau pietri în beșică), sau cu soda (*tofus*, la gută). Urații se văd în urină, la microscop, sub forme multe și regulate. Acidul uric și cu sărurile lui se găsesc în sânge, sudoare și urină.

Urdinare. — V. *Diaree*.

Urdinare cu sânge. — V. *Dizenterie*.

Ureche (lat. *auris*, ureche). — Organul auzului se numește ureche și se împarte în 3 părți: urechea externă, mijlocie și internă. Urechea externă se compune din *pavilion* (sgârâciul urechii) și din *conductul auditiv extern*. *Pavilionul* este un fel de sgârâciu lipit de cap prin piele, ligamente și mușchi. Toate ridicăturile și adânciturile pavilionului au de scop de a reflecta undele sonore către *conductul auditiv*. Acesta se înfundă în osul temporal și are cotituri. El este lung de 2—3 ctm., iar suprafața lui este acoperită de peri foarte fini, muiați într'un fel de ceară galbenă, amară, *cérumen* care este produs de niște glande în formă de ciorchină. Acest conduct este înfundat printr'o membrană, numită *timpan*, sau *toba urechii*, așezată oblic de sus în jos și dinafară înăuntru. Dispoziția sa în formă de pâlnie îi permite de a vibra pentru oarecare sunete. Urechea medie, sau *căsuța timpanului*, este o cavitate neregulată, plină de aer, care vine printr'o țevă, care pleacă din fundul nasului, *trompa lui Eustache*. În această cavitate se află patru oscioare așezate în formă de lanț și anume: *ciocanul*, *nicovala*, *scărița* și *osul lenticular*, reunite prin ligamente și mușchi. *Mânerul ciocanului* este fixat în membrana chiar a timpanului, iar *scărișoara* este în atingere cu membrana *ferestrei ovale*, una din cele două porțițe cari despart urechea medie de cea internă (a doua porțiță este *ferestra rotundă*, așezată deasupra celei ovale). Undele sonore primite de timpan sunt transmise prin cele patru oscioare la urechia internă. *Trompa lui Eustache*. Este un conduct, care pleacă din partea din apoi a foselor nazale și se deschide în urechea mijlocie. Urechea internă se compune din trei părți: *vestibulul*,

care este un fel de sac ce comunică cu urechea mijlocie prin fereastra ovală și fereastra rotundă, trei *canaluri semicirculare*, care se deschid în vestibul prin cinci orificii, *melcul*, care este un tub răsucit asupra lui însuși, așa încât formează un corp conoid ce se aseamănă cu căsuța unui melc. Toate cavitățile melcului sunt pline cu un lichid în care se scaldă niște concrețiuni calcare, *otoliți* și cilia *celulelor acustice*, cari sunt terminațiunile nervului auditiv. În melc este un fel de harpă formată de *arcalele lui Corti*, cari conțin celulele acustice mai sus pomenite. — Să vedem cum se produce *auzul*.



Fig. 466 — Urechea externă

(1 = helix; 2 = antihelix; 3 = tragus; 4 = antitragus)

Sunetele concentrate și întărite de pavilion și timpan sunt transportate de lanțul de oscioare din urechea medie, iar scărișoara, fiind în raport cu membrana ferestrei ovale, transmite vibrațiunile sonore lichidului din urechea internă. Pe de altă parte aerul cuprins în urechea mijlocie vibrează la rândul lui și face să vibreze fereastra rotundă. Mișcările încercate de lichidul urechii interne isbesc cilia vibratili ai celulelor acustice din arcadele lui Corti, cari sunt terminațiunile nervului auditiv și care duc senzațiunile sunetului până la creier. — *Surzenia* este produsă de mai multe cauze: îngroșarea sau ruperea timpanului, înțepenirea oscioarelor din urechea mijlocie, alterațiunea urechii externe, toate aceste cauze sunt grave, prin faptul că surzenia de cele mai multe ori nu se vindecă. Când însă surzenia este produsă de o inflamație a căptușelii trompei lui Eustache, din care pricină se astupă acest canal și nu mai permite ca aerul din căsuța timpanului să se primenească, atunci surzenia este trecătoare, căci odată cu vindecarea și destuparea trompei auzul revine. Când sunt stricate numai organele de transmisiune ale sunetului la ner-

vul auditiv (urechea externă și mijlocie), dar nervul este sănătos, acesta poate fi impresionat prin mijlocirea oaselor craniului, pe cari se aplică corpul sonor. Vibrațiunea acestor oase clatină lichidul conținut în urechea internă și face să vibreze firișoarele sau mai bine zis terminațiunile nervului auditiv. Acest fel de surzenie se mai poate face să dispară dacă ținem apăsată contra dinților o foaie de carton care culege sunetele și le duce la oasele craniului. Întru cât privește vâjiiturile de urechi, pe cari le simțim din când în când, cetitorul să caute la: *Vâjiiturile de urechi*. — *Boalele de urechi* sunt foarte numeroase, dar cele mai de căpetenie sunt următoarele: *Răniurile pavilionului*, cari se vindecă foarte repede, chiar și atunci când o parte a sgârçiiului este cu totul separată de rest, pentru care partea ruptă trebuie *îndată cusută*. Pavilionul este supus la diferite erupțiuni: *eczemă* (bube dulci), *furuncule*, etc., cari mai toate vin din iritațiuni de tot soiul. Pentru a preîntâmpina toate acestea trebuie ca pavilionul să fie spălat cu îngrijire în fiecare zi. Pentru a evita *degerăturile* urechii la copii le vom recomanda ca tratament general, să bea untură de pește și se vor obișnui cu frigul făcându-li-se idroterapie. Pe gerul mare vom acoperi urechile, introducându-le sub căciulă sau învelindu-le cu un șal. Conductul auditiv extern trebuie curățit în fiecare dimineață cu un colț de batistă înmuiat puțin în apă caldă. Nu este bine ca să ne sgândărim urechea cu chibrituri, cu ace de păr, cu bucăți de hârtie făcute sul. La persoanele cari nu-și curăță urechile, precum și la acelea cari au o conformațiune specială a conductului auditiv, sau la acelea la cari glandele secretă mult, mai cu seamă la gutoși, se întâmplă de li se îngămădește *ceară* multă (*cerumen*) în fundul urechii, formând acolo un fel de dop, din care cauză auzul slăbește din ce în ce mai mult, până la surzenie, însoțită uneori și de vâjiituri. Aceștia le vom face spălături în urechi, cu apă caldă, care deslipește dopul sau să se toarne mai întâiu în ureche puțină *apă oxigenată*, care, în câteva minute,

face ca dopul de ceară să se sfărâme, apoi să se spele cu apă caldă, introducându-se încet, cu o seringă, sau irigator. Adeseori se întâmplă, din nebagare de seamă, iar la copii jucându-se, să între în ureche diferiți corpuri (boabe de porumb, fasole, pietricele etc.). Toți acești corpi străini trebuiesc scoși cât se poate mai curând și a-ceasta să nu se facă de oricine, nici de însuși bolnavul, ci de un om priceput și mai bine de un doctor. Când corpul străin este *tare* (pietricică, mărgea) se va turna în ureche unt de lemn și se va pune un dop de bumbac, iar omul se va culca pe urechea astupată, astfel eșirea corpului se va face cu ușurință. Când corpul este *moale* și se poate prinde, se va scoate cu un mic cârlig, făcut dintr'un ac cu gămălie îndoit. Când este o *insectă* se va turna în ureche untdelemn, apoi se va spăla cu apă caldă. — *Inflamația*, sau *aprinderea conductului auditiv*, se numește *otită externă*. Această otită poate fi *acută* sau *cronică*; se vede de obicei la limfatici și este produsă de răceală, sau prin intrarea unui corp străin. *Semnele* sunt: durere, căldură, uscăciune, surzenie, văjiuturi și în cele din urmă o curgere de materie muco-purulentă (otoree). *Tratamentul* în otita *acută* constă în băi calde de ureche, făcute cu ceai de capete de mac, sau cu apă simplă, cu apă cu glicerină (1 la 50) sau cu untdelemn cald. Aceste băi se fac astfel: se pune într'o linguriță de cafea lichidul, se ține cu lingurița deasupra unei lămpi de spirt aprinsă, iar când lichidul este cald, ceea ce putem încerca cu vârful degetului, turnăm conținutul linguriții în urechea bolnavului, care stă culcat pe urechea sănătoasă. După 15 minute bolnavul se scoală și se apleacă în partea urechii bolnave, ca să curgă toată apa afară, după care se șterge urechea cu bumbac. Această baie se poate repeta de mai multe ori. Spălăturile se pot face și cu apă boricată. În otita *cronică* spălăturile se vor face de 4 ori pe zi cu apă caldă, cu apă sărată (socotit pe 7 gr. sare la 1 litru de apă), cu apă boricată; iar tratamentul general va consta în un-

tură de pește, etc. În amândouă felurile de otită, atât contra durerilor cât și ca dezinfectant, se pun câte 5 picături în ureche de 2—3 ori pe zi din: acid fenic, cocaină, câte 25 ctgr. din fiecare, glicerină 10 gr. *Ruptura* sau *spargerea timpanului* (a tobei) se produce prin introducerea unui corp tare în ureche, printr'o explozie puternică și apropiată, sau prin lovirea puternică cu palma peste ureche. *Semnele* ei sunt: durere mare, curgere de sânge (emo-




Fig. 467 — Secțiune într'o ureche

1=pavilionul; 2=conductul auditiv extern; 3=timpanul; 4=ciocanul; 5=nicovala; 6=scărița; 7=canalele semicirculare; 8=melcul; 9=trompa lui Eustache.

ragie din ureche, surzenie. Ca tratament se recomandă spălături cu apă boricată caldă. *Aprinderea*, sau *inflamația timpanului*, începe prin dureri mari în fundul urechii, văjiuturi și svâcnituri. Este produsă de răceală, mai cu seamă la cei cari au guturaiu vechiu. *Tratamentul* constă în băi de ureche cu ceai de capete de mac, punând pe urmă câte 5 picături din cele mai sus pomenite, iar după încetarea durerilor se vor face insuflațiuni de aer în căsuța timpanului prin trompa lui Eustach. — *Obstrucțiunea* sau *astuparea trompei lui Eustache* se ivește în cazurile de guturai și de angină și se arată prin surzenie și văjiuturi. Se recomandă injecțiuni de aer. — *Inflamația* sau *aprinderea urechii mijlocii*, numită *otită medie* este o boală care se vede destul de des în tinerețe, în boalele fundului gurii, în boalele generale infecțioase (febra tifoidă, febrele eruptive). Această boală are 2 forme: *benignă* și *purulentă*. În forma *benignă* (ușoară) avem:

o durere adâncă în ureche cu văjiituri, ameteți, vărsături, nu curge nimic și vindecarea se anunță printr'o simțire de pocnitură în ureche, produsă prin darea afară din gât a mucozităților din trmă lui Eustache. Forma *purulentă* începe întocmai ca forma de mai sus, numai că durerea merge crescând până se sparge timpanul și puroiul începe a se scurge. Forma benignă se vindecă în 14—20 de zile; uneori ea se transformă în forma purulentă, care ține mai multe săptămâni, uneori mai multe luni, lăsând în urma ei o surzenie completă. *Tratamentul* constă în a pune la început în ureche picături de laudan și iosciam, de a face băi calde de apă simplă, sau boricată, sau cu apă oxigenată, dezinfectarea gurii cu gargară de apă boricată, beșică cu ghiață în jurul urechii, sau o lipitoare, băi de picioare calde, sau de muștar de mai multe ori pe zi. — *Aprinderea sau inflamațiunea urechii interne (otita internă)* se vede mai rar. *Boala lui Menière* poate fi produsă de răceală, de căldură mare, de sifilis, sau de vreo rănire; ea are 2 forme: *apoplectică* și *lentă*. Forma *apoplectică* începe pe neașteptate, la oamenii sănătoși și cari n'au suferit de urechi. Ea începe printr'un fel de atac de apoplexie, cu pierderea cunoștinții, din care omul își revine în fire, galben la față și cu sudori reci, având greață, amețeală, uneori chiar vărsături. Umblă abia ținându-se pe picioare și este surd de amândouă urechile. În forma *lentă* se observă ameteți, văjiituri, auzul scade din ce în ce până ce omul rămâne surd, mersul este nesigur. Această boală se vindecă rar, sfârșind aproape întotdeauna prin surzenie completă. *Tratamentul* constă în revulsive pe piele (vezicători, muștare, puncte de foc), iodure, bromure, mercur. În caz de sifilis se va face tratamentul antisifilitic. — Înainte de a termina vom spune câteva cuvinte despre *examenul urechii*, a timpanului și a căsuții timpanului. Dacă vom să examinăm *auzul* vom ține un ceasornic de buzunar, cu bătaie bună, la o depărtare de un metru de urechea bolnavului, apoi vom apropia ceasornicul din ce în ce, până când sunetul lui este auzit de bolnav. Depărtarea la care sunetul

se aude lămurit ne arată gradul auzului. Când un om surd nu aude bătaile ceasornicului prin oasele craniului atunci este semn că urechia internă (nervul auditiv) este stricată, dacă însă el le aude prin acest mijloc, dar




Fig. 468. — Cele 3 părți ale urechii

a=glande producătoare de grăsime; b=depozitul de ceară (cerumen); c=timpanul; d=melcul.

nu le aude prin ureche, atunci aceasta dovedește că boala este localizată la canalul auditiv extern, sau la urechea mijlocie, sau la trompa lui Eustache iar urechea internă este neatinsă.

Urechelnița, iarba ciutei, iarbă de urechie, (*Sempervivum tectorum*, fam. crasulaceelor). — Frunzele ei cărnoase dau o pulpă groasă care la țară se întrebuințează sub formă de oblojeli la umflături, la arsuri, la brâncă, la trânji; iar sucul plantei subțiat cu apă se întrebuințează ca gargară, sau colutoriu în contra aftelor și a măr-găritarului.

Urechion, oreion, parotidită epidemica. — Boală molipsitoare și epidemică, ce se arată prin umflarea regiunii feței de dinaintea urechii. Această boală se vede rar, înainte de vârsta de 2 ani și după 40 ani. *Microbul* ei n'a putut fi descoperit. Mai des se arată dela 7 la 25 ani, bărbații sunt mai supuși decât femeile. Ea se arată mai mult iarna din cauză că în acest anotimp sunt oamenii mai adunați, mai în atingere. În această boală se umflă glandele cari produc saliva (balele), în special glanda *parotidă*, dintr'o parte sau din ambele părți (dreapta și stânga); uneori se umflă în același timp și celelalte glande salivare (*sub maxilare* și *sub linguale*).

Urechioanele încep uneori printr'o indispoziție, durere de mijloc, oboseală, cu căldură, neliniște și câte odată vărsături, apoi, după 24 până la 36 ceasuri, bolnavul începe să se umfle la o falcă sau la amândouă fălcile, în partea de dinainte a urechilor. Cele mai adeseori însă boala începe cu umflătura fălcilor, care în majoritatea cazurilor (de 9 ori din 10) se face în amândouă părțile. Umflătura începe mai întâiu într'un punct circumscris, care se află cam la nivelul părții mijlocii a urechii, dinaintea ei, de unde se întinde la părțile vecine până sub ureche și la partea de sus a gâtului. Apoi, după câteva ceasuri, începe să se umfle și partea cealaltă tot în același fel. Câte odată umflătura se poate întinde pe sub fălci la tot gâtul, dând bolnavului o înfățișare ciudată. Uneori se umflă și amigdalele din fundul gurii. Urechioanele se deosebesc de *udme* (adenite supurate) prin faptul că pielea își păstrează culoarea normală, pe câtă vreme în *udme* ea se înroșește, apoi la urechioane bolnavul n'are dureri cu *svăcnituri*, ci numai un fel de supărare când înghite și când vorbește. Boala durează 8 până la 15 zile, ea se vindecă în totdeauna chiar și când se ivește vreo complicație, rar se întâmplă ca ea să se ivească din nou la aceeași persoană. *Complicațiile* acestei boale sunt mai multe. Umflătura dela fălci se poate coborî în jos la organele genitale, producând la bărbați o umflătură dureroasă a *testicului* (orchită urliană), cu înroșirea pielii, căldură mare, neliniște și uneori aiurare, cari pot să țină vreo cinci zile; uneori bolnavul se poate alege cu o *atrofie testiculară*, urmată de *sterilitate*. La femei se umflă *ovarele*, dând aceleași suferințe. Alteori avem complicațiuni din partea sistemului nervos, cu aparențe foarte grave. *Tratamentul preventiv* constă în izolare, oprirea elevilor de a merge la școală, în timp de 15 zile. *Tratamentul curativ* constă în repaus în pat, destul de prelungit

și aceasta pentru a preveni umflătura testiculelor (orchita), antisepsie bucală, făcând gargară cu acid boric, cu permanganat de potasiu, etc. Pe umflătură se vor pune cataplasme de făină de in, sau se va face un pansament umed, acestea după ce mai întâiu se va unge partea umflată cu alifie mercurială beladonată.

Uree, (gr. *ouron*, urină, ud). — Rezidiul arderii complete a materiilor albuminoide se numește *uree*. Ea este adunată de sânge și străbate rinichii trecând în urină (ud) unde formează un element important (v. *Urină*); ea se mai află și în sudoare, și în lichidul cefalorachidian (0 gr. 30—0 gr. 50 normal).

Uremie (gr. *ouron*, ud, urină, și *hai-ma*, sânge). — Această cumplită boală este produsă de îngrămădirea ureei în sânge.

Uretan, *carbonat de etil*. — Ipnotic. Se dă în doză de 2—4 gr., în soluție sau poțiune; la copii câte 10 centigrame de fiecare an.

Ureter se chiamă canalul care duce urina din rinichi până în beșică (v. *Rinichi*).

Uretră. Se numește canalul prin care iese urina din beșică. Uretra bărbatului




Fig. 469. — Secțiune într'un basîn de bărbat

1=testicul; 2=epididim; 3=prostată; 4=penis; 5=uretră; 6=rect; 7=beșica udului.

are o lungime de 14 până la 19 ctm. și se compune din două părți: partea dinapoi care este fixă și lungă de 2 până la 3 ctm. și care este înconjurată de o glandă cunoscută sub numele de *prostată*, care o separă

de rect. După ce a eşit din prostată uretra este formată numai dintr'un strat de fibre musculare (porţiunea membranoasă). A doua parte, anterioară, este mobilă (porţiunea spongioasă) şi are multe vase. Ea îşi poate mări dimensiunile foarte mult. În dreptul prostatei se deschid în uretră canalele *spermatice*, pe unde iese sămânţa, sau sperma. Uretra la femeie este lungă numai de 5 cm. şi jumătate. Ea se află deasupra vaginului şi este numai membranoasă, din care cauză se poate lărgi mult. — Intre boalele uretrei avem; *uretrita*, sau inflamaţia ei, *calculii* sau pietrele uretrale, *fistulele*, strâmtarea sau *strictura* ei.

Uretralgie (grec. *ouréthra*, uretră şi *algos*, durere). — Durerea pe care o simte omul pe canalul udului se chiamă *uretralgie*. Ea este produsă de o piatră (*calcul*) în beşică, de boalele prostatei, de o strâmtorare a uretrei.

Uretrotomie (gr. *ouréthra*, uretră, şi *tome*, tăiere, inciziune). — Este o operaţiune care constă în tăierea uretrei. Această tăiere se poate face pe *dinăuntru*, cu instrumentul cunoscut sub numele de *uretrotom* şi în acest caz avem *uretrotomia internă*, care de obicei se face în cazurile de strâmtorare (*strictură*), sau pe *dinafară*, *uretrotomia externă*, care se face pentru scoaterea pietrilor (*calculilor*) oprite în canal.

Urină (grec. *ouron*, ud). — Urina este un lichid secretat de rinichi, de unde se scurge prin canalele numite *uretere* în beşică, unde stă un timp oarecare până când este dată afară prin *uretră*. Cantitatea urinii în 24 ore variază la omul sănătos dela 1 litru până la 1 litru şi jumătate. Această cantitate atârnă de cantitatea de hrană, de băuturi pe care le ia omul precum şi de cantitatea de sudoare pe care o face. Când urina este mai puţină de 800 gr. şi mai multă de 1500 gr. în 24 ore, trebuie să ne gândim la vreo boală. Copiii în raport cu statura lor fac mai mult ud decât oamenii mari. De obicei omul face mai multă urină decât lichidele pe care le bea, ceea ce provine din cauză că şi mâncările solide cuprind o cantitate oarecare de apă. Urina în unele boale (febră, idropizie) scade iar, în altele cantitatea ei creşte (*poliurie*), cum

se întâmplă în: albuminurie, diabet, isterie, epilepsie, excese de băuturi alcoolice, etc., sau când se ia vreun medicament *diuretic*. Coloarea urinii este galbenă şi atârnă de cantitatea de lichide pe care o bea omul. În timp de boală colorarea se schimbă, astfel în migrenă, în boalele nervoase, diabet, urina devine incoloră, în febră galbenă închisă, în boalele de ficat galbenă portocalie sau brună verzuie, în ematurie (urinare cu sânge) roşie, etc. Unele medicamente de asemenea pot să-i schimbe colorarea. În stare normală urina este un lichid limpede, transparent, în momentul când iese din beşică, dar după ce a stat câţva timp în vas ea se turbură din cauză că prin răcire sărurile şi materiile organice se precipită (cad la fund). În unele boale, cum sunt acele de beşică, ea poate să devie viscoasă dacă conţine puroi. Prin batere urina face spumă şi spuma este în mai mare cantitate când urina este alcalină şi conţine albumină. În stare de sănătate urina are un miros propriu, caracteristic, iar în timp de boală ea poate să miroase urât. În stare normală urina are o reacţiune acidă, iar în timp de boală ea poate deveni alcalină, ceea ce se poate constata cu hârtie de turnesol; albastrul se înroşeşte în urina acidă şi roşul devine albastru în cea alcalină. Carbonatele alcaline (apele alcaline) citratele şi tartratele fac urina alcalină. Când urina stă mai mult timp într'un vas se depune pe fund un depozit, sau sediment, format prin precipitarea substanţelor ţinute în suspensiune în urină. Acest depozit este galben roşietic când este format de acid uric şi urate, cum se întâmplă la gută, gravelă, etc.; el este albui când este format de fosfate, sau de puroi. În stare de boală urină poate să conţină albumină, zahăr, bilă (fiere), sânge, puroi, diferite săruri, microbi, etc., cari se pot constata cu precizie numai prin *analiza* făcută de un specialist. — Uneori omul nu poate ţine udul, care curge fără voia lui şi atunci are ceea ce se chiamă *incontinenţă de urină*, alteleori i se opreşte udul şi atunci are *retenţiune de urină* — *Incontinenţa urinii* este de mai multe feluri. Uneori urina curge picătură

cu picătură, pe măsură în care vine din rinichi în beșică, după cum se întâmplă în paralizia mușchiului care închide gura beșicii (sfincterului), sau în unele boale de creeri, ori de măduva spinării. Alteori urina curge tot pică-




Fig. 470. — Cum se caută zahărul în urină

A = dacă urina este clară după fierbere, nu conține zahăr, pe când, dacă este brună (B) îl conține.

tură cu picătură deși beșica este plină cu urină peste măsură, după cum se întâmplă în hipertrofia prostatei și uneori în paralizia beșicii (incontinență prin regurgitare). O altă varietate este incontinența numită *intermitentă*, în care urina curge fără voie, însă nu picătură cu picătură ca în varietățile de mai sus, ci ca și cum omul ar urina cu știință. Aceasta se vede la copiii cari se pun în pat, fac udul în timpul somnului fără să se deștepte, mai ales la copii nervoși. Această incontinență se produce din când în când, la intervale mai mult sau mai puțin mari, în timpul somnului, uneori și când copilul este distrat prin joc. *Tratamentul* incontinenței variază după varietatea ei, după cauzele cari o produc. Este bine ca întotdeauna să se înceapă cu sondajul, care ne va arăta mai bine cauza incontinenței și după ce vom stabili bine boala de care ea atârână, vom trata acea boală. Intru cât privește incontinența nocturnă a copiilor vom proceda astfel: vom pune copilul să urineze înainte de culcare, la masa de seară nu-i vom da lichide decât în cantitate cât se poate de mică, nici băuturi gazoase alcoolice, nici ceai, sau cafea. În timpul nopții trebuie sculat de 2—3 ori și pus să

urineze. Se recomandă dușuri, electricitatea, beladona, nuca vomică, antipirina, în doză prosulfatul de chinină. — *Retențiunea de urină*. Udul se poate opri de tot, sau numai în parte. Cauzele acestei opriri sunt mai multe și între acestea avem următoarele: imposibilitatea, sau neputința de a se contracta (de se strânge) a beșicii, cum se întâmplă în paralizia jumătății inferioare, a corpului (paraplegie), produsă de o boală de creeri, sau de măduva spinării, în febra tifoidă, în tifus, în febrele eruptive, în brâncă, sau când beșica este prea umflată de urină prin reținere de a urina. Altă cauză este un obstacol material (o piedecă) la eșirea urinei, de exemplu: un calcul (piatră), sau chiag de sânge în beșică, strâmtorarea sau strictura uretrei produsă de blenoragie, sau de o rănire oarecare, de hipertrofia prostatei, tumorile mitrei, sarcina, ernia beșicii. În retenția *completă* bolnavul are trebuințe continue de a face udul și cu toate silințele ce face nu poate urina; el simte o greutate în dreptul beșicii și dureri în partea de jos a pântecului, dureri cari se măresc prin stare în picioare și prin umblare. Bolnavul stă îndoit de șira spinării cu coapsele îndoite, pentru ca să-și mai moaie mușchii pântecului. Dacă pipăim pântecul în partea lui de jos, simțim, o umflătură care se ridică uneori până la buric. În aceste cazuri trebuie să se facă ceva pentru ca să iese udul, căci altfel bolnavul poate muri. În unele cazuri urina forțează obstacolul și se scurge picătură cu picătură (*incontinență prin regurgitare*, descrisă mai sus). Retenția *incompletă* se vede de obicei la bătrâni și se arată prin pofte dese de a urina, mai cu seamă noaptea, fără ca omul să poată face udul decât cu mare greutate. Uneori, sub influența răcelii, a oboselii, a unui exces venerian, udul se oprește cu totul (retențiune completă). În unele cazuri urina nu iese toată, ci o parte rămâne în beșică, așa ca omul nu simte o ușurare deplină și are o greutate în partea de jos (la perineu). *Tratamentul* constă în a face sondaje, adică scoțând udul cu ajutorul sondei, ceea ce o poate face bolnavul singur, după ce a fost obișnuit de doctor, luând, se

înțelege, cele mai aspre măsuri de antisepsie. Când nu se poate face sondarea cu nici un preț, vom recurge la punctia beșicii. Vom căuta să depărtăm cauza retențiunii, fie prin tratarea boalei care o produce, fie printr'o operație.

Urinal. — Astfel se numește vasul în care se adună urina (udul), mai ales pentru cazurile de *incontinență*, când cineva nu poate ține udul.

Urodonal. — Este un granulat efervescent, având de bază methyglyoxalidina (*lisidina*), quinalatul de piperazină (*sidonalul*) și de hexamethylen-tetramină (*formina* sau *urotropina*). Se întrebuințează cu bun succes în cazurile de litiază renală și biliară (nisip) și pietriș la rinichi și ficat), artritis, gută, arterioscleroză, reumatism, apoi în pielite, cistite, blenoragii, pe cari le ameliorează repede. Nu este toxic și se poate lua fără inconvenient chiar și în doze mari și repetate. *Modul de întrebuințare*: până la 3 lingurițe de cafea pe zi, fiecare într'un pahar cu apă, cu o jumătate de ceas înainte, sau cu trei ceasuri după mâncare. Copiii vor lua 2 lingurițe. În cazurile de criză se pot lua trei linguri mari pe zi.

Urosolvan. — Un preparat românesc (Iteanu) cu chinat de piperazină, formină și săruri de litină, care se recomandă în diateza urică, artritis, gută, reumatism, sciatică, obezitate.

Urotropină, uroformină, sau hexamethilen-tetramin. — Combinațiune a aldeidei formice și a amoniacului. Diuretic și bun solvent al acidului uric. Se dă în doză de 1 gr. până la 1 gr. 50 ctgr. pe zi, putând merge până la 2 gr., în soluție apoasă, sau asociată, cu sărurile de litină. Bună în blenoragie, boli de ficat, febră tifoidă și encefalită letargică.

Urticare (lat. *urticaria*), *blândă*. — Urticarea este o boală de piele și se numește astfel fiindcă ridicăturile ce ies pe piele seamănă cu cele produse de înțepăturile de *urzici*. Blanda constă în niște pete neregulate; unele mai roșii, altele mai albicioase, unele cu ridicături, mai mult sau mai puțin mari, altele netede. Aceste pete se însoțesc de arsură și mâncărime foarte mare. Blanda de obicei se arată în

mod repede, pe neașteptate, alteori este procedată și însoțită de o indispoziție generală, de febră, de fiori, de durere de cap și de o greutate la respirație. Urticarea poate să se arate numai într'o parte a corpului, mărginită pe o suprafață mică, sau se poate ivi peste tot corpul. Ea se poate arăta și pe mucoase: în gură, faringe, când poate da naștere la turburări grave. Cele mai adeseori blanda este *acută* și atunci este produsă de înțepături de ploșnițe, de fânțari, de omizi, etc., sau se ivește după o emoțiune morală vie, sau în urma unei mâncări de pește de mare, de stridii, de midii, raci, mezeluri, de fragi, smeură, coacăze, etc. Sunt unele persoane cari nu pot mânca nimic din toate acestea, din cauză că imediat capătă blândă. Sunt unele medicamente cari la unii produc blândă, cum sunt: antipirina, chinina, ipeca, etc. Uneori urticarea revine de mai multe ori la aceeași persoană, fără ca să se fi expus la una din cauzele mai sus enumerate. În aceste cazuri trebuie să ne gândim că ea poate fi întreținută de vreo boală de ficat, de diabet, sau de viermi intestinali (panglică sau limbrici). Urticarea durează dela câteva ceasuri până la 2—3 zile, revenind din când în când. — *Tratamentul preventiv* al blânde constă în suprimarea cauzei, să nu mănânce omul nimic din ceea ce știe că-i face urticare. *Tratamentul curativ* constă la început într'un purgativ drastic și în regim lactat; apoi se va da contra mâncărimei: tinctură de beladonă 10 gr., 6 până la 15 picături pe zi (date în 4 rânduri); sau: cloridrat de chinină 10 ctgr. ergotină ctgr, 10 extract apos de beladonna 2 miligrame, pentru 1 pilulă; să se facă astfel de pilule 50 și să se dea 6—10 pe zi; sau: tinctură de beladonă 15 picături, bromur de potasiu 4 gr., idrolat de lactază 130 gr., sirop de flori de portocale 25 gr.; să se bea la fiecare oră, câte o lingură, sau 0.50 gr. de peptonă o oră înainte de prânz, 30 picături adrenalină și clorură de calciu în soluție apoasă, autoseroterapie sau autohemoterapie. Pe *dinafară* se recomandă spălături cu apă cât se poate de caldă, spălături fenicate, cu oțet de

vin, cu oțet aromatic (de trandafiri), cu apă sărată, sau cu zeamă de lămâie.

Urzică, *oîșea* (*Urtica dioica*, fam. urticaceelor).— Plantă erbacee aco-perită cu peri aspri cari ustură. Ea crește prin locuri cultivate și pustii grădini, dărmături, pe lângă șanțuri, și garduri (Iunie—Septembrie). Perii de pe frunzele urzicilor sunt găunoșiți și plini de un fel de apă iute (iritantă), care se introduce sub piele când ne atingem cu urzica și ne face o mân-cărime și arsură dureroasă, cu roșeață și umflătură, cari dispar după câteva minute dacă ne punem mâna în apă rece ungând-o apoi cu unt de lemn, sau cu unt de migdale dulci și ferin-du-ne de a ne scărpinga. Iritarea pro-dusă de uzici poate fi întrebuințată cu folos la țară în loc de muștar, pentru a redeștepta simțirea și mișcarea în-tr'un loc oarecare.

Usturoiu (*Allium sativum*, *aiu*, *aliu*). Usturoiul ațăță pofta de mâncare și ușurează mistuirea, din care cauză




Fig. 471. — Cum se prepară sucul extras din usturoiu

se asociază uneori la mâncările ce se dau convalescenților, celor cu mistuirea grea și bătrânilor. Nu se va da

însă la copii și la femeile iuți, a căror nervi n'au trebuință de a fi întăritați, în tot cazul nu e bine să se abuzeze de el (v. *Condiamente*). În medicină se întrebuințează acum mai mult ca altădată. În lipsă de făină de muștar s'ar putea întrebuința cataplasme de usturoiu și în loc de alte fricțiuni s'ar putea face trăsături cu oțet și usturoiu pisat. *Allisatina*, bună în turburări digestive, enterite, diaree, arterioscleroză, erupții pe piele. Usturoiul se recomandă în cazuri de tensiune arterială ridicată, căci o face să scadă; mai este bun în gangrena plămânilor. Iată care sunt întrebuințările usturoiului în popor. Pe *buba neagră* se pune amestecat cu scârnă de om. De *tusă* se ung tălpile cu usturoiu și se încălesc la foc înainte de culcare. Pentru *limbrici* se ia de 3 ori pe zi câte o linguriță de lapte fierț cu usturoi, sau se mănâncă crud. Pentru *emoragie* (curgere de sânge) se mănâncă usturoiu pisat amestecat cu untură. La copii pentru *durere de pân-tece* se găurește un fir de usturoiu și se stoarce țâța în gura copilului prin aceea gaură. Pentru *durere de gât* și *pecingenă* se unge cu usturoiu pisat și amestecat cu praf de pușcă și cu miere. De *coleră* se unge peste tot corpul cu usturoi pisat și se mănâncă pe cât se poate mai multe căpățâni, sau se înghit 3 căței de usturoiu și 3 fire de piper. De *ciumurluială* se freacă tot corpul cu oțet și usturoiu pisat, mai ales pe tâmpile, mâni și picioare. Pentru *unghii stricate*, sau bolfe, se ung seara cu usturoiu pisat. Se mai poartă usturoiul la gât ca *amulet* contra *deochiului*. Se mai vindecă *bătăturile* și *buzele crăpate* tot cu usturoi pisat. Contra *strigoilor* în seara de Sf. Andrei se mănâncă usturoiu și se ung cu el ferestrele și ușile. Lipovenii din Dobrogea dau la copii contra *limbricilor* 5 căței de usturoi pisat și o linguriță de hrean într'o ceașcă de cafea de unt-delemn.

Uva ursi, *strugurii ursului* (*Arbutus* sau *Arctostaphylos uva-ursi*, fam. ericaceelor).— Arbust mic întotdeauna verde. Crește prin păduri de brad, prin tufișuri și prin stâncării în regiunea alpină. Fructele se pot mânca; frunzele se întrebuințează în medicină

VACC

pentru acțiunea lor astringentă și diuretică (face ud). Principiul activ este *arbutina*, care este antiseptică, calmantă și diuretică (50 ctgr. până la 1

VACC

gram sau 2 gr. pe zi în granule). Frunzele de uva ursi se întrebuintează ca *ceai*, 10 gr. la 1 litru apă, sau sub formă de praf, 1—5 gr. pe zi.

V

Vaccin (lat. *virus vaccinum*, dela *vacca*, vacă), *altoiu*, *ultoiu*. — Unele vaci sunt atinse de o boală numită *cow-pox*, sau *vaccină*, care se arată sub forme de bube sau pustule ce ies pe uger. Materia cuprinsă în aceste bube se numește *vaccin*, sau *altoiu* și ea se răspândește pe mâinile femeilor cari mulg vaca bolnavă și le dă aceeași boală, apărându-le în același timp de o altă boală mai cumplită, cunoscută sub numele de *variolă*, sau *vârsat* (bubă). Acel care a descoperit această însușire minunată a vaccinului a fost învățătorul doctor englez Jenner, în anul 1796, și în ziua de 14 Mai a făcut prima vaccinare, luând vaccin de pe mâna unei tinere țărance, care mulgea vacile și inoculându-l la un băiat de 8 ani, la care s'a prins foarte bine. Vaccinul este un lichid transparent, vâscos, fără miros, fără culoare și el se poate aduna, sau de pe ugerul unei vițe care a fost mai întâi vaccinată prin 12—14 înțepături și în acest caz avem *vaccin animal*, sau dela brațul unui copil de curând vaccinat și atunci avem *vaccin uman*. Astăzi se întrebuintează mai mult vaccin *animal*, din cauză că prin vaccinul uman se pot transmite diferite boale primejdioase, cum sunt: sifilisul și oftica. Vaccinul luat dela vițea se păstrează în tuburi mici de sticlă, bine astupate. Vaccinul *uman* se ia dela un copil vaccinat de 7 zile, când prezintă pe braț pustule frumoase, transparente și turtite la mijloc. El se culege pe un condeiu de pană de găscă curată, după ce s'a spart pustula și vaccinul începe a țâsni, apoi după ce se usucă bine se vâra acest condeiu într'un toc tot de pană, pentru a fi ferit de umezeală și de praf. Acest vaccin este bun și după 10 zile și pentru aceasta îl diluăm mai întâi cu o picătură de apă curată și puțin caldă. Dar, când ne servim de vaccin uman, cel mai bun lucru este de a lua vaccinul dela braț și a-l

inocula îndată la cei ce vrem să-i vaccinăm, făcând în acest mod vaccinarea *dela braț la braț*. Ori care ar fi vaccinul, animal sau uman, el lucrează cu atât mai bine cu cât este mai proaspăt.

Vaccinare, *altoire*, *ultoire*. — Vaccinul în sticle se prepară și în țara noastră. Este o mică operație, prin ajutorul căreia se introduce într-o înțepătură, sau sgărietură făcută pe piele, *limfa vaccinală*, sau *vaccinul*, ca omul să fie ferit de *variolă* (vârsat). Vaccinarea se face cu *vaccin animal*, sau cu *vaccin uman*. Ea se poate face la oricare etate, începând dela 4 săptămâni după naștere. Dar fiindcă puterea vaccinului pierde după câțiva ani trebuie să mai facem o nouă vaccinare după 6—8 ani, ceea ce se chiamă *revaccinare*. Legea obligă pe toată lumea să se supună atât vaccinării cât și revaccinării. Inocularea vaccinului se poate face pe oricare parte a corpului, dar obiceiul este ca să se facă în partea de sus a brațului, de desubtul mușchiului deltoid. La femei, pentru ca semnele vaccinării să nu se vadă când sunt decolate, se obișnuiește de câțva timp ca această operație să se facă la coapsă, sau la gambă, aproape de pulpă. — Vaccinarea se poate face în două feluri: *prin înțepare* și *scarificare*. La facerea vaccinării trebuie să se ia toate măsurile de *asepsie*, atât a locului unde se inoculează vaccinul, cât și a instrumentelor cu cari se operează. Astfel vom spăla brațul cu săpun și apă caldă, apoi vom da cu alcool și lăsan să se usuce. Instrumentele vor fi sterilizate prin flacăra unei lămpi cu spirt, sau prin fierbere. Instrumentul cu care se vaccinează se numește *lanțetă*. Ea trebuie sterilizată la fiecare vaccinare, ceea ce îi strică foarte repede tăișul și pentru a ocoli aceste neajunsuri lanțeta s'a înlocuit cu un fel de peniță care se chiamă *vaccinostil*, sau *ac de vaccinare*, un condei de

oțel, cu vârful ascuțit și cu un șanțuleț pe una din fețele lui. El costă foarte puțin și odată ce a servit la o vaccinare se aruncă. Dacă însă nu avem așa de multe câte ne trebuiesc putem foarte bine steriliza și vaccinostilul prin flacără, sau prin fierbere într'o soluție de carbonat de sodă, întrebuițându-l mai departe. *Vaccinarea prin înțepare* se face astfel: încărcăm lanțeta, sau vaccinostilul, pe una din fețele lor cu vaccin, apoi vârâm vârful instrumentului în piele în mod pieziș, la o adâncime cam de 2 milimetri și îl lăsăm acolo câteva minute, iar când îl scoatem îl tragem trecându-l astfel încât tot vaccinul să rămână în plagă. Pentru mai multă siguranță este bine ca să facem mai multe înțepături, câte 2—3 la fiecare braț. După operație lăsăm brațul neînvelit, liber, la aer, pentru ca sângele ce iese din răni să se usuce și să oprească pe loc vaccinul. Mai târziu lăsăm să se îmbrace brațul. *Vaccinarea prin scarificațiune* sau *sgăriere* se face astfel: după ce am preparat locul facem mai multe sgărieturi superficiale și apropiate între ele, interesând numai epidermul, pentru ca să nu curgă sânge și să spele vaccinul. Sgărieturile vor avea fiecare o lungime de 2—3 milimetri. După ce am făcut aceste sgărieturi, încărcăm vârful instrumentului cu vaccin și îl punem pe răni, apăsând puțin pentru ca vaccinul să intre mai bine. După vaccinare vom lăsa și aci brațul neînvelit, până după uscarea vaccinului. *Vaccinarea prin ardere* se face astfel: se ia un fier ars în foc și se aplică pe piele, producând o ușoară arsură. Pe acest loc se pune vaccinul. Când vaccinarea sau revaccinarea, repetată de mai multe ori, nu se prinde, este semn că acel om este neprimitor de vărsat și prin urmare putem să-l lăsăm în pace. Iată acum ce se întâmplă în zilele următoare, când vaccinul s'a prins: în cele dintâi 2—3 zile nu se vede nimic decât numai rănilor făcute cu instrumentul. Pe la sfârșitul zilei a *treia* se ivește un punct roșu, rotund, în dreptul fiecărei răni; roșeața aceasta este tare și în mijlocul ei se vede un punct ca o pișcătură de purice. În ziua a *patra* roșeața este mai mare

și cu o ridicătură la mijloc de formă rotundă și turtită la centru. În ziua a *cincea*, ridicătura se schimbă într'o beșicuță, în ziua a *șasea*, beșicuța și roșeața din jur se măresc și se înconjură de o cunună argintie plină de lichid, în ziua a *șaptea*, beșicuța se umflă și mai tare de lichid, iar roșeața din jur se întinde mai departe. Lichidul din zilele a *șasea* și a *șaptea* e cea mai bună limfă pentru vaccinat. În ziua a *opta*, beșica este mai largă mai plină și roșeața se întinde până la 3 centimetri de jur împrejur: în ziua a *noua* beșica se turbură, iar vârful ei se acopere de o coajă negricioasă. Bolnavul începe să aibă durere, căldură mare cu friguri. În ziua a *zecea* beșica se turtește, devine largă, umflătura din jur este mare și durerea este și mai mare, uneori așa de mare încât cel vaccinat face scurtă la sub-suoră. În ziua a *unsprezecea* beșica începe a se usca, devine tare și turtită, fără lichid, acoperindu-se cu o coajă cenușie tare, sau de culoare galbenă murdară. Dela a *douăsprezecea* zi înainte se află sub coajă puroi în loc de lichid limpede. Puroiul se împuținează zilnic, locul se desumflă și inflamația dispare cu totul precum și căldura bolnavului. Intre a *20-a* și *25-a* zi coaja cade și în locul ei rămâne o cicatrice, sau semn, care nu se șterge niciodată și care semn arată că omul a fost vaccinat. — *Revaccinarea* se face după 6—8 ani și ea se repetă de mai multe ori în caz de nereușită. După etatea de 25—30 de ani se mai poate încerca odată, pentru ca omul să fie cu totul asigurat în contra vărsatului.

Vagin (lat. *vagina*, teacă), *născătoare*, *teacă*. — Canal care începe la *vulvă* și se termină la *mitră*, de gâtul căreia se prinde de jur împrejur (v. *Mitră*). Vaginul este așezat între beșica udului și mațul șezutului (*rectum*), care se află înapoi; lungimea lui este de 14—16 cm.

Văjiituri de urechi. — De multe ori văjiiturile sunt semnul unei boale, a unei turburări în circulația sângelui, a unei îngrămădiri de sânge (congestie) în creeri, sau a unui anevrism, ori provin din anemie etc. Alte ori aceste văjiituri nu atârnă de o boală.

aşa de grea, ci numai de faptul că se aveau urechii s'a astupat cu cerumen, care s'a îngrămădit în fundul urechii, ca un dop, sau că a intrat în ureche un corp străin, după cum se întâmplă adeseori la copii. Mai pot proveni dintr'o inflamație (aprindere), din cauza unei tumori, dintr'o turburare nervoasă, în regiunile profunde. Ele se mai observă și în boalele de nas, catar naso-faringian, când se astupă trompa lui Eustache. *Tratamentul* vâjiiturilor de urechi variază după cauza care le-a dat naștere. Catarul naso-faringian se va combate cu spălături abundente prin nas și gură. În toate celelalte cazuri se va trata boala de care țin vâjiiturile și pentru aceasta se va chema doctorul, sau vreun specialist în boalele de urechi, care va institui un tratament potrivit. N'am spus nimic de vâjiiturile de urechi cari sunt produse de chinină, de acidul salicilic și alte medicamente și cari încetează odată cu efectul lor.

Vâlcele. — Ungurii îi ziceau Elöpatak. Stațiune balneară și climaterică cunoscută, din jud. Trei-Scaune. E așezată la 624 m. înălțime într'o regiune păduroasă. Apele conțin sare și sunt foarte bogate în fier și acid carbonic liber. Apa e radioactivă. Se recomandă pentru cei bolnavi de piept, de stomac, ficat, bășica udului, reumatism, gută, nervi, rachitism, anemie, boli de femei. Anotimpul : Mai—Octombrie.

Valea vinului. — Stațiune balneară și climaterică din jud. Bistrița-Năsăud, la o înălțime de 715 m., la 7 km. de Rodna-Veche. Apele conțin fier și acid carbonic liber mult. Se recomandă în bolile de plămâni, în anemie, slăbire fizică generală, boli de nervi, boli de femei. Anotimpul : Iulie—Septembrie.

Vălenii-de-Munte. — O oră departe de Ploști. Un orașel de munte pitoresc, așezat între livezi de pruni, pe râșorul Văleanca. Climă temperată, aer curat, dătător de sănătate celor slăbiți, anemicilor și neurasteniciilor.

Valeriană, gușa porumbului, năvalnic, odolean, (Valeriana officinalis, fam. valerianeeleor). — Plantă erbacee care crește prin fânețe umede și păduri umbroase, pe lângă pâraie. În medicină se întrebuințează rădăcina, care

are ca principiu activ *acidul valerianic*. Lucrează ca antispasmodic puternic. S'a dat și în contra frigurilor precum și în contra viermilor intestinali. Se dă sub formă de infuziune (ceai) 10 la 1000; pulbere 1—20 gr.; extract 1—10 gr.; esență 1—2 picături; sirop 20 gr.; tinctură alcoolică 2—20 gr.; tinctură eterată 2—5 gr. Pe *dinafară* sub formă de decoct, 30 la 1000.—La *țară* se întrebuințează foarte mult rădăcina de odolean, care se strânge toamna, se usucă și se păstrează în pod ferită de pisici, cari sunt atrase de mirosul ei particular. Se dă la copii cari sufăr de urdinare cu sânge (dizenterie), sub formă de ceai, care se prepară fierbând o mână de rădăcină la $\frac{1}{2}$ litru apă, se strecoară și se dă 5—6 lingurițe pe zi. Rădăcina plămădită în rachiul de drojdii, se dă în contra boalelor nervoase (isterici, palpitații nervoase). Copiilor cari sufăr de epilepsie li se fac băi cu rădăcină fiartă în apă. Femeile poartă la brâu odolean pentru ca să le aducă noroc în dragoste. — *Acidul valerianic* combinat cu *fierul* dă *Valeriantul de fier* (doză 10—15 ctgr.) cu *amoniacul* dă *valerianatul de amoniac* (5—50 ctgr.), cu *zincul* dă *valerianatul de zinc* (18—40 ctgr.) și cu *chinina* dă *valerianatul de chinină* (30 ctgr. până la 1 gr.). Aceste trei din urmă sunt foarte bune în contra nevralgiilor.

Validol, valerianat de mentol. — Stomachic, carminativ, analeptic. Se dă în neurastenii, isterie. Doză : 10—15 picături pe zahăr, sau în apă. Pe *dinafară* se dă în alifie 10—15 la 100, în cazurile de prurigo, boale de piele, coriză.

Valil, dietilamidă a acidului valerianic. — Lichid incolor, cu miros special, gust arzător. Sedativ, lucrând asupra sistemului nervos central. Se dă în capsule de câte 12 ctgr. 3—6 pe zi.

Valobromul este o combinațiune lichidă de principii activi ai Valerianei (extracțiune totală) cu bromuri organici și cu veronal. Se recomandă în : isterie, neurastenii, insomnii datorită unei comotii cerebrale, insomnie în cursul bolilor infecțioase acute, grave, neurastenii sexuală, tusa convulsivă, etc. Valobromul e pus în comerț în flacoane. Medicamentul are culoarea

brună, închisă, un miros ușor de valeriană, gust plăcut. Nu produce greață, nici repulsiune față de medicament. Doza: pentru copiii mici: 10 picături, între 5—12 ani; 30—60 picături, adulților 1—2 lingurițe, împărțite în 2 doze, una dimineața, alta seara.

Vânat. — Carnea de vânat este mult căutată de unele persoane, atât pentru gustul cât și prin însușirea ei hrănitore, fiind bogată în azot. Prin carne de vânat se înțelege aceea care ne-o dau animalele cari trăesc în stare sălbatică. Dacă vânatul este o mâncare bună pentru un om sănătos, el este însă foarte rău pentru cei bolnavi și convalescenți. Chiar și pentru cei sănătoși vânatul trebuie mâncat numai din când în când, iar nu zilnic, căci obosește stomacul, îl irită și poate să-l inflameze (gastrită). Carnea de vânat când este proaspătă fiind cam tare, este obiceiul ca ea să fie lăsată să stea vr'o două zile înainte de a fi gătită, să fie *fezandată*, dar să nu fie prea veche, putrezită, căci poate produce dureri de stomac, diaree, etc. Cei ce sufer de boale de stomac (dispepsie, gastralgie, gastrită), precum și cei atinși de boale de piele (eczemă, urticarie etc.) să se ferească de vânat.

Vânătaie. — V. *Echimoză* și *Conuție*.

Vânătoare. — Este un exercițiu foarte igienic care dezvoltă mușchii picioarelor, deschide pofta de mâncare, mărește puterea de mistuire a stomacului, care lucrează, în sfârșit, prin umbletul și prin adevărata baie de aer pe care trebuie s'o facem. Pe cât de sănătoasă este vânătoarea făcută în bune condițiuni, pe atât de primejdioasă este atunci când nu ținem seamă de unele reguli igienice, dându-ne, în loc de mulțumire sufletească, o tuse, un junghiu, sau reumatism, etc. *Înainte de vânătoare, în ajun* să mâncăm puțin, să ne culcăm de vreme, ca să dormim bine și dimineața să ne sculăm odihniți. Ca îmbrăcăminte se recomandă cămașă de flanelă, pantaloni de lână pe dedesupt, apoi o haină scurtă, mai subțire, sau mai groasă după anotimp, mănuși de piele, încălțăminte bună, de preferință cisme. *În timpul vânătoarei*, mâncare înainte de a ne obosi prea mult, să bem cât

se poate mai puțin și numai puțină cafea neagră, subțire și zaharată. *După vânătoare*, mâncare hrănitore, fără alcool, o oră de odihnă; seara culcatul de vreme. Vânătoarea este bună pentru oamenii artritici, reumatici, guțosi, prea grași, diabetici. Ea este rea pentru cei ce sufer de inimă, de năduf (emfizem), de tuse, de astmă.

Var (Apă de). — V. *Calciu*.

Vară. — Aceasta este anotimpul cel mai călduros și durează dela solstițiul de Iunie (21) și sfârșește la echinoxul de Septembrie (22). Vara este timpul fructelor, al pepenilor, al băilor reci și al băilor de mare, al durerilor de stomac și de intestine, al insolatiilor și al furtunilor. Efectele căldurii la noi nu sunt așa de simțite, așa de grave ca în țările calde din Africa, în unele părți ale Asiei și Americii, unde oamenii sufer mult de boale de ficat și de ochi. La noi boalele nu sunt produse atât de mult din cauza căldurii, cât din cauza greșelilor pe cari le facem. Pentru ca să ne apărăm de insolatie n'avem decât să nu umblăm cu capul gol mult timp în arșița soarelui. Pentru ca să nu suferim de durere de stomac și de mațe (colici), de urdinare, să nu facem abuz de mâncări și băuturi, să nu mâncăm fructe ne-coapte, nici multe când sunt coapte, nici să nu luăm înghețată, sau alte lichide prea reci, sau cu gheață, când suntem nădușiți. Prin urmare nu trebuie să învinovățim vara pentru aceste boale, ci numai lăcomia și nechibzuința noastră. Dintre boalele observate în timpul verii numai *congestia cerebrală* (îngrămădirea sângelui la cap) se poate atribui căldurii (v. *Căldură*). Zilele așa zise *caniculare* nu sunt așa de primejdioase pentru sănătate, după cum cred mulți (v. *Caniculă*).

Văratecu. — Mănăstrea de maici Văratecu este o stațiune climaterică. În județul Neamțu, situată la o înălțime de 470 metri și la o depărtare de o jumătate de oră de Târgu Neamțu. Această mănăstire se află într-o poziție admirabilă și este înconjurată de păduri ce se întind pe un platou foarte frumos. În jurul mănăstirii sunt multe căsuțe albe ale maicilor, cari se închiriază vizitatorilor. Clima este dulce, constantă, aerul curat și ozonizat, vânt-

turile lipsesc. Imprejurimi încântătoare : Poiana Țigăncei, Ciungi, Mănăstirile Agapia, Neamtu, etc.

Varice. — Se numește varice dilatația sau lărgirea permanentă a venelor. Varicele se arată de obicei între 30—40 ani, mai des la bărbați



Fig. 472
Varice



Fig. 473. — Varice ale gambelor, mai profunde

decât la femei și îndeosebi la acei cari prin meseria lor sunt siliți să stea mult timp în picioare, cum sunt negustorii, sergenții de stradă, tipografii, militarii, etc. La femei cauza de căpetenie este sarcina. Pentru producerea varicelor intră în joc doi factori și anume o presiune sangvină venoasă anormală, ceea ce explică de ce varicele se arată mai ales la membrele inferioare și o alterațiune a paretelui venos. Varicele se arată cu deosebire la gambă, adică dela glezne până la rădăcina coapsei. De obicei varicele încep prin vinele cele adânci și numai târziu vin și la cele de sub piele. Vinele încep a se arăta sub forma unor linii albastre, cari mai târziu se transformă în niște cordoane moi, de diferite grosimi, cari după umblet se îngroașe și mai mult, iar în timpul nopții se micșorează, se turtesc. Gambele sunt greoaie, bolnavul are dureri în pulpe, amorțeală în picioare cu înțepături și furnicături. Varicele prezintă mai multe complicații. Intre acestea avem mai întâi mult cunoscutele *ulcere varicoase*, răni nesfârșite, murdare și dureroase, de cari țărani noștri nu scapă nici în zeci de ani, mai ales că ei nu stau locului și nu se caută. Apoi mai avem ca complicații *flebita*, sau aprinderea vinelor, *emoragii*,

sau pierderi de sânge, *erizipel* sau brâncă. — *Tratamentul* varicelui, cel mai obișnuit și mai ușor este purtarea unui *ciorap elastic*, făcut din ață de bumbac, sau de matasă și din cauciuc, care trebuie să fie așa de lung încât să treacă mai sus de partea bolnavă. Acest ciorap trebuie să fie potrivit, adică nici prea strâns, nici prea larg. El permite bolnavului să-și vadă de ocupațiile lui și preîntâmpină complicațiile, mai ales ulcerale. Cel care este amenințat de varice, sau la care boala s'a declarat, nu va purta haine cari să-l strângă fie la trunchiu, fie într'un loc la membre, nu va purta jaretiere, se va feri să umble mult, sau să stea mult timp în picioare. Când însă varicele este prea dureros, sau complicat de flebite, de ulcere, de emoragii, se va recurge la *operație*, care de obicei constă în *legătura* trunchiurilor varicoase, sau în *resecțiunea* vinelor lărgite.

Varicelă, vărsat de vânt, vărsat în cruce. — Boală contagioasă (molipsitoare) epidemică. Ea atacă copiii dela etatea de 3 până la 7 ani, foarte rar după 10 ani. Cine a zăcut odată n'o mai capătă, decât numai în mod excepțional. Vărsatul de vânt nu este tot una cu vărsatul cel mare (variola). El este o boală de sine stătătoare, căci cine a zăcut de varicelă poate cădea bolnav de variolă și viceversa. Microbul varicelei nu se cunoaște până acum. Această boală are trei perioade. *Perioada I de incubatie* ține din minutul în care a intrat boala în corp până în minutul când ea se arată cam 16—19 zile. *Perioada II, de invazie* este caracterizată prin lipsă de poftă de mâncare, durere de șale, durere de cap și puțină căldură. Uneori temperatura se poate ridica până la 39—40°, rareori bolnavul are vărsături, durere de șira spinării, spasme. Durata acestei perioade este foarte scurtă, abia 24 ceasuri. *Perioada III de erupție*, constă în niște pete roșietice, cu câte o beșicuță la mijloc până



Fig. 474
Erupția varicelei

de lichid limpede și transparent. Beșicuța are cam mărimea unui bob de linte. În ziua întâiu aceste beșicuțe sunt rare, puține, 10—20, împrăștiate pe toate părțile corpului, pe față, pielea capului, trunchiului, membre, fără deosebire. Poporului nostru i se pare că aceste beșicuțe ar fi numai pe față, umere și piept, din care cauză a dat boalei numele de *vărsat în cruce*. În ziua următoare se ivesc 100—150, pete sau beșicuțe. Beșicuțele din ajun au început să se schimbe și apa lor să se turbure, să devină seropurulentă; cresc, devin neregulate și în jurul lor se formează o zonă inflamatoare. Ele produc durere și mâncărime iar spre ziua a patra se sparg și se usucă, formându-se o coajă negricioasă, care cade în curând, lăsând în urmă o pată roșietică vizibilă încă vreo câteva zile. Dar în același timp au putut să se ivească alte pete, dezvoltându-se în același mod. Erupțiunea se face altfel în 4—5 și uneori 10 zile. De cele mai multe ori bolnavul n'are febră în timpul erupțiunii. Unii bolnavi au curgere de sânge din nas; celelalte emoragii sunt rare. Varicela n'are complicații decât foarte rar și atunci sunt puse în socoteala unei boale concomitente, sau a unei infecțiuni oarecare. Intre aceste complicații se citează *varicela gangrenoasă*, care constă în aceea că pe la a 7-a zi a boalei, în loc ca beșicuțele să se usuce, se infiltrează cu sânge, se gangrenează. Inflamația se întinde cu 2 ctm în afără de ulceratie, se formează un șanț de eliminare, escara cade lăsând o rană (plagă) care supurează și bolnavul moare de infecțiune generalizată. Altă complicație este *nefrita*, care se poate ivi în toate perioadele varicelui. De obicei nefrita este ușoară și durează 4—5 zile, uneori însă poate fi mortală. — *Tratamentul* se mărginește numai la câteva prescripțiuni igienice, varicela fiind de obicei o boală ușoară. Bolnavul va sta în casă și despărțit de cei sănătoși, pentru ca să nu se îmbolnăvească și aceia. Se va da la început un purgativ ușor și ca mâncare numai lapte. Petele și beșicuțele se vor unge cu vaselină boricată și se vor presăra cu praf de talc steri-

lizat pentru ca bolnavul să nu aibă mâncărime și să nu se scarpine și să-i rămână semne. Urina se va examina pentru ca să se vadă dacă are albumină. Când s'a terminat erupțiunea, după 12—15 zile, se va face o baie cu săpun și bolnavul își va relua ocupațiunile.

Varicocel. — Când vinele cordonului spermatic sunt lărgite, în mod permanent, se zice că omul are *varicocel*. *Semnele* acestei boale sunt următoarele: regiunea numită ingvino-scrotală este umflată sub forma unei tumori alungite în sens vertical, cu nodulețe pe ici pe colo. Această tumoră merge în sus până la inelul ingvinal, iar în jos până în fundul boabelor, cari sunt trase în jos. La pipăire tumora este moale, păstoasă, neregulată, fără aderențe cu pielea. Dacă strângem puțin tumora în mână, sângele din vine fuge spre pânțe și tumora se micșorează, sau chiar dispare, pentru a reapărea îndată ce am lăsat-o liberă. Când omul stă culcat drept (orizontal) tumora scade, iar când se scoală în picioare ea crește. Bolnavul simte o greutate, uneori chiar durere, mai cu seamă când stă mult în picioare, sau aleargă. *Cauzele* varicocelului sunt: constipația, de oarece materiile adunate în mațul gros apasă vâna iliacă și împiedecă întrucâtva circulația sângelui, ceea ce face ca vinele scrotului și în deosebi a celui din stânga să se lărgască, purtarea unui bandaj de ernie (cerc pentru surpătură) rău aplicat și rău făcut. *Tratamentul* constă în purtarea unui *suspensor*, bolnavul să nu umble mult și să nu stea mult în picioare. *Tratamentul radical* constă în *operație*.

Variolă (lat. *variola*, dela *varius*, pătat), *bubat*, *vărsat*. — Această boală este cu mult mai veche decât creștinătatea. Este cunoscută în toată lumea, căci pretutindenea a dus jalea cu dânsa. România a fost mult încercată. Variola este o boală molipsitoare, cu fierbințeală și cu eșire pe corp a unor ridicături mici (beșicuțe), turtite la mijloc și în cari se formează puroi. Când beșicuțele se usucă ele cad și lasă în urma lor niște ciupituri cari rămân pentru toată viața. Ca toate boalele molipsitoare vărsatul tre-

bue să-și aibă microbul său, pe care unii învățați l-au și descris, fără să-l poată cultiva. Variola se ia dela om la om prin puroiul și cojile beșicuțelor, prin aerul răsuflat de bolnavi, prin hainele, rufăria și cadavrele celor ce au zăcut de vărsat. — *Formele* sub cari se arată această boală sunt mai multe: 1. O formă *ușoară* numită *discretă* (risipită) în care beșicuțele sunt puține la număr și rare, iar sfârșitul întotdeauna bun; 2. O formă *grea* zisă *confluentă* (reunită) în care beșicuțele sunt numeroase și apropiate unele de altele, fierbințeala mare și sfârșitul mai întotdeauna rău; 3. O formă *foarte grea*, numită *vărsat negru* sau *variolă emoragică*, în care beșicuțele sunt foarte numeroase și se umplu cu sânge, care se mai revărsă pe sub piele și pe sub căptușeala dinăuntru a corpului sub formă de pete negre și care omoară întotdeauna. Mai este o formă ușoară numită *varioloïdă*, care se observă câte odată la copiii vaccinați. — Vărsatul atinge toate etățile dar mai cu osebire pe copii. Un om bolnav de vărsat nu-l mai capătă și dacă întâmplător îl mai are, el este foarte ușor. — *Semnele* acestei boale se deosebesc după perioadele ei, cari sunt în număr de 5 și anume: 1. *Perioada de incubatie* (clocire), prin care se

înțelege tot timpul ce se strecoară dela intrarea otrăvii în corp până la întâia arătare a boalei și în care timp omul pare a fi sănătos; ea durează dela 5 până la 10 zile. 2. *Perioada de invazie* (năvălire) începe printr'un fior strașnic, urmat de sudoare mare, prin indispoziție, lipsă de poftă de mâncare, o sete mare și printr'o durere de cap. Căldura corpului se urcă deodată la 40 grade și uneori mai sus, rămânând astfel până în perioada următoare. Bolnavul mai are greață, vărsături și de obicei constipație (încuietură), durere de șeale uneori foarte mare și o slăbiciune în



Fig. 475
Bolnav de variolă, în plină erupție

picioare. Câte odată, mai ales copiii, au spasme (convulsii), uneori aiurează, alteori răsuflă greu, tot atâtea semne rele. În unele cazuri se ivesc pe corp niște pete roșii cari, sub apăsarea degetului, pier, alteori însă aceste pete stau neschimbate, semn că sângele s'a revărsat pe sub piele. Mulți copii au urdinare. Se mai pot observa curgeri de sânge din nas (epistaxe). Această perioadă poate dura 2—4 zile. 3. *Perioada de erupție* (izbucnire) se cunoaște prin aceea că fierbințeala scade, căldura corpului revine ca în stare de sănătate, bolnavul se simte bine, mai ales când avem a face cu forma ușoară (discretă). Izbucnirea se face prin niște pete mici roșii, puțin ridicate la mijlocul lor și cari ridicături se transformă în niște beșicuțe pline cu un fel de apă limpede, cari se turtesc la mijloc scufundându-se sub formă de buric. Când aceste beșicuțe sunt puține la număr și rare, avem variolă discretă; când ele sunt numeroase și apropiate unele de altele avem forma confluentă. Fața se umflă și se acoperă de o roșeață lucitoare, presărată cu un mare număr de ridicături roșii unele lângă altele încât nu se mai pot deosebi. Când aceste ridicături se preschimbă în beșicuțe, acestea se împreună între ele. Tot așa se umflă și mâinile și picioarele. Izbucnirea aceasta începe cu capul și gâtul apoi se scoboară către picioare și într'o zi și jumătate cuprinde tot corpul. Când boala are să fie ușoară erupțiunea se face numai înafară, pe piele. În cazurile mai grele ea se face și pe căptușeala dinăuntru, în gură (scuiat mult), pe esofag, dând greutate la înghițit și urdinare, pe trachee, dând răgușeală, înecăciune și tusă. Când se face pe ochi avem lăcrămare, frică de lumină și putem să orbim. 4. *Perioada de supurație* (facerea de puroiu) începe prin aceea că beșicuțele se turbură și se înconjură de un cerc roșu, mai întâiu cele dela cap, apoi celelalte. Părțile atinse se umflă, mai întâiu fața, apoi mâinile și picioarele. Cu cât beșicuțele au fost mai multe cu atât și umflătura se face mai mare. Fierbințeala dela perioada a doua începe din nou și căldura poate să se urce până la 42

grade, când bolnavul are aiurare și neastâmpăr. În această perioadă se pot ivi diferite complicații pe cari le vom arăta mai la vale. Durata acestei perioade este de 5—6 zile.

5. *Perioada de desicație* (uscare) se poate face în două moduri; beșicuțele pline de puroi se sparg, puroiul se scurge și rănila ce rămân se închid, sau puroiul revărsat se usucă și se prefăce într'un fel de coji galbene verzui, iar pielea de desuptul lor este roșie, sângerândă. Aceste coji cad dela sine cătră ziua a 20-a lăsând în piele niște ciupituri, mai mari sau mai mici, mai multe sau mai puține, după cum a fost forma boalei — Vărsatul *negru*, care este cel mai grozav, are un mers cu mult mai repede și este caracterizat prin revărsări de sânge pe sub piele, prin nas, gură, ud, etc. și bolnavul moare în 3—4 zile. — *Complicațiile* vărsatului sunt: aprinderi de creeri, urdinare ce nu se poate opri, aprindere de plămâni, de inimă, orbire, curgerea urechilor, etc. — *Tratamentul* variolei se deosebește de al celorlalte boale molipsitoare prin faptul că avem la îndemână un mijloc puternic de a preîntâmpina boala: *vaccinarea* (v. *Vaccin* și *Vaccinare*), așa că părinții trebuie să-și altoiască copiii cât se poate mai de vreme; cu cât vaccinarea se face pe scară mai întinsă pe atât și boala se arată mai rar. Odată variola declarată tratamentul se bazează mai mult pe igienă: bolnavul va sta culcat într'o odaie mare, bine aerată cu o temperatură egală, de 18°, fiind ușor acoperit, se va hrăni numai cu lichide, băuturi abundente, lapte, zeamă de carne, calde sau reci, se vor da tonice, alcool, sulfat de chinină, acid salicilic se vor da purgative pentru a combate constipația, băi de săpun cu 15—20 gr. de sublimat corosiv, spălături boricate la ochi, nas, gură. Pentru a combate fenomenele infecțioase și a micșora supurația se pot întrebuința următoarele: Se vor face ungerile cu alifii cu sublimat corosiv, acid salicilic (1 la 20), cu salol (1 la 10), sau cu ichtiol. Se vor face băi calde, antiseptice, cari calmează durerile și împiedică infecțiile secundare. Băile reci sunt bune pentru căldura prea

mare și pentru accidentele nervoase; se vor face tot la 3 ore, când căldura va fi mai mare de 39° și vor ține 10—20 minute la o temperatură de 18—22°. Ele se pot înlocui cu afuziuni reci. *Seroterapia*, făcută cu serul luat dela vițelele vaccinate, a dat rezultate bune. Sfătuim încă odată pe toți părinții să-și vaccineze copiii, chiar la câteva săptămâni după ce s'au născut și să-i revaccineze la 6—7 ani, ca să-i apere de această grozavă și omorătoare boală.

Vărsat. — V. *Variolă*.

Vărsat de vânt. — V. *Varicelă*.

Vărsat în cruce. — V. *Varicelă*.

Vărsare de sânge. — V. *Ematemeză*.

Vărsături. — Vărsăturile se observă în mai multe boale. Uneori omul are numai o singură vărsătură; alteori varsă de mai multe ori în aceeași zi, sau varsă mai multe zile dearându-l, după care ele se opresc fără să mai revină. În aceste cazuri dacă materiile vărsate se compun din mâncări și băuturi, curate sau amestecate cu venin, este vorba de o simplă *indigestie*; dacă vărsăturile sunt verzi poate să fie vorba de *peritonită*; iar dacă, după ce la început ele au fost compuse numai de mâncări și băuturi, omul varsă niște materii vâscoase (cleioase) și transparente, atunci putem să ne gândim la vr'o *febră eruptivă*, sau *febră tifoidă*, ori la vreo *inflamație de piept*, sau la vreo *congestiune de creier*, *meningită*, *brâncă*, sau este vorba numai de un *vău de mare*. Când vărsăturile se însoțesc de dureri mari de stomac și s'au produs îndată după ce omul a mâncat ceva, ne putem gândi la vreo *otrăvire*. Alteori vărsăturile se repetă timp îndelungat, săptămâni, luni și chiar ani dearându-l, după cum se întâmplă în *boalele cronice de stomac*, și anume: o *dispepsie* sau o *gastrită cronică*, în care caz materiile se compun numai din mâncări, sau dintr'un lichid vâscos, gumos, care se întinde ca ața, sau un *ulcer de stomac*, un *cancer* (rac) la stomac, dacă pe lângă aceste materii se mai află și sânge în vărsături. De altfel omul poate să aibă vărsături de sânge și din alte cauze, așa de exemplu dintr'o rupere a unui vas sangvin (o arteră sau vână), produsă printr'o sforțare

VĂRS

mare, sau printr'o lovitură sau cădere asupra stomacului (la lingurea), însă în aceste cazuri vărsăturile de sânge sunt trecătoare și nu se mai repetă. Vărsăturile nu se observă numai în boalele de stomac și de intestine. Sunt unii *ofticoși* cari au adeseori vărsături, cei cu *tusă măgărească* au vărsături dese și cari țin 15—20 zile, cei cu *boale de ficat* de asemenea varsă de multe ori cu venin și chiar cu sânge, femeile *însărcinate*, de multe ori varsă mai multe luni la începutul sarcinii, cei *adormiți cu cloroform*, unii varsă nu numai în timpul somnului ci și după ce s'au deșteptat încă 2—3 zile, cei cu *boale nervoase* (isterie, neurastenii) sau cu *boale de creier* și de *măduva spinării* (meningită, encefalită, tumori cerebrale, ataxie locomotrice, etc.) au adeseori vărsături. — *Tratament*. Înainte de toate trebuie căutată cu atențiune *cauza* vărsăturilor și odată găsită *boala* care le produce, se va institui tratamentul acelei boale. În general se vor suprima alimentele și se vor prescrie *băturile reci* cu ghiață, sau *gazoase* (apă de Seltz, șampanie frapată) luată în cantități mici și des. Se va da *poziunea lui Rivière*, la fiecare oră câte o lingură. Afară de aceasta bolnavul va înghiți din când în când câte o bucatică de ghiață. În caz de *indigestie* se vor înlesni vărsăturile dând *ipeca* (50 ctgr până la un gram la copii, 2—4 gr. la adulți) sau dându-i să bea apă caldă. În caz de *otrăvire* se va da un vomitiv și se va face spălarea stomacului. În caz de *dilatație de stomac*, sau de *cancer de stomac*, se va face spălarea stomacului și se vor da antiseptice intestinale. În *celelalte cazuri* se va da ghiață pe dinăuntru și pe dinafară, revulzive asupra stomacului (muștare, cataplasme de în presărate cu muștar, vezicători, puncte de foc). În vărsăturile *nervoase* (isterice) se vor prescrie antispasmodice, preparațiunile de valeriană, mentol, cocaină, apă clorformată, sau se va face spălarea stomacului. În vărsăturile *sarcinii* se pot încerca toate medicamentele notate mai sus. Se vor respecta capriciile alimentare ale bolnavei. Se vor aplica revulzive, pulverizațiuni cu eter, sau clorur de metil, dealungul șirii spi-

VÂSC

nării și în cele din urmă, dacă nu încetează, se va cere ajutorul unui medic mamof.

Varză, *curechiu* (*Brassica oleracea*, fam. cruciferelor). — Este una din legumele de căpetenie pentru hrana țaranului român, din care pricină se cultivă în măsură foarte mare. Zeama de varză este foarte plăcută la gust și cu cât este mai sărată cu atât este mai purgativă, pentru care mulți o beau ca doctorie, singură, sau cu puțin untdelemn, sau ulei de ricină. Varza este prea puțin hrănitoare, gătită însă cu grăsime, iar în post cu untdelemn sau ulei, sau gătită cu carne, este o mâncare bună și hrănitoare. Se mistuie cam greu, din care cauză este bine s'o mănânce numai cei cu stomac sănătos și chiar și aceștia să nu mănânce prea mult odată, nici prea des. Varza acră să nu se păstreze în vase cari coclesc, căci atunci este otrăvitoare.

Vâsc (*Viscum album*, fam. loranta-ceelor). — Plantă parazită care crește pe ramurile merilor, perilor, mai rar pe ale stejarilor, răchitelor și ale bradului alb. Din cercetările mai nou rezultă că preparatele din *vâscul proaspăt* au o lucrare cu mult mai mare decât cele din vâscul învechit, uscat. Din vâscul proaspăt se scoate un alcaloid volatil, lichid, numit *viscabină* și un corp de natură glicozidică, numit *visciflavină*, cărora își datorește vâscul proprietățile lui. Preparațiunile de vâsc proaspăt lucrează cu mult succes în toate boalele în cari *îpertensiunea* este mare: arterio-scleroză, aterome, gută, eclampsie, în otrăvirea cronică cu *plumb* (saturnism), în scuierea de sânge a ofticoșilor (*emoptizie*), în curgera de sânge din nas (*epistaxă*) la vârsta pubertății, etc., căci vâscul produce o lucrare *sedativă* asupra sistemului nervos central și asupra nervilor yasomotori și prin urmare o *îpertensiune*, din care pricină vâscul poate fi considerat ca un bun *antispasmodic*. La *țară* vâscul de păr și de brad, fiert cu apă, se bea în contra *astmei*, ceaiul de boabe pentru *tusă* și durere de piept, se mai dă în contra crampelor și în contra epilepsiei. Din fructele de vâsc se prepară cleiul de prins paseri.

Vaselina, *petroleină*. — Amestec de uleiuri grele, reziduu al distilațiunii petroleului, purificat și decolorat prin filtrațiune caldă prin negru animal. Vaselina este roșie, blondă sau albă. Pentru ca să fie groasă i se adaugă ceară, 5—10 la 100. Vaselina este neutră, insipidă, nu se saponifică, rezistă la acțiunea acizilor și alcalilor, nu se topește în apă și glicerină, foarte solubilă în alcool, nu se alterează și este un foarte bun excipient pentru alifii (pomade). Ea disolvă iodul, bromul, alcaloizii, puțin acidul fenic, unele săruri și oxide metalice. Sub numele de *ulei de vaselină* se înțelege o vaselină lichidă la temperatura ordinară.

Vâslit. — Nici un exercițiu nu poate fi mai bun decât acela pe care îl face vâslașul, căci pune în mișcare cel mai mare număr de mușchi, într'un timp foarte scurt. Când ne uităm la un vâslaș putem vedea cum își contractă succesiv mușchii antebrațelor, ai gambelor și ai coapselor, ai spatelui și ai pieptului, în fiecare din cele două timpuri cari constituiesc actul de a vâsli. Din aceasta rezultă ca vâslitul are o mare valoare igienică și este bine să-l facă toți cei ce sunt în stare să-l facă. Trebuie să arătăm și neajunsurile acestui exercițiu. Între acestea vom trece cu vederea peste beșicile cari pot fi produse în palme, prin frecarea lopeților și peste răceala care de altfel se poate ocoli îmbrăcând o flanelă pe care o putem schimba la urmă. Primejdia cea mai de căpetenie este că vâslitul, prin natura lui, este un exercițiu violent, care face să funcționeze peste măsură inima și plămânii, așa că toți cei ce sufăr de palpitații (bătăi de inimă) și cari au răsuflarea scurtă, nu trebuie să vâsleze.

Vată. — Astfel se numește *bumbacul* separat de toate părțile cari ar putea să supere întrebuințarea sa în chirurgie. Foile de vată, groase și mlădioase, sunt mai bune decât oricari alte substanțe pentru facerea pansamentelor (legarea rănilor). Vata se întrebuințează la pansamente, simplă sau înmuiată în substanțe *antiseptice*. Vata simplă însă trebuie să fie cât se poate de *aseptică*, adică fără nici un microb, iar pentru a o păstra tot astfel ea trebuie să fie ținută în vase bine închise,

cari nu se vor deschide decât în momentul întrebuințării, după care se vor închide imediat. Vata servește pentru aparatele compresive și pentru aceasta nu poate fi întrebuințată decât numai o singură dată, mai ales când a fost prea strânsă. *Vată idrofilă* se numește aceea care a fost desfăcută de o parte din apa ei printr'o preparațiune specială. Ea fiind foarte avidă de apă, constituie un foarte bun absorbant (vezi *Pansamente*). Se întrebuințează 3 feluri de vată: vată idrofilă, vată lucioasă (cenușie) și vată de hârtie (celuloză). Cea mai bună este cea idrofilă.

Vătămătură. — Sub acest nume se înțelege în poporul nostru aproape toate durerile din pânțe, fie ele dureri, sau *colici* de mațe, de ficat, de rinichi; hernia de asemenea se cheamă vătămătură.

Vedere (lat. *visus* grec. *ophis*) *văz*. — Vederea este unul din cele cinci simțuri ale omului care îl pun în legătură cu lumea dinafară, permițându-l să vadă lucrurile cari îl încunjură și să-și dea seama de forma, mărimea poziția, culoarea lor, etc. Vederea se face cu ajutorul *ochiului*, care este însărcinat să primească impresiunile venite din afară și a unui organ intermediar, *nervul optic*, care duce aceste impresiuni dela ochiu la *creier*, care le primește. Imaginile obiectelor exterioare se formează pe pelița din fundul ochiului, numită *retină*, cu ajutorul razelor luminoase cari pleacă dela aceste obiecte, străbătând succesiv mai multe lentile convergente și cari sfârșesc prin a se încrucișa formând pe retină imagini. Vederea este *bună* când vedem lucrurile lămurite, cu diferitele lor caractere de mărime, de formă, de poziție, etc., fără efortare, fără oboseală, de aproape ca și mai departe. Pentru aceasta trebuie ca toate organele vederii să fie în stare bună și să funcționeze bine, adică ochiul, nervul optic și creierul. În boalele ochiului vederea suferă; astfel când cornea are pete, (albeață) razele luminoase nu pot pătrunde în ochiu. Același lucru se întâmplă când cristalinelul este opac (perdea, cataractă), iar când razele luminoase se încrucișează și formează imaginea înaintea

retinii, omul are vederea scurtă (v. *Miopie*). Când imaginile se fac înapoia retinii omul are vederea depărtată (v. *Hipermetropie*). Vederea prezintă turburări mai mult sau mai puțin mari și în alte boale de ochiu (v. *Ochiu*). — *Igiena vederii* constă în a ne feri de toate influențele cari obosesc și irită ochii. Vânturile, aburii, gazele, fumul, praful, toate sunt tot atâtea cauze de iritație și pentru a le evita efectul este bine ca cel care este mai expus să poarte ochelari cu sticle simple, drepte, iar în contra luminii prea mari ochelari fumurii. Contra luminii artificiale prea mari ne putem apăra prin punerea unui cozoroc înaintea ochilor, sau un abajur de lampă, sau să purtăm ochelari fumurii, sau albaștii, mai ales când mergem la teatru și în alte săli de spectacole cu multă lumină. Cetitul și scrisul mult, lucrul de mână al femeilor (broderii), etc.) obosesc foarte mult ochii, dar fiindcă aici nu ne putem servi de ochelari (de cât în caz de ipermetropie), cel mai bun lucru este să știm să ne oprim la timp, dând ochilor odihnă câteva minute și aceasta făcând-o la fiecare oră, sau chiar la fiecare jumătate de oră. S'a constatat că și tutunul are influență rea asupra vederii, lucru de care trebuie să țină seamă toți fumătorii.

Vegetarianism. — Când am vorbit despre *alimente* și *alimentație* am arătat că omul să se hrănească cu substanțe animale și vegetale, să aibă un regim mixt și variat. Sunt însă mulți oameni cari se hrănesc numai cu vegetale, din care cauză li s'a dat numele de *vegetarieni*, care nu admit nici un aliment dat de regnul animal, mulțumindu-se cu *regimul vegetal*, cât se poate de strict, compus numai din *legume* și *fructe*. Unele alimente vegetale se mistuie cu greu, produc gaze intestinale, dureri și diaree, produc slăbiciune și sărăcesc sângele.

Venerice (boli), boli lumești. — V. Sifilis, Blenoragie, Șancrul moale.

Venesecție. — V. Lăsare de sânge.

Venin. — V. Fiere.

Veninariță, *avărămească creștăneasă*, *milostivă*, *potroacă* (*Gratiola officinalis*, fam. scrofulariaceelor). — Plantă erbacee veninoasă, care crește prin mlă-

știni, bălți, șanțuri cu apă, fânețe umede, pe malurile apelor. Se întrebuințează planta înflorită ca purgativ tare și în contra gutei, sub formă de praf 50 ctgr. până la 1 gr și jumătate pe zi. — La țară se întrebuințează în contra frigurilor, pentru durere de stomac și pentru tusă. În unele părți o iau femeile cari nu fac copii. În alte părți se afumă cu ea pentru *răul copiilor*, pentru spaimă, lipitură și vânturi rele, sau se fac scăldători din foi pentru pișcătură, se afumă contra ceasului rău, se descântă de dragoste.

Ventilație. — V. *Aerisire*.

Ventuză. — Ventuzele sunt niște păhăruțe de sticlă, cari au forma clopotului. Se aplică pe o parte a corpului după ce am gonit aerul din ele și pielea de desupt începe a se suge înăuntrul lor, adunând în acel loc sânge din toate părțile a dânci, așa că ventuzele lucrează ca *derivative*. Ventuzele se chiamă *uscate*, atunci când le punem numai pentru a aduna sângele sub ele, iar când creștăm pielea și aplicăm pe deasupra ventuzele, ca să tragă sângele afară, se chiamă ventuze *tărate*, sau *scarificate*. Ventuza cu



Fig. 476 — Diferite feluri de ventuze



Fig. 477. — Aplicarea ventuzelor

pompă este aceea care se goleşte de aer prin ajutorul unei pompe

fixate la fundul ei. Pentru a aplica o ventuză vom face golul, adică vom goni aerul din ea, cu ajutorul focului, aprinzând o bucată de hârtie în interiorul ei, sau cu un pământ înmuiat în spirt, pe care îl aprindem și îl ținem câteva secunde în păhar, după care îl aplicăm repede pe piele. Focul rărește aerul, îl gonește și în golul ce se face în păhar este trasă pielea și odată cu ea este tras și sângele de desupt și din jur care este impus de presiunea atmosferică. Din cauza îngrămădirii de sânge în pielea de sub păhar ea se înroșește și când sângele este mult se învinețește. Nu trebuie să aplicăm ventuza



Fig. 478 — Aplicarea ventuzelor cu cauciu

(Într-o secțiune — a — se vede cum se umple cu pielea, sub apăsarea fesuturilor dinăuntru în afară).

până ce nu s'a stâns focul din ea, pentru ca să nu ardem pielea. În loc de ventuze putem pune și păhăruțe de vin cu buzele mai groase. Ventuzele cu pompă se aplică cu mai mare înlesnire și fără teamă de a arde pielea. Când vom să ridicăm o ventuză, după ce ea a lucrat, vom prinde-o cu o mână de fund, iar cu degetul arătător dela mână cealaltă vom apăsa pielea dela marginea gurii, pentru ca să intre puțin aer și îndată ventuza se desface și cade singură. Pielea rămâne vântată mai multe ceasuri, când ventuza a fost bine aplicată, apoi își reia culoarea obișnuită. Ventuzele se lasă pe loc cam 10 până la 30 minute, după efectul pe care vom să-l avem. Numărul ventuzelor depinde de boală; el poate

fi de 10, 20 până la 40, aplicându-se pe aceeași parte. Ele se pot aplica de mai multe ori dacă trebuința cere. Ventuzele se aplică de obicei pe piept și pânțele, deasupra ficatului când el este umflat și dureros, pe partea dreaptă a pântecelui, iar când splina este bolnavă se pun pe partea stângă. La piept se pun acolo unde este, sau unde bolnavul simte, junghiul, în cazurile de congestie pulmonară (îngrămădire de sânge la plămâni), de pleurezie, de pneumonie, de dureri nevralgice, sau reumatice. Ventuzele tăiate, sau scarificate, se aplică mai întâi sub formă de ventuze uscate, apoi după ce s'a înroșit și învinețit pielea se scot și pe pielea ridicată și roșie se fac niște creștături cu vârful unui brici sau bisturiu, ori mai bine cu ajutorul unui instrument numit *scarificator*, pe care l-am descris în articolul: *scarificație* (vezi fig. 396). După ce am făcut aceste creștături aplicăm din nou ventuzele, cari acum trag sângele adunat și se umplu, după care le ridicăm, spălăm locul și la nevoie oprim sângele de a curge, punând vată și legând strâns partea locului. Aceste ventuze tăiate se vor pune numai după porunca doctorului.

Veramonul. — Este un praf galben, solubil în apă caldă. E un medicament analgezic foarte bun. Se recomandă în orice fel de durere, în doze de 1—4 tablete de câte 0,2 gr., pentru adulți, pe zi; copiilor li se dă doza jumătate.

Verbină, *verbină de câmp, maturită, sporici*, (*Verbina officinalis*, fam. verbenaceelor). — Plantă erbacee, care crește prin locuri pustii, necultivate, pe lângă drumuri, ziduri, dărâmături, etc. În medicină se întrebuințează frunzele, esența, pentru proprietățile sale amare, aromatice, astringente, excitante, stomachice. Se dă sub formă de infuzie (ceai), 10 la 1000. — La țară se vindecă cu ea răia făcând băi, cari se mai fac și la copiii slabi, anemici.

Vermut. — Adevăratul vermut, numit și de *Turin*, se compune din vin alb, în care se plămădește coajă de chinchină, cuasia, coji de portocale, coriandru, anason stelat, micsandră, scorțișoară, centaură și alte substanțe amare și aromatice. Vermutul se ia

înainte de masă pentru a atăta apetitul și a ușura mistuirea. Din nenorocire însă vermutul nu este curat, ci întărit cu spirt, ceea ce îl face primejdios și de care trebuie să ne păzim. Vermutul curat este bun și se poate lua în măsură mică, din când în când și numai la trebuință, fără însă ca să ne obișnuim a-l lua zilnic și de plăcere, ceea ce nu ne-ar face bine.

Veronal. — Bun ipnotic în insomniile nervoase. Se dă în doză de 25 ctgr. până la 1 gr., în buline sau în ceai de floare de teiu, în momentul culcării.

Veropiron. — Este un acid dietilbarbituric, combinat cu amidopirina. Este un bun calmant în durerile de orice natură, în stările de hiperexcitabilitate nervoasă și în insomnia cauzată de dureri. N'are nici o acțiune vătămătoare asupra inimii. Se dă în cazurile de migrenă, sciatică, gută, lumbago, etc., în doză de 1 tabletă de 3—4 ori pe zi pentru adulți.

Versiune (lat. *versio*, dela *vertere*, a întoarce, a înturna). — Astfel se numește operațiunea prin care copilul se întoarce, sau este întors, în mod artificial în pânțele mamei sale (în mîtră). Când se face dela sine se zice versiune *spontană*. Versiunea *artificială* se face de doctorul-mamoș în două feluri : prin *manopere externe*, aplicând mâinile asupra pântecului și făcând diferite apăsări și mișcări și prin *manopere interne*, introducând mâna în mîtră.

Vertebre. — V. *Columna vertebrală*.

Veșminte (lat. *vestimentum*), *haine*, *îmbrăcăminte*, *straie*. — Veșmintele servesc omului ca să-i mențină căldura corpului la un grad cât se poate de puțin variabil, reducând pe de o parte pierderea căldurii în timpul iernii și micșorând pe de altă parte acțiunea prea mare a căldurii solare în timpul verii. Pentru a îndeplini aceste cerințe trebuie ca veșmintele din toate anotimpurile să fie rele conducătoare de căldură, pentru ca să nu lase căldura corpului nostru să se piardă înafară, în timpul frigului și pentru ca să împiedece căldura din afară ca să pătrundă până la corp, în timpurile călduroase. Cele mai multe din țesăturile din cari se face îmbrăcăminte noastră îndeplinesc aceste condițiuni.

Țesăturile din cari se fac veșmintele se iau o parte din regnul animal și anume : *lâna*, *mătasa*, *blănurile*, *flanella* și am putea adăuga și *pielea* din care se fac încălțămintele ; iar altă parte din regnul vegetal, cum sunt : *inul*, *cânepa*, din cari se face pânza și *bumbacul*. Dintre acestea pânza și bum-bacul fac să se răcească mai iute corpul decât lâna și mătasa, din cauză că pânza lasă să treacă cu ușurință căldura din corp, pe câtă vreme lâna o ține îngrămadită pe loc ; astfel dar ne vom îmbrăca vara cu pânză, sau stofe, făcute din țesături analoage și iarna cu haine făcute din lâna. Mătasa este o stofă intermediară între pânză și postav : răcoroasă în timpul verii și în-deajuns de călduroasă în timpul iernii, păcat numai că ea este scumpă și n'o pot avea toți. Coloarea stofelor are deosebită importanță când este vorba de îmbrăcăminte : colorarea neagră aplicată la suprafața unui corp absoarbe căldura, o înmagazinează la trecerea ei, pe câtă vreme colorarea albă o reflectează, nu se încarcă cu ea. Deci în timpul verii vom purta mai mult haine de culoare deschisă, albe, iar în timpul iernii de culoare închisă, negre. Să nu pierdem din vedere că sunt unele vâpseli cari pot fi periculoase, cum sunt vâpselile verzi, arsenicale. De asemenea trebuie să ne ferim de tincturile și vâpselile cari cuprind anilină și cari pot da naștere la accidente grave, de oarece vaporii de anilină se pot absorbi prin piele și prin căile respiratoare. Oricare ar fi stofa din care se face îmbrăcăminte, faptul este că aceasta ia apa sudoarei eșite din corpul nostru, se îmbibă, se răcește și astfel răcește și corpul, după cum se întâmplă cu haina făcută din pânză, adecă cu cămașa și din care cauză se recomandă ca omul să poarte pe piele flanella, care absoarbe sudoarea și o împiedecă de a sta pe corp și să-și schimbe haina ori de câte ori este îndădușit, pentru ca să nu răcească. Forma veșmintelor depinde de climat, de obicei, de profesiuni, etc., așa că n'avem să ne ocupăm de ea aci. Tot ceea ce putem spune este că veșmintele trebuie să fie destul de largi ca nici o parte a corpului să nu fie prea strânsă, pentru ca miș-

cările să se facă liber, funcțiunile organelor să se îndeplinească în mod normal și circulația sângelui să nu fie împiedecată. Prin veșminte se pot transmite o mulțime de boale microbiene, cum sunt: angina difterică, oftica, pojarul, scarlatina, vărsatul, tusa măgărească, etc.; diferite boale de piele, râia, chelia, etc., pentru aceasta nu este bine să se servească omul de haine vechi decât numai fiind sterilizate în etuva de desinfec-tare, iar dacă nu se poate face aceasta, e mai bine să se ardă.

Vestă, jiletcă, pieptar. — O haină care nu este de lux, căci o vestă bine făcută închide la suprafața corpului un strat de aer care îl pune la adăpost de schimbările temperaturii și întreține o căldură mai potrivită, mai egală decât haina purtată pe deasupra ei. O vestă strămtă are cusurul de a strânge pieptul și pânțele și prin urmare de a supăra respirația și digestia. Vesta trebuie purtată în toate anotimpurile, însă stofa ei va varia după vreme, așa în timp de iarnă ea va fi făcută de postav, de lână, iar în timp de vară de pânză, de pichet. Vestele deschise în sus prea mult nu sunt bune, căci nu adăpostesc îndeajuns pieptul, ceea ce nu-i bine pentru persoanele slabe de piept. Pieptarul țaranului nostru este foarte bun întru cât el se încheie la o parte, așa că pieptul îi este acoperit în partea de dinainte, nu cum se întâmplă când este îmbrăcat numai cu cămașa și cu cojocul, cari nu se încheie bine înainte, lăsându-i pieptul gol.

Vetrice, jerecea, iarba raiului, vetricea, vitriță (*Tanacetum vulgare*, fam. compozitelor). — Plantă erbacee, aromatică, ce crește pe lângă drumuri și garduri, pe câmpuri și prin locuri necultivate, pe marginea râurilor, prin livezi și locuri umede. Se întrebuințează planta înflorită, care are proprietăți amare și aromatice; se dă în contra viermilor intestinali (limbrici). Pe *dinăuntru* se dă sub formă de infuziune (ceai) 5—10 la 1000, ulei volatil 1—2 picături, în clisme, 10—15 pentru o clismă. — La *șară* se dă ceaiul de vetrice pentru friguri, decoctul (fieritura) pentru mătice, floa-

rea uscată, pisată și amestecată cu miere se dă pentru limbrici, iar pentru lingoare se fac scăldători de vetrice.

Veziători. — Vezicătoarea este un *topic* care se aplică pe piele, pentru ca să producă o aprindere (inflamaune) cu formare de beșici pline de un fel de apă. Vezicătorile sunt de 2 feluri: *volante*, sau *temporare*, cari se aplică pe piele cu scopul de a o inflama și a obține o curgere de serozitate (apă), cari nu trebuiesc să supureze (să facă puroi) și cari se vindecă repede; *permanente*, cari trebuiesc să lucreze mai mult timp și să supureze. Vezicătorile sunt făcute sub formă de plastore, din talion (diachilon) amestecat cu *praf de cantaridă* dela gândăcei, care trăiesc pe frasini. Acești gândăceii se usucă, apoi se pisează bine și acest praf se amestecă cu talion. Vezicătorile se întind pe o bucată de pânză. Aceste vezicători aplicate pe piele produc o iritație urmată de vezicațiune, adică formarea unor beșici pline cu un fel de apă (serozitate). Timpul cât trebuie să stea pe loc o vezicătoare, pentru ca să scoată beșici depinde de efectul pe care voim să-l obținem și de etatea bolnavului; astfel o vezicătoare volantă va sta pe loc mai puțin timp decât una permanentă. La copiii a căror piele este foarte subțire, vezicătoarea lucrează în 2—4 ore, pe câtă vreme la oamenii mari îi trebuie 8—12 ceasuri. Se întâmplă uneori, mai ales la copii, că vezicătorile produc dureri de rinichi și de beșica udului, uneori urinare chiar cu sânge, ceea ce provine din cauză că s'a absorbit cantaridă prea multă și a iritat rinichii și beșica, din care cauză trebuie să fim cu mare băgare de seamă la aplicarea vezicătorilor. Vezicătoarea are diferite mărimi, după trebuință și această mărime este dată de doctor, căci numai el știe cât de mare trebuie să fie. De obiceiul plastorul de vezicătoare se întinde pe sparadrap de diachilon (talion), pentru ca să se lipească mai bine pe locul unde o aplicăm. În farmacii se vând și vezicători gata. Înainte de a aplica o vezicătoare trebuie să preparăm locul; dacă este cu păr să-l radem, apoi să-l spălăm cu apă caldă și săpun, după care aplicăm ve-

zicătoarea deadreptul pe piele, fixând-o prin talionul de pe margini și spre multă siguranță legând-o cu o fașe, cu un bandaj de corp, sau cu un colțar, ori tulpă în doit sub formă de cravată. Dacă trebuie să punem vezicătoarea pe umăr, atunci, pentru ca să se poată potrivi bine și să stea nemișcată, trebuie s'o încreștăm pe margini cu foarfecele. Vezicătoarele produc durere, de multe ori destul de mare, care silește pe bolnav să se miște și chiar să caute a o desface, când le este la îndemână, pentru aceasta ei trebuie supravegheați în tot timpul. Când au eșit beșici sub vezicătoare este semn că ea a lucrat bine și trebuie ridicată; beșica sau beșicile se încreștează cu foarfecile în partea lor de jos pentru ca să curgă apa din ele. Nu trebuie ruptă pielea beșicilor pentru ca să nu producem dureri și usturimi, ci s'o lăsăm pe loc, făcând pansamentul peste ea. Acest pansament se face cu vaselină întinsă pe o cârpă curată și mai mare decât a fost vezicătoarea, pe care o aplicăm pe rană și deasupra ei punem un strat subțire de vată, după care o legăm cu o fașe. Pansamentul se face de 2—3 ori pe zi, după cum curge apa de multă, iar după 3 zile numai odată pe zi până la vindecare, după care apoi mai presărăm încă vr'o două zile praf de scrobeală, sau pudră de orez, pe deasupra. — Vezicătoarele lucrează ca *revulzive* și se aplică de obicei pe piept în caz de pleurezie, de pneumonie, de bronșită intensă, de oftică (pe locul cu junghiu). În vezicătoarea *permanentă* se taie beșicile de jur împrejur, așa ca să se ridice toată pielea și să rămână rana descoperită, ceea ce o deosebește de vezicătoarea *volantă*, sau *temporară*. Vezicătoarele permanente se întrebuințau în boalele cronice, astăzi însă ele sunt date uitării deoarece medicina dispune de alte mijloace mai practice.

Vezicule (dela lat. *vesicula*), *beșicuțe*. — Sunt niște ridicături rotunde, sau ascuțite la vârful lor, cari sunt formate de ridicarea părții superficiale a pielei, numită *epiderm*, care se deslipește de partea adâncă, numită *derm*, așa că formează o cavitate mică, plină de un fel de apă limpede și trans-

parentă. Aceste vezicule pot să dispară dela sine și în acest caz apa lor intră în circulația sângelui, sau se scurge în afară; alteori veziculele se transformă în *pustule*, adică apa lor se prefăce în puroi. Veziculele se observă în arsuri, când se pun vezicătoari; ele se mai văd în unele boale de piele, cum sunt: erpesul și eczema, sau în vărsat la început, pentru a se schimba îndată în pustule, după cum se întâmplă și la vaccină (v. *Arsuri*, *Eczemă*, *Vaccinare*).

Viața. — Cu toate că în timpurile de azi viața oamenilor este mai sbuciumată, din cauza luptei pentru existență, care este mai aprigă decât acum câteva sute de ani, totuși durata vieții omenești s'a prelungit, datorită măsurilor de igienă, cari sunt mult mai cunoscute ca altădată. După statisticele elvețiene, întreprinse



Fig. 479 — Lungimea vieții omenești, la diferite epoci ale istoriei europene

în acest sens, se spune că dela 1870 încoace viața oamenilor a fost prelungită, în medie, cu 20 de ani. Așa, de unde pe la 1870 durata medie a vieții omenești era de 40 de ani pentru bărbat și 43 de ani pentru femeie, în 1935 bărbații aveau o durată medie de 60 de ani și femeile de 63 de ani. Longevitatea cea mai mare este în Olanda, unde, în secolul trecut, viața medie era de 65 de ani.

Viermi intestinali. — În intestinele omului trăesc trei feluri de viermi, cari produc diferite suferințe celor ce au nenorocul să-i aibă. Acești viermi sunt: *tenia* cunoscută în poporul nostru sub numele de *cordea*, *cordică*, *limbricul mare* și *panglică*; *ascariidele lombricoide* sau *limbricii* și *oxiurii viermiculari* numiți în popor *strânși* sau *viermușori*. — 1. *Tenia* este un vierme ce se dezvoltă în intestinele omului prin *cisticercii* dela animalele cari suferă de *ladrerie* sau *măzărîche*. Cauza de căpe-

tenie este numai *cisticercul* din cărnuri și din ape. Tenia se transmite dela om la om în mod indirect prin ouăle ei, cari dau naștere la *cisticerci* și cari, intrând în corpul omului, produc *tenia*. Uneori cisticercii se pot răspândi în mușchi, în ochi și în alte organe. Sunt trei feluri de tenia: *taenia solium*, *botriocephalus* și *taenia saginata*, sau *mediocanelata*. *Tenia solium* numită și *vierme solitar*, este produsă de *cisticercul* *cărnii de porc*. Tenia trăiește prin urmare o parte din viață în om și altă parte în porc. Omul o dă porcului și porcul o dă omului. Un ou de tenia fiind înghițit de un porc, coaja lui este distrusă de sucurile intestinale; embrionul pe care îl conține și care e deja format este pus în libertate. Acest embrion este oval și are la capătul cel mai mic șase cârlige, cu ajutorul cărora el găurește stomacul, sau mațul porcului și



Fig. 480 — *Tenia solium*

se duce printre țesuturi, sau în cavitatea vaselor sangvine, oprindu-se în cele din urmă în țesutul celular intramuscular (în mușchi) unde se dezvoltă repede, ajungând la mărimea unui bob de mazăre cu formă alungită. În această stare animalul se numește *cisticerc* și porcii, cari îl au, se zice că suferă de *ladrerie*, sau *măzăriche*. Viermele poate rămânea în stare de *cisticerc*

pede și capătă fiecare organe de reproducție masculine și femele. Mai târziu inelele, cari conțin ouă îndeajuns de înaintate în dezvoltarea lor, se desfac și sunt date afară cu scaunele bolnavului, sau în mod izolat, sau mai multe la un loc. Ele se aseamănă mult cu sămânțele de curcubeată și după câțva timp învelișul lor se putrezește și ouăle rămân libere. Acestea ajung prin apele necurate, sau pe legumele crude cu cari sunt înghițite de porc, unde va începe să se dezvoltă, după cum s'a arătat mai sus. *Măzărichea* la porc se cunoaște ușor și se poate vedea cu ochii în carnea lui, mai ales în mușchii dela gât și în mușchii dintre coaste. Uneori se văd și sub limbă niște beșicuțe transparente, cari sunt produse de cisticerci. Am spus că tenia poate să aibă o lungime de 3—6 metri. Capul ei este rotund și mare cât o gămălie de ac, iar vârful lui are o coroană de cârligute și 4 ventuze pe laturi. Gâtul este mai subțire, corpul este de culoare alburie și se compune din inele mai mari în lung decât în lat se pot număra până la 800. *Botriocephalus* se găsește în apă și în carnea unor pești de mare; el are o lungime de 5 până la 8 metri. Capul este ca o măciucă, gâtul e mai subțire decât capul, iar restul corpului este format de niște bucățele albe, late, mai late decât lungi și pot fi în număr de 600. *Tenia saginata* provine din carnea de bou. Ea este cea mai lungă, putând avea până la 12 metri și mai mult. Inelele ei sunt cele mai mari și se numără până la 12 mii. Capul nu are coroană de cârlige, gâtul este foarte subțire. Sunt mai multe împrejurări cari înleznesc dezvoltarea teniei: materiile fecale azvârlite în diferite locuri și luate pe corpul șoarecilor, sau mâncate de porci, dau cisticercii, cari în carne se transformă în tenie. Boii, adăpați cu ape cari cuprind cisticerci, prin carnea lor dau tenia; peștele cu cisticerci, precum și apa dau boala. Tenia se dezvoltă la oamenii cari mănâncă o carne nefiartă, sau nefriptă bine, cărnuri sărate, șuncă, mezeluri, pastramă, etc. *Tenia solium* se arată la toate popoarele cari se hrănesc cu carne de porc, *botriocephalus* la locui-

torii din apropierea mărilor (Rusia, Polonia, Prusia, Belgia, Olanda), iar tenia saginată este cea mai răspândită fiindcă cea mai mare parte din omenire se hrănește cu carne de bou. — Să vedem acum cari sunt *semnele* după care se cunoaște că omul are panglică. Mulți au boala fără să aibă nici o suferință și fără să-și dea seamă de ceea ce poartă în pân-tece, până ce dau afară o parte din tenie cu materiile fecale. Alții însă au diferite turburări digestive și nervoase; o greutate în pân-tece, un gomoloț care se mișcă, se schimbă din loc în loc; unii au dureri prin mațe, mai ales după ce au mâncat lucruri sărate și excitante, cum sunt scrumbiile, ceapa, usturoiul, zeama de lămâie, etc., pe câtă vreme laptele, ouăle și untul de lemn le potolesc. Alții au greață și vărsături mai ales dimineața. Unora li se umple gura de apă, apetitul le este mare, mistuirea grea și constipația alternează cu diareea; prin urdinare ies și bucăți de panglică, cu materiile fecale. Dintre turburările nervoase vom aminti mâncărime de nas și la șezut, durere de cap, amețeală, sughițuri, dilatarea pupilelor, apoi pal-pitații (bătăi de inimă), o stare de nervozitate generală, la copii spasme, la oameni mari aiurare, (delir), para-lizii, etc. Uneori cel ce are panglică nu se hrănește îndeajuns și încetul cu încetul cade într-o anemie foarte pronunțată, având pal-pitații și accese de sufocare, pe alții îi consumă febra, nepofta de mâncare și diareea. Cel mai sigur semn de tenie sunt bu-cățile date afară cu materiile fecale. — *Tratament.* Cu o zi mai înainte de a da medicamentul *viermifug*, adecă a-cela care va scoate panglica, vom supune bolnavul la regim de lapte. Medicamentul se va lua a doua zi de dimineață, pe nemâncate, iar după un ceas sau două, după ce a fost luat, bolnavul va lua un purgativ: unt de ricin (15—20 gr. la copii, 30—60 gr. la adulți), sau mai bine un pur-gativ ne uleios, pentru ca să nu înles-nim absorpțiunea principiului otră-vitor al *ferigei* (filix mas), cum ar fi: calomel, scamonee, câte 15—30 ctgr. jalapă pulverizată, 30—50 ctgr., pen-tru i praf, pe care bolnavul îl va lua la 2

ore după ce a luat medicamentul vier-mifug. Bolnavul va ieși la scaun pe un vas plin cu apă caldută și nu va trage de vieme când va ieși, pentru ca să nu-l rupă. Se va prescrie *extractul eterat de filix mas* (ferigă) în doză de 4 până la 6 gr. la adult, iar la copii în dozele următoare: dela 1 la 2 ani 50 ctgr. până la un gr.; dela 2 la 5 ani 1—3 gr.; dela 5 la 10 ani 3—4 gr.; dela 10—15 ani 5 gr. In lichid se poate da în forma următoare: extract eterat de filix mas 4—3 gr., gumă ara-bică pulverizată 8 gr., sirop de eter 40 gr., apă distilată de mentă 100 gr.; să se bea toată odată. Se poate da și în capsule: extract eterat de filix mas 8 gr., calomel 80 ctgr. să se facă 8 capsule, cari se vor lua din 5 în 5 minute câte unul, până la sfârșit. Extractul eterat de filix mas se mai poate da combinat cu cloroform și unt de ricin, în capsule. Se mai poate da *praful de flori de cuso* în doză de 15 gr. la copii și de 20 gr. la adulți, la 2 ceasuri după ce s'a luat purgativul (uleiu de ricină): pulbere de cuso 10—20 gr., miere, cât trebuie să se facă electuar, care se va da dimineța pe nemâncate. Se mai poate prescrie și *coaja de rodiu* în decoctiune, în doză de 50 gr., dimi-neța, la 2 ore după ce s'a dat un purgativ. Un medicament energic este *pelletierina* (care se scoate din rodiu), care însă nu se dă la copii, iar la adult se dă sub formă de sulfat de pelletie-rină, 30 ctgr după ce în ajun s'a dat un purgativ și bolnavul a mâncat numai lapte. — 2. *Ascaridele lombricoid* sau *Limbricii* sunt niște viermi lungi de 12—15 ctm., cari sunt înghițiți în stare de ouă cu apa de băut. Ei sunt rotunzi, cilindrici (nu sunt lați ca panglica), de culoare ro-șietică. Șederea lor în stomac și mațe dă loc la diferite turburări mai mult sau mai puțin grave. Limbricii se văd cu deosebire la copii, iar suferințele la cari dau naștere sunt următoarele: diaree în timpul nopții, agitație (neli-niște), gemete și visuri rele. Copiii au cearcăne în jurul ochilor și un miros greu în gură, ei se obosesc lesne și slăbesc. Pân-tecele este umflat și dureros, mai ales în jurul buricului Din când în când copilul scoate câte un

limbric pe șezut, sau pe gură. *Tratament.* Cel mai bun medicament este *santonina*, care se dă în dozele următoare: dela 1 la 2 ani, să nu se dea; dela 2 la 5 ani 5—10 ctgr. pe zi; dela 5 la 10 ani 10—15 ctgr. pe zi; dela 10 ani în sus, 15—30 ctgr. pe zi. Este bine să se asocieze *santonina* cu *calomelul*: *santonină* 2—5 ctgr., *calomel* 5—10 ctgr., zahăr de lapte 30 ctgr.; pentru 1 pachet; să se dea 3 pachete dimineța, la intervale de câte o oră, în timp de 2 zile. Când se dă *santonină* curată, fără *calomel*, se va da la 2 ore după ea ulei de ricin, cantitatea necesară după etatea omului. Se mai dă în contra limbricilor *semen-contra*, din care se scoate *santonina*, sub formă de infuzie, din 10 la 1000, praf 1—10 gr., urmată de



Fig. 481. — Oxiuri, mult măriți

ulei de ricin după 2 ore. — 3. *Oxiuri* (*strânși, viermușori*). Aceștia sunt niște viermi mici, albi, cari seamănă cu viermușorii brânzei; lungimea lor este de 2—3 milimetri. Se înmulțesc foarte repede și stau în mațul șezutului, în încrețiturile acestuia, producând o mâncărime cumplită. După ce a eșit la scaun, copilul se simte ușurat, fiindcă a dat afară o mare cantitate de oxiuri. *Tratament.* Se vor pune clisme de apă sărată (10 la 100), de apă cu oțet ($\frac{1}{2}$ sau $\frac{1}{3}$), de apă saponată, sau cu: asa fetida 3 gr., gălbenuș de ou și apă 120 gr.; sau cu: sulfur de potasă 40 ctgr, apă 150 gr., sau cu: naftalină 1 gr., ulei de olive 40 gr. Se vor pune aceste clizme după ce copilul a eșit afară, pentru ca să le poată ține mai mult timp. Se mai recomandă clismele cu *juningene*, cari omoară oxiurii. Se mai pot aplica și supozitoare (săpunașe) cu: unguent cinereu mercurial 5 ctgr., unt de cacao cât trebuie pentru 1 supozitor; se va introduce în șezut în fiecare dimineță câte unul. Pe dinăuntru, se recomandă *santonina* (5

ctgr. la copiii de 2 ani, 10—20 ctgr. la copiii mai mari), *calomelul*, floare de pucioasă. La toți copiii cu oxiuri, cari sunt anemici, li se va da la urmă fier.

Viermifug. — Medicament care se dă în contra viermilor intestinali (*limbrici, oxiuri, panglică*).

Vin (lat. *vinum*). — Vinul este produs prin fermentația mustului de struguri, care este foarte bogat în zahăr. *Fermentația*, sau fierberea mustului, este întreținută printr'un ferment cunoscut sub numele de *saccharomices ellipsoideus*, care se găsește pe coaja bobului de struguri și de fermentul *carpozima apiculata*. Acești doi fermenți transformă zahărul de struguri în alcool de vin sau, etilic, în apă și în acid carbonic, cu formare de acid succinic și glicerină. *Compoziția vinului*, în termen, mediu, este următoarea: apă cam 86—90 la 100, alcool de vin 10, glicerină 0.65, acid succinic 0.15, alte alcooluri eteruri și parfumuri, urme; albumină, grăsime, zahăr, gume și substanțe colorante, 1.60, tartrat de potasă, 0.40, acid acetic, propionic, nitric, malic și carbonic, 0.15, clorure, bromure, iodure, fluorure, fosfate de potasă, de sodă, de calciu, de magnezie, de aluminiu, oxid de fier, amoniac, 0.15. Proporțiunea alcoolului crește cu vechimea vinului din cauză că fermentațiunile noi, care se fac toamna și primăvara, prefac în alcool și restul zahărului rămas dela prima fierbere, ceea ce se întâmplă cam în trei ani de arândul, după care vinul rămâne așa cum este păstrat în vase. Din cifrele mai sus arătate am putea conchide că vinul are calitățile unui aliment, mai ales ale unui aliment de calorificație, așa că vinul luat în măsură potrivită, prin proporția alcoolului, care se arde în sânge, poate sluji ca aliment de calorificație. În doză moderată vinul este folositor organismului nostru, fără însă ca să fie indispensabil, iar în doză mare (când alcoolul trece de 1 gr. pentru un kgr. din greutatea corpului nostru) el este rău și produce alcoolismul acut și alcoolismul cronic, cu toate urmările lor triste, căci vinul are o acțiune foarte rea asupra stomacului

și ficatului, atât prin alcoolul său, oât și prin acidele și sărurile de potasă pe cari le conține. Dacă vinul este prea acid (acru), el produce aprindere de stomac și vărsături (gastrite). Vinul prea mult aprinde și arde ficatul (ciroze), apoi dă naștere la diferite turburări nervoase (delir, tremurături). *Vinul alb*, fiind mai bogat în eteruri, este mai excitant, însă din cauză că este mai sărac în tanin, el nu este așa de tonic ca *vinul roșu*, care din pricina bogăției în tanin este mai greu de suportat pentru stomacurile slabe, ale celor ce suferă de dispepsie. Vinul este supus la multe *falsificări*: adausul de apă, de alcool, de buchete artificiale, colorarea artificială și îndulcirea cu substanțe vătămătoare. Falsificarea cu apă și alcool este supărătoare numai prin faptul că proporția extrac-tului de vin scade. Colorarea vinului se face de multe ori cu substanțe toxice, cum sunt fucsina, care adeseori este arsenicală și cu cărmăz (phrtolaca decandra), care face ca vinul să fie purgativ. Astăzi însă vinul se vâpsește mai mult cu colorii diazoice, cari nu sunt primejdioase. — *Vinuri medicinale*. În medicină sunt câteva vinuri cari se întrebuințează ca medicamente:

1. *Vinul antiscorbutic*, preparat din vin alb în care se plămădește hrean, creson, trifoiște, lingurea, muștar negru.
2. *Vinul aromatic*, care se face cu vin roșu, și cu specii aromatice.
3. *Vinul diuretic*, care este preparat cu vin alb în care se pune digitală și scila. Afară de acestea mai sunt: *Vinul de chinchina*, de *gențiana*, de *colombo*, *vin iodotanic*, *pentru scrofuloză*, *debilitate*, *sifilis*.

Vin de mere. — Cidru.

Vin de pere, must de pere. — Este o băutură care se face din pere acre, pădurețe, cari nu sunt bune de mâncat și cari se zdrobesc, se presează și se lasă să fermenteze. Acest *cidru de pere* nu este așa de bun ca *cidrul de mere*, de oarece este mai sărac în alcool, nu se poate păstra așa mult timp și în contact cu aerul se acrește mai iute. Vinul de pere deși este plăcut la gust, dacă se bea mai mult produce durere de stomac și diaree (urdinare).

Vinars. — V. *Rachiu*.

Vindeecare. — V. *Boale*.

Vintre. — V. *Abdomen*.

Vintrea. — V. *Dizenterie*.

Vioarea, garioașe, hioară, micșunea, tă-măioară, toporași, (Viola odorata, fam. violaceelor). — Plantă mică erbacee care crește pe marginea pădurilor, prin tufișuri, livezi și poieni (Martie—Aprilie). În medicină se întrebuințează florile și rădăcinile. Florile fac parte din florile zise *pectorale* (bune pentru piept). Ele se întrebuințează și singure sub formă de infuzie (ceai), care înmoaie, calmează tusa, în catarul de piept. Viorelele dau un miros foarte tare, din care cauză nu este bine să fie ținute în odaia de dormit, căci pot produce durere de cap și amețeli. Rădăcina dată sub formă de praf, 2—4 gr., lucrează ca vomitiv și ca purgativ.

Viperă, năpârcă. — Șarpe foarte veninos, care din fericire se cunoaște ușor după o dungă lată, neagră și colțuroasă, pe care o are pe spate și după o pată neagră în formă de V de pe cap. Viperă are în gură, pe lângă dinții mărunți și doi dinți mari în falca de sus, încârligați și găuriți până la vârf. În acești dinți dau niște canale cari aduc venin (otravă) dela ghindurile așezate sub mușchii fălcilor. Când viperă cascade gura, mușchii apasă asupra ghindurilor, iar veninul se scurge prin dinți în rană. Viperă are o lungime cam de 65 ctm. Când viperă mușcă în locul mușcăturii se simte o durere mare, apoi apare o roșeață violacee și partea mușcată se umflă. Umfătura se întinde repede la tot membrul, iar bolnavul este cuprins de un fior rece, apoi de febră mare, uneori are spasme, sau cade într-o stare de toropeală adâncă, cu pulsul mic și neregulat, bolnavul are greață, vărsături, urdinare și dureri în pân-tece, pielea se îngălbenește și se acopere de sudori reci și viscoase, pierde cunoștința, are turburări ale vederii, uneori emoragii multiple, cari grăbesc moartea. *Tratamentul* mușcă-



Fig. 482—Aparatul veninos al viperei

1=glanda veninoasă
2=dinții veninoși


turii de viperă, precum și al *tuturor șerpilor veninoși*, este următorul: îndată ce a fost mușcat cineva de un șarpe veninos prima măsură de luat este de a strânge membrul mușcat cu o legătură, cu o batistă, cât se poate de aproape de mușcătură, între aceasta și rădăcina membrului. Apoi să se spele abundant plaga storcând-o bine ca să dea sânge, să se stropească cu o soluție proaspătă de clorur de calce (1 gr. la 60 apă), sau o soluție de clorur de aur pur (1 la 100), cari distrug veninul rămas în rană. După acestea se face un pansament. Ca tratament *curativ* se întrebuințează astăzi *serul antiveninos*, descoperit de doctorul Calmette, care nu este altceva decât serul calului imunizat contra veninului șerpilor. Acest ser se întrebuințează în injecții sub piele și în contra tuturor mușcăturilor de șerpi veninoși, sau de scorpioni. Injecția trebuie făcută cât se poate mai repede, căci unii șerpi omoară în câteva ore. Serul se poate injecta în cantitate mare, căci el nu conține nici o otrăvă și nu produce accidente. Bolnavului i se poate da în același timp cafea și ceai și i se pot face fricțiuni, învelindu-se apoi bine, ca să-i fie cald. Când n'avem nici un medicament la îndemână, nici ser, atunci îndată ce vom lega membrul deasupra rănii, după ce vom spăla rana și vom storce-o ca să iese sânge, vom arde-o cu un fier roșu, pe care îl are oricine și oricând la îndemână.

Virus (cuvânt latin care însemnează suc, otrăvă). — Prin cuvântul *virus* se înțelege o substanță vătămătoare, care transportată dela om la altul, prin inoculație, comunică acestuia boala celui dintâiu. Transmisiunea se face fie prin contact direct, sau indirect, cu o suprafață rănită (sifilis), fie prin aerul pe care îl respirăm, prin plămâni (oftică), fie prin căile digestive (coleră), etc.

Vișine. — Fructele arborelui numit *vișin*, sau *cerasus vulgaris*, din fam. rozaceelor, originar din Asia mică, astăzi cultivat foarte mult, sau chiar sălbătăcit; prin cultură s'au obținut mai multe varietăți. Fructele sunt acrișoare, unele chiar acre, din care cauză nu e bine să se mănânce prea

multe, căci dau naștere la indigestie (mistuire grea). Din vișine se face dulceață, compot sau alte preparații, cari sunt plăcute și ușurează mistuirea. În medicină se întrebuințează ca diuretice. Siropul de vișine, cu apă, taie setea. La *fară* se pune pe o tăietură *cleiu* de vișin, de cireș, ori de zarzăr, muiat în rachi de drojdii, pentru a opri sângele și a vindeca rana. O recomandare și aci ca și la cireșe: *să nu se mănânce sâmburii*.

Vitamine. — Sunt niște substanțe extrase, pentru prima dată acum 30 de ani, din coaja orezului, a căror constituție chimică nu se cunoaște încă,



Fig, 483

Sucurile și cu ele vitaminele din fructe pătrund în organism și merg la creier (A), la plămâni (B), la inimă (C), la ficat (D), și în stomac (E), sau se răspândesc în sânge (F), prin aparatul circulator.

dar fără de care organismul viu nu poate să trăiască. Lipsa vitaminelor din alimentație produce turburări grave în sănătatea corpului (avitaminoza).

Prin întrebuințarea lor, foarte ade-seori, în diferite boli și mai ales în așa numitele boli de nutriție, medicii au contribuit la popularizarea numelor acestor substanțe atât de folositoare vieții; azi se vorbește mult despre vitamine, până și în casa celor mai îndepărtați de centrele culturale și totuși se știe prea puțin despre valoarea vitaminelor și mai ales despre modul cum se pot prepara alimentele, ca să nu-și piardă din vitaminele pe cari le conțin.

Se cunosc azi, mai bine, 4 grupuri




Fig. 484. — Unde găsim în natură Vitamina A.

În : 1=unt, 2=ouă, 3=lapte, 4=lapte proaspăt de vacă de câmpie, 5=brânză grasă, 6=varză roșie, 7=afine, 8=mazăre, 9=dovleac, 10=zmeură, 11=banane, 12=coacăză verde, 13=afine, 14=trifoi, 15=prune, 16=varză nemțească, 17=fruct de soc, 18=pomușoară, 19=varză crească verde, 20=pătăgele roșii, 21=cireși, 22=porumb, 23=portocale, 24=ficat, 25=spanac, 26=morcovi, 27=hribi, ciuperci, 28=untură de pește.

Ce neajuns și ce boli aduce lipsa vitaminei A.

A=slăbire, B=piatră la beșica fierii, C=boala Basedow, D=vindecare grea a rănilor, E=sterilitate, poala albă, turburări ale funcțiilor organelor sexuale, F=Inflamații și tumori ale stomacului și intestinelor, G=lipsa vederii în întuneric, H=inflamația pleoapelor și înroșirea conjunctivei, I=turburări ale creșterii, J=incalcare către boli infecțioase.




Fig. 485 — Unde găsim în natură vitamina B.

În : 1=alune, 2=cireși, 3=varză roșie, 4=struguri, 5=Pătăgele roșii, 6=drojdie de bere, 7=prune, 8=lă-măie, 9=ouă, 10=lăptuci, 11=alune americane, 12=cereale, 13=portocale, 14=mazăre (verde și galbenă), 15=fruct de soc, 16=lapte proaspăt de vacă, 17=gușie, 18=căpsuni, 19=salată verde, 20=cartofi, 21=morcovi, 22=ziveta, 23=smeură, 24=ceapă, 25=săranghel, 26=ficat, 27=țelină, 28=măr, 29=spanac, 30=pară, 31=porumb.

Ce neajunsuri aduce și la ce boli predispune lipsa vitaminei B.

Cauzează mai ales boala Beri-Beri.

A=turbări ale creșterii, B=paralizii nervilor, C=slăbire și inflamație nervoasă, D=slăbirea nervilor, E=slăbire generală, F=inflamație intestinală și tumori, G=coree, H=slăbirea inimii, I=umflături, J=aueme, K=când copilul nu sugă de la mamă, (copil crescut cu biberonul) vitamina B lipsește.




Fig. 486. — Unde se găsește în natură Vitamina C.

În: 1=portocale, 2=ceapă, 3=lapte, 4=țelină, 5=ficat, 6=pătlăgele roșii, 7=pomușoară, 8=răsură, 9=zmeură, 10=fasole, 11=ardei grași, 12=salată verde, 13=mazăre, 14=varză, 15=lămâie, 16=ridichii, 17=sparanghel, 18=păpădie, 19=gulia, 20=cireși, 21=morcovi, 22=conopidă, 23=cartofi, 24=pomușoară, coacăză verde, 25=trifoi, 26=varză.

Ce neajunsuri aduce și la ce boli predispoze lipsa vitaminei C.

A=scorbutul în călătoriile lungi, când nu se mănâncă alimente proaspete, B=emoragii, (nas, stomac, intestine, etc.), C=scorbutul exploratorilor și locuitorilor ținuturilor polare cari se hrănesc cu alimente conservate, D=inflamații ale stomacului și intestinelor, E=predispoziție către boli infecțioase (și la sugaci), F=scorbutul în orașele și metropolele supra populate, unde populația periferică e sub-hrănită.




Fig. 487. — Unde se găsește în natură Vitamina D.

În: 1=pătlașele roșii, 2=ciuperci, 3=lapte proaspăt de vacă, 4=morcovi, 5=unt, 6=sardele, 7=mânătărci, 8=spanac, 9=ouă, 10=cartofi, 11=heringi.

Sub influența razelor solare, algele marine se prefac în vitamina D, pe care peștii mici (b) o înghit, peștii mari (c) la rândul lor mănâncă pe cei mici și apoi servesc de hrană morunilor (d) din ficatul cărora se extrage untura de pește (e) și se dă copiilor (f).

Neajunsurile pe cari le aduce și la ce predispune lipsa vitaminei D.

A=reumatism al încheeturilor, B=deformațiuni ale oaselor capului, conformații anormale, C=strâmtoarea oaselor basinelului, D=rachitism, E=căria și reaua creștere a dinților, F=slăbiciune corporală, slăbire generală, cu toată buna hrană.



Fig. 488. — Unde găsim în natură vitamina E.

În: 1=lapte proaspăt, 2=plantă medicinală, 3=untură de pește, 4=măsline, 5=nucă de cocos, 6=porumb, 7=salată verde, 8=cereale (și sămânța), 9=bobul sămânța (văzut cu lupa), 10=curmale, 11=gălbenuș de ou, 12=floarea soarelui, 13=mazăre tânără, 14=orez, 15=hreniță, cadamă de izvoare.

Ce neajunsuri aduce, sau la ce predispoze lipsa vitaminei E.

A=avort, turburări ale fecundației, B=testiculul nu lucrează, b=canalul inflamă, C=turburări menstruale, D=sterilitate din cauza dezvoltării defectuoase a organelor genitale, E=insuficiență secrețiune a laptelui.

de vitamine, marcate prin literile alfabetic A, B, C, D. Pentru ca să punem pe cititorii noștri în situația de

a ști exact la ce folosește fiecare din aceste grupuri și unde se găsește, vom vorbi câte ceva despre fiecare.

Vitamina A se găsește în lapte, unt, galbenuș de ou, untură de pește, frunze de vegetale, carote, patlagele roșii, salată verde, spanac. Lipsa persistentă din alimentație a vitaminei *A* ne dă turburări în dezvoltare, slăbiciune corporală, rachitism, turburări ale vederii, fie prin rănile cari se arată pe corneea (lumina ochilor), fie prin neputința de a mai vedea noaptea.

Vitamina B se găsește în tărațele cerealelor, în fructe, în drojdia de bere, nuci, gălbenuș de ou, rinichi. Este necesară creșterii, lipsa ei din alimentație provocând nevralgii, o lipsă permanentă de poftă de mâncare și mai ales boala numită beri-beri (slăbirea forțelor mușchiulare, paralizii ale membrilor, uscăciunea pielii, umflarea întregului corp, greutate în respirație).

Vitamina C, sau vitamina antiscorbutică, se găsește în legume, fructe crude, zeamă de fructe (lămâi, portocale, ardei, cartofi, măceși), în lapte de vacă și de femeie. Lipsa ei din alimentație dă hemoragii, contribuie la ivirea cariilor dinților, a boalelor molipsitoare (cu deosebire gripa, difteria, tuberculoza). Boala cea mai gravă, care se ivește la persoanele lipsite de vitamina *C*, este scorbutul, care se arată prin ivirea unor vânătăi pe corp și mai ales la încheeturi, pricinuite de revărsarea sub piele a sângelui din vâne. Gingiile se umflă, slăbesc și dinții cad la cea mai mică atingere. (v. și scorbut).

Persoanele lipsite de vitamina *C* îmbătrânesc repede.

Vitamina D se găsește în cantitate mare în plante, în untura de pește, în gălbenușul de ou. Lipsa ei din alimentație provoacă rachitismul.

Mai există și alte vitamine, despre care însă nu amintim nimic, ele fiind mai puțin cunoscute publicului.

După cum am spus, mai toate vitaminele se pot întâlni în fructe, legumi, carne, grăsimi și în cereale. Acestea toate ne sunt trebuincioase, pentru că ele aduc în alimentație toate vitaminele de care are nevoie corpul, ca să trăiască în bună stare de sănătate.

Ceeace nu prea știe publicul nostru este modul cum trebuie să ia vitaminele din alimente. În general toate

alimentele le pierd dacă sunt fierte, sau fripte prea mult. Legumele trebuie fierse puțin, numai atâta cât trebuie ca să poată fi mâncate. Fructele să fie mâncate crude totdeauna. Singura grijă pe care trebuie s'o avem este să fie bine spălate, ca să nu conțină pe coajă microbi luați din locurile unde au fost ținute după cules.

Compoturile sunt mai puțin hrăitoare decât fructele crude, de aceea vara să mâncăm fructele crude, iar pentru iarnă să le pregătim sub formă de compoturi în așa fel ca să fie fierse cât mai puțin; numai astfel ne vor servi ca adevărate alimente. Carnea e mai bine să fie friptă la grătar decât fiartă, căci astfel pierde mai puțin din vitaminele pe care le conține. Să nu uităm că legumele și fructele, pe care le găsim vara din belșug în țara noastră, ne dau toate substanțele de care avem nevoie să ne întărim trupul; să le dăm din belșug copiilor, împreună cu untul, laptele și mierea, cari conțin de asemenea multe vitamine și vor crește sănătoși și frumoși.

Să nu cădem în greșala celor ce au vara la masă sticlucă cu vitamine preparate în laborator, în locul fructelor și zarzavaturilor, cu cari este plin bogatul ogor românesc. Să nu mai uităm că trebuie să ne hrănim cu alimente variate și amestecate, căci numai astfel vom putea să luăm din ele toate vitaminele. Altfel, excluzând din alimentație unele mâncări, vom fi lipsiți de vitaminele pe care le conțin, arătându-se, deci, una din boalele amintite mai sus.

Vițel. — Carnea de vițel nu este bună de mâncat decât numai dacă vițelul a trecut de șase săptămâni. Înainte de această etate carnea de vițel este puțin gustoasă, fadă și nu se poate mânca decât gătită cu sosuri și diferite condimente. Afară de aceasta ea este puțin hrăitoare și cam laxativă. Carnea vițelului prea tânăr este palidă, flască, iar a vițelului trecut de o lună și jumătate este alb-roșietică și de consistență tare. Carnea vițelului prea tânăr, dacă se fierbe, devine moale, cleioasă, greu de mistuit. Carnea vițelului trecut de 2 luni este ceva mai hrăitoare și se potrivește pentru convalescenți, pentru cei ce

sufăr de pleoră, pentru cei cu temperament sangvin, pentru cei care sufăr de boale de piele. Ea mai este bună și pentru cei sănătoși, ca variație în prepararea mâncărilor, așa că și aceștia pot mânca din când în când, fără să se hrănească numai cu ea.

Vitiligo. — Această boală se mai numește *albinism parțial, leudermie parțială, distrofie pigmentară, discromia pielii*. În limba noastră n'am găsit nici un nume apropiat, afară de *prian*, care se dă la vitele cari prezintă pete mari pe piele (*bou la pâr prian*). Vitiligo este o boală de piele care se arată sub formă de pete albe (*acromie*) bine circumscrise, mărginite de o zonă mai închisă (*iperacromie*) decât țesutul din jur. Petele au, unele, o formă rotundă, altele neregulată; ele pot fi, sau nu, simetrice de fiecare parte a corpului. Diametrul lor poate varia dela câțiva milimetri până la mărimea unei palme, sensibilitatea pielii este păstrată. Aceste pete se arată de obicei pe față gât, pielea capului unde părul se albește în dreptul lor, la organele genitale. Petele se măresc încet, ele pot să dispară pentru a reapărea câte odată după un timp oarecare. Intre cauze se citează turburările nervoase și ale glandelor cu secreție internă. *Tratamentul* constă în idroterapie, electriticitate, bromure, iar pe loc se pot face fricțiuni cu tinctură de iod amestecată cu unguent mercurial (4 la 100), sau să se aplice emplastru mercurial (Vigo) sau să se facă spălături cu sublimat corosiv (1 la 500) și să se facă tratamentul opoterapie (tiroidian, sau ovarian).

Voce (lat. *vox*, grec. *phone*), *glas*. — Vocea este sunetul produs în *laringele* omului și al animalelor superioare, care le permite să comunice cu semenii lor, prin intermediarul simțului. Când am vorbit despre *laringe* am arătat că acest minunat organ are în interiorul lui două părți mai strâmte, mărginite de două perechi de limbulițe membranoase, numite *coarde vocale*: strâmtoarea de sus este mărginită de coardele superioare, iar cea de jos de coardele inferioare. Această strâmtoare de jos se cheamă *glotă* și dimensiunile ei se schimbă fără încetare după cum respirăm, vorbim sau cân-

tăm. Coardele vocale inferioare sunt într-o stare de încordare permanentă, astfel că pe când ele sunt isbite de aerul care este împus din plămâni, în timpul expirațiunii, sub o presiune oarecare, ele vibrează și produc un sunet. Acest sunet este *vocea*, care la copiii mici și la animale rămâne ca un sunet simplu, un sgomot fără însemnătate, pe câtă vreme la om, după ce a trecut de primul an al vieții, la sunetul produs de laringe se mai adaug alte sunete produse în gât, în gură și în nas, care modifică adânc sunetul din laringe și îl transformă în *voce articulată*, în *vorbă*, ceea ce nu lipsește decât la surdo-muți. Când cineva vorbește cu *glas încet*, când șușotește, aerul numai freacă părții glotei. Când vorbim cu *glas tare* părții glotei, sau coardele vocale superioare, vibrează în mod puternic. În rezumat, vocea se face mai mult prin ajutorul gâtului, a limbii și a buzelor și a cavitaților nasului. Vorba se compune din *vocale* și *consonante*; vocalele sunt sunete cari se formează în laringe și se întăresc prin gât, limbă, buze și nas, iar consonantele sunt sunetele cari se formează prin gât, limbă, buze și nas, și se întăresc în laringe. După locul în care se produc, consonantele se deosebesc în *guturale* (gât), *linguale* (limbă și cerul gurii), *labiale* (buze), *nazale* (nas). — Vocea se deosebește după etate și după sex: vocea copilului este *șipătoare* (strigătoare), vocea bărbatului matur este *gravă* și *sonoră*, iar a femeiei este *dulce* și *muzicală*. Ceea ce deosebește aceste voci între ele este *timbrul* sunetelor cari produc pe fiecare din aceste voci, adecă modul de a vibra al coardelor vocale pentru a le da naștere. Transformarea vocii copilului se face în etatea pubertății, adecă între 13 și 15 ani. În timpul acestei perioade vocea este răgușită, surdă, din cauză că coardele vocale sunt congestionate (umflate cu sânge), iar după ce a trecut această perioadă vocea a scăzut cu o octavă la băieți, iar la fete numai cu două tonuri, schimbându-se în același timp timbrul și intensitatea ei. Aceste deosebiri sunt mai pronunțate în vocea cântată, decât în vorbă. Intensitatea sunetului care face ca vocea să fie

puternică, sau *slabă*, atârnă de puterea cu care aerul este împins din plămâni și cu cât acest aer este dat afară cu mai multă putere, cu atât și coardele vocale vibrează mai puternic, de unde urmează că cu cât pieptul este mai dezvoltat cu atât și vocea este mai tare și aceasta este ceea ce deosebește vocea bărbatului de vocea femeiei. *Schimbările vocii în caz de boală*. Când un bolnav nu poate articula nici un sunet se zice că are *afonie*, când nu poate să vorbească decât cu glas încet, să șușotească, se zice că are *voce stânsă*, când vocea este surdă, acoperită, se zice că are *răgușeală*. Vocea mai poate fi *cavernoasă*, să sune a gol, să fie *stânsă*, tot atâtea schimbări despre cari nu ne putem da seamă prin scris pe cât ne putem da seamă prin auz. *Vocea ventrilocă* nu este produsă în pânze, după cum s'ar crede după nume, ci se produce tot în laringe, numai că *ventrilocul* are meșteșugul de a o înăbuși la eșirea ei din laringe, în timpul unei expirațiuni încete, gradate și menajate, așa încât se pare că ea vine dela o depărtare oarecare. Vocea este alterată în *boalele de bronhii* și de *plămâni*: astfel în *pleurezie* și în *fluxiunile de piept* vocea este slabă, șușotită și sacadată, în *oftică* ea este la început răgușită, apoi surdă, stânsă și în cele din urmă pierdută. Dar vocea este mai mult schimbată în *boalele de laringe*, în *laringitele acute și cronice*, în *arsurile laringelui* și în cazurile de *polipi* ai laringelui. Ea poate să fie gravă, răgușită, sau pierdută, și ceea ce o caracterizează mai mult sunt variațiunile la cari este supusă dintr'un minut într'altul, sau dintr'o zi într'alta. *Oftică laringelui* este boala care schimbă vocea, care la început este răgușită cu alternație de stângere și de sonoritate, până ce, în cele din urmă, se pierde cu totul. În *crup* vocea devine din ce în ce mai înăbușită și stânsă, fără ca să mai aibă perioade de sonoritate. În *boalele guri* alterațiunile vocii constau mai mult în greutate de a articula sunetele, încât vorba nu este destul de lămurită, așa că omul *bălbăie*, ceea ce provine din greutatea de a mișca limba și buzele (v. *Gângăvire*). Ceice n'au dinți vorbesc cu greutate și vocea

capătă un timbru special, cum se întâmplă la bătrânii fără dinți. Când lipsesc dinții tăietori (incisivi) vocea devine fluerătoare. Bețivii au vocea răgușită, surdă, cavernoasă. — *Igiena vocii*. Când cineva vorbește, declamă, sau cântă trebuie să aibă atitudine naturală, care ușurează jocul respirațiunii prea bruste, caripot să inflameze coardele vocale. În exercițiile vocale trebuie să mergem dela simplu la compus, având grija și ca exercițiul să nu dureze prea mult. Oratorii la început vor vorbi încet și cu glas moale și numai după câțva timp își vor ridica încetul cu încetul vocea. Cântăreții, la începutul studiului lor, nu trebuie să se silească să atingă notele extreme ale registrului lor. Toate exercițiile cari tind să mlădieze laringele și gâtul și să dea mușchilor agilitatea necesară pentru *cânt*, trebuie făcute cântând asupra *vocalelor*, adică vocalizând.

Vomitiv (lat. *vomitivus*, *vomitivus*, grec. *emetikos*). — Medicament care provoacă vărsături. Cel mai simplu mijloc de a face pe cineva să verse este gâdilarea omușorului cu degetul, sau cu o pană. Intre medicamentele vomitive cele mai întrebuințate avem *emeticul*, *ipeca*, *sulfatul de zinc*, *apomorfina* etc. Se mai recomandă și *apa caldă*.

Vulcana. — Stațiune balneară lângă Pucioasa, situată într'o vale frumoasă încunjurată de păduri, la o înălțime de 300 metri deasupra nivelului Mării Negre și la o depărtare de un ceas cu trăsura de Pucioasa. Apele sunt clorodice iodurate. Iodul se găsește în porție de 0.135—0.211 la 1000 gr. sub formă de iodur de sodiu și magneziu. Apele sunt foarte sărate, gustul lor este mai sărat, în atingere cu aerul se turbură depunându-se oxid de fier, de siliciu și carbonat de calciu, iar la suprafață se ridică un strat uleios, cu miros de petrol brut. Apele dela Vulcana sunt cele mai bogate în iod din toată țara. Băile se fac în sat, în cabine mici, ce se află pe lângă fiecare casă. Apa este cărată cu carul, sau cu donițele la vatră și este încălzită cu bolovani. Aceste băi se recomandă în reumatism, scrofuloză, limfatism. Are împrejurimi frumoase. Apele dela Vul-

cana se pot asocia cu apele dela Pucioasa în tratamentul balnear al unor boale, pentru a grăbi lucrarea lor terapeutică.

Vulvă (lat. *vulva*, *cunnius*, *pudendum muliebre*). — Aparatul genital extern al femeii.

X

X (Razele). — V. *Radiografie* și *Radiologie*.

Xeroform, *bismut tribromofenol*. — Pulbere galbenă cu puțin miros de fenol și care nu se topește în apă. Antiseptic intestinal, care se descompune în intestine în bismut și în tribromofenol, recomandat în diareele putride, în coleră 4—6 gr., în buline, sau într-o porțiune. Pe *dinafară* se întrebuințează

ca antiseptic în pansamentul rănilor și al șancărelor (pomadă 1 la 10).

Xerodermie (grec. *xeros* = uscat, *derma* = piele). Piele uscată cu jupuială ca praful. Este prima etapă a *Ichtozei* (V. acest cuvânt).

Xifoid (dela grec. *xiphos*, sabie și *eidos*, asemănare). — *Apendice xifoid* se numește partea de jos a osului *stern*.

Y

Yaurtul, *Yogurtul*, *Yagurtul*. — Este lapte concentrat de vacă, sau de oaie, obținut prin fierbere prelungită, în care se adaugă iaurt (puțin), din ajun. Este un lapte puțin acidulat, foarte gustos, foarte digestiv, hrănitor, diuretic și foarte bun regulator al funcțiunilor intestinale. La sfârșitul fiecărei mese un iaurt (o farfurie) este foarte recomandabil. O cură de mai multe luni de iaurt aduce mare folos sănătății omului. Yaurtul cum îl facem noi, Românii și Bulgarii, este cel mai bun (vezi *Lapte*).

Versin (bacilul lui), *Bacilul ciumei*. —

Yersin este medicul francez care l-a descoperit (V. și *Ciuma*).

Yohimbina (Cloridrat de). — Este un praf cristalin, solubil în apă. În soluție de 0 gr. 50% este anestezic local. Yohimbina este un bun afrodisiac. Se prescrie astfel : Cloridrat de yohimbina 10 cgr., alcoolat de melisă 10 gr. Se iau de 3 ori câte 5—10 picături pe zi. Un preparat bun, românesc, este *Retonul*. Conține, în afară de yohimbina, fosfați organici și stricnină. Se recomandă în neurastenii sexuală. Doză zilnică 1—3 tablete.

Z

Zăbale. — Se vede mai cu seamă la copii, la colțurile gurii. Epidermul buzelor este albui, macerat, scămoșat, dermul este roșu. Zăbalele produc oarecare arsură, uneori o durere destul de vie și o ușoară sângerare în dreptul crepăturilor. Această boală merge repede, se poate ivi din nou (recidivă) și este contagioasă. Este produsă de *streptococul plicatilis*, microb care se găsește în apele stătătoare, în puțuri și fântâni. *Tratamentul* constă în ungeri cu tinctură de iod, la fiecare 2 zile odată, arderi cu sulfat de cupru (piatră vânăță), cu acid lactic, sau cu nitrat de argint (piatră iadului), 1 la 50, urmate de ungeri cu vaselină boricată,

sau alifie cu acid salicilic (1 la 100), sau cu rezorcină (5 la 100). Vom opri copiii cu zăbale, să sărute pe alții și ei se vor servi de obiecte de masă și de toaletă rezervate numai pentru ei.

Zahăr. — Zahărul este un *aliment* și un *condiment*. Este un *aliment* fiindcă contribuie împreună cu materiile grase și feculente, la întreținerea căldurii animale, la menținerea grăsimii din corp la cantitatea ei normală, fără să fie în stare a întreține singur viața omului (vezi *Alimente*). El este un condiment fiindcă dă mâncărilor fade un gust dulce, plăcut tuturor, mari și mici. Astfel fiind, zahărul are o importanță vădită în traiul nostru fără

însă ca să fie în aceeași măsură de trebuincios ca *sarea*. Întrebuințarea moderată a zahărului este folositoare, întocmai precum abuzul este nesăbuit. Zahărul îngrașă pe om, din care pricină nu trebuie să-l mănânce



Fig. 489 — Trestia de zahăr

cei grași, cei ce suferă de *obezitate*. Ușurează mistuirea când este luat la sfârșitul mesei și în cantitate mică, dar poate să strice pofta de mâncare când este luat între mese, fără nici un rost, în cantitate mare și sub diferite forme: bomboane, dulceturi, bucăți mari de zahăr, după cum fac adeseori copiii. Cei ce suferă de dispensie, de gastralgie (dureri de stomac), nu trebuie să mănânce zahăr, căci le face arsuri și le îngreunează mistuirea. Zahărul mult strică dinții din pricină că, fermentând în gură, el dă proprietăți acide, salivei care udă mereu dinții și gingiile și în cele din urmă îi strică. Cei ce suferă de *diabet* se vor păzi de zahăr ca de foc. În rezumat, zahărul luat în natură și în cantitate mică este bun și folositor, dar este rău când se ia în cantitate mare și mai ales sub formă de bomboane și de dulceturi, cari amăgesc copiii și îi face să-și piardă cumpătul. În medicină zahărul se întrebuințează la facerea pastilelor, pastelor și siropurilor, cari servesc la îndulcirea medicamentelor cu gust neplăcut.

Zărnă, *umbra nopții*, *zărnotă* (*Solanum nigra*, fam. solaneele). — Plantă erbacee care crește pe lângă garduri, pe drumuri, prin locuri cultivate și pustii (Iulie—August). Conține principiul activ *solanină*. Lucrează ca narcotic, emolient, sedativ. Pe *dinăuntru* nu se întrebuințează, iar pe *dinafară* se dă sub formă de fiertură (decoct) 50 la 1000, în injecții. — *Solanina* se dă ca analgezic, în cazurile de nevralgii învechite, mai ales dacă există nevrită, calmează foarte bine durerile fulgerătoare și mai ales feno-

menele motrice. Se dă în buline de 5 ctgr. (2—4—6 pe zi).

Zarnacadea, *zarnacadele*, *burți*, *căprine*, *coprine*, *gheocei* (*Narcissus pseudonarcissus*, fam. amarilidaceelor). — Plantă erbacee crește pe la noi numai cultivată pentru florile sale frumoase (mari galbene). Aceste flori au o acțiune vomitivă (fac să verse), pentru care se întrebuințează uneori în loc de *ipeca*. Ele sunt bune și la tuse, mai ales la tusa măgărească. Se mai dău și în contra diareei. Se face o tiză (băutură), ca un ceai (infuzie) din 2—4 gr. flori la 125 gr. apă.

Zimotic (dela grec. *zime*), ferment). — Nume care s'a dat boalelor infecțioase pe timpul când se credea că ele sunt produse de fermenți.

Zinc. — Preparațiunile zincului sunt foarte active și primejdioase. Între aceste cele mai întrebuințate sunt: 1. *Acetatul de zinc*, care lucrează ca emetic, antispasmodic, astringent. Se dă în doză de 50 centigrame până la 1 gr. — 2. *Clorurul de zinc*, care se întrebuințează mai mult pe *dinafară* ca un caustic (pasta de Canquoin), 10—50 ctgr. la 1000 în injecții uretrale; soluțiunea lui Lannelongue, 1 la 9 apă, în injecții pentru a întări țesăturile, în jurul unui focar tuberculos (20 picături pentru o injecție). — Se mai întrebuințează în ungerile gingiilor, ca să le întărească. — 3. *Oxidul de zinc*, care lucrează ca antispasmodic, astringent, sicativ. Se dă în doză de 10 ctgr. până la 2 gr., iar pe *dinafară* în alifie de 1 la 10. — 4. *Sulfatul de zinc*, care lucrează ca astringent, antispasmodic, emetic, astringent rezolutiv. Se dă 15—26 ctgr. ca antispasmodic; 50 ctgr. până la 1 gr., ca emetic. Pe *dinafară* 0.10 ctgr la 10 gr., apă în colir; 50 ctgr. până la 1 gr. la 100 în injecții. 5. *Valerianatul de zinc* (vezi *Valeriană*). **Otrăviri**. Sărurile de zinc sunt întrebuințate în pictură și în fotografie. Cele mai multe otrăviri se fac din greșală luând sulfat de zinc în loc de sulfat de magnezie. Semnele sunt: vărsături tari neconținute, arsuri în gură și la buze, paralizie, etc. **Tratament**. Carbonat de sodă, sau de potasă, în cantitate mare, topit în apă caldă, ceai tare, cataplasme pe pânțe.

ZONA

Zona oftalmică, herpes, zoster oftalmic. — Este o boală caracterizată prin dureri foarte vii deasupra unei orbite, însoțite de obicei de ușoară ridicare a temperaturii. Tot odată apar mici vezicule, pline cu apă, pe jumătatea frunții care doare. După 2—3 zile aceste mici beșici se sparg, curge din ele o materie purulentă și când se usucă lasă în urma lor niște coji, sub care pielea este toată rănită. Târziu, după ce se curăță toată pielea, rămân cicatrici albe lucitoare, care se vor vedea vreme îndelungată, sau chiar toată viața. Boala durează dela câteva săptămâni până la câteva luni, putând să dea multe complicații de




Fig. 490. — Zona oftalmică
1=înainte și 2=după tratament

partea ochilor și pleoapelor. Cauza acestei boli se crede că ar fi un microb necunoscut încă, iar boala este epidemică și într'un grad mai mic și contagioasă. Microbul s'ar găsi în nas și pe amigdale. *Tratamentul ge-*

ZONA

neral constă în a-i da bolnavului calmante (veronal, allonal, aspirină, morfină), iar după vindecare radioterapie și electricitate. *Tratamentul local*: se va spăla regiunea bolnavă cu apă și săpun, se va pudra și se va unge cu alifie de oxid de zinc (oxid de zinc și pulbere de talc, câte 25 grame din fiecare).

Zona zoster, herpes zoster. — Această boală este cunoscută în poporul nostru sub numele de *foc viu*, din cauza că produce dureri ca de foc. Se arată printr'o erupție cu bășici, ca la herpes, localizată numai pe o singură parte a corpului și dispusă de-alungul unui nerv. Febra și starea generală care însoțește această erupție dă impresia că zona ar fi o boală acută și infecțioasă. Boala recidivează rar. Ea dă imunitate. Durata 8—10 zile. Nu-i contagioasă. Cauza nu se cunoaște. Sunt o mulțime de teorii, noi nu ne ocupăm aci de ele. Zona poate fi la față, sau la trunchi. Poate da complicații: Paralizia ochilor, paralizie facială, meningită ușoară, nevralgii. *Tratament.* Prin *aspirină*, sau *allonal* se calmează durerea. Cu praf de oxid de zinc, talc sterilizat, sau dermatol se pansează veziculele ca să nu se infecteze. Autohemoterapia a dat rezultate bune uneori. La sifilitici se recomandă tratament antisifilitic, la malarici: chinină.

S F A R Ș I T

Tipărit în Atelierele S. A. R. „Cartea Românească” din București,
B-dul Regele Carol I, Nr. 3. Reg. Com. Nr. 311/931 Soc. Ilfov,
în luna Decembrie 1942.

CARTEA SANATATII de VASILE

UNU17125

40,00 RON

19-F



I 1200.—